

R. E. TODD



Presented by the Widow

OF

ROBERT BENTLEY TODD, M.D.

MARCH, 1860.



# KING'S *College* LONDON


---

Pierer Library  
Medizinisches Realwörterbuch...  
1816 - 1829  
KCSMD R121.P1E

200824548 2



KING'S COLLEGE LONDON



Digitized by the Internet Archive  
in 2015

[https://archive.org/details/b21301049\\_0001](https://archive.org/details/b21301049_0001)





# Medizinisches Realwörterbuch

zum

Handgebrauch

practischer Aerzte und Wundärzte

und zu

belehrender Nachweisung

für gebildete Personen aller Stände.

Herausgegeben

von

D. Johann Friedrich Pierer,

H. S. Hofrath, Amts- und Stadtphysicus zu Altenburg.

---

Erste Abtheilung.

Anatomie und Physiologie.

Zweiter Band.

C — C.

---

Leipzig und Altenburg:

J. A. B r o c k h a u s.

1 8 1 8.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1901

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1901

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1901

1901

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1901

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1901

Anatomisch : physiologisches

# Realwörterbuch

zu

umfassender Kenntniß

der

körperlichen und geistigen Natur des Menschen

im gesunden Zustande.

Herausgegeben

von

D. Johann Friedrich Pierer,

H. S. Hofrath, Amts- und Stadtphysicus zu Altenburg.



---

Zweiter Band.

C — C.

---

Leipzig und Altenburg:

F. A. Brockhaus.

1818.

STANDARD. UNIVERSITY

STANDARD. UNIVERSITY

STANDARD. UNIVERSITY

STANDARD. UNIVERSITY

STANDARD. UNIVERSITY

STANDARD. UNIVERSITY

STANDARD. UNIVERSITY

STANDARD. UNIVERSITY

STANDARD. UNIVERSITY

STANDARD. UNIVERSITY

STANDARD. UNIVERSITY

STANDARD. UNIVERSITY

STANDARD. UNIVERSITY

STANDARD. UNIVERSITY

## Mitarbeiter an diesem Bande und deren Artikel.

---

**Dzondi**, (ordentlicher Professor der Medicin an der Universität zu Halle.)

Charakter, Combination, Cranioscopie, Dankbarkeit, Demuth, Denken, Dünkel, Dummheit, Ecstase, Edelmuth, Egoismus, Ehrbarkeit, Ehre, Ehrlichkeit, Ehrlosigkeit, Eifer, Eifersucht, Eigennutz, Eigenschaft, Eigensinn, Einfachheit, Einseitigkeit, Eitelkeit, Empfindlichkeit, Enthaltksamkeit, Entschlossenheit, Entschluß, Erbitterung, Erfahrung, Erfindsamkeit, Ergebenheit, Erholung, Erkenntniß, Erkenntnißvermögen, Ernst, Exaltation.

**Ficinus**, (Prof. der Chemie und Physik an der mediz. chir. Akademie zu Dresden.)

Chemie, Cohäsion, Contractilität, Crystallisation, Dammerde, Dampf, Darmkoth, Druck, Durchsichtigkeit, Eisen, Eiweißstoff, Elasticität, Electricität, Erden, Evaporation, Expansion.

**Greiner**, (Doctor der Medicin zu Eisenberg.)

Ehe.

**Rosenmüller**, (Hofrath und ordentlicher Prof. an der Universität zu Leipzig.)

Goccyrknocken, Coliacische Arterie, Cruralarterie, Cruralnerv, Cruralvene, Ethmoidalknocken.

**Seiler**, (Hofrath u. Director der medizinisch-chirurgischen Akademie zu Dresden.)

Darmcanal, Diaphragma, Drüsen, Ei, Embryo, Empfängniß, Erzeugung.

**Wilbrand**, (ordentl. Prof. der Anat. und Physiol. an der Universität zu Gießen.)

Capillargefäße, Chylus, Chymus.

## Real-Artikel vom Herausgeber selbst bearbeitet:

Cabbala, Cadaver, Calorimeter, Carotiden, Castrat, Centaur, Centrifräfte, Chaos, Chiromantie, Chirurgische Anatomie, Cladni's Klangfiguren, Clima, Coagulation, Concentration, Concentricität, Cosmologie, Cosmopolitismus, Culmination des Lebens, Cultur, Dämonen, Darmausleerung, Degeneration, Dephlogistifiren, Desorganisation, Dichtigkeit, Discretion, Divination, Drücken, Dualismus, Duplicität, Durst, Duumvirat, Dynamik, Dynamischer Proceß, Dynamometer, Effervescenz, Eingeweide, Einschlafen der Glieder, Ekel, Elemente, Embryotokie, Epistropheus, Erblaffen, Erbrechen, Erbbewohner, Erdorganismus, Erection, Ermattung, Ernährung, Erregungstheorie, Essen; Evolution, Excretion, Existenz.

## Zusatz zu dem Artikel:

Drüsen.

---



## Vorerinnerung.

---

Nach nicht ganz anderthalb Jahren erscheint der vorliegende zweite Band des anatomisch = physiologischen Realwörterbuchs. Wer diesen Zeitraum für zu weit hinausgerückt halten möchte, der wolle nicht übersehen, daß Werke dieser Art, wenn sie gerechte Anforderungen erfüllen sollen, am wenigsten in ihrem Beginnen übereilt werden dürfen. Der Herausgeber hofft, daß Sachkundige in den im gegenwärtigen Bande gelieferten Artikeln ein noch angeregteres Streben nicht verkennen werden, über jeden Gegenstand, der in denselben zur Sprache kommt, eine umfassende, genügende Nachweisung zu geben, und zugleich sie mit frühern und spätern Artikeln so in Verbindung zu bringen, daß bei fortgesetzter gleicher Bearbeitung die Besitzer des Werks, nach seiner gänzlichen Beendigung, ein in sich abgeschlossenes und abgerundetes Ganzes erhalten haben werden; ein Zweck, der bei lexicographischen Werken von einiger Ausdehnung, selten möglichst rasches Fortschreiten gewöhnlich durch die Umstände verboten ist, gar so leicht verfehlt wird. Bei den so weit vorgerückten Vorarbeiten zu den künftigen Bänden kann indessen das Publikum sich einer schnellen Aufeinanderfolge derselben eben so zuversichtlich versehen, als der Herausgeber Hoffnung nährt, nicht nur die bisherige thätige Unterstützung anerkannter würdiger Gelehrten in Uebernahme einzelner Hauptartikel sich zu erhalten, sondern auch noch mehrere achtbare Mitarbeiter für eigne Gegenstände zu gewinnen.

Der erschienene erste Band ist, was die Bearbeitung der einzelnen Artikel betrifft, in öffentlichen Blättern, so weit solches dem Herausgeber bekannt worden ist, durchaus beifällig beurtheilt worden. Wie in der Leipziger Literaturzeitung 1816 Nr. 289, in der Genaischen Allg. Literaturzeitung 1817 Nr. 65 und in der Salzburger Medicinisch = chirurgischen Zeitung 1817 Nr. 49 enthaltenen Recensionen desselben sind, in so fern sie des Antheils des Herausgebers an dem Werke und seiner eignen Beiträge gedenken, zu günstig und nach-

sichtig, als daß sie nicht mit dem relativen Werth, den er ihnen Vergleichung mit dem ihm vorschwebenden Ideal nur zugestehen kann in Widerspruch stehen sollten. Für einzelne Bemerkungen ist jenen Recensenten dankbar; über andere, deren Wichtigkeit er nicht oder nur theilweise zugestehen kann, möchte er wohl, wenn darauf ankam, sich leicht mit ihnen verständigen können.

Eine zweite, in dem Laufe dieses Jahres der Redaction der Leipziger Literaturzeitung unaufgefordert zugesandte, und von derselben zur Bethätigung ihrer Parteilosigkeit aufgenommene Recension verbreitet sich mehr über die Anlage des ganzen Werks, als über den erschienenen ersten Band, dem sie übrigens seinen Werth und inneren Gehalt nicht abspricht. Es war zu wünschen, daß unsere allgemeinen gelese- nen kritischen Blätter neue literarische Unternehmungen, besonders wenn solche von einigem Umfange sind, schon ihrem Plane nach zum besondern Gegenstand der Würdigung machen möchten. Sollte aber eine solche Würdigung von einem reellen Zweck seyn, so müßte sie mit beigefügten Gründen des Urtheils, und ehe das Unternehmen selbst zur Ausführung gekommen ist, erscheinen. Dann könnte von etwanigen in der Natur der Sache gegründeten Bemerkungen zweckdienlicher Gebrauch gemacht werden, und es ließen sich wohl auch in jenem noch solche Modalitäten treffen, wie sie der Interesse der Wissenschaft und der Zeitgenossen selbst förderlich erscheinen. Nach bereits begonnener Ausführung eines literarischen Unternehmens kommen aber Bemerkungen über die Anlage desselben zu spät, und erregen gar zu leicht den Verdacht versteckter Nebenabsichten gegen sich, wenn in ihnen das Streben sich ausdrückt, das Vertrauen des Publicums von einem Unternehmen abzulenken, nachdem dasselbe durch eine, nicht ohne Beifall aufgenommene Probe zum Theil bereits erworben ist.

Der Herausgeber benutzt diese Gelegenheit, zu einer Erklärung an alle, die ihm wohlwollen — oder auch nicht wohlwollen — um sich gegen Ausprüche zu verwahren, die durch Mißverständnisse an ihm gemacht werden könnten. Es ist in der Natur des menschlichen Geistes gegründet, daß irgend eine gefaßte Idee, die im Laufe der Zeit realisirt werden soll, erst dann zur völligen Klarheit kommt, wenn man zu ihrer Realisirung wirklich vorschreitet. Der Herausgeber bittet alle, die sich für sein Unternehmen interessiren, sich einzig an das zu halten, was er, nachdem bereits der erste Band verabsaf-

war, als Vorerinnerung zu demselben in Grundzügen aufgestellt ist.

Wer bloße Worterklärungen medizinischer Gegenstände in lexicographischer Form, mit einigen für das momentane practische Bedürfniß hinreichend genügenden Nachweisungen, und diese Arbeit in einem kurzen Zeitraum von 2 — 3 geschlossen verlangt, der werde sein Vertrauen dem Unternehmen des Hrn. Prof. Puchelt in Leipzig zu, der ein solches medizinisches Verballericon, nach eigenem Entwurf für dieselbe Verlagshandlung, welche das medizinische Realwörterbuch übernommen hat, bearbeitet, das, wenn es, wie zu erwarten, zweckmäßig verabsaft wird, selbst eine sehr schätzbare Vorarbeit für das spätere in späterer Zeit abgeben dürfte.

Das in dem gedachten Vorbericht angedeutete Unternehmen eines allumfassenden medizinischen Realwörterbuchs verschmäht aber seiner Idee nach die compendiarische Form, und kann nicht anders als in einer Reihe von Jahren, und auch dann nur unter zu verhoffender Zusammenwirkung mit dem Stand und dem Bedürfnisse der Wissenschaft vertrauter Männer zu Stande kommen, die in die dort aufgestellten Ideen eingegangen sind, und die dazu zu vereinigen die fortgesetzte Bemühung des Herausgebers seyn wird.

Um aber nicht das Publicum durch die Größe des Unternehmens und die weit hinauszgerückte Perspective der Beendigung desselben abzuschrecken, wurde gleich anfänglich der Plan eines alle medizinischen Fächer in untermischten Artikeln, nach alphabetischer Folge berücksichtigenden Werks, (vergl. das Dictionnaire des sciences médicales ist, welches aber statt, wie versprochen wurde, in 12 Bänden beendigt zu seyn, in dem 19ten, als dem neuesten vorliegenden Bande, noch nicht bis zum Buchstaben H reicht,) aufgegeben, und jeder einer Reihe einzelner Wörterbücher für die besondern Zweige der medizinischen Wissenschaft entworfen, der überhaupt so entschiedene Vortheile hat, daß alles, was man etwa zu Gunsten jenes Plans aufstellen könnte, und zum Theil auch bei unterschiedlichen Gelegenheiten geltend zu machen gesucht hat, gar nicht in Betracht kommen kann.

Unter diesen entschiedenen und völlig überwiegenden Vortheilen ist wieder der erste der: daß jedes einzelne Wörterbuch, nach dem mit-



getheilten Entwurf, ein in sich geschlossenes, und für sich bestehendes Werk ausmacht, und alle auf einander, auch in der Idee, in den Bezug haben, daß ein früher erscheinendes, unter Voraussetzung einer zweckmäßigen Bearbeitung, nothwendig den Wunsch herbeiführen muß, daß auch die andern Zweige der Medizin in gleicher Weise eigne Wörterbücher erhalten möchten, oder ein später erscheinendes Wörterbuch, in Hinsicht der Gegenstände, welche nicht in das besondere Fach gehören, dem dasselbe eigen gewidmet ist, aber doch in ihm in der nächsten Verührung stehen, in den früher erschienenen erforderliche Erläuterungen erhält.

Wer also überhaupt die Idee eines allgemein umfassenden medizinischen Realwörterbuchs, nach den Anforderungen, die von dem Standpunkte eines rein wissenschaftlichen Interesses an dasselbe gemacht werden können, zu colossalisch und ihm zu fern liegend erblickt, der möge insbesondere nicht verkennen: daß das anatomisch = physiologische Wörterbuch, wenn es gleich seiner Bestimmung nach die Wörterbücher der übrigen Zweige der Heilkunde einleiten soll, doch durch aus ein eignes Werk für sich ist, dessen relativer Werth weder jetzt in dem, was davon erschienen ist, noch in den noch rückständigen Bänden davon abhängig erscheint, ob und wenn auch für die übrigen Abtheilungen Wörterbücher folgen werden, und das dann für seinen eigentlichen Gegenstand, die allgemeine Menschenkunde, nicht bündereicher ausfallen wird, als ähnliche Werke von anerkanntem Werth für andere eigne Wissenschaften. Der Herausgeber wird wenigstens der Anlage und Vorbereitung der übrigen Wörterbücher nicht mehr Zeit widmen, als ihm, ohne daß der Fortgang und die mögliche baldige Beendigung des anatomisch = physiologischen Wörterbuchs dadurch beeinträchtigt werden dürfte, möglich ist.

So wie überhaupt darüber, daß von einer wirklich wissenschaftlichen Krankheits = und Heilkunde gar nicht die Rede seyn kann, der nicht durch eine umfassende Lehre von der Natur des Menschen in ihrer freien Entwicklung erst ihrer Basis gegeben ist, nicht der geringste Zweifel erhoben werden darf; so kann es auch der künftigen Bearbeitung der erstern in der Form von Realwörterbüchern nicht anders als höchst förderlich seyn, daß vor dem Beginnen derselben das anatomisch = physiologische Realwörterbuch wenigstens zum großen Theil durchgearbeitet ist, und so allseitig Anknüpfungspunkte für die künftigen Bearbeiter der in dieselben gehörigen Artikel darbietet.

Es ist, damit der Gesichtspunct bei Würdigung dieses Werks so weniger verfehlt werde, auch die Norm auf den einzelnen Bogen dieses zweiten Bandes, der Anordnung der Verlagshandlung zufolge, so ungeändert worden, als die Leser es beim Verwechseln mit denen des ersten Bandes finden werden. Mögen dann diejenigen, welchen das Schwankende und Precäre in der Behandlung der Physiologie in der neuesten Zeit nicht entgangen ist, die hier zugleich auch die verdienstlichen Bemühungen so mancher achtbaren Männer, die Lebenskunde nach ihrem ganzen Umfange auf eine höhere Stufe wissenschaftlichen Werthes zu erheben, gehörig zu würdigen wissen, auch den Zweck des Wörterbuchs sich nahe gelegt zu lassen, und wenn sie können, selbst mit thätig fördern: zu einem Revisionswerke zu dienen, bis wie weit wir mit alldem unsern Bemühen zeither in Kenntniß des menschlichen Körpers, und der menschlichen Natur, nach allen ihren Bestimmungen überhaupt gekommen sind, was wir über jeden Gegenstand, der sich in dieser Hinsicht darbietet, insbesondere wissen oder auch nicht wissen; und welche Wege, und mit welchem Glück solche einzuschlagen worden sind, um darüber Licht zu erhalten. Hoffentlich wird dieß Werk nach seiner zu verhoffenden Bezeichnung mehr als irgend eines unserer Literatur sich zu einem solchen Hauptpuncte des Wissenswerthen der allgemeinen Lebenskunde, mit besonderer Beziehung auf das menschliche Daseyn in jeder einzelnen Beziehung, darbieten, woran dann das, was die Folgezeit als reifere wissenschaftliche Ausbeute liefert, angereicht werden kann, und eben so als Repertorium nicht nur dem Arzte, sondern jedem nach höherer Bildung strebt, von der die innige Bekanntschaft mit der Menschennatur doch immer eine noch lange nicht genug würdige Grundbedingung bleibt, mannigfaltig nutzbar seyn.

Besonders in dieser Hinsicht ist auch in diesem zweiten Bande die Menge von Gegenständen nicht außer Acht gelassen, die einen nächsten Bezug auf das Heilgeschäfft haben, die aber theils die menschliche Natur theilweise charakterisiren, theils nothwendig gekannt werden müssen, indem sie der speciellen Wissenschaft des menschlichen Lebens zur allgemeinen Grundlage dienen. Wer dieß in dem ersten Theile zu tadeln fand, wird zu gleichem Urtheil in vorliegendem Bande überreichen Stoff finden. Indessen dürfte, auch nach den früher hierüber aufgestellten Grundsätzen,



der einzige Artikel: Erdorganismus, in vorliegendem Werke wegen seiner unverhältnißmäßigen Länge, einige Rechtfertigungen dürfen, diese aber besonders darin finden: daß 1) der nahe Bezug, in dem das allgemeine Erdenleben mit dem individuellen Menschenleben steht, noch lange nicht allgemein genug, so er es verdient, gewürdigt wird; 2) daß in jenem Artikel Menge dahin gehöriger Gegenstände zusammenbefaßt werden mußte, die gar leicht unter verschiedene Artikel hätten gebracht werden können, was aber, weil man sie unter diesen in einem anatomisch-physiologischen Wörterbuche nicht gesucht haben würde, nicht zweckmäßig erschien; 3) daß endlich die Darstellung der Erde der Erdoberfläche, wie sie gegen das Ende des Artikels gegeben wurde, in geographischen Werken, bei deren Verabfassung man einen beschränkteren Gesichtspunct, als der hier aufgestellte, genommen ist, völlig umgangen wird, die aus einfacher Autopsie hervorgehenden dort zusammengestellten Resultate aber, so wie die Anwendung derselben auf die allgemeine Geschichte der Entwicklung des Menschengeschlechts, gleichwohl dem Physiologen höchst nahe gelegt sind, der die individuelle menschliche Natur nicht außer ihrer Verbindung mit den übrigen und außer dem allgemeinen Bezug betrachten darf, in dem alle Menschen unter sich, als großes Ganzes, als Menschengeschlecht überhaupt sehen.

Winke oder Erinnerungen über in den bisher gelieferten Artikeln sich noch findende Lücken oder Halbheiten werden besonders in der Hinsicht, um sie bei vorkommenden Gelegenheiten unter verwandten Artikeln ergänzen oder berichtigen zu können, wie bisher auch ferner willkommen seyn. Fortschritte, welche die Wissenschaft während der Erscheinung des Werks machte, und von denen, wenn sie früher bekannt gewesen wären, bei Verfassung eines Artikels selbst hätte Nutzen gezogen werden können, werden ohnedieß unter verwandten spätern Artikeln nach Gelegenheit benutzt werden, und es wird sich darnach zeigen, das Werk zu seiner Bervollständigung am Schlusse noch Ergänzungsbildartikel, oder nur einiger Zurückweisungen bedürfen wird.

Geschrieben am Martinstage 1817.

---

## C. C.

**C**, ein erst in der Lateinischen Sprache und darnach in den andern Sprachen an die Stelle des Griechischen Gamma oder G gesetztes Zeichen<sup>1</sup>. Da sein Laut kein bestimmter ist, sondern nach Verschiedenheit der Sprachen oder der Zusammensetzung mit Vocalen und andern Consonanten von K bis Z alle Nuancen durchgeht; so daß, wie im Lateinischen und Deutschen, vor A, O und U gewöhnlich, wie Sch vor einem andern Consonanten wie K lautet, auch in der ersten Sprache die Stelle des K vertritt<sup>2</sup>, als Ch vorzüglich im Deutschen meist wie G ausgesprochen wird, im Französischen aber das deutsche Sch vertritt und einfach vor E und I im Lateinischen<sup>3</sup> und Französischen wie S, im Deutschen aber z. B. wie Ts oder Z ausgesprochen wird; so gehört es nicht der Natursprache an, sondern ist ein bloß conventionelles Sprachelement zu erachten. **S. Sprache.**

1) Man glaubt, daß der Buchstabe C erst nach dem ersten Punischen Krieg in die Lateinische Sprache aufgenommen sei, wie das Fragment der Inschrift auf der dem Consul Dullilius zu Ehren errichteten Columna rostrata: „*maestros lectiones pugnando copias Cartaginienses*,” andeutet. (Vgl. Lipsii antiqu. lection. l. 2. c. 14.) Auch bemerkt Quintilian (inst. orat. l. 1. c. 7,) daß in den Namen Cajus, Cnejus, das C wie G pronuncirt werde, daher auch die Bildung von *quadringenti, quingenti, septingenti* etc. von *centum*. 2) Suidas, in seinem Lexicon, bezeichnet eine halbmondförmige oder Esförmige Figur ausdrücklich als das römische Cappa. So bildeten auch die Griechen aus Caesar καίσαρ u. s. w. 3) Daher die häufigen Verwechslungen in Lateinischen Worten, wie *concilio* und *consilio*, *discidium* und *dis-idium*, *concors* und *consors*, u. s. w. (Vgl. Cellarii orthogr. lat. ed. Harles, p. 54 u. 70.)

**Cabala, (Cabala,) s. Cabbala.**

**Cabales, (Caballi, Gabales,) ein Product der ins Geisterreich überschweifenden Phantasie, nämlich vermeintlich astralische Körper von Menschen, die vor dem ihnen bestimmten Lebensziel durch einen Unfallsfall der Welt entrissen wurden, und nun unter dieser Gestalt solange noch auf der Erde herumirren sollen, bis jener Zeitraum eingetreten ist. Vgl. Gespenster.**

**Cabalia, Caballa, s. Cabbala.**

**Caballi, s. Cabales.**

**Caballista, s. Cabbalist.**

**Cabbala<sup>1</sup>, (Cabbala<sup>2</sup>,) Cabala<sup>3</sup>, (Caballa, Cabballa, Cabala, Cabalia, Cabula, Gaballa, Kabbala<sup>4</sup>, Kabala, Cabbatica ars<sup>5</sup> s. philosophia<sup>6</sup> Catena Homeri aurea<sup>7</sup>.) Fast alle Nationen der Vorzeit, deren geschichtliche Denkmäler auf unsere**

1) Fabricii Historie der Gelehrsamkeit, 2. B. S. 56. 2) Das Wort bedeutet nach seiner Ableitung aus dem Hebräischen so viel, als empfangen oder Tradition. Joh. Picus Mirandula (s. dessen Opera, Bas. 1601, fol.) hat sich desselben zuerst bedient. 3) — 5) s. die Literatur am Ende dieses Artikels. 6) J. Bruckeri inst. histor. philosophicae per, 2. part. 1. l. 2. c. 3. s. 3. 7) Vigenier. l. de igne et sale c. 26. in Theatr. chym. V. 6. p. 31.

**Minat. physiol. Realw. II. B.**



Zeiten herabreichen, besaßen eine geheime Wissenschaft, welche in der großen Volksmenge verborgen hielt. Hierher gehört auch die Cabbala der Juden, welches Wort eine mündliche geheime Ueberlieferung von Kenntnissen bezeichnet, die zu erfassen, das Volk für eben so unwürdig, als unfähig erachtet wurde.

Von welcher Art diese Geheimlehre indessen in der ältern Periode der Jüdischen Geschichte gewesen seyn mag, ist völlig in Dunkel gestellt. Wir wissen bloß aus den Zeugnissen der neuern Jüdischen Schriftsteller, namentlich von Josephus und Philo, daß zu jener Zeit, als die Essäer, die Lehren und die nationellen Einrichtungen der Syrer und Aegyptier auch nach Palästina überzutragen bemüht waren, und so eine eigne philosophische Secte bildeten, von die über gewisse Mysterien und philosophische Dogmen ein tiefes Stillschweigen beobachtet wurde<sup>8</sup>. Außerdem weiß man aus der Jüdischen Geschichte, daß zur Zeit des Königs Hyrcanus und seiner Söhne die Geheimlehre der Aegyptier von Simeon Schetachides nach Palästina übergepflanzt worden ist. Auch war es sehr nahe gelegt, daß während sich die Juden zu des Cambises, zu Alexanders des Großen und zu des Ptolemäus Philadelphus Zeiten in Aegypten aufhielten, sie einen Theil der Gebräuche, der Sitten dieses Volkes so wie in neuerer Zeit die der Griechen annahmen. Ihre Religion und philosophischen Ansichten wurden nun ein Gemisch von Zoroastrianischen, Aegyptischen, Pythagoreischen, Platonischen Ideen, die sich mit den nationellen Religionslehren vermischten, wo dann der fremdtliche Zusatz der neueren Zeit von der ältern überlieferten Lehre durchaus nicht mehr unterscheidbar war<sup>9</sup>.

Gleichwohl wurde der Ursprung der Cabbala nach cabbalistischer Lehre selbst so hoch hinaufgestellt, daß der Engel Raziel solche Adama im Paradiese in einem Buche zugestellt haben sollte, welches die ihm zwar nach der Vertreibung aus dem Paradiese habe zurückgeben müßte, auf anhaltendes Flehen aber doch ihm wieder zugestellt worden sei. Nachdem er erhielt Adama dieß Buch erst nach dem Sündenfalle, und zwar, auf sein Gebet, zu einiger Entschädigung wegen der Vertreibung aus dem Paradiese. Die Cabbalisten fabeln, daß drei Tage nachdem Adama Gott angefleht habe, ihm von dem Engel Raziel ein Buch überbracht worden sei, welches ihm die Kenntnisse aller Geheimnisse der Natur, nebst der Macht verliehen, mit der Sonne und dem Mond zu sprechen, Krankheiten entstehen zu lassen und sie zu heilen, Städte umzustürzen, Erdbeben zu erregen, guten und bösen Engeln zu gebieten, Träume und Wunderzeichen zu deuten, und die Zukunft voraus zu verkünden. Durch Ueberlieferung soll endlich das Buch bis zu Salomon gelangt seyn, der dadurch unter andern den Stand gesetzt worden sei, seinen Tempel zu bauen, ohne sich ein Werkzeug von Eisen dabei zu bedienen<sup>10</sup>.

Diese so unter den auf Neujuden auf die bemerkte Art ausgebildete Cabbala ist eine zweifache: eine contemplative und eine practische. Die erste ist die Wissenschaft, die göttlichen Bücher in Uebereinstimmung

8) Josephi hist. Judaeor. prooem.

philos. per. 2. part. 1. l. 2. c. 3. s. 2. §. 4.

ham lib. Raziel, Amst. 1701, fol.

9) Vgl. Bruckeri inst. h.

10) E. Isaac ben Ab

ung mit der geheimen Lehre anzulegen, und hierdurch die erhabnen Wahrheiten von Gott, von den Geistern und von den Welten zu erkunden; sie war also eine mystische Metaphysik oder eine subtile Naturrechte jener Zeit und jener Nation. Die zweite lehrt durch künstliche Anwendung von Worten und Sprüchen der heiligen Schrift und ihre verschiedene Zusammensetzung, ungewöhnliche Naturereignisse zu wirken.

Die contemplative Cabbala theilt sich wieder in die buchstäbliche, Cabbala literalis, s. nominalis, s. symbolica) und die philosophische, (Cabbala philosophica, s. dogmatica, s. realis.) Erstere ist eine künstlich symbolische Auslegung der heiligen Schrift, Versetzung von Buchstaben, Sylben und Worten, wodurch ein Vers einen ganz neuen und eigenen Sinn enthält. Letztere theilt sich wieder in zwei Theile, wovon die erste die Kenntniß der göttlichen Vollkommenheiten und der himmlischen Intelligenzen zum Gegenstand hat, und der zweite die magische oder Mercavah heißt, die andere aber die sublimare Welt betrachtet und der Anfang oder Bereschit genannt wird. Der erste Theil bezieht sich auf die Vision des Propheten Hesekiel<sup>11</sup>, der zweite aber auf das erste Wort der Genesis.

Die practische Cabbala gründet sich auf die Voraussetzung, daß die Gegenstände Strahlen der Objecte selbst sind, denen sie gegeben werden, und in denen eine Art von geheimem Leben ist; daß Gott selbst die Namen den Dingen beigelegt habe und daß sie daher in einer Einheit mit diesen sich befinden, von welcher großer Vortheil zur Verbesserung der Außenwelt zu ziehen ist. Die Cabbalisten lehren, daß man diese Wirkung um so sicherer erlangen könne, je heiliger die Sprache sei, deren man sich hierbei bediene, und daß um desswillen die Hebräische Sprache allen übrigen den Vorzug streitig mache. So sollen auch die Wirkungen um so wundervoller seyn, je nachdem man den Namen Gottes selbst, oder auch die Bezeichnungen seiner Vollkommenheiten aus Ausflüssen wählt. Dieser Namen Gottes, (die man Sephiroth<sup>12</sup> nennt,) sind nicht weniger als 72, durch deren Ausübung die Wirkungen geschehen. Auch die Namen von Dämonen werden zuweilen für hinreichend erachtet.

Folgende Sätze können als die Grundlagen des cabbalistischen philosophischen Lehrgebäudes angesehen werden: „Von nichts wird nichts; es gibt also keine Substanz, die aus dem Nichts hervorgegangen wäre; auch die Materie konnte also keinesweges aus dem Nichts entstehen; die Materie wegen ihrer geringen Natur entstand nicht aus sich selbst; es gibt also in der ganzen Natur keine Materie im eigentlichen Sinne; alles, was ist, existirt daher nur als Geist; dieser Geist ist unerschaffen, ewig, erkennend, empfindend, mit eignen Bewegungsmöglichkeiten begabt, unermesslich, unabhängig und hat ein nothwendiges Daseyn; dieser Geist ist also der Eusoph oder der unendliche Gott; alles also, was existirt, floß von diesem unendlichen Geist aus. Je näher nun die ausgestoßenen Dinge ihrem Ursprunge sind, desto größer und göttlicher sind sie; je mehr sie sich von ihrem Ursprunge entfernen, desto herabgewürdigter und geringfügiger ist ihre Natur. Die Welt unterscheidet sich von Gott, wie Wirkung von ihrer Ursache,



nicht aber wie eine vorübergehende, sondern wie eine bleibende Wirkung. Die von Gott ausgeflossene Welt muß also wie Gott betrachtet werden, der verborgen und unbegreiflich in seinem W durch seine Ausflüsse sich hat offenbaren und sichtbar werden wollen.

Unter den Geheimlehren der Cabbala nehmen die zehn Sephiroths den ersten Platz ein; man stellt sie theils in Form eines Stammbaumes, theils in Form von sich einander einschließenden Kreisen dar. Ihre Nahmen sind: die Krone, die Weisheit, die Einsicht, die Stärke, die Schönheit, die Größe, die Ehre, der Grund, der Sieg und das Reich; über ihre eigentliche Bedeutung und innern Verhältnisse zu einander sind die Erklärungen sehr verschiedenartig.

Als der erste Ausfluß der Gottheit, aus dem die Sephiroths hervorgehen, wird ferner nach cabbalistischer Lehre der Adam Kammun bezeichnet, nicht sowohl ein Mensch als eine menschliche Person, ein Macrocosmus, im Gegensatz des irdischen Adams, als des ersten Menschen oder Microcosmus, der, so wie dieser auf der Erde, so jener dem Himmel den ersten Rang behauptet. Er wird nach der cabbalistischen Lehre als ein Mensch dargestellt; dessen einzelne Theile ihre mysteriösen Bedeutungen haben<sup>12</sup>. So ist die Weisheit die Schale des ersten Adams und erstreckt sich bis zu den Ohren; die Einsicht ist das rechte Ohr, die Klugheit das linke. Auf seinem Pericardium ist eine Anhäufung von verdichtetem Licht; aber ein Theil davon ist durch die Augen und die Ohren entwichen; die Linie, welche dem Licht zum Canal diente, hat ihm mit der Einsicht und der Kraft das Vermögen mitgetheilt, andere Welten zu erzeugen. Die Welt dieses ersten Adams ist viel größer als alle übrigen, die von den übrigen erst wieder ihre Einflüsse erhalten und abhängig sind.

Ueberhaupt werden vier verschiedene Welten und vier Arten der Schöpfung unterschieden. Die erste, welche die Sephiroths und die großen von Gott ausgeflossenen Lichter bilden, wird als die azyluthische Welt, (Mundus azyluthicus i. e. emanationis,) bezeichnet. Diese Lichter sind von dem unendlichen Wesen ausgegangen, wie die Wärme vom Feuer, die Lichtstrahlen von der Sonne. Die Ausflüsse bleiben Gott immer nahe, und behalten ein lebhafteres und feineres Licht; denn dieses verdichtet sich in demselben Verhältniß, als es sich von dem unendlichen Wesen entfernt. Die zweite ist die briathische Welt, (Mundus briathicus, s. creationis,) worin die Schöpfung der Seelen begriffen ist, welche von der ersten Sache ausgegangen, und davon schon entfernter als die Sephiroths, daher auch dicker und verfinsteter als diese sind. Man nennt diese Welt auch den Thron des Ruhms und die Sephiroths der obern Theile theilen ihr ihre Einflüsse mit. Die dritte Welt ist die jezirathische (Mundus jezyrathicus s. formationis.) Sie befaßt die geschaffenen Engel, deren Bestimmung ist, himmlischen Körpern als Luft- oder Feuerprincip zu dienen. Ihr Oberhaupt wird Metraton genannt, dessen Vorzug das stete Anschauen Gottes ist, und von dem auch die ganze Engelordnung ihren Nahmen hat. Die asiathische Welt, endlich, (Mundus asiathicus s. fabricationis,) begreift die Körper, die weder für sich bestehen, wie die Seelen, noch in einem andern



Subject, wie die Engel. Sie sind aus einer der Theilung unterworfenen und veränderlichen Materie gebildet, und der Zerstörung unterworfen.

So phantastisch und offenbar willkürlich alle diese Bestimmungen sind; so viel Widersprüche auch die einzelnen cabbalistischen Lehrsätze unter sich und mit reellen Naturkenntnissen und Erfahrungen des täglichen Lebens haben; so wenig die aus selbigen für das practische Leben, besonders auch in Hinsicht des Gesundheitszustandes gezogenen Konsequenzen Bestätigung erhalten haben, und so vergessen und geacht auch das cabbalistische Studium in unsern Tagen ist: so ist doch nicht zu verkennen, daß in einzelnen Andeutungen der Cabala über das höhere und universelle Leben, das nur im Abglanz und Widersirahl sich der sinnlichen Wahrnehmung darlegt, manche lichte Strahlen unter übrigens trübem Gewölke durchscheinen, die auch zum Theil von den Naturphilosophen unserer Tage wieder aufgefaßt worden sind, so wie überhaupt auch die cabbalistische Lehre, wie so manche ältere und neuere Weisheit, in sich bezeugt, daß das Unendliche des Lebens und der Natur nicht anders als getrübt und in gebrochnem Lichte sich dem menschlichen Geiste offenbart.

Hierher gehörige Schriften:

do. Pistorii artis cabbalisticæ scriptores, Bas. 1587. fol.

Christian Knorr v. Rosenroth Kabbala denudata, Sulzb. 1644 4. Francof. 1694 u. 1695. Vol. II. 4)

Sam. Andreae examen cabb. philos. Mori. Herbrou 1670.

Jul. Sperber vom höchsten und besten Schatz der Magia oder Caballa, Amst. 175. 8.

Henr. Mori 1) conjectura cabbalistica, 2) triplex cabbalæ defensio, 3) sum tabularum cabbalisticarum descriptio, 4) quaestiones et considerationes librum Druschim, 5) Visionis Ezechielis, s. Mercaphæ expositio, 6) cabbismus cabbalisticus, 7) fundamenta philosophiæ, coll. in ejus scriptis philobiblicis, Lond. 1679, fol.

Co. h. Christ. Steeb caelum sephiroticum, Mogunt. 1679. fol.!

G. Wachteri elucidarius Kabbalisticus, Rom. (Berol.) 1706. 8. (H.)

Cabbalist<sup>1</sup> (*Cabbalista*<sup>2</sup>, Caballista,) ein in der Cabala unterrichteter oder von ihrer Realität Ueberzeugter. S. Cabala.

1) Fabricii Abriss eine Hfst. der Gelehrsamkeit, 2 B. S. 267. 2) Bruckeri inst. hist. phil. per. 2 part. 1. l. 2 c. 3. s. 2. §. 3.

(*Cabbalistica ars s. philosophia, Cabballa, Cabula*, s. Cabala.

(*Cachinnus*, s. Lachen.

(*Cadaver*, (*Cadaver*<sup>1</sup>), Todtenkörper, Todter Körper, Leiche, Leichnam, (*Corpus exanimatum*.) Das Leben bildet und erhält den menschlichen, wie jeden thierischen und überhaupt organischen Körper; der Tod hat dagegen die allmähliche Zerstörung der Form, das Aus- und Voneinanderweichen der Bestandtheile des Lebens, und die Verbindung dieser mit andern Theilen außerhalb des Organismus, mit andern Worten die Wiederaufnahme des entstellten Körpers in das große und allgemeine Naturleben zur unmittelbaren Folge. Jeder organische Körper befindet sich also von dem Moment an, wo das individuelle Leben von ihm gewichen ist, in einer Uebergangsperiode, in deren früherer Zeit er noch den größtentheil der äußern Andeutungen, die ihm seinen organischen Charakter

1) Hieronymi in c. 24. Math. v. 28 c. „corpus, quod significantius cadaver, ab eo, quod per mortem cadat.“

ter verliehen, aber nicht auf das Leben unmittelbar Bezug haben, da in wirklichen Lebensbewegungen bestehen, an sich trägt. In diesem Zustand wird insbesondere der menschliche Körper als Leiche bezeichnet, und so lange, als der Fäulnißproceß noch nicht so weit vorgeschrittene Zerstörungen der körperlichen Form zur Begleitung hat, daß diese in der äußern Auffassung verschwunden ist, sind wir gewohnt, immer noch die Idee einer Persönlichkeit an den irdischen Nachlaß eines Gestorbenen zu knüpfen. Wir finden eine geliebte Person, die wir vielleicht noch lebendig anzutreffen hofften, wenn sie unserer Abwesenheit verblieb, im Sarge; sie ist todt, aber es ist doch noch sie selbst, die wir da schauen, ja wenn sie auch schon das Gesicht aufgenommen und nach geraumer Zeit sie erst ungewöhnlich wieder an das Tageslicht gelangt, wähen wir immer noch, sie selbst zu erblicken, wofern nur die äußere Form nicht überwiegende Zerstörungen erlitten. Sinegen sind die mit Moder bedeckten Knochen, wenn sie auch in spät geöffneten Särgen als Gerippe noch mechanischen Zusammenhang unter sich haben, doch nur Ueberreste des Begrabenen, der selbst verwest und nun erst für die äußere Erscheinung verschwunden ist; wie auch die Leiche früher aufhört, eine Leiche zu seyn, wenn sie durch mechanische Zerstückelung ihre vorige Körperform im Ganzen, nicht bloß durch Entziehung eines oder des andern Theils, (selbst des Hauptes) verlor, wenn auch die organische Bildung dieser einzelnen Theile erhalten wurde, dagegen durch Kunstmittel, die den Proceß der Fäulniß unterbrechen und die Form der Verstorbenen ungestört lassen, wie das Balsamiren der todtten Körper, die Leichen als solche auch über ungewöhnliche Zeitperioden hinaus erhalten werden können.

Alles dieß sind Bestimmungen, die nur in dem Sprachgebrauch begründet sind. Der Mensch hat reell aufgehört zu seyn, so wie das wirkliche Moment des Todes eingetreten ist, und seine Leichengestalt selbst ist nur ein Rückstand von ihm, von dem dann wieder ein Theil nach dem andern, unter verschiedenartigen und zufälligen äußern Einwirkungen früher oder später, rascher oder langsamer sich löst.

Bevor aber noch diese Trennung und unter den chemischen Processen der Fäulniß bewirkte Metamorphose der einzelnen körperlichen Bestandtheile einen bedeutenden Fortgang gewonnen hat, gewährt die menschliche Leiche für die noch lebenden den Vortheil, durch Zergliederung über die innere Form der körperlichen Theile, zu denen im Leben der Zugang wo nicht ganz verschlossen, doch nur unter seltenen Verhältnissen und mit großer Beeinträchtigung des Lebens möglich ist, Aufschlüsse zu ertheilen, d. i. sie wird Gegenstand der anatomischen Technik. In dieser Beziehung hat das Wort *Cadaver* in der Deutschen Sprache die nähere Bezeichnung einer zu öffentlichen anatomischen Sectionen tauglichen und dafür benutzten Leiche erhalten, und es wäre wenigstens eine Verletzung des Anstandes seyn, die Leiche einer Person, für die man noch im Tode Achtung bezeigt, selbst wenn sie zur Erforschung einer Krankheitsursache oder zum Behuf der Ausmittlung eines der rechtlichen Erkenntniß unterworfenen Falls zergliedert werden sollte, ein *Cadaver* zu nennen. Auch findet dieß Wort im Deutschen nicht so gewöhnlich, wie in der ursprünglich Lateinischen Benennung Anwendung auf todtte Thierkörper, die man, in so fern sie d



faulniß unterliegen, gewöhnlicher als Aas oder mit andern bekannten natürlichen Ausdrücken bezeichnet.

Ein Cadaver in obiger Bedeutung schließt alle Nebenrückichten auf Persönlichkeit des Verstorbenen aus. Der Gegenstand ist ein rein sacherlicher, statt daß bei der Leiche, die aus bestimmten Rücksichten, nicht um der allgemeinen Belehrung willen, secirt oder theilweise zerlegt wird, eben so wie bei den Vorbereitungen derselben zur Beerdigung der Verstorbene nach seinen frühern Lebensverhältnissen immer zunächst in Betrachtung gezogen ist.

Das natürliche Gefühl, selbst auf den höhern Stufen der humanistischen Cultur zieht den Menschen von Leichenuntersuchungen ab. So nahe gelegt auch der Wißbegierde die Kenntniß der innern Organisation des Körpers ist; so kämpft ihr doch der natürliche menschliche Abscheu gegen den Tod und sein nächstes Product, die körperliche Fäulniß, so wie auf den höhern Stufen der Geistesbildung die Achtung für Verstorbene, die ihre Wurzeln selbst aus dem religiösen Gefühl zieht, mächtig entgegen. Alle Nationen der alten Welt scheuten sich, menschliche Leichen zum Gegenstand anatomischer Untersuchungen zu machen, und auch in neuerer Zeit hat nur der höhere wissenschaftliche Sinn, der als vorstehende Geistesblüthe der Europäischen Völkerschaften der letzten Jahrhunderte angesprochen werden kann, und sie, obwohl immer noch in bedeutender Minorität, über die Mitwelt hererhebt, alle andre Rücksichten besiegen können, die z. B. bei allen orientalischen Völkerschaften noch jetzt die Menschenzergliederung zu einem Gegenstand der Verabscheuung, selbst der Irreligiosität machen.

Aber daß auch hier nur die der Zergliederung menschlicher Leichen zum Zweck der Belehrung entgegenstehenden Rücksichten in den Hintergrund gedrängt, nicht aber völlig beseitigt sind, geht daraus hervor, daß überall, wo öffentliche Zergliederungsinstitute eingerichtet und unter Staatsfürsorge gesetzt sind, doch immer nur solche Leichen dafür benutzt werden, die, indem sie anatomischen Lehranstalten zum Zergliedern überliefert werden, entweder noch über das Leben hinaus, als Verbrecher oder als Selbstmörder, eine Verschuldung im Leben abbüßen sollen, oder auf die der Staat durch die Fürsorge die sie im Leben in Anspruch nahmen, wie in Lazarethen und Armenanstalten, ein natürliches Recht zu haben glaubt, oder deren persönliche Rechte wie bei ganz verarmten und verlassen Personen, niemand reclamirt, und die also gleichsam als eine Art von res nullius dem Staat zu freier Disposition darüber zufallen. Auch der hin und wieder noch übliche Gebrauch, daß Leute noch bei Lebzeiten ihren Körper anatomischen Instituten zu öffentlichen Zergliederungen nach dem Tode käuflich überlassen, oder auch Leichen von Kindern oder andern nächsten Angehörigen an dergleichen Anstalten verkaufen, setzt das unter der großen Volksmasse allgemein verbreitete Gefühl voraus, daß die Ueberlassung einer Leiche zu öffentlichen Zergliederungen ein Opfer sei, das, wenn es gebracht werden soll, erst ausgeglichen werden müsse und beweist, daß die Zerstückelung und überhaupt die willkürliche Behandlung des eignen Körpers nach dem Tode dem Menschen seiner geistigen Natur noch keinesweges gleichgültig sei.

Daß höhere Vernunftzwecke die kunstmäßige Zergliederung von Men-

schenkörpern vollkommen rechtfertigen, bedarf keiner Erörterung. Aber alle und jede menschliche Cultur, also auch die scientifische, allgemeinen humanistischen untergeordnet seyn muß und eigentlich nur wenn sie nicht in Aftercultur ausarten soll, eine andere seyn kann als die humanistische in besonderer Anwendung und mit näherer Richtung auf einen bestimmten Lebenszweck; so muß auch dem technisch Anatomen die zur Zergliederung ihm zugefallene Leiche in der Art heilig und achtbar seyn, daß er sie zu einem andern Zweck als den der Belehrung weder selbst benutzt, noch Mißbräuche damit zu Frivolität oder Vossen zuläßt, die an sich auch mit der Würde der Wissenschaft selbst, deren Charakter an sich nie anders als ernst seyn kann, in Contrast stehen müssen.

So wie überhaupt die anatomische Technik es erheischt, daß, bei der Anfertigung eines jeden Kunstgebildes; (dem ein jedes sorgfältig zubereitetes anatomisches Präparat, es sei für die Dauer oder auch nur für die momentane Beschauung, gleich gestellt ist,) die möglichste Sauberkeit beobachtet werde; so ist die Reinigung des zur Zergliederung erhaltenen Cadavers auch die erste an demselben wahrzunehmende Rücksicht. Es genügt daher nicht, den todten Körper, nachdem er aus seinen Kleidern oder Umhüllungen, in denen er dem Zergliederungsinstitut überliefert wurde, bloß gelegt worden ist, von dem ihn umgebenden Schmutz reinigen, auch nach Befinden die Kopf- und Barthaare wegnehmen zu lassen, sondern es ist auch nicht überflüssig durch Einspritzungen in den Mastdarm und Zusammendrücken des Unterleibs den etwaigen Darmkoth in den dicken Gedärmen, wie auch den noch etwan in der Harnblase befindlichen Harn zu entfernen. Zuweilen sind auch noch unverdaute Speisen und Getränke aus dem Magen zurück in die Mundhöhle getreten, oder gelangen durch Druck auf die Magengegend wieder dahin, die dann auch unter zweckmäßiger Stellung des Cadavers vor der Zergliederung entfernt werden müssen. Wenigstens ist durch in die Mundhöhle gebrachte Schwämme oder ähnliche Mittel zu verhüten, daß nicht unter dem Zergliedern und bevor auf schickliche Weise die Ueberreste der Speisen und Getränke aus dem Darmcanal entfernt werden können, diese durch zufälliges Ausreten Ekel und Störungen verursachen.

Widerliche äußere körperliche Verletzungen durch Geschwüre und andere noch an dem Cadaver ersichtliche Schäden müssen so viel als möglich ebenfalls dem Anblick entzogen werden. Der sinnliche Eindruck, den überhaupt das Cadaver vor oder während der Zergliederung macht, soll und darf kein anderer seyn, als der einer einfachen Leiche, deren allgemeiner Charakter Ruhe und Passivität als der reine Gegensatz des Lebens ist. Die etwaigen Ausnahmen von diesem Grundsatz, müssen lediglich durch die besondern Forderungen der anatomischen Technik bedingt seyn.

Die brauchbarsten Cadavers für den einfachen Zweck der anatomischen Zergliederungen sind die von vorher gesunden Personen, die auf eine gewaltsame Art, welche aber doch in den Hauptorganen keine erhebliche Verletzung zur Begleitung gehabt hat, um das Leben kamen. Daher Cadavers von Selbstmördern oder hingerichteten Verbrechern, wenn nicht absichtlich, wie beim Erschießen, wichtige Organe zerstört sind.



solchen, welche Hospitäler liefern, gewöhnlich vorgezogen werden. Da aber selten an einem Cadaver alle Theile in völliger Normalität sich finden; so ist auch um deswillen einer gut eingerichteten anatomischen Lehranstalt ein reichlicher Zugang von Cadavern Nothbedürfnis, damit der Zergliederer Theile, die er zufällig an einem Cadaver nicht deutlich in ihrer eigentlichen Form darstellen kann, an andern vorzubereiten und zu zeigen Gelegenheit habe. Auch erheischen die Verschiedenheiten der Bildung, die Eigenheiten des einen oder des andern Geschlechts, oder auch gewisser Lebensalter sind, sowohl von männlichen wie von weiblichen Cadavern, als auch von alten und jungen Personen, besonders auch von Kindern, und wo möglich auch von Schwängern und unreif abgehenden Früchten dahin gelangenden, einen verhältnismäßig starken Zugang.

Außer der nöthigen Versicherung des wirklich erfolgten Todes bei einem zur Zergliederung bestimmten Cadaver muß der Zergliederer auch, ehe er zur Section schreitet, von der Art und Weise, wie der Verstorbene um das Leben gekommen sei, Kenntniß erhalten, sowohl um ihn voraus auf diejenigen Erscheinungen bei der Zergliederung aufmerksam zu werden, die dieselbe in besonderer physiologischer oder pathologischer Hinsicht lehrreich machen können, als auch insbesondere um versichert zu seyn, daß die Zergliederung nicht vielleicht für die daran Theilnehmenden Gefahr bringen könne. Leichen von Personen, die an typhösen oder ähnlichen ansteckenden Krankheiten gestorben sind, dürfen gar nicht, oder nur mit großer Vorsicht zu Zergliederungen benutzt werden; Leichen mit hinterlassenen Spuren venerischer, krebiger oder andrer ähnlichen Krankheiten müssen mit der größten Sorgsamkeit zergliedert werden, damit nicht etwa unter der Zergliederung durch eigne Verletzung mit dem Messer oder den übrigen gebrauchten Instrumenten die Absorption jener Krankheitsstoffe aus dem Cadaver begünstigt und die Gesundheit des Zergliederers dadurch gefährdet werde. Die gewöhnlichen Vorsichtsmaßregeln zur Luftreinigung und Entfernung der Exhalationen des Cadavers aus dem zur Zergliederung benutzten oder eingerichteten Local müssen in Fällen, wo die Gefahr von Ansteckung näher gelegt ist, ebenfalls verdoppelt werden. Das Einreiben der Hände mit Dehl, das Vorbinden eines mit Essig angefüllten Schwammes vor dem Mund und der Nase, das Befeuchten des Cadavers und der geöffneten Theile desselben mit Essig, sind in allen Fällen, wo Ansteckungsgefahr eintritt, und diese nicht absolut vermieden werden kann, nicht zu verachtende Maßregeln. Das übrige ergibt sich aus den allgemeinen Grundsätzen der Klugheit und Lebensvorsicht. (Vgl. Anatomische Technik.)

Nicht alle auch übrigens wohl conditionirte Cadavers sind für jeden Zweig der anatomischen Wissenschaft von gleicher Brauchbarkeit. Für die osteologische Kenntniß bedarf man Cadavers aller Alter, von Kindern, um besonders die Form, welche die Knochen in ihrer Ausbildung während des Wachstums erhalten, und die Bildung der Knochen aus der Verbindung der Hauptstücke mit ihren Ansätzen oder ihren Epiphysen zu sehen; von jungen ausgewachsenen Körpern, besonders zu Vereitung vollständiger Skelette; von ältern Personen, um auch das Abnehmen der Knochen in dieser Lebensperiode und die Eigenthüm-

lichkeiten, die sie in diesem Alter zeigen, ansehen zu können. Zur Präparation der Ligamente und zu myologischen Demonstrationen sind Cadavers von nicht allzufetten Personen mittlern Alters, so wie auch männlichen Geschlechts vorzuziehen. Für splanchnologische Untersuchungen sind Cadavers von allen Altern und von beiden Geschlechtern erforderlich, besonders hier aber von solchen, die nicht an chronischen Krankheiten verstorben sind, bei denen nicht leicht sämtliche Eingeweide des Körpers sich in natürlicher Beschaffenheit zeigen. Zu angiologischen Präparationen, wobei der Cadaver vorher künstlich injicirt werden soll, muß man besonders jüngere nicht allzufette Körper wählen, in denen man keine Zerstörungen oder auch widernatürliche Beschaffenheit der Gefäße durch vorherige Krankheiten voraussetzt. An Cadavern von Menschen, die unter einem allgemeinen Blutverlust gestorben sind, wie z. B. bei Enthaupteten, eignen sich wegen der dadurch bewirkten Leere der Gefäße wenigstens die unverletzt gebliebenen Theile zur Gefäßinjection. Für neurologische Präparationen haben Cadavers alter Personen den Vorzug, weil die feinen Nerven nicht so leicht abreißen und unter der Vorbereitung sich verlieren oder gleichsam zerfließen, ingleichen der Mangel an Fett das Auffuchen und Blosslegen derselben erleichtert. Auch Cadavers von wassersüchtigen Personen sind für diesen Zweck wohl geeignet. Für die Nervenpräparation der Brust und des Unterleibes bieten jedoch wieder kindliche Cadavers Vortheile dar, die in spätern Lebensaltern verschwinden, weil die die Nerven verbergenden Theile leichter wegzunehmen sind.

Eine besondere Rücksicht erheischt die Erhaltung eines Cadavers sowohl im Ganzen als in seinen Theilen, so lange solches für den Zweck der anatomischen Zubereitung und Demonstration erforderlich ist. Um desswillen ist die Winterszeit und überhaupt kalte Witterung, so wie ein Local, das der Einwirkung der Sonnenstrahlen weniger ausgesetzt ist, der anatomischen Technik vorzüglich förderlich. Immer muß entweder mit Zergliederung derjenigen Theile, die der Zerstörung durch die Fäulniß am frühesten unterliegen, namentlich der Verdauungswerkzeuge, der Lunge, des Gehirns begonnen werden, oder es müssen diese Theile, wie überhaupt die Eingeweide des Unterleibes und der Brust, nachdem diese Höhlen bei Zeiten geöffnet sind, entweder aus denselben genommen werden, oder es muß durch Aufschlagen von kaltem Wasser, welches auch wohl mit Essig oder Branntwein vermischt wird, der Fäulniß in diesen Theilen Einhalt geschehen. Ueberhaupt wird durch zeitige Trennung der Theile, die man einzeln der Zergliederung zu unterwerfen gedenkt, von dem übrigen Körper, und die baldige Entfernung der Feuchtigkeiten aus dem Körper und den einzelnen Theilen, in so fern dieß die besondern Intentionen, die man bei der Zergliederung hat, erlauben, die Abhaltung der schnellen Fäulniß gar sehr erleichtert.

Man muß sich hüten, mehrere Körpertheile von der Haut und den umhüllenden Theilen zu entblößen, als man in einem Tage oder doch am folgenden völlig rein zu präpariren gedenkt, damit das Austrocknen der Theile an der Luft, wodurch sie in ihrer natürlichen Form unscheinbar werden, abgewendet wird. Muß die anatomische Arbeit



unterbrochen werden; so bringt man alle Theile, mit deren Untersuchung man sich beschäftigt, in ihre natürlichen Lage, bedeckt sie wieder mit der deshalb nur zurückzulegenden Haut, die man dann mit Nadeln zusammenhält, oder auch zusammennäht, und auch wohl der Sicherheit wegen noch mit Essig oder Brantwein oder damit vermengtem Wasser befeuchtet und mit Lüchern bedeckt. Muskeln werden, nachdem sie bloß gelegt sind, wenn sie sich eine Zeit lang erhalten sollen, mit Vortheil mit in Essig getauchten Lüchern umschlagen. Aus dem Körper genommene Eingeweide werden zu ihrer Erhaltung für den anatomischen Zweck in der Zwischenzeit in reines frisches Wasser gelegt. Das bloß gelegte Gehirn wird zu seiner längern Erhaltung mit Vortheil mit einer Mischung von 2 Theilen Weingeist und 1 Theil Salzsäure übergossen, und vor der fernern Zergliederung wieder mit reinem Wasser abgespült.

Die anatomische Beschäftigung mit einem Cadaver kann überhaupt so lange fortgesetzt werden, bis unter der fortgesetzten Fäulniß die Theile ihren Zusammenhang verlieren, und unter den nöthigen Vorsichtsmaßregeln ist die Ausdünstung derselben den Zergliederern laut Erfahrung nicht gefährlich. Zu diesen Vorsichtsmaßregeln gehört aber zunächst auch die Entfernung aller zur anatomischen Untersuchung weiter nicht gehörigen oder zu derselben nicht mehr fähigen faulen Theile, so wie auch die Anweisung solcher Plätze, wo die Rückstände der Zergliederung oder die zur Zergliederung nicht weiter geeigneten Cadavers beerdigt werden können, unter die Vorsichtsmaßregeln der Gesundheitspolizei.

Ob nicht Humanitätsrückichten, in Fällen wo nicht die, keinem Menschen ganz gleichgültige, Anweisung einer ihm bestimmten Ruhestätte in dem mütterlichen Erdschooß, durch gesetzlichen Ausspruch einem Verstorbenen versagt ist, erheischen, diesen körperlichen Ueberresten, gleich andern Leichen, noch diejenige Aufmerksamkeit angedeihen zu lassen, die der Volksausdruck unter einem ehrlichen Begräbniß befaßt, muß hier unberührt bleiben, da das dem Anatomen zur Untersuchung gelieferte Cadaver nur in so fern und so lange Gegenstand seiner Berücksichtigung ist, als es ihm Stoff zum eignen Unterricht und zu fremder Belehrung gibt. (H.)

**Cadaveröser Geruch**, (*Cadaverosus odor*,) Leichen- oder Leichengeruch, das erste Product des von dem Moment des entflohenen Lebens an beginnenden Fäulnißprocesses, durch die von todtten thierischen Theilen sich lösenden Essluvien, in ihrer Einwirkung auf das Geruchsorgan sich darstellend, das in jeder Thierart specifische Verschiedenheiten zeigt. Vgl. Cadaver.

*Caduca membrana*, f. Hunterische Membran.

*Caeca cavitas labyrinthi*, i. q. Cochlea.

*Caecae appendices venarum uteri*, f. Appendices caecae venarum uteri. — *tubae uteri*, f. Fallopische Trompeten.

**Caecalararterien**, (*Caecales arteriae*'), Blinddarmarterien<sup>2</sup>, Zweige der obern mesenterischen Arterie, die sich an den Blinddarm vertheilen, wovon eine vordere<sup>3</sup> und eine hintere<sup>4</sup>, (*anterior*<sup>5</sup> et

1) Halleri elem. physiol. T. VII. l. 24. s. 3. § 29. 2 — 4) Edmerring's Gefäßl. S. 268. 5) 6) Halleri et. physiol. l. c.

posterior <sup>6)</sup> unterschieden werden. Andere unterscheiden auch nur eine einzige Cäcal- oder Blinddarmarterie <sup>7)</sup> (Arteria caecalis <sup>8)</sup>.)  
 S. unter Mesenterische Arterie, obere Arterie.

6) S. Note 5. 7) Walsby's chir. Anat. übers. v. Puth, 1. Th. S. 346. 8) Meyers Besch. der Dntgef. S. 135.

*Caecale ligamentum*, f. Mesocäcum.

*Caecales arteriae*, f. Cäcalarterien.

*Caecalis arteria*, f. unter Cäcalarterien, auch Ileocolonarterie.

— *vena*, f. Cäcalvene.

*Cäcalvene*, (Caecalis vena <sup>1)</sup>) Blinddarm = Blutader, oder Vene <sup>2)</sup>, die das Blut von dem Blinddarm aus, in die Ileocolonvene zurückleitende Vene. S. Pfortader.

1) 2) Loderi tab. anat. und deutscher Text. Taf. 123. Fig. 1. Nr. 23.

*Caeci tubuli uteri*, f. Venen des geschwängerten Uterus.

*Caecitas*, *Caecitudo*, f. Blindheit.

*Caecum foramen*, f. Blindes Loch. — *— ossis frontis*, f. Blindes Loch des Stirnknöchens. — *— labyrinthi*, i. q. Cochlea.

— *— linguae*, f. Meibomisches Loch. — *— intestinum*, f. Blinddarm.

*Caecus*, *a*, *um*, f. Blind.

*Caecus locus retinae*, f. Blinde Stelle in der Netina. — *meatus*, f. Acustischer Sinus. — *saccus ventriculi*, f. Blinder Sack des Magens.

*Caerulea tunica oculi*, i. q. Iris.

*Caerulei oculi*, f. unter Farben der Iris, blaue Augen.

*Caeruleum Berolinense*, s. *Prussiacum*, f. Berlinerblau.

*Caesariatus*, f. unter Haarreich.

*Caesaries* <sup>1)</sup>, eigentlich zierliches schönes Haar bei Jünglingen und Männern, auf dessen Cultur die Römer große Sorgfalt verwendeten. Bei Knaben vor dem siebenten Jahre, wo das Haar das erste Mal förmlich verschnitten wurde, hieß das Haar Coma, von da an bis zum vierzehnten, wo es das zweite Mal verschnitten wurde, Cirri. Bei Dichtern findet man indessen auch Caesaries für Frauenhaar, das in seiner Zierlichkeit sonst Coima genannt wurde <sup>2)</sup>. S. Haupthaar.

1) Von caedere, schneiden, nämlich die künstliche Behandlung des Haars. Vgl.

Salmassii epist. de caesarie viroorum et coma mulierum. 2) Virgilii Georg. 1. 4. c. 337. „Caesariem effusae nitidam per candida colla.“

*Caesii homines*, f. unter Farben der Iris, blonde Menschen. — *oculi*, f. unter Farben der Iris, blaue Augen.

*Caesuliae*, veraltetes Wort <sup>1)</sup>, i. q. Caesii. S. unter Farben der Iris, blonde Menschen.

1) Noch Festus (de veter. verbor. sign.), γλαυκοπαλινος.

*Caegastriſche Seele*, *Caegastriſches Leben*, (*Caegastrica anima*, *Caegastrica vita*), f. unter Caegastrum.

*Caegastrum*, (*Caegastrum*), wird von Paracelsus <sup>1)</sup> an sich und in seinen Ableitungen Caegastriſche Seele, Caegastriſches Leben, (*Anima* s. *Vita caegastica*) u. s. w. immer dem Gliastrum und dessen Ableitung, als der ersten und unverdorbenen erschaffenen Materie entgegengesetzt und deutet dann den Abfall oder die Verderbnis jener an. Vgl. Gliaster.

1) S. dessen Schrift, Azoth s. de ligno et linea vitae.



*Calanium os*, i. q. *Processus styloideus*, s. *Stylsförmiger Proceß* der Schläfeknochen.

*Calamus scriptorius*, s. *Federkiel*.

*Calcanea bursa mucosa*, s. *Calcaneischer Schleimsack*.

*Calcanei os*, i. q. *Calcaneus*.

*Calcaneo - dorso - phalangeus musculus*, s. unter *Extensoren* der Behen, den kurzen *Extensor*. — *infra - phalangianus*, i. q. *Calcaneo - phalangeus musculus*, — — *phalangius digiti minimi musculus*, i. q. *Calcaneo - phalangeus musculus digiti minimi*. — — — *pollicis musculus* i. q. *Calcaneo - phalangeus pollicis musculus*. — *metatarso - phalangeus digiti minimi musculus*, s. *Abductor* der kleinen Zehe — *phalangeus digiti minimi musculus*, s. *Abductor* der kleinen Zehe. — — *musculus communis*, s. unter *Flexoren* der Behen, den kurzen *Flexor*. — — *pollicis musculus*, s. *Abductor* der großen Zehe. — *planta - phalangeus musculus*, s. unter *Flexoren* der Behen, den kurzen *Flexor*. — *supra - phalangianus*, s. *phalangianus musculus communis*, s. unter *Extensoren* der Behen, den kurzen *Extensor*. — — *ungularis musculus*, s. unter *Extensoren* der Behen, den kurzen *Extensor*.

*Calcaneum*, *Calcaneus*, s. *Ferse*, auch folgenden Artikel.

*Calcaneus*, (*Calcaneus* <sup>1</sup>, *Calcaneum* <sup>2</sup>.) *Fersenbein* <sup>3</sup>, *Fersenknochen* <sup>4</sup>, *Ferse* <sup>5</sup>, (*Os calcis* <sup>6</sup>, s. *calcaris*, s. *calcanei* <sup>7</sup>, *Calx* <sup>8</sup> *Calcar pedis* <sup>9</sup>.) der längliche, starke, seiner Gestalt nach unregelmäßige Knochen, welcher den hintern untern Theil des Oberfußes oder *Tarsus* ausmacht, oberwärts mit dem *Talus*, vorwärts mit dem cuboideischen Knochen durch straffe Gelenke in Verbindung steht, beim Stehen aber den größten Theil der Last des Körpers trägt. *S. Fußknochen*.

1) Nach dem Griechisch gleichbedeutenden Worte, *Καλκαίος* (*Galenide ossib.* l. c. 14.) gebildet. *Veslingii syntagm. an. c. 17.* 2) *Laurentii hist. anat. l. 2. c. 37.*

3) *Plenck's Berggliederungsk. Uebers. Leipzig 1782. I. Bd. S. 215.* 4) *Waller's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 358.*

5) *Kulmus anat. Tabell. 5. Tab.* 6) *Celsi de med. l. 8. c. 1.*

7) *Eustach. opusc. anat. p. 187, 188.* 8) *Kulmus anat. Tabell. a. a. D.*

9) *C. Bauhini theat. an. l. 4. c. 43.*

*Calcaneischer Schleimsack*, (*Calcanea bursa mucosa* <sup>1</sup>.) *Schleimsack* der *Ferse* <sup>2</sup>, ein zwischen der *Achillessehne* und dem *Calcaneus* unterschiedener Schleimbeutel, der jedoch öfters mehrfach vorhanden ist. *S. Schleimsäcke*.

1) 2) nach *Fischer*, (*Univ. zur Berggliederungsk. I. Th. S. 167.*)

*Calcar*, *Calcar avis*, i. q. *Pes Hippocampi minor*, s. unter *Hippocampusfüße*, kleinerer *Fuß*. — *capitis*, i. q. *Processus styloideus*, s. *Stylsförmiger Proceß* des Schläfeknochens. — *pedis*, i. q. *Calcaneus*.

*Calcarea terra*, s. *Kalkerde*.

*Calcaris os*, i. q. *Calcaneus*.

*Calcinierte Menschenknochen* <sup>1</sup>, (*Calcinata xilostea humana* <sup>2</sup>.) eine Unterabtheilung von menschlichen *Osteolithen*, wo die Knochen eigentlich nur fossil im engern Sinn sind, d. i. bloß noch ihre

1) 2) *Wallerius Mineral. Übers. v. Darsow 2. Aufl. Berlin 1767, S. 452.*

erdigen Rückstände in unveränderter Form zeigen. S. Anthropolithen.

*Calcis os*, i. q. *Calcaneus*.

*Calcoidea ossa tarsi*, i. q. *Sphenoidea ossa tarsi*.

*Calfa*, eigentlich ein Arabisches Wort, i. q. *Praeputium*, s. Vorhaut.

*Calices renales*, s. Becher der Nieren.

*Calidum acquisititium*, s. unter Angeborne Wärme. — *foemale*, s. Angeborne Wärme. — *ignem*, i. q. *Calidum acquisititium*. — *innatum s. insitum*, s. Angeborne Wärme. — *menteriale*, i. q. *Calidum acquisititium*. — *nativum*, i. q. *Calidum innatum*.

*Caligatio*, *Caligo*, s. Blindheit.

*Calla*, eigentlich ein Arabisches Wort, i. q. *Vesica urinaria*, Harnblase.

*Callicreas*, nach dem Griechischen gleichlautenden Worte<sup>1</sup>, i. q. *Pancreas*.

1) Καλλικρεας.

*Calliditas*, s. List.

*Callöse Haut*, (*Callosa cutis*<sup>1</sup>) Schwielige Haut, Hornhaut, mit Schwielen bedeckte Haut, besonders an den Fußsohlen und in den Handflächen. S. Schwielen.

1) Panegyric. ad Pisonem v. 17. „Humida callosa cum pinseret hordea dextra“.

*Callöser Körper des Gehirns*, (*Callosum corpus cerebri*<sup>1</sup>) *Calluskörper* oder *Balken*<sup>2</sup>, oder *Schwieliges Körper* oder *Markiger Mittelbalken*<sup>3</sup>, oder *Großes markige Querband*<sup>4</sup>, oder *Großes Markband*, oder *Großer Balken*<sup>5</sup>, oder *Knorplicher*<sup>6</sup>, oder *Harter*<sup>7</sup> *Körper des Gehirns* *Gehirnbalken*<sup>8</sup>, *Gehirnkern*<sup>9</sup>, *Hirnschwiele*<sup>10</sup>, *Größte Verbindungskörper im Gehirn*<sup>11</sup> (*Commissura cerebri maxima*<sup>12</sup>), der bei Entblößung des Gehirns von der harten Hirnhaut, und nach Wegnahme des sichelförmigen Fortsatzes dieser, zwischen den aus einander gezogenen Hemisphären des Gehirns in der Tiefe sichtbar werdende Gehirntheil, der sich durch seine weißere Farbe von der übrigen Gehirnoberfläche auszeichnet, und nach oben die Verbindung beider Gehirnhälften bewirkt. S. Gehirn.

1) nach Bessel (de h. c. fabr. l. 7. c. 5.) in Uebersetzung der Griechischen Benennung τυλλοειδὲς σωμα von τυλός, eine Schwielen, wegen Ähnlichkeit der Farbe, vielleicht auch der festern Consistenz gebildet. 2) 3) Mayer's Besch. d. menschl. K. 6. B. S. 117. 4) Haller's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v. Leveiling, 1. Th. S. 392. 5) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2856. 6 — 9) Bientaud's Zergliederungsk. 2. B. Uebers. 1782. S. 30. 10) Winslow's anat. Abh. 4 B. Uebers. Berl. 1735. S. 111. 11) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2. a. D. 12) Edm. merring's Hitz- u. Nervenlehre, S. 41.

2) 3) Mayer's Besch. d. menschl. K. 6. B. S. 117. 4) Haller's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v. Leveiling, 1. Th. S. 392. 5) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2856. 6 — 9) Bientaud's Zergliederungsk. 2. B. Uebers. 1782. S. 30. 10) Winslow's anat. Abh. 4 B. Uebers. Berl. 1735. S. 111. 11) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2. a. D. 12) Edm. merring's Hitz- u. Nervenlehre, S. 41.

6 — 9) Bientaud's Zergliederungsk. 2. B. Uebers. 1782. S. 30. 10) Winslow's anat. Abh. 4 B. Uebers. Berl. 1735. S. 111. 11) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2. a. D. 12) Edm. merring's Hitz- u. Nervenlehre, S. 41.

10) Winslow's anat. Abh. 4 B. Uebers. Berl. 1735. S. 111. 11) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2. a. D. 12) Edm. merring's Hitz- u. Nervenlehre, S. 41.

11) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2. a. D. 12) Edm. merring's Hitz- u. Nervenlehre, S. 41.

12) Edm. merring's Hitz- u. Nervenlehre, S. 41.

*Callor*, i. q. *Callus*, s. Schwielen.

*Callosa cutis*, s. *Callöse Haut*.

*Callositas cutis*, s. *Schwielen*.

*Callosum corpus cerebri*, s. *Callöser Körper des Gehirns*.

*Callosus limbus ostiorum venosorum cordis*, s. *Limbus* der venösen Oefnen des Herzens.

*Callum*, ungewöhnliches Wort statt *Callus*.



*Callus*, f. Schwielen.

*Calluskörper des Gehirns*, f. Callöser Körper des Gehirns.

*Calluskörperarterie*, (*Callosi corporis arteria* <sup>1)</sup>), Balkenarterie <sup>2)</sup>, einer der Hauptzweige, in welche sich die innere Carotis, nach Abgabe der ophthalmischen Arterie vertheilt, der den callösen Körper, wie mehrere Theile des Gehirns, mit Blut versorgt. S. unter Carotiden, innere Carotis.

<sup>1)</sup> Halleri icon. anat. Fasc. 7. p. 5. <sup>2)</sup> Edmümmerring's Gefäßl. S. 121.

*Calor animalis*, f. Animalische Wärme. — *innatus* s. *nativus*, Angeborne Wärme. — *relativus*, i. q. C. *specificus*. —

*anguinis*, f. Blutwärme. — *specificus*, f. Specifische Wärme.

— *vitalis*, f. Animalische Wärme, auch Angeborne Wärme.

*Caloricitas*, f. Wärmeerzeugung.

*Caloricum*, f. Wärmestoff.

*Calorificatio*, f. Wärmeerzeugung.

*Calorimeter* <sup>1)</sup>, (*Calorimetrum* <sup>2)</sup>), wörtlich Wärmemesser (Vgl. Thermometer), wird jedoch in neuerer Zeit von den Physikern besonders zu Bezeichnung des von Lavoisier und de la Place <sup>3)</sup> zuerst in Vorschlag gebrachten Eisapparats benutzt, um aus der Menge des durch den, aus einem Körper, oder einer Mischung von verschiedenartigen Körpern höherer Temperatur entströmenden Wärmestoff geschmolzenen Eises, oder dadurch erhaltenen tropfbar flüssigen Wassers, die relative Menge des Wärmestoffs in diesen Körpern bei einer gegebenen äußern Temperatur oder die specifische Wärme von Körpern zu erforschen.

Ein solcher Apparat besteht wesentlich aus einem metallenen Gefäß, welches wieder mit zwei verschließbaren Räumen umgeben ist. In das Gefäß selbst oder den innersten der auf diese Art entstandenen Räume wird nun der zum Versuch bestimmte Körper gebracht. Der mittlere und der äußere Raum werden mit gestoßenem Eis angefüllt. Der ganze Apparat wird in einer äußeren Temperatur von 0 Grad des Reaumur'schen Thermometers erhalten. Das Eis des mittlern Raums schmilzt nun durch Einwirkung des dem untersuchten Körper zutweichenden und in das Eis übergehenden Wärmestoffs; das entstehende Wasser fließt durch eine Röhre in ein tieferes Gefäß herab, wo man auf einer angebrachten Scale die relative Menge desselben und so auch sein Gewicht erschen kann. Das Eis in den äußern Raum hält die Einwirkung der äußern Temperatur ab. (H.)

<sup>1)</sup> Suclow's Anfangsgründe d. Physik u. Chemie, 1. Th. S. 602. <sup>2)</sup> aus dem Lateinischen Worte calor und dem Griechischen *μετρον* gebildet. <sup>3)</sup> S. Mém. sur la chaleur par M. Lavoisier et de la Place in den Mém. de l'acad. Royale de Paris 1780, p. 355. und in Lavoisier traité élém. T. II. p. 368. tab. 6.

*Calva*, *Calvaria*, f. Hirnschädel.

*Calx*, f. Ferse, ingleichen Calcaneus, auch Kalkerde.

*Cambium* <sup>1)</sup>, ein von den Arabisten nach Avicenna's Lehre <sup>2)</sup> unterschiedener dritter Nahrungsast, der, nachdem er durch zwei frühere Zustände (Ros und Gluten) hindurchgegangen ist, nun zur wirklichen Assimilation selbst sich eignet. Vgl. Assimilation.

<sup>1)</sup> von dem Verbum cambire, umwechseln, gebildet. <sup>2)</sup> S. Avicennae oper. ex Gerardi Cremon. versione et Andr. Alpigi Belunensis castig. a. J. Costeo et J. Paul, Mongio annot. illustr. ed. Ven. 1608, fol. T. II. p. 62. ann.

*Camera* <sup>1</sup>, f. Sinus. — *cerebri*, f. unter Gehirngruben, au  
Fornix des Gehirns. — *cordis*, i. q. Pericardium.

<sup>1</sup>) In eigentlicher Bedeutung eine gewölbte Decke, dann auch ein gewölbtes o  
auch anderes Gemach.

*Camerae cerebelli*, f. unter Gehirngruben. — *oculi*, f. Kam  
mern der wässerigen Feuchtigkeit.

*Cammerata involucra coli*, f. Zellen des Colons.

*Campe*, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte <sup>1</sup> i q. Pople  
f. Kniekehle.

<sup>1</sup>) *Καμψη* (Galenii comm. 3. ad Hipp. l. de articul.)

*Campus oculorum*, f. Augensfeld.

*Canälchen*, *Kanälchen*, (Canalicula, Canaliculus,) d  
Diminutiv von Canal.

*Canal* <sup>1</sup>, *Kanal* <sup>2</sup>, (Canalis <sup>3</sup>.) *Gang* <sup>4</sup> (Ductus <sup>5</sup>, Me  
tus <sup>6</sup>.) eine röhrenartige Aushöhlung, entweder selbst von Häuten <sup>1</sup> g  
bildet, oder, und zwar vorzüglich, in der Substanz von Knochen for  
gehend, oder auch den Knochen ganz durchdringend, ja selbst dur  
mehrere Knochen hindurch sich erstreckend, und zum Durchgang von G  
säßen, Nerven oder andern Theilen oder auch zum Abfluß oder Durc  
fluß von Feuchtigkeiten bestimmt. S. Gänge, auch Knochenau  
höhungen.

<sup>1</sup>) Poter's anat. Handb. 1. B. S. 13.

<sup>2</sup>) Mayer's Besch. d. menschl.

R. 1. B. S. 230.

<sup>3</sup> — <sup>5</sup>) Palfyn's chir. Anat. übers. v. Hut

1. Th. S. 37.

<sup>6</sup>) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D.

*Canal der Carotis*, f. Carotischer Canal.

*Canal der Chorda des Tympanums* <sup>1</sup>, (Canalis chordae  
s. pro chorda <sup>2</sup> tympani,) Loch für die Sehne des Trom  
melfells <sup>3</sup>, derjenige knöcherne Gang, welcher von dem Tympanu  
aus, sich rück- und abwärts bis zum stylo mastoideischen Loch d  
Schläfenknochens erstreckt und einen dünnen Nervenfasern vom Facia  
nerven, die sogenannte Chorda des Tympanums, in das Tym  
panum leitet. S. Knöcherne Gehörwerkzeuge.

<sup>1</sup>) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1600.

<sup>2</sup>) Kühn

diss. de organis auditus inserv. S. 18.

<sup>3</sup>) Cassebohm tr. de au

hum. S. 99.

<sup>4</sup>) Meutaud's Zergliederungsk. Uebers. Selp. 1782. 1. B. S. 6

*Canal der Epididymis*, (Canalis epididymidis <sup>1</sup>) Can  
der Nebenhode <sup>2</sup>, Nebenhodengang <sup>3</sup>, Nebenhoden  
gefäß <sup>4</sup>, Cylindrische Röhre des Nebenhoden <sup>5</sup>, (Vas  
Ductus <sup>6</sup> epididymidis,) das vom Kopf der Epididymis aus, dur  
den Zusammentritt der Graaf'schen Samenröhrchen, die den aufgenom  
menen Samen dahin ergießen, entstandene durch vielfache Verschlingelun  
gen die Epididymis hauptsächlich constituirende und in den deferirenda  
Samengang sich endigenderöhrenförmige Gefäß. Vgl. Epididymi

<sup>1</sup>) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 2235.

<sup>2</sup>) Mayer

Besch. d. menschl. R. 5. B. S. 112.

<sup>3</sup>) Haller's Grundle. d. Physio

umgearb. von v. Feveling, 2. Th. S. 370.

<sup>4</sup>) Hildebrandt's Lehr

u. f. w. a. a. D.

<sup>5</sup>) Halleri elem. physiol. T. VII. l. 27. s. 1. S. 2

<sup>6</sup>) Halleri pr. lineae physiol. ed. Wriesb. S. 839.

*Canal der männlichen Ruthe*, f. Männliche Harnröhre.  
*der Schnecke*, f. Scalen der Cochlea.

*Canal der Geruchsnerven*, (Canalis osfactorii instrumenti

<sup>1</sup>) Vassaei in anat. corp. h. tab. 3.



ductus instrumenti olfactus s. Ductus nerveus<sup>2</sup>.) wurde von ältern Anatomen, die ihre Untersuchungen bloß an größern Thieren anstellten, auch dem Geruchsnerven des Menschen beigelegt, aber nicht, wie bei jenen Thieren, eine mit der vordern Hirnhöhle auf derselben Seite in Verbindung stehende längliche Höhlung enthält; Sch hat Sommering diese Höhlung auch in zarten menschlichen Embryonen unterschieden<sup>3</sup>. S. unter Gehirnnerven, Geruchsnerv.

2) Varolii de nerv. opt. etc. epist. Pat. 1573. Er bestritt zuerst die Galenische Behauptung, daß auch im Menschen die vordern Hirnventrikel sich in die Geruchsnerven öffneten. 3) S. dess. Schrift über das Organ der Seele, S. 24.

Canal des Mutterhalses, s. Canal des Uterushalses.

Canal des Stapedius, (Canalis stapedii s. pro musculo stapedis<sup>1</sup>, s. protuberantiae pyramidalis tympani<sup>2</sup>.) Höhle der Papillareminenz der Pauke<sup>3</sup>, die in der pyramidenförmigen Eminenz in dem Tympanum befindliche Höhle, in welcher der Stapedius oder Steigbiegemuskel seine Lage hat. Vgl. Pyramidenförmige Eminenz des Tympanums.

1) Cassebohm tr. de aure hum. §. 132. 2) Kühnau de organis auditui inserv. p. 42. 3) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. §. 1611.

Canal des Tensors des Tympanums, (Canalis pro musculo interno mallei<sup>1</sup>.) Kanal des innern Muskels des Gehörhammers<sup>2</sup>, Stimmer für den Tensor des Tympanums<sup>3</sup>, Halbheinner Canal der Trommelhöhle<sup>4</sup>, Canalis semicanalis<sup>5</sup>, s. Semicanalis osseus<sup>6</sup> tympani,) der in der Eustachischen Röhre unterwärts nur durch eine dünne Lamelle, in Theil aber nur durch häutige Substanz abgesonderte längliche Röhre, in dem der Tensor des Tympanums seine Lage hat. S. Höckerne Gehörwerkzeuge.

1) Cassebohm tr. de aure hum. §. 89. 2) Lieutaud's Bergliederungskf. Uebers. Leipz. 1782, 2. B. S. 66. 3) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. §. 1611. 4) Winslow's Anat. Abb. Uebers. Berl. 1733. 1. B. §. 405. 5) nach Duvernon (tr. de l'organe de l'ouïe, Par. 1683, p. 28.) 6) Winslow expos anat. lat. vers. T. 1. §. 404.

Canal des Uterushalses, (Canalis cervicis<sup>1</sup> uteri,) Canal<sup>2</sup> der Kanal<sup>3</sup> des Mutterhalses, (Cavea cervicis uteri<sup>4</sup>,) der in dem ungeschwängerten Uterus mehr ideell vorhandene, und nur unter den Geschlechtsfunctionen des Uterus durch Auseinanderweichung der Uterushals constituirenden festen Theile sich bildende längliche Röhre, durch welchen die Höhle des Uterus und die Mutterscheide mit einander in Verbindung stehen. S. Uterushals.

1) 2) Stein's Anat. 1. Geburtsh., 1. Th. §. 121. 3) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. §. 628. 4) Halleri cl. physiol. T. VII. 1. 28. s. 2. §. 7.

Canal für die Schlaspulsader, s. Carotischer Canal.

(Canales arteriosae s. arteriosi, i. q. Arteriae. — cerebri, Sinus des Gehirns. — circulares labyrinthi, i. q. Canales micirculares labyrinthi. — condyloidei, s. Condyloideische Canäle des Occipitalknochens. — Cotunni, s. Cotunnische Canäle. — excretorii, s. Ausführende Gänge. — gustatorii s. incisivi, i. q. C. nasopalatini. — lacrymales, s. Lacrymalcanäle. — mastoidei, s. Mastoideische Löcher des Occipitalknochens. — medullares ossium, s. Knochentröhren. — membranæi renum, Anatom. physiol. Realw II. 2.

f. Becher der Nieren. — *nasopalatini*, f. Nasopalatinische Canäle. — *nervei fistulosi renum*, f. Ureteren. — *obscuri testis*, Graafische Samenröhrchen. — *palatini anteriores*, i. q. C. nasopalatini. — *pterygoidei*, f. Pterygoideische Canäle. — *pterygopalatini*, f. Pterygopalatinische Canäle. — *semicircularis labyrinthi*, f. Semicirculäre Canäle des Labyrinths. — *spongiosus uteri*, f. Venen des geschwängerten Uterus. — *Vidiani*, i. C. pterygoidei.

*Canalicula*, f. Canälchen.

*Canalicularis substantia renum*, f. Medullarsubstanz der Nieren.

*Canaliculi lacrymales*, f. Lacrymalcanäle. — *limacum*, i. q. C. lacrymales. — *renum*, f. Bellini's Gänge. — *semicircularis labyrinthi*, f. Semicirculäre Canäle des Labyrinths. — *seminales*, f. Samenröhrchen.

*Canaliculus*, f. Canälchen. — *nervi duri*, f. Falloppischer Canal.

*Canalis alveolaris maxillae inferioris*, f. Alveolarcanal des Unterkiefers. — *arteriosus s. arteriosus Botalli*, f. Botallischer Gang. — *caroticus*, f. Carotischer Canal. — *cervicis uteri*, f. Canal des Uterushalses. — *chordae tympani*, f. Canal der Chorda des Tympanums. — *cibarius*, f. Darmcanal. — *ciliaris*, f. Fontanaescher Canal. — *circularis membranae vitreae*, i. q. Canalis Petiti. — *cochleae*, f. Scala der Cochlea. — *communis hepatis*, f. Choledochischer Gang. — *cysticus*, f. Cystischer Gang. — *deferens*, s. *deferens testis*, f. Deferens der Gang des Hoden. — *eminutiae bigeminae*, s. *quadrigeminae*, f. Sylvischer Canal. — *Eustachii*, f. Eustachische Röhre. — *Fallopii*, f. Falloppischer Canal. — *Fontanae*, f. Fontanaescher Canal. — *infraorbitalis*, f. Infraorbitalcanal. — *intestinalis*, f. Darmcanal. — *lacrymalis*, f. Lacrymalcanal. — *membranaceus*, f. Membranöser Lacrymalcanal. — *maxillae inferioris*, f. Alveolarcanal des Unterkiefers. — *medullae spinalis*, f. Rückenmarkscanal. — *nasalis*, f. Lacrymalcanal. — *nervei hepatis*, f. Cystischer Gang. — *nervei auditorii*, i. q. Meatus auditorius internus, f. Acustischer Sinus. — *nervei duri*, f. Falloppischer Gang. — *olfactorii instrumenti*, f. Canal des Geruchsnerven. — *orbitalis inferior*, i. q. C. infraorbitalis. — *Petiti*, s. *Petiti*, f. Petit's Canal. — *pro chorda tympani*, f. Canal der Chorda des Tympanums. — *musculo stapedis*, f. Canal des Stapedius. — *protuberantiae pyramidalis tympani*, f. Canal des Stapedius. — *pterygoideus*, f. Pterygoideische Canäle. — *sacci lacrymalis*, i. q. C. lacrymalis. — *sacralis*, f. Sacralcanal. — *scalarum cochleae communis*, i. q. Infundibulum cochleae. — *semen deferens*, f. Deferens der Gang des Hoden. — *semicanalis tympani*, f. Canal des Tensors des Tympanums. — *semicircularis externus, horizontalis, inferior, major, medius, minimus, minor, posterior et inferior, superior et anterior, verticalis posterior et superior*, f. Semicirculäre Canäle des Labyrinths. — *sphenoclinoidalis*, f. Optisches Loch. — *stapedii*, f. Canal des Stapedius. — *Sylvii*, f. Sylvischer Canal. — *urinarius*, i. q. Ureter.



*ra.* — *uteri*, s. Uterushals, auch Vagina. — *venosus*, s. Venen Ductus. — *vertebralis*, s. Rückenmarkscanal. — *Vidia-*  
*rs*, s. Pterigoideische Canäle.

(*Canaster*, s. Graukopf.

(*Candicantes eminentiae*, s. *glandulae*, s. Mammillarproceſſe  
des Gehirns.

(*Candida linea*, s. Weiße Linie. — *substantia cerebri*, s. Me-  
llarsubſtanz des Gehirns. — *tunica oculi*, i. q. Sclerotica.

(*Candidum oculi*, s. Weißes im Auge.

(*Canis*, *Canis capilli*, graue Haare, s. unter Haupthaare.

(*Canini dentes*, s. Eckzähne.

(*Caninus musculus*, s. Levator des Mundwinkels.

(*Canis*, i. q. Frenulum praeputii, ingl. Vulva.

(*Canities*, graues Haar, s. unter Haupthaare.

(*Canina* <sup>1</sup> *brachii*, i. q. Os brachii, s. Oberarmknochen. —

*Canina* <sup>2</sup> *cruris*, i. q. Tibia. — *major antibrachii*, i. q.

*Canina*. — *cruris*, i. q. Tibia. — *minor antibrachii*, i. q.

*Caninus*. — *cruris*, i. q. Fibula. — *pulmonis*, i. q. Trachea.

1) In eigentlicher Bedeutung ein Schiffsrohr.

(*Canatio*, i. q. Cantio.

(*Canthi*, *Canthi oculorum*, nach dem ursprünglich Griechischen  
Worte <sup>1</sup> gebildet. S. Winkel des Auges.

2) *Κανθος*, ſonſt auch, wie auch das Lateiniſche Wort *Canthus*, eine Nadschlene,  
von Galen aber (l. introd. c. 10) in obiger Bedeutung gebraucht.

(*Canthomoplatto-brachiales muscoli*, i. q. Teretes muscoli.

(*Canthus externus*, *internus*, s. unter Winkel des Auges. —

*Major*, i. q. *Canthus internus*. — *minor*, i. q. *Canthus ex-*

*ternus*. — *nasalis*, i. q. *Canthus internus*. — *temporalis*,

i. q. *Canthus externus*.

(*Cantio*, *Cantus*, s. Singen.

(*Capacität*, (*Capacitas* <sup>1</sup>), Geräumigkeit, (*Eurychoria* <sup>2</sup>),

Größenverhältniß, in welchem Gefäße und Höhlungen zu den in ihnen  
enthaltenen und befaßten Theilen ſtehen, auch in Anwendung auf  
den lebenden thieriſchen Körper. Vgl. Gefäße und Höhlungen.

1) Columell. d. re rust. l. 12. c. 43. „pro capacitate vasorum.“

2) S. obig. Wort.

(*Capacität für Wärme*, s. Specifiſche Wärme.

(*Capacitas*, s. *Capacität*, auch Fähigkeit, ingl. *Receptivität*. —

*Uvis*, s. Beckenhöhle.

(*Caper* <sup>1</sup>, *Capra* <sup>2</sup>, i. q. *Hircus alarum*, s. Achſelgeſtänk.

1) Catull. carm. 69. v. 5: „Caedit te quaedam mala fabula, quae tibi  
fertur Valle sub alarum iuxta habitare caper.“ 2) Horatii ep. l. 1.  
ep. 5. v. 29: „Sed nimis arcta premunt olidae convivia caprae.“

(*Capillago*, *Capillatio*, *Capillatura*, *Capillitium*, s. Haar-  
büſchel.

(*Capillararterien*, (*Capillares arteriae* <sup>1</sup>), Haararte-  
rien <sup>2</sup>, die kleinſten Arterien, die den Uebergang ins Capillargefäß-  
ſystem machen, und von denen man annimmt, daß ſie mehr nicht als  
einige Zolls im Durchmeſſer betragen. S. Capillargefäße.

1) Halleri cl. physiol. T. I. l. 2. s. 1. §. 5.

2) S. obiger Ring's

Gefäß. §. 59.

*Capillares tubi*, f. Haarröhrchen.

**Capillargefäße**<sup>1</sup>, (*Capillaria vasa*<sup>2</sup>), Haargefäße<sup>3</sup>; Haargefäßchen<sup>4</sup>, können nach dem Wortsinne nur solche Gefäßchen thierischen Körper seyn, deren innerer Umfang, (Lumen,) nur dem eines Haarröhrchens, (f. dieß Wort,) verglichen werden. In Wenn wir z. B. die Verzweigungen des arteriellen Gefäßsystems anatomischen Präparaten, insbesondere von membranösen Organen, wo die Injection der Arterien mit einer feinen Masse gut gelungen ist, mit dem Auge so weit verfolgen, als dieses möglich ist; wo wir ferner, besonders membranöse Eingeweide lebender kaltblütiger Thiere, z. B. die Lungen von Fröschen, einer mikroskopischen Beobachtung unterwerfen: so werden uns viele äußerst feine Gefäßchen wahrnehmbar, denen wir den Namen Haargefäße wohl beilegen dürfen.

Indeß verdankt der Begriff von Capillargefäßen, und insbesondere der Begriff von einem Capillargefäßsystem, in seinem eigentlichen jetzigen Gehalte, nicht so sehr den anatomischen Untersuchungen seine Entstehung, als vielmehr einer besondern theoretischen Erklärungsweise, die man in neuern Zeiten auf viele im thierischen Körper sich ereignende Erscheinungen, die mit der Blutbewegung nächst in Verbindung stehen, angewendet hat; die anatomischen Untersuchungen haben dieser Erklärungsweise nur zur Aushilfe gedient (S. Blutcirculation.)

In den neuesten physiologischen Schriften versteht man unter Capillargefäße jene unendlichen feinen, zum Theile negartig sich verzweigenden Gefäße, welche zwischen den arteriellen und venösen Gefäßen überall im ganzen Körper in der Mitte liegen; und welche einerseits dazu dienen, dem Blute in seinem Laufe aus den Arterien in Venen den Uebergang zu verschaffen, andererseits auch die Stelle zu zeichnen, wo alle innere lebendige Bildungen und Absonderungen Statt finden. Jede fortdauernde Verwandlung des Bluts, jede Zeugung fester Molekülen aus dem Blute, jede Absonderung flüssiger Stoffe, z. B. des Speichels, Urins u. s. w., jede Aushauchung luftartiger Stoffe, oder wenigstens die Bildung derselben, geschieht in den Capillargefäßen; und dann geht das Blut aus den Haargefäßen wieder in die Venen über. — In diesem Sinne ist die Lehre von den Capillargefäßen zuerst von Bichat<sup>5</sup> hervorgehoben worden, und ist unter den Deutschen Physiologen vorzüglich an Walther<sup>6</sup> einen gründlichen Bearbeiter gefunden.

Eine genauere Vergleichung der Capillargefäße mit den Arterien einerseits, und mit den Venen andererseits hat dann die Lehre von den Capillargefäßen noch dahin bestimmt, daß in ihnen weder die arterielle Natur der Arterien, noch die venöse Natur der Venen herrschende seyn könne; und zwar eben deswegen nicht, weil in ihnen alle Verwandlung des Blutes, alle Absonderungen u. s. w. vor sich gehen. Auf diese Art erschien dann das System der Capillargefäße

1) Burdach's Encyclop. d. Heilkwiss. 2. B. §. 892. 2) F. B. de Sauvages diss. d. vasorum capillarium corp. h. suctu, Monsp. 1772. 3) Burdach's Encycl. u. s. w. a. a. O. 4) J. van den Boer Bemerk. über d. Muskelvermögen der Haargefäßchen, Münster 1786. 5) C. Bichat anatomie générale, T. II. p. 469. 6) C. besonders dess. Physiologie d. M. 2. B. S. 23.



scham als ein drittes, zwischen den Arterien und Venen liegendes Gefäßsystem, doch so, daß sich der Anfang dieses Gefäßsystems von Arterien aus und das Ende desselben in der venösen Richtung nicht annehmen lassen.

Bei den ältern Anatomen und Physiologen geschieht keine Erwähnung von einem Capillargefäßsystem in dem angegebenen Sinne. Haller erwähnt an mehreren Stellen seines großen anatomisch-physiologischen Werks der haarförmigen Arterien <sup>7</sup>, und auch solcher feinen Gefäße, die aus den Arterien entsprängen, aber nicht mehr geeignet seyen, ein rothes Blutkugeln aufzunehmen <sup>8</sup>. Boerhave beschrieb im Jahr 1703 diese Gefäße zuerst, und führt von ihnen den Umstand an, daß sie zu klein seyen, um ein rothes Blutkugeln aufnehmen zu können <sup>9</sup>; sie gehen nach Boerhave in die Venen über, und dienen vorzüglich zur Erzeugung der Membranen.

Diese von Boerhave, Haller und andern beschriebenen feinsten Gefäße nehmen aus den Arterien ihren Ursprung, und werden von ihren Erfindern für Verzweigungen des arteriellen Gefäßsystems gehalten; sie haben nicht bloß in der Physiologie, sondern auch in der Pathologie, insbesondere bei der Erklärung der Entzündung eine wichtige Rolle gespielt; sie haben auch unstreitig der neuern Lehre vom Capillargefäßsystem, wenigstens größtentheils, zur Grundlage gedient; sie sind sie nicht bloß dieselben, die man in neuern Zeiten Capillargefäße nennt, und letztere sind auch als ein indifferentes Gefäßsystem charakterisirt worden, welchen Charakter Boerhave, Haller u. a. von ihnen angeführten kleinen Gefäßen nicht beilegen.

Wenden wir uns in Beziehung auf die eigentliche Natur der Capillargefäße an die Anatomie, so kann diese überall nur haarförmige Verzweigungen des arteriellen Gefäßsystems darstellen, und in Beziehung auf das venöse System ist es nicht einmal möglich, haarförmige Anfangszweige der Venen anatomisch aufzuzeigen. Aus anatomischen Gründen läßt sich ferner keineswegs darüber entscheiden, ob diese haarförmigen Zweige vom arteriellen System aus, nicht endlich noch den arteriellen Charakter haben, und wenn auch andere Gründe aus der Physiologie dafür sprechen, daß dieser arterielle Charakter abnehmen müsse, so wie die Gefäße feiner werden, so läßt sich doch andererseits auch nicht einsehen, worum dieser Charakter bis zu einer indifferenten Natur gesunken seyn sollte, da sie doch offenbar nur die kleinsten Verzweigungen des arteriellen Systems sind. Uebrigens kann man in Beziehung auf diese Gefäße auch mikroskopische Untersuchungen zu Hülfe genommen, wo sich dann allerdings keine haarförmigen Gefäße zeigen.

Die Meinung, daß in den Haargefäßen die Lebensfunctionen vor sich gehen, die wir Ernährung, Absonderung, Aushauchung u. s. w. nennen, hat manche Gründe gegen sich; sie kann sich auf jeden Fall nur als Meinung behaupten, und zwar so lange, bis richtigere und andere Ansichten an ihre Stelle treten. Wenigstens steht mit dieser Meinung der Umstand im Widerspruch, daß in den punctförmigen

<sup>7</sup>) Elementa physiol. T. I. l. 2. s. 1. §. 3. 11. 22. et al. <sup>8</sup>) l. c. §. 29. et al. <sup>9</sup>) E. Boerhavi. institut. rei med. n. 245, und de usu rationis mechanici p. 14

Zufusionsthierchen, in den Strahlenpolypen, in den Insecten und dem kleinen Thierchen gar keine Gefäße wahrgenommen werden, mithin in diesen Thieren die Lebensprocesse, die in höhern Thieren den Haargefäßen vor sich gehen sollen, nicht in Haargefäßen stattfinden können.

Die Frage, ob der Blutübergang aus den Arterien in die Venen durch die Haargefäße vermittelt werde, ist bereits im Artikel Blutcirculation näher erörtert worden. (Wilbrand.)

**Capillargefäßsystem<sup>1</sup>, Haargefäßsystem<sup>2</sup>, (Systema varum capillarium.)** die Capillargefäße als intermediäre Gefäße zwischen Arterien und Venen betrachtet. S. Capillargefäße.

1) Walther's Physiol. d. M. 2. B. 17. Cap.

2) Wilbrand's Phys.

des M. S. 253.

*Capillaria vasa*, s. Capillargefäße.

*Capillata pars capitis ossei*, s. Hirnschädel.

*Capillatus, a, um*, s. Haarreich.

*Capilli<sup>1</sup>*, eigentlich Haupthaare, besonders Vorderhauptshaare, doch findet dieß Wort sich auch von Thierhaaren gebraucht<sup>2</sup>, und auch von neuern Schriftstellern von Haaren mehrerer Theile des menschlichen Körpers. S. Haare, Haupthaare.

1) durch Contractio (Capitis pili) gebildet.

2) Catulli carm. 25.

1: „mollior cuniculi capillo.“

*Capilli atrii s. atricolores*, s. unter Haupthaare, schwarze Haare. — *cani*, graue Haare, s. unter Haupthaare. — *demissi*, lang gewachsene Haare, s. unter Haupthaare. — *erecti*, struppiges Haar, s. unter Haupthaare. — *flavi*, blonde Haare, s. unter Haupthaare. — *fusci*, braune Haare, s. unter Haupthaare. — *hirsuti*, kirti, s. horrentei, s. horridi, struppiges Haar, s. unter Haupthaare. — *nigri*, s. nigricolores, schwarze Haare, s. unter Haupthaare. — *rari*, dünne Haare, s. unter Haupthaare. — *rigidi*, i. q. C. erecti. — *rufi*, s. rutili, s. rutilii, rothe Haare, s. unter Haupthaare. — *semicani*, halbgraue Haare, s. unter Haupthaare. — *spadicei subfusci*, s. unter Haupthaare.

*Capilluli*, Diminutiv von Capilli, s. Härchen.

*Capita costarum*, s. Köpfehen der Rippen. — *diaphragmaticis*, s. Köpfe des Diaphragma's, auch Schenkel des Diaphragma. — *inferiora ossis femoris*, i. q. Condyli ossis femoris. — *medullae oblongatae*, s. Schnervenhügel. — *tricipitis femoris*, s. unter Abductoren des Schenkels.

*Capitalis vena*, s. unter Cephalische Venen, größere Cephalische Vene.

**Capitalistische Lebenszeit**, nach Butte<sup>1</sup>, der Ueberschuß der Jahre der Kraft über die der Schwäche bei Berechnung der Lebensdauer von einer gewissen Zahl zugleich gebornen Menschen. S. unter Arithmetik des Lebens.

1) Grundstücken d. Arithmetik d. menschl. Lebens, S. 51.

*Capitata eminentia ossis humeri*, i. q. Capitulum ossis brachii, s. Köpfehen des Cubitalprocesses des Oberarmknochens.

*Capitatae papillae linguae*, s. unter Papillen der Zunge, hirtet, auch mittlere Papillen.

*Capitatum os carpi*, s. Kopfknochen des Carpus.



*Capitatus condylus ossis brachii*, i. q. Capitata eminentia ossis humeri.

*Capitellum*, Diminutiv von Caput, f. Köpfchen. — *costae*, Köpfchen der Rippen. — *ossis*, f. Kopf eines Knochens. — *radii*, i. q. Condylus radii.

*Capitula cartilaginum arytænoidearum*, f. Santorinische Knorpelchen. — *costarum*, f. Capitulum costarum. — *ossium metatarsi*, f. Köpfchen der Knochen des Metatarsus. — *trochlearia phalangum digitorum pedis*, i. q. Trochleae phalangum digitorum pedis.

*Capitulo-radialis bursa mucosa*, f. unter Radiuschleimsäcke.

*Capitulum*, Diminutiv von Caput, f. Köpfchen. — *cornuum hyoidei majorum*, f. Köpfchen der großen Hörner des Zungenknochens. — *costarum* s. *costarum majus*, f. Köpfchen der Rippen. — *minus*, i. q. Tuberculum costae. — *excavatum radii*, i. q. Condylus radii. — *musculi bicipitis*, i. q. Tuberositas radii. — *ossis brachii*, f. Köpfchen des Cubitalprocessus des Oberarmknochens. — *ossium metacarpi*, f. Köpfchen der Knochen des Metacarpus. — *processus odontoidei*, f. Kopf des odontoideischen Processes. — *radii superius*, i. q. Condylus radii. — *stapidis*, f. Köpfchen des Stapes. — *trochleare ossium digitorum*, i. q. Trochlea ossium digitorum.

*Capra*, f. Caper.

*Capreolaris aufractus*, f. Gefäßplexus des Samenstranges.

*Capreolaris et inuoluta pars tunicae albugineae testis*, wird von v. Linder<sup>1</sup>, ohne hinlänglichem Grund, der vordere fetts- und nervenreichere Theil der eignen weißen Haut des Hodens verschieden. Vgl. Albuginea des Hodens.

<sup>1</sup>) physiol. p. 249.

*Capreolaris meatus*, f. Neustischer Sinus. — *tunica*, f. Baushäute des Hoden und des Samenstranges.

*Capreolus*<sup>1</sup>, f. Helix.

<sup>1</sup>) In eigentlicher Bedeutung Diminutiv von Caprea; Reibholz.

*Caprouae*, eigentlich die den Pferden in die Stirne herabhängenden Mähnen, sonst auch überhaupt in die Stirn hereinhängende Haare<sup>1</sup>, Stirnhaare. Vgl. Haupthaare.

<sup>1</sup>) E. Nonii doct. de proprietate serm., der aus Lucili sat. folgende Stelle anführt: „Aptari caput atque comas sinitare capronas Altas, frontibus inmissas, ut mos fuit illis.“

*Caproueae*<sup>1</sup>, ungewöhnliches Wort statt Capronae.

<sup>1</sup>) Elmenhorst ind. ad Apuleji Florid.

*Capsa*, f. Capsel. — *cordis*, i. q. Pericardium. — *oculi*, Augenhöhle.

*Capsae tendinum articulares*, f. Schleimsäcke der Gelenke.

*Capsel*, (*Capsa*<sup>1</sup>, *Capsula*<sup>2</sup>, *Capsella*<sup>3</sup>,) Kapsel, Capsul<sup>4</sup>, Kapselhaut, im allgemeinen eine Schachtel oder futteralartiges Verhältniß zur Aufbewahrung anderer Dinge, in der anatomischen

<sup>1</sup>) Horatii ep. l. 1. ep. 1. v. 268.      <sup>2</sup>) Senecae ep. 115.

<sup>3</sup>) Ulpian. l. §. 12. conservandi, Dig. de instruct. et instrum.

<sup>4</sup>) obsolet. E. Heuermann's Physiol. 2. Th. S. 273 und 272.

Nomenclatur allein oder in Verbindung mit andern Worten in den folgenden Artikeln gebraucht.

**Capsel der Crystalllinse** <sup>1</sup>, oder **Linse**, (*Capsula lentis* <sup>2</sup> s. *crystallina* <sup>3</sup>, s. *lentis crystallinae* <sup>4</sup>, s. *humoris crystallini* <sup>5</sup>, s. *crystalloidea* <sup>6</sup>,) Kapsel oder Capselhaut der Crystalllinse, Crystallenes <sup>7</sup> oder Spinnwebenförmiges <sup>8</sup> Behältniß, Capsel <sup>9</sup>, oder Einfassung <sup>10</sup> der Linse, Crystallhäutchen <sup>11</sup>, Crystallenhaut oder Büchse <sup>12</sup>, Capsel der crystallinen Feuchtigkeit der Augen <sup>13</sup>, (*Membranas. Tunica crystallina* <sup>14</sup>, s. *lenticularis* <sup>15</sup>, s. *crystalloides* <sup>16</sup>, s. *crystalloidea* <sup>17</sup> s. *lentis* s. *lentiformis* <sup>18</sup>, s. *discoides* <sup>19</sup>, s. *arachnoidea* s. *arachnoides* <sup>20</sup>, s. *aranaea* <sup>21</sup>, s. *aranealis* <sup>22</sup>, s. *arenosa* <sup>23</sup>, s. *phacoidea* <sup>24</sup>, *Speculum* <sup>25</sup>,) die häutige, völlig durchsichtige Hülle, welche die Crystalllinse, ohne ihr offenbar anzuhängen, capselartig in sich schließt. S. Auge.

1) Haller's Grundr. d. Physiol. ungearb. von v. Lebeling, 1. Th. Note 398.

2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1657. 3) Winslow exp. anat. lat. vers. T. IV. S. 211. 4) Halleri elem. physiol.

T. V. 1. 16. s. 2 S. 20. 5) Heuermann's Physiol. 2. Th. S. 817.

6—8) Taylor's Mechanismus d. Aug. Uebers. Leipz. 1750, S. 35. 9—10) Leber's Vorles. über d. Sehgliederungsk., Wien 1776, S. 509. 11) Heuermann's Physiol. a. a. O. 12) Winslow's anat. Abh. Uebers., Berl.

1733, 4. B. S. 211. 13) Heuermann's Physiol. 2. Th. S. 873. 14) Winslow exp. an. etc. 1. c. 15) 16) C. Bauhini theat. anat. 1. 3.

c. 14. 17) Fabricii ab Aquap. de oculo 1. p. 1. c. 5. 18) 19) Jul. Placentini nov. anat. 1. 5. c. 26. 20) nach Galen (*apex Xvovdh*).

1. de oculo c. 2. Vidi Vidii de anat. 1. 7. c. 4.) 21) 22) Fabricii ab Aquap. 1. de oculo 1. c. wie das folgende in wörtlicher Uebersetzung des vor-

stehenden Wortes. 23) Laurentii anat. 1. 11. c. 6. 24) Fabricii ab Aquap. 1. de oculo 1. c. 25) C. Bauhini th. anat. 1. c.

**Capsel des gestreiften großen Gehirngangliums.** So bezeichnet Reil <sup>1</sup> die den gedachten Gehirntheil umgebende Marksubstanz, indem er an selbiger zugleich eine untere, eine äußere und eine innere Wand unterscheidet. Vgl. Gestreiftes großes Gehirnganglion.

1) S. Arch. f. d. Physiol. 9. B. 1. S. 199.

**Capselarterien**, s. Suprarenalarterien. — **bänder**, s. Capselligamente. — **blutadern**, s. Suprarenalvenen. — **haut**, s. Capsel. — — **der Crystalllinse**, s. Capsel der Crystalllinse.

**Capsella**, s. Capsel.

**Capselligament der intern Enden der Knochen des Vorderarms**, (*Capsulare ligamentum inferius cubiti* <sup>1</sup>,) Sackförmige Capselmembran <sup>2</sup>, oder Sackförmiges Capselband <sup>3</sup>, oder Gelenkcapsel <sup>4</sup>, oder Behältnißband <sup>5</sup>, oder Schleimiges Behältniß <sup>6</sup>, der untern Enden der Knochen des Vorderarms, Capselhaut am Handende des Ellbogens <sup>7</sup>, (*Ligamentum sacciforme cubiti*, *Membrana capsularis sacciformis* <sup>8</sup>, s. *Capsula mucilaginosa* <sup>9</sup>, s. *extremi-*

1) S. Arch. f. d. Physiol. 9. B. 1. S. 199.

**Capselarterien**, s. Suprarenalarterien. — **bänder**, s. Capselligamente. — **blutadern**, s. Suprarenalvenen. — **haut**, s. Capsel. — — **der Crystalllinse**, s. Capsel der Crystalllinse.

**Capsella**, s. Capsel.

**Capselligament der intern Enden der Knochen des Vorderarms**, (*Capsulare ligamentum inferius cubiti* <sup>1</sup>,) Sackförmige Capselmembran <sup>2</sup>, oder Sackförmiges Capselband <sup>3</sup>, oder Gelenkcapsel <sup>4</sup>, oder Behältnißband <sup>5</sup>, oder Schleimiges Behältniß <sup>6</sup>, der untern Enden der Knochen des Vorderarms, Capselhaut am Handende des Ellbogens <sup>7</sup>, (*Ligamentum sacciforme cubiti*, *Membrana capsularis sacciformis* <sup>8</sup>, s. *Capsula mucilaginosa* <sup>9</sup>, s. *extremi-*

1) Winslow exp. an. lat. vers. T. I. S. 288. 2) Weitbrecht's Syn-

onym. Uebers. Straßb. 1779, S. 35. 3) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M.

1. B. S. 743. 4) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 250. 5) 6) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1753, 1. B. S. 434. 7) nach

Sommering (Bändel. S. 65.) 8) nach Weitbrecht (Synonym.

Peterop. 1742, p. 36.) 9) Winslow exp. an. etc. 1. c.

tum interiorum cubiti.) das dünne häutige Band, welches von dem Umfange der semilunären Incisur des Radius aus den Con-  
tus der Ulna umfaßt, mit dem Interarticularknorpel des Carpus  
zusammenhängt und zur Verbindung der beiden untern Enden des  
Vorderarms dient. C. Armligamente.

Capselligament des Carpus, (Capsulare ligamentum car-  
pi,) Kapsel des Handgelenks<sup>1</sup>, Kapselband des Ge-  
lenks der Hand mit dem Vorderarme<sup>2</sup>, Gelenkcap-  
sel des Handgelenks<sup>3</sup>, Kapselmembran des Gelenks  
des Vorderarms mit der Hand<sup>4</sup>, Kapselmembran des  
Handwurzelgelenks<sup>5</sup>, (Membrana capsularis diarthroseos  
carpi<sup>6</sup> s. articuli cubiti, s. articuli carpi<sup>7</sup>), diejenige häutige  
Ausbreitung, welche von dem Rande der Glenoidhöhle des Radius,  
an dessen stylförmigem Proceß und dem der Ulna, auch von dem Cap-  
salligament der untern Enden des Vorderarms aus, sich über die Dor-  
sal- und Volarfläche des Carpus, doch über erstere nur zur Hälfte, ver-  
breitet, sehr viele Verstärkungsfasern erhält, welche theils von den  
angewählten Theilen, wo sie am beträchtlichsten sind, theils von fast  
allen Knochen des Carpus in verschiedenen Richtungen in sie überge-  
hen, und dazu dient, den Unterarm mit der Handwurzel zu ver-  
binden. C. Handligamente.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 795. 2) nach Söm-  
merring (Vänd. S. 69) 3) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2. B.  
S. 269. 4) Weitbrecht's Syndesm. Uebers. Straßb. 1779, S. 54. 5)  
Roder's anat. Taf. 19, Fig. 11. Nr. 7. 6) Hildebrandt's Lehrb. u.  
f. w. a. a. D. 7) nach Weitbrecht (Syndesm. p. 56.)

Capselligament des Fußgelenks, (Capsulare ligamentum  
articulationis tarsi<sup>1</sup>), Kapselmembran der Fußwurzel<sup>2</sup>,  
Kapsel<sup>3</sup> oder Gelenkkapsel<sup>4</sup>, oder Kapselband<sup>5</sup> des Fuß-  
gelenks, Behältnißband der Articulation des Sprungs  
mit dem Schienbein<sup>6</sup>, (Membrana juncturae capsularis pe-  
dis<sup>7</sup>, s. capsularis articuli tarsi<sup>8</sup>, s. capsularis diarthroseos  
tarsi, Ligamentum orbiculare tarsi<sup>9</sup>), das hinterwärts und vor-  
wärts vom untern Rande der Tibia aus gerade herabsteigend, an  
dem hinteru und vorderu Rande der obern Fläche des Talus sich an-  
setzende und so mit einigen seitwärts befindlichen Bändern die capselarti-  
ge Umgebung des Fußgelenks bildende Band. C. Fußligamente.

1) Winslow exp. anat. lat. vers. T. I. tr. de oss. rec. S. 208. 2)  
Weitbrecht's Syndesm. Uebers. Straßb. 1779, S. 172. 3) Hilde-  
brandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 1010. 4) Mayer's Besch.  
d. menschl. K. 2. B. S. 366. 5) nach Sömmerring (Vänd. S. 100.)  
6) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1753, 1. Th. S. 396. 7) nach  
Weitbrecht (Syndesm. p. 163.) 8) Roder's anat. Handb. 1. B. S. 418.  
9) Walther de articulationis et musc. hom. incessu statuque dirigend.  
observ. Lips. 1728, p. 37.

Capselligament des Knies, (Capsulare ligamentum ge-  
nu<sup>1</sup>), Kapselmembran<sup>2</sup>, oder Gelenkkapsel<sup>3</sup>, oder Be-  
hältnißband<sup>4</sup>, oder Kapsel<sup>5</sup>, oder Kapselband<sup>6</sup>, oder Cap-

1) Winslow expos. anat. lat. vers. tr. de oss. rec. S. 173. 2) nach  
Sömmerring (Vänd. S. 87.) 3) Mayer's Besch. d. menschl. K.  
2. B. S. 548. 4) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1753, 1. Th.  
S. 386. 5) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 900. 6)  
Weitbrecht's Syndesm. Uebers. Straßb. 1779, S. 152.



## 26 Capselligament d. Kopfs d. Fib. Capsell. d. Metac. d. Daum.

selmembran des Kniegelenks<sup>7</sup>, (Membrana capsularis genu<sup>8</sup>), das vom ganzen Umfang des untern Endes des Schenkelknochens entspringende Band, das sich, die Kniescheibe zwischen sich fassend, an den ganzen Umfang des obern Endes der Tibia ansetzt von Aponeurosen naheliegender Flecken der Muskeln und von dem Popliteischen Ligamente, so wie von den Lateralligamenten des Kniegelenkes verstärkt wird, und indem es zur Befestigung des Kniegelenkes beiträgt, das Ausfließen der Synovia verhütet. S. Kniegelenk.

7) Pöder's anat. Tafeln, Taf. 24. Fig. 1. Nr. 9. 8) nach Weitbrecht (syndesm. p. 145.)

**Capselligament des Kopfs der Fibula,** (Capsulare ligamentum capituli, s. extremitatis superioris<sup>1</sup> fibulae,) Oberes Waden- und Schienbeinband, Kapselband des obern Endes des Wadenbeins<sup>2</sup>, Behältnißband des obern Endes der Röhre des Beins<sup>3</sup>, Capselmembran des Kopftheils des Wadenbeins<sup>4</sup>, (Ligamentum capituli fibulae, Membrana capsularis capituli fibulae<sup>5</sup>), diejenige feste Membran, welche den Umfang des auf der Seite befindlichen Articularsinus der Tibiaumfassend, sich an den Rand der Articularfläche des obern Endes der Fibula ansetzt, und so beide Knochen mit einander verbindet. S. Schenkel ligamente.

1) Winslow expos. anat. lat. vers. T. I. tr. de oss. rec. §. 178. 2)

Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. §. 914. 3) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1755, 1. Th. S. 388. 4) Pöder's anat. Tafeln, Taf. 24. Fig. 3. Nr. 14. 5) Pöder's anat. Handb. 1. B. §. 408.

**Capselligament des lenticulären Knochens des Carpus,** (Capsulare ligamentum ossis subrotundi,) Kapselband des runden Beins<sup>1</sup>, (Membrana capsularis ossis pisiformis<sup>2</sup>), die membranöse Umgebung der Verbindung des lenticulären Knochens mit den triangulären Knochen des Carpus. S. Handligamente.

1) Sömmerring's Bändel. §. 71. 2) Pöder's anat. Handb. 1. B. §. 351.

**Capselligament des Maxillargelenks,** (Capsulare ligamentum articulationis maxillaris<sup>1</sup>), Membran des Kiefergelenks<sup>2</sup>, Kapsel<sup>3</sup>, oder Gelenkkapsel<sup>4</sup> des Kiefergelenks, Kapselmembran des untern Kinnbackens<sup>5</sup>, Capselmembran der Unterkinnlade<sup>6</sup>, (Membrana maxillae articularis<sup>7</sup>, s. capsularis maxillae inferioris<sup>8</sup>), das den Condylus des Unterkiefers und den Umfang der Articulationshöhle des Schläfenothen auf jeder Seite kapselartig, mit vorzüglich nach hinten starken Fasern umfassende Band. S. Unterkiefer.

1) Winslow expos. anat. lat. vers. T. I. tr. de oss. rec. §. 360. 2)

nach Sömmerring (Bändel. §. 10.) 3) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. §. 409. 4) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 50.

5) Weitbrecht's Syndesm. Uebers. Elph. 1779, S. 82. 6) Pöder's anat. Tafeln, Taf. 16. Fig. 15. Nr. 13. 7) Sömmerring's Bändel.

§. 10. 8) nach Weitbrecht (syndesm. p. 8.)

**Capselligament des Metacarpus des Daumens,** (Capsulare ligamentum ossis metacarpi pollicis<sup>1</sup>), Band des Mittelhandbeins des Daumens<sup>2</sup>, Capselmembran<sup>3</sup> oder Ge-

1) Pöder's anat. Handb. 1. B. §. 366. 2) Sömmerring's Bändel. §. 73.

3) Pöder's anat. Tafeln, Taf. 20. Fig. 25. Nr. 33.



**Capselligament d. Metac. d. kl. Fing. Capsell b. Oberarmknu. 27**

**Kapsel 4** des Mittelhandknochens des Daumens, (Membrana capsularis ossis metacarpi pollicis 5,) das den Umfang der Digitalfläche des großen multangulären Knochens des Carpus umgebende, sich auf eben diese Art an den ganzen Umfang der Basis des Metacarpus des Daumens ansetzende und so die Verbindung beider Knochen capselartig bewirkende Band. S. Handligamente.

4) Mayer's Beschr. d. menschl. K. 2. B. S. 297. 5) Loder's anat. Handb. 1. B. S. 366.

**Capselligament des Metacarpus des kleinen Fingers, Capsulare ligamentum ossis metacarpi quinti,) Band des Mittelhandbeins des kleinen Fingers 1, Capselmembran des fünften Mittelhandknochens 2, (Membrana capsularis ossis metacarpi quinti 3,) das dünne Ligament, welches die Verbindung des Hakenknochens mit der Basis des Metacarpus des kleinen Fingers capselartig umfaßt. S. Handligamente.**

1) Sommering's Wandelr. S. 73. 2) Loder's anat. Tafeln Taf. 20. Flg. 3. Nr. 25. 3) Loder's anat. Handb. 1. B. S. 573.

**Capselligament des Metatarsus der großen Zehe, (Capsulare ligamentum ossis metatarsi hallucis,) Capselmembran des ersten Keilbeins und des ersten Mittelfußknochens 1, Kapselhaut des Mittelfußbeins der großen Zehe 2, (Membrana capsularis ossis cuneiformis et metatarsi primi 3,) dasjenige Ligament, welches die Ränder der beiden Vereinigungsflächen des ersten sphenoideischen Knochens des Tarsus und des Metatarsus der großen Zehe capselartig umgibt, auf der Dorsal- und Plantarfläche aber noch Verstärkungsfasern erhält. S. Fußligamente.**

1) Loder's anat. Tafeln, Taf. 25. Flg. 1. Nr. 33. 2) Sommering's Wandelr. S. 102. 3) Loder's anat. Handb. 1. B. S. 433.

**Capselligament des Metatarsus der kleinen Zehe, (Capsulare ligamentum ossis metatarsi quinti,) Kapselhaut des fünften Mittelfußbeins 1, (Connexio ossis metatarsi quinti et cuboidei 2,) dasjenige Ligament, welches die Ränder der beiden Vereinigungsflächen des cuboideischen Knochens des Tarsus und des Metacarpus der kleinen Zehe äußerlich, und an der Dorsal- und Plantarseite capselartig umgibt, auch an dieser letztern Verstärkungsfasern erhält. S. Fußligamente.**

1) Sommering's Wandelr. S. 102. 2) Loder's anat. Handb. 1. B. S. 437.

**Capselligament des Oberarmknochens, (Capsulare ligamentum ossis brachii 1, s. capitis ossis humeri,) Rundes Band 2 oder Großes Capselband 3 des Schulterbeins oder Oberarms, Gelenkkapsel des Oberarms oder Schultergelenks 4, Behältnißband 5 oder Schleimiger Ueberzug 6 des Kopfs vom Oberarmbein, Kapsel 7 oder Capselmembran 8 des Schultergelenks, (Ligamentum capsulare mag-**

1) Winslow exp. anat. lat. vers. T. I. tr. de oss. rec. S. 261. 2) 3) Weitbrecht's Synthesm. Uebers. Straßb. 1779, S. 21. 4) Mayer's Beschr. d. menschl. K. 1. B. S. 232. 5) 6) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1755, 1. Th. S. 412. 7) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 700. 8) Loder's anat. Tafeln, Taf. 20. Flg. 6. Nr. 9.

num<sup>9</sup>, s. orbiculare humeri<sup>10</sup>, s. brachii, Membrana capsularis humeri<sup>11</sup>, s. brachii, Tunica mucilaginosa articulationis capituli ossis brachii<sup>12</sup>,) das schlaaffe Band, welches von dem Umfange des Condylus des Schulterblattes aus sich im ganzen Umfange des Halses des Oberarmknochens anlegt, und das Oberarmgelenke als ein geräumiger Sack umgibt, aber nicht nur durch eine eigene membranöse Scheide verstärkt, sondern insbesondere noch von den benachbarten Muskeln bedeckt und beschützt, zur Sicherung und Befestigung dieses Gelenks dient. S. Schulterligamente.

9) 10) Weitbrecht syndesm. p. 23.

11) Pöder's anat. Handb. 1. B.

§. 324.

12) Winslow exp. an. etc. 1 c.

**Capselligament des odontoideischen Processes,** (Capsulare ligamentum processus odontoidei<sup>1</sup>,) Kapselband des Gelenks des Kappens<sup>2</sup>, (Ligamentum vaginale dentis<sup>3</sup>, s. processus odontoidei<sup>4</sup>,) die das Gelenk, welches durch die hintere Fläche des Bogens des Atlas und der vordern Articulationsfläche des odontoideischen Processes gebildet wird, kapselartig umgebenden schlingigen Fasern. S. Epistropheus.

1) 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. §. 484.

3) nach Man-

chord (diss. capituli art. c. prima et sec. colli vertebra, Tüb. 1747. 24.)

4) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D.

**Capselligament des scaphoideischen Knochens,** (Capsulare ligamentum scaphoidei ossis, s. tali et ossis scaphoidei tarsi<sup>1</sup>,) Kapselmembran des Fußes und des Schiffbeins<sup>2</sup>, Behältnißband des Sprungs und des Schiffbeins<sup>3</sup>, Kapsel des Gelenks des Talus und des kahnförmigen Knochens<sup>4</sup>, (Membrana capsularis tali et ossis navicularis<sup>5</sup>,) diejenige ligamentöse Membran, welche die Verbindung des Talus mit dem scaphoideischen Knochen, indem sie von dem Rande der Verbindungsfläche des ersten zu dem dieser Fläche des letztern hingeht, kapselartig umfaßt, jedoch von verschiedenen Ligamenten verstärkt wird. S. Fußligamente.

1) Winslow exp. anat. lat. vers. T. I. tr. de oss. rec. §. 219.

2) Weit-

brecht's Syndesm. Uebers. Straßb. 1779, S. 176.

3) Winslow's anat.

Abh. Uebers. Berl. 1735, 1. Th. S. 398.

4) Hildebrandt's Lehrb. d.

Anat. d. M. 1. B. §. 1015.

5) nach Weitbrecht (syndesm. p. 174.)

**Capselligament des Schenkelknochens,** (Capsulare ligamentum femoris,) Kapselhaut des Schenkelkopfs<sup>1</sup>, Gelenkapsel<sup>2</sup> des Schenkelknochens, Kapsel<sup>3</sup> oder Kapselmembran<sup>4</sup> oder ründliches Band<sup>5</sup> des Schenkelbeins, Kapselband des Hüftgelenks<sup>6</sup>, (Ligamentum annulare, s. orbiculare<sup>7</sup>, s. latum femoris, Membrana capsularis femoris<sup>8</sup>,) das an Dicke und Stärke vor allen andern des Körpers sich auszeichnende, übrigens locker anliegende, vom ganzen Umfange des Acetabulums aus sich, den Kopf des Schenkelknochens umfassend, um den Hals desselben anliegende Band. S. Schenkelligament.

1) nach Sommering (Wandel. §. 83.)

2) Maner's Vischr. d. menschl.

K. 2. B. S. 524.

3) Pöder's anat. Tafeln, Taf. 25. Fig. 1. Nr. 13.

4) Weitbrecht's Syndesm. Uebers. Straßb. 1779, S. 144.

5) Wins-

low's anat. Abh. Uebers. Berl. 1735, 1. B. §. 125.

6) Hildebrandt's

Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. §. 849.

7) nach Winslow (exp. anat. lat.

vers. T. I. tr. de oss. rec. §. 125.)

8) nach Weitbrecht (syndesm. p. 159.)



**Capselligament des Schlüsselknochens und des Sternum's,** (Capsulare ligamentum claviculae et sterni,) Kapselband des Schlüsselbeins an seinem Brustende<sup>1</sup>, Kapsel<sup>2</sup> oder Gelenkkapsel<sup>3</sup> des Gelenks des Brust- und Schlüsselbeins, Capselmembran des vordern Endes des Schlüsselbeins<sup>4</sup>, Brustbeinschüsselbeinband<sup>5</sup>, (Connexio claviculae cum sterno et costa prima<sup>6</sup>, Membrana capsularis extremitatis sternalis claviculae<sup>7</sup>, Ligamentum sternoclaviculare<sup>8</sup>, s. capsulare anticum claviculae<sup>9</sup>;) das aus dichten Fasern bestehende Band, welches die Verbindung der Sternalextremität des Schlüsselknochens mit dem Manubrium des Sternum's capsulartig umfaßt, und so dieselbe befestigt, dessen Fasern aber sich sowohl vorwärts als hinterwärts auf dem Sternum, als auch auf beiden Flächen des ersten Rippenknorpels strahlenförmig verbreiten, welche jedoch auch von einigen als ein eignes Ligament, (s. Costo-Clavicularligament,) unterschieden werden. S. Schulterligamente.

1) nach Sömmerring (Vändersl. S. 50.) 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 660. 3) Maner's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 214. 4) Foder's anat. Tafeln, Taf. 18. Fig. 2. Nr. 13. 5) Weitbrecht's Synthesm. Uebers. Straßb. 1779, S. 9. 6) Sömmerring's Vändersl. S. 50. 7) Foder's anat. Handb. 1. B. S. 314. 8) 9) Weitbrecht synthesm. p. 9. n. 13.

**Capselligament des Schulterblatts,** (Capsulare ligamentum scapulae,) Band des Schlüsselbeins zur Grätenstrecke<sup>1</sup>, hintere Gelenkkapsel des Schlüsselbeins<sup>2</sup>, Bänder des Schlüsselbeins und des Acromions<sup>3</sup>, Behälterhaut der Articulation der Schulterhöhe<sup>4</sup>, Capselmembran des hintern Endes des Schlüsselbeins<sup>5</sup>, Kapsel des Gelenks des Schulterblatts und Schlüsselbeins<sup>6</sup>, Connexio claviculae cum acromio<sup>7</sup>, Ligamentum claviculae capsulare posticum, s. claviculae acromiale<sup>8</sup>, s. capsulare extremitatis posterioris claviculae<sup>9</sup>, Membrana capsularis extremitatis scapularis claviculae<sup>10</sup>;) dasjenige dünne häutige Ligament, welches zunächst die Verbindung zwischen dem Schlüsselknochen und dem Acromion bewirkt, indem es vom Rand des hintern Endes des Schlüsselknochens aus an den innern Rand des Acromions in einem ganzen Umfang sich ansetzt. S. Schultergelenke.

1) nach Sömmerring (Vändersl. S. 52.) 2) Maner's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 216. 3) Weitbrecht's Synthesm. Straßb. 1779, S. 14. 4) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1735, 1. Th. S. 409. 5) Foder's anat. Tafeln, Taf. 18. Fig. 6. Nr. 2. 6) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 683. 7) Sömmerring's Vändersl. S. 52. 8) Foder's anat. Handb. 1. B. 1. Th. 3. Abschn. S. 317. 9) Maner's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 216. 10) Winslow exp. anat. lat. vers. T. I. tr. de oss. rec. 1. S. 250.

**Capselligament des Talus,** (Capsulare ligamentum tali,) Capselmembran des Laufs und des Fersenbeins<sup>1</sup>, Beultnißband des Sprungs- und Fersenbeins<sup>2</sup>, Kapsel des Gelenks des Fersenbeins und des Talus<sup>3</sup>, (Membrana capsularis articulationis calcanei et talus<sup>4</sup>;) dasjenige dünne häutige Ligament, welches die Verbindung zwischen dem Fersenbein und dem Talus bewirkt, indem es vom Rand des hintern Endes des Fersenbeins aus an den innern Rand des Talus in einem ganzen Umfang sich ansetzt. S. Fußgelenke.

1) Weitbrecht's Synthesm. Uebers. Straßb. 1779, S. 174. 2) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1735, 1. Th. S. 398. 3) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 1012.



## 30 Capselligament d. Vorderarms Capselligament d. Fing.

Membrana capsularis tali et calcanei <sup>4</sup>, Ligamentum capsulare calcanei et astragali <sup>5</sup>,) das die Ränder der einander zugekehrten überknorpelten Flächen des Talus und des Calcanei capselartig umfassend und so beide Knochen fest zusammenhaltende Band. S. Fußligamente

4) nach Weitbrecht (synthesm. p. 172.)

5) Winslow exp. anat. lat. vers. T. I. tr. de oss. rec. §. 219.

**Capselligament des Vorderarms, (Capsulare ligamentum cubiti, s. ossium brachii anterioris <sup>1</sup>,) Kapselband oder Capselmembran <sup>2</sup> der Gelenkkapsel <sup>4</sup> des Ellbogengelenks, Gemeinschaftliche Kapselmembran des Schulterbeins und des Vorderarms <sup>5</sup>, Behältnißband an der Articulation der Gebeine des Unterarms <sup>6</sup>, Kapselband des Gelenks zwischen dem Ober- und Unterarm <sup>7</sup>, (Membrana capsularis cubiti <sup>8</sup>,) dasjenige Band, welches das untere Ende des Oberarms und die obern Enden der Ulna und des Radius und das von diesen Knochen gebildete Gelenk capselartig umgibt, dabei aber noch von eignen Bändern an den Seiten verstärkt wird; und auch vorwärts Verstärkungsfasern erhält. S. Arm-ligamente.**

1) Winslow exp. anat. lat. vers. T. I. §. 282.

2) nach Zimmerling (Wanderl. §. 58)

3) Pöder's anat. Tafeln, Taf. 19. Fig. 7. Nr. 8.

4) Maner's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 247.

5) Weitbrecht's Synthesm. Uebers. Straßb. 1779, S. 26.

6) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1733, 1. B. S. 421.

7) nach Weitbrecht (synthesm. p. 21.)

8) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. §. 758.

**Capselligamente, (Ligamenta capsularia <sup>1</sup>,) Kapselbänder <sup>2</sup>, Kapselbänder <sup>3</sup>, Gelenk- <sup>4</sup> oder Articularcapseln, Gelenkbänder <sup>5</sup>, Behältnißsehnens <sup>6</sup>, oder Bänder <sup>7</sup>, Kugelbänder, Totale Gelenkbänder <sup>8</sup>, Capselmembranen, Articularligamente, (Membranae capsulares <sup>9</sup>, Ligamenta articularia <sup>10</sup>, s. articularia, s. orbicularia <sup>11</sup>,) diejenigen sehnigen Häute, welche die Gelenkenden der mit einander articulirenden Knochen umfassen, und für selbige eine eigene Höhle bilden, worin diese sich ihrer Bestimmung gemäß mehr oder minder frei bewegen können. (Vgl. Orbicularligamente). S. Articulation.**

1) nach Winslow (ligamens capsulaires) exp. anat. tr. des os frais §. 36.

2) Pöder's anat. Handb. 1. B. §. 271.

3) 4) Weitbrecht's Synthesm. Straßb. 1779, S. 4.

5) Pöder's anat. Handb. a. a. D.

6) 7) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1733, 1. B. S. 336.

8) nach Burdach, (Encyclop. d. Heilw. 2. B. §. 1453.)

9) Pöder's anat. Handb. a. a. D.

10) Schaarschmidt's synthesm. Tabell., Tab. 1. (wo jedoch auch die unterstützenden Gelenkbänder mit darunter befaßt sind.)

11) Schaarschmidt's synthesm. Tabell. a. a. D.

**Capselligamente der Fingerglieder, (Capsularia ligamenta phalangum digitorum manus,) Kapselbänder der Fingergelenke <sup>1</sup>, Capsel- <sup>2</sup> oder Kapselmembranen <sup>3</sup> der Fingerglieder, Gelenkkapseln <sup>4</sup> oder Kapselbänder <sup>5</sup> der Gelenke der Finger, (Membranae capsulares phalangum digi-**

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. §. 826.

2) Pöder's anat. Tafeln, Taf. 20. Fig. 4. Nr. 45.

3) Weitbrecht's Synthesm. Uebers. Straßb. 1779, S. 79.

4) Maner's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 205.

5) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. §. 826.

ormen<sup>6)</sup> die die ersten Phalangen der Finger sowohl mit den Endstücken der Knochen des Metacarpus als die die Phalangen unter sich verbindenden eignen Gelenkbänder. S. Handligamente.

6) Weitbrecht syndesm. p. 66.

**Capselligamente der Knochen des Carpus, (Capsularia ligamenta ossium carpi,)** Gelenkkapseln der Handwurzelknochen<sup>1</sup>, Kapselbänder der Knochen der Handwurzel<sup>2</sup>, die die Gelenkflächen der Knochen des Carpus umgebenden ligamentösen Häute, welche, indem sie von einem solchen Knochen zum andern gehen, als Kapselbänder anzusehen sind, aber auch durch verschiedene Faserbündel so mit einander verbunden werden, daß sie in eine die Volarseite des Carpus überziehende sehnigte Membran zusammenzutreten scheinen. S. Handligamente.

1) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 275. 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. 6. 800.

**Capselligamente der Knochen des Metacarpus, (Capsularia ligamenta ossium metacarpi,)** Kapselbänder<sup>1</sup> oder Gelenkkapseln<sup>2</sup> der Mittelknochen mit den Handwurzelknochen, werden eigentlich durch die sich über die Gelenke herabziehende ligamentöse Membran des Carpus auf der Dorsalseite gebildet, indem sie zugleich Verstärkungsfasern erhalten; doch scheinen sich die des ersten und letzten Metacarpusknochen noch besonders aus. S. Handligamente.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 807. 2) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 289.

**Capselligamente der Knochen des Metatarsus, (Capsularia ligamenta ossium metatarsi communia,)** Kapselbänder der Gelenke der Fußwurzelknochen und der Knochen des Mittelfußes<sup>1</sup>, Gelenkkapseln der Mittelfußknochen<sup>2</sup>, diejenigen Ligamente, welche die festen Gelenke der meisten Knochen des Tarsus, so wie die Vereinigung derselben mit dem Metatarsus kapselartig umfassen und an einander halten, auf dem Rücken des Tarsus in eine Membran zusammenfließen, sich aber übrigenfalls undeutlich und unvollkommen zeigen. S. Fußligamente.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 1019. 2) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 587.

**Capselligamente der Knochen des Tarsus, (Capsularia ligamenta ossium tarsi<sup>1</sup>),** Kapselbänder der Fußwurzelknochen<sup>2</sup>, Kapselmembranen oder Behältnißbänder<sup>3</sup> der Knochen der Fußwurzeln<sup>4</sup>, Gelenkkapseln der Hinterfußknochen<sup>5</sup>, (Membranae capsulares ossium tarsi<sup>6</sup>), die die Gelenkflächen der Knochen des Oberfußes zunächst zusammenhaltenden felförmigen Häute, wovon die des Calcaneus und des Talus und des und des scaphoideischen Knochens noch besonders sich auszeichnen. S. Fußligament.

1) Winslow exp. anat. lat. vers. T. I. tr. de. oss. rec. S. 223. 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 2. B. S. 1016. 3) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1765, 1. Th. S. 400. 4) Weitbrecht's Syndesm. Straßb. 1779, S. 186. 5) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 370. 6) nach Weitbrecht (syndesm. p. 185.)



## 32 Capselligamente d. Rippen Capselligamente d. Zehngl.

**Capselligamente der Rippen,** (*Capsularia ligamenta capitulorum majorum costarum*,) Bänder der Rippenköpfchen<sup>1</sup>, Ligamentöse Bündel der Köpfe der Rippen (*Ligamenta capitulorum costarum*<sup>2</sup>, s. *costarum vertebrali Fasciculi ligamentosi capitulorum costarum*<sup>3</sup>,) die von den Köpfchen der Rippen nach dem Umfange der ihnen entsprechend Gelenkvertiefungen an den Thoraxwirbeln hinlaufenden Fasern, welche bestimmt sind, die Köpfchen der Rippen an das Rückgrath zu festigen. S. **Rippenligamente.**

- 1) nach Sömmerring (Vändrl. §. 29.) 2) Weitbrecht's Syndesm. Uebers. Straßb. 1779, S. 119. 3) Sömmerring's Vändrl. §. 24. 4) nach Weitbrecht (syndesm. p. 112.)

**Capselligamente der Rippenknorpel,** s. **Rippenknorpelcapselligamente.**

**Capselligamente der Wirbel,** (*Capsularia ligamenta vertebrarum*<sup>1</sup>,) Gelenkbänder oder Gelenkkapseln der schiefen Processen der Wirbel<sup>2</sup>, Behältnißbänder der gelenkmäßigen Fortsätze der Wirbelbeine<sup>3</sup>, Bänder der obern und untern schiefen Fortsätze der Wirbelbeine<sup>4</sup>, Kapseln der Gelenke der schiefen Fortsätze der Wirbelbeine<sup>5</sup>, Capselmembranen der schrägen Fortsätze der Wirbelbeine<sup>6</sup>, (*Ligamenta processus obliquorum vertebrarum*<sup>7</sup>, s. *articularia*<sup>8</sup>, s. *membranea*<sup>9</sup>, *Membrana capsulares processus obliquorum*<sup>10</sup>,) die ziemlich starken Bänder, welche jedes von den Articularprocessen zweier Wirbel auf beiden Seiten gebildete Gelenk capselartig umfassen und selbiges befestigen. S. **Rückgrathsligamente.**

- 1) Winslow exp. anat. lat. vers. tr. de oss. rec. §. 335. 2) Mayer's Beschr. d. menschl. K. 2. B. S. 123. 3) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1733, 1. B. S. 443. 4) Weitbrecht's Syndesm. Uebers. Straßb. 1779, S. 111. 5) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. §. 435. 6) Foder's anat. Tafeln, Taf. 17. Fig. 7. Nr. 15. 7) Weitbrecht syndesm. p. 110. 8) Hildebrandt's Lehrb. u. f. a. a. D. 9) Vesalii d. corp. h. fabr. l. 2. c. 40. 10) Winslow's anat. Handb. 1. B. §. 286.

**Capselligamente der Zehnglieder,** (*Capsularia ligamenta phalangum digitorum pedis*,) Verbindung der Zehnglieder mit den Mittelfußbeinen und unter einander: Kapselhäute<sup>1</sup> oder Gelenkkapseln<sup>2</sup>, Kapselmembranen der Glieder der Zehen<sup>3</sup>, Behältnißbänder der Glieder der Zehen<sup>4</sup>, Kapselbänder der Zehngelenke<sup>5</sup>, (*Cornexio phalangum digitorum pedis cum metatarsi ossibus inter se*<sup>6</sup>, *Membranae capsulares phalangum digitorum pedis*<sup>7</sup>,) diejenigen Ligamente, welche die Verbindung der ersten Phalangen der Zehen mit den Knochen des Metacarpus sowohl, als auch die Verbindung der übrigen Phalangen unter sich capselartig umgeben, und von den Lateral-ligamenten verstärkt werden. S. **Fußligamente.**

- 1) Winslow exp. anat. lat. vers. T. I. tr. de oss. rec. §. 235. 2) Sömmerring's Vändrl. §. 104 u. 106. 3) Mayer's Beschr. menschl. K. 2. B. S. 399. 4) Weitbrecht's Syndesm., Straßb. 1779, S. 196. 5) Winslow's anat. Abh. Uebers., Berl. 1733, 1. Th. S. 40. 6) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. §. 1031. 7) Sömmerring's Vändrl. §. 104. 8) nach Weitbrecht (syndesm. p. 190)



**Capselligamente des Atlas,** (*Capsularia ligamenta, atlantis* <sup>1</sup>, (*Ligamenta articularia atlantis* <sup>2</sup>, s. *articularia inferiora atlantis* <sup>3</sup>,) die auf beiden Seiten des Atlas gelegenen Bänder, welche die von der untern Gelenkfläche des Atlas und der obern des Epistropheus auf beiden Seiten gebildeten Gelenke capselartig umgeben, und so die allzustarke Bewegung des Atlas verhüten. S. Halsgelenke.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 478. 3) nach Manhard (diss. l. cap. articulatio c. prima et sec. colli vertebra, Tüb. 1747, p. 14.)

**Capselligamente des Kopfs,** (*Capsularia ligamenta capitis* <sup>1</sup>, Capselmembranen der Verbindung des Hinterkopfs und des Trägers <sup>1</sup>, Gelenkbänder des Kopfs <sup>2</sup>, Gelenkbänder zwischen dem Grundbein und Atlas <sup>3</sup>, gelenkmäßige Bänder am Rückgrath <sup>4</sup>, (*Ligamenta articulationis capitis cum atlante* <sup>5</sup>, *Ligamenta articularia capitis* <sup>6</sup>, *spinnae dorsi* <sup>7</sup>, *Ligamenta capitis articularia superiora* <sup>8</sup>, *ligamenta annularia cervicis* <sup>9</sup>, *Membranae capsulares juncturae ossis occipitis cum atlante* <sup>10</sup>,) die auf jeder Seite die Enden des Hinterhauptknochens mit den Gelenkflächen des Atlas kelförmig oder als ein häutiger Ring überziehenden Ligamente. S. Capselligamente.

1) Pöder's anat. Tafeln, Taf. 17. Fig. 1. Nr. 13. 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 477. 3) nach Sommering, (Bändel. 1. S. 15.) 4) Winslow's anat. Abh. Uebers., Berl. 1735, 1. B. S. 334. 5) Sommering's Bändel. S. 13. 6) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. 7) Winslow exp. anat. lat. vers. T. 1. S. 354. 8) nach Manhard (diss. cap. articulatio c. prima et sec. vertebra colli Tüb. 1747, p. 14.) 9) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. 10) Pöder's anat. Handb. 1. B. S. 279.

**Capselligamente des Zungenknochens,** (*Capsularia ligamenta ossis hyoidei*,) Kapselbänder der Zungenbeine <sup>1</sup>, wenigen Ligamente, welche die Gelenkvereinigungen der großen kleinen Hörner des Zungenknochens mit dem Körper desselben capselartig umgeben. S. Zungenknochen.

Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1736.

**Capselmembran der Unterkinnlade,** s. Capselligament des Kinnknochen. — **der Verbindung des Hinterkopfs und Trägers,** s. Capselligament des Kopfs und des Atlas. — **des Ellenbogengelenks,** s. Capselligament des Ober- und Vorderarms. — **des ersten Keilbeins und des ersten Mittelfußknochens,** s. Capselligament des Metatarsus der großen Zehe. — **des fünften Mittelhandknochens,** s. Capselligament des Metacarpus des fünften Fingers. — **des Handwurzelgelenks,** s. Capselligament des Carpus. — **des hintern Endes des Schlüsselbeins,** s. Capselligament des Schulterblatts. — **des Kniegelenks,** s. Capselligament des Knies. — **des Köpfchens des Wadenbeins,** s. Capselligament des Kopfs der Fibula. — **des Laufs- und des Schiffsbeins,** s. Capselligament des scaphoideischen Knochens. — **des Mittelhandknochens des Daumens,** s. Capselligament des Metacarpus des Daumens. — **des Schenkelknochens,** s. Capselligament des Schenkelknochens. — **des Schultergelenks,** s. Capselligament des Schultergelenks.

34 Caps. ill. d. vord. End. d. Schlüsselb. Caps. lig. cap. oss. br.  
Capselligament des Oberarms, — des vordern Endes d.  
Schlüsselbeins, s. Capselligament des Schlüsselknochens und  
Sternum's.

Capselnmembranen, s. Capselligamente. — der Fingergli-  
der, s. Capselligamente der Fingerglieder. — der schrägen So-  
sätze der Wirbelbeine, s. Capselligamente der Wirbel.

Capselpulsadern, s. Suprarenalarterien. — venen, s. Su-  
renalvenen.

Capsul, s. Capsel. — der crystallinen Feuchtigkeit d.  
Augen, s. Capsel der Crystalllinse. — der gläsernen Feucht-  
keit der Augen, s. Hyaloidea.

Capsula, s. Capsel. — *communis hepatis*, s. Glissoni  
Capsel. — *cordis*, i. q. Pericardium. — *crystallina*, s. Ca-  
psel der Crystalllinse. — *Glissoniana* s. *Glissonii*, s. *hepati-*  
s. Glissonische Capsel. — *humoris crystallini*, i. q. Caps-  
lentis. — *lentis*, s. *lentis crystallinae*, s. Capsel der Cryst-  
linse. — *lumbaris*, i. q. Receptaculum chyli. — *mucilagino-*  
*extremitatum inferiorum cubili*, s. Capselligament der unt-  
Enden der Knochen des Vorderarms. — *seminalis*, s. Prost-  
— *vaginalis processus styloidei*, s. Vaginalcapsel des stylo-  
migen Processes.

*Capsulae atrabilariae*, s. Suprarenaldrüsen. — *ligamen-*  
*sae*, s. *mucosae tendinum*, s. Schleimsäcke der Flechsen. — *n-*  
*orum*, s. Nervenscheiden. — *renales*, i. q. C. suprarena-  
— *seminales*, s. Samenbläschen. — *suprarenales*, s. Supr-  
enaldrüsen. — *synoviales tendinum*, s. Schleimsäcke der Flechsen.

Capsulararterien der Nieren, (Capsulares arteriae, s.  
capsulares renum.) Ohne Beisatz werden darunter die Supr-  
arenalarterien verstanden, mit dem Beisatz vordere und hi-  
tere aber, (*anteriores*<sup>1</sup> et *posteriores*<sup>2</sup>), kleine und unbestimmte  
Arterienzweige, wovon die erstern, (auch *Arteriae adiposae*<sup>3</sup>, Fett-  
pulsadern<sup>4</sup>, benannt) gewöhnlich aus der Nierenarterie entspre-  
ngen und zum Fett der Nieren vorwärts gehen, letztere aber aus  
ersten Lumbalarterie ihren Ursprung nehmen, und sich in das N-  
rennfett hinterwärts verbreiten. S. unter Nierenarterien und Lu-  
balarterien.

1) 2) Wäher's Beschr. d. Blutgefäße, S. 138 u. 143. 5) Winsl-  
exp. anat. lat. vers. tr. de arter. S. 218. Haller begreift alle Arter-  
welche das Nierenfett erhält, unter diesem Namen und unterscheidet *arterias adi-*  
*sas superiores, medias et imam.* (cl. physiol. T. VII. l. 26. s. 1. §. 1.)

4) Winslow's anat. Mus. Uebers. Berl. 1733, 3. B. S. 91.

*Capsulare ligamentum*, s. Capselligament. — — *articu-*  
*tionis maxillaris*, s. Capselligament des Maxillargelenks. —  
— *ossium brachii anterioris*, s. Capselligament des Ober- u.  
Vorderarms. — — — *tarsi*, s. Capselligament des Fußgelen-  
— — *astragali*, s. Capselligament des Talus. — — *atlan-*  
*et epistrophei*, s. Capselligament des Atlas und Epistropheus.  
— *brachii magnum*, s. Capselligament des Oberarms. —  
*calcanei et astragali*, s. Capselligament des Talus. — —  
*pitis ossis brachii*, s. Capselligament des Oberarms. — — *ca-*

*capituli fibulae*, f. Capselligament des Kopfs der Fibula. — — *carpi*, f. Capselligament des Carpus. — — *claviculae anticum*, *claviculae et sterni*, f. Capselligament des Schlüsselknochens des Sternums. — — — *posticum*, f. Capselligament des Schulterblatts. — — *cubiti*, f. Capselligament des Vorderarms. — — — *inferius*, f. Capselligament der untern Enden der Knochen des Vorderarms. — — *extremitatis posterioris claviculae*, f. Capselligament des Schulterblatts. — — — *superioris fibulae*, f. C. lig. capituli fibulae. — — *femoris*, f. Capselligament des Schenkelknochens. — — *genu*, f. Capselligament des Knies. — — *ossibus carpi proprium*, i. q. Annulare ligamentum carpi. — — *ossis brachii*, f. Capselligament des Oberarms. — — — *metacarpi pollicis manus*, f. Capselligament des Metacarpus des Daumens. — — — — *quinti manus*, f. Capselligament des Metacarpus des kleinen Fingers. — — — *metatarsi*, f. Capselligament des Metatarsus der großen Zehe. — — — *quinti pedis*, f. Capselligament des Metatarsus der kleinen Zehe. — — — *scaphoidei*, f. Capselligament des scaphoideischen Knochens. — — — *subotradi*, f. Capselligament des leniculären Knochens. — — *ossium brachii anterioris*, f. Capselligament des Vorderarms. — — *processus odontoides*, f. Capselligament des odontoidischen Processes, — — *scapulae*, f. Capselligament des Schulterblatts. — — *tali*, f. Capselligament des Fußes. — — — *et ossis scaphoidei*, f. Capselligament des scaphoideischen Knochens.

*Capsulares arteriae*, f. Suprarenalarterien, ingleichen Capsulararterien der Nieren. — *membranae*, f. Capselligamente. — — *cartilaginum costarum*, f. Rippenknorpel = Capselligamente. — — *ossium tarsi*, f. Capselligamente der Knochen des Tarsus. — — *phalangium digitorum manus et pedis*, f. Capselligamente der Fingerglieder und der Zehenglieder. — — *processuum obliquorum*, f. Capselligamente der Wirbel. — *venae*, f. Suprarenalvenen, ingleichen Capsularvenen der Nieren.

*Capsularia ligamenta atlantis*, f. Capselligamente des Atlas. — — *capitulum majorem costarum*, f. Capselligamente der Rippen. — — — *minorum costae*, f. unter Querligamente der Rippen, äußeres Querligament. — — *cartilaginum costarum*, *costarum anteriora*, f. Rippenknorpel = Capselligament. — — *ossium metacarpi*, f. Capselligamente der Knochen des Metacarpus. — — — *metatarsi*, f. Capselligamente der Knochen des Metatarsus. — — — *tarsi*, f. Capselligamente der Knochen des Tarsus. — — *phalangium digitorum manus*, f. Capselligamente der Fingerglieder. — — — *pedis*, f. Capselligamente der Zehenglieder. — — *vertebrarum*, f. Capselligamente der Wirbel.

*Capsularis membrana articuli carpi*, s. *articuli cubiti*, f. Capselligament des Carpus. — — — *tarsi*, f. Capselligamente des Fußgelenks. — — *brachii*, f. Capselligament des Oberarmknochens. — — *capituli fibulae*, f. Capselligament des Kopfs der Fibula. — — *cubiti*, f. Capselligament des Vorderarms. — — *arthroseos carpi*, i. q. Capsularis membrana articuli carpi.



— — — *tarsi*, f. Capselligament des Fußgelenks. — — — *extremi-  
scapularis claviculae*, f. Capselligament des Schulterblatts. — — —  
*sternalis claviculae*, f. Capselligament des Schlüsselknochens  
des Sternums. — — — *femoris*, f. Capselligament des Schen-  
kelknochens. — — — *genu*, f. Capselligament des Knies. — — —  
*meri*, i. q. C. *membrana brachii*. — — — *juncturae pedis*,  
Capselligament des Fußgelenks. — — — *maxillae inferioris*,  
Capselligament des Unterkiefers. — — — *ossis cuneiformis et me-  
tarsi primi*, f. Capselligament des Metatarsus der großen Z.  
— — — *metacarpi pollicis*, f. Capselligament des Metacar-  
pus des Daumens. — — — — *quinti*, f. Capselligament des M.  
carpus des kleinen Fingers. — — — — *pisiformis*, f. Capselli-  
ment des lenticulären Knochens. — — — — *sacciformis cubiti*,  
*extremilatatum interiorum cubiti*, f. Capselligament der unt-  
Enden der Knochen des Vorderarms. — — — — *tali et calcanei*,  
Capselligament des Talus. — — — — *et ossis navicularis*,  
Capselligament des scaphoideischen Knochens.

**Capsularvenen der Nieren**, (Capsulares venae renum  
Fettblutadern<sup>2</sup> oder Fettvenen<sup>3</sup>, (Venae adiposae  
im allgemeinen, Synonyme von den Suprarenalvenen,  
besonderer Bezeichnung aber die das Blut von dem Nierenfett<sup>3</sup>  
Theil nur in die gedachten zurückführenden Venen. Vgl. Supr-  
arenalvenen.

1) Mayer's Besch. d. Blutgef. S. 248. 2) Winslow's anat. u.  
Übers. Berl. 1733, 3. B. S. 168. 3) Palsyn's chir. Anat. Übers. v. Pu-  
1. Th. S. 372. 4) Winslow exp. anat. lat. vers. tr. de ven. S. 1

**Capulum coleorum**, i. q. Penis.

**Caput**, f. Kopf. — *adductoris hallucis breve*, f. Quermus-  
kel des Fußes. — — — — *longum*, f. Abductor der großen Ze-  
— *bicipitis breve et longum*, f. unter Coracoradialis kurz  
und langer Kopf. — *clitoridis*, f. Eichel der Clitoris. — *co-  
dis*, f. Basis des Herzens. — *costarum majus*, f. Köpfschen  
Rippen. — — — — *minus*, f. Tuberkel der Rippen. — *galli gallinae*,  
s. *gallinaginis*, f. Hahnenkopf der männlichen Harnröhre. — *me-  
lei*, f. Kopf des Malleus. — *medullae*, f. unter Medullarsubstanz  
des Gehirns. — *mortuum*, f. Tottenkopf. — *musculi*, f. Ko-  
eines Muskels. — *ossis brachii*, f. Kopf des Oberarmknochens  
— — — — *femoris*, f. Kopf des Schenkelknochens, incl. unter Trochan-  
teren des Schenkelknochens großer Trochanter. — *ossium*, f. Ko-  
eines Knochens. — *pancreatis*, f. Kopf des Pancreas. — *penis*,  
f. Eichel. — *radii*, f. Condylus des Radius. — *rosae*, i. q.  
*Infundibulum cerebri*. — *scapulae*, i. q. Acromion. — *s-  
cundum flexoris longi digitorum pedis*, f. Accessorischer Mus-  
kel des langen Flexors der Zehen. — *stapidis*, f. Köpfschen des St-  
pes. — *sternocleidomastoidei claviculare*, *mastoidem*,  
*occipitale*, *sternale*, f. unter Sternocleidomastoideus. — *s-  
perciliorum*, f. Kopf der Augenbrauen. — *tali*, f. Kopf d.  
Talus. — *testis*, i. q. Epididymis — *tibiae*, f. Kopf der Tibi-  
— *tricipitis breve externum et longum*, f. unter Anconiten in-  
nerer, äußerer und langer Anconäus. — *ulnae*, f. Kopf der Ulna.

**Carbo.** f. Kohle. — *animalis*, f. Thierische Kohle. — *cru-*  
*is*, s. *sanguinis*, f. Blutkohle.

**Carbon humanum**, ein Paracelsischer Ausdruck für Menschen-  
 1. Bgl. Darmkoth.

**Schroederi pharmacop. med. chym.** l. 5. cl. 1. n. 10.

**Carbonates**, f. Kohlensäure Salze.

**Carbonacea corpora**, f. Kohlenstoffhaltige Körper.

**Carbonum**, f. Kohlenstoff.

**Carbonica salia**, f. Kohlensäure Salze.

**Carbonicum**, f. Kohlenstoff. — *acidum*, f. Kohlensäure. —  
 f. Kohlensaures Gas.

**Carbureta**, f. Kohlenstoffhaltige Körper.

**Cardia**<sup>1</sup>, (*Cardia*<sup>2</sup>), Oberer Mund<sup>3</sup>, oder Schlund-  
 4, oder Anfangsende<sup>5</sup>, oder Eingangsende<sup>6</sup>, oder  
 7 des Magens, Oberer<sup>8</sup> oder Linker<sup>9</sup>  
 Magenmund, Oberer<sup>10</sup> oder Linker Magenloch<sup>11</sup>, Un-  
 12 der Mündung der Speiseröhre<sup>12</sup>, Obere Oeffnung des  
 Magens<sup>13</sup>, (*Cor*<sup>14</sup>, *Stomachus*<sup>15</sup>, *Ingressus*, s. *Orificium*  
*superius*<sup>16</sup>, s. *sinistrum*<sup>17</sup>, s. *Os*<sup>18</sup>, s. *Os superius*<sup>19</sup>, s. *Osti-*  
*um superius*<sup>20</sup>, s. *ventriculi*, *Ostium ventriculi oesopha-*  
*gi*<sup>21</sup>), die Uebergangsstelle der Speiseröhre in den Magen, nach-  
 erstere die in dem Diaphragma für sie in dessen linker Hälfte,  
 bildende Oeffnung durchdrungen hat, und nun sich conisch erwei-  
 3. Magen.

1) Mayer's Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 337. 2) nach dem Griechischen  
 gleichlautenden Worte *Kardia*, eigentlich das Herz, in medizinischen Schriftstel-  
 3. lern aber häufig in der angegebenen Bedeutung (*Galenus de aliment. fac.*  
*l. 3. „Os ventriculi cor etiam appellam”*) *Heisteri comp. anat. ed.*  
*l. 2. p. 59.* 3) *Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1733, S. 448.*  
*l. 4. — 7) Sömmerring's Eingeweidel. §. 132.* 8) 9) Mayer's Besch.  
*l. 1. s. w. a. a. D.* 10) 11) *Palfen's chr. Anat. übers. v. Huth, 2.*  
*Bd. S. 47.* 12) *Hildebrandt's anat. Handb. 3. B. §. 2000.* 13)  
*Haller's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v. Fevelling, 2. Th. S. 552.*  
*l. 14. — 16) Riolani anthropogr. l. 2. c. 20* 17) *Verheyen c. h.*  
*anat. l. 1. tr. 2. c. 10.* 18) nach dem Griechischen (*το στομα του*  
*πυλωτος* *Galenus l. 1. c. 1. c.*) *C. Bauhini theat. an. l. 1. c. 46.* 19)  
*Vesalii de c. h. fabr. l. 5. c. 3.* 20) *Vidi Vidii de anat. c. h.*  
*l. 1. s. c. 6.* 21) *Hildebrandt's Lehrb. n. s. w. a. a. D.*

**Cardiaarterie**, (*Cardia arteria*<sup>1</sup>), Arterie des obern  
 Magenmundes<sup>2</sup>, der erste Zweig der coronarischen Magenarte-  
 rie, der sich in die Cardia verbreitet. S. unter Cöliacische Ar-  
 1. Cardiaarterie, Coronarische Magenarterie.

1) Mayer's anat. Besch. d. Blutgef. d. menschl. K. S. 124. 2) *Poder's*  
*anat. Tafeln, Taf. 101. Fig. 1. Nr. 29.*

**Cardiaarterien**, (*Cardiacae arteriae*<sup>1</sup>), Magenmund-  
 2. arterien<sup>2</sup>, werden auch wohl sämtliche Zweige der coronarischen  
 Magenarterie benannt, die sich um die Cardia herum vertheilen.  
 1. Cardiaarterie.

1) 2) *Sömmerring's Gefäßl. §. 166.*

**Cardia arteria dextra et sinistra**, f. Coronarische Herzar-  
 1. ten. — *regio*, f. unter Epigastrium. — *vena*, f. Cardiavene.  
**Cardiacae arteriae**, f. Cardiaarterien, auch Coronarische Herz-  
 1. arterien. — *venae*, f. Coronarische Herzvenen.

# 38 Cardiaci nervi Carneo-papillosae rugae cerv. uteri

*Cardiaci nervi*, f. Herznerven. — — *profundi*, f. *I* Herznerven.

*Cardiacum ganglion*, f. unter Cervicalganlien, unteres Ganglion

*Cardiacus nervus aortae superficialis*, f. Oberflächlicher H nerv der Aorta. — — *crassus*, f. dicker Herznerv. — — *longus*, f. Langer Herznerv. — — *magnus*, s. *magnus profundus*, f. Großer Herznerv. — — *superficialis*, s. *superior*, *supremus*, f. flacher Herznerv. — *plexus*, f. Herznervenplexus. — — *inferior*, s. *profundus*, f. Tiefer Herznervenplexus. — — *superficialis*, f. Oberflächlicher Herznervenplexus.

*Cardiagraphia*, nach dem Griechischen gebildetes Wort<sup>1</sup>, Bezeichnung der anatomischen Lehre des Herzens. S. Herz.

1) *Kardia*, Herz und *γραφον*, Beschreibung.

*Cardimelech*, ein von Dölans<sup>1</sup> gebildeter Ausdruck zur Zeichnung des Lebensprinzips, in so fern es seinen Sitz im Herzen hat. Vgl. Lebenskraft.

1) *encyclop. med. dogm.* I. 3. c. 1 et 6.

*Cardiavene*, (*Cardiaca vena*<sup>1</sup>), Vene des obern Magenmundes<sup>2</sup>, die von der Cardia aus zur Milzvene das Blut rückführende Blutader. S. unter Pfortader.

1) 2) *Foder's anat. Tafeln*, Taf. 124. Fig. 1. Nr. 39.

*Cardinamentum*, s. *Cardinata commissura brachii*, Cubitalproceß des Oberarmknochens.

*Cardines*, i. q. *Vertebrae*, f. Wirbel.

*Cardiniformis articulatio*, f. *Ginglymus*, auch *Rotation*.

*Carditen*, (*Carditae*<sup>1</sup>), Bildsteine oder Naturspiele, aus dem Geschlecht der Stalactiten, die eine zufällige Ähnlichkeit mit einem menschlichen Herzen haben. S. *Anthropoglyphen*.

1) *Wallerii syst. mineral.* T. II. ed. nov. Viennae 1778, p. 600.

*Cardo*<sup>1</sup>, f. *Ginglymus*.

1) Im eigentlichen Sinn eine Thürangel.

*Carina*<sup>1</sup> *corporis*, i. q. *Spina dorsi*, f. Rückgrath.

1) eigentlich der bogenförmig gekrümmte Boden eines Schiffs, mit dem Galenus. part. I. 12 c. 11) bei Thieren das Rückgrath vergleicht.

*Caritas*, f. Liebe.

*Carnea commissura ossium*, i. q. *Syssarcosis*. — *fib cordis*, f. Vieussenischer Isthmus. — *massa Jacobi Sylvi* Accessorischer Muskel des langen Flexors der Zehen. — *substantia renum*, f. Medullarsubstanz der Nieren. — *tunica arteriarum*, f. unter Arterienhäute muskulöse Haut. — — *oesophagi*, f. unter Oesophagushäute, Muskelhaut. — — *ventriculi et intestini*, f. unter Häute des Magens und der Gedärme, Muskelhaut. — *valvula venae cavae*, f. Vieussenischer Isthmus.

*Carneae columnae cordis*, f. Fleischbündel der Herzventrikel. *excrecentiae coli*, f. Epiploische Anhänge. — *trabeculae cordis*, f. unter Fleischbündel der Herzventrikel.

*Carnei processus cordis*, f. unter Fleischbündel, der Herzventrikel.

*Carneo-papillosae rugae cervicis uteri*, f. Baumartige Stellen des Uterushalses.



*Carnes*, f. Fleisch, auch Muskeln. — *glandulosae*, f. Drüsen. — *papillae muliebris similes renum*, f. Papillen der Nieren. *Carneum corpus oculi*, f. Lacrimalcarnikel. — *foramen diaphragmatis*, f. Oesophagusspalte des Diaphragma's. — *marsum musculi gemini*, f. unter Gemellen. *Carneus musculus nasi*, f. Comprimirender Nasenmuskel. *Carnicula*, i. q. Caruncula, f. Carunkel. *Carnosa connexio ossium*, f. Symplose. — *membrana cut.* f. Fleischhaut. — — *scroti*, i. q. Dartos, — — *vesicae*, unter Harnblasenhäute. — *substantia renum*, f. Corticalsubstanz der Nieren. *Carnosae columnae cordis*, f. Fleischbündel der Herzventrikel. *frimbriae coli*, f. Epiploische Anhänge. — *productiones myrtiliformes vaginae*, f. Myrtenförmige Carunkeln. — *rugositates vaginae*, s. *Carnositates vaginae*, f. Myrtenförmige Carunkeln. *Carnosus limbus ostiorum venosorum cordis*, f. Limbus der Hohen Oefen des Herzens. — *monticulus urethrae*, f. Hahnenknopf der männlichen Harnröhre. — *musculus colli vesicae*, f. Sphincter der Harnblase. — *panniculus*, f. Fleischhaut. — *sphincter ani*, f. unter Sphincteren des Afters, äußerer Sphincter. *Caro*, f. Fleisch, ingleichen Muskel. — *accessoria flexoris digitorum pedis*, f. Accessorischer Muskel des langen Flexors der Behen. — *clitoridis*, i. q. Clitoris. — *glandulosa*, f. Drüsenabstanz. — *dentium*, f. Zahnfleisch. — *linguae*, f. Lingualabstanz. — *musculosa*, f. Muskelsubstanz. — *musculosa quadrata*, *quadrata manus*, f. unter Palmararmuskeln der Hand, kurzer Muskel. — *quadrata Sylvii*, f. Accessorischer Muskel des langen Flexors der Behen. — *testis*, f. Hodensubstanz. — *valvularum tracheae et arteriae pulmonalis*, f. Kranz's Nodulus — *viscera*, f. unter Parenchyma. *Carotica lingula*, f. Carotische Lingula. — *fossa*, f. Carotische Fossa. *Caroticae arteriae*, f. Carotiden. *Carotici sulcus*, f. Carotische Sulcus. *Caroticus canal*, f. Carotischer Canal. — *sulcus anterior et posterior*, f. Carotische Sulcus. **Carotiden, Carotides<sup>1</sup>, (Carotides<sup>2</sup>),** Carotiden, Kopfarterien<sup>3</sup>, oder Schlag- oder pulsadern<sup>4</sup>, Hauptarterien<sup>5</sup>, oder Schlag<sup>6</sup>, oder pulsadern, Halsarterien oder Schlag- oder pulsadern, Schlafarterien<sup>6</sup>, oder Schlag- oder pulsadern<sup>7</sup>, (*Arteriae carotides*<sup>8</sup>, s. *caroticae*<sup>9</sup>, s. capitales im Singular Carotis. *Pientaud's* Vergleichungsk. Uebers. *Belz.* 1782, 1. B. S. 676. 2) nach dem gleichlautenden griechischen Worte *Καρωτιδας* (*Celsi* de med. 1. 1. c. 1.) von *Καρος*, betäubender Schlaf, (nicht von *Καρυς*, Kopf) weil die Alten glaubten, daß ihr Verschließen die Besonnenheit raubte. *Stephani* dict. med. ed. 1564. p. 546. Vgl. auch *Galen* de Hipp. et Platon. decr. 1. 2. c. 6, und *Haller* el. physiol. T. IV. 1. 3. s. 3. §. 1. not. f. 3) *Sömmering's* Gefäß. S. 105. 4) *Maier's* Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 106. 5) *Pientaud's* Vergleichungsk. u. f. w. a. a. D. S. 674. 6) *Valson's* Chr. Anat. übers. v. *Huth* 1. Th. S. 557. 7) *Winslow's* anat. Abb. Uebers. Berl. 1753, 3. B. S. 28. 8) *Riolani* anthropogr. 1. 4. c. 2. 9) *Καρωτιδας αρτηρια* (*Galen* de H. et Pl. decr. 1. 1. c.)

les <sup>10</sup>, s. jugulares <sup>11</sup>, s. soporales <sup>12</sup>, s. soporariae, s. soporificae, s. somniferae, s. apoplecticae <sup>13</sup>, s. lethargicae <sup>14</sup> gehören zu den bedeutendsten arteriösen Blutgefäßen des Körpers, in dem der Kopf mit dem Hals den größern Theil des bedürftigen Blutes dadurch zugeführt erhält.

Ursprung der Carotiden und Carotidenstämme. Aus dem Bogen der Aorta gehen, auf der rechten Seite, in der Regel aus einem gemeinschaftlichen Stamm für sie und die rechte Subclaviculararterie (oder aus der sogenannten anonymen Arterie,) die rechte Carotis (Carotis dextra,) auf der linken Seite aber, und zwar unmittelbar nach Abgang der anonymen Arterie, aus dem Bogen der Aorta selbst die linke Carotis, (Carotis sinistra,) ab. Von den manchen Anomalien, die in diesem Ursprung der Carotiden zuweilen vorkommen, ist bereits unter einem andern Artikel (Aorta) die Rede gewesen <sup>15</sup>.

Der Grund, warum in der Regel die rechte Carotis aus der anonymen Arterie entspringt, oder mit andern Worten, mit der Subclaviculararterie der rechten Seite einen gemeinschaftlichen Stamm haben, die linke Carotis dagegen unmittelbar aus dem Bogen der Aorta hervorgeht, ist die bedeutende Abweichung des Winkels, den die Subclaviculararterien der rechten und linken Seite ihrer Hauptrichtung nach mit der Aorta machen, der wegen der Krümmung dieser auf der rechten Seite ein sehr stumpfer, auf der linken Seite ein ziemlich spiziger ist. Damit der Ausfluß des Blutes aus der Aorta auf der rechten Seite in die Subclaviculararterie nun nicht zu sehr gehindert würde, mußte diese erst in etwas mit in die Höhe steigen, um dann in einem weitem Bogen sich rechts krümmen zu können. Sonach mußte er mit der ihm so nahen Carotis in einen einzigen Stamm gleichsam zusammenfließen. In der Hinsicht, daß die anonyme Arterie eigentlich um der rechten Subclaviculararterie willen vorhanden ist, haben auch mehrere Anatomen <sup>16</sup> sie selbst als den Stamm derselben betrachtet, und nach diesen entspringt also die Carotis auf der rechten Seite aus der Subclaviculararterie. Mit Ausnahme dieses Ursprungs sind beide Carotiden einander in ihrem Bau und Verhalten bis auf einzelne Varietäten, wie bei allen paarigen Gefäßen, vollständig gleich, wenn man nicht etwa der rechten im Durchschnitt eine geringe Capacität mehr zugestehen will, was wiederholte Beobachtungen darüber darzuthun scheinen. Diese Differenzen mögen in unterschiedlichen Körpern mehr oder weniger betragen <sup>17</sup>, in vielen Körpern aber ganz verschwinden, ja es ist sogar ein gegenseitiges Verhalten beobachtet worden <sup>18</sup>.

Dieser Carotidenstamm einer jeden Seite führt auch den besonde-

10) Verheyen corp. h. anat. l. 1. tr. 7. c. 1. 11) nach Aristoteles

(σφαγιτιδες, hist. anim. l. 3, c. 3) Vgl. Halleri elem. physiol. l.

12) Vesalii de h. c. fabr. l. 3. c. 12. 13) 14) Laurentii anat.

l. 4. c. 10. 15) S. 1. Band S. 326 — 328. 16) Winslow ex.

anat. Vol. III. tr. des arter. §. 46. Sabatier tr. d'anat. T. III. éd.

p. 12. n. a. m. 17) höchstens etwa  $\frac{1}{3}$  des Durchmesser. S. die mehr.

Beobachtungen darüber in Halleri elem. physiol. l. c. §. 1. 18) Sen-

tr. de la str. du coeur T. I. p. 246.) gibt vom 90,000 Theilen des Diameters der Aorta der linken Carotis 23,216 und der rechten nur 23,104 Theile.

namen Gemeinschaftliche Carotis, (*Carotis communis*.) zur näheren Unterscheidung von den nächsten Ästen, in welche sie sich theilt, und die gleichfalls auch den Namen Carotis behalten. Ihre Capacität ist um etwas geringer, als die der ihr benachbarten Subclavialarterie.

In der Brusthöhle liegt die gemeinschaftliche Carotis, (auf der linken Seite,) hinter der linken Jugularvene, die quer über sie wegläuft, oder heraufsteigend aber wird sie auf jeder Seite mit der Jugulararterie und dem vagen Nerven ebenfalls derselben Seite von einem zarten Faserbündel umgeben. Erstere hat ihre Lage etwas mehr nach hinten und vorwärts, letzterer hinter ihr. Beide Carotiden fassen die Luftröhre in ihrem Aufsteigen gabelförmig ein, der sie zur Seite laufen, indem, wenn sie hinter dem Manubrium des Sternum an dem Hals aufsteigen, sie zugleich etwas von einander weichen, auch zugleich etwas hinterwärts sich krümmen. Hinter sich hat jede den größern rechten Kopfmuskel, (*M. rectus capitis major*.) mit dem langen Halsmuskel, (*M. longus colli*.) zur Begrenzung, zur Seite liegt nach außen der Sternocleidomastoideus, nach innen der Sternothyreoideus. Letzterer Muskel bedeckt sie auch unterhalb, so wie der Omohyoideus, indem beide sich mit ihr kreuzen. Oberhalb der Stelle, wo der Sternocleidomastoideus sie noch verbirgt, liegt sie am meisten nach außen und ist bloß von dem als Platysmamioides bekannten muskulösen Ueberzug des Halses und von der äußern Haut bedeckt, daher man auch hier ihr Klopfen durch den angelegten Finger deutlich fühlt, ja hört, wenn das Klopfen heftig ist und bei mageren abgezehrten Personen, die Erhebung der Arterie beim Puls durch das Gesicht wahrnimmt.

Im Leben ist ihre Richtung ziemlich gerade, doch zeigt sie ausgenutzt sich etwas geschlängelt. Sie gibt in der Regel keine Äste, oder auch als Ausnahme nur unbedeutende Zweige zur Schilddrüse, Thymus und an benachbarte Muskeln. Sind zwei pharyngeische Arterien da, so entspringt die untere gewöhnlich aus der gemeinschaftlichen Carotis<sup>19</sup>. Zuweilen geht aber auch die obere thyreoideische Arterie, von der sogleich näher die Rede seyn wird, schon von ihr<sup>20</sup>. Da sie keine oder nur sehr geringe Zweige abgibt, so bleibt sie im Durchmesser sich völlig oder doch ziemlich gleich, und erreicht den obern Rand des Kehlkopfs, in welcher Gegend sie ihre Theilung macht und von hier an nun als äußere und als innere Carotis ihren besondern Verlauf nimmt.

A) Äußere oder Facial-Carotis, Gesichtscarotis, (*Carotis externa*, s. *facialis*.) der erste der gedachten Hauptäste der gemeinschaftlichen Carotis hat seinen Namen daher bekommen, weil die äußern Theile des Halses und des Kopfs, besonders das Gesicht und Gesichtstheile, von den Gehirnthteilen aber nur die harte Hirnhaut von demselben mit Blut versorgt werden. Es darf also keinen Widerspruch begründen, wenn man von der äußern Carotis bemerkt, daß sie dem Larynx näher ist als die innere, und also in dieser Hinsicht mehr nach innen ihren Verlauf beginnt, wobei sie zugleich auch mehr vorwärts gerichtet ist.

<sup>19</sup>) Sommerring's Gefäßl. S. 155.

<sup>20</sup>) so in der Abbildung in Mon-

str's Zeichn. d. Blutgef. Taf. 2. Pl. 1. Nr. d.



Ihr fernerer Verlauf ist im allgemeinen folgender: daß sie der anfänglichen Richtung nach als der sich fortsetzende Carotidenstamm angesehen werden kann, in ihrem Aufsteigen hinter der Maxillardrüse und dem hintern Rande des aufsteigenden Astes der untern Kinnlade dann unter der Parotis sich verbirgt, über dem Condylus der Kinnlade eine starke Krümmung nach außen macht, nun vor der Ohrknorpel, in der Gegend der Schläfe, als Schlafarterie, wieder äußerlich in ihrem Klopfen fühlbar wird, und hier endlich in ihren letzten Hauptramificationen als äußere Carotis ihr Ende findet. Sie liegt in diesem Verlauf an der innern Seite des hypoglossischen Nerven des hintern Bauchs des digastrischen Muskels und des Stylohyoideus.

Sie ist übrigens in Bezug auf die innere Carotis etwas größer als diese, in dem gewöhnlichen Fall, wenn die obere thyreoidische Arterie ihren Ursprung aus ihr nimmt <sup>21</sup>, mit ihr gleich, wenn dieselbe wie zuweilen, aus der Theilungsstelle selbst hervorgeht, und endlich kleiner, wenn dieselbe Arterie bereits aus der gemeinschaftlichen Carotis abgegangen war <sup>22</sup>.

Ihre einzelnen Äste, wenn man mehrere kleine unbeständige Zweige an den Sternocleidomastoideus, den obern Halsknoten des sympathischen Nerven, den vordern Bauch des Digastricus, den Masseter, den Stylohyoideus und Stylopharyngeus, den Platysmamyoides, und eine nicht sogar seltne Arterie an den Larynx nicht achtet, sind gewöhnlich folgende:

1) Die obere thyreoidische Arterie oder Schilddrüsenarterie, (A. thyreidea superior.) Sie entspringt von der innern Seite der äußern Carotis, immer in der Nähe der Zertheilung der gemeinschaftlichen Carotis in die äußere und in die innere, ja aus der Stelle der Trennung selbst, so daß dann wirklich die gemeinschaftliche Carotis in drei Äste sich spaltet, wovon sie selbst der eine ist, ja wohl auch noch (wie erwähnt,) aus dem gemeinschaftlichen Carotidenstamme. Sie ist nach Verhältniß weit stärker, als man dieß, wenn man ihr nur bloß die Bestimmung beilegt, die Theile, zu denen sie geht, zu ernähren und organisch zu erhalten, für nöthig erachten sollte, ja wohl nicht selten selbst der innern Carotis gleich, zumal wenn die untere thyreoidische Arterie, (ein eben-so ansehnlicher Ast der Subclaviararterie,) klein als gewöhnlich ist. Bisweilen ist sie auf einer Seite, vorzüglich der linken, sehr klein, wo dann die entgegengesetzte größere beide Hälften der thyreoidischen oder Schilddrüse versorgt. Davon, daß sie der genannten Drüse vorzüglich und zwar überreich Blut zuführt, hat sie ihren Namen erhalten. Um dahin zu gelangen, nimmt sie vor ihrem Abgang an erst eine kurze Strecke aufwärts und einwärts ihren Verlauf, krümmt sich dann noch mehr einwärts und steigt sodann zur Schilddrüse herab.

Insbesondere aber unterscheidet man an ihr

a) Muskelläste, (Rami musculares,) die sich auf unbestimmte Weise in den Hypothyreoides, Sternothyreoides, Sternohyoideus, Omohyoideus und andere benachbarte Muskeln einsenken und verbreiten, auch Zweige zur Hautbedeckung geben.

21) nach Haller (a. a. O.) in dem Verhältniß wie 15 zu 13.

22) nach Haller (a. a. O.)

1) Nefte zum Pharynx, (Rami pharyngei,) die hinterwärts, gemeinlich aus Einem, doch ihnen nicht ausschließlichen Stamm in untern Constrictor des Pharynx oder des Schlundkopfs gehen.

2) Drüsenäste, (Rami glandulares,) theils mit besondern Stämmen, theils mit solchen, die ihnen und den Muskelästen gemeinschaftlich sind, die sich insbesondere in die Schilddrüse und zwar in der Regel in die ihnen entsprechende Hälfte derselben verbreiten, jedoch nur mit denen der entgegengesetzten Seite, gemeinlich vorwärts in einem obern und in einem untern Bogen, sondern auch mit Ästen untern thyreoidischen Drüse anastomosiren<sup>21</sup>. Sowohl von diesen als den Muskelästen gehen auch Zweige zur äußern Fläche des Schilddrüsenknorpels.

1) Die laryngeische oder Kehlkopfarterie, (Arteria laryngea.) Dieser Ast ist unter allen der beständigeste, und wird daher auch als eine eigene Arterie unterschieden; bisweilen nimmt sie jedoch auch aus der äußern Carotis selbst ihren Ursprung, oder ist auch ein Ast der pharyngeischen Arterie. In der Regel ist sie als Fortsetzung der obern thyreoidischen Arterie anzusehen. Sie verbreitet sich, wie ihr Name besagt, vorzüglich in den Larynx oder den Röhrenkopf, doch nicht einzig, indem sie zwischen dem obern Rande des thyreoidischen Knorpels und dem Zungenknochen, selten durch ein eigenes Loch des erst genannten Knorpels, zur innern Fläche des Larynx hin gelangt. Nachdem sie sich zuerst in zwei Äste, einen obern und einen untern, zertheilt hat, gelangen hieraus zahlreiche Zweige vorzüglich zum thyreoidischen Knorpel, zu den arytenoidischen Knorpeln, zu dem cricoideischen Knorpel, zur Epiglottis und an die Ligamente und Muskeln des Larynx, mannigfaltiger Varietäten nicht zu gedenken.

2) Die Lingual- oder Zungenarterie, (A. lingualis.) Sie entspringt ebenfalls aus der innern Seite der äußern Carotis, über dem vorigen, zuweilen aus einem ihr und der äußern Maxillararterie gemeinschaftlichen Stamme. Sie ist gewöhnlich noch etwas größer, als die obere thyreoidische Arterie. Sie krümmt sich gleich nach ihrem Ursprung stark aufwärts, nimmt geschlängelt einwärts dicht über dem großen Horne des Zungenknochens in horizontaler Lage ihren Fortgang, und wird hier von dem Stylohyoideus bedeckt; nun krümmt sie sich über das kleine Horn des Zungenknochens in die Höhe und verbreitet sich in die Zunge.

Die dieß geschieht, gibt sie Muskelzweige, und zwar einen ziemlich beständigen in den Stylohyoideus, dann mehrere an den Stylohyoideus, den Hyoglossus, den Mylohyoideus, den Digastricus, den Stylohyoideus und Styloglossus, und mehrere benachbarte Muskeln, ferner Zweige an die ligamentöse Verbindung der Zunge mit dem Zungenknochen. Unter ihnen wird ein beständiger kleiner Ast, als thyreoidische, (Ramus hyoideus,) unterschieden, der gleich über dem kleinen Horn des Zungenknochens und dem Geniohyoideus nach vorn entspringt, und sich am obern Rande der Basis des Zungenknochens mit dem nämlichen Ast der andern Seite in einen Bogen, (Arcus hyoideus,) vereinigt. Es geht dieser Ast jedoch auch zuweilen unmittelbar aus

21) Vgl. Pöcher's anat. Tafeln Taf. 91. Nr. 75 u. 77.



dem Stamm der äußern Carotis hervor, oder entspringt auch wohl aus der äußern Maxillarterie. Aus dieser Verbindung entsteht vorzüglich ein ansehnlicher Zweig, der zwischen dem rechten und linken Geniohyoideus hindurchgeht, sodann auch den Mylohyoideus über dem Zungenknochen in der Mitte durchbohrt und sich zuletzt in die Haut verliert. Auch die Maxillardrüse und die Zunge selbst erhalten, wiewohl unbeständige, Zweige von der Zungenarterie, ehe sie eigens bezeichnete Arterien abgibt.

Diese selbst sind nun aber folgende:

a) die Dorsalarterie der Zunge oder Arterie des Zungenrückens, (*A. dorsalis linguae.*) Sie geht, ihrem Namen entsprechend, aufwärts an den hintern Theil der obern Fläche der Zunge, wo sie sich netzförmig verbreitet. Auch der Stylohyoideus erhält Zweige von ihr, wie auch rückwärts die Epiglottis. Bisweilen ist sie doppelt, und öfters so lang, daß sie auch in den Schlund und in die Tonsillen Zweige gibt, ja sich bis zu dem weichen Gaumen erstreckt.

b) Die Sublingual- oder Unterzungenarterie, (*A. sublingualis.*) Sie ist ansehnlicher als vorige, obgleich in Hinsicht ihres Ursprungs nicht beständig, indem sie zuweilen mehr nach hinten, zuweilen aber auch erst in der Mitte der Zunge entspringt, zuweilen aber auch ein Ast der Submentalarterie aus der äußern Maxillarterie ist. Sie nimmt unter der Zunge zwischen der Sublingualspeicheldrüse und dem Geniohyoideus vorwärts nach dem Kinn ihren Lauf; gibt der gedachten Drüse, dem Geniohyoideus, Genioglossus und Mylohyoideus, ingleichen dem Digastricus Zweige, wie auch kleine den Mylohyoideus durchbohrende an die äußere Haut. Hinter dem Kinn anastomosirt sie mit der Submentalarterie, wenn sie nicht aus ihr selbst entspringt.

c) Die sogenannte Froscharterie oder Seitenzungenarterie, (*A. ranina.*) ist eigentlich wegen ihrer Größe und da sie die Zungensubstanz bis zur Spitze mit Zweigen versorgt, als die Fortsetzung und das Ende der Zungenarterie selbst zu betrachten. Sie nimmt ihren Verlauf geschlängelt an der untern Seite der Zunge, wo sich die Fortsetzungen des Genioglossus in die Zunge einsenken. Unter der Spitze der Zunge, wo sie überhaupt nicht tief unter der Zungenhaut liegt, als leicht verletzlich ist, macht sie eine bogenartige Verbindung mit der andern Seite <sup>24</sup>.

3) Die äußere Maxillar-, Gesichts- oder Lippenarterie, (*A. maxillaris externa, s. facialis, s. labialis.*) Sie entspringt unmittelbar über der vorigen Arterie, ebenfalls aus der innern Seite der äußern Carotis; in seltenen Fällen jedoch auch mit ihr aus einer gemeinschaftlichen Stamme. Sie ist ebenfalls von ansehnlicher Stärke, wiewohl in der Regel etwas schwächer als die Zungenarterie. Ihr Ursprung ist in der Gegend des Winkels der untern Kinnlade, hinter und unter dem die äußere Carotis heraufsteigt. Sie ist hier von hintern Bauche des Digastricus und dem Stylohyoideus bedeckt, hinter welchen Muskeln sie etwa  $\frac{1}{4}$  Zoll senkrecht aufsteigt, dann abwärts vorwärts und einwärts sich krümmt. Diese ihre erste und größ-

<sup>24</sup>) Eine gute Darstellung von ihr, s. in Schmerring's Abbild. d. menschl. Organe d. Geschmacks Pl. 3.



krümmung macht sie unter der Maxillarspeicheldrüse; bald darauf verläßt sie gewöhnlich, nachdem Muskelzweige zum Digastricus und Stylohyoideus von ihr abgegangen sind,

a) die aufsteigende palatinische oder Gaumenarterie, (A. palatina ascendens,) ab, die jedoch in Hinsicht ihres Ursprungs mannigfaltig variiert, zuweilen unmittelbar aus der äußern Carotis, zuweilen aus der aufsteigenden pharyngeischen Arterie kommt, zwischen dem Styloglossus und Stylopharyngeus, mit Abgabe von kleinen Zweigen an sie, aufwärts steigt, der Tonsille Zweige gibt und in den pterygoideischen Muskeln verliert, auch mehrere benachbarte Theile, die Eustachische Röhre, den weichen Gaumen und seine Muskeln, den hintern Theil der Zunge mit Blut versieht, in seltenen Fällen wohl auch doppelt ist.

Von mehreren Zweigen, welche die fortlaufende Arterie an benachbarte Theile, als den weichen Gaumen, die pterygoideischen Muskeln, die Submaxillardrüse abgibt, wird

b) die Tonsillar- oder Mandelarterie, (A. tonsillaris,) als ein zu der Tonsille derselben Seite gehender Zweig, besonders ausgezeichnet, weil sie das vorzüglichste arterielle Gefäß dieses Theils ist. Zuweilen ist sie auch wohl von noch einem oder mehreren Zweigen begleitet.

Auch die Wurzel der Zunge wird mit von ihr versorgt. Bisweilen ist sie wohl auch ein Zweig der aufsteigenden palatinischen Arterie; wenn nimmt sie aus der äußern Carotis selbst ihren Ursprung.

Bedeutender ist der Ast, der als

c) Submental- oder Unterkinnarterie, (A. submentalis) verschieden wird, obgleich diese Benennung auch der ganze Arterienstamm für die ganze Strecke, als er noch nicht unter der untern Maxille das Gesicht hervorgetreten ist, erhält. Man kann diesen als einen der Hauptäste betrachten, in welche sich der Arterienstamm spaltet.

Sie geht in der Furche der Maxillarspeicheldrüse von diesem ab, Anfangs auf der äußern Fläche des Stylohyoideus ihre Lage, wo sie sich neben dem vordern Bauch des Digastricus nach vorn außen krümmt. Beide Muskeln erhalten eine Menge Zweige von ihr; andere durchbohren den Platysmampoides und gehen zur äußern Haut. Andere Zweige treten am untern Rand der untern Maxille das Gesicht und anastomosiren mit Zweigen der Facialisarterie, wie auch der innern Maxillararterie. Das Ende der Arterie macht mit der Zungenarterie Gefäßverbindungen. Zuweilen ist die Sublingualarterie ein Ast von ihr. Auch die Endigungen beider Submentalarterien am Kinn stehen mit einander in Verbindung und bilden wohl einen arteriösen Bogen.

d) Die eigentliche Facialisarterie, auch flache Lippenarterie genannt, (A. facialis s. labialis,) als der zweite, aber größere Hauptast, in den sich der Stamm der äußern Maxillararterie spaltet, eben so gut auch als der fortgesetzte Stamm zu betrachten. Er verläuft sich geschlängelt über den Rand des Unterkiefers dicht vor dem Unterkiefer herum, und ist hier, da bloß der Platysmampoides überliegt und der Knochen eine harte Unterlage gewährt, äußerlich als pulsirende Arterie deutlich wahrzunehmen. An dem Knochen selbst erkennt man

e) G. Meier's Besch. d. Mäuler S. 40.

gewöhnlich durch eine leichte Vertiefung die Stelle, wo im Leben die Arterie sich um ihn herumschlug. Außer den hintern Muskelästern, welche der Masseter von ihr erhält, gibt sie auch nach vorn gleich zu den niederziehenden Muskeln des Mundwinkels und der Unterlippe (*M. triangularis et quadratus menti*), wodurch sie zugleich Anastomosen mit den Verzweigungen der Submentalarterie und der untern Maxillalarterie unterhält. In ihrem fernern Verlauf gibt sie Zweige an den Buccinator, die mit der Verzweigung der Buccalarterie von der innern Maxillalarterie Gemeinschaft haben, zum Zahnfleisch der untern Kinnlade, ferner den zygomatischen Muskeln und dem Levator des Mundwinkels. Zuletzt theilt sie sich, auf nicht gleichförmige Weise, in drei größere Zweige, die man auch als eben so viele besondere Arterien unterscheidet, nämlich die beiden coronarischen Lippenarterien und die Angulararterie.

aa) Die coronarische oder Kranzarterie der Unterlippe (*A. coronaria labii inferioris*), geht zuerst, entweder allein, oder mit der folgenden zugleich mittelst eines gemeinschaftlichen Stammes, von ihr, am Mundwinkel ab und läuft an dem Rande der Unterlippe geschlängelt bis zur Mitte derselben fort, wo sie sich mit der ihr entgegenkommenden gleichen der andern Seite vereinigt. Zweige daraus gehen aufwärts zum Orbicularmuskel des Mundes, abwärts in den niederziehenden Muskel des Mundwinkels und der Lippe und an benachbarte Theile.

bb) Die coronarische oder Kranzarterie der Oberlippe (*A. coronaria labii superioris*), ist stärker als die vorige und nimmt noch geschlängelter ihren Verlauf am Rand der Oberlippe, von dem Mundwinkel aus, bis zur Mitte, wo sich beide eben so, wie die beiden coronarischen Arterien der Unterlippe thun, anastomosirend verbinden. Auf diese Weise wird um den ganzen Mund herum ein arterieller Kranz gebildet, wovon beide Arterien ihren Namen haben; doch ist bei der unendlichen Mannigfaltigkeit, die in dem Verlauf dieser Arterie Statt findet, dieser Kranz auch zuweilen nur das Ansehen eines arteriösen Netzes. Aus der obern coronarischen Arterie gehen abwärts Zweige zum Orbicularmuskel des Mundes, aufwärts zu den Nasenflügeln, zur Nasenscheidewand und Nasenspitze, selbst zum Rücken der Nase. Diese zur Nase gehenden Zweige führen auch den besten Namen Untere Nasalarterien, (*Arteriae nasales inferiores*), und zwar die in der Mitte aufsteigenden, die mittlern, (*mediae*), die mehr zur Seite gelegenen Seitenarterien, (*laterales*).

cc) Die Angulararterie, (*A. angularis*), wird auch wohl als eine Fortsetzung der coronarischen Arterie der Oberlippe angesehen, woher sie sich trennt, um neben der Nase bis zum innern Augenwinkel herauf zu gelangen. Sie liegt innerhalb der zygomatischen Muskeln, aber außerhalb der übrigen Wangenmuskeln. Die zygomatischen Muskeln, der Levator des Mundwinkels, der der Oberlippe und des Nasenflügels, der Orbicularmuskel der Augenlider und die äußere Fläche der Nase erhalten von ihr Zweige. Sie anastomosirt mannigfaltig mit der Infraorbitalarterie, der Querarterie des Gesichts, Zweigen der untern Maxillalarterie, und vereinigt sich zuletzt mit der Nasenarterie aus der ophthalmischen Arterie. Die seitwärts zur äußern Nase gehenden Zweige, das über die ganze äußere Nase sich erstreckende arteriöse Netz ihrerseits



altbildenden Zweige werden auch als obere Seitennasalararterien, (*Arteriae nasales laterales superiores*,) bezeichnet. Einer ihrer inneren Zweige dringt auch durch ein eignes Loch des Nasenknochens in die Nasenhöhle.

Alle gedachten einzelnen Aeste der äußern Maxillararterie geben auch Hautzweige für das Gesicht zu den Stellen, wo sie in der Tiefe ihren Verlauf nehmen.

4) Aufsteigende Pharynx- oder Schlundkopfarterie, (*Arteria pharyngea ascendens*.) Sie ist in der Regel der kleinste Ast der äußern Carotis, und in Hinsicht ihres Ursprungs den bisher drei gedachten Arterien darin entgegengesetzt, daß sie auf der hintern, der Halswirbeln zugewendeten, Seite, ungefähr in der Gegend, wo die Lungenarterie vorwärts hervorkommt, selten höher als diese, aus dem Hauptstamm hervortritt. Doch findet man sie auch als einen Ast der Occipitalarterie, der äußern Maxillararterie oder der obern thyreoidischen Arterie, ja sie findet sich wohl auch doppelt, wo dann der ältere Stamm gewöhnlich von der gemeinschaftlichen Carotis kommt, und dreifach. Dieser so unbeständige Ursprung derselben ist auch Ursache, daß die Anatomen bis auf Haller's Zeiten sie wenig oder nicht beobachtet und unterschieden haben.

Ihre Hauptzweige sind ihre vordern, die sich in den hintern und größtentheil des Pharynx, besonders oberwärts und in der Mitte desselben vertheilen, und auf der hintern Seite desselben mit denen der entgegengesetzten gleichen Arterie anastomosiren. Außerdem verbreiten sich ihre Zweige auch in die Eustachische Röhre und die an ihr und an dem styloideischen Proceß sitzenden Muskeln, an dem Knorpel zwischen der Eustachischen Röhre und der Pyramide, in das Tympanum, den kleinen vordern geraden Kopfmuskel, und dem hintern Theil der Nasenhöhle. Ein kleiner Zweig verbindet sich, durch den pterygoideischen Canal vorwärts bringend, mit einer Nasalarterie.

Andere kleine Zweige gehen zu den vordern geraden Kopfmuskeln, zum Periosteum der Halswirbel, zu dem Stylopharyngeus, zuweilen auch an den Sternocleidomastoideus und den Platysmammoideus, ferner an das obere Ganglion des sympathischen Nerven, an den vagen Nerven, und die lymphatischen Drüsen am Halse; ein Zweig steigt der Jugularvene bis zum Quersinus der harten Hirnhaut, und verbreitet sich am Occipitalloch und an der Pyramide; ein anderer wird unterschieden, der am neunten Nerven, oder auch durch ein eignes Loch am condyloideischen Proceß des Occipitalknochens in den Schädel zur harten Hirnhaut eindringt, und in der Gegend des großen Occipitallochs sich verbreitet. Andere Zweige gelangen durch den Knorpel, der die Pyramide mit dem Occipitalknochen verbindet, zur harten Hirnhaut und in den cavernösen Sinus.

Auch die Zunge, der bewegliche Gaumen und der Larynx erhalten Aeste.

5) Occipital- oder Hinterhauptsarterie, (*Arteria occipitalis*.) Sie ist bedeutender als die vorige, und entspringt ebenfalls an der hintern und zugleich äußern Seite der äußern Carotis, in der Gegend, wo nach innen die äußere Maxillararterie entspringt, oder etwas höher. Selten ist sie ein Ast der innern Carotis. Sie steigt An-



fangs nach außen am Stamme der äußern Carotis in die Höhe, so dem sie sich jedoch in ihrem Fortgang immer mehr entfernt. Hier sie vom hintersten Theile des Digastricus, dann vom obersten Theile des Sternocleidomastoideus und des Trachleomastoideus bedeckt. Nachwärts legt sie sich an den hintern Rand des styloideischen Proceß und kreuzt sich hier mit der in der Tiefe liegenden innern Carotis. Hinter dem styloideischen Proceß macht sie fast rechtwinklich eine Krümmung und nimmt nun in horizontaler Richtung, in der Tiefe zwischen dem mastoideischen Proceß und dem Querproceß des Atlas, ihren Verlauf nach der äußern Seite des Hinterkopfs, wovon sie auch ihren Namen hat.

Unter dem mastoideischen Proceß gibt sie nicht selten die stylomastoideische Arterie ab, die aber noch häufiger aus der hintern Auriculararterie hervorgeht. In derselben Gegend gibt sie auch gewöhnlich eine hintere meningeische Arterie, (*A. meningea postica*), welche durch ein mastoideisches Loch zum hintern Theil der harten Hirnhaut geht.

Die allgemeine Ramification dieser Arterie ist übrigens folgende. In der Gegend ihres Ursprungs erhalten die an der Jugularvene liegenden lymphatischen Drüsen, der Digastricus, der Sternocleidomastoideus und der Trachleomastoideus kleine Zweige. In ihrem Fortgang gibt sie dem geraden Seitenkopfmuskel, dem obern schrägen Kopfmuskel und den am Atlas ihre Insertion habenden Muskeln Zweige, wo sie zugleich mit der untern thyreoideischen oder Cervicalarterie Anastomose bildet; durch das Jugularloch gelangen Zweige an die harte Hirnhaut in der Gegend der Grube des Cerebellums; ein unbeständiger Zweig geht an das Ohrkläppchen, und auch von ihm kommt zuweilen die stylomastoideische Arterie; in seltenen Fällen geht auch hier eine hintere Temporalarterie hervor, die in der Regel ihren Ursprung aus der Temporalarterie nimmt. Im fernern Verlauf an der untern Seite des Hinterkopfs gibt sie dem Splenius des Halses, dem Trachleomastoideus auch wohl dem Quermuskel des Nackens und den schrägen Kopfmuskeln Zweige; andere Zweige gehen an den Complexus, an die beiden hintern geraden Kopfmuskeln und anastomosiren mit Zweigen der Vertebralarterie.

Nach Abgabe dieser kleinern Zweige spaltet sich der Arterienstamm selbst, und zwar gewöhnlich unter der Insertion des obern Bauches des Biventer des Nackens zuvörderst in zwei Äste, einen obern und einen untern.

Der obere Ast, (*Ramus superior*), geht gewöhnlich zwischen dem Ende des Cucullaris und des Splenius des Kopfs geschlängelt nach der Mitte des Hinterhaupts schräg einwärts und aufwärts, und theilt sich dann wieder in zwei Äste, wovon der hintere, (*Ramus posterior*), auch als Fortsetzung des Stammes angesehen werden kann, zum mildern obern Theile des Hinterhaupts hinauffleigt, mit dem gleichen Ast der entgegengesetzten Seite, auch dem vordern Ast anastomosirende Verbindungen eingeht und meist auch einen kleinen Zweig durch ein Parietalloch zur Diploe oder zur harten Hirnhaut abgibt, der vordere aber, (*Ramus anterior*), vorwärts zum obern Seitentheile des Hinterhaupts aufsteigt, und mit der Temporal- und der hintern A.

Carotterie in Verbindung tritt. Beide Äste versehen die aponeurotische Galea des Kopfs und den Occipitalmuskel mit Blut.

Der untere Ast, (Ramus inferior,) ist bedeutend dünner, nimmt seinen Ursprung dem Cucullaris und dem Complexus einwärts seine Richtung, und sendet Zweige an den obern Theil der Nackenmuskeln, die an der obern semicirculären Linie des Occipitalknochens ihre Insertion haben.

Die Verzweigungen auf beiden Seiten anastomosiren mit einander. Uebrigens treten auch hier mannigfaltige Abweichungen in der Vertheilung dieser Gefäße ein.

Hinterer Auricular- oder Ohrarterie, (A. auricularis posterior.) Sie ist die dünnste Arterie, welche die äußere Carotis gewöhnlich abgibt, blieb indeß doch auch von ältern Anatomen nicht unbeachtet. Sie kommt häufig auch aus der Occipitalarterie von der hintern Seite derselben, selten aus der innern Maxillararterie. In der Regel entspringt sie von der hintern Seite der äußern Carotis, über der Occipitalarterie, ihren Ursprung, und steigt durch die Ohrdrüse, der sie zunächst Zweige abgibt, von dem hintern Bauche des Digastricus und Stylohyoideus bedeckt, die auch Zweige erhalten, aufwärts, indem sie auch dem zurückziehenden Ohrmuskel, dem Sternocleidomastoideus, Anfang des Cucullaris, ingleichen dem untern Theil des Gehörganges Zweige abgibt, und mit dem tiefen Ast der untern thyreoideischen Arterie anastomosirt.

Unter ihren Verzweigungen verdient die stylomastoideische Griffelzigen-arterie, (Arteria stylomastoidea,) ihres beständigen Ganges wegen Bemerkung. Diese dünne, aber beständige Arterie nimmt in der Regel aus der hintern Auriculararterie, unweit ihres Ursprungs, oder unter dem mastoideischen Proceß ihren Ursprung, tritt aber auch sehr häufig aus der Occipitalarterie, tritt, nachdem sie an den Gehörgang feste abgegeben und mit einem Zweige der temporalen Arterie Anastomosen eingegangen hat, in das stylomastoideische Foramen des Schläfens, und dadurch in den Faloppischen Gang, wo sie mit einem Ast der mittlern meningeischen Arterie sich zusammenschließt und sonst sich in die einzelnen Theile des innern Gehörorgans vertheilt. (S. Ohrarterien.)

Nachdem die hintere Auriculararterie noch einen Zweig an den Sternocleidomastoideus und die Kopfbedeckungen abgegeben hat, der sich sowohl um den Ursprung des Cucullaris schlägt, und mit der untern thyreoideischen Arterie anastomosirt, steigt sie schräg rückwärts in die Vertiefung hinter dem äußern Ohr hinauf, und gibt Zweige an das äußere Ohr, die mit andern von der Temporalarterie anastomosiren und verliert sich entweder in dieser Gegend, oder steigt in einzelnen Verzweigungen auch wohl bis zum Occipitalmuskel und dem Epitemporal des Kopfs, ebenfalls mit andern arteriösen Gefäßen dieser Theile anastomosirend.

Temporal- oder Schläfearterie, (Arteria temporalis.) Man sieht sie so als Fortsetzung der äußern Carotis, (besonders der Richtung nach,) als einer der Hauptäste anzusehen, in welche sich dieselbe in die Abgabe der bemerkten Arterien spaltet. Diese Theilungsstelle ist unmittelbar dem mastoideischen Proceß und hinter dem hintern Rande des Unterkiefers, der untern Kinnlade. Die Temporalarterie steigt, Anfangs noch





von der Parotis bedeckt, zwischen der Wurzel des zygomatischen Processes und dem knorpelichen Theil des Gehörganges und hinter condyloideischen Proceß der untern Kinnlade herauf, wo sie dann an äußern Fläche der Temporalaponeurose ihre Lage hat. Mehrere Aemern betrachten den tiefern Theil derselben bis dahin, wo sie dem o Rand des zygomatischen Processes gleichkommt, noch nicht, als Temporalarterie, sondern noch als den fortgesetzten Stamm der äußern Carotis<sup>25</sup>. Nach dieser Ansicht gehen die nächsten Aeste der Temporalarterie auch nicht aus ihr, sondern sind Hauptäste der äußern Carotis. Einige kleine Zweige nicht zu rechnen, welche dieselbe an Parotis, den Masseter, (vergleichen auch aus dem Stamm der äußern Carotis selbst hervorkommen,) und gibt an das Maxillargelenk, wo zum Theil den Facialnerven begleiten, und durch die Fissur am Gehörgang selbst in das Tympanum eindringen, sind die einzelnen der Temporalarterie gewöhnlich hervortretenden Arterien folgende:

a) die Querarterie des Gesichts, oder Zwerchhantlarterie, (A. transversa faciei.) Sie geht noch unter dem zygomatischen Bogen am obern Theile der äußern Fläche des Masseter quer vorwärts, Anfangs noch von der Parotis bedeckt, dann aber in der Richtung des Stenonianischen Ganges, und diesen begleitet an das Gesicht. Sie ist ein ansehnlicher Ast, ja öfters so dick als die Temporalarterie selbst, wo sie dann mehrere Theile des Gesichts mit Gefäßen versieht, welche diese sonst zunächst von der Facialarterie erhalten. Sie wird wohl auch als ein Ast der innern Maxillarterie betrachtet. Ihre mehresten Zweige erhält der Masseter, bekommen auch die Parotis, der Temporalmuskel, die zygomatischen Muskeln, der untere Theil des Orbicularmuskels der Augenlider und unbedeutende Gefäße von ihr. Sie bildet häufige Anastomosen mit der äußern Maxillararterie und der Infraorbitalarterie aus der innern Maxillararterie. Bisweilen ist sie von einer ihr ähnlichen kleinern begleitet, die über den Backenknochen zum Orbicularmuskel der Augenlider geht.

b) Die untere Auricular- oder Ohrarterie, (A. auricularis inferior) und

c) die vordere Auricular- oder Ohrarterie, (A. auricularis anterior,) sind beide kleine Aeste, wovon der erstere rückwärts zum untern Theil des äußern Ohres, der letztere, etwas ansehnlicher, vor dem äußern Ohr in die Höhe steigt, und dessen vordern Theile Zweige gibt, die mit der hintern und obern Auriculararterie anastomosiren. Ihr Ursprung ist der Quergefichtsarterie gegenüber, auf der hintern Seite der Temporalarterie. Die vordere ist auch wohl doppelt, dreifach.

d) Die mittlere Temporal- oder Schläfearterie, (A. temporalis, media.) Diese nicht unansehnliche Arterie wird auch häufig als die tiefe, (profunda,) bezeichnet, was aber nicht zu billigen ist. Sie nimmt auf der äußern Seite des zygomatischen Processes aber der innern der Temporalarterie, ihren Ursprung, gibt Zweige an den äußern Augenwinkel und den Orbicularmuskel der Augenlider, versorgt auch wohl den obersten Theil des Ohres mit Gefäßen.

<sup>25</sup>) Vgl. Mayer's Besch. d. Blutgef. S. 60.



tatsächlich aber verbreitet sie sich hinter dem Temporalmuskel, unmittelbar auf dem Pericranium des Hirnschädels in die Höhe laufend, den Schläfemuskel und die darunter liegenden Knochentheile. Man bemerkt auf der im Leben von dem Temporalmuskel bedeckt gemachten äußern Fläche des Schuppentheils des Schläfenochns und des Scheitelsknochens die Spur ihres Verlaufs in einer eingedrückten Linie.

Ungeachtet sie nun in Bezug auf die folgenden beiden Aeste ihren Verlauf nimmt; so führt sie doch, in der Hinsicht, daß sie zwischen diesen und den späterhin gedachten, aus der Maxillalarterie entspringenden, aber unter dem zygomatischen Bogen, (nicht auf dessen vorderer Seite) ihren Lauf nehmenden Temporalarterien in der Mitte läuft, angemessener den Nahmen der mittlern.

Die obere Auricular- oder Ohrarterie, (*A. auricularis superior*), nimmt entweder aus der Temporalarterie, unmittelbar vor ihrer endlichen Zertheilung nach hinten, oder auch häufig, nachdem sie sich zertheilt hat, aus der hintern Temporalarterie ihren Ursprung, und geht, ihrer Benennung entsprechend, an den obern Theil des äußern Ohrs; wo sie nicht allein an die Knorpel des Ohrs, sondern auch mit der hintern und mit der vordern Auriculararterie mannigfaltig anastomosirt.

(Fig.). Nachdem nun die Temporalarterie über dem zygomatischen Bogen, der Haut näher gelegt, ihren feinem Verlauf nimmt, und daher auch unmittelbar dem vordern Ohrknorpel oder dem Tragus an, an den Schlaf klopfen deutlich gefühlt werden kann, indem sie zwischen der Aponeurose des Temporalmusfels und der Haut liegt, also bloß von dieser bedeckt

auch hier kleine Zweige, an den Orbicularmuskel der Augenlider abgegeben hat, spaltet sie sich auf der gedachten Aponeurose in eine vordere und in eine hintere Aste, die auch als die vordere und hintere Temporalarterie, (*temporalis anterior*, s. *externa et posterior*, s. *interna*), bezeichnet werden. Jene geht vorwärts über die Temporalaponeurose, und sendet ihre Zweige zu, fort, ist in ihrem Klopfen vorzüglich fühlbar und verbreitet sich besonders in den Frontalmuskel, den corrugirenden Muskel der Augenbraunen und den Orbicularmuskel der Augenlider:

Hilft sie der Supraorbitalarterie den Augenbraunenbogen, (*Arcus superciliaris*), bilden. Zweige von ihr gelangen bis in den innern Theil der Augenhöhle und zur Thränendrüse. Auch mit der Querarterie des Gesichts und der Infraorbitalarterie geht sie Anastomosen ein.

Diese geht mehr in gerader Richtung aufwärts und ist in so fern als das Ende des Stammes zu betrachten. Häufig entsteht von der obern Auriculararterie. Sonst wird der hintere Theil des Temporalmusfels, so wie der attollirende Ohrmuskel, weiter hinauf der vordere und hintere Theil der aponeurotischen Galea des Kopfs, durch diese Zweige versehen. Sowohl vorwärts mit der vordern Temporalarterie, als hinterwärts mit der Occipitalarterie werden mannigfaltige

Anastomosen bewirkt, so daß die ganze Oberfläche des Kopfs, von der aponeurotischen Galea bedeckt ist, ein ansehnliches Netz überzieht, durch welches sie sowohl, als die häufigen Bedeckungen des Kopfs, das ihnen nöthige Blut erhalten. Einige Zweige dringen durch die Parietallöcher zur harten Hirnhaut.

8) Innere Maxillaris = oder Kieferarterie, (*Arteria maxillaris interna*.) Sie ist der zweite oder innere Ast, in welchen sich die Arteria Carotis zuletzt vertheilt. Sie ist gewöhnlich stärker als die Temporalarterie, und könnte in dieser Hinsicht darauf Anspruch machen, die Fortsetzung des Stammes angesehen zu werden. Sie verbreitet hauptsächlich in den innern Theilen beider Kinnladen, und hat hier ihre Benennung erhalten. Sie nimmt, indem sie sich auf oben bemerkten Theilungsstelle von der perpendicularer ferner aufgehenden Temporalarterie trennt, in horizontaler Richtung, vorn und einwärts, über dem Lateralligamente des Maxillargelenks Fortgang, gelangt, etwas aufwärts steigend, unter den Temporalmuskel und vertheilt sich zuletzt in der Sphenomaxillarfissur.

Folgende aus ihr ihren Ursprung nehmende größere oder kleinere Arterien werden besonders unterschieden:

a) die tiefe Auricular = oder Ohrarterie, (*A. auricularis profunda*), die unter mehreren kleinen Zweigen, welche zum Maxillargelenk gehen, (*Rami maxillares*), in die Häute und Drüsen des Gehirnganges sich verbreitet, zuweilen jedoch auch ein Zweig der Temporalarterie ist. — Aus dieser Gegend geht zuweilen auch ein stämmiger Ast über das Querligament des Unterkiefers zur Eustachischen Röhre, der auch wohl dem Gehörgang, dem Gelenkfett und dem äusseren pterygoideischen Muskel Blut zuführt, und mit dem dritten und fünften Nerven in die Hirnhöhle zur harten Hirnhaut gelangt.

b) Die Tympanum = oder Paukenarterie, (*A. tympanica*) ebenfalls eine kleine Arterie, welche, an der innern Seite des eustachoidischen Processes des Schläfenknochens entspringend, nach Aufsteigen in kleineren Zweigen zum Fett dieser Gegend, rückwärts durch die Glasseffissur in das Tympanum zum äussern Muskel des Malleus geht.

c) Die mittlere meningeische oder Hirnhautarterie, (*A. meningea media*.) Sie gehört zu den vorzüglichsten Arterien, welche die untere Maxillaris absendet und ist diejenige Arterie, wodurch das meiste Blut zur harten Hirnhaut gelangt. Zuerst nimmt sie noch aus dem Stamm der äussern Carotis ihren Ursprung. Sie steigt zwischen zwei Nerven, die vom Facialisnerven zum fünften Nervenpaar gehen, in die Höhe, gibt zuweilen Zweige, die theils das Periosteum des Sphenoidalknochens und zum äussern pterygoideischen Muskel, theils durch eigne feine Löcher zur harten Hirnhaut gehen, häufig auch die kleine meningeische Arterie, (*A. meningea parva*), die aber auch nicht selten von der innern Maxillaris selbst kommt, und sich theils in beiden pterygoideischen Muskeln und den Muskeln der Eustachischen Röhre, theils in dem dritten und fünften Nerven, theils in der harten Hirnhaut, von welcher der cavernöse Sinus gebildet wird, verzweigt, und mit den Arterien des cavernösen Sinus und der innern Carotis anastomosirt, und durch das zu ihrem Durchgang eigen in dem großen Flügel des Sphenoidalknochens gebildete spinöse Loch, das nicht selten doppelt ist, auch noch durch einen Canal am Sphenoidalwinkel des Scheitellknochens in den Hirnschädel, um sich auf der harten Hirnhaut zu verbreiten. Hier theilt sie sich in zwei Aeste, einen vorderen und einen hintern, (*Ramus anterior et posterior*), die beide sich bau



in der harten Hirnhaut verbreiten, und deren Spuren, wie die Stammes, man auf der innern Fläche der Hirnschale in eingetragenen Furchen wahrnimmt. (Vgl. Gehirnarterien.)

Zuweilen gehen Zweige von ihr durch den großen Flügel des Sphenoidalknochens zur Thränendrüse, in den Backenknochen, so daß sie auch der Lacrymalarterie den Ursprung gibt; andere gehen in die Pyramide, die Eustachische Röhre, an den Facialnerven und den Nerven, in das Tympanum; ferner gelangt ein Zweig vorwärts, (Ramus acusticus,) durch den Hiatus des Faloppischen Canals in den Faloppischen Gang, wo er mit der stylo mastoideischen Arterie anastomosirt. Bisweilen ist dieser Zweig größer und theilt sich dann, wovon ein größerer Zweig zur harten Hirnhaut geht.

Zuweilen findet sich auch noch eine zukommende mittlere meningeische Arterie, (A. meningea media accessoria,) welche nahe am Ursprung der Eustachischen Röhre, dem circumplexen Gaumemuskel und dem Levator des weichen Gaumens kleine Zweige gibt, und durch das ovale Loch des Sphenoidalknochens zur harten Hirnhaut dringt. Im Falle, wo zwei mittlere meningeische Arterien vorhanden sind, steigt die erste, ohne einen Ast abzugeben, in den Sinus hinauf.

Die tiefe Temporal = oder Schläfearterie, (A. temporalis profunda,) die indessen häufig auch doppelt, ja dreifach ist. Im erstern Fall wird dann eine innere und eine äußere (exterior und interior) unterschieden. Ihr Lauf und ihre Verbreitung ist unter dem zygomaticen Bogen, (wodurch sie sich von der mittlern und der oberflächlichen Temporalarterien auszeichnet,) in dem untern Theile des Temporal Muskels, der sie bedeckt, wie auch im äußern pterygoideischen Muskel; auch das Maxillargelenk und der Masseter werden zum Theil von ihr versorgt. Oft geht auch ein Zweig durch einen Canal in dem Backenknochen in die Augenhöhle, wo er dem Fett der Augenhöhle und der Periorbita Blut zuführt, ja selbst sich in die Thränendrüse verbreitet, oder auch die Lacrymalarterie bildet.

Zum Theil aus dieser, zum Theil aber auch aus der folgenden und aus dem Stamm der innern Maxillararterie selbst gehen unbestimmte Äste an die pterygoideischen Muskeln, (Rami pterygoidei,) die an den weichen Gaumen, ingleichen an den Buccinator, die Membran des Mundes und die Submaxillardrüse gelangen.

Die untere Maxillar = oder Kiefer = oder Alveolararterie, (A. maxillaris, s. alveolaris inferior.) Sie kommt zuweilen unmittelbar aus einem gemeinschaftlichen Stamme, und entspringt öfter in der Nähe derselben. So wie jene aber aufwärts geht, so geht sie, in Begleitung des untern Maxillarnerven zwischen den pterygoideischen vorwärts herab, und tritt, nachdem sie Zweige zum innern pterygoideischen Muskel, zuweilen auch einen Zweig zum Buccinator und zum Temporalmuskel abgegeben hat, mit jenem Nerven ein gemeinschaftliches, oder auch ein besonderes Loch in den in der Unterkiefer dafür gebildeten Maxillarcanal von hinten hinein.

Unmittelbar vor dieser Oeffnung geht eine kleine Arterie von ihr ab, an der man auf dem Unterkiefer in einer von diesem hinteren Ende des Maxillar = oder Alveolarcanales auf der innern Seite des Kiefers



des Unterkiefers schräg vorwärts herablaufenden Furche wahrnimmt und die man wohl auch die mylohyoideische Arterie, (*A. mylohyoidea*.) nennt, da sie zugleich mit dem mylohyoideischen Nerven dem Mylohyoideus benannten Muskel geht. Mit der Submentalar bildet sie Anastomosen.

In dem Canale selbst gibt die untere Maxillalarterie einzelne Zweige aufwärts für die sämtlichen Zähne des Unterkiefers, und zwar jeden so viele, als die Zahnwurzel Spitzen oder Zacken hat. (*Zähne*.) Unter dem zweiten Backenzahn geht der Hauptzweig der Arterie, durch das in dem Unterkiefer hier befindliche vordere Alveolarchanalloch wieder nach außen, während der, obgleich schwächere, Bestand der Arterie noch bis unter den vordersten Schneidezahn sich streckt. Jener austretende Ast, (*Ramus mentalis*.) versorgt, neben den Nerven, die Muskeln, die Haut und die Drüsen der Unterlippe und des Kinns, und anastomosirt mit Verzweigungen der Facial- und der Submentalarterie aus der äußern Maxillalarterie.

f) Die masseterische oder Kiefermuskelarterie, (*A. masseterica*.) wird zum Theil auch unter mehreren, die der Masseter benachbarten Arterien, auch aus dem Stamme der äußern Carotis erhalten und die im allgemeinen als hintere masseterische Arterien, (*A. massetericae posteriores*.) bezeichnet werden, unterscheiden. Oft gibt die äußere Carotis unter kleinen Zweigen auch sehr ausgezeichneten.

Auch der untere Theil des Temporal Muskels und der äußere pterygoideische Muskel erhalten Zweige davon.

g) Die buccinatorische oder Backenarterie, (*A. buccinatoria s. buccalis*.) Sie verbreitet sich in den Buccinator oder Backenmuskel in die zygomatischen Muskeln, in den Levator der obern Lippe des Mundwinkels, in die Haut der Mundhöhle, in das Periosteum des Oberkiefers, steigt bis zum untern Augenlid hinauf, geht an Buccaldrüsen und anastomosirt mit der Facialarterie und der Infraorbitalarterie. Bisweilen entspringt diese kleine Arterie auch unmittelbar aus der äußern Carotis, oder ist auch ein Zweig einer tiefern Temporalarterie oder der folgenden, oder der Infraorbitalarterie. Bisweilen geht auch von ihr ein Zweig durch den Backenknochen an Thränendrüse, oder auch ein anderer an die Alveole des letzten Backenzahns, oder auch ein anderer durch die Alveolarlöcher mehrerer Zähne des Oberkiefers, zu diesem, und gelangt durch kleine Löcher in das Gesicht.

h) Die Alveolar- oder Zahnfacharterie des Oberkiefers, (*A. alveolaris superior*.) Sie ist von der Stärke der äußern Maxillalarterie. Sie schlängelt sich gegen die äußere Fläche der Alveolarprocesses des Oberkiefers nach vorn fort, und gibt dem Zahnfleisch des Oberkiefers, der innern Haut des Mundes und dem Buccinator, dem Periosteum des Oberkiefers, der Haut, der Maxillalarhöhle, ja der Nasenhöhle selbst Zweige. Ihre Hauptbestimmung ist, entweder allen Zähnen des Oberkiefers, oder wenn die vordern von der Infraorbitalarterie versorgt werden, doch den Backenzähnen Blut zuzuführen, zu welchem Zweck der Hauptast von ihr, (*Ramus dentalis*.) durch das Alveolarloch, (oder sich vertheilend durch die Alveolarlöcher

Oberkiefers in diesen Knochen eingeht, und eben so wie die untere Maxillalarterie besondere Zweige an die Zähne abgibt.

Die Infraorbital- oder Unteräugenhöhlenarterie, (*A. infraorbitalis*), ist einer der letzten Äste, in welche sich die innere Maxillalarterieerspaltet, wenn sie bis zu dem obern Theil der Sphenomaxillaris- oder der untern Fissur der Augenhöhle gekommen ist. Ehe die innere Maxillalarterie dahin gelangt, gibt sie noch zuweilen kleine Zweige an die Eustachische Röhre, an den circumflexen Muskel des Gaumens, an den Levator des weichen Gaumens und an die pterygischen Muskeln, so wie auch mit dem dritten Aste des fünften Paares zur harten Hirnhaut und zum cavernösen Sinus aufsteigende Zweige.

Die Infraorbitalarterie selbst entspringt zuweilen mit der vorigen aus einem gemeinschaftlichen Stamm, und hat ihren Namen daher, weil sie durch einen eigenen in dem Oberkiefer unter der Augenhöhle hinten nach vorn sich erstreckenden Canal ihren Verlauf hat. Wenn sie in denselben eingeht, gibt sie noch Zweige zur Periorbita und zum Fett der Augenhöhle, wie auch zur Thränendrüse, ingleichen zuweilen einen kleinen Zweig, der am zweiten Aste des fünften Nerven laufend, zur harten Hirnhaut gelangt; in dem Canal selbst gibt sie Zweige für den Orbicularmuskel der Augenlider, für den untern Augenmuskel, für den Thränensack, selbst für die Nasenhöhle und für den Ethmoidalzellen, die mit Zweigen der ophthalmischen Arterie anastomosiren. Bisweilen gelangt einer ihrer Zweige, durch einen besonderen Knochencanal, zum Levator der Oberlippe und zum Orbicularmuskel des Mundes, bisweilen ein anderer durch ein Loch des Backenknochens zum Temporalmuskel; bisweilen geht ein ansehnlicher Ast durch einen eigenen Knochencanal zu den Vorderzähnen; oft gehen auch sämtliche Vorderzähne, ganz oder zum Theil, ja wohl auch die vordern Backenzähne mit von ihr versorgt. Auch in den Maxillarsinus steigen kleine Zweige hinab. Bisweilen ersetzen ihre in die Orbita gelangenden Zweige fast die Lacrymalarterie.

Wenn sie durch das Infraorbitalloch in das Gesicht getreten ist, vertheilt sie sich in den zygomatischen Muskeln, den Levatoren des Mundwinkels und der Oberlippe, in dem Buccinator, dem untern Nasenmuskel der Nase, dem Orbicularmuskel der Augenlider, dem untern Lippenmuskel, dem Thränensack und dem Zahnfleisch der Schneidezähne und des Eckzahns, indem sie hier überall mit den mehreren früher genannten arteriösen Endigungen anderer Stämme nebartig sich verbindet.

Die pterygopalatinische oder obere Gaumenarterie, (*A. pterygopalatina*, s. *palatina descendens*, s. *superior*), ist die zweite Ast, in welchen sich die innere Maxillalarterie in der sphenomaxillaris- oder pterygopalatinischen Fissur theilt. Sie geht von hier aus durch den großen pterygopalatinischen Canal, und einer oder zwei Nebenäste durch die beiden kleinern pterygopalatinischen Canäle, schräg vorwärts. Oft sind gleich vom Anfang zwei oder auch drei pterygopalatinische Arterien vorhanden, wovon aber immer eine ansehnlicher ist. Alle diese Zweige oder auch Arterien verbreiten sich in den hintersten Theil des harten und weichen Gaumens, und haben mit der aufsteigenden palatinischen Arterie aus der äußern Maxillalarterie durch Ana-



stomosen Gemeinschaft. Besonders entspringt noch aus dieser Arterie oder der größern derselben

a) die vordere palatinische oder Gaumenarterie, (*palatina antica*.) welche in der Gaumenhaut unter dem knöchernen Gaumen vorwärts geht, mit der gleichen der entgegengesetzten Seite ein Bogen bildet, aus welchem ein Ast durch das vordere palatinische Loch und von diesem aus, durch die nasopalatinischen Canäle in zwei Aeste getheilt, in die Nasenhöhle zu den beiden untern Muscheln gelangt und in der Nasenhaut sich vertheilt; von dem vordern Stamme gehen Zweige in die Maxillarkhöhle hinab;

ß) die pterygoideische oder Oberschlundkopfarterie (*A. pterygoidea*, s. *pharyngea suprema*, s. *Vidiana*.) die indessen sehr häufig auch unmittelbar aus der innern Maxillararterie kommt oder auch ein Zweig der vorigen ist. Diese kleine Arterie geht durch den pterygoideischen oder Vidianischen Canal des Sphenoidalknochens rückwärts zu den Muskeln des Gaumenvorhanges und zum obersten Theile des Pharynx, wo sie sich, wie auch in der Substanz des Sphenoidalknochens in der Gegend des Sattels, in den Knorpel zwischen der Pyramide und dem Basilartheil des Occipitalknochens verbreitet, mit Verzweigungen der innern Carotis oder der aufsteigenden pharyngeischen Arterie, oder der meningeischen Arterie zum Facialisnerven anastomosirt.

1) Die sphenopalatinische, oder hintere Ethmoidalarterie, (*A. sphenopalatina*, s. *nasalis posterior*.) ist der dritte und letzte Hauptast, in welche sich die innere Maxillararterie in die sphenopalatinischen Fissur theilt, indem von hier aus nur noch ein horizontal laufende hintere und obere Arterien in die Nasenhöhle laufen, mit denen sich dieselbe endigt. Sie ist jedoch zuweilen auch doppelt oder dreifach. Sie geht, ihrem Nahmen entsprechend, durch das sphenopalatinische Loch des Gaumienknochens, oder getheilt durch die doppelte vorhandene, in die Nasenhöhle, wo sie die stärkste Arterie der Nasenscheidewand bildet, und sich in die hintern Ethmoidalzellen, in die Sphenoidalkhöhle, in den mittlern, auch wohl den untern Nasengang, in die obere und untere Muschel in der Maxillarkhöhle, auch wohl in den Pharynx verbreitet, und mit der vorderen und hinteren Ethmoidalarterie von der ophthalmischen Arterie und der Infraorbitalarterie Anastomosen eingeht.

B) Innere, oder Cerebral- oder Hirncarotis, (*Carotis interna*, s. *cerebralis*.) Dieser zweite Hauptast des gemeinschaftlichen Carotidenstammes, der unter die constantesten Bildungen des Körpers gehört, (obgleich man ihn auch wenigstens auf Einer Seite ganz ermangelnd gefunden hat<sup>27</sup>.) geht in der Gegend des thyreoidischen Knorpels des Larynx von der äußern Carotis ab, und ist gewöhnlich etwas kleiner als diese, ehe sie die thyreoidische Arterie abgegeben hat. Sie steigt hinter der äußern Carotis, Anfangs etwas auswärts sich wendend, sodann mit nur weniger Neigung einwärts ziemlich senkrecht am Hals herauf, und gelangt so hinter dem styloideischen Proceß zu dem ihr bestimmten und nach ihr benannten can

27) S. Lode's mediz. Abh. 10. B. S. 401.



den Canal im petrosen Theile des Schläfelenknochens oder der sogenannten Pyramide.

Gewöhnlich gibt sie auf diesem ganzen Verlauf keine Aeste ab und ist also bloß, dem Gehirn und den damit in näherem Bezug stehenden Organen des Kopfs Blut zuzuführen. Doch führt Haller<sup>228</sup> einen Fall an, wo die Occipitalarterie, und einen andern, wo eine aufsteigende Pharynxarterie daraus entsprang; auch Mayer<sup>29</sup> beschreibt einen kleinen Ast, der noch außerhalb der Höhle der Hirnschädelkapsel von ihr an die Eustachische Röhre, die Gaumenmuskeln und den hintersten Theil des Pharynx ging. Sie wird auf diesem Wege mit einem vom ersten Cervicalganglion des sympathischen Nerven umgebenen.

Während ihres Eintritts und Ueberganges in die Hirnschädelhöhle geht sie auf eine merkwürdige Weise schlangenförmige Krümmungen und Windungen, die am verständlichsten auf folgende vier zurückgeführt werden können<sup>30</sup>.

Die erste Krümmung macht sie vor dem Eintritt in den Canal. Sie ist bei erwachsenen Personen weniger bemerklich als bei jüngern Subjecten, wo sie nicht leicht fehlt, obgleich bedeutend variiert; im Allgemeinen bengt sich hier die Arterie vorwärts und steigt dann aufwärts, wobei sie sich zugleich mehr oder minder windet. Diese Krümmung erscheint bei Ausprägung der Gefäße etwas stärker, als sie in der Natur ist, und verschwindet, wenn man das um die Arterie herliegende und sie spannende Zellgewebe ablöst.

Die zweite Krümmung ist die, welche die Arterie im carotischen Canal selbst macht, und die der Aushöhlung dieses Canals entspricht. Sie tritt in die untere und äußere Oeffnung desselben in perpendiculärer Richtung ein, und biegt sich hier rechtwinklig vorwärts und schräg einwärts, wodurch sie an dessen innere und vordere Oeffnung gelangt.

Die dritte Krümmung ist die, welche die Arterie bei ihrem Austritt aus dem carotischen, in ihrem Durchgang durch den cavernösen Sinus macht. Der vordere innere Ausgang des carotischen Canals ist nämlich so gebildet, daß nur der untere Theil gewöhnlich aus Knochenmasse gebildet, der obere Theil aber von der darüber sich erstreckenden harten Hirnhaut geschlossen ist, welche auch wohl durch ein eigenes Knochenblättchen bewirkt. Von hier aus steigt die Arterie in der von dem Seitentheile des Körpers des Sphenoidalschädels gebildeten, als carotische Grube bekannten Vertiefung, neben dem hintern clinoidischen Proceß ihrer Seite schräg aufwärts in den von der harten Hirnhaut gebildeten cavernösen und mit venösem vom Gehirn zurückgeleiteten Blute gefüllten Sinus, krümmt sich hier, wo sie zugleich von diesem Blut umflossen wird, wieder vorwärts, und zwischen dem mittlern und vordern clinoidischen Proceß, oder durch das hier sich zuweilen wieder aufwärts vorfindende Loch. Fehlen dem mittlern clinoidischen Proceß, so krümmt sie sich in dem cavernösen Sinus nur einmal aufwärts.

B) elem. physiol. T. IV. 1. 10. S. 5. §. 7. 29) Besch. d. Blutgef. 2. Aufl. S. 92. 30) Eine instructive Abbildung derselb. s. in Mayer's Besch. d. Blutgef. 2. Taf. Fig. 2. t. Comper beschrieb sie zuerst (phil. transact. Nr. 280) mit Genauigkeit.

Die vierte Krümmung macht sie endlich, indem sie in ihrem Austritt aus dem cavernösen Sinus, und ihrem Aufwärtssteigen sich um den mittlern cliuoidischen Proceß zugleich rückwärts schlägt, die innere Lamelle der harten Hirnhaut durchdringt, so daß sie hinter dem optischen Loch die Basis der Hirnhöhle selbst erreicht.

Die erste und zweite Biegung, die sie bei ihrem Eintritt in den carotischen Canal und ihrem Austritt aus demselben macht, ist fast rechtwinklicht, die dritte in dem cavernösen Sinus kann im allgemeinen einem stumpfen Winkel, die beim Eintritt in die Gehirnhöhle selbst aber einem spitzen Winkel gleich geachtet werden.

Es scheint, daß die Natur durch diese Einrichtung habe bewirken wollen, daß der Antrieb des Bluts nach dem Gehirn bei jedem Pulschlage in etwas gebrochen werde, und nun auf denjenigen Grad gebracht sei, der der feinem Organisation des Gehirns entspricht. Es ist dieß dadurch wahrscheinlich, weil auch die Vertebralarterien, welche dem Gehirn hinterwärts aus der Subclavicularterie Blut zuführen, auf gleiche Weise sich krümmen, ehe sie zum Gehirn gelangen.

Bei mehreren Thieren, bei Hunden, beim Rindvieh, bei Schafen, Schweinen, Fischen, Katzen u. s. w., findet sich der eigne Bau der innern Carotis, daß sie innerhalb des cavernösen Sinus in eine Menge kleiner Zweige sich zertheilt, die nebartig sich wieder verbinden und mit, wiewohl wenigeren, kleinen Venen, welche Zweige der Jugularvene sind, wie auch kleinen Nerven durchflochten sind, auch auf beiden Seiten mit einander in Verbindung stehen, aus welchen kleinen arteriösen Verzweigungen dann wieder ein neuer Stamm zusammentritt, der durch die innere Lamelle der harten Hirnhaut in die Gehirnhöhle gelangt. Die ältesten Anatomen schrieben diesen selbst nicht allen vierfüßigen Thieren zukommenden<sup>31</sup> Bau, der den Namen des wunderbaren Netzes, (*Rete mirabile*), erhalten hat, auch dem Menschen bei, welchen Irrthum jedoch schon *Verme-garius*<sup>32</sup> berichtigte.

Innerhalb des carotischen Canals ist die Carotis von einer äußern Membran umkleidet, die mit dem Knochen selbst fest verbunden ist und eine Verbreitung der harten Hirnhaut zu seyn scheint. Sie gehört mehr dem Canal als der Carotis an, und ist als das Periosteum des ersten zu betrachten.

In demselben Canal sendet die Carotis einen Zweig ab, der mit einem Faden vom zweiten Aste des fünften Nerven in dem pterygoideischen Canal vorwärts läuft, und mit einem Zweig der innern Maxillararterie anastomosirt. Ein anderer Zweig verbreitet sich von da aus in dem Tympanum an das Promontorium, und anastomosirt mit Zweigen von der meningeischen Arterie.

Innerhalb des cavernösen Sinus gibt sie mehrere kleine Arterien für denselben, (*Arteriae sinus cavernosi*, s. *receptaculi*.)

31) den Pferden, Elephanten, dem Biber u. s. w. geht er ab. Auch bei Vögeln findet er sich nicht. Doch werden bei Pferden und andern Thieren dagegen die Gehlencarotiden von beiden Seiten nach ihrem Eintritt in die Hirnschale, aber ehe sie noch die harte Hirnhaut durchdrungen haben, in einen einzigen Stamm vereiniget, dessen beide Äste dann erst zur Basis des Gehirns gelangen. 32) commentar. in Mundini anat. p. 432. u. isag. p. 67.



von man besonders eine hintere, (posterior,) und eine vordere, (anterior,) unterscheidet. (S. Gehirnarterien.) Auch dringt bis zu den von hier aus ein ansehnlicher Zweig durch die Sphenoidalfissur in die Augenhöhle und verbreitet sich hier in die Periorbita und das Orbita.

Wichtiger ist die ophthalmische oder Augenarterie, (Arteria ophthalmica,) welche die Gehirncarotis, unmittelbar nachdem sie ihre letzte Krümmung gemacht hat und in die Gehirnhöhle selbst gelangt ist, als die Hauptarterie, welche das Auge empfangt, abgibt. Die Beschreibung des Verlaufs derselben ist ausführlich unter dem Artikel Augenarterien <sup>33</sup> gegeben worden, und muß also hier überlassen werden, so wie auch die Verfolgung der Gehirncarotis, da diese von der Abgabe der ophthalmischen Arterie an einzig dem Gehirne gewidmet ist, das aber seinen Bedarf an Blut nur etwa die Hälfte durch sie bezieht, dem Artikel Gehirnarterien vorbehalten bleibt <sup>34</sup>. (v.)

33) 1. W. S. 557. 34) Zur Intuitiven Kenntniß der mehrsten Verästelungen der Carotiden, besonders der äußern, sind insbesondere Haller's icon. anat. fasc. 2. 3. u. 7. von großem Werth.

Carotis, (Carotis,) s. Carotiden. — anterior, i. q. Carotis externa. — cerebralis, i. q. C. interna. — communis, s. Carotis interna. — exterior, s. externa, s. facialis, s. unter Carotis, äußere Carotis. — interior, s. interna, s. posterior, s. profunda, s. ebendas. innere Carotis. — superficialis, i. q. C. externa.

Carotische Fossa, oder Rinne <sup>1</sup>, (Carotica fossa <sup>2</sup>), die dem hintern zum vordern carotischen Sulcus reichende Vertiefung an jeder Seitenfläche des Körpers des Sphenoidalknochens, welche die Spur des Laufs der Carotis bezeichnet. S. Sphenoidalknochen.

1) Mayer's Besch. d. menschl. K. 1. B. S. 330. 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 203.

Carotische Lingula, (Carotica lingula <sup>1</sup>), Züngelchen Grundbeine <sup>2</sup>, das an den Seitentheilen des Körpers des Sphenoidalknochens gemeiniglich, und zwar etwas hinterwärts befindliche, nach unten und außen abgehende kleine, gebogene Knochenstück, welches den hintern carotischen Sulcus vorwärts an seinem äußern Rande begrenzt. S. Sphenoidalknochen.

1) Walter's Abhandl. v. den trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 103. 2) Schumacher's Ring's Knochl. S. 131.

Carotische Sulcus am Sphenoidalknochen, (Carotici sulci <sup>1</sup> ossis sphenoidae,) die beiden an den Seitentheilen des Körpers des Sphenoidalknochens bemerkbaren Aushöhlungen, in welchen sich die innere Carotis nach der untern Fläche des Gehirns zu öffnet, und von denen man a) die vordere Furche <sup>2</sup>, oder Auschnitt <sup>3</sup>, (Sulcus caroticus <sup>4</sup> anterior,) neben dem mittlern clipeiformen Proccesse des Sphenoidalknochens nach außen, (nicht selten

1) Schaarschmidt's osteol. Tabell. Taf. 9. 2) Pöcher's anat. Handb. 1. B. S. 63. 3) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 200. 4) Walter's Abh. v. d. trockn. 2. Aufl. S. 102.



aber auch als ein wirkliches Loch,) und b) die hintere, (Sulcus caroticus posterior<sup>1)</sup>) von den hintern Seitentheilen des Körpers und den Occipitalproceßten des Sphenoidalknochens auf jeder Seite gebildet, unterscheidet. S. Sphenoidalknochen.

5) S. ebendaf. S. 103.

**Carotischer Canal**, (Caroticus canalis<sup>1)</sup>) Schlafarteriengang<sup>2</sup>, Halspulsadercanal<sup>3</sup>, Canal<sup>4</sup> oder Kanal der Carotis, Canal für die Schlafpulsader<sup>5</sup>, Knochenkanal der Hauptschlagader<sup>6</sup>, Kanal der Schlafschlagader<sup>7</sup>, der ziemlich weite Knochengang, welcher fast auf der Mitte der untern Fläche des petrosen Stücks der Schläfenothen anhebt, diesen Knochen in einer horizontalen Biegung durchbohrend, an der stumpfen Spitze desselben endet, und zunächst der innern Carotis zum Eingange dient. S. Schläfenothen.

1) Winslow exp. anat. lat. vers. T. I. tr. de oss. rec. §. 260.

2) Walsby's Hdt. Anat. übers. v. Puth, 1. B. S. 89.

3) Walther's Abh. v. d. trock. Knoch. 2. Aufl. S. 76.

4) R. 1. B. S. 312.

5) Sommering's Knochenl. §. 131.

6) Winslow's anat. Abh. übers. Berl. 1733, 1. B. §. 260.

7) Zergliederungskf. Übers. Leipz. 1782, 1. B. S. 59.

8) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. §. 244.

**Carpacus**, Carpeus, Carpius, Carpius a, um, alles, was auf den Carpus nahen Bezug hat und zu ihm gehört. S. Carpus.

**Carpea arteria dorsalis**, f. Dorsalarterie des Carpus.

**Carpeische Ligamente des Metacarpus**, (Carpea ligamenta metacarpi<sup>1)</sup>) Bänder zwischen den Handwurzelbeinen und Mittelhandbeinen<sup>2</sup>, oder der Beine der Mittelhand mit denen der Handwurzel<sup>3</sup>, diejenigen, meistens kurzen, von den Knochen des Carpus aus zu dem obern Ende eines jeden Knochens des Metacarpus gehenden Ligamente, welche diese Knochen zusammenhalten, und je nachdem sie auf der Volar- oder Dorsalfläche der Hand befindlich sind, zu den Volar- oder Dorsalligamenten des Carpus gehören. S. Handligament<sup>4</sup>.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. §. 486.

2) Bänderl. S. 54.

3) Weitbrecht's Synonym. Übers. Straßb. 1779, S. 69.

**Carpeus**, a, um, f. Carpaus, a, um.

**Carpeus arcus**, f. Arterielles Netz der Dorsalfläche des Carpus.

**Carpius**, s. Carpius, a, um, f. Carpaus, a, um.

**Carpius musculus**, f. unter Palmarmuskeln, kurzer Muskel.

**Carpo-metacarpus**, s. metacarpianus musculus minimi digiti, f. Abductor des kleinen Fingers. — — — pollicis, f. Opponirender Muskel des Daumens. — palma-phalangeus musculus pollex, f. unter Flexoren des Daumens, den kurzen Flexor. — palmaris musculus, f. unter Palmarmuskeln, kurzer Muskel. — phalangeus, s. phalangeus auricularis, s. minimi digiti musculus, f. Abductor des kleinen Fingers. — — — musculus pollex, f. unter Abductoren des Daumens, den kurzen Abductor. — — — pollicis, f. Opponirender Muskel des Daumens, auch unter Flexoren des Daumens, den kurzen Flexor. — — — secundus musculus digiti minimi, f. Flexor des kleinen Fingers. — supra phalangeus, s. phalangeus, f. unter Abductoren des Daumens, den kurzen Abductor.

**Carpus**, (*Carpus* <sup>1</sup>), Handwurzel <sup>2</sup>, Vorderhand <sup>3</sup>, Carpiale <sup>4</sup>, Palma <sup>5</sup>, Prima palma, s. Prima palmae pars <sup>6</sup>, Carpa <sup>7</sup>, Rasceta <sup>8</sup>, Rascha <sup>9</sup>, Raseta <sup>10</sup>, Rasetta <sup>11</sup>, Rasseta <sup>12</sup>, Osseta <sup>13</sup>, Ossa Rasete <sup>14</sup>), der aus acht, in zwei Reihen übereinander liegenden, Knochen von ungleicher Gestalt zusammengesetzte, an der Volarseite etwas concave, noch der Dorsalseite aber ein wenig convexer Theil der Hand, ihrer knöchernen Grundlage nach, welche zwischen den Vorderarmknochen und dem Metacarpus oder der Mittelhand befindet, und so den Anfang oder die Wurzel der Hand bildet. *S. Hand*, ingl. Handknochen.

1) nach dem Griechischen Worte *Καρπος* gebildet, als wie Aristoteles (*hist. animal.* 1. 1. c. 15) den Gelenktheil der Hand mit dem Vorderarm benennt. *Riolani comm. de ossib.* c. 24. 2) *Walter's Abhandl. v. den trockn. Knoch.* 2. Aufl. S. 313. 3) *Kulmus anat. Tabellen*, Tab. 2. 4) nach *Besal (de c. h. fabr. 1. 1. c. 25.)* 5) *Vesalii de c. h. fabr. 1. 1. c. 1.* 6) nach *Celsus (de med. 1. 8. c. 1.)* 7 — 14) Aus dem Arabischen ins Lateinische übergetragene, aber veraltete Kunstausdrücke. *S. Vesalii 1. 1. c. Laurentii hist. an. 1. 2. c. 34. Veslingii synt. an. c. c. Blasii Pat. 1677, p. 248. not. et. al.*

*(Cartilaginea cornua ossis hyoidei*, s. unter Hörner des Zungenknochens, die beiden kleinern Hörner. — *pars meatus auditorii*, s. Knorplicher Gehörgang. — *substantia*, s. Knorpelsubstanz. — *trochlea tarsi*, s. Knorpelligament des Calcaneus und scaphoideischen Knochens. — *tunica arteriarum*, s. unter Arterienhäute eigentliche Haut. — *zona tarsi*, s. Knorpelligament des Calcaneus und des scaphoideischen Knochens.

*Cartilagines articulares*, s. Articularknorpel. — *arytenoidae*, s. *arytenoides*, s. Arytenoideische Knorpel. — *brouchiolum*, s. Ringe der Luftröhre. — *costales*, s. *costarum*, s. Rippenknorpel. — *falcatae articulationis genu*, s. Semilunäre Knorpel des Kniegelenks. — *guttales*, s. *gutturinae*, s. *gutturinae*, s. *gutturiformes*, s. Arytenoideische Knorpel. — *intervertebrales*, s. Intervertebralknorpel. — *laryngis*, s. Knorpel des Kehlkopfs. — *lunatae articulationis genu*, s. Semilunäre Knorpel des Kniegelenks. — *nasi*, s. Nasenknorpel. — *palpebrarum*, s. Linsenknorpel. — *semilunares articulationis genu*, s. Semilunäre Knorpel des Kniegelenks.

*(Cartilagineum labrum acetabuli*, s. Knorpelring des Acetabulum. — *ligamentum calcaneo-naviculare*, s. Cartilaginöses Ligament des Calcaneus und des scaphoideischen Knochens. — *ligamentum pectinis femoris*, i. q. Triangulare ligamentum femoris. — *septum narium*, s. Scheidewand der Nase.

*Cartilagineus porus acusticus*, s. Knorplicher Gehörgang.

*(Cartilaginosa ligamenta vertebrae*, i. q. Intervertebralligamenta. — *striga cordis*, s. Vieussenischer Isthmus. — *substantia*, s. Knorpelsubstanz.

*(Cartilaginosa os carpi*, i. q. Lenticulare os carpi. — *os carpi*, s. Kniefscheibe.

*(Cartilago*, s. Knorpel. — *anonyma*, s. *annularis*, s. *anuliformis*, s. Eicoideischer Knorpel. — *auris*, s. Ohrknorpel. — *clypealis*, s. Thyreoideischer Knorpel. — *sterni*, s. Ki-



phoideischer Proceß. — *cordiformis manubrii sterni*, s. Herzförmiger Knorpel des Manubriums des Sternumis. — *cricoidea s. cricoides*, s. Ericoideischer Knorpel. — *centralis, s. ensiculata, s. epiglottalis, s. gladialis sterni*, s. Xiphoideischer Proceß. — *innominata*, s. Ericoideischer Knorpel. — *interarticularis acromii*, i. q. C. interarticularis scapulae. — — *articulationis maxillaris*, s. Interarticularknorpel des Maxillargelenks. — — *carpi*, s. Interarticularknorpel des Carpus. — — *claviculae*, s. Interarticular-Knorpel des Schlüsselknochens, ingleichen des Schulterblatts. — — *scapulae*, s. Interarticularknorpel des Schulterblatts. — *intermedia triangularis carpi, s. extremitatum inferiorum cubiti*, i. q. C. interarticularis carpi. — — *maxillae*, s. Interarticularknorpel des Maxillargelenks. — — *meniscoidea articulationis maxillaris*, s. Interarticularknorpel des Maxillargelenks. — *mucronata sterni*, s. Xiphoideischer Proceß. — *narium media*, s. Scheidewand der Nase. — *parva valvularum aortae et arteriae pulmonalis*, s. Arauzi's Nodulus. — *peltalis, s. peltata, s. quadrilatera, s. scutalis, s. scutiformis*, s. Thyreoideischer Knorpel. — *scutiformis sterni*, s. Xiphoideischer Proceß. — *septi narium*, s. Scheidewand der Nase. — *thyreoidea*, s. Thyreoideischer Knorpel. — *triangularis carpi*, i. q. C. interarticularis carpi. — *uvifera, s. uvigena, s. uvigera*, i. q. Uvula. — *xiphoidea, s. xiphoides sterni*, s. Xiphoideischer Proceß des Sternumis.

*Cartophorus, sc. musculus*, s. Subscapularis.

*Caruncula*, Diminutiv von Caro, s. Carunkel. — *cerebri, s. cerebri manubrii*, i. q. Olfactorius nervus. — *innominata*, s. Thränendrüse. — *inter alas nupliebres*, i. q. Clitoris. — *lacrymalis, s. nervosa oculi*, s. Lacrymalcarunkel. — *nrethrae virilis*, s. Hahnenkamm der männlichen Harnröhre.

*Carunculae cuticulares*, s. Nymphen. — *mucosae pronae inferiores et superiores*, s. Graafische Schleimsäcke u. s. w. — *myrtiformes*, s. Myrthenförmige Carunkeln. — *papillares cordis*, s. unter Fleischbündel der Herzventrikel. — — *renum*, s. Papillen der Nieren. — *vaginae, s. vaginales*, s. Myrthenförmige Carunkeln. — *ynloe cuticulares*, s. Nymphen.

**Carunkel**, (*Caruncula, Carnicula*), diese Benennung wird einzelnen Theilen des Körpers gegeben, die in ihrer äußern Darstellung durch Röthe und Hervorragung den in pathologischen Zuständen sich erzeugenden Fleischwärtzchen gleichen, und in den vorhergehenden Artikeln angedeutet sind. Vgl. Fleisch.

*Caseatio*, s. Käsebildung.

*Caseosa pars lactis*, s. Käfiger Theil der Milch. — *vernix*, s. Käseartiger Hautüberzug des Fötus.

*Cassa, Cassos*, veraltete Benennungen der Arabisten statt Thörax.

*Casserii fontanellae*, — *musculus*, — *nervus*, nach Jul. Casserius, Prof. der Anatomie zu Padua zu Anfang des 17. Jahrhunderts, so benannt. S. unter Fontanellen, hintere Seitenfontanellen, unter Laxatoren des Tympanums, den kleinen Laxator, und Aeufferer Hautnerv des Arms.



Cassos, f. Cassa.

Castimonia, Castimonium. Castitus, Castitudo, f. Keuschheit.

Castrat<sup>1</sup>, (Castratus<sup>2</sup>,) Eunuch, Verschnittener, Ent-  
runter, (Excastratus<sup>3</sup>, Eunuchus<sup>4</sup>, Spado<sup>5</sup>, Semivir<sup>6</sup>,  
Castratus<sup>7</sup>, Seminas<sup>8</sup>, Semimascuatus<sup>9</sup>, Emascuatus<sup>10</sup>,  
Castratus<sup>11</sup>, Exsectus<sup>12</sup>, Extesticulatus<sup>13</sup>, Ectomius<sup>14</sup>.) Im  
gemeinen Sinne, ein durch Beraubung oder Zerstörung der zur  
Fortpflanzung unumgänglich nöthigen Geschlechtsorgane, zur Zeugung  
unfähig gewordener Mann, oder auch auf gleiche Weise dazu un-  
fähig gewordenes männliches Thier.

Es ist irgend wodurch der innige Zusammenhang der körperlichen und  
geistigen Natur, ja ihr eigentliches Zusammenfallen evident darge-  
legt; so ist es in der Einwirkung, welche die natürliche Entwicklung  
der Zeugungskräfte, ingleichen die Erhaltung der Integrität der phy-  
sikalischen Geschlechtsfunction, auf das allgemeine geistige Leben männ-  
licher Individuen haben. Es ist andern Artikeln vorbehalten, zu zei-  
gen, von welchen nachtheiligen Folgen für den Gesamtorganismus  
die frühzeitige und vorzeitige Anstrengungen der Zeugungskräfte beglei-  
tet sind; hier ist es dagegen der Ort, die Einflüsse zu berühren, die  
in zufälliger oder absichtlicher Zerstörung der Zeugungsorgane zunächst  
in männlichen Körpern auf das ganze organische Leben hat.

Bekanntlich bewirkt die in unsern Climates um das 14te Jahr  
tretende Samenabsonderung und die gleichzeitige Entwicklung der  
Geschlechtsorgane, in dem ganzen Körper und dem ganzen Wesen ei-  
ner Knaben diejenigen bekannten Veränderungen, die man unter dem  
Namen Geschlechtsreife, oder Pubertät begreift. Unter ihnen zeich-  
nen sich die Veränderung der Stimme, die aus dem weichen klaren  
Ton, der die Rede der Kinder bezeichnet, in eine tiefe gröbere, die  
männliche Sprache charakterisirt, übergeht, und der Ausbruch des  
Mannes aus, der jedoch erst mehrere Jahre später seine Vollendung er-  
reicht. Gleichzeitig ändern sich die Neigungen und der ganze Cha-  
rakter des in das Jünglingsalter tretenden Knaben. Das Leben geht  
nun an mehr aus sich selbst, und strebt nach außen; der vor-  
her alles egoistisch bloß auf sich selbst reflectirende Knabe fühlt sich in  
der Selbstständigkeit; mit dem beginnenden Muthe erweitert er sich  
in seine Wirkungskphäre, nicht um aus weitem Umgebungen mehr  
Material für eigne Befriedigung zu erhalten, sondern um in ihr seine

1) Mayer's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 145. 2) Curtii de reb.  
Alex. m. l. 6. c. 3. Das Wort Castrare wird von Castor, Viber, abgeleitet:  
equasi castorare, nach der Sage der Alten, daß der Viber sich selbst die Testikeln  
abbiß, um der Nachstellung der Menschen zu entgehen, indem er besonders des  
Vibergells oder seiner vermeintlichen Samenfeuchtigkeit wegen gefangen wurde.  
Juvenal. sat. 12. v. 34 — 36:

„imitatus Castora, qui se

Eunuchum ipse facit, cupiens evadere damno

Testiculorum; adeo medicatum intelligit inguen.”

3) Gellii noct. Att. 1 9. c. 9. 4) Terentii Eunuchus. Vgl. dieß  
Wort. 5) Plinii hist. m. l. 11. c. 49. Vgl. auch dieß Wort. 6)  
Martialis epigr. l. 9. ep. 21. 7) Hebenstreit anthropol. forens  
Lips. 1751, p. 613. 8) Ovid. fast. l. 1. v. 586. 9) Fulgen-  
tius mythol. l. 3. c. 5. 10 — 13) Alberti syst. jurispr. med. T. 1.  
pp. 40. 14) P. Zachiae quaest. med. leg. l. 2. r. 4. qu. 7. II. 36.

frei gewordenen Kräfte zu üben. Alles Gute, Große und Schöne in dem Mannesleben faßt nun erst sichern und festen Boden, und wurzelt in dem sich entwickelnden Geschlechtsleben.

Diese Saat aber ist in ihrem Keime zerstört, wenn die normale Samenabsonderung in der Periode der Geschlechtsreife durch Vernichtung der dazu bestimmten Organe gehemmt ist oder gestört wird. Jedoch sind die Folgen etwas minder beeinträchtigend, wenn die Zerstörung und Hemmung erst nach jener Periode eintritt, wo dann dem Körper die Vortheile derselben doch früherhin zu Gute gingen und ihm wenigstens zum Theil erhalten bleiben.

Es würde von diesen Folgen der Entmannung bloß als einer pathologischen Erscheinung die Rede seyn, wenn sie lediglich als Begleiter von Unfällen eintreten, durch die die Zeugungsorgane eine Zerstörung erlitten. Aber unter die mehrern willkürlichen Handlungen, die von der einen Seite durchaus unnatürlich erscheinen, wenn man den Menschen bloß von seiner Lichtseite als Vernunftwesen, nach seiner Anlage und Bestimmung zur Humanität betrachtet, wo der andern aber den Menschen auch in seiner Schattenseite darstellen indem sie ihn, in seiner durch Verstand bloß potenzierten Thiernatur charakterisiren, gehört auch das gesessentliche Versümmeln von Mitmenschen während der Periode ihrer jugendlichen Entwicklung, um während diese selbst der höchsten und schönsten Blüthe ihres Lebens verlustig zu werden, sie im erwachsenen Alter zu Zwecken zu benutzen, die nur unter Hemmung der freien Entfaltung der menschlichen Natur erreichbar sind.

Die unter den orientalischen Völkern der ältern und neuern Zeit verbreitete Polygamie führte nothwendig zu einem erhöhtern Mißtrauen des männlichen Geschlechts in die weibliche Treue; daher die in jenen Welttheilen verbreitete Sitte der Absonderung und Trennung des weiblichen Geschlechts von dem männlichen in dem Lebensumgange und daher auch das den Mächtigen und Begüterten unter ihnen nahegelegte Bedürfniß von Keuschheitshütern, die selbst physisch nicht der Argwohn und die Eifersucht aufzuregen geeignet waren.

Die älteste Geschichte kennt bereits Eunuchen, welches Wort insbesondere den zu Sclavendiensten, wobei männliches Vermögen Mißtrauen erregen könnte, bestimmten und um deswillen ihrer köstlichsten Naturgabe beraubten Verschnittenen beigelegt wird. Ältere Schriftsteller<sup>15</sup> beschuldigen die babylonische Königin Semiramis sich dieses Verbrechens gegen die Menschheit zuerst schuldig gemacht zu haben. Aus dem Orient kam der Gebrauch nach Rom. Die Geschichte kennt mehrere Eunuchen, die durch ihre Anhänglichkeit und Treue, unterstützt von den Hülfsmitteln, durch die es kleinen Seelen nicht selten gelingt, an kräftigere Naturen sich anzuranken und so selbst aus dem Staube sich zu erheben, aus Sclaven ihrer Gebieter ihre Günstlinge wurden, und so eine ihnen geliebte Bedeutung im öffentlichen Leben erhielten. Noch jetzt ist im Orient die Sitte der Großen, eine Menge Verschnittene in ihrem Dienste, besonders zur Bewahrung und zur Bedienung des Harems zu haben, allgemein. Die Vorsicht der Orientalen begnügt sich nicht damit, den Dienst im Harem Verschnittenen anzuvertrauen, denen die zur Erzeugung und Bereitung der

15) Ammian. Marcellin. hist. l. 14, Justin. brev. hist. l. 1. c. 3.



nenfeuchtigkeit dienenden Organe entzogen oder desorganisirt sind, wenn ein vollkommener Verschnittener muß auch aller äußern Anzeigung seiner Mannheit, oder aller äußern Geschlechtstheile entzogen, da die Erfahrung lehrt, daß im erstern Falle der Rückstand (Geschlechtsandeutung immer noch einiger Aufregung fähig bleibt wenigstens einigen Schein eines männlichen Vermögens besitzt. Gefahr aber, der diejenigen, die durch vollständige Amputation der äußern Geschlechtstheile zu Verschnittenen gemacht werden, oder der Operation ausgesetzt sind, macht, daß, wie Tavernier erzählt, diese vollständig Verschnittenen in Persien und in der Türkei fünf bis sechs Mal so viel kosten, als die auf gewöhnliche Art Verschnittenen, indem man annimmt, daß von jungen Leuten, an denen die Operation auf diese Art unternommen wird, kaum  $\frac{1}{4}$  am Leben bleibt, und die Behandlung der Wunde wenigstens 6 Wochen dauert, auch von Knaben zwischen 7 — 10 Jahren, welches Alter am günstigsten ist, ein ansehnlicher Theil stirbt. Nach Moyné<sup>16</sup> kommen von hundert, die in der bemerkten Art verschnitten werden, oft nicht funfzig mit dem Leben davon. Daß die Lebensgefahr bei dieser Operation aber hauptsächlich von dem Verfahren und andern Nebenumständen abhängt, erhellt unter anderm aus einem Bericht von Píedro della Valle, wornach in Persien, die Amputation der männlichen Geschlechtstheile eine gewöhnliche Strafe der Nothzucht, des Ehebruchs und ähnlicher Verbrechen ist, diese Operation nicht leicht einen bösen Ausgang zur Folge hat, obgleich die ganze Heilung sich fast nur auf Aufstreuen von Asche auf die Wunde beschränkt<sup>17</sup>.

Besonders sind die schwarzen Verschnittenen in der Türkei und Persien u. s. w. solche schmähtlich verstümmelte Halbmenschen. Noch finden man aber in jenen Ländern eine Menge anderer, die größtentheils dem Königreich Golconda, aus der Halbinsel diesseit des Ganges, aus den Königreichen Assan, Arakan, Pegu und Malabar dargebracht werden, deren Farbe grau ist, oder vom Bengalischen verbusen von olivenfarbigem Aussehen; nur wenige von weißer Farbe stammen aus Georgien und Circassien her. Als Tavernier (im Jahr 1657) sich im Königreich Golconda aufhielt, wurden an 22,000 Menschen daselbst so schändlich gemißbraucht. Die Schwarzen aber kamen besonders aus Aethiopien. Sie werden um so mehr gesuchet, je häßlicher ihr Aussehen ist. Man schätzt an ihnen besonders eine sehr breite Nase, einen wilden Blick, große und dicke Lippen, schwarze und weit aus einander stehende Zähne.

Außer dem erwähnten gewöhnlichsten und am allgemeinsten verbreiteten Zweck der absichtlichen Vernichtung des menschlichen Zeugungsvermögens gibt es aber auch noch andere, die zu diesem partiellen Zweck an sich und an andern verleiteten. Unter diesen verdient der Inatismus die nächste Bemerkung. Die Priester der Cybele in der ältesten Zeit übten diese Grausamkeit an sich aus, um ihrer Götterwürdig zu dienen, und die Kaiser Constantin und Justinian

<sup>16</sup>) Voyage T. I. ch. 10.

Uebers. Berl. 1773, S. 82.

<sup>17</sup>) Vgl. Buffon's allg. Naturgesch. 3. Th.



mußten ihr ganzes Ansehn anwenden, um dieser Selbstverstümmelung Einhalt zu thun, indem sie dieß Vergehen gesetzlich einem willichen Mord gleich stellten. Eine mißverständne Stelle der Bibel verleitete eine eigne Secte des dritten Jahrhunderts, die Valesianer zum Wahn, sich selbst und jeden, dessen sie nur durch Gewalt oder List sich ermächtigen konnten, nach dem Vorgang des Origene durch die Beraubung des männlichen Vermögens des Himmelreichs zu versichern<sup>19</sup>.

Auch Rache suchte und fand in einzelnen Fällen ihr Ziel der Befriedigung in Entmannung eines überwältigten oder überlisteten Feindes, zumal wenn dieser eben durch die Organe, die der Rache Opfer wurden, diese selbst aufgereizt hatte. Wer kennt nicht Abelard's unglückliches Geschick? Wie häufig nahm schon verschmähte weibliche Liebe in wilder Aufregung heimtückisch sich diese Selbststrafe an männlicher Untreue?

Nach dem barbarischen Grundsatz der criminellen Gesetzgebung vieler Nationen, ein Verbrechen durch den Theil des Körpers abzuwaschen, durch welchen es verübt wurde<sup>20</sup>, war auch schon bei den Aegyptiern die Entmannung eine gewöhnliche Strafe der Nothzucht und ähnlicher Verbrechen<sup>21</sup>, und nach Piedro della Valle besteht aus dieser Gebrauch noch in Persien, und wird häufig in Anwendung gebracht.

Auch die Unwissenheit und der Mißbrauch derselben von Chaulatanen brachte häufig Menschen in ihren Kinderjahren um die zur Fortpflanzung ihres Geschlechts wesentlichen Organe. Frank hat in neuerer Zeit<sup>22</sup> insbesondere das Unheil aufgedeckt, das im Land herumziehende sogenannte Bruchschneider dadurch brachten, daß sie um Brüche bei Kindern radical zu heilen, ja wohl gar ihnen vorzubeugen, denselben zuweilen Einen, oft aber auch beide Hoden ausschneitten. Die weitere Ausführung dieses Gegenstandes gehört nicht hierher.

Noch kann die Verzeiſlung als eine zufällige Veranlassung angeführt werden, die durch Entmannung der Kinder zugleich der Bevölkerung Eintrag that. Es ist von den Hottentotten bekannt, daß, indem sie Zwillinge in einer Familie für das größte Unglück ansehen und wännen, daß Zeugung mit zwei Hoden dieselben veranlassen, den Knaben um das 9te oder 10te Jahr den linken Hoden ausschneiden<sup>23</sup>. Nach andern soll dieß jedoch geschehen, das Laufen dadurch zu erleichtern. In andern Ländern verstümmeln die Armen ihre Kinder absichtlich, um ihre Nachkommenschaft auszurotten, damit diese ihre Kinder nicht einst in eben so großes Elend gerathen, wenn ihnen für sich und die Ihrigen das nothdürftige Brod ermangelt<sup>24</sup>.

18) Matth. 19. Cap. 12. V. „denn es sind etliche verschnitten, (ευνουχον,) die sind aus Mutterleibe also geboren, und sind etliche verschnitten, die von Menschen verschnitten sind, und sind etliche verschnitten, die sich selbst verschnitten haben, um des Himmelreichs willen. Wer es fassen mag, der fasse es.“ 19) Eb. fñhren um desswillen in der Kirchengeschichte den Namen Eunuchi. E. Epiph. haeres. 58. 20) „Per quod quis peccat, per idem puniatur et item.“ 21) nach Diodorus Siculus Bericht. 22) S. des sen Syst. ein. medic. Politz. 1. B. 2. Abth. 4. Abschn. §. 8. 23) S. Frank's med. Politz. a. a. O. 2. Aufl. S. 413. Note. 24) S. Buffon's allgem. Naturgesch. a. a. O. S. 81.

in cultivirten Europa ist die Entmannung, (außer in chirurgischen Fällen, wo sie wie die Amputation anderer Theile nicht selten ein zu großes kleineres Uebel bleibt,) nur noch als ein Auswuchs der Hybris üblich, um, wie namentlich in Italien, starke und kräftige Stimmen einer männlichen Kehle für den Sopran zu bilden. Man bezeichnet in der gewählten Lebenssprache das Wort Castrat eigentlich die auf diese Weise gewordenen Kunstsänger, wogegen man bei den Orientalen gewöhnlich Eunuchen, die nach der Art um eines chirurgischen Zwecks willen Entmanneten aber Castraten nennt.

Das Italienische Wort *Castrato* findet auch in gebildeten und feinen Kreisen keinen Anstoß, da hingegen die Delicatesse der Franzosen den freien Gebrauch seines Synonyms im Französischen nicht für erlaubt erachtet<sup>25</sup>.

Die Castration um des musikalischen Kunstzwecks willen wird in Italien von besondern Leuten unternommen, die nicht Wundärzte sind, die in dieser Operation zum Theil besondern Ruf haben, so daß mehrere, wenigstens ehemals, sogar zu Neapel öffentliche Schilder der Aufschrift führten: „hier werden Knaben wohlfeil castrit“<sup>26</sup>. Der Verfasser des Faustins oder des philosophischen Jahrhunderts berichtet, daß jährlich im Durchschnitt mehr als 4000 Knaben in Italien, besonders im Kirchenstaat, die Castration erleiden.

Obgleich wohl die absichtliche Castriren der Kinder zu dem Zweck, sie einmal mit ihrer Stimme Geld verdienen mögen, nach römischem Rechte als ein Vergehen betrachtet. Der Papst Clemens XIV. untersagte es bei Strafe des Kirchenbannes. Auch während der neuern Besiznahme der Franzosen von Italien war das Verbrechen der Knaben durch den Code pénal bei harter Strafe untersagt. Gleichwohl wimmelt Rom und alle große Städte Italiens von Castraten. Sie singen zur Messe, wie in der Oper und den Concerten, und wie sehr auch die öffentliche Meinung sich gegen diese Kunst gebrachten Menschenopfer erklärt hat<sup>27</sup>, so findet das feine Ohr eines Musikkenners aller Orten doch eine wohlausgeglichene Castratenstimme an Kraft und Klarheit weder durch die natürliche Stimme eines Chorknaben, noch durch die einer Kunstsängerin ersetzt, und so lange dieß Kunstbedürfniß dauert, und gute Castratenstimmen sich so in dem Werth erhalten, den sie gegenwärtig in alleuropäischen Hauptstädten behaupten, so lange wird auch die Stimme der Humanität und der Natur, selbst durch die Macht des religiösen Aberglaubens unterstützt, doch durch die Lockungen des Eigennutzes und des Strebens nach künstlerischem Ruhm übertäubt werden.

Charré: Das Wort *Castrat* ist ein neu gebildetes technisches Wort, und eigentlich der Sprache fremd. *Encycl. fr. T. VI. mot castrato.* 26) Walz: *Anger's Magaz. f. Verite, 2. St. S. 752.* 27) Nichts kann für das Urtheil eines Menschen von natürlichem Gefühl wahrer seyn, als was der Verf. des Artikels *Castrato* in der *Encyclop. franc.* hierüber sagt: „Quelle horrible cruauté, de mutiler nos semblables, pour répandre dans les temples et sur des théâtres quelques voix de fausset, qui ne pouvoient plaire, qu'à un gout dépravé! L'amour exprimé en public par de misérables êtres incapables de le sentir, n'étoit plus qu'une farce ridicule et sans ame; les hymnes chantées par les malheureuses victimes, à qui l'avarice a ravi les dons les plus précieux de la Providence, ne peuvent plaire au Dieu, bienfaiteur et reproducteur de la nature humaine.“



Dieser eigene Zusammenhang der geheimniten Entwicklung des Geschlechtslebens bei Castraten, und der Erhöhung und Ausbildung der Discantstimme des Knabenalters zu der bekannten Castratenstimme zieht mit Recht die besondere Aufmerksamkeit des Physiologen auf sich.

Was Haller nur vermuthete<sup>28</sup>, fand Dupuytren in der Zergliederung eines Menschen, dessen Zeugungstheile in der frühesten Jugend verstümmelt worden waren, bestätigt. Der Larynx hatte nur ein Drittel des Umfangs, den er gewöhnlich besitzt, die Stimmrinne war weit schmäler als gewöhnlich und die Knorpel des Larynx waren nur wenig entwickelt<sup>29</sup>. Da die höhere Stimme zunächst von der engeren Stimmrinne und der Kürze und stärkern Spannung der Ligamente derselben herrührt; so behält der Castrat, da zu Folge des eigenen sympathischen Verhältnisses, das zwischen den Organen der Stimme und den Geschlechtsorganen obwaltet, der Larynx mit den rückständig gebliebenen Geschlechtstheilen unentwickelt bleibt, auch im Gesang, wie im Sprechen, die Stimme des Knaben, die, wegen der gleichwohl fortgehenden Entwicklung der Brusthöhle, der Mund- und Nasenhöhle, dann diejenige Kraft und Stärke erlangt, durch welche sich die Castratenstimme vor der Knabenstimme auszeichnet. (Vgl. Stimme und Singen.)

Die körperlichen und geistigen Eigenheiten eines Castraten können überhaupt auf folgende Momente zurückgebracht werden:

1) Die Geschlechtstheile, die nicht weggenommen werden, bleiben ziemlich in demselben unentwickelten Zustand, wie sie bei der Castration waren; ein im siebenten Jahre Castrirter ist in dieser Hinsicht im zwanzigsten Jahre noch eben so gebildet wie damals. Wenn dagegen die Operation erst zur Zeit der Pubertät, oder ein wenig später unternommen wurde, sind jene Theile fast auch wie bei andern Männern entwickelt.

2) Ein durch völlige Zerstörung oder Wegnahme der Hoden Castrirter ist zur Fortpflanzung seines Geschlechts durchaus unfähig; indessen ist er doch nicht ohne alle Geschlechtsanregung, die sich wohl auch in wirklichen Erectionen äußert, die bei versuchtem Weisclaf, ja selbst durch die Macht der Phantasie, wohl auch einen Abgang von lymphatischer Feuchtigkeits, welche besonders die Prostata absondert, obgleich, aus Mangel an Samen bereitender Organe, keinen Samen-erguß zur Folge haben<sup>30</sup>. Die bei ältern Schriftstellern bemerkten Fälle von Zeugungsfähigkeit von Eunuchen<sup>31</sup> sind von der Art, wobei nur unvollkommener Castration ein Theil des Hodens oberwärts zurückgeblieben, oder der Hoden selbst nicht ausgeschnitten, sondern bloß, aber unvollkommen, desorganisirt war<sup>32</sup>. Man hat die Frage

28) G. elem. physiol. T. VII. l. 27. s. 3. §. 3. - 29) G. Alibert nouv. élém. de thérapie, T. II. 2. éd. p. 549.

30) Daher die Fügellösung der Römischen Frauen auch wohl auf Eunuchen gerichtet war, nach Juvenal (sat. 6. v. 364):

„Sunt quas eunuchi imbelles ac mollia semper

Oscula delectant, ac desperatio barbae;

Et quod abortivo non est opus.”

Vgl. auch Galeni de usu part. l. 14. c. 11. 31) Dahin gehört die Angabe, daß die Pythias, Aristoteles Mutter oder Besorgerin, von dem Verschütteten Thladias erzeugt worden seyn soll.

32) Vgl. Hollerii comment. ad aphor. Hipp. s. 5. aph. 63.



gestellt, ob ein nach der Periode der Pubertät castrirter Mann; in den nächsten Tagen nach der Operation, mit dem in den Samenbläs- noch rückständigen Samen einen fruchtbaren Beischlaf ausüben kön- Der Fall ist nicht unmöglich, doch wohl mehrentheils großer- Niseln unterworfen<sup>33</sup>.

33) Den wirklichen Mann deutet in der äußern Erscheinung hör- die tiefere sonore Stimme, sichtbar der Bart an. Beider Merk- entrathet der Castrat. Die Stimme bleibt wegen des in der Entwicklung mit den Geschlechtstheilen zurückbleibenden Larynx kna- kraft, wird aber der Cultur zur kräftigen Sopranostimme fähig, gewinnt zugleich an Umfang mehrere Töne. Die Weichheit der Stimmligamente, die dem Castraten verbleibt, verhindert ihn nicht, den Buchstaben R deutlich zu pronunciren. Auch an Thie- r ist der Einfluß, den der Verlust des Zeugungsvermögens auf die Stimme hat, bemerkbar; auch die Hähne verlieren, wenn sie zu Hähnen gemacht werden, ihre krähende Stimme. Wird die Ca- stration erst nach der Pubertät verrichtet; so hat dieß zwar auch Ein- fluß auf die Stimme, wie übermäßiger Samenverlust durch Aus- reifungen dasselbe bewirkt; sie wird klarer und nähert sich der Männerstimme, ohne indessen der Cultur einer Castratenstimme fähig zu werden. — Ueber das Verhalten des Bartwuchses bei Castraten unter dem Artikel Bart<sup>34</sup> das Nähere bemerkt worden. Thiere, zur Zeit der Geschlechtsreise eigne das Geschlecht bezeichnende Kör- theile bekommen, wie die Hirsche Geweihe, oder die Hähne Kämme Sporen, ermangeln dieser eben so, wie der menschliche Castrat. Bartes, doch verbleiben sie ihnen, wenn das Castriren im spätern Lebensalter erfolgte.

34) Der so allgemein sich andeutende zweite Lebenstrieb, der die Pubertät begleitet, bleibt mit seinen Folgen ganz aus, wenn die Castration vor dieser Periode Statt hatte. Die ganze geist- und Geistesentwicklung eines Castraten in dieser Zeit ähnelt mehr der dem weiblichen Geschlecht eignen, ohne ihm jedoch einen Reiz zu verleihen, mit denen die Natur das reisende Mädchen überreich ausschmückt. Der ganze Körper bekommt ein schlaffes gedunsenes Ansehen, die Haut eine besondere Weichheit und Blässe; Bindegewebe, alle Muskeln sind schlaff; der ganze Körper hat Ueber- an Feuchtigkeit, ja selbst das Skelett von Castraten ähnelt in der Bildung dem weiblichen<sup>35</sup>. Weder an den Geschlechtstheilen, noch unter den Achseln, noch außer dem Kopf sonst wo wird die Kör- perfläche behaart. In fortrückendem Lebensalter bekommen Castraten ähnlich dicke Wänche, dicke Schenkel, geschwollene Füße und werden Gang schwerfällig. Diese Körperconstitution hat indessen auch für mehrere Nebenvortheile. Alle diejenigen Krankheiten, bei denen Mi- der der Fasern wenigstens eine mitwirkende Ursache ist, kommen nicht bei Castraten vor. Dahin gehören Brüche, Gicht, Nierenstein, Krankheit des Kopfs u. s. w. Auch hat man schon früher bemerkt, Eunuchen vom Ausfag, von der Elephantiasis, ja selbst von Flech- 35) Barro (de re rust. l. 4. c. 5) behauptet, daß ein castrirter Esel kurz nach der Operation noch eine Kuh trüchtlig zu machen vermöge.

34) r. B. S. 652. 35) nach Mejan's in Genf Untersuchung. S. Alibert élém. de théor. a. a. D.

ten frei bleiben. Bei der Ruhe ihrer Natur fallen sie nicht leicht in Wahnsinn, ja man hat Beispiele, daß gegenseitig die Manie durch die Castration geheilt wurde. Dabei werden aber Castraten doch selten alt, aus Mangel an innerem Lebenstrieb. Man hat nicht Ein Beispiel eines hundertjährigen Castraten. Wegen des weichern und saftigern Fleisches werden bekanntlich auch esbare Thiere castrirt; ja man behauptet sogar, daß die anthropophagischen Völkerschaften in Amerika ihre Kriegsgefangenen castrirten und sodann mästeten, um sie zu ihren Mahlen desto schmackhafter zu machen<sup>36</sup>.

5) Auch der Geist erfährt diese Ablenkung der freien Entwicklung. Alles, was geistig den Mann charakterisirt, bleibt unentwickelt, und wird nicht, wie bei dem Weibe, durch ein feineres Gefühl und ein reicheres Gemüth ersetzt. Alles, wozu der Geist Kraft bedarf, ist dem Castraten seiner Natur nach fremd. Ob man in neuerer Zeit gleich Castraten sehr sorgfältigen musikalischen Unterricht ertheilt, so gelangen doch, selbst im Gesang, wenige nur zu einer wirklichen Virtuosität, und man findet unter allen nicht Einen ausgezeichneten Componisten. Eben so wenig kennt man irgend ein vorzügliches Geistesproduct, wozu nur einige Genialität gehört, von einem Castraten. Sie sind durchaus ohne Muth, zaghaft und charakterlos, und unter äußerem Druck listig, verschlagen und mit allen Lastern einer kleinen Seele besetzt. Was sich dann bei Eunuchen zuweilen noch Untes im geistigen Leben entwickelt, ist Anhänglichkeit an ihre Gebieter, Treue in ihrem Dienst, und eine besondere Vorliebe für Kinder; daher ihnen schon bei den alten Persern<sup>37</sup>, wie noch jetzt im Orient, von den Großen die Erziehung der Kinder übertragen war und ist. Auch wenn im spätern Lebensalter Männer durch Castration ihr Zeugungsvermögen verlieren, nähert sich, eben so wie bei Männern, welche sich frühzeitige und übermäßige Ausschweifungen erlaubten, der Charakter mehr dem weiblichen in seiner negativen Seite.

Die in der Geschichte hin und wieder aufgestellten Beispiele von Eunuchen, die sich durch Geist und Kraft auszeichneten<sup>38</sup>, stehen nur als einzelne Ausnahmen von dem Gesetz der Natur da, welche die Beeinträchtigung ihrer ersten und vornehmsten Zwecke bei Erzeugung der Individuen, die Geschlechter zu erhalten, immer mehr oder minder rächt. Man kann immer auch in jenen Fällen mit höchster Wahrscheinlichkeit voraussetzen, daß ohne die erlittne Verstümmelung jene Menschen noch weit mehr in ihrer Art geleistet haben würden.

Noch ist der verschiedenen Art der Castration, besonders

36) Charlevoix (hist. natur. des Antilles) behauptet es von den Cariben.

37) nach Xenophon's Bericht in seiner Cyropädie. 38) Man nennt Phavorinus den Philosophen, Aristonicus, General eines der Ptolemäer in Aegypten, Marses unter Justinian, Galy, Großvezier von Soliman II. und mehrere. Auch die Eunuchen Bagoas unter Alexander dem Großen, Spauras unter Nero haben als Günstlinge ihre Häften ihr Andenken in der Geschichte erhalten. Auch Phorin unter Ptolemäus, Philoterus unter Lucimachus, Menophtus unter Mithridates, Eutropius unter Theodosius starben am Ruder der Staatsgeschäfte, aber zum Verderben des Staats. Uns neuerer Zeit ist der Castrat Farinelli als erster Minister des Spanischen Königs Ferdinand III. bekannt, dem ungeachtet seines unbescholtenen Betragens, dessen Nachfolger jedoch mit der Bemerkung entließ: „Capaune taugt nur zum Essen“. (E. Barotti's Reise 39. Brief.)



gegen des Unterschieds von Castraten, den die Alten von daher nehmen, mit einigen Worten zu gedenken. Die zuverlässigste und einfachste Art ist diejenige, die auch als chirurgische Operation bei uns üblich wird, und in Durchschneidung der Samenstränge und Ausschä-  
nung der Hoden besteht, deren Detail indessen hier nicht beschrieben werden kann. Die Italienischen Castraten der neuern Zeit sind alle auf diese Weise castrirt.

Die Eifersucht der Orientalen begnügte sich aber nicht immer, wie bereits erwähnt wurde, mit dieser bloß virtuellen Entmannung. Ein zukommener Eunuch und Haremswächter muß demnach der Hoden, mit dem Scrotum, nebst dem männlichen Gliede selbst beraubt seyn, und bedarf dann, um Urin zu lassen, einer künstlichen eingebrachten Röhre. Die Türken reichen gewöhnlich, ehe sie die natürlich schmerzhaftige Operation verrichten, dem ihr Unterworfenen einen starken Schlafrunk<sup>39</sup>. Ein anderes in Syrien gebräuchliches Verfahren soll seyn, daß die Castrirenden in ein Bad gesetzt und ihnen hier, ehe die Operation unternommen wird, die Halsadern so lange zusammengeedrückt werden, bis sie die Besinnung verlieren<sup>40</sup>.

Eine im Alterthum gebräuchlichere einfachere, aber freilich auch unvollkommnere Castrirungsart war die durch Zerreibung und Zusammenrückung der Hoden. Dieser Art der Castration bei Thieren geschildert bereits Aristoteles<sup>41</sup>. Paul von Aegina<sup>42</sup> beschreibt das Verfahren bei Menschen. Man badete die Kinder in warmem Wasser, oder auch in Pflanzenabkochungen, und drückte und rieb längere Zeit die Hoden, so daß nach und nach ihre Substanz dadurch zerstört werde, oder man bediente sich auch eines Instruments, um sie durch Wund zu zerstören. Die auf solche Weise Entmannten führten den Namen Thlibiae und Thlasiae<sup>43</sup>. Einige Analogie damit hat die genannte Art bei Thieren, durch Verdrehen der Samengefäße Castration zu bewirken.

Nur uneigentlich können die sonst noch, besonders von ältern Schriftstellern, gedachten Arten, Eunuchen zu machen, z. E. durch Aufschlagen äußerer den Samen vernichtender Mittel<sup>44</sup>, oder den Gebrauch anderer Mittel zu gleichem Zweck<sup>45</sup>, oder auch die Anwendung von andermitteln<sup>46</sup>, hierher gerechnet werden, da, in so fern ihnen nicht an die historische Glaubwürdigkeit ermangelt, die angeführten Fälle, in so wie die von Menschen, die als Eunuchen geboren waren, unter den Artikel Impotenz gehören.

Noch ist mit wenigem der Castration der Frauen zu gedenken, von bei ältern Schriftstellern, jedoch häufig auf zweideutige Weise, Rede ist. Nach Athenäus<sup>47</sup> soll der König in Lydien, Amyntes, zuerst Weiber haben castriren lassen, Hesychius und Luidas gedenken, daß der Lydische König Gygas dasselbe gethan habe. Man sieht aber den Zweck davon nicht ein, wenn derselbe nur etwa war, Weiber unfruchtbar zu machen. Dalechamp<sup>48</sup>

39) S. Schenk obs. med. rar. T. II. l. 4. tit. Eunucismus Turcarum.

40) Alex. Bened. pract. l. 6. c. 34.

41) hist. anim. l. 3. c. 1.

42) de re med. l. 6. c. 63.

43) S. diese Worte.

44) Vgl. Mar-

cellini de med. l. 6. c. 33.

45) S. Serapion. l. de simpl. med.

c. 334. 46) S. Caesalpini de investig. Daemon. c. 5.

47) Deip-

nosoph. l. 12. c. 3 et 3.

48) in seinem Commentar zum Athenäus.



glaubt, daß man dieß nicht wörtlich verstehen müsse, und daß von einer andern Operation die Rede sei, deren Zweck war, durch ein mechanisches Hinderniß den Beischlaf unmöglich zu machen. Vielleicht ist auch die Nymphotomie oder Beschneidung der äußern weiblichen Geburtstheile darunter zu verstehen. S. unter Beschneidung <sup>49</sup>.

Nach Galen <sup>50</sup> hat die Castration beim weiblichen Geschlechte oder die Wegnahme der Eierstöcke, welches allein als Castration der Frauen bezeichnet werden kann, die gleichen Folgen wie bei castrirten Männern. An einem andern Orte aber <sup>51</sup> führt er an, daß castrirte Weiber eben so ihre weibliche Natur ablegen, wie castrirte Männer ihre männliche, daß aber die Castration selbst bei jenen gefährlicher zu unternehmen sei als bei diesen. Es ist aber wahrscheinlich, daß er bloß analoge Schlüsse von Thieren auf Menschen machte. Denn schon zu seiner Zeit war es üblich, wie noch jetzt, weiblichen Schweinen, Kühen und andern Thieren, um besserer Mastung willen, die Ovarien auszuschneiden. Fel. Plater kannte zu seiner Zeit noch keinen Fall, wo diese Operation an Weibern vorgenommen worden sei, hält sie jedoch nach Beispielen an Thieren für zulässig, ja zur Unterdrückung krankhaft angeregter heftiger Naturtriebe sogar für rathlich <sup>52</sup>. Indessen gedenkt Bärhæve <sup>53</sup> des Falls, wo ein über die Ausschweifungen seiner Tochter aufgebrachter Schweinschneider diese nach ihm gewohnter Art castrirte, und bewirkte, daß diese nun alle Geschlechtsanregungen verlor. Pott <sup>54</sup> gedenkt eines Falls, wo die vorgefallenen Ovarien, in der Meinung, daß es widernatürliche Bildungen seien, einer Frau ausgeschnitten wurden, worauf die Menstruation weglieb, und der Busen welk wurde. In Indostan soll es Gebrauch seyn, daß ehebrecherischen Weibern vorher die Ovarien ausgeschnitten werden, ehe sie die Todesstrafe erleiden <sup>55</sup>.

49) 1. Th. S. 724, a. t. 50) de semin. l. 1. c. 14. 51) l. c. c. 12.

52) observ. l. 1. in Act. vener. defectu obs. eminas castrari posse, exsectis testibus, exemplo animantium demonstratur. 53) praelect. ac. in propr. instit. Vol. 4. P. 2. §. 669. 54) S. dess. chirurg. Beobachtungen Uebers. Berl. 1776, S. 155. 55) Dict. des sc. med. Vol. IV. art. castrat.

### H i e r h e r g e h ö r i g e S c h r i f t e n :

Th. Raynaud Eunuchi nati, facti, mystici, Divione 1655, 4.

Z. Pasqualius, puerorum emasculator ob musicam, quo loco habendus, Divione 1655, 4.

G. Frankii diss. de castratione mulierum, Heidelb. 1673, 4. (rec. in sa-tyris med. Nr. 2. p. 36.)

J. H. Slevogt, diss. de spadonibus, Jen. 1640, 4.

B. Ewaldt diss. de eunuchis et spadonibus, Regiom. 1707, 4.

Aucillon (unter dem Namen d'Ollincau) traité d'eunuques, dans lequel on explique toutes les différentes sortes d'euniques, quel rang ils ont tenu, et quel cas on en a fait etc. 1707, 12.

J. Ph. L. Withof de castratis commentationes IV, Lausannae 1762, 8. (H.)

Castration <sup>1</sup>, (Castratio <sup>2</sup>, Castratura <sup>3</sup>), Castriren <sup>4</sup>, Castrirung <sup>5</sup>, Kastration <sup>6</sup>, Kastriren <sup>7</sup>, Kastrirung <sup>8</sup>, Verschneiden, Verschneidung, Entmannung (Eviratio, Excastratio, Etesticulatio, Exsectio virilium <sup>9</sup>, Eu-

1) Mayer's Besch. d. menschl. R. 5. B. S. 145. 2) Columellae de rust. l. 6. c. 26. 3) Mayer's Besch. n. f. w. a. d. 4) Pal-ladii de re rust. l. 6. c. 7. 5 — 8) Frank's System d. mediz. Polik. 1. B. 2. Aufl. S. 411. u. 412. 9) Arnobii l. adv. gent. l. 5. c. 165.

uchismus<sup>10</sup>.) die geſſentliche Beraubung der Mannheit durch Wegnahme oder organiſche Zerstörung der Hoden. S. Caſtrat.

10) Caelii Aurel. tard. pass. l. 1. c. 4.

*Catacleis*, nach dem gleichlautenden Griechiſchen Worte<sup>1</sup> der Knorpel der Gelenkverbindung des Schulterblatts und Schlüsselknochens, welchen die Alten für einen eignen Knochen gehalten haben, auch Synonym der ersten Rippe. S. Interarticularligament des Schulterblatts und Erste Rippe.

1) Κατακλεις, f. Galeni de ossib. (Ferd. Balamio Sic. interpr.) c. 14.

*Catagoge*, nach dem gleichlautenden Griechiſchen Worte<sup>1</sup>, i. q. Regio.

1) Καταγωγή (Hippocrat. epidem. l. 7.)

*Catamenia*, nach dem Griechiſchen gleichlautenden Worte<sup>1</sup>, i. q. Menstrua.

1) Καταμηνια (Vgl. Foesii occ. Hipp. h. v.)

*Cataposis*, nach dem gleichlautenden Griechiſchen Worte<sup>1</sup>, i. q. Deglutitio, f. Schlucken.

1) Κατάποσις (Galenii de usu part. l. 7. c. 16.)

*Catasceve*, nach dem gleichlautenden, von Galen gebrauchten Worte<sup>1</sup> heftige, einem athletischen Körperbau entsprechende Bewegung, auch ein kraftvoller Körperbau selbst. Vgl. Athletischer Habitus, auch Gesundheit.

1) Κατάσκειν, eigentlich künstliche Verberetung (Galenii de san. tuend. l. 3. c. 2. u. comm. 2. in libr. Hipp. de rat. vict. in ac.)

*Catastasis*, nach dem gleichlautenden Griechiſchen Worte<sup>1</sup>, f. Constitution.

1) Κατάστασις (Vgl. Foesii occ. Hipp. h. v.)

*Catena Homeri aurea*, f. Cabbala.

*Caterae musculus*, i. q. Tibialis musculus anticus.

*Cathectice*, sc. facultas, wörtliche Uebertragung des ursprünglichen Griechiſchen Wortes<sup>1</sup>, nach Galeniſcher Unterſcheidung. S. Anhaltende Facultät.

1) Καθεκτική (Galenii de facult. nat. l. 1. 1.)

*Catholica fluida*, f. Universelle Körperfeuchtigkeiten.

*Catocheilon*, nach dem Griechiſchen gleichlautenden Worte<sup>1</sup> als Gegenſatz vom Anocheilon, i. q. Labium inferius. S. Unterlippe.

1) Κατωχείλον. S. Hofmanni id. machin. hum. s. 28. §. 1.

*Catoptromantie*, (*Catoptromantia*<sup>1</sup>), nach dem Griechiſchen gleichlautenden Wort<sup>2</sup> das vermeintliche Vermögen, durch Zaubererei das Zukünftige in Spiegeln dargestellt zu erblicken oder erblickt zu laſſen. S. Divination.

1) Πενκερι comm. de praec. divinationum generibus Serv. 1591, p. 182.

2) Κατεπτρομαντεία von Κατοπτρον, Spiegel und μάντια, Divination.

*Cauda*, f. Schwanz. — *cordis*, f. Spitze des Herzens. —

*dorsalis*, f. Rückenmark. — *equina*, f. Pferdeschweif. — *mallei*,

i. q. Manubrium mallei. — *medullae*, f. Verlängertes Hirnmark.

— *muliebris*, i. q. Clitoris. — *musculi*, f. Schwanz eines Mus-

culus. — *pancreatis*, f. Spitze des Pankreas. — *prior flexo-*

*ris brevis*, f. unter Abductoren des Daumens. — *salax*, i. q.

Penis. — *superciliorum*, f. Schwanz der Augenbraunen.

*Caudae os*, i. q. Coccygis os.



*Caudata eminentia hepatis*, s. Geschwänzter Lobulus der Leber.  
*Caudatae gentes*, *Caudati homines*, s. Geschwänzte Völker  
 oder Menschen.

*Caudatum tuberculum*, s. *Caudatus lobulus hepatis*, s. Geschwänzter Lobulus der Leber.

*Caudex* <sup>1</sup> *spinæ*, s. Rückenmark.

1) eigentlich das innere Holz eines Stammes.

*Caulis*, wörtlich ein Pflanzenstengel, Synonym von Penis, auch von Vagina uteri.

*Cava facies*, s. *superficies hepatis*, s. unter Flächen der Leber, untere Fläche. — *vena*, s. Hohlader. — — *inferior*, *superior*, s. Hohladern.

*Cavae venae*, s. Hohladern.

*Cavamen*, *Cavatio*, *Cavatura*, s. Cavität.

*Cavea*, s. Cavität. — *arteriosa et auricularis ventriculorum cordis*, s. Höhlen der Herzventrikel. — *buccalis*, s. *buccarum*, s. unter Mundhöhle, vorderer Theil. — *cervicis uteri*, s. Canal des Uterushalses. — *Duncanii*, s. Duncanische Höhle.

— *durae matris pro nervo quinto*, s. Ovale Oeffnung der harten Hirnhaut u. s. w. — *lingualis*, s. Mundhöhle. — *Martii*, s. Martischöhle. — *maxillarum*, s. unter Mundhöhle, hinterer Theil.

— *narium*, s. Nasenhöhle. — *oculi*, s. Augenhöhle. — *uteri*, s. Uterushöhle. — *tunicae vaginalis testis propria inferior*, s. unter Vaginalhäute des Hoden und des Samenstrangs. — *ventriculorum cordis, arteriosa et auricularis*, s. Höhlen der Herzventrikel.

*Caveae cordis*, s. Ventrikel des Herzens. — *dentium*, s. Alveolen. — *magnae corporis*, s. Körperhöhlen. — *mediastini*, s. Cavitäten des Mediastinums.

*Caverna*, s. Cavität, ingleichen Sinus. — *oculi*, s. Augenhöhle. — *ossis frontis*, s. Frontalhöhlen. — — *quarti maxillae*, s. Maxillärhöhle.

*Cavernae dentium*, s. Alveolen. — *ossis frontis*, s. Frontalhöhlen. — *tracheae*, s. unter Bronchien.

Cavernöse Aderhöhlen, s. Cavernöse Gehirnsinus.

Cavernöse Gehirnsinus, (Cavernosi sinus<sup>1</sup>), Zellige Blutbehälter<sup>2</sup>, oder Blutleiter<sup>3</sup>, Schwammichte Blutbehälter<sup>4</sup>, Cavernöse Aderhöhlen<sup>5</sup>, Hohlichte Behälter der festen Hirnhaut<sup>6</sup>, Fächerigte Höhlen der festen Hirnhaut<sup>7</sup>, (Sinus polymorphi<sup>8</sup>, s. sphenoidales<sup>9</sup>, Receptacula sellae equinae lateribus apposita<sup>10</sup>), die durch Boneinanderweichen der äußern und innern Platte der harten Hirnhaut zu den beiden Seiten des sogenannten Türkensattels des Sphenoidals

1) Winslow exp. anat. lat. vers. tr. de. cap. §. 29.

2) Mayer's

Beschr. d. menschl. K. 6. B. S. 36.

3) Sommering's Hin- und

Nervent. §. 8.

4) Lientaud's Zergliederungsf. Uebers. Leipz. 1782, 2.

B. S. 16.

5) Winslow's anat. libh. Uebers. Berl. 1733, 2. B.

S. 96.

6) Haller's Gründe. d. Physiol. ungearb. von v. Leveiling,

2. B. S. 293.

7) Eoder's anat. Tafeln, Taf. 121. Fig. 4. Nr. 24.

8) nach Ortlob (hist. part. et oecon. hom. diss. p. 156.)

9) Schaarschmidt's splanch. Tabell. 22. Tab.

10) nach Vieussens, der sie zuerst genau beschrieb (nevrogr. l. 1. c. 2)



nochens sich bildenden kleinen Höhlen, die außer einem Theil des von dem Gehirn zurückströmenden Bluts, das von ihnen aus in die obern Cavernösen Sinus sich ergießt, ein zelliges Gewebe enthalten, und von der Cerebralcavotis jeder Seite, wie auch dem abducirenden Nerven und Gehirntheil des sympathischen Nerven durchdrungen werden.

5. Gehirnsinus.

Cavernöse Körper der Clitoris<sup>1</sup>, (Cavernosa corpora clitoridis<sup>2</sup>), Hohligte<sup>3</sup>, oder Fächigte<sup>4</sup>, oder Schwammigte<sup>5</sup>, Körper, oder Schwammigtes<sup>6</sup>, oder Cavernöses<sup>7</sup>, Gewebe der weiblichen Ruthe oder des Fihlers, (Corpora ateralia<sup>8</sup>, s. ligamenta majora<sup>9</sup>, s. spongiosa<sup>10</sup>, s. Textus spongiosus<sup>11</sup>, s. cavernosus<sup>12</sup> clitoridis,) die ihrer Substanz nach mit den cavernösen Körpern des Penis übereinkommenden beiden Seiten theile der Clitoris, durch deren Zusammentritt sie eigentlich selbst gebildet wird. Vgl. Clitoris.

- 1) Heuermann's Physiol. 4. Th. S. 345. 2) Winslow exp. anat. lat. vers. T. III. tr. de abd. S. 634. u. 636. 3) Palsyn's chr. Anat. übers. v. Huth, 2. Th. S. 230. 4) Mayer's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 166. 5) Haller's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v. Leveiling, 2. Th. S. 908. 6) 7) Winslow's anat. Abh. Hebers. Berl. 1735, 3. B. S. 652. 8) C. Bauhini theatr. anat. l. 1. c. 40. 9) 10) Riolani anthropogr. l. 2. c. 34. 11) 12) Winslow exp. etc. l. c. S. 635.

Cavernöse Körper des Penis oder männlichen Gliedes<sup>1</sup>, Cavernosa corpora penis<sup>2</sup>, Hohligte<sup>3</sup>, oder Fächerarmige<sup>4</sup>, oder Fächigte<sup>5</sup>, oder Schwammige<sup>6</sup> Körper, oder Fächgewebe, oder Zellkörper, oder Zelligte Körper<sup>7</sup> der männlichen Ruthe, (Corpora nervosa<sup>8</sup>, s. nervosa et ligamentosa<sup>9</sup>, s. spongiosa<sup>10</sup> tendinea<sup>11</sup>, s. nerveo-spongiosa, s. Thalami<sup>12</sup>, s. ligamenta<sup>13</sup>, s. Nervi cavi<sup>14</sup>, s. cavernosi et ligamentales<sup>15</sup> penis,) die aus dem innerlich geräumige Höhlen zwischen sich lassenden, äußerlich mit einer sehnichten Haut umzogenen Zellgewebe gebildeten Theile, welche dem männlichen Gliede selbst wesentlich seine Form geben, und unterhalb die Harnröhre, an ihrer Verbindungsstelle mit einander, in ihrer ganzen Länge von beiden Seiten aufnehmen. Ihre vornehmste Eigenschaft ist ihre Fähigkeit zur Aufregung oder Erection. S. dieß Wort. Vgl. Penis.

- 1) Heuermann's Physiol. 4. Th. S. 333. 2) Halleri elem. physiol. T. VII. l. 27. s. 1. S. 54. 3) Jadelot's Lehre v. d. Nat. d. ges. Körper. übers. v. Panzerbieter, S. 411. 4) Mayer's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 130. 5) Haller's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v. Leveiling, 2. Th. S. 877. 6) Bôrhave's Physiol. übers. v. Eberhard, S. 655. 7) Heuermann's Physiol. a. a. D. 8) Spigelii de corp. h. fabr. l. 3. c. 18. 9) Riolani anthropogr. l. 2. c. 51. 10) Fallopii obs. anat. p. 449. 11) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. 12) Santorini obs. anat. venet. 1724. p. 183. 13) Riolani anthropogr. l. c. 14) Laurentii anat. l. 7. c. 7. 15) Riolani oper. p. 220.

Cavernöse Sinusarterien, (Cavernosi sinus<sup>1</sup>, s. receptaculi<sup>2</sup> arteriae,) Arterien des zelligen Blutleiters. Man unterscheidet eine vordere und eine hintere, (Arteria anterior<sup>3</sup> et posterior<sup>4</sup>.) Es sind kleine Äste der innern Carotis, die sich in der Gegend der cavernösen Gehirnsinus in die harte Hirnhaut

- 1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 2. B. S. 2459. 2 — 4) Halleri elem. physiol. T. IV. l. 10. 2. S. S. 9.

haut, in die pituitarische Drüse und an einige Gehirnnerven verbreiten. S. unter Carotiden, innere Carotis.

**Cavernöser Körper der männlichen Harnröhre,** (Cavernosum corpus urethrae<sup>1</sup> virilis,) Fächiger<sup>2</sup>, oder Schwammiger<sup>3</sup> Körper, oder Schwammigte Scheide<sup>4</sup> oder Substanz<sup>5</sup>, oder Zellkörper, oder Fächgewebe, oder Cavernöses<sup>6</sup>, oder Schwammigtes Gewebe<sup>7</sup>, oder Wesen<sup>8</sup> der männlichen Harnröhre, (Corpus cellulosum, s. spongiosum, s. Substantia spongiosa, s. Textus spongiosus, s. cavernosus urethrae virilis,) die, der Substanz nach den vorher gedachten Theilen ähnliche, die männliche Harnröhre umfassende, besonders unterwärts mehr ausgebildete, zellige, ebenfalls bei der Erection anschwellende Scheide des männlichen Gliedes. S. unter Genitalien des männlichen Geschlechts und Harnröhre.

- 1) Halleri cl. physiol. T. VII. l. 27. s. 1. §. 33. 2) Mayer's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 135. 3) Meientaud's Zergliederungsk. Uebers. Leipz. 1782, 2. B. S. 638. 4) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 2274. 5) Palfyn's Chr. Anat. übers. v. Guth, 2. B. S. 174. 6 — 8) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1733, 3. B. S. 632 — 634.

**Cavernöses Gewebe der männlichen Harnröhre,** s. Cavernöser Körper der männlichen Harnröhre. — — **der weiblichen Ruthe,** s. Cavernöse Körper der Clitoris.

**Cavernosa arteria penis,** s. unter Penisarterien. — **corpora clitoridis,** s. Cavernöse Körper der Clitoris. — — **penis,** s. Cavernöse Körper des Penis. — **pars ossis ethmoidei,** i. q. Labyrinthus ossis ethmoidei.

**Cavernosi et ligamentales nervi penis,** s. Cavernöse Körper des Penis. — **sinus durae matris,** s. Cavernöse Gehirnsinus. — — **uteri,** s. Venen des geschwängerten Uterus.

**Cavernoso-bulbosus musculus,** i. q. Accelerator urinae.

**Cavernosum corpus urethrae,** s. Cavernöser Körper der männlichen Harnröhre. — **os,** s. Ethmoidalknochen.

**Cavernosus textus clitoridis,** s. Cavernöse Körper der Clitoris. — — **urethrae virilis,** s. Cavernöser Körper der männlichen Harnröhre.

**Cavernula ossis quarti maxillae,** s. Maxillarchöhle.

**Cavernulae, Cavernulae cellulosae,** s. Zellen. — **sinus ethmoidales,** s. Ethmoidalzellen. — **uteri,** s. Venen des geschwängerten Uterus.

**Cavicula.** Dieß Wort wird in Wörterbüchern als Synonym von Cavilla in der Bedeutung von Knöchel angegeben; es scheint corrupt zu seyn aus Clavicula oder auch Cavilla.

**Caviculae pedis nodus.** So benennt Forestus<sup>1</sup> den Tarsus.

- 1) observ. chir. l. 6. observ. 49 schol.

**Cavilla,** ein der Lateinischen Sprache als Bezeichnung körperlichen Theile<sup>1</sup> fremdes, und aus der Arabischen übergetragenes Wort<sup>2</sup>, wo es einen Pflock oder Keil bedeutet, von den Arabisten als Syno-

- 1) Plautus (Aul. act. 4. sc. 4. v. 11.) braucht cavilla statt cavillum in der Bedeutung von Spott oder Hohn. 2) S. Haly Abbas l. totius medicinae necess. Ven. 1492, fol.



anym von Sphenoidalknochen, auch von Talus, auch von Knöchel gebraucht<sup>3)</sup>.

3) S. insbesondere über dieß Wort Schneideri de catarrh. l. 1. c. 2.

*Cavillae*, s. *Cavillae domesticae cruris*, s. Knöchel.

**Cavität**, (*Cavitas*<sup>1)</sup>) Höhle<sup>2</sup>, Höhlung, Hohligkeit<sup>3</sup>, Behälter, Behältniß, Aushöhlung, (*Cavum*, *Cavea*, *Caverna*<sup>4</sup>, *Cavatio*, *Cavatura*, *Cavamen*, *Cavositas*, *Excavatio*, *Conceptaculum*, *Cenon*<sup>5</sup>, *Cenos*<sup>6</sup>.) wird im allgemeinen von ganz oder theilweise verschlossenen Räumen im thierischen Körper gebraucht, die größtentheils auch wieder besondere Rahmen bekommen. Vgl. Sinus, Zellen, Kammern, auch Knochen-  
aushöhlungen.

1) ein erst in neuerer Zeit gebildetes, aber unter den mit ihm ihre Abstammung nach übereinkommenden, am häufigsten in die anatomische Nomenclatur übergegangenes Wort. Vesalii d. c. hum. fabr. l. 1. c. 8.

2) Palfyn's Chr.

Anat. überf. v. Huth 1. Th. S. 3.

3) 4) Winslow's Anat. Abh.

Uebers. Berl. 1733, 4. B. Reg. 5) 6) S. diese Worte.

**Cavität der Bettstelle**, s. *Sella* des Hirnschädels.

**Cavität der Plantarfläche des cuboideischen Knochens nach hinten**, (*Cavitas posterior superficiei plantaris ossis cuboidei*<sup>1</sup>.) Hintere Aushöhlung der Sohlenfläche des Würfelbeins<sup>2</sup>, die an der untern Fläche des cuboideischen Knochens hinter dem Tuber desselben befindliche raue Vertiefung, in welcher das schräge und das rhomboideische Plantarligament ihre Lage haben. S. Fußknochen.

1) Loderi tab. anat. tab. 14. f. 14. n. 2.

2) Loder's anat. Taf.

a. a. D.

**Cavität des Larynx**, (*Cavitas laryngis*<sup>1</sup>.) Höhle<sup>2</sup>, oder Hohligkeit<sup>3</sup> des Kehlkopfs, der durch die Zusammenfügung der den Kehlkopf constituirenden Knorpel umschlossene Raum, oder nach oben mit der Mundhöhle, nach unten mit der Luftröhre in Verbindung steht, und der Luft beim Respirationsacte zum Durchgange dient. S. Larynx.

1) 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1873.

3) Heuer-

mann's Phnol. 2. Th. S. 20.

**Cavität des Modiolus**, (*Cavitas modioli*<sup>1</sup>.) Hohligkeit der Walze<sup>2</sup>, (*Tubulus centralis cochleae*.) der kleine Raum, den der Modiolus der Ohrschnecke in sich selbst umschließt. S. Modiolus der Cochlea.

1) 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1627.

**Cavität des Peritonäums**, (*Cavum peritonae*<sup>1</sup>.) Höhle der Bauchhaut<sup>2</sup>, der von dem durch das Peritonäum gebildeten Sacke umschlossene Raum, in dem insbesondere die zur Verdauung dienenden Eingeweide des Unterleibes besetzt sind. S. Peritonäum.

1) 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1966.

**Cavität des untern Endes der Tibia**, (*Cavitas articularis tibiae*<sup>1</sup>.) Gelenkaushöhlung der Schienbeinröhre<sup>2</sup>, oder überknorpelte, leicht ausgehöhlte Theil der Basis der Tibia, der mit der Articularfläche des äußern Knöchels zugleich den Talus in sich aufnimmt, und so die Articulation des Unterschenkels und des Oberfußes vermittelt. S. Tibia.

1) Loder's anat. Handb. 1. B. S. 229.

2) Loder's anat. Tafeln, Taf.

23. Fig. 5. Nr. 17.



Cavitäten der semicirculären Canäle des Labyrinths, (Cavitates canalium semicircularium<sup>1</sup>.) Vertiefungen der Bogengänge<sup>2</sup>, deren werden drei, a) eine elliptische des besondern Ausgangs des obern Bogenganges<sup>3</sup>, (Cavitas elliptica initii proprii canalis ossei semicircularis superioris<sup>4</sup>.) b) eine elliptische des Anfangs des äußern Bogenganges<sup>5</sup>, (Cavitas elliptica initii canalis ossei semicircularis exterioris<sup>6</sup>.) c) eine kreisförmige des besondern Anfangs des hintern bogenförmigen Canals<sup>7</sup>, (Cavitas orbicularis initii proprii canalis semicircularis ossei posterioris<sup>8</sup>.) unterschieden. Vgl. Semicirculäre Canäle des Labyrinths.

1) Kühnau diss. de organ. auditui in-erv. §. 26. 2 — 8) Loder's anat. Tafeln, Loderi tab. anat. T. LV. f. 5. n. 5 — 7.

Cavitäten des Körpers, (Cavitates<sup>1</sup>; s. Caveae corporis,) Behälter, Behältnisse<sup>2</sup>, oder Kammern<sup>3</sup>, oder Höhlen<sup>4</sup>, oder Hohligkeiten<sup>5</sup> des Körpers, im allgemein umfassenden Sinne jeder einzelne im thierischen Körper umschlossene Raum, insbesondere aber auch mit der besondern Bezeichnung Große Körperhöhlen, oder der veralteten Benennung Bäuche, (Cavitates magnae corporis, Ventres,) die drei großen Räume des Kopfs, der Brust und des Unterleibes. S. Körperhöhlen.

1) Verheyen c. h. anat. prooem. 2) 3) Verheyens Anat. Uebers. Leipz. 1708, S. 3. 4) Kulmus anat. Tabell. Tab. 2. 5) Hermann's Physiol. 2. B. S. 331.

Cavitäten des Mediastinums, (Cavitates, s. Caveae<sup>1</sup> mediastini,) Höhlen der Mittelwand<sup>2</sup>, die Zwischenräume, welche von der aus dem Zusammentreten der innern Wände der pleuritischen Säcke entstehenden Mittelwand der Thoraxhöhle gebildet werden von denen, a) die vordere<sup>3</sup>, (Cavum mediastini anterius<sup>4</sup>.) die Thymus und die innern mammarischen Gefäße, b) die hintere<sup>5</sup>, (Cavum mediastini posterius<sup>6</sup>.) aber den absteigenden Theil der Aorta, die Azyga, den thoracischen Gang, die Speiseröhre, das vage Nervenpaar und oberwärts die Luftröhre in sich befaßt. S. Pleura.

1) Halleri elem. physiol. T. 1. l. 5. s. 1. §. 7. 2 — 6) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. §. 1800.

Cavitäten des Vestibulums, (Cavitates vestibuli.) Als solche werden nach Scarpa<sup>1</sup> unterschieden: eine halb elliptische, eine halbkugelförmige und eine rinnenförmige, (Cavitas semiovalis, hemisphaerica, sulciformis.) S. Hemielliptische, Hemisphaerische und Rinnenförmige Vertiefung des Vestibulums.

1) anat. disqu. de olfactu et auditu t. 6. f. 1.

Cavitas abdominalis, s. abdominis, f. Abdominalhöhle. — acetabuli, f. Boden des Acetabulum. — antrorsa auris, i. q. Tympanum, — articularis maxillae inferioris, f. Articulationshöhle des Schläfelfnochens. — — tibiae, f. Cavität des untern Endes der Tibia. — buccinata, s. caeca labyrinthi, i. q. Cochlea. — claviculâris manubrii sterni, f. Clavicularincisur des Manubriums des Sternum. — cochlearis, s. cochleata labyrinthi, i. q. Cochlea, — composita, f. Zusammengesetzte Knochenhöhle. — condyloidea, f. Glenoidalgrube. — condylorum femoris anterior, f. Sinus der Condylen des Schenkelknochens.

— *corporis*, *inferior*, *media*, *superior*, f. Körperhöhlen. — *uteri*, f. unter Uterushöhle. — *cotyloidea*, i. q. *Acebulum*, vgl. *Cotyle*. — *cranii*, f. Hirnschädelhöhle. — *elastica initii proprii canalis ossei semicircularis superioris*, f. unter Cavitäten der semicirculären Canäle des Labyrinths. — *glenoidalis*, f. Glenoidaigrube. — *maxillae inferioris*, s. *ossis temporum*, f. Articulationshöhle des Schläfeknochens. — *ossium digitorum*, f. Glenoidalhöhlen der Fingerknochen. — *scapulae*, f. Glenoidalhöhle des Schulterblatts. — *glenoidea*, i. q. *Glenoidalis*. — *hemisphaerica vestibuli*, f. Hemisphärische Grube des Vestibulums. — *impar*, f. Ungleiche Knochenhöhle. — *infraspinata scapulae*, f. Infraspinalaushöhlung des Schulterblatts. — *innominata auris*, f. Unbenannte Furche des Ohrs. — *laryngis*, f. Cavität des Larynx. — *manus*, f. Volarseite der Hand. — *modioli*, f. Cavität des Modiolus. — *narium*, f. Nasenhöhle. — *oculi*, f. Augenhöhle. — *orbicularis initii proprii canalis semicircularis ossei posterioris*, f. unter Cavitäten der semicirculären Canäle des Labyrinths. — *oris*, f. Mundhöhle. — *ossis profunda*, i. q. *Cotyla*. — *superficiaria*, i. q. *Glene*, f. Glenoidaigrube. — *pelvis*, f. Beckenhöhle. — *pericardii*, f. Pericardische Höhle. — *peronaea tibiae*, f. Fibularincisur der Tibia. — *scyphi*, f. Infundibulum der Cochlea. — *semilunaris radii*, f. Semilunäre Incisur des Radius. — *ulnae major et minor*, f. Sigmoideische Cavitäten der Ulna. — *semiovalis vestibuli*, f. Hemielliptische Grube des Vestibulums. — *sigmoideae major et minor*, f. Sigmoideische Cavitäten der Ulna. — *sinuosa tarsi*, f. Sinuöse Cavität des Tarsus. — *simplex*, f. einfache Knochenhöhle. — *sulciformis vestibuli*, f. Rinnenförmige Cavität des Vestibulums. — *superficii plantaris ossis cuboidei posterior*, f. Cavität der Plantarfläche des cuboideischen Knochens nach hinten. — *supraspinata scapulae*, f. Supraspinalaushöhlung des Schulterblatts. — *thoracica*, s. *thoracis*, f. Thoraxhöhle. — *transversalis ossis temporum*, f. Articulationshöhle des Schläfeknochens. — *trochleae ossis brachii*, f. Aussparung der Trochlea des Oberarmknochens. — *trochlearis ossium digitorum*, f. Trochlearhöhle der Fingerknochen. — *tympani*, f. Tympanum. — *uteri*, f. Uterushöhle. — *ventriculi*, f. Magenhöhle. — *vestibuli*, i. q. *Vestibulum*.

*Cavitates articulares*, f. Articulirende Höhlen der Knochen. — *canalium semicircularium*, f. Cavitäten der semicirculären Canäle des Labyrinths. — *corporis*, f. Körperhöhlen. — *cerebri*, f. Ventrikel des Gehirns. — *cordis*, f. Ventrikel des Herzens. — *alveolarium*, f. Alveolen. — *durae matris*, f. Sinus des Gehirns. — *glenoidales atlantis*, f. Articularflächen des Atlas. — *phalangium digitorum pedis*, f. Glenoidalhöhlen der Phalangen der Füße. — *radii*, f. Glenoidalische Höhlen des Radius. — *tibiae*, f. Articularsinus der Tibia. — *magnae corporis*, f. Körperhöhlen. — *mediastini*, f. Cavitäten des Mediastinums. — *ossis brachii*, f. Articulationsgruben des Oberarmknochens. — *pares*,



f. Gleiche Knochenhöhlen. — *semilunares*, s. *sigmoideae ulnae*.  
 f. Sigmoideische Cavitäten der Ulna. — *trochleares phalangum digitorum pedis*, f. Trochlearchöhlen der Phalangen der Behen.  
*vestibuli*, f. Cavitäten des Vestibulums.

*Cavositas*, *Cavum*, f. Cavität.

*Cavum abdominale*, s. *abdominis*, f. Abdominalhöhle.  
*alare ossis sphenoidi*, i. q. Pterygoidea fossa. — *mediastini anterius et posterius*, f. Cavitäten des Mediastinums.

*Cavum oculi*<sup>1</sup>, der Raum zwischen dem obern Theil der Orbita und dem obern Augenslid, der sich besonders bei mageren Personen und im kränklichen Zustand als hohl zeigt. Vgl. Auge. S. an Augenhöhle.

1) Uebersetzung des Griechischen Wortes Κολον (Ruffi de nomin. c. h. p. 1.) Spigelii de h. c. fabr. l. 1. c. c.

*Cavum oris*, f. Mundhöhle. — — *antidentale*, *infralinguale*, *postdentale*, *supralinguale*, f. unter Mundhöhle.  
*pelvis*, f. Beckenhöhle. — *pericardii*, f. Pericardische Höhle.  
*peritonei*, f. Cavität des Peritoneums. — *thoracis*, f. Thoraxhöhle. — *tympani*, i. q. Tympanum. — *umbilici*, f. Nabelgrube. — *ventriculi*, f. Magenhöhle. — *vestibuli*, i. Vestibulum.

*Cavus annulus circa lentem crystallinam*, f. Petit's Carina.

*Cayseles dentes*, i. q. Dentes sapientiae, f. Weisheitszähne.

*Cechynos*, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte, das Maul aufsperrender Mensch, und in so fern Bezeichnung der Dummheit. S. Manlaufsperren.

1) Κεχυνος, wird von Menschen und Thieren gebraucht. Vgl. v. d. Linden, sel. med. Ex. 11. §. 61.

*Celeritas*, f. Geschwindigkeit.

*Cella*<sup>1</sup>, wörtlich ein Keller, wovon das Wort Zelle, wird allgemeinen in der anatomischen Kunstsprache von kleinen Räumen braucht die mit andern gleichen in offener Verbindung stehen, nämlich mit den davon abgeleiteten Worten in folgenden Fällen.

1) von celare, verbergen, gebildet.

*Cella prima coli*, f. Blinddarm.

*Cellula*, Diminutiv von Cella, f. Zellschen. — *tympani*, Antrum des Tympanums.

*Cellulae*, f. Zellen. — *aëreae pulmonum*, f. Pulmonalzellen. — *coli*, f. Zellen des Colons. — *ethmoidales*, f. Ethmoidalzellen. — *frontales ossis ethmoidi*, f. unter Ethmoidalzellen stehende Zellen. — *infundibuliformes ossis ethmoidi*, f. unter Ethmoidalzellen, vordere Zellen. — *mastoidae*, f. Mastoideische Zellen. — *membranae vitreae*, f. Zellen des gläsernen Körpers. — *orbitariae ossis ethmoidi*, f. unter Ethmoidalzellen, vordere Zellen. — *ossis ethmoidi*, f. Ethmoidalzellen. — *ossium*, Knochenzellen. — *pulmonales*, f. Pulmonalzellen. — *tympanicae*, f. Zellen des Tympanums.

*Cellularbildung*, f. Zellförmige Bildung. — *haut*, f. Zellschicht. — *des Auges*, f. unter Hyaloidea.

*Cellularis fabrica*, s. *formatio*, f. Zellförmige Bildung. — *membrana*, f. Zellige Haut. — — *oculi*, f. unter Hyaloidea.



*tela*, f. Zellgewebe. — *tunica*, f. Zellige Haut. — — *arteri-  
um*, f. unter Arterienhäute, äußere Haut. — — *ventriculi et  
intestinorum*, f. unter Häute des Magens und der Gedärme, Zellhaut.  
Zellulöse Bildung, f. Zellförmige Bildung. — *Haut*, f. Zel-  
Haut.

*Cellulosa fabrica*, s. *formatio*, f. Zellförmige Bildung. —  
*tela alba mylohyoidei*, f. unter Mylohyoidens. — *membrana*,  
Zellgewebe, auch Zellige Haut. — *spatia*, f. Zellen. — *tela*,  
Zellgewebe. — — *subcutanea*, f. Fetthaut. — *tunica*, f.  
Zellgewebe, auch Zellige Haut. — — *adscititia arteriarum*, f.  
unter Arterienhäute, äußere Haut. — — *arteriarum*, f. unter Ar-  
terienhäute, äußere, ingleichen eigentliche Haut. — — — *interior*,  
unter Arterienhäute. — — — *propria*, f. unter Arterienhäute,  
eigentliche Haut. — — *gangliorum, densa et laxa*, f. unter  
Ganglienhäute. — — *ventriculi et intestinorum*, f. unter Häute  
des Magens und der Gedärme, Zellhaut. — — *vesicae*, f. unter  
Harnblasenhäute, äußere Haut.

*Cellulosae cavernulae*, f. Zellen.

*Celluloso-vasculosa tunica arteriarum*, f. unter Arterienhäute  
eigentliche Haut.

*Cellulosum corpus urethrae virilis*, f. Cavernöser Körper der  
männlichen Harnröhre.

*Cellulosus annulus oculi*, f. Cilienkreis. — *contextus*, s. *textus*,  
Zellgewebe. — *textus extimus vesicae*, f. unter Harnblasen-  
häute, äußere Haut.

*Ceneon, Cencos*, nach den gleichlautenden Griechischen Worten <sup>1</sup>  
Raum zwischen den Rippen und Hüftknochen auf jeder Seite.  
Gliaische Regionen.

*Κενον, Κενος*, wörtlich leer. *S. Foesii occ. Hipp. v. ΚΕΝΩΔΕΣ.*  
*Moschion* (de morb. mulier. c. 41) braucht auch ersteres Wort zur Bezeichnung  
des Nabels bei Kindern.

*Cenon, Cenos*, ebenfalls nach Griechischen Worten <sup>1</sup>, überhaupt  
Leere im Körper. *S. Cavitat.*

*Κενον, Κενος. Κενον εν τη κεφαλη* (Hippocr. aph., l. 7. aph 7 ca-  
pitis inanitas).

*Centaur, (Centaurus<sup>1</sup>, Centotaurus<sup>2</sup>, Hippocen-  
taurus,<sup>3</sup>)* eine Zwitterbildung: oberwärts bis unter die Brust Mensch,  
unwärts von da Pferd <sup>4</sup>, dergleichen nach der fabulösen Griechischen  
Geschichte einem Thessalischen Volksstamm zukommen sollte.

Man hat in früherer Zeit in die Möglichkeit von dergleichen Mißbil-  
dungen oder Doppelwesen, die man der unnatürlichen Geschlechtsver-  
einigung von Männern und Stuten zuschrieb, keinen Zweifel gesetzt, und

nach dem Griechischen Worte *κενταυρος*, wörtlich Stiere mit Stichen verfol-  
gend, nach der wahrscheinlichsten Etymologie, *απο του κεντειν τους ταυρους*,  
nach der Sage, daß, als die von einem Thessalischen König zu Zusammentreibung  
wild gewordenen Stiere ausgesandten Diener zu schnellerem Fortkommen sich auf  
Pferde gesetzt, und durch Longenstücke die Stiere vor sich weggetrieben haben, sie  
aus der Ferne für Wesen von halber Menschen-, halber Pferdebildung ange-  
sehen worden seien (*Servii comm. ad Virgilii Georg. l. 3. v. 115*)

<sup>2</sup>) *κεντοταυρος*. *S. Hofmanni comm. ad Galeni l. de usu part. c. 1.*  
*mu. 118.* <sup>3</sup>) *Plinii hist. nat. l. 7. c. 3.* <sup>4</sup>) *Equus rufinus ho-*

*minem, Homo cacan equum*, nach der etwas läppischen Definition eines Aelian.

*nat. physiol. Realw. II. B.*

einzelne Fälle davon aufgeführt, die jedoch aller historischen Glaubwürdigkeit entrathen<sup>5</sup>. Aber schon Galen erklärte sich gegen diese Hauptung<sup>6</sup>, und in neuerer Zeit ist von Centauren als Naturwesen durchaus nirgends mehr die Rede, indem sie als Phantasiegebilde bloß der Mythologie und der Fabelwelt angehören. (H.)

5) Plutarch erzählt, daß ein von einer Stute geborner Centaur den sieben Weisen vorgestellt worden sei, Plinius (a. a. O.) daß er einen aus Aegypten gebrachten todteten, und durch Honig gegen die Fäulniß vermahrten Centaur sehen habe, der heilige Hieronymus, (in vita Pauli Eremitae,) der heilige Antonius in der Wüste einem Hippocentaur begegnet sei, u.

6) de usu part. l. 3. c. 1. Auch Lucret; (de rer. nat. l. 5. v. 876) bemerkt: neque Centauri fuerunt, neque tempore in ullo

Esse queat duplici natura, et corpore bino

Ex alienigenis membris compacta potestas,

Hinc illinc par vis ut non sic esse potis sit.

**Central**, (Centralis, e.) wird im allgemeinen dem Peripherischen entgegengesetzt, und bezeichnet eigentlich ein Ortsverhältniß, eine Beziehung auf die Mitte eines Theils, jedoch nur in strengem Sinne auf den Mittelpunkt selbst. Analog wird dieß Wort auch von räumlichen Verhältnissen gebraucht, und hat dann den Sinn von absolut Innerem im Gegensatz von Aeußerem. Namentlich findet es folgenden Fällen Anwendung.

**Centralarterie der Markhaut<sup>1</sup> oder Netzhaut<sup>2</sup> oder Retina**, (Centralis arteria, s. arteria centralis retinae<sup>3</sup>), Centralpulsader des Sehnerven<sup>4</sup>, Mittlere Schlagader der Markhaut<sup>5</sup>, ein Zweig der ophthalmischen Arterie, der in Sehnerven bis zu dessen Mitte eindringt, in der Axt desselben zum Augapfel fortläuft, und sich theils in die Retina, theils in Glaskörper verbreitet. S. Augenarterien.

1) Eoder's anat. Tafeln, Taf. 96. Fig. 6. Nr. 23. 2) Haller's Gr. d. Physiol. übers. von v. Leveiling, 1. Th. S. 574. 3) Haller's physiol. T. V. l. 16. s. 2. S. 34. 4) Mayer's Besch. d. menschl. K. S. 406. 5) Meientaud's Fergliederungskf. Uebers. Leipz. 1782, 2. B. S.

**Centralarterie des Modiolus der Cochlea**, (Centralis arteria modioluli<sup>1</sup>), ein Ast der Auditivarterie des innern Ohrs, durch den Tubulus des Centrums des Modiolus hindurchgeht. unter Subclaviculärarterie, Basilararterie.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1642.

**Centralbildung**, s. Centralorgan.

**Centrale foramen retinae**, s. unter Gelber Fleck in der Netzhaut — **organum**, s. Centralorgan.

**Centralende der Nerven**, s. Ursprung von Nerven.

**Centrales vires**, s. Centralkräfte.

**Centralgebilde**, s. Centralorgan.

**Centralis, e**, s. Central. — **arteria retinae**, s. Centralarterie der Markhaut. — **modioluli**, s. Centralarterie des Modiolus. — **tubulus cochleae**, s. Cavität des Modiolus der Cochlea. — **vena vena retinae**, s. Centralvene der Netzhaut.

**Centralkräfte<sup>1</sup>**, (Centrales vires<sup>2</sup>), diejenigen Kräfte oder Bewegungsprincipe, durch welche sich ein Körper um einen andern einer krummen Linie bewegt.

1) Winkler's Anfangsgr. d. Physik, 2. Lehrb. 6. Hauptst. 2) Winkler's phil. contempl. P. 3. S. 1357.



nach einfachen Bewegungsgesetzen nimmt jeder im Ganzen seinen  
 in verändernde Körper, zu Folge eines äußern ihm gegebenen  
 trieb, seinen Weg in gerader Linie. Es strebt also jeder Körper,  
 sich in einer Curve oder krummen Linie bewegt, in jedem Augen-  
 durch die Tangente dieser Curve von seiner Richtung auszuwei-  
 , und bleibt nur in jener Curve, indem er durch eine entgegen-  
 te Kraft nach dem Centrum dieser Curve, (welches in dieser Be-  
 zung dann das Centrum der Bewegung genannt wird,) in  
 Richtung erhält. Es ist also die Centralkraft zusammengesetzt aus:  
 Kraft, die dahin strebt, den bewegenden Körper von dem Cen-  
 der Bewegung zu entfernen, und einer andern, die gegenseitig  
 t, ihm nach dem Centrum der Bewegung hin seine Richtung zu-  
 a. Erstere wird insbesondere als Centrifugalkraft, (*Vis centrifuga*),  
 letztere als Centripetalkraft, (*Vis centripeta*),  
 chnet. Beide Kräfte dürfen aber, wenn krummlinige Bewegung  
 aus hervorgehen soll, einander nicht direct entgegengesetzt seyn, in-  
 dann; wenn sie gleich stark wirkten, Ruhe des Körpers, bei Un-  
 gleichheit der Stärke aber nur mindere Energie einer oder der andern,  
 in die Folge davon seyn würde, sondern die durch centrifugale  
 t allein bewirkte Bewegung schweift seitwärts und rechtwink-  
 mit dem Radius vom Centrum der Curve bis zu dem Punct der-  
 en, von dem aus sie allein wirksam wird, aus. Wenn z. B. in einer  
 leuder ein in der Schleife gefasster Stein im Kreis herumgeschwun-  
 wird, so bildet die ihn befassende Schleife, so lange sie nicht los-  
 ssen wird, für diese Kreisbewegung die Centripetalkraft; so wie  
 das eine Ende der Schleife von der Hand nicht mehr gefast,  
 dann der Stein sich selbst überlassen wird, geht er in dem Au-  
 sblick seines Freiwerdens zu Folge der ihn nun allein treibenden  
 centrifugalkraft in der Richtung fort, die er unmittelbar vorher in  
 Umschwung im Kreis hatte, und nur das Gesetz der eignen Schwere,  
 er nun zugleich mit dem der erhaltenen Bewegung gehorcht,  
 ändert, daß diese Bewegung eine wirklich geradlinige bleibt.  
 Es werden nun sowohl die Centripetal- und die Centrifugalkraft,  
 doch immer nur in ihrer Beziehung auf einander,) Centralkräfte ge-  
 ant, und sind dann also die beiden Arten, welche die Mathema-  
 als Centralkräfte unterscheiden, als es wird auch insbesondere  
 Centripetalkraft, aber doch nur, in wie fern sie durch die Centri-  
 falkraft modificirt oder vielmehr als Centralkraft reell wird, dar-  
 er verstanden.

Der berühmte Mathematiker Huygens ist der erste, der diese  
 Bewegungsgesetze entdeckte; aber er bestimmte sie bloß für die einfache  
 krummlinige Bewegung, zu Folge welcher der sich bewegende Körper einen  
 el beschreibt. Newton hat dagegen die Theorie der Centralkräfte  
 alle mögliche Curven aufgestellt, und nach dieser ist es vorzüglich,  
 durch wir die Gesetze der Bewegungen der Himmelskörper des zwei-  
 und dritten Ranges um ihre Hauptkörper erkennen.

Die Grundlage dieser Theorie ist folgende. Wenn ein Körper von  
 m bestimmten Gewicht sich gleichförmig um ein Centrum mit ei-  
 gewissen Geschwindigkeit bewegt; so muß man untersuchen, von  
 her Höhe es gefallen seyn müßte, um diese Geschwindigkeit zu er-



langen, worauf man den Satz aufstellen kann: wie der Radius des Kreises, den der Körper beschreibt, sich zum Doppelten jener verhält; so verhält sich sein Gewicht zu seiner Centrifugalkraft. — Setzt man auf diese Weise das Verhältniß der Centralkraft eines Körpers zu seinem Gewichte, und befindet man sich dadurch im Stande, die Centralkräfte unter sich zu vergleichen; so kann man, wenn bloß die Centralkräfte mit einander, also ohne auf das Gewicht Rücksicht zu nehmen, vergleichen will, sich folgenden Theorems bedienen, daß die Centralkräfte zweier Körper sich zu einander verhalten, wie die Producte ihrer Massen, multiplicirt durch die Quadrate ihrer Geschwindigkeiten, und dividirt durch die Radien oder die Durchschnitte der Kreise, welche sie beschreiben. Die Ungleichförmigkeit der Bewegung oder der andern Kraft lenkt den bewegten Körper von der Kreisbahn ab und bestimmt dann die Gestalt der Curve. Verhält sich die Centripetalkraft in jedem Punkte der Bahn umgekehrt wie das Quadrat der Entfernung vom Centrum; so ist die Curve eine Ellipse, wie man wirklich in den Planetenbahnen. Eine weitere Ausführung des Gegenstandes würde hier nicht an seinem Orte seyn.

Wenn die Kenntniß der mathematischen Lehre der Centralkräfte dazu dient, sich über das Leben des großen Weltenorganismus, dem die Bewegungen der Himmelskörper um einander eine Hauptbindung sind, so weit es von unserm niedern Standpuncte verstatet seyn kann, zu verständigen; so kann man doch keine mannigfaltigen Kräfte und Bewegungen im thierischen Körper als Centralkräfte und Centralbewegungen oder als Centripetal- und Centrifugalkraft, oder Bewegung in dem angegebenen bestimmten Sinne bezeichnen, und es findet also diese Benennung hier höchstens vergleichungsweise und bildlich oder in entfernten Andeutungen Anwendung. (H.)

**Centrallinie der Gebärmutter**, s. Axe des Uterus. — **Mutterscheide**, s. Axe der Vagina. — **Des Beckens**, s. Axe des weiblichen Beckens. — **Des Körpers**, s. Axe des Körpers.

**Centrallinien der Körper und der Köpfe der Schenkelbeine**, s. Axen der Körper und der Köpfe der Schenkelknochen.

**Centralorgan**<sup>1</sup>, (Centrale organum,) Centralpunkt, Centraltheil, Centralbildung<sup>2</sup>, Centralgebilde<sup>3</sup>, wird relativ ein Organ oder Körpertheil genannt, der für andere, denen er für eine Lebensfunction oder Aeußerung ein besonderes System bildet, als Haupttheil anzusehen ist, so das Herz für die Blutcirculation, das Gehirn für die Sinnesthätigkeiten u. s. w. Vgl. Organismus.

<sup>1</sup>) Görres's Erpos. d. Physiol. S. 163.

<sup>2</sup>) Burdach's Encyclop. d. Heilm.

<sup>3</sup>) 2. B. S. 813.

<sup>4</sup>) Wilbrand's Physiol. d. M. S. 486 u. 681.

**Centralpulsader des Sehnerven**, s. Centralarterie der Netzhaut. — **punct**, s. Centralorgan.

**Centralpunkte der Sensibilität**, so bezeichnet Burdach<sup>1</sup> die Verbindung des Gehirns und Rückenmarks in Verbindung, im Gegensatz der Nerven und der Sinnesorgane. Vgl. Sensorium, auch Sensibilität.

<sup>1</sup>) Encyclop. d. Heilm. 2. B. S. 1350.

**Centraltheil**, s. Centralorgan.

**Centralvene der Netzhaut**<sup>1</sup>, oder der *Retina*, oder des Auges, (*Centralis vena*<sup>2</sup>, s. *venula*<sup>3</sup> *retinae*,) die die Centralarterie der Netzhaut begleitende, von der Capsel der Crystalllinse, Hyaloidea und der *Retina* Blut in die ophthalmische Cerebralvene oder auch in den cavernösen Sinus Blut zurückführende kleine v. e. S. Augenvenen.

1) Eoder's anat. Tafeln Taf. 122. Fig. 1. Nr. 37. 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2663. 3) Halleri cl. physiol. T. V. 1. 16. s. 2. S. 38.

**Centrifugalkraft**<sup>1</sup>, (*Centrifugalis vis*<sup>2</sup>,) Tangentialkraft<sup>1</sup>, bei Centralkräften derjenige Antrieb, der einen in krummer Bewegung befindlichen Körper von dem Centrum der Bewegung ab in der Richtung der Tangente der Curve hin zu bewegen th. S. Centralkräfte.

1) Suckow's Entw. d. Naturf. 2. Aufl. S. 110. 2) Winkleri philos. cont. P. 3. S. 1357. 3) Suckow's Anfangsgr. d. Phys. u. Ch. 1. Th. S. 142.

**Centripetalkraft**<sup>1</sup>, (*Centripetalis vis*<sup>2</sup>,) bei Centralkräften der Centrifugalkraft entgegengesetzte Antrieb, der, indem er dem bewegten Körper immer nach dem Centrum der Bewegung zu seine Richtung gibt, ihn in seiner krummlinigen Bahn erhält. S. Centralkräfte.

1) Suckow's Entw. d. Naturf. 2. Aufl. S. 110. 2) Winkleri philos. cont. P. 3. S. 1357.

**Centrum**, (*Centrum*<sup>1</sup>,) Mittelpunkt. Die Mitte eines Körpers, oder Körpers, in möglichster Kleinheit oder als ein Punkt d. Man unterscheidet Centrum oder Mittelpunkt der Größe<sup>2</sup>, (*Centrum magnitudinis*,) und Centrum oder Mittelpunkt der Schwere<sup>3</sup>, (*Centrum gravitatis*,) Ersteres ist Mittelpunkt dem Raum nach, von wo aus nach entgegengesetzten Punkten der Peripherie oder der Oberfläche gleiche Distanz ist, letzteres ist Stützpunkt eines Körpers zu Erhaltung des Gleichgewichts. Vgl. Schwerpunkt.

1) nach dem Griechischen Worte *κεντρον* gebildet. Ciceron. Tusc. qu. L. 1. 2. 17. 2) 3) Suckow's Naturf. 2. Aufl. S. 159.

**Centrum corporis longitudinis et rotunditatis**, s. Centrum des Körpers.

**Centrum der Bewegung**, (*Centrum motus*<sup>1</sup>, s. *virium*<sup>2</sup>,) Centralkräften der Punkt, auf den die Wirkung der Centripetalkraft gerichtet ist, und von dem die Centrifugalkraft den bewegten Körper zu entfernen strebt. S. Centralkräfte.

1) 2) Winkleri philos. contempl. P. 3. S. 1357.

**Centrum der Größe**, s. unter Centrum. — der Schwere, Schwerpunkt.

**Centrum des Körpers**, (*Centrum corporis*,) Die Mitte menschlichen Körpers auf seiner vordern Fläche wurde von den Alten in den Nabel versetzt<sup>1</sup>. Riola<sup>2</sup> unterscheidet Centrum *magnitudinis et rotunditatis*. Ersteres fällt in die Symphyse der Beckenknochen, letzteres in den Nabel, welches aber nur in Bezug auf Unterleib richtig ist. Vgl. Anthropometrie.

1) Galeni de placitis etc. l. 6. Doch setzt Galen auch die Körpermitte noch in die Nieren, ingleichen in die Leber (l. epid. 6 et de humor. l.) 2) Anthropogr. l. 2. c. 12.



*Centrum diaphragmatis*, f. Aponeurotische Expansion des Diaphragma's. — *gravitationis*, f. Gravitationspunct. — *gravitatis*, f. Schwerpunct. — *medullare cerebelli*, f. Medullarium des Cerebellums. — *membranosum*, s. *nervosum diaphragmatis*, f. Aponeurotische Expansion des Diaphragma's. — *motus*, f. Centrum der Bewegung. — *mulieris*, f. Uterus. — *nervosum*, f. Cöliacischer Nervenplexus. — *oculi*, f. Crystalllinse. *ovale cerebri*, f. Vieussens's halbeisförmiger Mittelpunkt. *phrenicum*, f. Aponeurotische Expansion des Diaphragma's. — *pyloricus*, f. Hypomochlium. — *semicirculare geminum*, s. *semilunare*, s. *semiovale Vieussensii*, f. Vieussens's halbeisförmiger Mittelpunkt. — *tendineum*, s. *tendinosum diaphragmatis*. i. q. C. phrenicum. — *virium*, f. Centrum der Bewegung. *Cepa*, i. q. Bulbus. — *urethrae*, f. Bulbus der Harnröhre. *Cephale*, in Uebersetzung des Griechischen Wortes  $\kappa\epsilon\phi\alpha\lambda\eta$ , i. q. Kopf.

1)  $\kappa\epsilon\phi\alpha\lambda\eta$ .

*Cephalica*, Cephalische Armvene<sup>1</sup>, (*Cephalica vena*<sup>2</sup>, *Cephalica vena propria*, s. *brachii*, s. *major*<sup>3</sup>, s. *Caephalica*, Cephalische Vene, Hauptvene<sup>4</sup>, Kopfvene<sup>5</sup>, Kopfader<sup>7</sup>, Hauptader<sup>8</sup>, Hauptader des Arms<sup>9</sup>, Große Hauptader<sup>10</sup>, oder Kopfadern<sup>11</sup> des Arms, (*Vena humeraria*<sup>12</sup>, *humeralis*<sup>13</sup>, s. *capitalis*<sup>14</sup>, s. *cubiti exterior*<sup>15</sup>.) hat ihren Namen daher, weil sie von den Alten vornehmlich in Kopfkrankheiten zum Aderlassen gewählt wurde, die darum ihnen hierzu züglicher schien, weil sie bei Thieren sich gewöhnlich in die äußere Jugularvene ergießt; am menschlichen Körper aber ist sie die aus cephalischen Daumvene und andern auf dem Rücken der Hand zusammengetretende, am Arm herausgehende, und zuletzt in die Axillaris sich einmündende Hautvene. Ihr unterer Theil unter der Biegung des Ellbogens wird auch als Kleinere Cephalische Vene (*Vena cephalica minor*<sup>17</sup>, s. *anterior*<sup>18</sup>.) Äußere cephalische Speichenvene<sup>19</sup>, Äußere Spindelblutader<sup>20</sup>, Äußere Ellbogenröhrenvene<sup>21</sup>, (*Vena radialis externa*<sup>22</sup>, s. *dialis externa*<sup>23</sup>, *Funis brachii*<sup>24</sup>.) bezeichnet.

1) Edmerring's Gefäß. S. 231.

2) nach dem Griechischen:  $\eta\ \kappa\epsilon\phi\alpha\lambda\alpha\iota\alpha\ \phi\lambda\epsilon\beta\eta$ . Avicennae canon. l. 1. fen. 1. doctri. 3. c. 4. 3) Schönschmidt's anatol. Tabell. Taf. 9. 4) vitell's (Columbi de re anat. l. 5) Eoder's anat. Tabell. Taf. 123. Fig. 3. Nr. 114. 6) Palsyn's (Anat. übers. v. Huth, 1. B. S. 366. 7) 8) Winslow's anat. Abh. Uel. Berl. 1753, 5. B. S. 157. 9) 10) Plentand's Zergliederungskf. Uel. Leipz. 1789, 1. B. S. 771 u. 773. 11) Winslow's anat. Abh. u. f. a. a. D. S. 158. 12) nach Vesal (de h. corp. fabr. l. 5. c. 7.) 13) Columbi de re anat. l. 6. 14) C. Bauhini theatr. an. l. 4. c. 16) Edmerring's Gefäß. a. a. D. 17) Plentand's Zergliederung Uel. Leipz. 1789, 2. B. S. 773. 18) Spigelii de h. c. fabr. l. 5. c. 19) Edmerring's Gefäß. a. a. D. 20) Winslow's anat. Abh. f. w. a. a. D. 21) Palsyn's Chr. Anat. u. f. w. a. a. D. 22) Schaaersmidt's anatol. Tabell. a. a. D. 23) Palsyn's Chr. Anat. u. f. w. a. a. D. 24) Th. Bartholini anat. libell. 1. c. 6.

*Cephalica linea*, f. Naturlinie. — *pars nervi intercostalis*, f. Cephalischer Theil des Intercostalnerven. — *vena*, s. *brachii*.



Cephalica. — — exterior, s. unter Cephalica. — — major, Cephalica. — — manus, s. Cephalische Daumenvene. — — liana, s. Cephalische Medianvene. — — minor, s. unter Cephalica. — — pollicis, s. Cephalische Daumenvene. — — propria, s. Cephalica.

Cephalicae venae, s. Cephalische Venen.

Cephalicus plexus, s. unter Plerus lymphatischer Gefäße.

Cephaline, nach dem Griechischen gleichlautenden Worte<sup>1</sup> der vordere Theil der Zunge. S. Zunge.

Κεφαλίη. Stephani dict. med. 1564, p. 592.

Cephalische Armvene, s. Cephalica.

Cephalische Daumenvene<sup>1</sup>, (Cephalica vena pollicis<sup>2</sup>, s. manus<sup>3</sup>), Kopfvene<sup>4</sup>, oder Kopfsader<sup>5</sup>, oder Hauptsader<sup>6</sup> des Daumens, (Vena acularia<sup>7</sup>, Salvatella<sup>8</sup>), die gewöhnlich zwischen dem Metacarpus des Daumens und dem des Zeigefingers verläuft, vom Rücken des Daumens herkommende Hautvene, welche am Anfang der cephalischen Armvene angesehen wird. S. Arteria vena.

Sammerling's Gefäß. S. 251. 2) Schaarschmidt's anglol. Tabell. Tab. 9. 3) Spigelii de h. c. fabr. l. 5. c. 7. 4) Palfyn's Chr. Anat. übers. v. Puth, 1. Th. S. 367. 5) Winslow's anat. Abb. Uebers. Berl. 1733, 3. B. S. 161. 6) Pöder's anat. Tabell. Tab. 129. Fig. 1. Nr. 54. 7) Th. Bartholini anat. libell. 1. c. 7. 8) nach Mundinus. S. ebendas.

Cephalische Medianvene, (Vena mediana cephalica<sup>1</sup>), Cephalmedianvene<sup>2</sup>, Mediankopfsader<sup>3</sup>, | Hauptmedianader<sup>4</sup>, ein unbestimmter Verbindungsweig der Median- und der cephalischen Vene. Manche unterscheiden wieder eine größere und eine kleinere, (major et minor<sup>5</sup>.) S. Arteriarum.

1) nach Winslow (exp. anat. lat. vers. T. III. tr. de ven. S. 125.) 2) Palfyn's Chr. Anat. übers. v. Puth, 1. Th. S. 366. 3) Winslow's anat. Abb. Uebers. Berl. 1755, 1. Th. S. 158. 4) Meutaud's Zergliederungsk. Uebers. Leipz. 1782, 1. Th. S. 774. 5) Schaarschmidt's anglol. Tabell. Tab. 9.

Cephalische Vene, s. Cephalica.

Cephalische Venen, (Cephalicae venae.) Dahin gehören außer den eigentlichen cephalischen, oder der cephalischen Armvene, die cephalische Daumenvene und die cephalische Medianvene, (Vena cephalica propria, s. brachii, pollicis et mediana.) S. die vorhergehenden Artikel.

Cephalischer Theil des Intercostalnerven, (Cephalica pars nervi intercostalis<sup>1</sup>), Kopfstück, oder Kopftheil, oder Kopfende<sup>2</sup>, oder Anfang<sup>3</sup>, oder Anfangstheil oder Ursprung<sup>4</sup>, oder Erste Wurzeln<sup>5</sup> des Intercostalnerven, (Origine<sup>6</sup>, s. Principium<sup>7</sup>, s. Radices primae<sup>8</sup> nervi intercostalis,) die am carotischen Canal zusammentretenden und dann gemeinschaftlich in das obere Cervicalganglion des Intercostalnerven übergehenden, oder 1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 3141. 2) 3) Sammerling's Hirn- und Nervenl. S. 315. 4) 5) Meurer's Besch. d. menschl. K. 8. B. S. 115. 6) Halleri de vera nervi intercost. origine diss. 7) Willisii cerebri et nerv. anat. c. 26. 8) Winslow exp. anat. lat. vers. T. III. tr. de nerv. S. 359.

auch gesondert aus ersterem hervor- und in letzteres eintretenden den Nervenzweige des zweiten Astes des dritten und des sechsten Hirnnerven, die nur nach der einseitigen und beschränkten Ansicht, vom Gehirn alle Nerven ausgehen, als der Anfang oder der Ursprung des Intercoastalnerven betrachtet werden können. S. Intercoastal

**Cephalogenesis**, wörtlich Entstehung des Kopfs, ist neuerdings von Styr<sup>1</sup> zur Bezeichnung der Darstellung der genetischen Entwicklung des Kopfs durch die ganze Thierreihe, vom Insect bis Menschen und durch alle Perioden des individuellen Lebens hindurch vom Embryo bis zum höchsten Alter gebraucht worden. Vgl. K

- 1) S. dessen *Cephalogenesis*; s. *capitis ossei structura, formatio et significatio per omnes animalium classes, familias, genera et aetates digestae atque tabulis illustrata*, Monach. 1815, fol.

**Cephalometer**, (*Cephalometrum*,) Kopfmesser. Unter diesem Namen hat Stein<sup>1</sup> ein Instrument bekannt gemacht, das dazu dient, die verschiedenen Durchmesser eines menschlichen Kopfes zu messen. Es besteht aus einem Tastercirkel mit einem Quadranten, auf dessen Flächen die Rolle und Linien der möglichen Entfernung seiner Spitzen angegeben sind.

- 1) G. W. Stein's Beschreibung eines Baromacrometers und eines Cephalometers u. s. w. Cassel 1775, 4. Abbildungen des Instrumentes: in der genannten Schrift und in G. W. Stein's Anleitung zur Geburtshilfe, 7. Aufl. 1. 12. Kupfert. Fig. 2.

(H.)

**Cephalopharyngeus**, (*Cephalopharyngeus*<sup>2</sup>, s. *musculus*,) diejenige Muskelportion des obern Constrictors des Pharynx, welche bisweilen von der Basis des Schädels in ihn übergeht. Constrictoren des Pharynx.

- 1) Mayer's Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 284. 2) Winslow anat. lat. vers. T. IV. tr. de cap. §. 475.

**Cephalotomie**, (*Cephalotomia*,) Kopfzergliederung, anatomische Darstellung der zum Kopf gehörigen Theile. Vgl. K

- 1) Traité de la cephalotomie, par J. B. (ou homme), à Avignon 1748.

**Cera aurium**, i. q. Sordes aurium, s. Ohrenschnitz.

**Ceraceae glandulae palpebrarum**, s. Meibomische Drüsen.

**Cerasum**, i. q. Glaus penis, s. Eichel.

**Ceratioglossus**, s. *musculus*, i. q. Chordroglossus.

**Ceratodes**, i. q. Ceratoides, s. Cornea.

**Ceratoglossus**<sup>1</sup>, (*Ceratoglossus*<sup>2</sup>, s. *musculus*,) Breiter Seitenmuskel der Zunge<sup>3</sup>, Horn- und Zungenmäuslein<sup>4</sup>, (*Musculus keratoglossus*<sup>5</sup>, s. *hyoceratoglossus*<sup>6</sup>,) der Theil des Hyoglossus, welcher von dem großen Horn des Zungenknochens zur Zungenwurzel geht, und von einigen als besonderer Muskel betrachtet worden ist. S. Hyoglossus.

- 1) Mayer's Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 235. 2) von κερως, Horn, und γλῶσσα, Zunge, gebildet. Spigelii de hum. c. fabr. 1. 2 c. 9. 3) Schaal schmidt med. Tabell. Tab. 6. 4) Brown's verdenschte Westr. Musc. v. Spene, Berl. 1704, S. 24. 5) Winslow's anat. Abb. illeber. Berl. 1753, 4. S. 407. 6) nach Schreger (Mém. de l'Acad. de Med. S. 17.

**Ceratoides**, nach dem Griechischen gleichlautenden Worte<sup>1</sup>, i. q. Cornea.

- 1) Κερατοειδής, hornförmig. (Galen de usu part. 1. 10, c. 3.)

**Ceratois**, i. q. Ceratoides, s. Cornea.

**Ceratopharyngeus**<sup>1</sup>, (*Ceratopharyngeus*<sup>2</sup>, sc. musculus,) Breiter Seitenmuskel des Schlundes, Großer Ceratopharyngeus<sup>3</sup>, (*Musculus hyo-cerato-pharyngeus*<sup>4</sup>, Cerato-pharyngeus magnus<sup>5</sup>,) diejenigen Muskelfasern des untern Constrictors des Pharynx, welche vom großen Horne des Zungenbeins entspringen. S. unter Constrictoren des Pharynx, mittlern.

Maner's Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 291. 2) von κερας, Horn und φαρυγξ, Schlund, gebildet. Walter's myol. Handb. 2. Aufl. S. 120. 3) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1735, 4. B. S. 479. 4) nach Douglas (myogr. compar. c. 15.) 5) nach Winslow (expos. anat. lat. v. ir. de cap. S. 479.)

*Ceratopharyngeus musculus magnus*, f. Ceratopharyngeus.  
— *minor*, s. *parvus*, i. q. Chondropharyngeus.

*Cerato-pharyngo-occipitalis musculus*, f. unter Constrictoren des Pharynx, den mittlern Constrictor.

**Cerato-staphylinus**, (*Cerato-staphylinus*<sup>1</sup>, sc. musculus,) Unterer Pterygostaphylinus<sup>2</sup>, (*Epistaphylinus lallius*<sup>3</sup>, s. *Pterygostaphylinus inferior*<sup>4</sup>, sc. musculus.) Unter dem Kinn unterscheiden einige Anatomen einzelne Muskelfasern des Circumflexen Muskels des Gaumens, die sich, (wiewohl nicht immer) an die Wurzel des pterygoideischen Hakens festsetzen und von da seitwärts zur Uvula gehen. S. Circumflexer Muskel des Gaumens.

Heisteri comp. an. ed. rec. nr. 72. f. 38. 2) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1735, 4. B. S. 500. 3) Verdier's Anat. übers. v. Deisch, Augsb. 1744, 1. Th. S. 228. 4) nach Winslow (exp. anat. lat. vers. T. IV. S. 500.)

**Cercis**, nach dem Griechischen gleichlautenden Worte<sup>1</sup>, i. q. Cilius.

Κερκίς.

**Cercolipa**, nach dem Griechischen gleichlautenden Worte<sup>1</sup>, i. q. Cilis.

Κερκολιπα, Cauda salax.

**Cercosis**, desgl.<sup>1</sup>, i. q. Clitoris.

Κερκωσις, von κερκος, Schwanz, gewöhnlich jedoch nur im Sinne einer ungewöhnlichen Vergrößerung dieses Theils. (Paul. Aegin. de re med. l. 6. c. 7.)

**Cerea aurium**, i. q. Sordes aurium, f. Ohrenschmalz.

**Cerebellum**<sup>1</sup>, (*Cerebellum*<sup>2</sup>,) Kleines Hirn<sup>3</sup>, oder Gehirn<sup>4</sup>, Hinterhirn<sup>5</sup>, Hirnlein<sup>6</sup>, Gehirnelein<sup>7</sup>, Kleins Gehirnelein<sup>8</sup>, (*Cerebrum parvum*<sup>9</sup>, s. *privatum*<sup>10</sup>, posterius<sup>11</sup>, Appendix ad cerebrum<sup>12</sup>, Encranium<sup>13</sup>, Encranium<sup>14</sup>, Epencranium<sup>15</sup>, Parencephalus<sup>16</sup>,) der an Volumen gerin-

Großes Expos. d. Physiol. S. 147. 2) Diminutiv von Cerebrum, daher bei den Classikern die zur Speise oder sonstigem Gebrauch benutzten Gehirne kleiner Thiere so bezeichnet werden. S. Apicii de arte coqui l. 2. c. 2., in neuerer Zeit aber allgemein zur Bezeichnung des hinteren und tiefern Gehirns theils angenommen. Vesalii d. h. c. fabr. l. 7. c. 5. 3) Sommering's Hirn- und Nervenl. S. 63. 4) Meusnier's Zergliederungsf. Uebers. v. Petz. 1783, 2. B. S. 49. 5) 6) Ambro. Paracelsus Uebers. v. Meusnier, 1783, 2. B. S. 127. 7) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1735, 4. B. S. 127. 8) Kulmus anat. Tabell. Taf. 8. 9 — 11) C. Bauhini theat. anat. l. 3. c. 15. 12) Meusnier's Zergliederungsf. Uebers. Petz. 1783, 2. B. S. 49. 13 — 15) S. diese Worte. 16) Galeni de usu part. Nic. Regio Catabr. interp. l. 8. c. 13.



gere, übrigen der Hauptmasse des Gehirns, oder dem sogenannt großen Gehirn analog gebildete, nur durch die parallele Lage seiner Windungen und mehrere eigenthümliche Formen derselben von ihm sich unterscheidende Gehirntheil, in dem hintern und tiefsten Theil der Hirnschale befaßt, und von dem darüber liegenden hintern Theil des großen Gehirns, durch einen eignen Fortsatz der harten Hirnhaut, als durch eine Scheidewand, räumlich abgesondert, mittelst seiner Markschenkeln aber mit demselben doch in innigstem Zusammenhang. S. Gehirn.

**Cerebellumarterien**, (*Arteriae cerebelli*,) Arterien des kleinen Gehirns. Als solche werden unter den zum Cerebellum gehenden Arterien insbesondere a) eine obere Arterie <sup>1</sup>, (*arteria cerebelli superior* <sup>2</sup>, s. *profunda cerebelli* <sup>3</sup>,) welche Basililararterie unmittelbar vor ihrer Spaltung in die tiefen Cerebellumarterien auf jeder Seite abgibt, die zuweilen auch mehrfach ist, deren tief eindringende Zweige wohl auch den Nahmen tiefe Arterien, (*Arteriae cerebelli profundae* <sup>4</sup>,) führen, und b) eine untere <sup>5</sup>, (*Arteria cerebelli inferior* <sup>6</sup>,) unterschieden, deren wohl mehrere, nämlich eine größere <sup>7</sup> und kleinere <sup>8</sup>, (*major et minor* <sup>10</sup>,) aufgeführt werden, und rückwärts aus der Basililararterie oder auch der Vertebralarterie einer jeden Seite entspringen. unter Subclaviculararterien, Basililararterie.

1) Sömmerring's Gefäßl. S. 128.

2) Halleri icon. anat. fasc.

p. 10.

3) nach Murray (descr. arter. c. h. p. 2.)

4) Mayer

Beschr. d. Blutgefäße, S. 83.

5) Sömmerring's Gefäßl. S. 126.

Halleri icon. anat. fasc. 8. p. 8, wo auch Varietäten derselben angegeben sind.

7 — 10) Foder's anat. Tafeln und tab. anat. tab. 95. f. 5.

43 n. 44.

**Cerebralarterien**, (*Cerebrales arteriae* <sup>1</sup>,) im allgemeinen Synonym von Gehirnarterien. Insbesondere werden aber die beiden Hauptäste, in welche sich die innere Carotis theilt, als vordere und hintere, (*Arteria cereбрalis anterior* <sup>1</sup> et *posterior*) so bezeichnet. S. unter Carotiden, innere Carotis.

1) 2) Leber's prael. anat. ed. nov. Vind. 1778, p. 229.

**Cerebralbedeckungen**, s. Gehirnhäute.

**Cerebralcarotis**, (*Cerebralis carotis* <sup>1</sup>,) Innere Carotis oder Kopfarterie <sup>2</sup>, Hirncarotis <sup>3</sup>, Gehirnarterie <sup>4</sup>, Hirnschlagader <sup>5</sup>, Innere Schlafarterie <sup>7</sup>, oder Schlupfader <sup>8</sup>, oder Halspulsader <sup>9</sup>, oder Hauptschlagader <sup>10</sup>, Innerliche Lustader des Halses <sup>11</sup>, (*Arteria carotis interna* <sup>12</sup>, s. *Carotis interna* <sup>13</sup>, s. *interior* <sup>14</sup>, s. *posterior* <sup>15</sup>.)

2) Halleri el. physiol. T. I. l. 10. s. 5. §. 2.

2) Meientaud's

3) 4) Sömmerring's

Gefäßl. S. 117.

5) Haller's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v.

Velting, 1. Th. S. 284.

6) Meientaud's Vergleichend. u. f. w. 2.

7) Palfyn's Hdr. Anat. libers. v. Nuth, 1. Th. S. 538.

8) Meiermann's Physiol. 2. Th. S. 131.

9) Fadelot's Lehre von

Natur des gesunden menschl. K. libers. v. Wanzersbiller, S. 192.

10) Meientaud's Vergleichend. u. f. w. a. a. D.

11) Ambro. P.

Wundarz. libers. v. Uffenbach, Frankf. a. M. 1501, S. 191.

12) Winslow exp. anat. lat. vers. T. III. tr. de art. §. 71.

14) Bartholini anat. libell. 2. c. 3.

15, Arteria encephalica <sup>16</sup>, s. capitis profunda <sup>17</sup>,) der zweite Hauptast der gemeinschaftlichen Carotis, der in der Gegend des Kehlkopfs von der äußern, oder der Facialcarotis, abgeht, durch den ihm so benannten carotischen Canal in mehrfachen Krümmungen in die Hirnschädelhöhle gelangt, und vorzüglich dem Gehirn und erst zunächst dem als großes Gehirn unterschiedenen Gehirntheil Blut führt. S. Carotiden.

16) Winslow exp. l. c. §. 49.

17) Spigelii de h. c. fabr. l. 6.

cc. 2. 17) Walter's angiol. Handb. S. 27.

Cerebrale systema, s. Cerebralsystem.

Cerebralerhabenheiten des Hirnschädels, (Juga cerebra <sup>1</sup>,) Hügel der Schädelhöhle <sup>2</sup>, die an der innern Fläche fast aller Knochen, welche die Gehirnhöhle bilden helfen, bemerkt werden, in die Zwischenräume der Windungen des Gehirns tretenden Erhabenheiten. S. Gehirnschädel.

1) Foder's anat. Handb. 1. B. S. 28.

2) Mayer's Besch. d. menschl.

K. 1. B. S. 265.

Cerebrales arteriae, s. Gehirnarterien, auch Cerebralarterien. —

vitates, s. Hirnhöhlen. — fossae, s. Gehirngruben. — gyri,

Windungen des Gehirns. — nervi, s. Gehirnnerven. — sen-

nae, s. Cerebralsinne. — venae, s. Cerebralvenen.

Cerebralsfläche der großen Sphenoidalsflügel, (Cerebralis superficies alarum magnarum ossis sphenoidi <sup>1</sup>,) Gehirnfläche <sup>2</sup>, Innere oder Obere Fläche <sup>3</sup> der großen Flügel der Flügelknochen, die innere, dem Gehirn zugekehrte gemehrte Fläche der großen Sphenoidalsflügel, auf welcher der vordere Theil der hintern Loben des Gehirns ruht. S. Sphenoidalknochen.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. §. 210.

2) Mayer's

Besch. d. menschl. K. 1. B. S. 333. 3) Foder's anat. Handb. 1. B. S. 72.

Cerebralfunction, s. Cerebralleben. — höhlen, s. Hirnhöhlen.

Cerebralia juga, s. Cerebralerhabenheiten des Hirnschädels.

Cerebralis arteria, anterior et posterior, s. Cerebralarte-

rien. — carotis, s. Cerebralcrotis. — functio, s. Cerebral-

leben. — substantia, s. Cerebralsubstanz. — superficies ala-

rum magnarum ossis sphenoidi, s. Cerebralsfläche der großen

sphenoidalsflügel. — vena, s. Cerebralvene. — vita, s. Cere-

bralleben.

Cerebralleben, (Cerebralis vita, s. functio <sup>1</sup>,) Gehirn-

oder Cerebralthätigkeit, Gehirn- oder Cerebralfunctio,

in Bewußtseyn, sinnliche Wahrnehmung und gefühlvolles Wir-

ken auf die Außenwelt sich reflectirende geistige Leben, in so fern kör-

perliche Vorgänge im Gehirnorgan als Ursächliches dabei vorausgesetzt

werden. S. Gehirn, auch Geist.

1) Halleri elem. physiol. T. IV. l. 10. s. 8. §. 25.

Cerebralnerven, s. Gehirnnerven.

Cerebralsinne, (Cerebrales sensus) So bezeichnet Bur-

dach <sup>1</sup> diejenigen höhern Sinne, deren Organe unmittelbar am das

Haupt gelagert sind und von dem Gehirn unmittelbar Nerven erhal-

ten. Sie unterscheiden sich wieder in niedere <sup>2</sup>, (Geschmack und

Geruch,) und höhere <sup>3</sup>, (Gehör und Gesicht.) S. Sinne.

1) Encycl. 2. B. §. 1295.

2) 3) S. ebendas. §. 1294 u. 1297.



**Cerebralsubstanz**, (*Cerebralis substantia* <sup>1</sup>.) Gehirns-  
stanz <sup>2</sup>, Gehirnmasse <sup>3</sup>, Hirnsbstanz <sup>4</sup>, Hirnmasse <sup>5</sup>,  
Sensible Substanz des Gehirns <sup>6</sup>, (*Massa cerebri* <sup>7</sup>, *Me-*  
*dulla calvariae* <sup>8</sup>.) die eigene mit Gefäßen durchwebte, aber doch vom  
Gefäßbau merklich unterschiedene, weiche, gleichförmige Masse, welche  
wesentlich das Gehirn mit seiner Fortsetzung, dem Rückenmark, consti-  
tuirt und das Material desselben abgibt. Man unterscheidet zunächst  
in ihr wieder, eine äußere oder *Corticalsubstanz* und eine innere  
oder *Medullarsubstanz*, wie auch eine intermediäre gelbe, in-  
gleichen theilweise schwarze Substanz. S. alle diese Artikel.  
Vgl. Gehirn.

- 1) Winslow *expos. anat. lat. vers.* T. IV. tr. de capite §. 54. 2)  
Nell's Arch. für d. Physiol. 1. B. 2. St. S. 32. 3) Hildebrandt's Lehrb.  
d. Anat. 4. B. §. 2333. 4) 5) Sommerling's Hirn- und Nervenl.  
S. 25 u. 20. 6) Burdach's Encyclop. d. Heilkunst. 2. B. §. 1351. 7)  
Chambon *observ. clin. obs.* 29. 8) nach Plato (s. *Vidi Vidi*  
de anat. 1. 7. c. 3.)

**Cerebralsystem** <sup>1</sup>, (*Cerebrale systema*.) das Gehirn nebst dem  
Rückenmark, mit den von beiden ausgehenden Nerven und de-  
ren Verbreitungen in die Sinnes- und Bewegungsorgane, als ein  
Ganzes betrachtet, besonders im Gegensatz des Gangliensystems. Vgl.  
Nervensystem.

- 1) Noll über die Eigenschaften des Gangliensystems und sein Verhältnis zum  
Cerebralsysteme im Archv f. Physiol. 7. B. 2. H. S. 189.

**Cerebralthätigkeit**, s. Cerebralleben.

**Cerebralvene**, (*Cerebralis vena* <sup>1</sup>.) Hirn- oder Gehirn-  
vene, Hirn- oder Gehirnblutader <sup>2</sup>. Als solche wird insbe-  
sondere die innere Jugularvene, so weit als sie bloß vom Gehirne  
empfangenes Blut führt, also bis zu der in sie gewöhnlich einmün-  
denden Facialvene herab, bezeichnet. S. unter Jugularvenen,  
innere Vene.

- 1) Haller's ch. physiol. T. IV. 1. 10. s. 5. 6. 31. 2) Meutaud's Zer-  
gliederungsf. Heb. rs. Leipz. 1782, 1. B. S. 767.

**Cerebralvenen**, (*Cerebrales venae* <sup>1</sup>.) Hirn <sup>2</sup> oder Ge-  
hirnvenen, Hirn- oder Gehirnblutadern, im allgemeinen  
alle die kleinern und unbezeichneten venösen Gefäße, welche von al-  
ten Gehirntheilen das Blut aufnehmen, und in die Gehirnsinus lei-  
ten, vorzüglich aber auf der Oberfläche des Gehirns zwischen den  
Gehirnwindungen sichtbar sind. S. Gehirnsinus.

- 1) Mayer's Besch. d. Blutgef. S. 102. 2) Sommerling's Gefäßl. S. 245.

**Cerebralwindungen**, s. Windungen des Gehirns.

**Cerebrum** <sup>1</sup>, (*Cerebrum* <sup>2</sup>.) wird häufig, besonders von frühern  
Anatomen, wie auch *Encephalon* <sup>3</sup>, *Encephalos* <sup>4</sup>, *Encephalum* <sup>5</sup>,  
in der Bedeutung von Gehirnorgan überhaupt genommen. Insbe-  
sondere aber bezeichnet man damit, wie auch noch schärfer als Großes  
Hirn <sup>6</sup> oder Gehirn <sup>7</sup>, (*Cerebrum magnum* <sup>8</sup>, s. *anterior* <sup>9</sup>.)

- 1) Görtz's Erpf. d. Physiol. S. 275. 2) Vesalii de h. c. fabr. 1. 7.  
c. 4. Ueber die Etymologie dieses Wortes s. Veslingii syntagm. anat. c.  
not. Blasii c. 14. v. cerebrum. 3 — 5) S. diese Worte. 6)  
Sommerling's Hirn- und Nervenl. S. 31. 7) Mayer's Besch. d.  
menschl. K. 6. B. S. 107. 8) Leheri pracl. anat. ed. nov. Vind.  
1778, p. 406. 9) Vesalii de h. c. fabr. 1. c.



ansehnlichen über der als Tentorium des Cerebellums unterschiedenen Verlängerung der harten Hirnhaut, und in dem vordern Theile der Hirnschale gelegenen Gehirntheil, dessen Fortsätze oder Schenkel gleichen des Cerebellums zu der Annularprotuberanz oder dem Ausgange des verlängerten Hirnmarks zusammentreten, wodurch dann vereinschaftlich erst das Gehirnorgan gebildet wird. S. Gehirn.

*Cerebrum abdominale*, s. Coeliacischer Nervenplexus. — *anterius*, s. *Cerebrum*. — *longum*, s. Rückenmark. — *magnum*, *Cerebrum*. — *oblongatum*, s. Rückenmark. — *parvum*, s. *Minorius*, s. *privatum*, s. Cerebellum.

*Cerumen*, *Cerumen aurium*, *Cerumina aurium*, s. Ohrenschmalz.

**Cervicalarterien**, (*Cervicales arteriae* <sup>1</sup>), Nackenarterien: puls = oder schlagadern <sup>2</sup>, Halsarterien, oder puls = oder schlagadern. Als solche werden unterschieden: a) unbestimmt als Arterie <sup>3</sup>, oder puls = <sup>4</sup> oder schlagader, Nackenarterie, oder puls = oder schlagader, (*Arteria cervicalis* <sup>5</sup>), als Synonym der aus der Subclaviculararterie entspringenden untern thyreoideischen Arterie, von ältern Anatomen <sup>6</sup> aber auch als Synonym der Vertebraarterie, ingleichen der Basilararterie <sup>7</sup>, b) eine vordere, (*anterior*), ebenfalls als Synonym der untern thyreoideischen Arterie <sup>8</sup>, (s. unter Thyreoideische Arterie,) gewöhnlicher aber als Zweig derselben <sup>9</sup>, der auch aufsteigende (*A. cervicalis ascendens* <sup>10</sup>), genannt wird, welche Benennung <sup>11</sup>, c) wie auch oberflächliche (*A. cervicalis superficialis* <sup>12</sup>), Oberste Rückenarterie <sup>13</sup>, (*A. dorsalis suprema* <sup>14</sup>, s. *thyroidea ascendens* <sup>15</sup>), einem andern Zweig der untern thyreoideischen Arterie ertheilt wird, sich oberhalb in mehrere Muskeln des Nackens verbreitet, d) eine hintere <sup>16</sup>, (*posterior* <sup>17</sup>), auch tiefe Nackenarterie <sup>18</sup>, (*A. cervicalis profunda* <sup>19</sup>), ein anderer Zweig der Subclaviculararterie, der sich in die tiefern Gegenden des Nackens verbreitet, e) eine oberflächliche, (*transversalis*), als Synonym der transversellen Schulterblattsarterie <sup>20</sup>, der aufsteigenden Cervicalarterie <sup>21</sup> und der folgenden f) eine obere und flache Nackenarterie <sup>22</sup>, (*A. cervicalis superior*, s. *superficialis* <sup>23</sup>), auch ein Ast der Subclaviculararterie, g) eine unterste Nackenarterie <sup>24</sup>, (*A. cervicalis ima* <sup>25</sup>), welche gewöhnlich die erste Dorsalarterie aus der obern Intercostalarterie sich endigt, h) eine tiefe Nackenarterie <sup>26</sup>, (*A. cervicalis profunda* <sup>27</sup>), als Synonym der hintern, aber auch als ein bez.

(2) Pientaud's Zergliederungsf. Uebers. Leipz. 1782, 1. B. S. 688. 3) Walsby's Hirn. Anat. übers. v. Huth, 1. Th. S. 336. 4) Winslow's Anat. Abh. Uebers. Berl. 1733, 3. B. S. 45. 5) nach Winslow (expos. anat. lat. v. T. III. tr. de arter. §. 91. 6) Laurentii hist. anat. l. 4. c. 10. 7) Vieussens neurogr. l. 1. c. 6. 8) Halleri icon. anat. fasc. 2. tab. 1. 9) Pientaud's Zergl. u. f. w. S. 689, Note. Winslow expos. anat. etc. §. 92. 10) Halleri fasc. icon. anat. fasc. 2. 6. 7. 8. p. 60. 11) Edmerring's Gefäß. S. 184. 12) Maner's Besch. d. Blutgef. 2. Aufl. S. 125. 13) 14) Edmerring's Gefäß. a. a. D. 15) Murray descr. art. diss. l. p. 7. 16) 17) nach Winslow (a. a. D. §. 93.) 18) 19) Edmerring's Gefäß. S. 197. 20) nach Murray (a. a. D. p. 11.) 21) Edm. Note 12. 22 — 23) Edmerring's Gefäß. S. 195 u. 194. 24) 25) E. ibendaf. S. 197.

sonders unterschiedener Zweig der ersten Intercostalarterie <sup>28</sup>. Auch werden unbestimmte Zweige der äußern Carotis als eine vordere und obere Halsarterie <sup>29</sup>, (A. cervicalis anterior et superior <sup>30</sup>) und der Occipitalarterie als hintere und obere Halsarterie <sup>31</sup>, (A. cervicalis posterior et superior <sup>32</sup>), unterschieden. S. besonders unter Subclaviculararterie.

28) S. ebendas. S. 185.

29 — 32) Palsyn's Chr. Anat. u. s. w. a.

a. D. S. 327 u. 358.

**Cervicaldrüsen**, (Cervicales glandulae <sup>1</sup>), diejenigen lymphatischen Drüsen, mit denen die Cervicallymphgefäße reichlich versehen sind. S. Cervicallymphgefäße.

1) Hildebrandt's Legeb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 257.

**Cervicale ganglion cardiacum imum, inferius, infimum, magnum, medium, olivare, s. ovale; s. primum, secundum, superius, s. supremum, tertium, thyreoideum, ultimum**, s. unter Cervicalganglien. — **ligamentum**, s. Cervicalligament.

**Cervicales arteriae**, s. Cervicalarterien. — **circuli venosi medullae spinalis**, s. unter Venenringe des Rückenmarks. — **glandulae**, s. Cervicaldrüsen. — **musculi**, s. Nackenmuskeln. — **nervi**, s. Cervicalnerven. — **plexus**, s. unter Cervicalvenen. — **venae anteriores, posteriores**, s. Cervicalvenen. — **lymphaticae**, s. Cervicallymphgefäße.

**Cervicalganglien**, (Cervicalia ganglia <sup>1</sup>), Halsganglien <sup>2</sup>, Halsknoten <sup>3</sup>, Halsnervenknoten <sup>4</sup>, Nackennervenknoten <sup>5</sup>, die in dem Cervicaltheile des Intercostalnerven sich bildenden Nervenganglien, deren insbesondere folgende unterschieden werden: a) ein beständiges oberes, Oberstes <sup>6</sup>, Großes <sup>7</sup>, ober Erster <sup>8</sup> oder Olivenförmiger <sup>9</sup> Halsknoten, (Ganglion cervicale superius <sup>10</sup>, s. supremum <sup>11</sup>; s. magnum <sup>12</sup>, s. primum <sup>13</sup>, s. olivare <sup>14</sup>, s. ovale, Plexus gangliiformis cervicalis <sup>15</sup>), b) ein unbeständiges mittleres <sup>16</sup>, Schilddrüsenknoten <sup>17</sup>, (Ganglion cervicale medium <sup>18</sup>, s. thyreoideum <sup>19</sup>), oder in seltenen Fällen auch wohl zwei mittlere <sup>20</sup>; c) ein beständiges unteres <sup>21</sup>, Unterstes <sup>22</sup>, Unterster Kehlkopfknotten <sup>23</sup>, Herzknoten <sup>24</sup>, (Ganglion cervicale inferius <sup>25</sup>, s. ul-

1) Winslow exp. anat. lat. vers. T. III. tr. de nerv. §. 365. 2) Palsyn's Chr. Anat. übers. v. Duth, 1. Th. S. 402. 3) Winslow's

anat. Abb. Uebers. Berl. 1753, 3. B. §. 365. 4) Pöder's anat. Tafeln,

Taf. 165 — 168. 5) Meutaud's Zergliederungsk. Uebers. Pöps. 1782,

2. B. S. 142. 6 — 8) Sömmerring's Hirn- und Nervenl. §. 316.

9) Meutaud's Zergliederungsk. Uebers. Pöps. 1782, 2. B. S. 142. 10)

Neubauer de nerv. intercost. cervicali diss. §. 8. 11) Haller's el.

physiol. T. IV. l. 10. s. 5. §. 41. 12) Meutaud's Zergliederungsk.

u. s. w. a. a. D. 13) Winslow exp. anat. lat. vers. T. III. tr. de

nerv. §. 366. 14) Meutaud's Zergliederungsk. u. s. w. a. a. D. 15)

Willisii cerebri et nervor. anat. c. 26. 16) Sömmerring's

Hirn- und Nervenl. §. 320. 17) Mayer's Besch. d. menschl. K. 8. B.

S. 150. 18) 19) nach Haller (elem. physiol. T. V. l. 4. s. 5. §. 25.)

20) Mayer's Besch. u. s. w. a. a. D. S. 149. 21) Sömmerring's

Hirn- und Nervenl. §. 321. 22) Mayer's Besch. u. s. w. a. a. D.

S. 157. 23) 24) Mayer's Besch. u. s. w. a. a. D. S. 157 u. 158.

25) Neubauer de nerv. etc. diss. §. 25.



imum <sup>26</sup>, s. infimum <sup>27</sup>, s. tertium <sup>28</sup>, s. thyreoideum in-  
 ius <sup>29</sup>, s. ultimum <sup>30</sup>, s. cardiacum <sup>31</sup>, s. secundum <sup>32</sup>,)  
 auch wohl doppelt sich findet, auch nicht selten mit vorigem ver-  
 magt worden ist, und von dem ein Theil d) auch noch besonders  
 Unterster, (imum <sup>33</sup>, s. infimum, s. tertium <sup>34</sup>, s. cardia-  
 um <sup>35</sup>,) unterschieden wird. S. Intercostalnerve.

35) Sommering's Hrn: und Nervenf. §. 321. 27 — 32) Mayer's  
 Besch. n. f. w. a. a. D. 32) Walther prog. I. de pari intercost. et.  
 vagi an. p. 14. 33) Neubauer de nerv. etc. diss. §. 82. 34).  
 Walther l. c. p. 16. 35) Neubauer de nerv. etc. diss. l. c.

Cervicalis, e, zum Nacken gehörig <sup>1</sup>.

Das Wort ist erst in späterer Zeit als ein Adjectiv von cervix gebildet. Doch  
 findet sich cervicale, (cervical,) beim Plinius (hist. n. l. 20. c. 20) und  
 andern Classikern als Substantiv in der Bedeutung von Hauptkissen. Vgl. Nacken.

Cervicalis arteria, s. Basilararterie, ingeleichen unter Thyreoidei-  
 Arterien, untere. — — ascendens, anterior, ima, posterior,  
 profunda, superficialis, superior, transversalis, s. unter Cer-  
 vicalarterien. — musculus capitis anticus, s. Cervicalmuskel des  
 Kopfes nach vorn. — — descendens, s. descendens. — —  
 Menembroekii, s. Absteigender Cervicalmuskel. — nervus  
 intercostalis, s. pars nervi intercostalis, s. Cervicaltheil des  
 Intercostalnerven. — plexus ganglioformis. s. unter Cervical-  
 ganglien, oberes Ganglion. — vena, s. unter Cervicalvenen. — —  
 profunda, s. Tiefe Nackenvene.

Cervicalligament, (Cervicale ligamentum <sup>1</sup>, Cervicale li-  
 gamentum posterius <sup>2</sup>,) Nackenband <sup>3</sup>, Hinteres Nacken-  
 band <sup>4</sup>, (Ligamentum nuchae <sup>5</sup>,) das von der äußern Protuber-  
 anz des Occipitalknochens aus, an alle getheilten Spitzen der spinö-  
 se Proceße der sämtlichen Halswirbel sich ansetzende Ligament, wel-  
 ches zur Befestigung der Halswirbel unter sich und sämtlicher an  
 den Kopf beiträgt, vorzüglich aber den starken Muskeln des Nackens  
 Grundlage dient. S. Halswirbel, ingeleichen Halsmuskeln.

Léber i prael. anat. ed. nov. Vindsb. 1778, p. 116. 2) nach Wins-  
 low (exp. anat. lat. vers. T. I. tr. de oss. rec. §. 342.) 3) Mayer's  
 Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 123. 4) Winslow's anat. Abh. Uebers.  
 Berl. 1733. 1. B. §. 337. 5) Léber i prael. etc. l. c.

Cervicallymphgefäße, (Venae lymphaticae cervicales, <sup>1</sup>,)  
 Lymphgefäße des Nackens, die mit denen, welche die hintere Jugu-  
 lare begleiten, in Verbindung stehen. S. Lymphgefäße.

Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2791.

Cervicalmuskel des Kopfs nach vorn, (Cervicalis mus-  
 culus capitis anticus <sup>1</sup>,) Vorderer größerer gerader Kopf-  
 muskel <sup>2</sup>, Vorderer Nackenmuskel <sup>3</sup>, oder Vorderer Hals-  
 muskel des Kopfs, Innerer oder Vorderer großer gera-  
 der Kopfmuskel <sup>4</sup>, (Musculus rectus capitis anticus major <sup>5</sup>,  
 rectus capitis internus major <sup>6</sup>, s. transverso-sphoenocci-  
 lis anticus longus <sup>7</sup>, s. trachelo-basilaris major <sup>8</sup>, s. trache-

nach Hildebrandt (Lehrb. d. Anat. d. M. 2. B. S. 1127.) 2) nach  
 Sommering (Muskel, §. 206.) 3) Hildebrandt's Lehrb. n. f. w.  
 a. a. D. 4) 5) Mayer's Besch. d. menschl. K. 3. B. S. 220. 6)  
 nach Comper (myotom. ref. c. 22.) 7) nach Schreger (Nomencl. d.  
 Musc. S. 14.) 8) (Legrand trachelo-basilaire) nach Chaussier (expo-  
 sitionnaire des musc. etc. p. 60.)



lo-sub-occipitalis<sup>9</sup>), der länglich platte Muskel, welcher von der vordern Wurzel der Querproceße des dritten bis sechsten Halswirbels mit eben so viel schnigten Enden entspringt, sich, aufwärts steigend, vor dem condyloideischen Proceß am Basilarproceß des Occipital-knochens befestigt, und den Kopf etwas schräg zur Seite zieht, aber mit dem gleichnamigen gemeinschaftlich wirkend, gerade vorwärts beugt. S. Kopfmuskeln.

9) (Trachelo-sous-occipitien,) nach Dumeril (s. Cuvier's Vorles. über vergl. Anat. S. 287.)

Cervicalmuskeln, s. Nackenmuskeln.

Cervicalnerven, (Cervicales nervi<sup>1</sup>), Hals<sup>2</sup>= oder Nacken-nerven<sup>3</sup>, (Nervi intervertebrales colli<sup>4</sup>, Nervi nuchae<sup>5</sup>, s. cervicis<sup>6</sup>), die am Hals aus dem Rückenmark hervortretenden Nerven, welche, da sie wie alle primäre Nerven auf beiden Seiten nahe an einander ihren Ursprung nehmen, auch als so viel Paare, als Nerven auf jeder Seite sind, bezeichnet werden. So bemerkt man ein erstes Cervicalnerveng Paar, (Par primum nervorum cervicalium, s. spinalium<sup>7</sup>, s. Willisianum<sup>8</sup>, s. cervicis motorium<sup>9</sup>, s. occipitale nervorum cervicalium,) das zwischen dem Occipital-knochen und dem Atlas oder ersten Halswirbel hervortritt und von Willis<sup>10</sup> und andern ältern Anatomen den Cerebralnerven beigezählt und daher auch als Hinterhauptsnerv<sup>11</sup>, Nerv unter dem Hinterhaupte<sup>12</sup>, (Nervus infraoccipitalis<sup>13</sup>, s. suboccipitalis<sup>14</sup>, s. occipitalis<sup>15</sup>, s. infraspinalis, auch Nervus Aschianus<sup>16</sup>, s. subcervicalis vertebralis<sup>17</sup>), bezeichnet wird, sodann ein zweites bis siebentes Cervicalnerveng Paar, (Par secundum ad septimum,) deren jedes zwischen zwei Halswirbeln, und ein achttes, (octavum,) das zwischen dem letzten Halswirbel und dem ersten Thoraxwirbel hervortritt. S. Rückenerven.

1) Winslow exp. an. lat. vers. T. III. tr. de nerv. §. 157. 2) 3)

Mayer's Besch. d. menschl. K. 8. B. S. 5. 4) Schaarschmidt's nevrol. Tabell. Tab. 12. 5) Avicennae gloss. ad Can. l. 1. fen. 1.

D. V. 6) Halleri elem. physiol. T. IV. l. 10. s. 6. §. 55. 7)

Asch diss. de primo pare nerv. med. spinal. Goett. 1750, 4. 8) Bourdon tab. anat. 8. fig. 1. 9) M. Hofmanni id. mach. h. anat.

phys. Altd. 1705, l. 25. §. 31. 10) cerebri et nerv. anat. c. 29.

11) Mayer's Besch. d. menschl. K. 8. B. S. 11. 12) 13) Wins-

low's anat. Abh. Uebers. Berl. 1753, 3. B. S. 264. 14) nach Wins-

low (expos. anat. lat. vers. T. III. tr. de nerv. §. 154.) 15) Bidloo

anat. tab. 7. 9. 10. 16) Haase de gangl. nerv. diss. Lips. 1772, p. 44.

17) nach Monro (diss. d. nerv.)

Cervicaltheil des Intercostalnerven, (Cervicalis pars nervi intercostalis<sup>1</sup>, Nervus intercostalis cervicalis<sup>2</sup>), Halsstück des großen sympathischen Nerven<sup>3</sup>, der Intercostalnerv von seinem Austritt aus dem carotischen Canal an, bis zum untersten Cervicalganglion, von wo aus er in das obere thoracische Ganglion und zugleich in den thoracischen Theil übergeht. S. Intercostalnerv.

1) Mayer's Besch. d. menschl. K. 8. B. S. 126. 2) nach Meubauer (descr. an. nervor. cardiacorum s. 1.) 3) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. §. 318.

Cervicalvene, s. unter Cervicalvenen.

Cervicalvenen, (Cervicales venae,) Nackenvenen, Halsvenen, Halsblutadern, im allgemeinen die die Cervicalarter-

begleitenden Venen. Insbesondere werden aber a) von den hinteren Nackenmuskeln in Geflechten zusammentretende (Venae cervicales posteriores, Plexus venarum cervicalium posteriores<sup>1</sup>, Musculus venosi colli posteriores<sup>2</sup>, Plexus cervicales<sup>3</sup>), und b) die kleineren von den vorderen Nackenmuskeln kommenden Venen, (Venae cervicales anteriores<sup>4</sup>, Plexus colli<sup>5</sup>, Musculus venosi colli<sup>6</sup> anteriores,) darunter begriffen, welche beide sechs bis sieben Stämme sich in die Vertebralevene ergießen. Andere Anatomen unterscheiden nur eine in die Vertebralevene einmündende Vene als Cervicalvene, (Venae cervicalis, s. Musculus inferior.) S. unter Jugularvenen, äußere Vene.

Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. Th. S. 2667. 2) Sömmerring's Gefäßl. S. 255. 3) Mayer's Besch. d. Blutgef. S. 214.

4) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. 5) Mayer's Besch.

u. f. w. a. a. D. 6) Sömmerring's Gefäßl. a. a. D.

**Cervico - dorso - costalis musculus**, i. q. Serratus musculi porticus superior. — **mastoideus musculus**, i. q. Splenius capitis. — **scapularis musculus**, i. q. Rhomboideus musculus inferior. — **mastoideus musculus**, i. q. Splenius capitis.

**Cervicositas**, f. Halsstarrigkeit.

**Cervicula**, Diminutiv von Cervix, f. Halschen.

**Cervix**, f. Nacken, auch Hals. — **costae**, f. Hals der Rippen.

— **mallei**, f. Hals des Malleus. — **ossis**, f. Hals eines Knochens. — **femoris**, f. Hals des Schenkelknochens. — **radii**, f. Hals des Radius. — **scapulae**, f. Hals des Schulterknochens. — **tali**, f. Hals des Talus. — **ulnae**, f. Hals der Ulna.

**uteri**, i. q. Vagina, f. auch Uterushals. — **vesicae**, f. Blasen-

hals, auch Urethra.

**Costicillus** <sup>1</sup> **cotyloideus**, f. Knorpelring des Acetabulum's. —

**Cystus**, f. unter Eustach's Tuba.

**Cingulum**, f. eigentlich ein Hauptgürtel, Diminutiv von Cestus, Gürtel.

**Sigmoidische Ausschnitte der Ulna**, f. Sigmoidische Cavitäten der Ulna. — **Oeffnung der Niere**, f. Winslowsches Ostium.

**Sigmoidischer Ausschnitt des Untertiefers**, f. Sigmoidische Oeffnung des Untertiefers.

**Chaete**, nach dem Griechischen gleichlautenden Worte<sup>1</sup>, hat hier

entweder die Bedeutung von Tuba, oder Thiermähne, ist indessen

zur Bezeichnung der Hinterhauptshaare bei Menschen angewendet worden<sup>2</sup>. S. Haupthaare.

**Χαίτη**. 2) S. Gorraei defin. med. h. v.

**Albinos**, dergleichen<sup>1</sup>, hat die besondere Anwendung auf Be-

zeichnung des Mundes und der Kinnladen gefunden<sup>2</sup>. S. Mund-

knäuel.

**Χαλινος**, frenum s. habena. 2) S. Stephani dict. med. ed. 1564,

p. 681.

**Chamia**, f. Chemie.

**Chaomantie**, (*Chaomantia*<sup>1</sup>), vermeintliche Kunst, aus Luft-

strömen, Winden, Gewittern u. f. w. durch Divination die Zukunft

abzuspähen, (vgl. Aeromantie,) und insbesondere von Paracelsus

aus Chaos und παντρία gebildet.

Mat. physiol. Realw. II. B.



sus<sup>2</sup> mit der Geomantie, Hydromantie und Pyromantie unter die unsichern Künste gezählt. S. Divination. Vgl. auch Chaos.

2) philosophiae sagicis l. 1. (in dessen Werken, Straßb. 1616, 2. Th. S. 364)

**Chaos**, (*Chaos*<sup>1</sup>). Es ist dem menschlichen Geiste durch sein ihm eigenthümliches Streben nach einem gewissen festen, wenn gleich nie erreichten, noch erreichbaren Endziele, (da die geistige Natur ohne eigne Vernichtung, zu keinem absoluten Sättigungspunct ihres Belangens, zu keiner völligen Befriedigung ihres Bedürfnisses gelangen kann,) nahe gelegt, auch in der Reflexion über die Außenwelt, ob die Natur überhaupt, den Stoff alles Seyns als das Erste, und die Grundlage, das diesen Stoff aber Zusammenfügende und Zusammenhaltende, und so die Form Bedingende, als etwas Hinzugefügtes und von jenem Verschiedenes zu denken.

So entstand auch in den mannigfaltigen Theorien über Weltenbildung überhaupt, die, da Poesie durchaus der Philosophie, eben wie Einbildungskraft dem Verstand, vorausschreitet, bei allen Völkern in dem frühern Zeitraum ihrer Bildung, zugleich Mythen waren, die Idee eines Chaos, d. i. einer Urmaterie, der aber noch alle Form und damit alle innere Verbindung durchaus abging.

Das ursprünglich Griechische Wort<sup>2</sup> deutet eine Leere, einen weiten Raum an, aber nicht in absolutem Sinne, sondern nur in dem nach welchem die Form selbst einen wesentlichen Theil der Realität ausmacht. In dieser Hinsicht war das Chaos nach der Vorstellung der Alten ein Mittelzustand von Seyn und Nichtseyn, ein relatives Seyn und auch wieder ein relatives Nichtseyn, indem es an in der Vorstellung als ein Widerspruch erscheint, die Materie von aller Form zu sondern, und nicht bloß als einen abstracten Begriff, sondern als wirklich vorhanden sich zu denken.

Die Scheu des menschlichen Geistes vor allem Leeren führte bald dahin, den Satz in Erklärung der Natur: „von Nichts wird Nichts,“ als ein Axiom aufzustellen. Hieran knüpfte man natürlich den Folgesatz: der Schöpfung der Welt, als eines verbundenen Naturganzen, ging ein roher Stoff vorher, wobei man gleichwohl über sah, daß wenn man dieser als Chaos bezeichneten materiellen Grundlage, nicht wenigstens einen geringen innern Halt, wodurch doch mindestens das Neben- und Aufeinanderliegen der einzelnen Theile bedingt war, also doch schon ein Bindungsmittel oder Bindungsprincip beimaß, man doch nicht aus der Leere herauskam.

Nach der Dichtung des Hesiodus<sup>3</sup> war also das Chaos das ursprüngliche alles Seyns; das Bindemittel aber, das bewirkte, daß sich aus ihm Wesen gestalteten, war der Eros oder die Liebe. Die ersten Erzeugnisse aus dem Chaos waren nun der Erebus, (Finsterniß) und die schwarze Nacht. Beide, (identisch dem Wesen nach, aber von

1) Ovidii metamorph. l. v. 5:

„Ante mare et tellus, et, quod tegit omnia, coelum,

Unus erat toto naturae vultus in orbe,

Quem dixere Chaos, rudis indigestaque moles,

Nec quidquam, insi pondus iners, congestaque eodem

Non bene junctarum discordia semina rerum.”

2) *Χαος*, von *καω*. Weniger zweideutig ist das von Plato (in Timaeo)

Bezeichnung von roher Masse gebrauchte Wort *ἄλγ*.

3) Theogon. v. 116—117



bestem Geschlecht,) durch die Liebe vermählt, erzeugten nun den Tag und den Tag. Nun gelangten Erde und Himmel zum Dasein, und durch diese alle übrige Wesen.

Nach Hygin<sup>4</sup> ging das Chaos selbst erst aus der Finsterniß, (Cacus) hervor. Beide zeugten zusammen die Nacht, den Tag, den Erebus, den Aether. Aus der Nacht und dem Erebus gingen unter anderm das Fatum, das Alter, der Tod, der Schlaf hervor, aus dem Meer und dem Tag aber entstanden die Erde, der Himmel, das Feuer u. s. w.

Die Philosophen der neuern Zeit und nach Ursprünge des Christenthums waren bemüht, die alte Lehre des Chaos mit den Lehren ältesten Urkunden des christlichen Glaubens in Verbindung zu bringen. Das tohu vapohu in der Einleitung zur Mosaischen Schöpfungsgeschichte<sup>5</sup> war ihnen das Chaos, das nach der christlichen Lehre sich bloß von dem des Heidenthums dadurch unterscheidet, daß es selbst erst ein Product der göttlichen Schöpferkraft war, und das Bindemittel desselben, wodurch eine Ordnung der Dinge und auch die Welt selbst sich gestaltete, nicht der Eros, sondern der Logos Gottes war, der über dem Flüssigen schwebte.

Indem man nun beflissen war, von dem Chaos selbst etwas Bekanntes zum Behuf der Erklärung des Seyns zu prädiciren, gerieth man auf die Atomistik, von deren Wichtigkeit unter einem eignen Titel<sup>7</sup> die Rede gewesen ist, und wornach also auch die Idee eines Chaos selbst zu würdigen ist.

So wenig zu irgend einer Zeit ein Chaos existent gewesen ist, dem Lauf der Zeit erst ein ordnendes Princip sich beifügte, so wenig und kann der materielle Stoff, der der Träger der Natur in der Erscheinung ist, durch Entfernung, Abwendung oder Wegnahme dieses Bindemittels wieder in Chaos zerfallen. Immer und ewig die große Naturmetamorphose in nöthwendiger Verbindung und wechselseitiger Durchbringung des Stoffs und der Kraft ihren Fortgang nehmen. Die Synthese beider ist wegen ihrer innern Nothwendigkeit auch unlösbar, und der Versuch einer Trennung derselben in der Thatstellung führt, wenn er bis zur absoluten Scheidung fortgesetzt wird, auch zur absoluten Leere, d. i. zur Nichtigkeit.

Relativ aber beobachten wir auch an Naturvorgängen ein chaotisches Zerfallen, wo die Ordnung für einen Vernunftzweck, (aber immer nur in einer eng umschlossenen Sphäre,) sich minder bemerkbar beobachten darbietet. Jeder Organismus geht in diesem Sinne, wenn er durch Fäulniß zerfällt, in einen chaotischen Zustand über, der bloß transitorisch ist, indem durch denselben Proceß das Allleben neuer in seinen Schooß aufnimmt, was es sich in der organischen Entwicklung, aus dem ein individuelles Leben hervorging, sich selbst momentan zum Gegensatz bildete.

1. fabul. 1. 1. c. 1. 5) 1. Buch Mose 1. Cap. 1. u. 2. B. „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erden. Und die Erde war wüst und leer, und es war finstern auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebete auf dem Wasser.“ 6) eigentlich der Wind, nach dem Hebräischen Wort, gleichsam der Aushauch Gottes. In demselben Sinne, heißt es im 33. Psalm B. 6: „Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und alle sein Heer durch den Geist, (den Panch.) seines Mundes.“ 7) 1. B. S. 362.

In den Schriften des Theophrastus Paracelsus findet sich vielfach das Wort Chaos in der Bedeutung eines thätigen Principes, das zugleich ein Element der Luft ist <sup>8</sup>, und mit seinen übrigen phantastischen Gebilden übereinkommt oder ihnen doch nahe steht. In dieser Bedeutung, der es aber freilich, wie allen ähnlichen Paracelsischen Figmenten, an Klarheit und Bestimmtheit fehlt, unterscheidet er ein Chaos microcosmi von einem Chaos aëris, und läßt das Chaos auch den gesunden Körper beherrschen <sup>9</sup>, und durch die Lunge in den Körper gelangen <sup>10</sup>.

(5)

- 8) philos. 1. 1. de elem. aëris, Nr. 10. „Dieses Element,“ (die Luft,) „hält auch die Kraft, daß das Feuer an ihm hängt, und fällt nicht, und ist ein Aëren, das da heßt und trägt ohne alle Materia und Elchbarkeit, das geschieht durch sein Chaos, der liegt zwischen der Haut und der Erden. Und ist medium interstritium und geht vom Himmel bis auf die Erden, darinnen schwebt das Feuer, darinnen schwebt die Erden und das Wasser. Und zu gleicherweil, in der Dotter im Ei vom Eiter gehalten wird, daß er die Schale nicht anrührt; also hält der Chaos die Globel, daß sie nicht fällt auf keine Art u. s. w.
- 9) chirurg. 1. 4. tr. 2. c. 71. „nachfolgend den gesunden Leib, als den, der die Particulation steht des Aëtel, Aëres, Gleich und Chaos. 10) von Ursprung, Ursach und Helling der Franzosen, 2. B. 2. Cap. „Das den Leib hält in seinem Eitel, das ist der Chaos. Nun begehrt der Chaos sein Spiel sein Speiß ist der Luft, daraus nimmt er seine Nahrung. Nun ist die Lunge dieselbig, wodurch er seine Nahrung empfahet.“

**Chaotische Generate, eine Paracelsische Wortbildung <sup>1</sup>, Zeugnisse des Chaos im Paracelsischen Sinne. Vgl. Chaos.**

- 1) Theophr. Paracelsi chirurg. 1. 5. tr. 1. c. 2, 100 mineralische, nephridische, terrestrische und chaotische Generate unterschieden werden.

**Chara, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wortes i. q. Gaudium, s. Freude.**

- 1) χαρα.

**Charakter, Denkungsart, Sinnesart, Gesinnung** Charakter, ein Griechisches Wort <sup>1</sup>; welches eigentlich das Gepräge und dann das Beharrliche, Eigenthümliche und Auszeichnende eines Gegenstandes andeutet, wird auch in unserer Sprache in dieser letzten Bedeutung gebraucht. In diesem Sinne sprechen wir von dem Charakter einer Nation, eines Thieres, einer Landschaft, eines Gegenstandes, eines Gemähltes, einer Rede u. s. w. In einer bestimmten Bedeutung wird es aber dann gebraucht, wenn man die Sinne und Denkungsart eines Menschen dadurch bezeichnet. Hier kann es entweder einen weitem oder engern Sinn haben. In der weitern Bedeutung bezeichnet es die herrschende Gemüthsstimmung eines Menschen, und die daraus hervorgehenden Hauptneigungen; in enger Bedeutung aber einzig und allein das Verhältniß der Neigungen und Bestrebungen zum Sittengesetz. Jenes ist der physische oder psychologische, dieses der sittliche oder moralische Charakter eines Menschen. In dieser letztern Bedeutung brauchen wir es, wenn wir von einem Menschen vorzugsweise sagen: er hat Charakter, oder ist ein Mann von Charakter. In diesem engern Sinne gibt es nur zwei Charaktere, die einander entgegengesetzt sind: den guten Charakter, herrschende Achtung gegen das Sittengesetz; den schlechten Charakter, herrschende Verachtung des Sittengesetzes. Zur Charakteristik des Menschengeschlechtes ist der letztere nur selten; indessen da auch

- 1) χαρακτήρ.



erstere nicht der Mehrzahl der Menschen beigelegt werden kann, und die meisten in moralischer Hinsicht charakterlos, d. h. sie handeln nach zufälligen äußern Antrieben, ohne feste Grundsätze, bald gut, nicht gut — inconsequent.

Von großer Mannigfaltigkeit im Gegentheil ist der Charakter der Menschen in weiterer — und gewöhnlicher — Bedeutung, welcher dem Mannigfaltigen des Seyns und Bestrebens des Menschen, zur Erreichung eines Zweckes, verbunden, besteht. Wir unterscheiden z. B. in dieser Hinsicht einen edlen, großmüthigen, menschenfreundlichen, ungenüßigen, strengen, offenen, stolzen, sanften, ängstlichen, verärgerten, furchtsamen, herrschsüchtigen, ruhsüchtigen, habgierigen, wollüstigen Charakter u. s. w., von denen die meisten auf mancherlei Weise combinirt, und — die ersten und letzten ausgenommen — mit einem sittlich guten oder bösen Charakter vereint seyn können. Denn streng, sanft, ängstlich, furchtsam u. s. w. kann sowohl moralisch gute als böse Charakter seyn. Der Charakter, in dieser Bedeutung, besteht gewöhnlich aus mehreren Hauptzügen, unter welchen oft einer besonders hervorsticht, der dem ganzen Seyn, Streben und Handeln des Menschen eine gewisse Stimmung, Haltung, Farbe, Ton gibt, wodurch er sich von andern auszeichnet und individualisirt. So werden zwei, übrigens ganz gleich gute, menschenfreundliche, uneigennütige Charaktere ihrem ganzen Seyn und Wollen ein verschiedenes Gepräge ausdrücken, je nachdem der eine sich durch Härte, der andere aber durch Milde und Sanfttheit auszeichnet.

Der Charakter, in jeder Bedeutung, wurzelt nicht sowohl in der Intelligenz des Menschen, als vielmehr im Gemüth und Begehrungsvermögen, und Wissen, Kenntnisse und Einsichten haben weit weniger Einfluß auf die Bestimmung desselben, als Gefühle, Neigungen und Bestrebungen; in sittlicher Hinsicht insonderheit das Verstandesvermögen, sich mit Freiheit bestimmende Begehrungsvermögen. Ob nun auch der Charakter eine Bestimmung des geistigen Seyns und Lebens des Menschen ist, so hat dennoch seine physische Natur einen großen unverkennbaren Einfluß auf die Gründung und Bestimmung des Charakters.

Die Hauptmomente, welche zur Bildung eines bestimmten Charakters zusammenwirken, sind: angeborene Anlagen, Erziehung, Unterweisung, Beispiele, äußere Lage und Schicksale, verbunden mit einem mehr oder weniger lebhaften freien innern Selbstthätigkeit und Reaction gegen jene äußern Momente. Die Gründung des Charakters, und des sittlichen, geschieht in der Regel nach und nach durch fortgesetzte Einwirkung der äußern Momente und Reaction der innern Thätigkeit; denn die Natur macht auch hier keine Sprünge. Nur in Hinsicht des sittlich guten Charakters scheint die Behauptung nicht's beweisen zu können, daß er „durch eine Art Wiedergeburt, und gleichsam durch eine Explosion“ bewirkt werde.

Außer der angegebenen innern Mannigfaltigkeit der Charaktere finden wir auch noch eine Verschiedenheit in Hinsicht der Stätigkeit ihrer Entwicklung, und man unterscheidet daher mit einem festen Charakter von einem schwankenden, zwischen welchen bis zu einer völligen Charakterlosigkeit eine Menge Grade und Abstufungen Statt



finden können, welche theils in der Kürze der Dauer, theils in der Natur des Menschen selbst begründet seyn können.

So wie der Charakter auf die Bestimmung und Schattirung des innern Seyns und äußern Handelns wirkt, so wirkt er auch auf die äußere Form und Haltung des Körpers, hauptsächlich auf die Züge und Mienen des Gesichtes, und spricht sich in ihnen sehr deutlich und mit leserlichen Schriftzügen aus. Ja selbst der Mangel desselben, die Charakterlosigkeit, zeigt sich auf eben so deutliche Art und Weise. Da nun das Studium und die Erkenntniß des Charakters der Menschen, auf welche wir wirken sollen, eben so wichtig als schwierig ist, so leuchtet ein, daß das Alphabet der Pathognomik ein wichtiges Studium des Menschenkenners sei. Denn es ist bekannt, daß, um mit Glück und Erfolg auf die Menschen wirken zu können, die Kenntniß ihrer herrschenden Neigungen, und ihres Charakters die Hauptbedingung sei. Zur Erforschung desselben ist aber nicht allein ein hoher Grad von Scharfsinn und Sagacität, sondern auch Kenntniß der Tiefen des menschlichen Gemüthes, im allgemeinen, und des zu bestimmenden insbesondere erforderlich; zu diesem reicht uns das Studium der Pathognomik sehr oft allein den Schlüssel. (Dzondi.)

**Charakterbildung**, die äußere geistliche oder zufällige Einwirkung auf den Menschen zur Charakterbestimmung. S. Charakter.

**Charaktere**, (*Characteres* <sup>1</sup>), Merkzeichen, Kennzeichen, Mahlzeichen, Signaturen, (*Characterismi* <sup>2</sup>, *Signaturae* <sup>3</sup>, *Signata* <sup>4</sup>), überhaupt äußere Andeutungen der innern Natur und des Wesens durch willkürliche oder auch natürliche Zeichen, deren Deutung dann eine eigne Kunst oder Wissenschaft (*Ars characteristica*, *Ars*, s. *Scientia signata* <sup>5</sup>), voraussetzt, aber auch nicht selten auf Wahn beruht. In einem umgekehrten Sinn wird auch unter Charakter die innere Eigenheit eines Individuums, oder individuellen Gegenstandes angedeutet, in so fern solche durch bestimmte äußere Merkmale erkennbar ist. Vgl. Charakter.

1) *Peuceri de praec. divinationum generib. Serv. 1591, p. 200, 66.* 2)

*C. Gemmae de naturae divinis characterismis, Autv. 1575, 8.* 3)

*Osw. Croll tr. de signaturis rerum, Francof. 1609, 4.* 4) Th.

*Paracelsi l. de imaginib. c. 7.* 5) Th. Paracelsi *Erkl. d. Astro-*

*nomen. Oper. 2. Th. Straßb. 1616, S. 511.*

**Charakterentwicklung**, die mehr aus dem Innern des Geistes nach dessen Anlagen, als durch äußere Bestimmungen bewirkte Fixirung des Charakters. S. Charakter.

*Characteres*, s. Charaktere.

**Charakterfestigkeit**, die Fixirung des Charakters in Bestimmung des Willens. S. Charakter.

**Charakteristikkunst**, s. Physiognomie.

*Characterismi*, s. Charaktere.

**Charakterlosigkeit**, Mangel an Charakter. S. unter Charakter.

*Charis*, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte <sup>1</sup>. S. Grazie.

1) *Χαρις.*

**Charnierförmige Gelenkfügung, Charniergelenk**, s. *Ginglymus*.

*Charopos* <sup>1</sup>, in Beisag von *oculus* deutet eine mittlere Augen-

1) *Χαροπος*, s. *Focaii ocon. Hipp. h. v.*

an, die das Angenehme der blauen Farbe hat, aber doch mehr Dunkle fällt, und eine Beimischung von Gelb hat. Ihr entspricht auch das Lateinische Wort *Ravus*. S. Farben der Iris.

*Charta virginea*, i. q. Amnion.

*Chartilago*, vitios für *Cartilago*, s. Knorpel.

*Chasme*, *Charmos*, nach dem Griechischen gleichlautenden Wort, i. q. *Oscitatio*. S. Gähnen.

*Χασμη*, *Χασμος*, eigentlich hiatus. Gleichbedeutende Worte sind *Χασμηση*, *Χασμωδία*.

*Chailon*, desgl. <sup>1</sup>, i. q. *Labeo*, s. Großlippiger Mensch.

*Χειλων*.

*Chailos*, desgl. <sup>1</sup>, i. q. *Labium*, s. Lippe.

*Χειλος*.

*Chair*, desgl. <sup>1</sup>, i. q. *Manus*, s. Hand.

*Χειρ*.

*Chelae* <sup>1</sup> *palpebrarum*, i. q. *Tarsi oculorum*, s. Tarsen. nach dem Griechischen Wort *Χηλη*, eine Klaue oder auch Schere. Obige Benennung rührt von Rufus Ephesens her, der sie in der Hinsicht wählte, inwiefern sich die Augenslideränder im Schlaf scherenförmig über einander legen. S. Stephani dict. med. ed. 1564, p. 529.

*Chelonion*, nach dem Griechischen gleichlautenden Worte <sup>1</sup>, der vordste Theil des Rückens unter dem Halse. S. Rücken.

*Χελωνιον*, von *χελωνη*, Schildkröte. S. Gorraei defin. med.

*Chemia*, s. Chemie. — *animalis*, s. *vitalis*, s. Animalische Chemie.

*Chemica affinitas*, s. Verwandtschaft der Chemiker. — *analy-*

s. Analyse der Chemiker. — *compositio*, s. Chemische Mischung. — *divisio*, s. Chemische Theilung. — *elementa corpo-*

ra, s. Chemische Bestandtheile der Körper. — *irritamenta*, s.

chemische Reize. — *mixtio*, s. Chemische Mischung. — *operatio*,

unter Chemischer Proceß. — *principia corporum*, s. Chemische

Bestandtheile der Körper. — *synthesis*, s. Chemische Mischung.

*Chemici sensus*, s. Chemische Sinne.

*Chemicus motus*, s. Chemische Bewegung. — *processus*, s.

chemischer Proceß.

*Chemie* <sup>1</sup>, (*Chemia* <sup>2</sup>, *Chimia*.) *Chymie* <sup>3</sup>, (*Chymia* <sup>4</sup>),

Alchemie <sup>5</sup>, Mischungskunde <sup>6</sup>, Spagirische Kunst <sup>7</sup>,

hermetische Kunst <sup>8</sup>, Pyrotechnie <sup>9</sup>, (*Spagyria* <sup>10</sup>, *Ars*

*pyryrica* <sup>11</sup>, s. *seperatoria* <sup>12</sup>, s. *hermetica* <sup>13</sup>, *Pyrotech-*

*ica* <sup>14</sup>, *Pyrosophia* <sup>15</sup>, *Philosophia per ignem* <sup>16</sup>, *Chamia* <sup>17</sup>),

ein Theil der Naturwissenschaft. Ist nämlich die Natur ein gro-

ßer Organismus, dessen Kräfte, so wie die davon abhängigen Er-

scheinungen seiner Organenreihen sich in verschiedenen Richtungen of-

fenbaren, und sich unter besondere Gesetze bringen lassen; so ist Na-

turwissenschaft der Inbegriff der dahin gehörigen Gegenstände Die-

2) entsprechend dem Griechischen Worte *Χημια*, s. *Χημια*, nach der Ablei-

tung von *Χεω*, fando. 3) 4) entsprechend dem Griechischen Worte *Χυμια*

nach der Ableitung von *Χυμος*, succus oder auch *Χυω*, fando. 5) — 9)

Deberleiner's Lehrb. d. Chemie, 1. B. S. 1. 10) Barchusen el.

chemiae, l. 1. s. 1. §. 4. 11) Teichmeieri inst. chemiae, p. 1.

c. 1. 12) — 14) Barchusen el. ch. l. c. 15) Teichmeieri

inst. ch. l. c. 16) Spielmann inst. chemiae § 1. 17) unge-

gewöhnlich in gezwungener Ableitung von *Cham*, dem Sohne Noah's, oder

auch *Chan*, (auch *Ehem*), einem Lande in Aegypten. Barchusen el. ch. l. c.



jenige Abtheilung, welche die Veränderung der Form und Mischung der unorganischen Körper umfaßt, gibt das Gebiet der Chemie.

So wie jede empirische Wissenschaft sich nur durch vorausgegangene Sammlung von Beobachtungen bilden kann, so auch die Chemie. Wir finden ihre ersten Spuren in der gemeinsamen Beachtung natürlicher Gegenstände vergraben, durch die Nothwendigkeit, dringende Bedürfnisse zu befriedigen geweckt, durch die aus der zunehmenden Cultur erwachte Aufmerksamkeit auf die Natur vermehrt. Jede vorgenommene Veränderung eines Naturkörpers ist ein chemischer Proceß, dessen Wiederholung technische Fertigkeit und Erfahrung mit sich bringt. Der Anfang der Naturkenntniß ist gegeben; theilweise Entwicklung folgt nach; die Geschichte aber lehrt, daß sie mit der allgemeinen Ausbildung bei allen Völkern nicht gleichen Schritt gehalten hat, sondern durch Staatsverfassung und geographische Einflüsse aufgehalten oder erregt wurde. So ist Aegypten, wenn nicht Indien, die Wiege der Naturwissenschaft und zugleich der Chemie; sie blieb aber hier ein Geheimniß der Priestercaste, welche dasselbe gleich dem Schwarzen und Geheimen im Auge (*χρυσος*) Chemie nannten. Von hier schreibt sich vielleicht auch der Name der Wissenschaft her, den die Alchemiker der neuplatonischen Schule <sup>18</sup> zuerst erwähnen. Nimmt man an, Moses habe durch seine in Aegypten genossene Erziehung seine gezeigten Naturkenntnisse sich erworben: so scheinen die Aegyptier im Besiz höherer Weisheit gewesen zu seyn, als man aus dem spätern nach Arabien verstreuten Samen urtheilen kann, welcher dort nur kümmerlich zur Goldmacherei ausartete; es sei denn, die alte Geheimniß behandelte Chemie sei verloren gegangen. Pythagoras bringt wenig aus Aegypten mit; Aristoteles handelt zwar bereits von der Identität der Materie und der Verschiedenheit der Form <sup>19</sup>. Theophrast war nächst ihm ein guter Beobachter, beide verschlossen sich aber durch falsche Speculation die richtige Ansicht der Natur.

Bei den Römern finden sich chemische Kenntnisse gegen den Anfang unserer Zeitrechnung. Plinius sammelte aus allen Quellen, er selbst setzt wenig von Gewicht hinzu. Nimmt man wenige technische Operationen aus, deren Spuren hoch ins Alter reichen, wie Mörtelbereitung, Eisenschmelzen u. s. w., so ist Dioscorides, Arzt der Cleopatra, der erste, der von einem chemischen Proceß, der Reduction des Quecksilbers, spricht. Destillation oder sonst eine Operation von Bedeutung kannte er nicht. Eben so wenig findet sich bei Hippokrates oder Galen eine chemische Arzneibereitung. Es bleibt hier mehrere Jahrhunderte dunkel; die Chemie scheint durch den Mysticismus der neuplatonischen Schule einzig auf Goldmachen gerichtet gewesen zu seyn <sup>20</sup>. Erst im siebenten Jahrhundert gab unter den Arabern die Alchemie Anlaß zu Arzneibereitungen, so daß von hier der Anfang der Pharmacie zu suchen ist; auch zeigt die frühere Nomenclatur der Chemie, wie viel sie den Arabern verdankt. Geber's Schrift

18) Borrichii de orni et progress. Chemiae. l. p. 12.

auscult. Par. 1654, fol. p. 495.

19) natur

20) Zosimus Panopolita im fünften Jahrhundert schrieb über Goldmacherkunst. Suidas aus dem 10ten Jahrhundert erwähnt, daß Dioscorian mehrere Bücher der Aegyptier περί χρυμης αργυρου καὶ χρυσου verbrannten ließ.



<sup>22</sup> beschreiben die Destillation, den Probirapparat, den ägenden Klimat u. s. w. Es bestand die Chemie nur in der Kenntniß der Veränderungen einzelner Körper. Doch ist diese Arabische Alchemie der Vorläufer der spätern Wissenschaft. Das Suchen nach dem Steine der Weisheit beförderte chemische Erfahrung; dasselbe gilt von der Ausbildung technischer Gewerbe und Künste, die im 13ten Jahrhunderte von Arabien nach Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland verpflanzt wurden. Die damaligen Gelehrten verachteten alles Empirische und suchten die Belehrung durch solche Erfahrungen; keiner versuchte den zerstreuten Reichthum zu sammeln und zu ordnen. Roger Bacon in England († 1292) und Albert von Bollstädt, genannt magnus, in Deutschland († 1280) machen davon eine Ausnahme, allein niederachtete auf diese vorreifen Blüthen. Auch wenn die Chemie jetzt an sich bereichert sieht, so war Goldmacherei die Quelle der Erfahrungen, ohne Einheit und ohne andern Zweck als den, Metalle aus Schwefel, Salz und Quecksilber zu erzeugen. Die chemischen Kenntnisse beschränkten sich auf Gold, Silber, Quecksilber, Kupfer, Zinn, Blei, Eisen, Schwefel, Dryde des Quecksilbers, Bleies, Spießglanzes, Scheidewasser, Königswasser, Quecksilberoxyd, Sublimat, Vitriol, Alaun, Salpeter, Zucker, Essig u. s. w. Avicenna v. Majorca im 13ten Jahrhundert, (ein Schüler des Arzts Arnald v. Villanova,) setzte dazu: Spießglanz, seinen Präcipitat, Salmiak, kohlensaures Kali, Weinstein, Alkohol, kühnsten Salpetergeist. Albert v. Bollstädt lehrte kennen: Arsenmetall, äzendes Kali, Schwefelleber, Schwefeleisen, Schießpulver.

Vasilius Valentinus aus Erfurt im 15ten Jahrhundert, noch reich noch Goldmacher, doch tiefer und reifer als seine Zeit, unterschied: Zink, beschrieb <sup>22</sup> Spießganzbutter, Schwefel, Wein; erkannte Arsenik, Realgar, Massicot, Bleiweiß, Bleizucker, Grünspan, Knallgold, mehrere Zerlegungen von Salzen, Verbindungen von Metallen, Schwefelbalsam, Schwefeläther. Georg Agricola (1555) <sup>23</sup> und Lazarus Erckern, des heil. Röm. Reichs Gencralrath, sind beide Stifter der Deutschen Metallurgie. Paracelsus, ein wüthender Prahler, den der Magistrat zu Basel zum ersten Lehrer der Chemie in Europa machte, der aber aus Hang zur Ungebundenheit den Lehrstuhl verließ, um die Welt zu durchstreifen und mit dem Geheimniß einer Universalmedizin zu prahlen, hatte wenigstens den Nutzen, daß er viele chemische Präparate als Arzneimittel einführte. Er starb 1541 wahrscheinlich eines gewaltsamen Todes.

Metalle und starre Körper blieben der Hauptgegenstand der Chemie, selbst die wenigen bekannten Flüssigkeiten dienten nur, um jene zu bereiten; niemand bekümmerte sich um ihre Zusammensetzung. Vor dem Helmont, (geb. zu Brüssel 1577,) waren die luftförmigen Körper ganz unbekannt; dieser führte in die Chemie ein: Wasserstoff, gekohlte Wasserstoffluft, Gas fuliginosum, aus verbrannten Metallen, kohlensaure Luft gährender Dinge, Gas sylvestre, &c. (1) de alchemia argentea, Speculum alchemiae et de inventionibus perfectionis. 1705. Hierher noch Sympson im 16ten Jahrhundert, Avicenna im 12ten und Mesue im 11ten Jahrhundert. <sup>22</sup>) in seinem cursus triumphalis ammonit. <sup>23</sup>) schrieb de re metallica in 12 Büchern.

musti, Sauerstoffluft aus Salpeter entwickelt, Gas flammteum er beschenkte sie mit scharfsinnigen Ideen über ihre permanente Elasticität und den Einfluß der Wärme. Rosenkreuzer und Alchemie ließen diese wichtigen Erfahrungen nicht aufkommen, obgleich Athanasius Kircher († 1680), Herrmann Conring († 1682), Kepler († 1631) sich gegen den Unsinn laut und glücklich erklärten; obgleich J. Key<sup>24</sup>, gestützt auf Libavius, Gesalpin und Cardanus, in der beobachteten Zunahme des Gewichts der an der Luft calcinirten Metalle, und Sylvius de la Boe durch die Vergleichung des Verbrennens und Athmens, dieselben Grundsätze aufstellten, welche später die Pfeiler des antiphlogistischen Systems wurden. Nur Galilei's († 1641) Entdeckungen über die Atmosphäre, Toricelli's Barometer, Pascal's Versuche damit, Otto v. Guericke's Luftpumpe gründeten erst den Anfang der pneumatischen Chemie. Große Erleichterung, diese Erfahrungen zu verbreiten, schaffte die Buchdruckerkunst, und Beguin's, Brendel's, Wolfink's Compilationen. Neue Kenntnisse über mehrere Salze verdankte man 1640 Glaubern; über technische Chemie Kunkeln v. Löwenstern; Brandt entdeckte 1669 den Phosphor; Glaser gab in Frankreich ein Lehrbuch heraus. Ohne Baeo v. Verulam († 1626), dem Englischen Kanzler, aber wäre der richtige Weg zur Erforschung der Natur nicht betreten worden; er war so glücklich, seine Zeitgenossen von der Wahrheit zu überzeugen, daß alles durch Beobachtung, Induction und Nachahmung der Natur geleistet werden müsse. Sieht vereinigten die Akademie del Cimento 1651 zu Florenz, die Königl. Societät zu London 1660, die Akademie der Wissenschaften zu Paris 1666 die Kräfte mehrerer Männer. Hooke und Boyle verbesserten die Luftpumpe, beobachteten mit Mayow aus Oxford das Athmen<sup>25</sup>; letzterer untersuchte die aus Salpeter entbundene Luft und die Calcination der Metalle. Vor allem legte Boyle den Grund zur wissenschaftlichen Gestaltung der Chemie.

Dieser Zeitpunkt charakterisirt sich durch die Trennung der Naturwissenschaft in mehrere Zweige und die schnellere Ausbildung dieser einzelnen, ferner dadurch, daß Newton's Aufstellung mehrerer physikalischen Naturgesetze in den Chemikern das Bedürfnis erregte, ihre Erfahrungen auch unter dergleichen zu ordnen. Schon hatte Becher aus Speier († 1682,) ein guter Metallurg, ein chemisches System der ganzen Erde zu liefern versucht, worin er durch wenige Elemente (eine verglasbare, eine metallische und eine entzündliche Erde,) alle tellurischen Erscheinungen zu erklären meinte. Geoffroy stellte weit glücklicher die Anziehung als ordnendes Princip auf, er nannte sie Verwandtschaft und bestimmte die Ordnung der Körper nach ihrem Grade<sup>26</sup>. Stahl aus Ausbach († 1731) baute auf Becher's Grundsätzen sein phlogistisches System. Er erfuhr, daß kohlige, brennbare Dinge die Metalloryde zum Metall, die schwefelsauren Salze zum Schwefel reducirten, und daß durch Verbrennen an der Luft

24) Sur la recherche et la cause, par la quelle estain et plomb augmentent de poids, quand on les calcine, à Bazas 1630. 25) Boyle's Works, Vol. IV. p. 90. Hooke's Micrographia, p. 45. 26) Mémoire de l'académie franc. 1713, p. 236



wieder in den vorigen Zustand kämen; er sah daher den Reaktionsproceß als eine Verbindung des Brennstoffes, (Phlogistons,) der Säure oder dem Metalloryde, (Metallerde,) an, und nahm die Verbrennung für eine Abscheidung des Phlogistons von diesen Grundstoffen. Die ganze Natur zeigte ihm nichts als verbrennliches und Unverbranntes, der Uebergang von jenem in dieses war mit Wärme und Lichtentwicklung verbunden, und diese Erscheinung war ihm der Repräsentant des Phlogistons. Hiernach baute er sein System, aber über den großen Fehler, den Einfluß der Luft auf die brennenden Körper, trotz der darüber schon von Boyle gemachten Erfahrungen, ganz zu vernachlässigen. Diese Einseitigkeit stürzte sein System, als man ihm später neue Erscheinungen anpassen wollte; nur die große Autorität seines Erfinders gab der von ihm aufgestellten unnatürlichen Hypothese von der negativen Schwere des Phlogistons Halt; denn anders war die Zunahme des absoluten Gewichtes durch das Verbrennen, und seine Abnahme bei der Reduction zu erklären. Dessen ungeachtet bereicherte Stahl die Wissenschaft, er trug viel dazu bei, die chemische Prüfung auf alle Gegenstände der Natur auszudehnen. So geschahen die Entdeckungen des Zinks durch Lewis, des Kobalts durch Brandt, des Nickels durch Cronstädt, der richtigern Unterscheidung der Alkalien, Erden, Kochsalzes durch Marggraf aus Berlin († 1782,) mehrerer atmosphärischen Gegenstände durch Hales († 1761) in England, merklich durch die Aufstellung eines die Luftform gebenden Elements, die Darstellung der kohlensäuren Luft aus dem rohen Kalkstein durch Black, der Wasserstoffluft (1765) durch den genau arbeitenden, chemisch gründlichen Cavendish und seine Erfindung des pneumatischen Apparats; Priestley's Verbesserung desselben zum Zinkfilberapparat lehrte seit 1771 Ammoniumluft, die salzsaure, schwefeligsaure, die oxydirte Stickluft kennen; derselbe fand, unabhängig aber gleichzeitig, mit Scheele die Lebensluft (Sauerstoffluft,) die später als das überall thätige Antiphlogiston die phlogistische Luft völlig umstieß.

Scheele, ein Pharmaceut († 1786,) ward bei sehr eingeschränktem Einkommen der fruchtbarste Chemiker des 18ten Jahrhunderts. Wir danken ihm die Zerlegung der atmosphärischen Luft in Sauerstoff- und Stickstoffluft, höchst wichtige Versuche über das Verbrennen, die Zersetzung, das Athmen, Verkalken und die dabei nothwendige Gewichtsveränderung der Luft, die Kenntniß der Schwefelleberluft, der Schwererde, der phlogistisirten Salzsäure, Flußspath- und Arseniksäure, der freien organischen Säuren u. s. w. Stahl's Autorität hielt ihn ab, durch einen Schritt vorwärts die nahe liegende Wahrheit als Folgerung aus seinen Versuchen selbst zu finden. Nächst dem förderten Marquet, Rouelle, Pott in Frankreich, Bergmann in Schweden die Chemie nicht wenig. Letzterer insbesondere bildete den mathematischen Theil, die Gesetze der Anziehung und Verwandtschaft aus, er unterschied mechanische (s. Cohäsion) und chemische, er ahndete das Gesetz der bestimmten Verhältnisse. Kirwan in Irland, Wenzel in Böhmen, Guyton-Morveau in Frankreich waren seine fruchtbaren Nachfolger. Dazu gesellen sich noch die Resultate vieler Arbeiten, die in



den Werken von Neumann, Cartheuser, Boerhave u. s. w. zerstreut sind, die Lorenz v. Crell in seiner Zeitschrift seit 1778 Rozier und Delamethrie in der ihrigen sammelten, welche alle man bemüht war, Stahl's Theorie anzupassen, es nicht konnte, und gleichwohl die Theorie selbst nicht wegwerfen wollte.

Was Scheele nicht erreichte, das geschah durch Lorenz Anton Lavoisier, (guillotiniert 1794,) den Stifter der antiphlogistischen Schule. Er führte Maß und Gewicht in die Experimente und also zweifelsfreie Resultate ein, erklärte die Form der Körper vom Wärmestoff abhängig, und stellte die der weitem Zerlegung trocknenden Stoffe als Elemente auf. Er zeigte, daß die Metalle und alle brennlichen Stoffe, als Grundlagen künftiger Verbindungen, während des Brennens Sauerstoff aus der Luft aufnehmen, daß dieser in allen durch das Brennen entstandenen Säuren, Metallsäuren, im Wasser u. s. w. zu finden sei; er verbannte das Phlogiston als ein Un Ding. Allein er ging zu weit, wenn er den Sauerstoff als einzige Ursache der Verbrennung, als das allgemeine Princip jeder Säure aufstellte, er war einseitig, wenn er die Entwicklung von Licht und Wärme bei dem Brennen unbeachtet ließ, und mußte sich bald von Gren, Wernb, Richter meistern lassen. Seine Ansicht konnte nur durch Verbesserung dieser Mängel bestehen. Dazu legten die Deutschen bald Hand an. Richter gründete mit mathematischer Bestimmtheit die Stöchiometrie<sup>27</sup>, d. i. die Lehre von den quantitativen Verhältnissen, in welchen sich die Körper verbinden; Proust, der Spanier, trat ihr bei. Berthollet<sup>28</sup> stellte minder glücklich die Affinität als eine zusammengesetzte Wirkung der Cohäsion, Crystallisation und der Menge der zusammenwirkenden Stoffe auf.

Es war die antiphlogistische Lehre, nach Lichtenberg's Erinnerung, zwar eine meisterhafte Sammlung der isolirten, sich auf den Sauerstoff beziehenden Thatsachen; allein sie blieb die Verbindung mit der übrigen Naturlehre schuldig, und ließ mehrere in der großen Natur chemisch wirkende Kräfte, wie die Electricität, unbeachtet. Hierher gehörige einzelne Vorarbeiten blieben unbemert. Lavoisier reducirte (1774) und oxydirte Metalle mit Hilfe der Electricität; van Marum entband aus vielen Dingen dadurch Wasserstoffluft; Trostwik und van Deimann zerlegten (1790) das Wasser dadurch in seine Elemente, und setzten es auch wieder zusammen. Eine Einführung der Electricität ins chemische Gebiet ward aber erst durch Galvani und Alexander Volta eingeleitet. Genem gab ein Frosch zu der Entdeckung Gelegenheit, daß durch Berührung der Nerven und Muskeln eines frisch getödteten Frosches mit heterogenen Metallen sich Electricität entwickle und in Zuckung sich offenbare; dieser bewies, daß schon gegenseitige Berührung zweier heterogener Metalle beide in die entgegengesetzt electrischen Zustände versetzt, daß diese Electricitäten sich verstärken und durch innerwährende Entladungen und Ladungen chemisch zersetzende Thätigkeit äußern, sobald die Metallschichten mit leitenden Flüssigkeiten verbunden werden. Seit

27) Richter über die neuern Gegenstände der Chemie, Breslau und Pilschke 1791 — 1802. 28) Recherches sur les loix de l'affinité n. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

chemischer Apparat, den wir als Voltaische Säule kennen, beschäfs-  
 von jetzt an die Aufmerksamkeit der Chemiker. Ritter sprach:  
 im chemischen Proceß auch der electrische enthalten ist; so muß  
 System der Electricität auch das der Chemie werden. Cruik-  
 shank, Nicholson, Carlisle zerlegten durch die Säule Was-  
 salzaufösungen u. s. w.; die Vervielfältigung und Fortsetzung solcher  
 wurde binnen einer Reihe von funfzehn Jahren durch Davy, Henry,  
 La Font, Brugnatelli, Berzelius, Hisinger, Ritter,  
 Laff, Säger, Simon, Erman, Arnim, Humboldt,  
 Schweigger u. a. beschenkt die Wissenschaft mit glänzenden Ent-  
 deckungen, von denen die aufgefundenen Zusammensetzung der Alkalien  
 Erden als Metakörper oben an stehen; sie brachten eine vollstän-  
 dige Ueänderung des wissenschaftlichen Theiles mit sich, welche die Spu-  
 re der Vereinigung der Chemie mit der übrigen Naturlehre an sich  
 so ward ein geringfügig scheinender Frosch in der Hand genialer  
 erörtert die Ursache der systematischen Gestaltung der Chemie, die  
 früher Winterl in Pesth († 1809) darzustellen versucht

dieses jüngste und erste chemische System muß das electrische  
 dualistische heißen, wegen des electrischen Gegensatzes der  
 Plus und Minus Electricität, welcher darin als alleiniges und ober-  
 waltend herrscht. Es sind nach ihm alle Körper nur chemisch thätig  
 durch die beiden Electricitäten, welche sie bei gegenseitiger Berüh-  
 rung entwickeln, und welche sich und dadurch auch die Körper zu verei-  
 nigen streben. Aus der beiderseitig relativen Menge der Electricitäten  
 der Grad der Verwandtschaft hervor. Alle chemisch thätige  
 Körper stehen also nur in dem gegenseitigen Verhältniß des Positiven  
 und Negativen; jene werden vom — Pole der Säule, diese vom +  
 angezogen, jene sind gegen diese basisch, (verhältnißlich,) diese  
 jene sauer, (zündend). Im Augenblicke der Vereinigung findet  
 Verbindung beider Körper und beider Electricitäten Statt; daher oft  
 Chemismus dieselbe Erscheinung, die wir beim Entladen der  
 electrischen Flasche sehen: nämlich Feuer. Die heterogensten Körper  
 zeigen diese Feuererscheinung am intensivsten, z. B. Kupfer und Schwefel,  
 Phosphor und Sauerstoff, Antimon und Chlorine.

Die Vereinigung aller Körper geschieht in bestimmten Verhältniß-  
 zahlen, die gleich sind der den Massen inhärenten Mengen  
 der Electricitäten, und die allzeit wieder ihrer Natur nach dieselben  
 sein müssen, sobald dieselben beiden Körper wieder in gegenseitige  
 Berührung treten. Doch bilden je zwei oder mehrere Körper immer  
 mehrere Vereinigungen, die sich durch Stufen ihrer gegenseitigen Ver-  
 hältnismengen unterscheiden und deren electronegativer Theil sich in  
 folgenden Stufen um 1. 5. 2. 4 vermehrt. Die niedern Stufen  
 gehen sich durch das Vorherrschen einer Electricität aus, daher sie  
 basisch, bald sauer sind, die mittlern sind oft neutral und ihre  
 Electricitäten gesättigt, in den höchsten herrscht die der untern entge-  
 gesetzte Electricität vor. Es würde zu weit führen, hier noch mehr  
 Einzelnes einzugehen; nur so viel: während die Einseitigkeit der  
 phlogistischen Lehre dem Sauerstoff allein das Vermögen beilegte,



mit Grundlagen Säuern zu bilden; zeigt diese, daß dasselbe jedem Körper, dem Sauerstoff, Schwefel, Stickstoffe, der Chlorine, Jode u. s. w. zukommt, wenn er gegen einen andern electronegativ vorherrscht.

So viel vom System. Es würde Undankbarkeit gegen das Zeitalter verrathen, wenn wir nicht nur in kurzem des Nutzens gedenken wollten, welchen die Chemie durch ihre raschen Fortschritte seit Lavoisier allen Zweigen des menschlichen Wissens gebracht hat.

Zuerst die Naturkunde. Sie gewann durch die Vollkommenheit, welche Lavoisier der Analyse gab, und wodurch er mit Berzelius, Hatchet, Proust, Berzelius, Hisinger, Wollaston, Tennant und mehreren die Kenntniß der Metalle und Erden vermehrte. Davy bewies mittelst der ihm zu Gebote stehenden kräftigen electrischen Apparate, daß auch den Alkalien und Erden Metalle zum Grunde liegen. Die Grundlage der Borarsäure ward dargestellt; die Salzsäure zeigte sich aus Wasserstoff und oxydierter Salzsäure, (Chlorine,) zusammengesetzt, während letztere in die Reihe der einfachen Stoffe zurücktreten mußte. Einen, ihr ähnlichen Stoff, Jode, fand Courtois im Kelp. Aus diesem wenigen ergibt sich die Erweiterung der Mineralogie.

Die Kenntniß des Verhaltens organischer Körper schritt ebenfalls vorwärts. Die Chemie ist dadurch zur sichern Leiterin der Physiologie geworden. Schon Lavoisier fand, daß das organische Reich als Elemente vorzugsweise den Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff habe, und daß Stickstoff überdieß im Thierreiche vorherrsche. Fourcroy und Berzelius bewiesen dieß durch zahlreiche Untersuchungen organischer Gebilde, Parmentier und Deyn durch Zerlegung des Blutes, die von Brande und Berzelius revidirt ward. Letzterer insbesondere zeigte, wie alle thierischen Secrete und Excretionen in ihrer Mischung dem Blute ähnlich sind, und sich nur darin unterscheiden, daß der im Blute unter dreierlei Gestalt vorkommende Eiweißstoff, Serum, färbende Materie und Blutfärbchen, in ihnen als modificirter, eigener Stoff auftritt, in den Excretionen mit vorherrschendem Alkali, in den Excretionen mit vorherrschender Säure. Boström suchte Reagentien auf organische Stoffe. Kielmeyer betrachtete viele physiologisch chemische Gegenstände. Außer diesen Chemikern verbesserten Seguin, Proust, Jaquin, Hermstädt, Schrader, Chevreuil die Unterscheidung der nähern Pflanzenbestandtheile, des Extractstoffs, Gerbestoffs, Saugmehl, Harzes u. s. w.

Auch das Leben, so weit es als chemische Aeußerung im Zusammenhang mit der unorganischen Natur auftritt, ward belauscht: Lavoisier's Beobachtungen über das Athmen berichtigten Allen und Pepys dahin, daß es nicht in einer Aufnahme von Sauerstoff, sondern in einer Excretion und Säuerung von Kohlenstoff bestehe.

Die Lehre vom Wachstume der Pflanzen, ihr Zusammenhang mit dem Boden, und der Atmosphäre, der Einfluß der Erdmischung des Wassers u. s. w. darauf ist durch Cenebier, Ingenhous, Priestley, Kielmeyer, v. Humboldt, Schrader, Cuihof, ganz besonders durch v. Saussure verbessert. Letzterer hat mit de Luc, Lichtenberg, v. Humboldt, Howard, Muland u. m. a. vie



die Aufklärung des Chemismus der meteorologischen Prozesse an.

Auch der Tod der Organismen bot dem Chemiker der Aufmerksamkeit werthe Erscheinungen dar. Freiwillige Zersetzungen, die man durch Lavoisier als Gährung und Fäulniß kannte, zeigten chemische Zersetzungen und Producte, in denen die organischen Elemente thätig hervortraten und deren Einsicht der Heilkunde zur Erläuterung einiger physiologischen und mehrern pathologischen Vorgänge reichlich sind.

Außer der Vollkommenheit, welche durch diese Entdeckungen vielen Künsten und Gewerben zum Theil ward, z. B. der Färberei durch Hermstädt, der Gerberei durch Seguin, dem Bleichen durch Rotholstet, der Zuckergewinnung durch Achard, der Hüttenkunde durch Lampadius, der Agricultur durch Einhöf, Thaer, von, der Salpetererzeugung, Schießpulverbereitung u. s. w., hat vorzüglich die Pharmacie gewonnen. Dem Professor zu Köthen, C. G. Hagen, gebührt das erste Verdienst ihrer Verbesserung, er hat sie entschieden durch sein Lehrbuch der Apothekerkunst, welches lange Zeit das Symbolum der Deutschen Apotheker blieb, hergeführt, und allen folgenden pharmaceutischen Schriftstellern dazu ein Vorbild gegeben. Dazu kommt noch, daß fast alle Deutsche Chemiker wo nicht selbst Apotheker, doch in der Schule dieser Kunst gebildet waren, wie Gren in Halle, Götting in Jena, Sie und Schrader in Berlin, Gehlen in München, Westrumb in Hameln, Dörflert in Wittenberg, Bucholz und Trommsdorff in Erfurt, welche alle, theils durch ihre Entdeckungen, theils durch ihre Schriften und Zöglinge die Deutsche Pharmacie zu einem hohen Grade der Ausbildung emporgehoben haben. (Ficinus.)

### Hierher gehörige Schriften:

Die vorzüglichern Schriften sind mit \* und die Hauptwerke mit \*\* bezeichnet.)

#### 1) Literatur der Chemie.

1. Borelli bibliotheca chemica, s. catalogus librorum philosophicorum et medicorum, in quo 4000 chemici continentur, Paris. 1654, 12.

2. Borrichii conspectus scriptorum chemicorum illustrium, Hafn. 1668, 4.

3. Hr. Ehrenfr. Weigel's Einleitung zur allgemeinen Scheidekunst, 1. — 3. St. Vorbegriffe der allgemeinen Wücherkunde enthaltend, Leipzig. 1788 — 1793, 8.

4. (F. Ch. Zuch's) Repertorium der chemischen Literatur von 494 vor Chr. G. 1806, in chronologischer Ordnung aufgestellt, 1. u. 2. B. Jena 1806 — 1811, 8.

5. Hegelm. Fr. Hermstädt's Bibliothek der neuesten physisch-chemischen u. s. w. Literatur, 1. — 5. B. Berl. 1787 — 1803, 8. (Der 5. Band auch unter dem Titel: Hermstädt's Annalen der chem. Literatur, 1. — 5. Heft.)

6. Trommsdorff's allgemeiner chemische Bibliothek des 19ten Jahrhunderts, 1. — 5. St. Erfurt 1801 — 1805, 8.

#### 2) Geschichte der Chemie.

1. Herm. Conringii de hermetica Aegyptiorum vetere et Paracelsicorum medicina liber, Helmst. 1648 (1669.) 4.

2. Ol. Borrichii de orni et progressu chemiac diss. Hafn. 1668, 4.

3. J. d. Hermetis, Aegyptiorum et Chemicorum sapientia ab H. Conringii animadversionibus vindicata, Hafn. 1674, 4.

4. Englet du Fresnoy histoire de la philosophie hermétique, T. I. — III. Haye 1742, 12.

5. Torbern Bergmann diss. de primordiis chemiac, Lips. 1779, 4 (rec. Musc. phys. chem. Vol. IV, p. 1.)

\* Ejusd. historiae chemiae medium, s. obscurum aevum, a medio sec. VII. ad medium sec. XVII. Ups. 1787, 4. (rec. in opusc. phys. chem. Vol. IV. p. 85.)

\*\* Joh. Christ. Wiegels's historisch kritische Untersuchung der Alchemie Wismar 1777 (1793.) 8.

\*\* Ebendesselben Geschichte des Wachstums und der Erfindungen in der Chemie in der ältesten und mittlern Zeit, aus dem Lat. (von L. Bergmann, s. die angezeigte Schrift,) übersetzt, mit Anmerk. und Zus. Berlin 1792, 8.

\*\* Ebendesselben Geschichte des Wachstums u. s. w. in der neuern Zeit 1. — 3. B. Berlin 1790 u. 1791.

\* J. E. Gmelin's Geschichte der Chemie seit dem Wiederaufleben der Wissenschaft bis an das Ende des 18. Jahrhunderts, 1. — 3. B. Göttingen 1797 — 1799, 8.

J. B. Trommsdorff's historisches Taschenbuch für Aerzte, Chemiker und Pharmaceuten, Erfurt 1803 — 1805, 8. (Daraus dessen Versuche einer allgemeinen Geschichte d. Chemie, Erfurt 1806, 8.)

### 5) Allgemein umfassende Lehrbücher.

Petr. Boni introductio in divinam chemiae artem, Basil. 1572, 4.

Andr. Libavii rerum chemicarum epistolica forma descriptarum libri III. Francof. 1596 — 1599, 8.

\* Ejusd. Alchemia, Francof. 1597, 4. (recogn. emend. et aucta, ibid. 1606, fol.)

J. Beguin éléments de Chymie, à Paris 1608, 12. (1611, 1613, 1620, 1624, 12. Genève 1624, 8. Rouen 1637, 8. Lyon 1665, 8. Lateinisch: Tyrocinium chemicum Beguini per Joz. Barthium, Francof. 1618, 8. ed. a Chr. Glückradt, Regiom. 1618, c. utriusque notis emiss. a Joh. Georg. Pelshofero, Viteberg. 1634, 1650, 8. not. perpetuis ill. ed. O. Blasio, Amst. 1659, 12. auct. ibid. 1669, 12.)

Zach. Brendelii chymia in artis formam redacta, Jen. 1630, 12. (1641, 8. Amst. 1672, 12.)

Guil. Davissoni philosophia pyrotechnica, s. curriculum chymiatricum, Paris. 1633, 8. (1640, 8., 1644, 8., 1657, 8. Hay. com. 1653, 1641, 1663, 4. Französisch: tr. par J. Hellot, Paris 1651, 1657, 1675, 8.)

Guern. Rolfinccii chymia in artis formam redacta, Jen. 1641, 8. (1661, 4., 1679, 4. Genev. 1671, 4. Francof. 1676, 4. Franc. et Lips. 1686, 4.)

Steph. Glavei cours de chémie, Paris 1646, 8.

Jo. Franc. Viganii medulla chemiae, Lond. 1658, 8. (Jen. 1682, 8. auct. Lond. 1683, 8. 1688, 8. c. not. et obs. Dan. Stam, Lugd. B. 1693, 8. Norimb. 1718, 8.)

Nic. le Febure traité de la chymie, Vol. I et II, à Paris 1660, 8. (1669, 12. Leyde 1669, 12. T. I. II. cours de Chémie — par M. du Monstier, T. 1 — 5. Paris 1751, 12. übersetzt: Nic. le Febure chymisches güldenes Kleinod, Nürnberg. 1672, 8. — chymischer Handleiter, Nürnberg. 1676, 8. vermehrt von Joh. H. Cardiluccio, Nürnberg. 1685, 8.)

\* Jo. Joach. Becheri Oedipus chymicus, Francof. 1664, 12. (auct. Francof. 1720, 8.)

\* Ejusd. Physica subterranea, Francof. 1669, 4. (ed. a O. E. Stahl, Lips. 1703, 8. 1738, 4.)

Christoph. Glaser traité de la chymie, à Paris 1663, 8. (1668, 12. Bruxelles 1676, 12. übersetzt: Chr. Glaser's chymischer Wegweiser, Jena 1684, 1696, 1710, 12.)

P. Thibaut cours de chymie, à Paris, 1667, 8. (1674, 8. à Leide 1672, 12.)

Jac. Barneri chymia philosophica, Norimb. 1689, 8.

\* Nic. Lemery cours de chymie, à Paris 1675, 8. (1677, 1679, 12. 1682, 1685, 1687, 1690, 1697, 1713, 1750, 8. à Amst. 1698. à Leide 1700, 1750, 8. à Bruxelles 1744, 1747, 8. à Avignon 1751, nouv. éd. par Baron, à Paris 1756, 4. Lateinisch: vert. J. C. Derebecque, Genev. 1681, 12. Deutsch: Lemery's cursus chymicus, oder der vollkommene Chymist, Dredd. 1698, 1705, 1713, 1726, 1734, 8. mit Zusätzen von Joh. Christ. Zimmermann, Dr. 3d. 1754, 8.)



- Helfr. Jungken chymia<sup>a</sup> experimentalis curiosa, Francof. 1681, 8.  
 4.)  
 le Mort compendium chymiae, Lugd. Bat. 1682, 12.  
 add. chymia medico-physica, Lugd. Bat. 1684, 8.  
 add. chymia rationibus et experimentis superstructa, Lugd. B. 1688, 8.  
 de Maets prodromus chymiae rationalis, Lugd. B. 1684, 8.  
 add. chymia rationalis, Lugd. B. 1687, 4.  
 esh. Ettmülleri chimia rationalis ac experimentalis curiosa, cura  
 trib. Jo. Chr. Aursfeldi, Lugd. B. 1684, 4.  
 Wilsou a compleat course of chemistry, Lond. 1699, 8. (1700,  
 1735, 1746, 8.)  
 (Gonr. Barchusen pyrosophia succincta, Lugd. B. 1698, 4.  
 add. compendium ratiocinii chemici, Lugd. B. 1712, 8.  
 add. elem. pyrosophiae, Lugd. B. 1718, 4.  
 Freindii praelectiones chemicae, Oxon. 1704, 8. (Amst. 1710,  
 1788.)  
 dir. Perermani chymia, Lips. 1708, 4.  
 berg. Wölg. Wedelii compendium chimiae theoreticae et practicae,  
 1715, 4.  
 etfr. Rother's gründl. Anleitung zur Chemie, Leipz. 1717, 8. (1721,  
 1727, 1739, 1745, 1750, 8.)  
 Maur. Hofmanni acta laboratorii chemici Altorfini, Norimb. et  
 1719, 4.  
 erg Ernst Stahl's Chymia rationalis et experimentalis, oder gründl.  
 ung zur Chemie, Leipz. 1720, 8.  
 misd. fundamenta chimiae dogmaticae et experimentalis, Norimb. 1723,  
 I et II. 1732, 4. T. I — III. 1746, 8.)  
 ac nouveau cours de chymie suivant les principes de Newton et de  
 , à Paris 1723, 12. (1736, 12.)  
 m. Boerhave institutiones et experimenta chymiae, T. I et II, Paris.  
 1788.)  
 Ejsud. elementa chymiae, T. I et II. Lugd. B. 1732, 4. (Lips. 1732,  
 etfr. Herrm. Boerhave's Anfangsgründe der Chemie, Halberst. 1732,  
 Leipz. 1753, 8. Berlin 1762, 8. mit Anmerk. v. Wieglieb, Berlin und  
 1782, 8.)  
 Shaw new method of chymistry, Lond. 1727, 8.  
 add. chymical lectures, Lond. 1734, 8. (Franz. à Paris 1759, 4.)  
 erg. Frid. Stabelii chymia dogmatico-experimentalis, Hal. 1728, 8.  
 m. Frid. Teichmeyer's institutiones chymiae dogmaticae et experi-  
 ss, Jen. 1729, 4. (1752, 4.)  
 H. Junckeri conspectus chymiae theoretico-practicae, T. I et II.  
 1730 et 1738, 4. (1744, 8. ed. tertia 1749 et 1750, 4. Deutsch: vollstän-  
 d. handlung der Chemie, 1. — 3. Th. Halle 1749 — 1753, 4. Franz.: Elémen-  
 tie, avec des notes par M. de Machy, Vol. 1 — 6, à Paris 1757, 12.)  
 . Fr. Cartheuser elementa chymiae dogmatico-experimentalis in  
 cademicum conscr., Hal. 1736, 8. emend. Francof. ad V. 1753, 1766, 8.  
 Gerike fundamenta chymiae rational., Lips. et Guelph. 1740, 8.  
 sp. Neumann's praelectiones chemicae, herausgegeben v. Joh. Christ.  
 Hermann, Berl. 1722, (1740, 4. in 3 Bänden 1749, 4.)  
 ssen Chymia medica dogmatico-experimentalis, oder gründliche und mit  
 menten erzielte medizinsche Chymie, herausgeb. v. Ehr. Heinr. Kessel,  
 . B. Büttchau 1749 — 1755, 4.  
 ssen chymia med. dogmatico-experimentalis, 1. u. 2. Th. Büttchau 1755,  
 1764.  
 n allgemeine Grundsätze der theoretisch-practischen Chemie, herausg. v. J. C.  
 Hermann, 1. 2. B. Dresd. 1755 u. 1756, 4.  
 H. Lewis course of practical chemistry, Lond. 1746, 8.  
 dir. Hofmanni chymia rationalis et experimentalis, s. Collegium  
 med. curiosum, Lugd. B. 1748, 8.  
 acquer élémens de chymie théorique, à Paris 1749, 12. 1754, 12.  
 . physiol. Realw II. B.



et élémens de chymie pratique, Vol. I et II. 1751, 12. 1756, 12.; Übers. des Herrn Macquer's Anfangsgründe der theoretischen Chemie, Leipz. 1752, (1763, 8.) Anfangsgründe der practischen Chemie, Leipz. 1753, 8. 1768, 8.)

Pieron. Lavoisier's vollständige und gründliche Einleitung in die Chemie, C. 1752, 8.

Jam. Millar a new course of chemistry, Lond. 1754, 8.

\* Rud. Aug. Vogel institutiones chemiae, Goett. 1755, 8. (Lugd. et Lips. 1757, 8. Francof. et Lips. 1762, 1764, 1774, 8. Deutsch: Rud. Aug. Vogel's Lehrsätze der Chemie, übers. mit Anmerk. v. Joh. Chr. Wieg. Weim. 1775, 1785, 8.)

Ant. Nütiger's systematische Anstelt. zur reinen und überhaupt applicirten allgemeinen Chymie m. R., Leipz. 1756, 8.

\* Jo. Gottsch. Wallerius chemia physica, 1. — 4. Afdelning, Stockh. 1759 — 1768, 8. (Pars I lat. vers. et locupl. Stockh. 1760, 8. Deutsch: G. Wallerius's physische Chemie, 1. Th. aus dem Lat. übers. v. Chr. And. M. gold, Gotha 1761, 8. 2. Aufl. mit Anmerk. v. Christ. Ehrenfr. Weigel, Leipz. 1780, 8. 2. Th. 1. u. 2. Abth. aus dem Schwed. übers. mit Anmerk. v. C. E. Weigel, Leipz. 1776, 8. 3. u. 4. Abth. Leipz. 1776, 8.)

\* Jac. Reinh. Spielmanni institutiones chemiae, Argent. 1763, (1766, 8. übers.: Hrn. Prof. Spielmann's chemische Begriffe und Erfahrungen, veränd. von Joh. Herm. Pfingsten, Dresd. 1783, 8.)

\* Baume manuel de chymie, à Paris 1763, 8. (1766, 12. übers.: Handb. der Scheidekunst, aus dem Franz. des Hrn. Baume, übers. mit Anmerk. v. K. von Wasserberg, Wien 1774, 8.) Chymie expérimentale et raisonnée, Vol. I — III. à Paris 1773, 8. (übers.: Hrn. Ant. Baume's erläuterte Experiment. Chemie, aus dem Franz. übers. v. J. E. Gehler, 1. — 3. Th. Leipz. 1775 u. 1776, 8.)

Maury instituts de chymie ou principes élémentaires de cette science, Vol. I et II. à Paris 1766, 12.

Procédés chimiques, rangés méthodiquement et définis, à Paris 1769, 8.

Faur. Joh. Dan. Succow's Entwurf. einer physischen Scheidekunst, Jena. Leipz. 1769, 8.

Jac. Joach. Pangen's Grundlegung zur chemischen Erkenntnis der Körper, Anmerk. v. Jul. Joh. Madihn, Halle 1770, 8.

Lud. Tessari chymiae elementa, in aphorismos digesta, Venet. 1772,

Delorme traité de chymie, à Paris 1773, 8.

Ruelle tableau de l'analyse chimique, ou procédés du cours de chimie à Paris 1774, 12.

\* Joh. Gottf. Krieger's Naturlehre, 4. Th., welcher die Chemie enthält, Halle 1774, 4.

\* Joh. Christ. Polnh. Erleben's Anfangsgründe der Chemie, Götting. 1775, 8. (mit Zusätzen v. Joh. Christ. Wieg. Götting. 1784, 1793, 8.)

Herr. T. Scheffers Töreläsningar-samlade, i ordning stälde, och med Anmerkningar utgifve, Upsala 1775, 8. (Deutsch: Hrn. J. J. Schäffer's chemische Vorlesungen, — gesammelt, in Ordnung gestellt und mit Anmerkungen ausgegeben v. Hrn. Prof. und Ritter Dorch. Bergmann, aus dem Schwed. übers. v. Christ. Ehrenfr. Weigel, Greifsw. 1779, 8.)

Christ. Ehrenfr. Weigel's Grundr. der reinen und angewandten Chemie, 1. u. 2. Th. Greifsw. 1777, 8.

Dissen Einleitung zur allgem. Scheidek. 1. — 3. St. Leipz. 1788 — 1793, 8.

Jo. Ant. Scopoli fundamenta chemiae public. cation. ib. accommodata, Prag. 1777, 8. (Papiae 1780, Vienn. 1780. Deutsch: übers. von R. Freis. v. Meidinger, Wien 1786, 8.)

\* Elémens de chymie, théorétique et pratique, rédigés dans un nouveau dre d'après les decouvertes modernes, pour servir aux cours publics l'acad. de Dijon. T. I — III. à Dijon 1778 et 1778, 8. (Anfangsgründe der theoretischen und practischen Chemie, zum Gebrauch der öffentlichen Vorlesungen v. de Morveau, Maret und Laplace; aus dem Franz. mit Anmerk. v. C. E. Weigel, 1. — 3. B. Leipz. 1779 u. 1786, 8.)

Franc. de Wasserberg institutiones chemiae, T. I — III. Vindob. 1778, 1780, 8.

- Rich. du Tannet ar élémens de chymie, à Metz 1779, 8.
- Joh. Friedr. Gmelin's Einleitung in die Chemie, Berl. u. Stett. 1780, 8.
- Ausfl. unter dem Titel: Grundriß der allgemeinen Chemie, 1. u. 2. Th. Götting. 1781, 8. 1804, 8.)
- Joh. Christ. Wiegand's Handb. der allgemeinen Chemie 1. u. 2. Band, Berl. 1786, 1796, 8.)
- Ant. Fourcroy leçons élémentaires d'histoire naturelle et de chymie, I et II, à Paris 1781, 8. (Elémens d'histoire nat. et de chymie, Vol. I et II, à Paris 1786, 8. T. I — V, à Paris 1791, 8. Deutsch: des Herrn Fourcroy Handbuch der Naturgesch. und Chemie, mit Anmerk. v. J. Chr. Wiegand, aus dem Franz. übers. v. Ph. Boos, 1. — 4. B. Erf. 1788 — 1791, 8.)
- Dessein philosophie chimique, à Paris 1792, 8. (1794, 8. augm. par van Mons, à Bruxelles 1795, 8. Deutsch: A. J. Fourcroy's chemische Philosophie oder Grundwahrheiten der neuern Chemie, auf eine neue Art geordnet, aus dem Franz. übers. v. J. G. Seidler, Leipzig. 1796, 8. Englisch: transl. by Des-... Lond. 1807, 8.)
- Dessein Tableau synoptique de chimie, à Paris an 9, 4. (Deutsch: A. J. Fourcroy's System der theoretischen und pract. Chemie in Tabell. entworfen, herausg. v. C. G. Eschenbach, Leipzig. 1801 8ol. Engl. Franz. und Deutsch: A. J. Fourcroy's Uebersicht d. Chemie, herausgeg. v. J. A. Heldmann, 2 Hefte 1800 — 1801; in einer andern Uebersetzung: A. J. Fourcroy's synoptische System über den ganzen Umfang der Chemie, übers. v. Göttes, Cobl. Jahr. 9. 1802) 8ol. 1805 8ol., Englisch: 1802.)
- Dessein Système des connoissances chimiques, T. I — IV, à Paris an 9, 4. (Deutsch: A. J. Fourcroy's System der chemischen Kenntnisse, a. d. Fr. von einer Gesellsch. Deutscher Gelehrten, 1. u. 5. Band v. Chr. W. Wiedemann, Braunsch. 1801; in einer andern Bearbeitung: Fourcroy's System d. chemischen Kenntnisse in Auszügen von Fr. Wolf, 1. — 4. B. Hamb. 1801 — 1805, 8.)
- Wilh. Baumeri fundamenta chemiae theoretico-practicae, Giess. 1780, 8.
- Th. Dycksen chemisk Haandbog, 1. — 3. B. Kopenh. 1784, 8. (Deutsch: Dycksen's kurzes chem. Handb. Kopenh. 1787, 8.)
- Carl Gottfr. Hagen's Grundr. d. Experimentalchemie, Königsb. u. Leipzig. 1790, 8. unter d. Tit.: Grundsätze d. Chemie durch Versuche erläutert, 1796, 8.)
- Fr. Christ. Buch's chemischer Lehrbegriff nach Spielmann's Grundsätzen bearb., Leipzig. 1787, 8.
- Fr. Albr. Carl Gren's system. Handb. d. gesammten Chemie, 1. — 4. Halle 1787 — 1791, 8. (umgearb. Aufl. Halle 1794 — 1796, 8. umgearb. von Fr. Heinr. Klaproth, 1. — 3. Th., Halle 1806 — 1807.)
- J. G. Karl Wartsch's erste Gründe d. systemat. Chemie, Jena 1789, 8.
- Lavoisier traité élémentaire, présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes, T. I — II, à Paris 1789, (nouv. éd. augm. des III, av. fig. 1801, 8. Deutsch: des Herrn Lavoisier's System der phlogistischen Chemie, aus dem Franz. übers. u. mit Anmerk. und Zusätzen verm. v. J. G. Hermbstädt, 1. u. 2. B. m. K. Berl. u. Stett. 1792, verb. 1803, 8.; Englisch: transl. by Kerr, Vol. I et II, 1802, 8.)
- Chaptal élémens de chimie, Vol. I — III, à Montpellier, 1790, 8. Deutsch: J. A. Chaptal's Anfangsgründe d. Chemie, aus dem Franz. übers. u. mit Anmerk. versehen, 1. — 4. Th. Königsb. 1791 — 1805, 8.)
- Erstes m. Fr. Hermbstädt's systematischer Grundriß der allgemeinen Experimentalchemie, zum Gebrauch seiner Vorlesungen entw. 1. — 3. Th. Berl. 1791, umgearb. und verb. mit dem Zusatz: und zur Selbstbelehr. beim Mangel des mündl. Vorles. nach den neuesten Entdeckungen entworfen, 1. — 4. B. Berl. 1800 — 1801, 8.)
- Wilh. Nicholson's Anfangsgründe der Scheidek., aus d. Engl. übers. v. C. Spohr, Alz. 1791, 8.
- Fr. Ad. Richter's Lehrb. d. Chemie, Halle 1791, 8.
- W. Weber's physische Chemie, Münch. 1791, 8. (neu bearbeitet: 1798, 8.)



- \* Chr. Gietanner's Anfangsgründe der antiphlogistischen Chemie, Berl. 1792  
8. (verb. u. verin. Aufl. 1795, 8. dgl. 1801, 8.)
- J. F. W. Göttling's Versuch einer physischen Chemie f. Jugendlehrer, Jena  
1792, 8.
- \* Dessen Handbuch der theoretischen und pract. Chemie, 1. — 3. B. Jena 1798 —  
1800, 8.
- Dessen physisch: Chemische Encyclopädie, oder physisch: chemischer Hausfreund, 1. — 3.  
B. Jena 1805 — 1807, 8.
- Jos. Friedr. v. Jacquin's Lehrbuch der allgem. und. mediz. Chemie, zum Gebra-  
uch d. Vorlesungen, 1793, 8. (1800, 1803, 8. vierte Aufl. in 2 Bänden 1810, 8.)  
Lateinisch: Viennae 1793, 8.)
- \* G. Friedr. Hildebrandt's Anfangsgründe der Chemie zum Grundriss akadem.  
Vorlesungen nach dem neuen System verabfaßt, 1. — 3. B. Erlang. 1794 — 1802, 8.
- \*\* Dessen Encyclopädie der gesammten Chemie, 1. — 16. Heft, Erlang. 1799 —  
1810, 8.
- Dessen Erklärung der Abbildungen zur Encycl. d. Chemie, m. K. Erlang. 1807, gr. 8.
- \*\* Dessen Lehrbuch der Chemie als Wissenschaft und Kunst, Erlang. 1816, 8.
- Alex. Nic. Scherer's Versuch einer populären Chemie, Mählf. 1795, 8.
- Dessen Grundzüge der neuern chemischen Theorie, und Nachträge dazu, Jena 1799  
u. 1796, 8.
- Dessen Grundriß der Chemie, für akadem. Vorlesungen entworfen, Tübing. 1800,  
C. J. B. Bouillon-la-Grange manuel d'un cours de chimie, T. I et II  
à Paris an 7. (3. édit. an 11; 8. Deutsch: C. J. B. Bouillon-Lagrange's  
Handbuch eines Cours der Chemie, aus dem Franz. übersetzt mit einigen Anmerk.  
Dan. Jäger, 1. u. 2. Th. Leipz. 1801 u. 1803, 8.)
- Will. Henry elements of experimental chemistry, Lond. 1799, 8. (6  
7 Auflagen erhalten. Deutsch: W. Henry's Chemie für Dilettanten, aus dem Eng-  
nach d. 4. Aufl. umgearb. v. J. W. Trommsdorff, Erfurt 1803 u. 1807, 8.)
- \*\* Jac. Jos. Winterl prolusiones ad chemiam seculi 19, Budae 1800,  
8. Access. ib. 1803, 8. (Erläuternde Schriften: J. J. Winterl's Darstellung  
d. vier Bestandth. d. anorganischen Natur, aus d. Lat. v. J. Schuster, Jena 1804,  
Joh. Chr. Bersted's Materialien zu einer Chemie des 19ten Jahrhunderts,  
St. Regensb. 1803, 8. R. W. G. Kastner's Materialien zur Erweiterung d. Natur-  
z. B. Jena 1805, 8. Joh. Schuster's System der dualistischen Chemie des Pro-  
f. Jac. Jos. Winterl, Berl. 1807, 8.)
- \*\* Joh. Barth. Trommsdorff's systematisches Handbuch der gesammten Che-  
mie, zur Erleichterung des Selbststudiums dieser Wissensch., 1. — 5. B. Erf. 1800 —  
1803, 8. (Neue verb. Aufl., auch unter dem Titel: die Chemie im Felde der Erfor-  
schung, 1805, 8. 6. — 8. B. 1804 — 1808, 8.)
- \* Thom. Thomsons system of Chemistry, Vol. I — V, Lond. 1802,  
(Die neueste Aufl. ist vom Jahr 1810. Deutsch: Th. Thomson's System d. Che-  
mie, nach der zweiten Engl. Ausg. übers. v. F. Wolf, 5 Bände, Berlin 1805  
1811, 8.)
- Dessen Elements of Chemistry, Lond. 1810, 8.
- \* Jos. Black's Lectures on the Elements of Chemistry, published from  
his MS. by Dr. Robinson, Vol. I and II, Lond. 1803. (Deutsch: Jos. Black's  
Vorlesungen über die Grundlehren von der Chemie, herausg. v. F. Robinson; 2  
B. dem Engl. mit Anmerk. v. F. v. Crell, 1. — 4. B. Hamb. 1804 u. 1805, gr. 8.)
- R. W. Juch's System der antiphlogistischen Chemie, nach den neuesten Entdeckungen  
1. Th. Nürnberg. 1805, 8.
- Dessen Handb. der populären Chemie, München 1807, 8.
- J. Schaub's system. Lehrbuch der allgem. Chemie, mit Hinsicht auf die neu-  
Entdeckungen, 1. Th. Nürnberg. 1804, 8.
- Ernst Bartel's Grundlinien einer neuen Theorie d. Chemie und Physik, nach  
Erfahrung entworfen, Hannov. 1804, 8.
- P. A. Adet principes de chimie, à Paris 1804, 8. (Deutsch: P. A. Adet's  
Grundz. der Chemie, aus dem Franz. mit Zusätzen v. Huber, Basel 1805, gr. 8.)
- H. F. Link die Grundwahrheiten der neuern Chemie, nach Fourcroy, mit  
100 Zusätzen, Moskau 1805, 8.
- G. Etromener's Grundr. der theoretischen Chemie, 2 Theile, Götting. 1808,



Ed. Wurzer's Handbuch der populären Chemie, zum Gebr. bei Vorlesungen zur Selbstbelehrung, Leipz. 1806, gr. 8. (2. umgearb. Aufl. Leipz. 1814, 8. handsch.: Beknopt Handboek der Scheikunde etc. Utrecht 1809, und nach 2ten Aufl. 1815, 8.)

W. G. Kastner's Grundriß der Chemie, zum Gebr. für Vorles. 1. Th. 11b. 1807, 8.

McCum's System of theoretical and practical Chemistry, Vol. I and II; sec. 1 Lond. 1807, 8.

Wissen Manuel of a Course of Lectures on Experimental Chemistry and of Mineralogy, Lond. 1809, 4.

W. H. Grindel's Handb. der theoret. Chemie zu akadem. Vorlesungen, Dor. 1808, 8.

Jam. Parkinson the Chemical Pocket-Book, or Memoranda chemica, added in a Compendium, Lond. 1809, 8.

Ch. Sylvester's Experimental Treatise on Chemistry, comprising the important Facts on the Science, Lond. 1809, 8.

Sam. Parke's Rudiments of Chemistry 1810, 12.

Wissen Chemical Catechism the 5th. edit., Lond. 1814, 8.

J. W. Döbereiner's Lehrb. der allgem. Chemie, zum Gebrauche seiner Vorlesungen entworfen, 1. — 3. B. Jena 1811 u. 1812, 8.

#### 4) Wörterbücher.

P. J. Macquer Dictionnaire de Chymie, 3 Tomes, à Paris 1766, 12.

Ed. 4 Tomes, à Paris 1778, 8. nouv. éd. corr. 5 Tomes, à Neuchourg

1. 8. (Deutsch: Allgemeine Begriffe der Chymie nach alphabetischer Ordnung, aus

Franz. mit Anmerk. v. Carl Wilh. Pörner, 1. — 3. Th. Leipz. 1768 u.

2. 8. vollständiger: Pet. Jos. Macquer's chymisches Wörterbuch, oder allge-

meine Begriffe d. Chymie nach alphabet. Ordnung, aus dem Franz. und mit Anmerk.

Zusätzen von Jos. Gottfr. Leonhardi, 1. — 6. B. Leipz. 1781 — 1783.

2. verm. und verb. Aufl. 1. — 7. B., Leipz. 1788 — 1791, 8., dritte Aufl.

Chimiegeschichte der bloßen Vermuth. u. mit Ergänzung durch die neuern Erfahr.

gestaltet von J. Benj. Richter, 1. u. 2. Th. Leipz. 1806 u. 1807, 8.

3. neu bearb. u. fortges. v. Elgesm. F. Hermstädt, Leipz. 1809, 8. Neue

Beob. und Anmerkungen zu Macquer's chem. Wörterbuche, 1. Ausgabe v. Joh.

Gottfr. Leonhardi, 1. u. 2. B. Leipz. 1792 u. 1793, 8.)

W. Fiedler's allgemeines pharmaceutisches, chemisches, mineralisches Wör-

terbuch, 1. u. 2. B. Mannh. 1787 u. 1790, 8.

W. Kels onomatologia chemica practica, oder vollständiges pract. Handb.

Chemie, in alphab. Ordnung, mit Vorrede von J. F. Gmelin, Ulm 1791,

1. B. Bourguet's chem. Handwörterbuch nach den neuesten Entdeckungen, 1. u.

2. B. Berl. 1798 — 1800. 3. — 6. B. fortges. v. J. B. Richter, Berl.

1805, 8. Anhang zum 6. Bande, Berl. 1805, 8.

W. Trommsdorff's allg. pharmac. chemisches Wörterbuch 1. — 3. Th. Erfurt

1810, 8.

W. F. Klaproth's und F. Wolf's chemisches Wörterbuch, 1. — 5. B.,

1807 — 1810, 8.

Aikin et C. R. Aikin Dictionary of Chemistry and Mineralogy,

1. and 2, London 1807, 4.

#### 5) Nomenclaturen.

Méthode de Nomenclature chimique proposée par MM. de Morveau,

Lavoisier et Fourcroy, à Paris 1787; (Deutsch: Methode der chemischen

Nomenclatur für das antiphlogistische System, von den Herren de Morveau, La-

voyer, Berthollet und de Fourcroy, nebst einem Systeme der dieser No-

menclatur angemessenen chemischen Zeichen, v. Paffenraß u. P. A. Udet, aus

Frans. von Carl Frelh. v. Meidinger, Wien 1793, (1801, 8.)

Christoph Girtanner's neue chemische Nomenclatur für die deutsche Sprache,

1791, 8.

Joh. Andr. Scherer's Versuch einer neuen Nomenclatur für deutsche Chemisten,

1792, 8.

Georg Eimcke's Versuch einer systemat. Nomenclatur für die phlogistische und

antiphlogistische Chemie, Halle 1793, 8.

Joh. Christ. W. Nemler's tabellarischer Versuch einer Französisch-Deutschen Nomenclatur der neuern Chemie, Leipz. 1795, 8ol.

Dessen neues Chemisches Wörterbuch, oder Handlexicon und allgemeine Uebersicht der in neuen Zeiten entworfenen Französisch-Lateinisch-Italienisch-Deutschen Chemischen Nomenclatur, Erfurt 1795, 8.

Westrumb's Versuch eines Beitrag's zu den Sprachbereicherungen für die Deutsche Chemie, (d. H. phys. Abh. 5. B. 2. St.) Hannover 1795.

Pye's New Chemical Nomenclature, selected from the most distinguished modern writers on Chemistry, London 8.

J. B. Fougeron nouvelle synonymie chimique, à Paris 1815, 8.

6) Vermischte Schriften eines oder mehrerer Verfasser.

\* Andr. Libavii opera chimica, Vol. I — VII, Francof. 1606, fol.

\* Joh. Rud. Glauberi opera chymica, Bücher und Schriften, 2 Th. Frankfurt a. M. 1658, 4.; operum chym. continuatio, Frankfurt. 1659, 4. (Glauberi concentratus, oder Kern der Glauberschen Schriften, Leipz. u. Bresl. 1715, 4.)

\* Jo. Mayow tractatus quinque medico-physici, Oxon. 1669, (1674) 8.  
Pet. Poterii opera omnia, Francof. 1676, (1698.) 4.

Joh. Kunfel's chemische Anmerkungen, Wittenb. 1677, 8. (lat. donat. ti observationes chymicae, a Car. Ant. Ramsajo, Lond. et Roterd. 1678, 12.

Dessen mit dem Zusatz von Löwenstern fünf chemische Tractate, Frankfurt. u. Leipz. 1721, 8.

\* Joh. Joach. Becher's chemischer Glückshafen, oder große chymische Concoctanz, Frankfurt. a. M. 1682, (Halle 1726, 4.)

\* Ejusd. opuscula chymica rariora, ed. per Frid. Rothschoizium Norimb. 1719, 8.

Chr. Love Morley collectanea chymica Leydensia, Lugd. B. 1684, 4. (Uebers. Jena 1728, 8.)

Georg. Ern. Stahl's observationes selectiores physico-chemico-medicae curiosae, Hal. 1709, 8.

Ejusd. opusculum chemico-physico-med., Hal. 1715, 4.

Ejusd. experimenta, observationes, animadversiones CCC numero, chymicae et physicae, Berol. 1731, 8.

Urb. Hierne acta et tentamina chymica, Holm. 1712, 4. (c. ann. J. G. Wallerii, T. I et II, Holm. 1752, 8.)

Frid. Hofmanni observationum physico-chem. select. libri, Hal. 1722 4. (1756, 4. Venet. 1749, 4.)

Joh. Heinr. Pott exercitationes chymicae, Berol. 1738, 4.

Ejusd. observationum et animadvers. chymicarum collectio I et II, Berol. 1739 u. 1741, 4.

Ebeness. chemische Untersuchungen, Potsd. 1746, 4. (Berlin 1757, 4.) Fortsetzung, Berl. u. Potsd. 1751, 4. Zweite Forts. 1754, 4.)

Dessen physikalisch-chemische Streitchriften, 5 Stücke, Berl. 1756, 4.

Dessen neu entdeckte physisch-chemische Materien, Berl. 1762, 4.

Joh. Fr. Henkel's kleine mineralogische und chemische Schriften, herausgeg. Carl Fr. Zimmermann, Leipz. 1744, 8.

Christoph Andr. Mangold's chymische Erfahrungen, Erf. 1748, 4. Fortgesetzte chemische Erfahr., Frankfurt. u. Leipz. 1749, 4.

Joh. Christ. Bernhard's chemische Versuche u. Erfahrungen, Leipz. 1755, 8.

Ernst Gottfr. Kurella's chymische Versuche und Erfahrungen, 1. St., Berl. 1756, 8.

Joh. Heinr. Gottl. v. Justi's gesammelte chymische Schriften, 1. — 5. 2. Berlin u. Leipz. 1760 — 1771, 8.

Joh. Gottl. Lehmann's physikalisch-chemische Schriften, Berl. 1761, 8.

Andr. Sigism. Marggraf's chymische Schriften, 1. u. 2. Th., Berl. 1761 1767, 8.

Joh. G. Model's chemische Nebenstunden und Fortsetzung, Petersb. 1762 1768, 4.

Dessen kleine Schriften, Petersb. 1775, 8.

W. Levl's physisch-chemische Abhandlungen, 1. u. 2. Th., Berl. 1764, 8.

Joh. Theod. Eller's physikalisch-chemisch-medizinische Abhandlungen, über v. C. Abr. Gerhard, 1. u. 2. Th., Stettin u. Leipzig 1764, 8.



- Joseph. Christ. Wiegand's kleine chymische Abhandlungen u. Fortsetzung, Land-  
 sasse, 1767, 1770, 8.
- Johr. Ehrenfr. Weigel observationes chemicæ et mineral. P. I et II,  
 edit. 1771 u. Gryphisw. 1772, 4. (übersetzt und mit vielen Zusätzen vermehrt  
 Joseph. Theod. Phil., 2 Theile, Bresl. 1779, 8.)
- Guynon de Morveau digressions académiques, ou essais sur quelques  
 arts de physique, de chimie et d'histoire nat. à Dijon et à Paris 1772, 8.
- Lavoisier opusculs physiques et chimiques, T. I et II, à Paris 1779,  
 (Deutsch: Herrn Lavoisier's physikalisch-chemische Schriften, aus d. Franz.  
 f. mit Anmerk. von Ehrst. Ehrenfr. Weigel. 1. — 3. B., Greifsw.  
 3 — 1785, 4. u. 5. B. übersetzt und mit Anmerk. von H. F. Link, Greifsw.  
 2 u. 1793.)
- E. W. Erleben's physikalisch-chemische Abhandlungen, Leipzig. 1776, 8.
- Hagen's Abhandlungen, chemischen und physikal. Inhalts, Königsb. 1778, 8.
- Torber. Bergmann opuscula physica et chemica, Vol. I et II, Lips.  
 1779 et 1783, 8. (ed. nov. emend. Vol. I — III, ed. N. G. Leske, Lips.  
 1786, 8. Vol. IV — VII, ed. E. B. G. Hebenstreit, Lips. 1787 — 1790,  
 Deutsch: Torbern Bergmann's kleine physische und chymische Werke, aus d.  
 v. H. Tabor, 6 Bände, Frankf. a. M. 1785 — 1790, 8.)
- G. Wallerius disputationes acad., Vol. I et II, Stockh. et Lips. 1780,  
 1. 8.
- K. Richard's chymisch-physische Schriften, Berl. 1780, 8.
- Deffen Sammlung physikalischer u. chemischer Abhandlungen, 1. B. Berl. 1784, 8.
- Car. Guil. Scheele opuscula chemica et phys., Latine vert. G. od. Henr.  
 Häffler, ed. et præfatus est E. B. G. Hebenstreit, Vol. I et II, Lips. 1788  
 1789, 8. (Deutsch: Sammtliche physisch-chemische Werke von C. W. Scheele,  
 1. u. 2. B. Berl. 1792, 8.)
- Alf. Kirwan physikalisch-chemische Schriften, aus d. Engl. übers. von For. v.  
 1. u. 2. B. Berl. 1783 — 1801, 8.
- Fourcroy mémoires and observations de chymie, à Paris 1784, 8.  
 (Deutsch: Fourcroy's chemische Beobachtungen u. Versuche, aus d. Franz. mit  
 Anmerk. v. E. B. G. Hebenstreit, Leipzig. 1785, 8.)
- Joseph. Fr. Westrumb's kleine physikalisch-chemische Abhandlungen, 1. — 3.  
 Leipzig. 1785 — 1789, 8. 4. — 6. B. auch unter dem Titel: Chemische Ab-  
 handlungen, 1. — 3. B. 1795 — 1800, 8.
- Deffen kleine Schriften, physikalischen, chemischen u. technischen Inhalts, 1. B.  
 1805, 8.
- Ignaz. Friedr. Hermstädt's physikalisch-chemische Versuche u. Beobach-  
 tungen, 1. — 3. B. Berl. 1786 — 1790, 8.
- J. W. Richter über die neuern Gegenstände der Chemie, 1. — II. St. Bresl.,  
 1791 u. 1792, 8.
- G. Link's Beiträge zur Physik u. Chemie, 1. — 5. St. Stettin 1795 —  
 1807, 8.
- A. Lampadius Sammlung practisch-chemischer Abhandlungen u. vermischte  
 Erfahrungen, 1. u. 2. B. Dresd. 1793 u. 1797, 8.
- Franc. Marabelli's physisch-chemische Aufsätze, aus verschiedenen periodischen  
 werken und dem Manuscripte des Verf. gesammelt, übersetzt und erläutert v. Sal.  
 Just. Titius, Leipzig. 1795, 8.
- Schubert's Beiträge zur Erweiterung und Berichtigung der Chemie, 1. — 3.  
 Erf. 1799 — 1802, 8.
- Haume's kleine chemische Schriften, aus d. Franz., Frankf. a. M. 1800, 8.
- Joseph. Mar. Socquet's pract. chemische Abhandlungen, aus d. Franz. mit An-  
 merk. v. J. W. Trommsdorff, Erf. 1802, 8.
- J. Segur lettres élémentaires sur la chimie, à Paris an 11, 8.
- E. W. G. Kastner's Beiträge zur Begründung einer wissenschaftlichen Chemie,  
 1. 2. B. Heidelberg. 1806 u. 1807, 8.
- 7) Zeitschriften.
- For. Crevil's chemisches Journal für Freunde der Naturlehre, Arznelgelehrte  
 , Haushaltungs- und Manufacturen, 1. — 6. Th. Lemgo 1778 — 1781, 8.
- Deffen neueste Entdeckungen in der Chemie, 1. — 15. Th. Leipzig. 1781 — 1786,  
 (Auswahl aus den eigenthümlichen Abhandlungen und Beobachtungen aus den neu-

# 120 Chemische Analyse Chemische Bestandtheile d. Körper.

seiner Entdeckungen in der Chemie, 1. — 3. B. Leipzig, 1786, 8. 4. Band, welcher noch viele gedruckte Aufsätze enthält, Leipzig, 1786, 8.)

Deffen chemisches Archiv, 1. u. 2. B. Leipzig, 1783, 8.

Deffen neues chem. Archiv, 1. — 8. B., Leipzig, 1785 — 1791, 8.

Deffen neuestes chem. Archiv, 1. B., Weimar 1798, 8.

\*\* Deffen chemische Annalen für die Freunde der Naturlehre, Arzneigeheltheit, Haushaltungskunst, und Manufacturen, 40 Bände in 20 Jahrgängen, Helmst. u. Leipzig, 1784 — 1803, 8.

\* Deffen (v. Crell) Beiträge zu den chemischen Annalen, 6. Theile, Helmst. u. Leipzig, 1785 — 1799, 8.

Deffen Auswahl vorzüglichster Abhandlungen, aus den Französischen Annalen der Chemie, 1. B., Helmst. 1802, 8.

Jac. Andr. Weber's physisch-chemisches Magazin für Aerzte, Chemisten und Künstler, 1. u. 2. Th., Berlin 1780, 8.

\* (J. F. A. Göttling's) Almanach oder Taschenbuch für Scheidekünstler und Apotheker, 30 Jahrgänge, Weimar 1781 — 1809, 12.

\*\* Annals de Chemie, ou Recueil de mémoires, concernant la Chemie et les arts, qui en dependent, par M. M. Morveau, Lavoisier, Monge, Berthollet, de Fourcroy, le Baron de Dietrich, Hassenfratz et Adet, à Paris et Londres, 50 Tomes, 1789 — 1805, 8.

Recherches physico-chymiques, par Deiman, Troostwyk, Nieuwland und Bond, 3 Mem. Amsterd. 1792 — 1794, 8.

\* Alex. N. Scherer's allgemeines Journal d. Chemie, 1. — 6. B., Leipzig, 1798 — 1801.

Deffen Archiv für die theoretische Chemie, 1. — 3. Heft, Jena 1800 u. 1801. 4. Heft, Berl. 1802, 8.

\*\* Neues allgemeines Journal der Chemie von Ch. F. Bucholz, For. v. Crell, C. F. Hermstädt, M. H. Klaproth, J. W. Richter, Alex. N. Scherer, J. W. Trommsdorff, herabg. von A. F. Gehlen, 1. — 6. B. Berl. 1803 u. 1805, 8.

\*\* Journal der Chemie und Physik von C. F. Bucholz, For. v. Crell, C. F. Hermstädt, M. H. Klaproth, J. W. Richter, J. W. Ritter, J. W. Trommsdorff, herabg. v. A. F. Gehlen, 1. — 4. B., Berl. 1806 — 1807, 8. Journal für die Chemie, Physik und Mineralogie, v. J. J. Bernhardt, H. C. Dersted, Ch. Bucholz u. s. w. 5. — 9. B., Berl. 1807 — 1810, 8.

\*\* J. C. Schweiigger's neues Journal für Chemie und Physik, in Verbindung mit J. J. Bernhardt, C. F. Bucholz, For. v. Crell, A. F. Gehlen, C. F. Hermstädt, J. Hildebrandt, M. F. Klaproth, H. C. Dersted, C. H. Pfaff, E. J. Sorbex, C. S. Weiss, 1. — 3. Jahrg., Nürnberg 1811 — 1816, 8.

Ferd. Steffens u. D. H. Grindel's Russisches Jahrb. für die Chemie und Pharmacie, 1. B., Alga 1809, 8.

Chemische Analyse, s. Analyse der Chemiker. — Anziehung, s. Verwandtschaft der Chemiker.

Chemische Bestandtheile<sup>1</sup> der Körper, (Chemica elementa<sup>2</sup>, s. principia<sup>3</sup> corporum,) Grundstoffe, Uraufänge<sup>4</sup>, Urstoffe<sup>5</sup>, Elemente<sup>6</sup>, Einfache oder Unzerlegte Stoffe<sup>7</sup>, (Partes constitutivae<sup>8</sup>), einzelne Körpertheile gemischter Substanzen, welche die Chemie als gleichartig unter sich unterscheidet, in denen selbst aber keine Verschiedenheit weiterwahrgenommen wird. Doch unterscheidet man auch nächste Bestandtheile<sup>9</sup>, (Partes constitutivae proximae<sup>10</sup>, Principia proximae<sup>11</sup>), in denen bei fortgesetzter chemischer Untersuchung noch qualitative Verschiedenheit wahrgenommen wird, von den entfernten Bestandtheilen<sup>12</sup>, (Partes constitutivae remotae<sup>13</sup>, Principia remota<sup>14</sup>), die aber nur dann, wenn man die weitere Bergliederung aufgeben zu müssen glaubt, als letzte Bestandtheile<sup>15</sup> — 14) Gren's Handb. d. Chemie, 1. B. S. 19 u. 23.



andtheile<sup>15</sup>, (Principia prima<sup>16</sup>, s. primitiva<sup>17</sup>), angesehen werden. S. Chemie.

15) — 17) S. ebend. a. a. D.

Chemische Bewegung<sup>1</sup>, (Chemicus motus,) die innere Veränderung der Mischung der Körper durch Anziehung der mit einander chemisch verwandten Stoffe. S. Chemie.

11) Schelling's Ideen zu einer Philosophie der Natur, S. 257.

Chemische Mischung<sup>1</sup> oder Zusammensetzung<sup>2</sup>, (Chemica mixtio<sup>3</sup>, s. synthesis<sup>4</sup>, s. compositio<sup>5</sup>.) Chemisches Gemisch<sup>6</sup>, eine Verbindung zweier oder mehrerer verschiedenartigen Stoffe zu einem homogenen Ganzen, im Gegensatz des Gemenges<sup>7</sup>, oder Zusammenhäufung<sup>8</sup>, oder Zusammenfügung<sup>9</sup>, oder Aufwerks<sup>10</sup>, Aggregats<sup>11</sup>, (Aggregatio<sup>12</sup>), wodurch bloß erhaltene Theile verbunden werden. Vgl. auch Aggregat. S. Chemie.

11) — 5) Gren's Handb. d. Chemie, 1. B. S. 21. 6) 7) Hildebrandt's Lehrb. d. Chemie, 1. B. S. 15. u. 14. 8) 9) Gren's Handb. u. f. w. a. a. D.

10) 11) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. S. 14. 12) Gren's Handb. u. f. w. a. a. D.

Chemische Mittel, s. unter Chemischer Proceß. — Operation, s. unter Chemischer Proceß.

Chemische Physiologie. So unterscheidet Hildebrandt<sup>1</sup> denjenigen Theil der Physiologie, der die Kenntniß der Stoffe, aus denen er besteht, und ihrer Mischung mit einander, welche auf Chemie sich gründet, zum Gegenstand hat, im Gegensatz der anatomischen und der eigentlichen Physiologie. Vgl. Physiologie.

11) S. dessen Lehrb. d. Physiol. S. 4.

Chemische Reize<sup>1</sup>, (Chemica irritamenta.) So werden äußere Einwirkungen auf den reizfähigen Körper bezeichnet, welche nach den Gesetzen der chemischen Verhältnisse wirken, und durch chemische Reagentien erkannt werden. S. Reiz.

11) Fufeland's Pathol. 1. B. S. 189.

Chemische Sinne, (Chemici sensus,) als solche werden von Linné<sup>1</sup> der Geruch- und Geschmackssinn, im Gegensatz des Gesichtssinns und Gehörsinnes als cosmischer Sinne bezeichnet. S. Sinne.

11) Exposition d. Physiol. S. 229.

Chemische Thätigkeit, s. unter Chemischer Proceß.

Chemische Theilung<sup>1</sup> oder Zerlegung<sup>2</sup> oder Zersetzung<sup>3</sup>, (Chemica divisio<sup>4</sup>.) Scheidung<sup>5</sup>, die Aufhebung der chemischen Mischung, die, wenn die einzelnen chemischen Bestandtheile, dann beachtet werden, und eine chemische Untersuchung der Zweck ist, zur chemischen Analyse führt. Vgl. Analyse der Chemiker.

11) Gren's Handb. d. Chemie, 1. Th. S. 27.

2) — 5) Dobergetner's

Lehrb. d. Chemie, 1. B. S. 14.

Chemische Untersuchung, s. unter Chemische Theilung. —

Verwandtschaft, s. Verwandtschaft der Chemiker. — Vorrich-

tung, s. unter Chemischer Proceß. — Zerlegung oder Zersetzung,

Chemische Theilung. — Zusammensetzung, s. Chemische Mi-

schung.

**Chemischer Proceß** <sup>1</sup>, (*Chemicus processus* <sup>2</sup>), der wirkliche Vorgang bei Veränderung einer chemischen Mischung, nach chemischen Principien betrachtet, es sei nun durch geßiffentliche Anwendung chemischer Mittel oder Verfahrungsweisen, wo man dann denselben auch als *Chemische Operation* <sup>3</sup> oder *Vorrichtung*, (*Operatio chemica* <sup>4</sup>), bezeichnet, oder durch innere Thätigkeit der Mischung, oder *Chemische Thätigkeit* bei zufälligen Einwirkungen von Außendingen. S. *Chemie*.

<sup>1</sup>) — <sup>4</sup>) *Gren's Handb. d. Chemie*, §. 67.

**Chemisches Gemisch**, s. *Chemische Mischung*. — **Verhältniß**, s. *Chemismus*.

**Chemismus** <sup>1</sup>, (*Chemismus*), *Chemisches Verhältniß* <sup>2</sup>, der Subgriff alles dessen, was in Naturphänomenen aus Mischungsveränderungen nach chemischen Grundsätzen erklärlich und dadurch bedingt ist, namentlich im thierischen Organismus, als *Thierischer Chemismus* <sup>3</sup>, dem dynamischen und mechanischen Verhältniß in Triplität entgegenstehend. Vgl. *Chemie*.

<sup>1</sup>) *Gruthuysen Organozootomie*, Nr. 2.

<sup>2</sup>) *Burdach's Encycl. d. Heilwiff.* I. B. §. 611.

<sup>3</sup>) nach *Gruthuysen a. a. D.*

**Cherubim**, biblisch ein Engelnahme, wird von *Paracelsus* <sup>1</sup> als ein himmlischer Ausfluß beschrieben, der alle Naturmächte auf Erden und auch in dem menschlichen Leben beherrscht. S. unter *Theosophistische Systeme der Natur*, *Paracelsisches System*.

<sup>1</sup>) in *expos. psalmod. David*.

**Chiasma**, *Chiasmus*, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte <sup>1</sup>, im allgemeinen die Form eines Kreuzes, daher auch *Durchkreuzung*. S. *Decussation*.

<sup>1</sup>) *Χίασμα, Χίασμος*.

**Chiliferae venae**, s. *Echylusgefäße*.

**Chilificatorium organum**, s. *Verdauungssystem*.

**Chilo**, *Chilon*, i. q. *Labeo*, vgl. *Cheilon*.

**Chilus**, ungewöhulich und unrichtig geschrieben, i. q. *Chylus*.

**Chimia**, s. *Chemie*.

**Chira**, corrumptes Wort statt *Hira*.

**Chiriten**, (*Chiritae* <sup>1</sup>), *Bildsteine*, oder *Naturspiele*, meist aus dem Geschlecht der *Stalactiten*, die menschlichen Händen zufällig ähneln. S. *Anthropoglyphen*.

<sup>1</sup>) *Wallerii syst. mineral. T. II. gen. 73. sp. 629. i.*

**Chiromant**, (*Chiromanta* <sup>1</sup>, *Chiromantes* <sup>2</sup>, *Chiromanticus* <sup>3</sup>), *Chiroscep*, (*Chiroscopus*, *Manuinspex* <sup>4</sup>), ein der *Chiromantie* Trauender und sie Uebender. S. *Chiromantie*.

<sup>1</sup>) *Mejen's chiromantia med.* S. 21.

<sup>2</sup>) *Χειρομαντης; s. Χειρομαντιν.*

*Peuceri de praecip. divination. generib. Serv. 159f. p. 371.*

<sup>3</sup>) *Th. Paracelsi l. de imaginib. c. 7.*

<sup>4</sup>) *Gloss. vet. v. Χειροσκοπος.*

**Chiromanticum judicium**, s. *vaticinium*, s. *Chiromantisches Urtheil*.

**Chiromanticus**, s. *Chiromant*.

**Chiromantie**, (*Chiromantia* <sup>1</sup>), *Chiromanci* <sup>2</sup>, *Handkundigung*, (*Chyromantia* <sup>3</sup>), *Chyromanthie* <sup>4</sup>. Unter den mehreren Bestrebungen des menschlichen Geistes, aus anscheinend zufälli-

<sup>1</sup>) nach dem Griechischen gleichlautenden Worte von *χειρ*, Hand, und *μαντεια*, Divination. <sup>2</sup>) — <sup>4</sup>) *vittos* und veraltet, s. die Literatur am Schluß dieses Artikels.



ni äußern Andeutungen das Verborgene und die Geheimnisse der Natur und des Lebens zu erspähen, welche gleichwohl mit jenen Charakteren in durchaus keinem ersichtlichen Zusammenhang stehen, gezerrt auch die vermeintliche Kunst, aus den Hautfalten oder Hauteriefungen der hohlen Hand, welche bei allen Menschen mehrere oder andere Verschiedenheiten darbieten, nicht nur ihren inneren Charakter, sondern auch ihr jetziges und künftiges Lebensgeschick zu ersehen, welches nämlich die Andeutung obigen Wortes ist.

So wenig Vertrauen auch die Physiologen der neuern Zeit auf diese Kunst setzen, und so wenig Realität der nüchterne Verstand derselben anerkennen kann; so ist es doch in physiologischer Hinsicht ein merkwürdiges Problem der Geschichte der Entwicklung des menschlichen Geistes, wienach man schon in den ältesten Zeiten auf die Vermuthung fallen konnte, daß des Menschen inneres Wesen und Geschick seiner Hand zu lesen seyn soll, und wie das Bemühen, diese veräusserten Chiffren zu deuten, sich unter mehrern Völkern und Generationen bis auf den heutigen Tag erhalten konnte, wo öfters auch Gebildete und Naturverständige wenigstens neugierig hinhorcht und aufmerkt, wenn ein Chiromant mit der Miene des Vertrauens die Handlineamente prüfend untersucht, und die Grundsätze einer angeblichen Kunst auf sie anzuwenden sucht. Um deswillen sei auch hier das, was die Chiromantie über die von ihr beachteten Eigenschaften der menschlichen Hohlhand ausspricht, und als Lehre aufstellt, in eine gedrängte Uebersicht zusammenbefaßt.

Vorher etwas über das Geschichtliche der Chiromantie.

Man leitet die Kunst, aus den Händen zu wahr sagen, von den Chaldäern ab, wo sie schon zu Zeiten des Propheten Daniel geübt worden seyn soll. Man glaubt, daß sie sodann von diesen zu den Ägyptern gekommen sei, von denen die Griechen und später die Römer die Kenntniß derselben erlangt haben sollen. Nur gezwungen werden einzelne Stellen des alten Testaments auf die Chiromantie deuten<sup>5</sup>; die neuern Juden, sonst dem Aberglauben und der Schwärmerei nicht ungeneigt, kennen diese Lehre gar nicht. Auch verwerthet es alles historischen Beweises, daß die Zigeuner der neuern Zeit, die bekanntlich das Wahrsagen aus der Hand professionsmäßig treiben, als Nachkömmlinge der alten Ägyptier, selbiges noch von ihnen ererbt hätten. Die sogenannte Lebenslinie aber kannte schon Aristoteles und verwirft es nicht, daß ihre Länge der des muthmaßlichen Lebens proportionirt sei<sup>6</sup>. In dem Traumbuche des Artemidorus aus dem zweiten Jahrhundert<sup>7</sup> haben wir zuerst eine zusam-

5) 2. Buch Mos. 13. Cap. 9. B. „Darum soll dir es seyn ein Zeichen in deiner Hand.“ Hiob 37. Cap. 7. B. „Alle Menschen hat er in der Hand, als verschlossen, daß die Leute lernen, was er thun kann,“ nach der Vulgata aber: „in manu omnium hominum signat, ut noverint singuli opera sua.“

6) hist. animal. l. 1. c. 15. „Pars interior manus vola dicitur, carnosior est et scissuris vitae indicibus distincta, longioris scilicet vitae, singulis autem binis ductis per totam; brevioris binis, quae non longitudinem totam designant.“ Problem. sect. 10. Nr. 43. „Cur qui manus caesuram per totam obtinent palmam vivere diutius possunt?“ Probl. 8. 34. Nr. 10. „Cur homines, qui virgulam suae palmae ductum per totam latitudinem habent, vitae longissimae esse possunt?“ 7) C. die Literatur zum Schluß dieses Artikels.

menhängende Lehre über die vermeintliche Deutung der Lineamente der Hand erhalten. Vorzüglich aber erhielt die Chiromantie zugleich mit der Astrologie ihre höhere Ausbildung, und ging von nun an mit ihr Hand in Hand. In späterer Zeit trug der aller Art von höhern Naturpotenzen gewogene Cardanus<sup>8</sup>, vornehmlich auch Theophrastus Paracelsus viel bei, den Glauben an die Chiromantie in dem sich neugestaltenden Europa zu verbreiten. Letzterer dehnte, nach seiner Weise, den Worten, die er nicht neu schuf, willkürliche Bedeutungen unterzulegen, den Begriff der Chiromantie auch weit über das aus; was sie eigentlich besagt, indem er die Kunst, aus den äußern Signaturen und Lineamenten an Menschen, an Thieren; an Pflanzen, sogar an Gesteinen u. s. w. ihre innern Qualitäten zu erkennen, so benannte, so daß nach seinem Ausspruch kein wahrer und vollkommener Arzt derselben entrathen kann. In diesem Sinn theilt er auch die Chiromantie in eine innere und eine äußere<sup>9</sup> u. s. w.

Mit der Astrologie hat aber auch die Chiromantie ihren Wendepunct erreicht; und ist in neuerer Zeit in dem Reiche der Wissenschaft als ein untergegangenes Nebelgestirn zu betrachten.

Die Ursache, warum gerade die Lineamente der Hand zu Wahr- und Merkzeichen innerer Qualitäten und verborgener Schicksale genommen worden sind, ist die, weil an keinem Theile des Körpers die Hautfalten oder vielmehr Hautrunzeln so beständig und so scharf ausgedrückt sich zeigen, als in der Hohlhand. Es ist dieß eine natürliche Folge der Bestimmung und des dieser entsprechenden Baues der Hand. Die Hand soll bei Biegung und Krümmung der Finger und bei Einziehung des Daumens sich höhlen, um mit Vortheil etwas fassen zu können. Zum Ausstrecken der Hand durfte aber auch der nöthige Hautbedarf nicht fehlen; die Natur erreichte also diesen Zweck, indem sie der Haut in der Hohlhand an den Stellen, wo theils die Muskeln ihre Grenze haben, theils die Ligamente ihre Ansätze erhalten, ebenfalls durch festeres Zellgewebe straff anzog, in den Zwischenräumen aber sie lockerer gespannt ließ. Im allgemeinen beruht die Höhlung der Hand auf dem Anziehen des Daumens durch die das Dickfleisch unter dem Daumen, oder dem Daumenballen bildenden Muskeln, und auf einem Niederziehen oder Beugen der drei letzten Finger; woran zwar der Zeigefinger auch mit Theil nimmt, ohne daß er aber dabei, weil er einen eignen Ausstreckemuskel hat, in seinen Bewegungen so an die der übrigen drei letzten Finger gebunden ist, als diese es unter sich sind, daher er auch bei natürlicher Biegung der Finger oder bei geballter Faust nicht über das zweite Daumengelenk herabreicht, während die übrigen sich dem Ballen des Daumens selbst entgegenstellen. Bei auch nur oberflächlicher Betrachtung der Hohlhand wird man daher auch finden, daß unter den mehrern Hautrunzeln hier sich die eine und vornehmste auf den Daumen bezieht und bei dem Anziehen desselben besonders scharf bezeichnet

8) S. vorzügl. dessen Werk de rer. varietate l. 15. c. 79.

9) S. vorzügl.

dessen tract. de pestilitate l. 2. u. de morb. podagr., de caduc. §. 5. Im sublimern Sinne spricht er auch von einer Chiromantia coelestis (philos. sagacis l. 2.)



dd, eine zweite mit der Biegung der letzten drei Finger in einem solchen Bezug steht, unter den mehreren Mittellinien aber eine Hauptlinie, die sich zunächst auf die Bewegungen des Zeigefingers bezieht, obwohl in der Richtung aller dieser Linien eine große Mannigfaltigkeit herrscht, weshalb eben diese so in die Augen fallenden, obgleich für geringfügig erscheinenden Bildungen die Aufmerksamkeit der Chiromanten auf sich gezogen haben. Daß aber wirklich nicht erst von dem Gebrauch der Hände diese Linien entstehen, beweist der Umstand, man sie schon, wenigstens in den Hauptzügen, bei ungebornen Kindern angelegt findet, ob sie gleich in dem Fortgang des Lebens, zwar schon in früher Lebenszeit eine schärfere und dann bleibende Imprägung erhalten.

Nach diesen vorläufigen Bemerkungen machen wir zu den Lehren der Chiromantie selbst den Uebergang.

Die Chiromanten unterscheiden zuvörderst die in der Handhöhlung vornehmbaren Linien oder länglichen Hautvertiefungen, die das Gepräge haben, als ob durch ein spitziges Instrument ein leichter Einschnitt in die Hautoberfläche gemacht worden wäre, und die dazwischen liegenden Räume.

Von den Linien werden Hauptlinien und Nebenlinien unterschieden.

Der Hauptlinien sind fünf.

1) Die Lebenslinie, (*Linea vitalis*), die vornehmste und bedeutendste von allen. Sie fängt am äußern fleischigen Theile der Hand, zwischen dem Daumen und Zeigefinger, oder an der Grenze anziehenden Daumenmuskeln nach innen an, läuft krumm um das Handgelenk, welches unten als *Rasceta* und *Discriminallinien* vorzukommen. Ihr Ende ist näher oder entfernter von der ersten dieser Nebenlinien, der *Rasceta*, oder in derselben, oder auch über sie und die *Discriminallinien* heraus.

2) Die Natur- oder Hauptlinie, (*Linea naturalis*, s. *celtica*.) Sie fängt unter dem Zeigefinger, oder unter dem Zwischenraume zwischen diesem und dem Mittelfinger, zuweilen aber auch unter dem Mittelfinger an, und vereinigt sich gewöhnlich entweder unmittelbar, oder durch einen Ast, in einem spitzen Winkel, unter dem Zeige- und Mittelfinger mit der Lebenslinie; bisweilen aber findet diese Vereinigung auch nicht Statt, und der sonst hier geschlossene Winkel bleibt offen. Diese Linie geht mitten durch die hohle Hand, bis zum kleinen Raum, der unten als der *Mondberg* bezeichnet werden wird.

3) Die Tisch-, Gedärm- oder auch gemeine Linie, (*Linea mensalis*, s. *inguinalis*, s. *communis*.) Sie fängt sich unter dem kleinen Finger zur Seite der Hand, ja noch auf dem Rücken derselben an, läuft quer unter den drei letzten Fingern weg, gebogen abwärts und endigt sich zwischen dem Zeige- und Mittelfinger, oder ihrem unten bezeichneten *Jovisberg* unter dem Zeigefinger oder auch in dem innern Anfang des ersten Gelenks des Zeigefingers.

4) Die Leber- oder Magenlinie, (*Linea hepatica*, s. *stomachica*.) hat einen unbestimmten Anfang, indem sie entweder, sowohl in seltenen Fällen, in der unten als *Rasceta* bezeichneten Li-

nie, oder in der Lebenslinie, oder in dem als Venusberg bezeichneten fleischigen Theil unter dem Daumen entspringt, und erhebt und endigt sich in der Naturlinie unter dem kleinen Finger.

5) Die *Rasceta*, (*Rasceta*,) die erste Querlinie auf dem Handgelenk.

Der Nebenlinien sind sieben.

1) Die *Martisl Linie*, oder Schwester der Lebenslinie (*Linea Martis*, s. *Soror vitalis*.) Sie läuft parallel mit der Lebenslinie zwischen ihr und dem Daumen auf dem Daumenballen.

2) Die *Sonnen- oder Ehrenlinie*, (*Linea solis*, s. *honoris*.) Sie fängt von der Grenzlinie des vierten Fingers, wodurch selbiger von der Hand sich abscheidet, oder dem Anfang des ersten Gelenks dieses Fingers nach innen, an, und geht bis in die Tischlinie, oder auch durch diese durch bis in die Naturlinie, oder auch durch beide bis in die Lebenslinie, oder auch bis in den unten als Dreieck bezeichneten Raum.

3) Der *Venusgürtel*, (*Cingulum Veneris*,) fängt zwischen dem Zeige- und Mittelfinger an, beugt sich zwischen der Tischlinie und dem Mittel- und vierten Finger bis in den Zwischenraum des letzten und des kleinen Fingers. Man findet diese Linie häufig auch doppelt, ja dreifach; zuweilen zeigt sie sich auch nur ganz kurz oder auch nur stückweise ein- oder mehrfach.

4) Die *Saturn- oder Glückslinie*, (*Linea Saturnina*.) Sie fängt entweder in der *Rasceta* unter dem Daumenballen an, und geht durch diesen und durch die Lebenslinie gegen den Mittelfinger zu, oder sie fängt außer dem Daumenballen in der *Rasceta* an, und steigt gegen den Mittelfinger, oder sie fängt auch nur nahe bei der *Rasceta* an, oder in der unter dem unten als Mondberg bezeichneten Raum, und geht durch den Mondberg auf den Mittelfinger zu. Hier endigt sie sich entweder schon in der Naturlinie, oder in der Tischlinie, oder unterhalb des Mittelfingers, dessen Grenzlinie sie auch wohl erreicht.

5) Die *Heiraths- oder Ehestandslinien*, (*Lineae matrimoniales*,) sind kleine Linien, die unter dem kleinen Finger mit der Tischlinie parallel laufen.

6) Die *Milchstraße*, (*Via lactea*,) ist eine Schwester- oder Seitenlinie der Leberlinie, fängt unter ihr am Mondenberg, und bei der *Rasceta* an, und geht gegen den als Mercur- oder Mondenberg unten bezeichneten Raum zu, oder sie fängt im Venusberg an, und geht bei der *Rasceta* in oder durch den Mondenberg hin.

7) Die *Discriminal- oder Entscheidungslinien*, (*Lineae discriminales*.) grenzen die Hand von dem Arm ab; die erste derselben ist unter dem Nahmen *Rasceta* bereits unter den Hauptlinien aufgeführt. Sie werden in der rechten Hand von der linken gegen die rechte Seite, in der linken von der rechten gegen die linke gerechnet und gemessen.

Auf gleiche Weise werden auch die Grenzlinien der Finger, oder die scheinbaren Gelenke derselben auf der Hohlhand gerechnet und gemessen.

Zu den Räumen gehören:



11) der sogenannte Tisch, (Mensa,) oder der von der Natur =  
Tischlinie umgrenzte Raum der Hohlhand:

12) Das sogenannte Dreieck, auch Martishöhle, (Cavea Martis,)  
genannt, der von der Lebens =, Natur = und Leberlinie eingeschlossene  
möglich dreieckige Raum, dessen oberster spitziger Winkel durch die  
Vereinigung der Lebens = und Naturlinie gebildet wird, und wofür  
die Leberlinie die Basis bildet. Wenn die Saturnlinie aus der Nas-  
ceta oder, bei der Roscetta aus dem Mondenberg durch die Natur-  
oder Tischlinie zum Mittelfinger steigt; so entsteht dadurch ein dop-  
pelted Dreieck.

13) Die sogenannten Berge der Finger, nämlich die fleischigen  
Hüme unter den ersten scheinbaren Gelenken der Finger. Es sind  
je nach der Zahl der Finger ebenfalls fünf, deren jeder einen be-  
sondern Namen führt, nämlich:

a) der Venusberg, (Mons Veneris,) der große Raum unter  
dem Daumen, nach innen von der Lebenslinie, unten von der Nas-  
ceta begrenzt;

b) der Jovisberg, (Mons Jovis,) der Raum unter dem Zei-  
finger abwärts, bis an die Lebens = und Naturlinie;

c) der Saturnberg, (Mons Saturni,) der Raum unter dem  
Mittelfinger, bis zur Tischlinie herab;

d) der Sonnenberg, (Mons Solis,) der Raum unter dem vier-  
ten Finger, bis zur Tischlinie herab;

e) der Mercurberg, (Mons Mercurii,) der Raum unter dem  
kleinen Finger, bis zur Tischlinie herab.

Diesen Benennungen entsprechend, führen auch die Finger und deren  
Nägel gleiche Planetennahmen. So ist der Daumen der Venusfinger,  
der Zeigefinger der Jovisfinger, der Mittelfinger der Saturnfinger,  
der vierte Finger der Sonnenfinger, der kleine Finger der Mercur-  
finger. Auf gleiche Weise wird auch ein Venus =, Jovis =, Saturn =,  
Sonnen = und Mercurnagel unterschieden.

14) Der Mondenberg, (Mons Lunae,) ist der erhabene an-  
sehnliche fleischige Theil der innern Hand, unter dem kleinen Finger  
zwischen der Tischlinie und der Nasceta, also dem Venusberg ent-  
gegengekehrt.

Eine besondere Kunst der Chiromantie ist die Ausmessung der  
Linien und Räume, wobei besonders ihr Anfang und ihr  
Ende genau zu bemerken sind. Es geschieht, solches mittelst  
eines Kreises für jede Linie und jeden Raum, nach eignen Bestim-  
mungen, die wir, um nicht zu weitläufig zu werden, übergehen müs-  
sen. Diese Ausmessungen sollen die Zahl der Jahre andeuten, bis  
zu dem Leben oder ein bezeichnetes Glück oder Unglück dauern wird,  
oder auch, wenn solches zu erwarten ist. Es werden aber überhaupt  
zwei Linien unterschieden, die nicht zu lang seyn können,  
nämlich die Lebenslinie und die Sonnen = oder Ehrenlinie; dagegen  
ist es nicht erwünscht, wenn die Glückslinie sich bis in das erste  
Gelenk des Mittelfingers oder in die Zwischenräume des Zeige- und  
Mittelfingers, oder des Mittel- und vierten Fingers erstreckt. So  
auch die Tischlinie, wenn sie bis ins erste Gelenk des Zeige-  
fingers geht, ein mühseliges Leben an, so wie auch die Naturlinie,

wenn sie gar zu weit in den Mondenberg, oder durch diesen hindurch reicht, ingleichen die Leberlinie, wenn sie bis in, oder durch die Tischlinie geht.

Tiefe und breite Linien deuten überhaupt auf die Gewißheit einer verkündigten Sache, und zeigen Standhaftigkeit und Ernst des Charakters an, seichte und flache Linien aber Wankelmuth und Unbestand. Breite Linien zeigen einen freigebigen, auch wohl verschwenderischen und unbeständigen Menschen an, schmale und tiefe Linien aber einen geizigen. Wenn eine Linie die andere durchschneidet, so deutet dieß Gefahr an; doch nur dann große, wenn die durchschneidende Linie breiter ist als die durchschnittene.

Einige Chiromanten achten auch auf einzelne kleine Figuren, die außer den gedachten Räumen von den Lineamenten der Hand umschlossen und gebildet werden, unter ihnen auch die Buchstaben A — H, die sich zuweilen in den Bergen finden und als göttliche oder heilige Buchstaben mit besondern Andeutungen unterschieden werden.

Unter den unendlichen einzelnen Bedeutungen, die die Chiromanten den Handlineamenten beimessen, können wir hier bloß in Bezug auf die einzelnen bemerkten Linien und Räume eines und das andere als das Hauptsächlichere herausheben.

Die Lebenslinie deutet die innere Lebenskraft und die Gesundheit an. Wo sie ganz fehlt oder unscheinbar ist, will man daraus einen großen Fehler des Herzens, Schwäche der Lebensgeister, einen geringen Verstand, einen unbeständigen Sinn und einen frühen Tod erkennen. Ist sie dagegen lang, undurchschnitten, rein ausgeprägt, reicht sie bis in die Nasceta, ja noch drüber hinaus, ist dabei das Dreieck im obern Winkel gut geschlossen; so deutet dieß eine gute Gesundheitsconstitution und dabei einen ordentlichen gesitteten Menschen, folglich auch ein langes Leben an.

Die Natur- oder Hauptlinie deutet überhaupt die Beschaffenheit des Gehirns und der Lebensgeister, dann die Uebereinstimmung des Herzens mit dem Gehirn und die Zufälle des Hauptes an. Hat sie ihre vollkommene gehörige Länge, und ist dabei die Leber- und Magenlinie wohl mit ihr und der Lebenslinie vereinigt; so bedeutet dieß einen guten Zustand des Magens, der Leber und der Lebensgeister. Ist sie kurz, so zeigt dieß einen übereilten Charakter an.

Die Tischlinie hat überhaupt auf den Zustand der Geschlechtstheile Bezug und verräth, wo sie stark ausgeprägt und rein ist, eine gute Zeugungskraft.

Die Leber- oder Magenlinie steht mit dem natürlichen Zustand der Verdauung im Zusammenhang, und ist wohl beschaffen, wenn sie das Dreieck gehörig schließt, und undurchschnitten ist.

Die Nasceta nebst den übrigen Discriminallinien deutet, wenn sie unzerrissen ist, einen glücklichen Fortgang in Unternehmungen an.

Die Martisl Linie zeigt, wenn sie lang, unzerrissen und wohl gefärbt ist, an, daß ein Mensch Reichthum, auch Glück, besonders im Soldatenstand erlangen werde, vornehmlich wenn das Dreieck rein und wohl geschlossen ist.

Die Sonnen- oder Ehrenlinie deutet im allgemeinen auf



Verstandeskraft, und dadurch erlangtes Ansehen und Ehrenstellen, vorzüglich wenn sie in das Dreieck geht.

Der Venusgürtel ist mit der Tischlinie von gleicher Natur, und deutet, wo er rein und undurchschnitten ist, auf Glück in der Liebe.

Die Saturn- oder Glückslinie deutet, wenn sie unzerrissen, nicht geschlängelt ist, im Dreieck stehen bleibt und sich vor der Natur- endet, Glück und Reichthum an. Ueberschreitet sie aber ihre Grenzen, ist sie durchschnitten, ist sie doppelt oder dreifach da; so deutet dieß Mühseligkeit und Gefahren.

Die Ehestandslinien haben als kleine Schwestern der Tischlinie auch mit dieser gleiche Bedeutung.

Die Milchstraße, wenn sie lang und nicht unterbrochen oder durchschnitten ist, zeigt Geschick zu Studien und Künsten, auch Glück vor Fremde und in der Liebe an.

Unter den bemerkten Räumen deutet der Tisch besonders auf Reichthum und Freigebigkeit hin.

Das Dreieck ist martialer Natur und bedeutet, wenn es wohl gegliedert ist, auf Glück im Vaterland, verräth einen guten natürlichen Verstand, und zeigt einen stillen bescheidenen Menschen an. Ein unregelmäßiges Dreieck bedeutet dagegen ein mühseliges Leben. Die Berge zeigen im allgemeinen die planetarische Natur des Fingers, dem sie gehören. So ist der Venusberg venerischer, der Jupitersberg jovialer, der Saturnberg saturninischer, der Sonnenberg solarischer, der Mercurberg mercuriarischer, wie auch der Mondenberg lunarischer Natur, sie sind nach dem Vorherrschen dieser planetarischen Eigenschaften beurtheilen.

Für eine glückliche Hand wird im allgemeinen erachtet, wo alle Linien in gehöriger Anzahl und vornehmlich die Hauptlinien vorhanden sind, wo alle Hauptlinien unzerrissen, unzerschnitten sind und das Dreieck von verworrenen Linien rein ist; wenn der Venusgürtel nicht durchschnitten ist; wenn alle Hauptlinien sammt der Glückslinie die gehörige Länge haben; wenn die Tischlinie nicht in das erste Gelenk des Zeigefingers fällt; wenn der Tisch in beiden Händen gleich groß ist; wenn alle Linien an ihrem rechten Ort, und die Berge genau unter ihren Plätzen oder Fingern stehen. Das Gegentheil zeigt eine unglückliche Hand an.

Auch die Nägel sind von den Chiromanten nicht außer Acht gelassen worden. Sie theilen die Nägel in drei gleiche Theile und rechnen auf jeden Einen Monat, woron der erste Theil von dem Nagel die kommende Zeit, der zweite, oder die Mitte, die gegenwärtige, und der dritte, oder oberste, die vergangene Zeit von 4 Wochen anzeigt. Weiße Punkte darin sollen Glück oder Gesundheit, und die Risse, Gruben und die bleichen, gelben, schwarzen oder rothen Punkte Mahr, Unglück oder Krankheit bedeuten. Auch jeder einzelne Fingernagel hat wieder besondere Bedeutung.

#### Hierher gehörige Schriften.

Artemidori Daldiani Oneurocriticorum l. V. gr. ed. princ. ap. Aldum. 1534, 8. et gr. lat. tit. de somniorum interpretatione, de auguriis, et manu- inspectione, c. not. N. Rigaltii, Paris. 1605, 4.  
 Barth. Cocclidis infinata naturae secreta, chiromantia, etc. Bonon. 1611, fol.

B. Coclidis chyromantiae et physionomiae anaphrasis, cum approb. Al. Achillini, Bonon. 1523, fol. (1536, 1586, Argent. 1534, 1536, Transl. la physionomie naturelle et la chiromancie, Par. 1560, 8. Rouen 1598.)

Ejusd. physiognomiae et chiromantiae compendium, Argent. 1534, 8. Joh. ab Indagine introductiones apotelesmaticae in chiromantiam, physiognomiam, complexionem hominis, canones de aegritudinibus, Francof. (1522) 8. (rec. 1546, 1556, 1662, 8. Colon. 1549, 8. Ursell. 1603, 8. Argentor. 1622, 1630, 8. Mediol. 1601. Kunst der Chyromantie, Pshysognomes u. s. w. Straßb 1523, 1540, 8el.)

Rud. Goclenii aphorismorum chiromanticorum tractatus, Lichae 1597, 8. Ejusd. uranoscopica, cheiroposcopica et metascopica, Francof. 1613, 8.

Ejusd. chiromantia et physiognomia specialis, Marp. 1621, 8. (Francof. 1621, 8.)

J. Taisnerii opus mathematicum physiognomiae octo libros complectens, innumeris figuris idealibus manuum etc. adornatum, Colon. 1562 fol. (1566, 1583, fol.)

Ant. Piccioli de manus inspectione l. III, Bergami 1578, 8. (1587, 8.)

Mar. Cureau de la Chambre diss. sur la chiromance, Paris 1653, 4. (l'art de connoitre les hommes, avec des dissertations sur l'astrologie et la chiromancie, Vol. III, à Paris 1660, 4. libers. Frankf. a. M. 1672, 8.)

Joh. Praetorii thesaurus chiromantiae locupletissimus, Jen. 1661, 4.

Phil. May la chiromantie médicale, trad. en françois par Ph. H. Truchsess, la Haye 1665, 4. (Ejusd. chiromantia medica, Graven Haag 1669, 8. Deutsch 1667, Dresd. 1670, 8.)

J. A. J. Hoeping institutiones chiromanticae, oder Unterweisung, wie man ein gründliches Judicium aus den Linien der Hände ersehen kann, Jena 1674, 8.

Ebendesselben Chiromantia harmonica, die Uebereinstimmung der Chiromantie mit der Physiognomie, Jena 1677, 8.

G. B. della Porta della chirofisonomia, Nap. 1677, 8.

Nic. Pompeji praecepta chiromantica, Ven. 1680, 8.

Das große Planetenbuch, sammt der Geomantie, Pshysognomie und Chiromantie, Leipz. 1687, 8.

Joh. Ingenbert chiromantia, metoposcopia et physiognomia curiosopractica, Francof. ad M. 1698, fol.

Die astronomischen Lehrsätze nach lehrende Chiromantie, nebst Traumbuch, Frankf. u. Leipz. 1742, 8.

E. H. Peuschel's Abhandlung der Pshysognomie, Metoposcopia und Chiromantie, Leipz. 1769, 8. (H.)

**Chiromantisches Urtheil**<sup>1</sup>, (Chiromanticum judicium, s. valicinium<sup>2</sup>), der auf die Chiromantie sich gründende Ausspruch über eines Menschen Constitution oder Schicksal. S. Chiromantie.

1) Peuschel's Abh. der Pshysogn. u. s. w. S. 373. 2) Peuceperi de praec. divin. generib. Serv. 1591, p. 366.

**Chirosceop**, (*Chirosceopus*), nach dem gleichlautenden Griechischen Worte<sup>1</sup>. S. Chiromantie.

1) Χειροσκοπος.

**Chirurgische Anatomie**<sup>1</sup>, (*Chirurgica anatomia*<sup>2</sup>).

Wenn dem Chirurgen überhaupt anatomische Kenntnisse nicht fremd seyn dürfen, so kann er deren besonders in Hinsicht derjenigen Theile des Körpers, an denen chirurgische Operationen zu bewirken sind, nicht entbehren, und muß daher mit dem Bau und der Beschaffenheit der hierbei interessirten Theile vorzüglich vertraut seyn. Ein anatomischer Unterricht, wobei insbesondere auf die zu angemessener Beurtheilung chirurgischer Operationen unumgänglich nöthigen anatomischen Kenntnisse Rücksicht genommen wird, wird daher wohl auch als chirurgische Anatomie bezeichnet. Auch haben mehrere anatomische Schriftsteller sich bestimmen lassen, die anatomische Wissenschaft überhaupt,

1) S. das zum Schluß des Artikels angeführte Werk. 2) B. Genga anatomia chirurgica, Bologna 1687, 8.



er mit besonderer Berücksichtigung des davon für Chirurgen zu machenden Gebrauchs in eignen Werken verabsfaßt, auf den Titeln dieser so zu bezeichnen.

Mehr darüber s. unter Anatomischer Literatur <sup>3</sup>.

a) Vorzüglich verdienen in dieser Hinsicht Bemerkung:

aa) als Lehrschrift: J. Valſyn's chirurgische Anatomie, aus d. Franz. 2te Aufl., Frankfurt u. Leipzig 1790, 4.

bb) als Kupferwerk: J. E. Rosenmüller's chirurgisch, anat. Abbildungen, 3 Theile, Wilmars 1805 — 1812, Fcl. (H.)

Ehladni's Klangfiguren<sup>1</sup>, Ehladnische Figuren<sup>2</sup>, Klangfiguren<sup>3</sup>. Wenn man eckige oder abgerundete, (metallene, selbst gläserne, am besten aber gläserne) Scheiben, auf einer passenden Stelle mit den Fingern gehalten, oder sonst auf ähnliche Weise in horizontaler Richtung befestigt, mit klarem Sand oder einer andern feinen körnigen, trocknen und gleichförmigen Materie bestreut, und am Rande mit einem geharzten Violinbogen bestreicht; so wird gleichzeitig mit dem dadurch hervorgelockten Klange der Sand, der die aufgestreute Masse, durch die fibrirnde Bewegung der Scheibe an den mehrsten Stellen ab- und fortgestoßen werden, an andern Stellen zurückbleiben und sich daselbst anhäufen, so daß also hierdurch sich charakteristische Figuren auf der Scheibe bilden, die nicht nur eine Regelmäßigkeit zeigen, und unter gleichen Verhältnissen auch immer bestimmt wieder erscheinen, sondern auch mit der Form und der Größe der Scheibe und dem darnach hervorgelockten Tone in einem gewissen einstimmenenden Verhältniß stehen.

Hr. Prof. Ehladni hat diese Erscheinung zuerst bemerkt, und indem er sie auf eine wissenschaftliche Grundlage gebracht hat, zugleich die Akustik hierdurch, wie mit mehreren Aufschlüssen über die Natur der Töne, wesentlich bereichert <sup>4</sup>.

Diese eigentlich in die Experimentalphysik gehörige Erscheinung hat auch den Physiologen das nahe gelegte Interesse, daß sie zu einem evidenten Beweis dient, wie das Gesetz der Harmonie und der Symmetrie in seinem Princip eins und dasselbe ist, und nur für die die Erscheinungen im Raume wahrnehmbaren Sinne sich anders und anders entsprechend andeute, als in dem bloß auf das Zeiterfüllende, (den Ton,) gerichteten Gehörsinn. Eine ähnliche Idee liegt der Pythagoräischen Lehre von der Harmonie der Weltensphären zu Grunde, wonach der erkannten Regelmäßigkeit der cosmischen Bewegungen auf den Anklang derselben für einen höhern, gleichsam mystificirten Zusammenhang zurückgeschlossen wird <sup>5</sup>.

Um aber die Entstehung der Ehladnischen Figuren zu verstehen, so man auf folgendes Gesetz der schwingenden Bewegung tönender Körper Acht haben.

Es kann nämlich ein jeder klingender Körper in seiner ganzen Ausdehnung, (mit Ausnahme eines oder zweier Punkte, wo er fest gehalten wird,) schwingen; er kann aber auch auf mannigfaltige Art in diese relativ sich scheiden, die nach entgegengesetzten Richtungen schwin-

(Görres Expos. d. Physiol. S. 218. 2) 3) Willbrand's Physiol.

So. Cap. u. S. 573. 4) S. besonders dessen Entdeckungen über die Theorie

des Klanges, Leipzig. 1787, 4. und dessen Hauptwerk die Akustik (mit 12 Kupfer- tafeln,) Leipzig. 1802, 4. 5) S. Cicero. somnium Scipionis c. 4.

gen, während die zwischen diesen Theilen befindlichen Stellen, die man Schwingungsknoten nennt, in Ruhe bleiben. An diesen Stellen kann man den klingenden Körper, ohne daß die Schwingungen dadurch gehindert werden, berühren, auflegen oder halten; hingegen muß der Stoß, oder die Reibung, wodurch er in Bewegung gesetzt wird, an keiner solchen Stelle, sondern an einem schwingenden Theile angebracht werden. Die Theile, in welche sich der klingende Körper theilt, haben allemal gegen einander ein solches Verhältniß der Größe, als erforderlich ist, um in gleicher Geschwindigkeit schwingen zu können. Mehrere Arten der schwingenden Bewegung und also auch mehrere Töne können zugleich an einem klingenden Körper Statt haben, ohne daß eine die andere hindert.

Bei den in die Länge gezogenen tönenden Körpern, (einer gespannten Saite, oder einem Stabe,) bilden sich krumme Linien, zwischen deren auf entgegengesetzten Seiten der Ase liegenden Theilen die Schwingungsknoten sich als feste Punkte befinden; bei den Schwingungen einer Scheibe aber, (von der sich die Glocke bloß durch ihre Krümmung unterscheidet,) wie auch den gespannten Membranen, (auf Pauken oder Trommeln,) kommen nicht krumme Schwingungslinien, sondern krumme Flächen in Betrachtung, die nach mehr als einer Richtung auf verschiedene Weise gekrümmt sind, bei welchen nun die auf entgegengesetzten Seiten der Ase befindlichen Theile nicht durch feste Punkte, sondern durch feste Linien, die man auch Knotenlinien nennen kann, von einander abge sondert sind.

Auf diesen Knotenlinien also, die bei der Erschütterung der tönenden Fläche in Ruhe bleiben, bleibt auch die aufgestreute Masse in Ruhe, während sie von den übrigen Stellen abgestoßen wird, und sich nun nach der Richtung jener Linien anhäuft.

Es werden nun die hierdurch hervorgebrachten Figuren regelmäßig oder unregelmäßig seyn, je nachdem die Scheiben eine regelmäßige Form bilden, und an Stellen, wo Knotenlinien durchlaufen, gehalten oder befestigt werden, auch die gestrichenen Stellen der Scheiben mit ihnen in einem proportionirten Verhältniß stehen. Sie fallen also anders aus, je nachdem die Scheibe ein Viereck oder ein Rectangulum oder eine andere regelmäßige, von gleichen oder ungleichen Seiten und Winkeln begrenzte und gebildete Fläche, oder von runder oder elliptischer, oder überhaupt einer Form mit verlaufenden Winkeln ist, je nachdem die Fläche in der Mitte oder nach den Rändern zu gehalten, und, je nachdem an den von den Knotenlinien entfernten oder nahen Rändern mit dem Bogen gestrichen wird. Die nähern Bedingungen, unter denen die mehreren bei diesen Versuchen möglichen Figuren entstehen, können hier nicht berührt werden, wo es bloß darauf ankam, einen allgemeinen Begriff dieses Gegenstandes aufzustellen. Mehr hierher gehöriges s. unter dem Artikel Töne. (H.)

6) In dem oben angeführten Werke sind (auf der 4. — 9. Tafel) 243 solcher Klangfiguren bildlich dargestellt.

*Choana*, eine der hintern Nasenöffnungen. S. folgendes Wort. Vgl. auch *Infundibulum* des Gehirns.



**Choanae**, nach dem Griechischen gleichlautenden Worte <sup>1</sup>, s. der Aperturen der Nase, die hintern.

*χοαναι, χοανοι, χοανα*, eigentlich Trichter, daher auch im Singular gleichbedeutend mit Infundibulum cerebri.

**Cholago** <sup>1</sup>, **Cholas**, letzteres nach dem Griechischen gleichlautendes Wort <sup>2</sup>, die Höhlung des Leibes unter den Hypochondrien und sogenannten Weichen. Vgl. Iliacische Regionen.

nach Gaza in der Uebersetzung von Aristotel. hist. animal l. 1. c. 13.

<sup>2</sup>) *χολας*, (Aristotel. hist. an. l. c.) Sonst wird dieß Wort auch (Homeri il. l. 4. v. 527) für Gedärme gebraucht.

**Chole**, in Uebersetzung des Griechischen Wortes <sup>1</sup>, i. q. Bilis. Galle.

*χολη*.

**Choledochi pori**, nach den Griechischen gleichlautenden Worten <sup>1</sup>, die die Galle ausführenden Gänge überhaupt. S. Gallengänge.

*ποροι χοληδοχοι*. (C. Bauhini theatr. an. l. 1. c. 45)

**Choledochischer Gang**, (Choledochus ductus <sup>1</sup>, Cholethrus ductus communis <sup>2</sup>, s. Choledochus ductus <sup>3</sup>,) Gekröner <sup>4</sup>, oder Gemeinschaftlicher <sup>5</sup> Gallengang, (Meatus venaeculae bilis <sup>6</sup>, Ductus chylodochus <sup>7</sup>, s. biliaris communis <sup>8</sup>, Canalis communis <sup>9</sup>, Porus biliaris <sup>9</sup>, s. choledochus <sup>10</sup>,) durch den Zusammentritt des hepatischen und cystischen Ganges bestehende, und sowohl die in der Leber neu abgesonderte, als auch eine Zeit lang in der Gallenblase aufbewahrt gewesene Galle in Duodenum ausführende Gang. S. unter Leber.

Leberi prael. anat. ed. nov. Vind. 1772, p. 329 2) Heisteri comp. anat. ed. II, p. 69. 3) Kulmii anat. Tabell. Tab. 24. 4)

Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. § 515. 5) Valsgyn's chr. Anat. übers. v. Puth, 2. Th. S. 122. 6) nach Vesal's (de h. corp.

libr. l. 5. c. 8;) trichterförmige Vorstellung und Beschreibung. 7) nach Gassen, Edl's (de nutrit. animal.) ebenfalls trichterförmige Vorstellung davon. S. Bartholini anat. l. 1. c. 15. 8) nach C. Bauhin (theatr. an. l. 1. c. 45.)

9) Hildebrandt's Lehrb. u. s. w. a. a. D. 10) entsprechend der Gallenblase Benennung *πορος χοληδοχος*, (de usu part. l. 4. c. 13.)

**Choledochus**, nach dem Griechischen gleichlautenden Worte <sup>1</sup>, der ursprünglichen Bedeutung nach Galle führend, wird in ältern Schriften als Beiwort aller Galle absondernden, aufbewahrenden und abführenden Gefäße und Behälter gebraucht, in neuern Schriften aber besonders auf den gemeinschaftlichen Ausführungsgang der Galle bezogen. S. Choledochischer Gang.

*χοληδοχος*. (Galen de usu part. l. 4. c. 13 et Hofmanni comm. ad h. l. n. 223)

**Choleferi ductus**, i. q. Biliarii ductus, s. Biliargänge.

**Cholegraphia**, s. Chologie.

**Cholera**, (*Cholera*.) nach dem gleichlautenden Griechischen Worte <sup>1</sup>, wird ungewöhnlich und ungebührig in der Bedeutung der Galle gebraucht. S. Galle.

*χολερα*, die Gallenkrankheit, (Cholera.) welches Wort aber eigentlich eine Verwirrung bedeutet, aus der das Regenwasser abfließt, und daher zu Bezeichnung jeder Krankheit angewendet worden ist, obgleich andere es auch von *χολη*, Galle, ableiten, weswegen auch jene Krankheit selbst Bilis genannt wird.

**Cholerica constitutio**, s. complexio, s. temperies, s. Choleric's Temperament.

*Cholerico-melancholica*, — *phlegmatica-sanguinea temperamenta*, *Cholerico-melancholici*, — *phlegmatici, sanguines homines*, s. Cholerisch-melancholische u. s. w. Menschen oder Temperamente.

*Cholericum temperamentum*, s. Cholerisches Temperament.

*Cholericus*, (*Cholericus*), s. Cholerische Personen.

1) Weuschel's Abh. d. Physiognomie, S. 64.

*Cholerische Körper*, (*Cholerica corpora* <sup>1</sup>), Körper, denen das cholerische Temperament beigelegt wird. S. Cholerisches Temperament.

1) Arnoldi Villenovani de regimine sanitat. comm. c. 2.

*Cholerische Personen* <sup>1</sup>, *Cholerici* <sup>2</sup>, (*Cholerici* <sup>3</sup>, *Homines biliosi* <sup>4</sup>, s. *cholerici*), Hitzige Personen, Menschen mit cholerischem Temperamente. S. Cholerisches Temperament.

1) 2) Weuschel's Abh. d. Physiognomie, S. 70 u. 83.

3) Arnoldi

Villenovani de regimine sanitat. comm. c. 2.

4) Fernellii inst.

stit. physiol. l. 3. c. 11.

*Cholerisches Temperament* <sup>1</sup>, (*Cholericum temperamentum* <sup>2</sup>), Galliges <sup>3</sup>, oder Hitziges <sup>4</sup>, oder Rühnes <sup>5</sup> Temperament, (*Temperies* <sup>6</sup>, s. *Constitutio* <sup>7</sup>, s. *Complexio* <sup>8</sup> *cholerica*, *Temperies biliosa* <sup>9</sup>, *Temperamentum biliosum* <sup>10</sup>), nach der alten Lehre der Temperamente dasjenige, in dem der Grundstoff der Galle die Oberhand hat, und das sich durch Kraft und Reizbarkeit, daher auch vorherrschende Neigung zum Zorn auszeichnet. S. Temperamente.

1) Haller's Grunde. d. Physiol. umgearb. von v. Lebeling, 1. Th. 1. 638.

2) F. Hofmanni med. rat. syst. l. 2. c. 12. §. 2.

3) — 5) Luthers

ist das physische Leben, 1. Th. 1. B. S. 137.

6) 7) Stahl theoria

med. Hal. 1708, p. 301 et 302.

8) Arnoldi Villenovani de

regimine sanit. comm. c. 2.

9) Stahl th. med. l. c.

10) Fer-

nellii inst. physiol. l. 3. c. 11.

*Cholerisch-melancholische*, *Cholerisch-phlegmatische*, *Cholerisch-sanguinische Menschen* oder Temperamente, (*Cholerico-melancholici-phlegmatici sanguinei homines*, *Cholerico-melancholica-phlegmatica-sanguinea temperamenta* <sup>1</sup>), Personen von gemischtem Temperamente, oder Mischungen mehrerer Temperamente, bei denen aber das cholerische Temperament das Uebergewicht hat. S. Cholerisches Temperament.

1) Weuschel's Abh. d. Physiognomie, S. 48 u. f.

*Cholidochus ductus*, i. q. *Choledochus ductus*.

*Cholodochus ductus*, vitios, statt *Choledochus ductus*.

*Cholologie* <sup>1</sup>, (*Cholologia*, *Cholegraphia* <sup>2</sup>), Lehre oder Beschreibung der Galle. S. Galle.

1) Burdach's Literatur d. Heilwiss. 1. B. S. 530.

2) J. Pauer. Bruno-

nis cholegraphia s. diss. de bile, Altd. 1694, 4.

*Chondroglossus* <sup>1</sup>, (*Chondroglossus* <sup>2</sup>, s. *musculus*), Schmäler Seitenmuskel der Zunge <sup>3</sup>, Knorpel-Zungen-

1) von *Xondros*, Knorpel, um desswillen so bezeichnet, weil bei Erwachsenen das kleine Horn des Zungenknochens noch fast immer bloßer Knorpel ist. Mayer's Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 235.

2) Douglass descr. comp. musc.

vers. lat. §. 59.

3) Schaarschmidt's myol. Tabell., Tab. 6.



**Chonßlein** <sup>4</sup>, (*Musculus hyochondroglossus* <sup>5</sup>, s. *ceratoglossus* <sup>6</sup>, *corniculo-lingualis* <sup>7</sup>.) der kleine Muskel, welcher, vom kleinen Horne des Zungenknochens aus, aufwärts in den Ceratoglossus, wie auch in den Genioglossus übergeht, und den kleinsten Theil des Hyomus ausmacht. S. Hyoglossus.

4) Brown's vertauschte Beschr. d. Musk. v. Spener, Berl. 1704, S. 25.  
5) nach Schreger (Nomenclat. d. Musk. S. 15.) 6) 7) nach Berghen (corp. h. anat. tr. 4. c. 19.)

**Chondrographie**, (*Chondrographia* <sup>1</sup>.) Chondrologie <sup>2</sup>, (*Chondrologia*.) Chondrotomie, (*Chondrotomia*.) Knorpellehre <sup>3</sup>, anatomische Beschreibung und Zergliederung der Knorpel des Körpers, welche jedoch keinen eignen Theil der anatomischen Lehre bildet, sondern der Osteologie, zum Theil auch Synthesmologie zufällt. S. diese Artikel.

1) von *Χονδρος*, Knorpel, und *γραφη*, Beschreibung, gebildet. 2) 3) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 1. B. S. 17.

**Chondropharyngeus** <sup>1</sup>, (*Chondropharyngeus* <sup>2</sup>, s. *musculus*.) Schmäler Seitenmuskel des Schlundes einer *keratopharyngeus* <sup>3</sup>, (*Musc. ceratopharyngeus minor* <sup>4</sup>.) wenigen Muskelfasern des mittlern Constrictors des Pharynx, welche dem kleinen Horne des Zungenknochens entspringen. S. Constrictoren des Pharynx.

1) Maner's Beschr. d. menschl. K. 4. B. S. 292. 2) Douglass descr. comp. musc. vers. lat. S. 74. 3) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1733, 4. Th. S. 384. 4) nach Winslow (expos. anat. lat. vers. T. IV. S. 479)

**Chondrosyndesmus**, nach dem Griechischen gleichlautenden Worte <sup>1</sup>. S. Synchondrose.

1) *Χονδροςυνδесμος*. (Galenus de temperam. l. 1. c. 9.)

**Chondrotomie**, (*Chondrotomia*.) s. Chondrographie.

**Chondrus**, in Uebertragung des Griechischen Wortes <sup>1</sup>, i. q. Carugo, s. Knorpel.

1) *Χονδρος*.

**Chorda**, dem gleichlautenden Griechischen Worte <sup>1</sup> entsprechend, eigentlicher Bedeutung eine Schnur, oder ein Seil, bezeichnet in der anatomischen Nomenclatur, außer den so eben näher anzugebenden Gegenständen, eine Flesche.

1) *Χορδη*.

**Chorda Achillis**, s. Achillessehne.

**Chorda des Tympanums**, (*Chorda tympani* <sup>1</sup>.) Paukensaite <sup>2</sup>, Saite des Paukenfells <sup>3</sup>, Paukensaiten <sup>4</sup>, Trommelsaiten <sup>5</sup>, Trommelsehne <sup>6</sup>, Sehne des Trommelfells <sup>7</sup>, Trommelschnur <sup>8</sup>, ein merkwürdiger Verbindungsweig des Facialis- oder harten Gehörnerven, von dem aus er in einem eignen Knorpelcanal zum Tympanum gelangt, unter der Membran des Tympanums, oder dem sogenannten Trommel- oder Paukenfell, weggeht,

1) Cالداني de chordae tympani officio in dessen Comment. an. fasc. 1. n. 1, Faloppia hat sie zuerst entdeckt, Eustach aber zuerst bestimmt, daß sie ein Nerv sei. 2) Edmeyerling's Hirn- und Nervenl. S. 237. 3) Leber's Vorles. d. Zergliederungsk., Wien 1776, S. 335. 4) — 6) Maner's Beschr. d. menschl. K. 7. B. S. 202. 7) Meutaud's Zergliederungsk. Uebers. Leipz. 1782, 2. B. S. 116. 8) Palfyn's chir. Anat. übers. v. Puth, 1. B. S. 595.

durch die Glaserische Fissur nach außen tritt, und sich in den Zungenerven vom fünften Gehirnnervenpaar einsenkt. S. unter Gehirnnerven.

*Chorda Hippocratis*, s. Achillessehne. — *longitudinalis Lancisii*, s. Raphe des Gehirns. — *magna*, s. Achillessehne. — *spermatICA*, s. Samenstrang. — *transversalis cubiti*, s. Querligament des Vorderarms. — *tympani*, s. Chorda des Tympanums.

*Chordae*, s. Därme. — *albae cerebri*, i. q. Ch. longitudinales *Lancisii*. — *Ferrenii*, s. *Ferrenii vocales*, s. Ferrein's Saiten. — *ligamentosae cartilaginum arytænoidearum*, s. Eigene vordere Ligamente der arytænoideischen Knorpel. — *longitudinales Lancisii*, s. Lanzisi's längliche Saiten. — *Willisii*, s. Willis'sche Streifen.

*Chordulae valvulae foraminis ovalis*, s. Hörner der Balvel des eiförmigen Lochs.

*Chorioformes plexus cerebri*, s. Chorioideische Plexus des Gehirns.

*Chorioformis*, s. *Chorioidea tunica*, s. Choroiden.

*Chorioidei plexus cerebri*, s. Chorioideische Plexus des Gehirns.

**Chorion**<sup>1</sup>, (*Chorion*<sup>2</sup>), nach den ältern Anatomen, der ganze äußere Ueberzug des Fötus in dem Uterus, wovon bloß die als Amnion bezeichnete innere Haut ausgeschlossen bleibt, durch Mißverständniß auch wohl die sämtlichen Häute des Fötus mit Einschluß der Placenta. Neuere Anatomen dagegen unterscheiden a) als eigentliches Chorion<sup>3</sup>, (*Chorion*<sup>4</sup>), Lederhaut<sup>5</sup>, Lederhäutchen<sup>6</sup>, Mittlere Haut<sup>7</sup>, oder Membran<sup>8</sup>, oder Mittleres Häutchen<sup>9</sup> des Eies, Aderhaut<sup>10</sup>, Mittlere glatte Aderhaut<sup>11</sup>, Geaderte oder Dritte Eihaut<sup>12</sup>, Glattes oder Durchsichtiges Chorion<sup>13</sup>, Glattes Gefäß- oder Aderhäutchen<sup>14</sup>, (*Chorion pellucidum*<sup>15</sup>, s. *laeve*<sup>16</sup>, *Membrana ovi media*<sup>17</sup>, s. *secunda*<sup>18</sup>, s. *tertia*<sup>19</sup>, s. *vasculosa*<sup>20</sup>, *Lamina chorii interna*<sup>21</sup>, *Allantois*<sup>22</sup>, *Pseudallantois*<sup>23</sup>), den in-

- 1) Haller's Grundr. d. Physiol. übers. von v. Lebeling, 2. Th. S. 944. 2) nach dem gleichlautenden Griechischen Worte *Χοριον*, Leder, sonst auch von Aristoteles (de generatione animal. l. 2 c. 7) und andern Griechischen Schriftstellern im Singular in der angegebenen Bedeutung, im Plural (*τα Χορια*) zur Bezeichnung sämtlicher Kindeshäute gebraucht. Die davon gegebene Etymologie, (*Χορηγει*, quod suppeditat, sc. alimentum,) oder mit abweichender Schreibart, *Χωριον*, (von *Χωρημα*, conceptaculum,) Galeni desin. med. scheint gesucht. Vgl. hierüber besonders Fabricii ab Aquapendente de formato foetu l. 1. c. 5. 3) Stein's Anleit. zur Geburtsh. 7. Aufl. 1. Th. S. 300. 4) Albini de utero gravido, tab. 5. 5) Mayer's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 270. 6) Cens's Lehrb. f. Hebammen, S. 61. 7) Haller's Grundr. u. f. w. a. a. D. S. 945. 8) Stein's Anleitung u. f. w. a. a. D. S. 297. 9) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. K. 4. B. S. 3263. 10) v. Siebold's Lehrb. d. Hebammen, 2. Aufl. S. 232. 11) Stein's Anleit. u. f. w. a. a. D. 12) Osiander's Lehrb. d. Hebammenf. S. 515. 13) Stein's Ant. u. f. w. a. a. D. 14) Meientaud's Vergliederungsf. Uebers. Leipz. 1732, 2. B. S. 691, Note. 15) 16) Wrisberg de struct. ovi ex secund. in ovi hum. tr. Goett. 1733, p. 10 u. 20. 17) — 19) Halleri cl. physiol. T. VIII, l. 29. s. 3. § 3. 20) Osiander's Entbindungsf. 1. Th. S. 193. 21) Verheyen anat. c. h. T. II, suppl. tr. 5. c. 11. 22) sächs. Vgl. Halleri cl. physiol. l. c. 23) Ruysch thes. anat. v. u. 41.



nen zunächst das Amnion umgebenden, wie diese von Blutgefäßen ablösten Theile und b) die Außenseite des Chorions, schwammiges Chorion<sup>24</sup>, flockige<sup>25</sup> oder Dritte<sup>26</sup> Haut, der Aderhäutchen<sup>27</sup> des Eies, Moosartige Lederhaut<sup>28</sup>, Liebhaut<sup>29</sup>, schwammiges Ader- oder Gefäßhäutchen<sup>30</sup>, Liebhaut<sup>31</sup>, (Chorion spongiosum<sup>32</sup>, s. tomentosum<sup>33</sup>, fungosum<sup>34</sup>, s. muscosum<sup>35</sup>, s. frondosum<sup>35</sup>, s. floccosum<sup>37</sup>, s. flocculentum, s. villosum<sup>38</sup>, s. reticulatum<sup>39</sup>, Membrana ovi crassa<sup>40</sup>, s. cribrosa<sup>41</sup>, s. exterior<sup>42</sup>, Membrana chorii retiformis<sup>43</sup>, Membrana retiformis<sup>44</sup>, Reticulum<sup>45</sup>, Involucrum foetus reticulare<sup>46</sup>, s. exterius, Membrana placentae reticularis<sup>47</sup>, s. villosa<sup>48</sup>, Tunica ovi filamentosa<sup>49</sup>,) das jene Haut umgebende gefäßreiche Zellgewebe, das mit seiner zelligen, nach der Gebärmutter gekehrten Fläche mit dem als charakteristische Membran bezeichneten Ueberzug derselben zusammenhängt und auf das innigste sich verbindet. S. Ei.

- 24) Haller's Grundr. u. f. w. a. a. D. Note. 25) 26) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. S. 3267. 27) Pientaud's Zergliederungsf. u. f. w. a. a. D. S. 691. 28) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. 29) v. Siebold's Lehrb. u. f. w. S. 151. 30) Pientaud's Zergliederungsf. u. f. w. a. a. D. S. 690. 31) v. Siebold's Lehrb. d. Entbindungsf., 5. Aufl. 1. B. S. 247. 32) — 34) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. 35) 36) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. 37) 38) Pientaud's Zergliederungsf. u. f. w. a. a. D. 39) Haller's el. physiol. l. c. 40) 41) Oslander's Entbindungsf. a. a. D. S. 192, 191. 42) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. S. 3268, Note. 43) Hoboken anat. secundinar. p. 125. 44) Vieussens diss. de str. uteri et plac. adj. Verheyen suppl. anat. Col. 1712, p. 29. 45) Ronhault oss. an. Nr. 1. 46) 47) Haller's bibl. anat. T. II, p. 91. 48) Bourton ess. tow. a new syst. of midwifery, p. 15. 49) Roederer de foetu perfecto diss. p. 7.

*Chorion floccosum, flocculentum, frondosum, fungosum, muscosum, pellucidum, reticulatum, spongiosum, tomentosum, villosum, s. unter Chorion.*

*Choroidea<sup>1</sup>, (Choroidea<sup>2</sup>,) Aderhaut<sup>3</sup>, oder Aderhäutchen<sup>4</sup>, oder Traubenhaut<sup>5</sup> des Auges, Braune Augenhaut<sup>6</sup>, Braune Haut<sup>7</sup>, oder Gefäßhaut<sup>8</sup> des Auges, Schwarze Augenhaut<sup>9</sup>, Schwarze Haut des Auges, (Tunica choroidea<sup>11</sup>, s. choroides<sup>12</sup>, s. choriformis, Uvea<sup>13</sup>, Tunica uvea<sup>14</sup>, s. uvalis, s. uviformis, s. acino similis, s. aciniformis<sup>15</sup>, s. acinosa, s. acinalis,*

- 1) Mayer's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 394. 2) *Xopoειδης* (Ruffi de apell. part. c. h.) nach einer entfernten Ähnlichkeit, die man zwischen dieser Haut und dem Chorion gefunden hat, so benennt. C. Stephani dicr. med. ed. 1564, p. 540. Verheyen corp. h. anat. l. 1. tr. 4. c. 14. 3) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1500. 4) Taylor's Mechan. d. Aug. Uebers. Frankf. a. M. 1750, S. 24. 5) — 8) Pientaud's Zergliederungsf. Uebers. Leipzig 1782, 2. B. S. 281. 9) Pient's Zergliederungsf. Wien 1780, S. 206. 10) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. 11) Pientaud's Zergliederungsf. u. f. w. a. a. D. 12) in Uebersetzung des Griechischen Worts. C. Bauhini theatr. an. l. 3. c. 69. 13) Bartholini anat. l. 3. c. 8. Vgl. dieß Wort. 14) Vesalii de h. corp. fabr. l. 7. c. 14. 15) Ingrassius comm. in Avicenn. de humorib. p. 292.

s. sanguinolenta <sup>16</sup>, s. perforata <sup>17</sup>, s. vasculosa <sup>18</sup>, Secunda <sup>19</sup>,) die zunächst unter der Sclerotica liegende, mit dieser concentrisch laufende, nach innen an die Retina grenzende, aus vielem durch Zellgewebe zusammengehaltenen Blutgefäßen bestehende Haut des Auges. S. Auge.

<sup>16</sup>) nach Walla (Casseri pentasth. l. 3. c. 25.) <sup>17</sup>) v. d. Linden med. physiol. l. 2. c. 10. <sup>18</sup>) Halleri elem. physiol. T. V. l. 16. s. 2. §. 9. <sup>19</sup>) Casseri pentasth. l. c.

*Choroides duplata*, i. q. Uvea.

*Choroides plexus cerebri*, s. Choroidische Plexus des Gehirns. — — *laterales*, s. unter Choroidische Plexus des Gehirns, Seitenplexus. — — *minores*, s. Choroidischer Plexus des Cerebellums. — — *pares*, i. q. Chor. pl. laterales.

*Choroidische Plexus des Gehirns*, (*Choroides plexus cerebri* <sup>1</sup>,) Adergeflechte <sup>2</sup>, oder Adergewebe <sup>3</sup>, oder Aderstränge <sup>4</sup>, oder Aderneße <sup>5</sup>, oder schwärzliches Adergewebe <sup>6</sup> des Gehirns, Gefaltetes Hirnaderneß <sup>7</sup>, Aderichte Flechten <sup>8</sup>, Würmer <sup>9</sup>, (*Plexus chorioidei* <sup>10</sup>, s. *choroides* <sup>11</sup>, s. *chorioformes* <sup>12</sup>, s. *coriformes* <sup>13</sup>, s. *reticulares* <sup>14</sup>, s. *retiformes*, s. *glandulosi* <sup>15</sup>, *Contextus chorioidei* <sup>16</sup>, *Rete mirabile* <sup>17</sup>, *Vermes* <sup>18</sup>,) die aus geschlängelten und unter sich verbundenen Blut- und lymphatischen Gefäßen, besonders aber aus Blutvenen bestehenden, durch die weiche Hirnhaut zusammengehaltenen, in dem Gehirn sich durch ihre schwarzrothe Farbe bemerklich machenden Körper, von denen man a) zwei Seitenplexus, (*Plexus chorioidei laterales* <sup>19</sup>, s. *pares* <sup>20</sup>,) Seiten-Adergeflechte <sup>21</sup>, Schwarze seitwärts liegende Adergewebe <sup>22</sup>, in den beiden Seitenventrikeln des Gehirns und b) einen mittlerern oder dritten <sup>23</sup>, (*tertius* <sup>24</sup>, s. *medius* <sup>25</sup>, s. *impar* <sup>26</sup>,) Mittleres Seitenadergeflechte <sup>27</sup>, oder schwärzliches Adergewebe <sup>28</sup> den dritten Ventrikel bedeckenden unterscheidet. S. Gehirn.

- 1) nach der Griechischen Bezeichnung und Vergleichung mit dem Chorion (*Χοροειδής*, *πλεγματά η συστρεμματά*, Galeni de usupart. l. 9. c. 7.) Heister comp. an. ed. 2. p. 115. 2) Haller's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v. Leubeling, 1. Th. §. 596. 3) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1735, 4. B. S. 124. 4) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. §. 2871. 5) — 7) Mayer's Besch. d. menschl. K. 6. B. S. 143. 8) Winslow's anat. Abh. u. f. w. a. a. D. 9) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. S. 144, Note. 10) nach C. Hofmann (apol. pro Galeno T. I. §. 196.) S. Halleri elem. physiol. T. IV, l. 10. s. 1. §. 21. 11) nach dem Griechischen Worte *Χοροειδής*. C. Hofmanni apol. p. Gal. l. c. 12) Spigelii de c. h. fabr. l. 10. c. 4. 13) vltlós, Columbi de re anat. l. 8. c. 1. 14) nach Columb. l. c. 15) Verolii de nerv. op. ep. p. 8. 16) G. Bauhini theatr. an. l. 3. c. 15, Note o. 17) Laurentii hist. anat. l. 10. c. 10. 18) Berengarii Carp. in Mundini anat. comm. p. 437. 19) 20) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. 21) Loder's anat. Tafeln, Taf. 155. Fig. 7. Nr. 12. 22) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. S. 141. 23) — 26) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. 27) Loder's anat. Tafeln, Taf. 154. Fig. 9. Nr. 8. 28) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. S. 145.

*Choroidischer Plexus des Cerebellums*, (*Choroides plexus cerebelli* <sup>1</sup>,) Adergeflechte des kleinen Gehirns <sup>2</sup>.

- 1) Loderi fabr. anat. tab. 158. fig. 10. Nr. 6. 2) Loder's anat. Tafeln a. a. D.



kleines Adernetz, oder Kleine Adergeflechte <sup>3</sup> des Gehirns <sup>4</sup>, (Plexus choroidei minores <sup>5</sup>.) ein den choroideischen Plexus in den Seitenventrikeln des großen Gehirns analoges, nur kleineres Gebilde am Anfang des Rückenmarks, welches sich bis in die dritte Hirnhöhle erstreckt. S. Gehirn.

3) — 5) Maner's Besch. d. menschl. K. 6. B. S. 187 u. 188.

(Choroides contextus cerebri, f. Choroideische Plexus des Gehirns. — membrana cerebri, i. q. Pia mater. — — oculi, f. choroidea. — plexus cerebri, f. Choroideische Plexus des Gehirns. Choroideus plexus cerebelli, f. Choroideischer Plexus des Cerebellums. — — impar, s. medius, s. tertius, f. unter Choroideische Plexus des Gehirns, mittlerer Plexus.

Chresmologus, nach dem Griechischen gleichlautenden Worte <sup>1</sup>, i. q. Fatidicus, f. Wahrsager.

1) χρησμολογος, von χρησμα, Orakel, gebildet.

Chroma, in Uebertragung des Griechischen gleichlautenden Wortes <sup>1</sup>, die äußere Haut, wobei ihr Ansehen oder ihre Färbung beachtet wird. S. Integumente des Körpers.

1) χρωμα, eigentlich Farbe, in obigem Sinne mehrfach von Hippokrates gebraucht. S. Foessii oec. Hipp. h. v.

Chros, beßgl. <sup>1</sup>, fleischige Körpertheile überhaupt, auch die Hautoberfläche. S. Fleisch, auch Integumente des Körpers.

1) χρος. S. Foessii oec. Hipp. h. v.

Chylifer ductus, f. Thoracischer Gang. — sacculus, f. Retaculum des Chylus.

Chylifera ampulla, f. Ampulle des Chylus. — vasa, f. Chylusführende Gefäße.

Chyliferae venae, s. viae, Chyliferi ductus, f. Chylusführende Gefäße.

Chylification <sup>1</sup>, (Chylificatio <sup>2</sup>.) Chylificationsprocess <sup>3</sup>, Chylose, Chylusbereitung, (Processus chylificationis, chylosis <sup>4</sup>, Praeparatio chyli <sup>5</sup>.) die Umwandlung des Nahrungsaftes in dem Darmcanal in Chylus, als der zweite Act der Assimilation. S. Chylus, ingl. Assimilation.

1) Lucd's Entw. e. Syst. d. mediz. Anthropol. 1. B. S. 216. 2) G. Moebii diss. de chylificatione, s. concoctione prima, Jen. 1644, 4.

3) Lucd's Entw. u. f. w. a. a. D. S. 224. 4) M. Hofmanni diss. de alimentorum coctione prima, s. fermentatione, chylosi dicta, salva et laesa, Altd. 1662, 4. 5) G. A. la Rose diss. de chyli praeparatione, Lugd. B. 1715, 4.

Chylificatorium organum, f. Verdauungssystem.

Chylodochus ductus, f. Cholodochischer Gang.

Chylöse Gefäße, f. Chylusführende Gefäße.

Chylologia <sup>1</sup>, Lehre von der Bereitung des Chylus und der Verdauung überhaupt. Vgl. Chylus.

1) M. Schurigii chylologia hist. med. h. e. chyli hum. consideratio physico-med. foren-is, Dresd 1735, 4.

Chylopoea, s. Chylopoietica organa, s. viscera, f. Verdauungsorgane.

Chylopoietica vasa, Chylopoeticae arteriae — venae, f. Ärzgeln der Pfortader.

Chylopoieticum systema, f. Verdauungssystem.

*Chylosa vasa*, f. Chylusführende Gefäße.

*Chylose*, (*Chylosis* <sup>1</sup>.) nach dem Griechischen gleichlautenden Worte <sup>1</sup>. S. Chylification.

<sup>1</sup>) *Χηλωσις*, Verwandeln in Galt.

*Chylosi ductus*, f. Chylusführende Gefäße.

*Chylus* <sup>1</sup>, (*Chylus* <sup>2</sup>.) Milchsaft <sup>3</sup>, Nahrungsaft <sup>4</sup>, Nahrungsmilch <sup>5</sup>, Speisensaft <sup>6</sup>, Brustganglymphe <sup>7</sup>, Weißes Blut <sup>8</sup>, (*Chilus* <sup>9</sup>, *Chymus* <sup>10</sup>.) ist derjenige Saft, welcher in den Verdauungsorganen aus den Nahrungsmitteln durch die Functionen der Verdauung und Assimilation bereitet, und vom Darmcanal aus ins Innere des Körpers aufgenommen wird, während daß die Reste der Nahrung auf dem natürlichen Wege wieder fortgeschafft werden.

Der Chylus hat im Menschen und in den Säugthieren ein milchartiges Ansehen; doch spielt er im Menschen, wenn man ihn aus dem Milchbrustgang, (*Ductus thoracicus*.) erhält, etwas ins Bläuliche, und zeigt eine Neigung zur Zersetzung, welches Verf. dieses selbst am Chylus aus dem Milchbrustgange eines Enthaupteten, unmittelbar nach dessen Hinrichtung, zu beobachten Gelegenheit hatte. Dieses milchartige Ansehen hat dem Chylus auch den Deutschen Namen Milchsaft verschafft, der übrigens deswegen nicht ganz passend ist, weil er zu einer Verwechslung des Chylus mit der Milch, die in den weiblichen Brüsten abgeschieden wird, führen könnte. Beide Flüssigkeiten sind sich aber nur in der Farbe ähnlich, in ihrer innern Natur dagegen ganz unähnlich. Die Milch wird in den Brüsten secernirt; dagegen verdankt der Chylus fremden Stoffen, die als Nahrung genossen sind, wenigstens zum Theile, seine Entstehung und wird erst weiterhin dem Blute assimilirt. Uebrigens hat der Chylus nur im Menschen und in den Säugthieren eine Milchfarbe, nicht auch in den Vögeln, und in den übrigen Thieren. In diesem ist er vielmehr bläulichhell, und kommt so der Farbe der Lympha nahe.

Der Chylus verdankt seinen Ursprung nicht bloß den Nahrungsmitteln, sondern er ist das Resultat einerseits von den eingenommenen Nahrungsstoffen, andrerseits von den Functionen der Verdauung und Assimilation der Nahrungstoffe. Der Chylus ist demnach theils noch mit den Nahrungsstoffen verwandt, und in so weit fremden Ursprunges, theils ist er mit dem jedesmaligen thierischen Individuum verwandt, und zwar in so weit, als auf den Proceß der Ver-

<sup>1</sup>) Burdach's Encycl. d. Hellw. 2. B. S. 1086.

<sup>2</sup>) nach dem gleichlautenden Griechischen Worte *Χυλος*, welches überhaupt einen Saft, insbesondere auch einen etwas eingedickten Pflanzensaft bezeichnet (*Galenus de simpl. fac. l. c. 36*.) Von der Ähnlichkeit eines solchen aus Gerste bereiteten Saftes hat insbesondere obige Bedeutung erhalten. (*Galenus de atra bile l. c. 3*.)

Vgl. C. Hofmanni apol. p. Gal. T. I. c. 344. <sup>3</sup>) Jadelot's Versuch v. d. Natur d. gesunden R. übers. v. Panzerbieter, S. 387. <sup>4</sup>) Heuermann's Physiol. 1. Th. S. 52.

<sup>5</sup>) Mäyer's Besch. d. menschl. 2. B. S. 55. <sup>6</sup>) Emmert's Beitr. zur nähern Kenntn. d. Speisensaft u. d. Verd. in Kell's u. Mutenriet's Arch. für d. Physiol. 8. B. 2. S. 145.

<sup>7</sup>) Encd's Entw. e. Syst. d. Anthropol. 1. B. S. 246. <sup>8</sup>) nach Burdach (a. a. O. S. 112.) <sup>9</sup>) nach van Linder (sel. med. ex. 13. §. 28.)

<sup>10</sup>) Vgl. diesen Artikel Note 2.



nung die Kräfte des thierischen Individuums, und auf die Assimilation insbesondere die verschiedenen Säfte ihren Einfluß ausüben, theils in den Verdauungsorganen, theils in verschiedenen drüsigen Körpern, die mit den Verdauungsorganen in Verbindung stehen, abgeschieden werden, und sich mit den Nahrungsstoffen immer mehr vermischen.

Es folgt hieraus von selbst, daß der Chylus in jedem Thiere eine eigenthümliche, mit der innern Constitution dieses Thiers übereinstimmende Natur haben müsse, die übrigens selbst innerhalb gewisser Grenzen einem beständigen Wechsel unterworfen ist. Der Chylus ist demnach verschieden, einerseits nach der Verschiedenheit der Nahrung, wovon das Thier lebt, andrerseits nach der Verschiedenheit der jeweiligen Verdauungskräfte, endlich nach der Verschiedenheit der Verdauungssäfte, die in diesen Proceß eingreifen. Im strengsten Sinne ist er selbst in jedem Menschen nach der Verschiedenheit seines ganzen Verhaltens verschieden.

Das Angegebene bestätigt sich in allen Beobachtungen. So sind z. B. äußere Stoffe, die das eine Thier als Nahrungsmittel genießt, für das andere Thier ein tödtliches Gift; die Ziege frißt den Schierag, wovon andere Thiere sterben, und zwar nicht deswegen, weil etwa als Ballast unverdauet in den Eingeweiden liegen bliebe, sondern weil der Chylus, der aus diesem Nahrungsstoffe gewonnen wird, für die Ziege der natürliche, ihrer Constitution entsprechende Chylus ist, dagegen er in andern Thieren ihrer Constitution entgegengesetzt ist, und dieselbe zerstört, wenn er sich in einem zu großen Maße gebildet hat. — Daß sich die Qualität der eingenommenen Nahrungsstoffe im Chylus äußere, sehen wir unter andern auch darin bestätigt, daß sich

Wirkungen mancher Arzneimittel, die offenbar zuerst verdauet werden mußten, in andern Organen äußern, und daß selbst die Wirksamkeit mancher Arzneimittel davon abhängt, ob sie verdauet werden, oder nicht; dieses ist unter andern bei der China der Fall, wenn sie in Substanz genommen wird. — Daß aber auch andrerseits die innere Natur des thierischen Individuums sich schon im Chylus äußere, dieß wird selbst durch die äußere Farbe des Chylus bestätigt, indem derselbe doch nicht als ein weißer Saft den Nahrungsmitteln überall beigemischt, sondern als solcher erst im Verdauungsprocesse gewonnen wird. Hierauf beruht es auch, daß das körperliche und geistige Verhalten derjenigen Völker, die bloß von Vegetabilien leben, nach der uneinschäftlichen Beobachtung der reisenden Naturforscher, verschieden ist von dem körperlichen und geistigen Verhalten derjenigen Völker, die sich von Fleisch ernähren. Hierauf mag es auch beruhen, daß bei verschiedenen Völkern Religionsgebräuche und Religionsgesetze verschieden sind, die sich auf den Genuß und Nichtgenuß verschiedener Nahrungsmittel, entweder in Beziehung auf das ganze Volk, oder in Beziehung auf die Priester, gründen.

Der Begriff von Chylus setzt als nothwendige Bedingung seines Daseins voraus, daß die fremden Stoffe, denen der Chylus wenigstens theilweise seinen Ursprung verdankt, andrerseits in einem gewissen Grade assimilirt worden sind. Doch läßt sich nicht läugnen, daß auch Stoffe, die mit dem Chylus, theils auf andere Weise Stoffe in das In-

nere der organischen Körper aufgenommen werden können, die weniger oder gar nicht assimilirt werden, und die deshalb verschieden eigenthümliche Wirkungen hervorbringen. Hierauf scheinen die eigenthümlichen, mitunter heftigen Wirkungen mancher Metallpräparate zu beruhen. So durchdringen auch geistige Stoffe die Stelle des Körpers, die sie berühren, unmittelbar, mehr oder weniger. So scheint auch die schnelle tödtliche Wirkung der Blausäure darauf zu beruhen, daß dieselbe, innerlich genommen, den Körper durchdringt, und augenblicklich die organische Lebensregung zerstört, ähnlich wie das rein Wasser durch den Zuguß anderer Flüssigkeiten augenblicklich getrübt wird. Da der Genuß der Blausäure innerhalb weniger Minuten tödtlich wird; so läßt sich unmöglich eine Aufnahme in den Chylus zu geben.

Wenn man den Chylus in hinlänglicher Quantität erhalten kann und denselben sich zersetzen läßt; so scheidet er sich in einen fadenartigen Theil, der sich in einen weichen Kuchen sammelt, und in eine flüssigere, wasserhelle Lymphe, ähnlich, wie sich auch das Blut in einen Blutkuchen, und in Blutwasser trennt. Indes ist der Chylus, woran diese Beobachtungen gemacht werden, nicht mehr derselbe, der unmittelbar vom Darmcanal aus in die chylösen Gefäße übergeht. Der Chylus, der aus dem Milchbrustgang gewonnen wird, ist nämlich ein Gemische aus dem eigentlichen Chylus, und aus der Lymphe, die am ganzen Umfange des Körpers, theils aus der äußern Haut theils aus allen Verzweigungen des Zellgewebes, aufgenommen wird. — Uebrigens hat man die meisten Beobachtungen, den Chylus betreffend, nur an dem Chylus der Thiere angestellt; man hat auch denselben einer chemischen Untersuchung unterworfen, insbesondere den Chylus aus Hunden und Pferden; vom menschlichen Chylus ist dagegen keine chemische Zerlegung bekannt. Doch führen auch hier die chemischen Zerlegungen noch auf kein bestimmtes Resultat, welches einen Aufschluß über das Verhalten des Chylus im lebenden Zustande gäbe.<sup>11)</sup>

Der Chylus ist, nachdem er in die chylösen Gefäße aufgenommen worden ist, noch eben so einer allmählichen Veränderung unterworfen wie die Nahrungsmittel in den Verdauungsorganen einer allmählichen Veränderung unterworfen sind, damit aus ihnen der Chylus hervorgeht. Der Chylus wird noch in den chylösen Gefäßen fortwährend assimilirt; insbesondere scheint diese Assimilation in den Drüsen der chylösen Gefäße vorzüglich zu geschehen, weil in diesen der Chylus wahrscheinlich eine längere Zeit verweilt. Alle Assimilation besteht aber darin, daß ihm die eigenthümliche Lebendigkeit des besondern thierischen Individuums immer mehr und mehr mitgetheilt wird. Die letzte Assimilation des Chylus findet dann Statt, wenn sich derselbe aus dem Milchbrustgang ins Blut des Hohlvenensystems ergießt. Er wird alsdann diesem Blute beigemischt, und hört hiermit auf, als Chylus zu existiren.<sup>12)</sup> (Wilbrand.)

11) Vgl. hierüber insbesondere Scherer's allg. Journal d. Chemie, 26 B. S. 161 u. 30. Heft S. 691, Ingl. Emmert's Beiträge zur nähern Kenntn. d. Speisefakts u. s. w. S. oben Note 6, ferner John's chemische Tabellen, d. Thierreichs, S. 7 u. 67. (N. d. Z.) 12) S. mehrere hierüber, unter dem Artikel Blut im 1. Th. S. 830. (N. d. Z.)



**Chylusführende Gefäße, Chylusgefäße, (Chylifera vasa<sup>1</sup>),**  
 chylöse Gefäße<sup>2</sup>, Speisefastgefäße<sup>3</sup>, Milchgefäße<sup>4</sup>,  
 milchsaftgefäße<sup>5</sup>, Milchadern<sup>6</sup>, Einsaugende Darm-  
 gefäße<sup>7</sup>, Aselli's Milchvenen<sup>8</sup>, (Lactes<sup>9</sup>, Venae lacteae<sup>10</sup>,  
 Galbae<sup>11</sup>, s. chyliferae, s. chiliferae<sup>12</sup>, Vasa chylosa, s.  
 chyli<sup>13</sup>, s. lactifera, s. lactea<sup>14</sup>, Viae lacteae<sup>15</sup>, s. chyliferae<sup>16</sup>,  
 Vasa chylum sorbentia<sup>17</sup>, s. absorbentia intestini angusta,  
 Vena lacteae<sup>18</sup>, s. chyliferi, Tubuli lactiferi, Venae lacteae  
 Asellii<sup>18</sup>), die mit undeutlichem Anfang aus den Darmzotten ent-  
 stehenden, den Chylus aufnehmenden, durch die Gekrösdrüsen hin-  
 durchführenden und in den thoracischen Gang sich entleerenden, über-  
 haupt zu dem System der Saugadern gehörigen Gefäße, von denen  
 auch die der ersten Ordnung, (Vasa chylifera, s. lactea  
 primi ordinis<sup>19</sup>, s. generis<sup>20</sup>, Venae lacteae primariae<sup>21</sup>, s.  
 lacteales<sup>22</sup>), zwischen den Gedärmen und den Gekrösdrüsen, von der  
 zweiten Ordnung, (Vasa chylifera, s. lactea secundi  
 ordinis<sup>23</sup>, s. generis<sup>24</sup>, Venae lacteae secundariae<sup>25</sup>), zwi-  
 schen jenen Drüsen und dem thoracischen Gang unterscheidet. S. Lym-  
 phatisches Gefäßsystem.

Halleri el. physiol. T. VII. l. 25. s. 1. 2) Wilbrand's Physiol.  
 §. 101. 3) Haller's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v. Leveiling,  
 2. Th. 8. Cap. 4) Mayer's Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 54. 5)  
 Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. Th. S. 2746. 6) Valsyn's  
 Lehr. Anat. übers. v. Huth, 2. Th. 12. Cap. 7) Haller's Grundr. u.  
 f. w. a. a. D. Note 527. 8) S. diesen Artikel. 9) 10) nach Aselli's  
 Beschreibung. (S. dessen diss. de lactibus, s. venis lacteis, Mediol.  
 1627.) 11) nach ebendens. l. c. §. 11. 12) van d. Linden sel.  
 med. ex. 13. §. 282. 13) Asellii de lact. etc. diss. c. 9. 14)  
 Blancardi anat. ref. c. 22. 15) Bohl's diss. de viis lacteis,  
 Regiom. 1741, 4. 16) Verheyen c. hum. anat. tr. 2. c. 13.  
 17) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2746. 18) Th.  
 Bartholini opuscula nov. ant. c. 4. 19) Hildebrandt's Lehrb.  
 u. f. w. a. a. D. §. 2730. 20) Haller el. physiol. l. c. §. 5. 21)  
 Schaarschmidt's splanchnol. Tabell. Tab. 5. 22) Blancardi anat.  
 ref. l. c. 23) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. 24) Hal-  
 leri el. physiol. l. c. §. 8. 25) Schaarschmidt's splanchnol. Ta-  
 bellen a. a. D.

**Chylusharn<sup>1</sup>, (Urina chyli<sup>2</sup>),** wird im Gegensatz des Blut-  
 s<sup>3</sup>, (Urina sanguinis<sup>4</sup>), (eigentlich in semiotischer Hinsicht,)  
 dünne Harn genannt, der in den nächsten Stunden nach einer  
 Mahlzeit gelassen wird, indem mit ihm noch mehrere rohe  
 Theile aus den Nahrungsmitteln, die mit dem Chylus in das Blut  
 gegangen sind, vermischt sind, und seine qualitative Natur mo-  
 dernen. S. Harn.

— 4) Mayer's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 65.

**Chyluskügelchen<sup>1</sup>, (Globuli chyli),** die in dem Chylus un-  
 zweifelhafte, den Blutkügelchen ähnlichen Formationen. S. Chyl-  
 vgl. auch Blut.

Kell's und Autenrieth's Arch. für die Physiol. 8. B. 2. St. S. 170,  
 Note 2.

**Chylusserum, s. Serum des Chylus.**

**Chymie, (Chymia,) s. Chemie.**

**Chymification**<sup>1</sup> **Chymificationsgeschäft**<sup>2</sup> oder **proceß**<sup>3</sup> (*Chymificatio*<sup>4</sup>, *Chymosis*<sup>5</sup>;) der erste oder vorbereitend Act der Assimilation, wodurch die Nahrungsmittel theils mechanisch theils chemisch in Chymus oder Speisebrei umgewandelt werden. **Chymus**, ingl. Assimilation.

1) — 3) Lucá's Entw. e. Syst. d. mediz. Anthropol. 1. B. S. 207.

Cartheuser diss. de laesa chymificatione, Francof. ad V. 1753, 4.

5) Riolani univ. med. comp. 6. 1. c. 5.

**Chymus**<sup>1</sup>, (*Chymus*<sup>2</sup>;) **Speisebrei**<sup>3</sup>, **Speisenbrei**<sup>4</sup>, **Nahrungsbrei**<sup>5</sup>, **Magenbrei**<sup>6</sup>, ist die in dem Verdauungs canal, und insbesondere im Magen enthaltene, durch die Verdauung allmählig aus den eingenommenen Nahrungsmitteln hervorgebrachte Nahrungsmasse. Die Nahrungsmittel werden, wenn sie fest sind, im Menschen und in den Säugthieren durch das Kauen zuert zerstückelt; es wird ihnen zugleich Speichel beigemischt, wodurch dieselben ihr voriges Ansehen bereits verlieren, und vorläufig in einen gröblichen Brei verwandelt, und zur weitem Verdauung vorbereitet werden. In der Rachenhöhle wird diesem gröblichen Brei im Augenblicke des Hinunterschluckens noch Schleim beigemischt, der in den Mandeln abgeschieden wird. Im Magen ergießt sich zu dieser Nahrungsmasse noch der Magensaft, und die peristaltische Bewegung des Magens bewirkt eine weitere innige Vermischung des Magensaftes mit der Nahrung, die zugleich durch den Einfluß der lebendigen Wärme im Magen noch weiter verändert wird. Auf diese Art verliert dann dieselbe allmählich ganz ihre vorige Gestalt, nimmt dagegen eine grauliche Farbe an, und wird alsdann durch die peristaltische Bewegung aus dem Magen in den Zwölffingerdarm gebracht, wo sich noch weiterhin die Galle, der pâncreatische Saft, und der Darmsaft, nebst dem Schleime aus den Drüsen im Darmcanal beimischen.

Der Chymus ist demnach einer allmählichen Veränderung unterworfen. Gewöhnlich aber versteht man unter Chymus denjenigen Speisebrei, der noch im Magen enthalten ist. Aber auch im Magen ist er, vom blinden Sacke des Magens angefangen, bis zum Pförtner nicht durchaus derselbe. Im blinden Sacke des Magens sammelt sich die Nahrungsmasse zuerst, und zwar in der Art, wie sie beim Hinunterschlucken beschaffen ist. Vom blinden Sack angefangen gelangt dieselbe allmählich, und zwar in einer leisen Bewegung weiter; es ist daher natürlich, daß in den folgenden Schichten des Nahrungsbreies bereits weitere Veränderungen vor sich gegangen sind, als im blinden Sacke des Magens der Fall ist. Im Zwölffingerdarm erreicht endlich der Speisebrei den Grad der Umwandlung, daß sich derselbe

1) Burdach's Encycl. d. Heilw. 2 B. S. 1046.

2) nach dem gleichla-

zenden Griechischen Worte *Χυμος*, welches aber überhaupt Feuchtigkeits bedeutet und in so fern mit *Χυλος* übereinkommt. Doch unterscheidet schon Galen (simpl. fac. 1. 1. c. 56) *Χυμος* von *Χυλος*, daß er unter ersterem Worte den Geschmack erregende Eigenschaft, unter letzterem aber den eingedickten Saft versteht, in dem der Geschmack ist. Nach van Linder (sel. med. ex. 13. S. 28) ist Chymus der edlere Theil des Chylus und dieser dagegen das, was in neuerer Zeit allgemein als Chymus bezeichnet wird. Hambergeri physiol. S. 73

3) Burdach's Encycl. u. s. w. a. a. D.

4) Döllinger's Grundr.

Naturl. d. menschl. Organ. S. 159.

5) 6) Jadelot's Lehre v. d. Nat.

d. gesund. R. übers. v. Panzerbieter, S. 575 u. 587.



schsam nach zwei Seiten scheidet; einerseits entwickelt sich aus ihm (Chylus, und andererseits verändert sich der Rest einigermaßen schon, daß die Vorbereitung zur Natur der Excremente schon Statt findet, obgleich im Verlaufe des ganzen dünnen Darmcanals im eigentlichen Sinne noch keine Excremente vorhanden sind.

Der Speisebrei steht im ganzen noch auf der niedrigsten Stufe der organischen Assimilation, doch so, daß, wie so eben angegeben worden ist, der Grad der Assimilation allmählich steigt, und im Dünndarm die höchste Steigerung erreicht. Der Speisebrei verleiht deshalb seine Entstehung nicht bloß den Nahrungsstoffen, die aufgenommen worden sind, sondern auch der Verdaunung, die Statt genommen hat, und mithin auch den Säften, die aus dem Innern des Verdauungschanals abgeschieden worden sind, und sich den fremden Nahrungsstoffen beigemischt haben.

Der Chymus aus einem Menschen ist noch nicht einer sogenannten chemischen Prüfung unterworfen worden. Dagegen hat man einige chemische Zerlegungen des Speisebreies aus Thieren angestellt, aus denen Resultate hervorgehen, die in Beziehung auf die vorstehende Assimilation der fremden Nahrungsstoffe in den Verdauungsorganen interessant sind. So viel ist aber sicher, daß im Verdauungsprocesse die Nahrungsmittel durchaus ihre vorige Natur verändern. (Wilbrand.)

Chyromantie, (*Chyromantia*,) s. Chiromantie.

Cibaria fistula, i. q. Oesophagus.

Cibarius canalis, s. tubus, f. Darmcanal.

Cibatio, f. Essen.

Cicatrices ovarii, f. Narben des Ovariums.

Cilia<sup>1</sup>, nach gewöhnlicher Bedeutung die Wimpern der Augenlider, dann auch die Linsen oder Knorpel der Augenlider, ja die Augenlider selbst.

Der Name wird vom Griechischen Verbum κινέω, moveo, oder auch vom Lateinischen celare hergeleitet. Vgl. Fabricii ab Aquap. de oculo, P. I. c. 12.

Ciliar, (Ciliaris, e,) wird als Beisatz oder Beiwort der Bezeichnung von Theilen des innern Auges zugesetzt, die in ihrer Structur dem Ansehen haarförmiger Bildung, gleich den Augenwimpern, oder auf dieselben einen nähern Bezug haben, und in folgenden Arten benannt sind.

Ciliararterien<sup>1</sup>, (Ciliares arteriae<sup>2</sup>,) Haarpulsadern<sup>3</sup>.

solche werden vordere und hintere kurze und lange, (anticae, s. anticae<sup>4</sup>, posteriores, s. posticae breves<sup>5</sup> et longae<sup>6</sup>), unterschieden. Es sind sämmtlich kleine Gefäße, welche von der ophthalmischen Arterie die Sclerotica durchdringend, zu dem Ciliarkörper und dessen Umgebungen gehen. S. Augenarterien.

1) Schlemmering's Gefäßl. S. 161. 2) Maier's anat. Besch. d. Blutgefäße. S. 67. 3) Maier's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 406. 4) — 5) — 6) Wilbrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2466 — 2469.

Ciliarbündchen, f. Ciliärproceß.

Ciliare corpus, f. Ciliarkörper. — ganglion, f. Ciliarganglion.

— interstitium, f. Ciliarkreis, beßgl. Ciliarkörper. — limbus, f. Ciliarkreis, beßgl. Ciliarkörper. — septum, f. Ciliarkörper.

— septum, f. Ciliarkörper.

— septum, f. Ciliarkörper.

— septum, f. Ciliarkörper.

— septum, f. Ciliarkörper.

— septum, f. Ciliarkörper.

*Ciliares arteriae*, f. Ciliararterien. — *fibrae*, f. Ciliarproceſſe. — *glandulae*, f. Meibomiſche Drüſen. — *impressiones*, f. Ciliarimpreſſionen. — *musculi*, f. Ciliarproceſſe. — *nervi*, f. Ciliarnerven. — *plicae*, f. Ciliarproceſſe. — *processus*, *radii*, s. *striae*, f. Ciliarproceſſe. — *venae*, s. *venulae*, Ciliarvenen.

**Ciliarſalten**, f. Ciliarproceſſe. — **fortſätze**, f. Ciliarproceſſe. **Ciliarganglion**, (Ciliare ganglion<sup>1</sup>.) Augenknoten<sup>2</sup>, Augennervenknoten, Nervenknoten der Haarnerven<sup>3</sup>, oder Triſnerven<sup>4</sup>, Linſenförmiger Nervenknoten<sup>5</sup>, oder Knoten<sup>6</sup> des Auges, Kreisgeflecht der Haarnerven (Ganglion ophthalmicum<sup>7</sup>, s. lenticulare oculi<sup>8</sup>, Plexus liaris<sup>10</sup>.) das an der äußern Seite des Sehnerven liegende, aus zwei Wurzeln, einer kürzern, aus einem Aſte vom dritten Gehirnnerven, und einer längern, aus dem Nafenſtamm des erſten Hauptaſtes des fünften Gehirnnerven entſpringende, kleine, ſeiner Geſtalt nach mehr viereckige als runde Nervenganglion, aus welchem größtentheils die Ciliarnerven hervorgehen. S. Auge, auch Gehirnnerven.

1) Halleri elem. physiol. T. V. l. 16. s. 2. §. 29.

2) 5) Maner

Befchr. d. menſchl. K. 7. B. S. 118 u. 119.

4) nach Hildebrandt

(Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. §. 2994.)

5) Meutaud's Zergliederungsf.

Uebers. Leipz. 1782, 2. B. S. 96.

6) 7) mit Unrecht ſo benennt.

Maner's Befchr. u. f. w. a. a. D. u. S. 123.

8) Halleri elem.

physiol. l. c.

9) 10) mit Unrecht ſo benennt. S. Maner's Befchr.

f. w. a. a. D.

**Ciliargefäße**, (Ciliaria vasa,) die Ciliararterien und Ciliarvenen.

**Ciliarhäutchen**, f. Ciliarzona.

*Ciliaria ligamenta*, f. Ciliarproceſſe. — *puncta*, f. Ciliarpuncte. — *vasa*, f. Ciliargefäße.

**Ciliarimpreſſionen**, (Ciliares impressiones<sup>1</sup>.) Als ſolche werden die ſchwarz gefärbten Eindrüſe der Ciliarproceſſe auf dem vordern Theile des Glaskörpers des Auges unterſchieden. S. Auge.

1) Maner's Befchr. d. menſchl. K. 5. B. S. 405.

**Ciliaris**, e, f. Ciliar. — **annulus**, f. Ciliarkreis. — **canalis**, f. Fontaneißcher Canal. — **corona**, f. Ciliarförper, beſſer Ciliarzona. — **nigra**, f. Mucöſer Ring des Auges. **membrana**, f. Ciliarkreis. — **membranula corouae**, f. Ciliarganglion. — **musculus**, f. Ciliarkreis. — **palpebrarum**, f. unterer Bicularmuſkel der Augenlider, innere Faſerlage. — **plexus**, Ciliarkreis, auch Ciliarganglion. — **processus**, f. Ciliarkörper beſſgl. Ciliarproceſſe. — **tunica**, f. Ciliarkörper. — **zona**, Ciliarzona.

**Ciliarkörper**<sup>1</sup>, (Ciliare corpus<sup>2</sup>.) Ciliarring, Gefäßteter Ring<sup>3</sup>, Strahlenförmiger Körper<sup>4</sup>, Strahlenband, Faltenkranz, Haarkörper<sup>5</sup>, (Tunica ciliaris<sup>6</sup>.)

1) Haller's Physiol. umgearb. von v. Leveſing, 1. Th. Note 383.

2) nach Faloppia (observ. anat. in Vesalii operib. Lugd. B. 1725, 766.

3) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 5. B. §. 1511.

4) Meutaud's Zergliederungsf. Uebers. Leipz. 1782, 2. B. S. 231.

5) Maner's Befchr. d. menſchl. K. 5. B. S. 399.

6) Vesalii de c.

fabr. l. 7. c. 13.



titium, s. Septum ciliare <sup>7</sup>, Nexus stamineus oculi <sup>8</sup>, Co-  
na ciliaris <sup>9</sup>, Processus ciliaris <sup>10</sup>, Ligamentum ciliare <sup>11</sup>,  
annulus oculi niger,) der im Innern des Auges unmittelbar hin-  
der Iris gelegene, die Crystalllinse ringförmig einschließende, mit  
dunkelem Pigment überzogene, und sich durch seine strahlenförmige  
Anordnung, (vgl. Ciliarproceſſe,) bemerklich machende Theil. Zuweilen wird  
der Ciliarreis unter dieser Benennung mit begriffen. S. Auge.

7) Vesal. exam. obs. Fallop. in operib. Lugd. B. 1725, p. 827.  
8) Plemppii ophthalmograph. l. 3. c. 9. 9) Winslow exp. an. lat.  
vers. T. IV. §. 227. 10) Ruyschii thes. anat. II. obs. l. n. 15.  
11) Ruyschii resp. ad ep. an. 13.

Ciliarfranz, f. Ciliarreis.

Ciliarreis <sup>1</sup>, (Ciliaris orbiculus <sup>2</sup>), Ciliarfranz <sup>3</sup>, Cili-  
ring <sup>4</sup>, Haarring <sup>5</sup>, Weißer Ring <sup>6</sup>, oder Sternband <sup>7</sup>,  
Sternekreis <sup>8</sup>, oder Strahlenband <sup>9</sup>, oder Strahlenge-  
zecht <sup>10</sup>, oder Strahlenförmiger Cirkel <sup>11</sup>, oder Strah-  
lenring <sup>12</sup>, oder Zellenförmiger Ring <sup>13</sup> des Auges, (Lig-  
amentum ciliare <sup>14</sup>, Intersitium ciliare <sup>15</sup>, Circulus ciliaris <sup>16</sup>,  
Membrum iridis <sup>17</sup>, Musculus, s. Membrana ciliaris <sup>18</sup>, Plexus  
iridis <sup>19</sup>, Annulus cellulosus <sup>20</sup> oculi, s. ciliaris <sup>21</sup>), der schmale,  
aus dichtem Zellgewebe gebildete weiße Ring, welcher die Choroidea  
abgrenzt, und nicht nur zur innigern Verbindung der Sclerotica und  
Choroidea beiträgt, sondern insbesondere auch der Iris und dem  
Linsenkörper zur Anlage dient. S. Auge.

Haller's Physiol. umgearb. von v. Leveiling, 1. Th. S. 451. 2)

nach Haller (elem. physiol. T. V. l. 6. s. 2. §. 9.) 3) Schimmer:  
ling's Hirn- und Nervenl. §. 225. 4) Pöder's anat. Tafeln, Taf. 66.

Abg. 4. Nr. 8. 5) Mayer's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 394. 6)

Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. §. 1509. 7) 8) Taylor's  
Mechanism. der menschl. Augen Uebers. Frankfurt. 1750, S. 27.

9) 10) Meientaud's's Zergliederungsk. Uebers. Leipzig. 1782, 2. B. S. 281. 11)

nach Maltresan (cercle ciliaire.) S. Meientaud's Zergliederungsk. a. a. D.

12) Meientaud's Zergliederungsk. u. f. w. a. a. D. S. 283. 13) nach

Sinn (f. ebendas.) 14) Vesling syntagm. anat. c. 15. 15) Bar-

tolini anat. l. 3. c. 8. 16) Taylor's Med. d. A. a. a. D. 17)

Meientaud's Zergliederungsk. u. f. w. a. a. D.) 18) Heisteri de tun. oculi

choroid., n. Ausg. Helmst. 1746, S. 15. 19) nach Meientaud. (S.

20) nach Sinn. (de ligam. ci-

liaribus diss.) 21) Meientaud's Zergliederungsk. u. f. w. 2 Th. S. 285.

Ciliarnerven <sup>1</sup>, (Ciliares nervi <sup>2</sup>), Irisnerven <sup>3</sup>, Haar-

nen <sup>4</sup>, Blendungsnerven <sup>5</sup>, die meist aus dem Ciliargan-

zeln ihren Ursprung nehmenden, ihrer Feinheit wegen mit Haaren

versehen, oft in zwei Bündeln zusammenliegenden, zertheilt von

hinten nach vorn ihren Fortgang nehmenden, die Sclerotica durch-

dringen und einzig in dem Ciliarreis nebst der Iris sich vertheilen-

den Nerven. S. Auge, ingleichen Gehirnnerven.

2) Haller's el. physiol. T. V. l. 16. s. 2. §. 29 3) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M.

W. 5. S. 2994. 4) Mayer's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 408.

5) nach Schimmerling (a. a. D.)

Ciliarproceſſe, (Ciliares processus <sup>1</sup>), Ciliarfortsätze <sup>2</sup>,  
Plemppii ophthalmogr. l. 3. c. 9. 2) Haller's Grundr. d. Physiol.

Ciliarbändchen <sup>1</sup>, Ciliarfalten <sup>4</sup>, Strahlenfasern <sup>5</sup>, Haariger Fortsatz <sup>6</sup>, Haarbänder <sup>7</sup>, Haarförmige Fortsetzungen <sup>8</sup>, Haarichte Bänderchen <sup>9</sup>, (Radii ciliares <sup>10</sup>, Plicae corporis ciliaris <sup>11</sup>, Fibrae ciliares <sup>12</sup>, s. paldae <sup>13</sup>, s. arcuatae oculi, Plicae <sup>14</sup>, s. Striae ciliares <sup>15</sup>, Muculi ciliares <sup>16</sup>, Ligamenta ciliaria <sup>17</sup>,) der vordere Theil des Ciliarkörpers, wo er sich der Linse nähert, und indem er sich zusammenzieht, einige 70 strahlenförmig gegen den innern Rand laufend meist aus Ciliargefäßen bestehende Falten bildet. *S. Auge.*

3) *S. Note 2.*

4) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B.

1512. 5) Stentaud's Vergliederungsk. Uebers. Leipz. 1782, 2. B.

282. 6) Taylor's Mechanism. d. m. Aug. Uebers. Frankf. 1750, S.

7) Mayer's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 399. 8) Winslow

anat. Abb. Uebers. Berl. 1733, 4 Th. S. 220. 9) Heuermann's Phys.

2. B. S. 343. 10) Stentaud's Vergliederungsk. u. f. w. a. a. D.

Morgagni ep. 17. S. 14. p. 256. 12) Heuermann's Physiol. a.

D. 13) Hildebrandt's Lehrb. a. a. D. 14) Winslow ex

anat. lat. vers. T. IV. S. 221. 15) Halleri elem. physiol. T. V. l.

8. 2. S. 13. 16) Kepleri dioptr. propos. 64, p. 27. 17) Ma

yer's Besch. d. menschl. K. a. a. D.

**Ciliarpuncte**, (Ciliaria puncta <sup>1</sup>,) Augenwimperpuncte, die Endigungen der Ausführungsgänge der Meibomischen Drüsen des Augenlides. *S. Meibomische Drüsen.*

1) Schaaßschmidt's splanchn. Tabellen, Tab. 17.

**Ciliarring**, *s. Ciliarkörper*, auch *Ciliarkreis*.

**Ciliarvenen** <sup>1</sup>, (Ciliares venae <sup>2</sup>, s. venulae <sup>3</sup>,) diejenigen Venen, aber reichlichen Venen, welche, die Sclerotica durchbohrend von der Choroidea, dem Ciliarkörper und der Iris das Blut zurückleiten. Man unterscheidet a) hintere, von welchen wieder α) kurze (breves,) und unter diesen insbesondere vier oder fünf bogenförmig in der Choroidea und in der Iris sich zeigende als Büschelförmige Gefäße, Wirbelförmige Venen <sup>5</sup>, Wirbelblutadern <sup>6</sup>, Vasculöse Wirbel <sup>7</sup>, (Vasa vorticiosa <sup>8</sup>,) und β) lange, (Venae ciliares longae <sup>9</sup>,) unterschieden werden, und b) vordere (Venae ciliaris anticae <sup>10</sup>,) *S. Auge und Augenvenen.*

1) Gommerring's Gefäßl. S. 391.

2) 3) Halleri el. physiol. T.

1. 16. s. 2. S. 37.

4) 5) Gommerring's Gefäßl. a. a. D.

Mayer's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 407. 7) Stentaud's

Vergliederungsk. Uebers. Leipz. 1782, 2. B. S. 285. 8) nach Zinn (dis

de oc. hum. tab. 4) so benannt, weil sie wie Strahlen in einem Mittelpu

nkt sich vereinen und zugleich die Gestalt eines Meerstrudels einigermaßen nachahn

*S. Mayer's Besch. d. Blutgefäße, S. 207. 9) 10) Hildebrandt's*

Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2662.

**Ciliarzona**, (Ciliaris zona <sup>1</sup>, s. zonula <sup>2</sup>,) Ciliarhäutchen, Strahlengürtel <sup>3</sup>, Strahlenkrone, (Corona ciliaris <sup>4</sup>, Membranula coronae ciliaris <sup>5</sup>,) ein dünnes durchsichtiges Häutchen, das ringförmig die Capsel der Crystalllinse umgibt und selbige an den Glaskörper befestigt. *S. Auge.*

1) nach Zinn (des-cr. oc. hum. l. c. 3. S. 3.) 2) Hildebrandt's Lehrb.

d. Anat. d. M. 3. Th. S. 101. 3) Leber's Vorles. über d. Vergliederung

Wien 1776, S. 508. 4) nach Camper (de nonnull. oculi part.

diss. Lugd. B. 1746, 4.) 5) Zinn descr. oc. h. l. c.

**Ciliatus** <sup>1</sup>, ein mit schönen Augenwimpern Begabter. *Vgl. Wimpern.*

1) Gloss. gr. lat. v. evoppeus.



*Cilo* <sup>1</sup>, ein Spigkopsf.

nach Festus: „cui frons est eminentior, ac dextra sinistraque velut resciissa videtur,” nach Charstius: „cui caput oblongum et compressum est.” S. v. der Linden sel. med. ex. 11. c. 38.

*Silunculus* <sup>1</sup>, auch *Silunculus* <sup>2</sup>, Diminutiv von *Cilo*.

Arnobii adv. gent. l. 3. p. 108. 2) l. c. Heraldii animadv. p. 135.

*Alinaedns* <sup>1</sup>, f. Wollüstling.

eigentlich ein Gauffer, (*κιναιδος*) Vgl. v. d. Linden sel. med. exerc. 11. §. 29.

*Cincinnatus*, Diminutiv von folgendem Worte.

*Cincinnatus*, mit lockigem Haar begabt. S. Lockenkopf.

*Cincinnati*, eigentlich künstlich gefräuselte Haarlocken, sonst aber von natürlich fallenden lockigen Haaren gebräuchlich <sup>1</sup>. Außerdem auch die Seitenhaare des Kopfs so bezeichnet. S. Locke, unter Haupthaar:

nach Nonius (doctr. de propr. serm.) beschreibt Varro einen wohlgebildeten Knaben folgendermaßen: „Ante aures modo ex subolibus parvulis Inforti dimituntur sex cincinnati.”

*Cincinnati*, Diminutiv von *Cincinnati*, Lockchen. S. Cincinnati.

*Cinclensis*, *Cinclismus*, in Uebertragung der gleichlautenden griechischen Worte <sup>1</sup>, eine kleine und kurze, auch wohl abwechselnde Bewegung <sup>2</sup> der Brust und anderer Theile; daher auch Synonym *Crissatio*.

*κινλσις, κινλσιμος*. Foessii oecon. Hipp. h. v. 2) in Art der Bewegung des Schwanzes einer Nachstelze, (*κινλσις*.)

*Cinctus* <sup>1</sup>, i. q. Diaphragma, auch Peritoneum.

wie Cingulum, wörtlich ein Gürtel.

*Cinerea substantia cerebri*, f. Corticalsubstanz des Gehirns.

*Crabs transversa in cerebro*, f. unter Commissuren der Gehirnhügel, die untere.

*Cinerei oculi*, f. unter Farben der Iris, graue Augen.

*Cinereus bulbus nervi olfactorii*, f. Bulbus des olfactorischen Nerven.

*Cineries, Cineritium corpus cerebri*, f. Corticalsubstanz des Gehirns.

*Cingulum*, i. q. Diaphragma, ingleichen Peritoneum, ingleichen auch letzter Thoraxwirbel. — *abdominis musculosum*, s. *musculo-aponeuroticum*, f. unter Abdominalmuskeln. — *Venus*, f. Venusgürtel.

*Cionis*, f. Asche.

*Cion*, *Cionis*, in Uebertragung der gleichlautenden Griechischen Worte <sup>1</sup>, i. q. Uvula.

*κινλσις, κινλσις*

*Circuitus sanguinis*, f. Blutcirculation.

*Circulares canales labyrinthi*, f. Semicirculäre Canäle des Labyrinth. — *fibrae tunicae carnae ventriculi*, f. unter Häute Magens und der Gedärme, Muskelhaut.

*Circularis canalis membranae vitreae*, f. Petit's Canal.

*Cineas oculi*, i. q. Iris. — *motus sanguinis*, f. Blutcirculation. — *protuberantia cerebri*, f. Annularprotuberanz des Gehirns. — *sinus cerebri inferior*, f. Quersinus des Türkensattels.

— *superior*, s. *sinus Ridleyi*, f. Ridley'scher Gehirnsinus.

*Circulatio*, vgl. Periosis. — *sanguinis*, f. Blutcirculation.

Circulation der Lebensgeister, (*Circulatio spirituum animalium* <sup>1</sup>), eine längst vergessene Hypothese von J. Roger nach der die in dem Gehirn und dessen Höhlen abgesonderten Lebensgeister durch die Nerven zu allen Theilen des Körpers und von da mit Ausnahme des durch die unmerkliche Ausdünstung verlorenen Theils, in die kleinsten Venen übergehen, und mit dem Blute zu Herzen, und von da wieder ins Gehirn gelangen sollten. Regnier wollte diese Circulation sogar in einer in einem Glase eingeschlossenen Schnecke beobachtet haben. Vgl. Lebensgeister.

- 1) Th. Bartholini, anat. libell. 3. c. 1, wo diese Circulation ernstlich widerlegt wird. 2) G. dessen diatribe de quinque corp. concoctionib. e Lond. 1664, 4. und Halleri bibl. anat. Vol. II. p. 760.

Circulation des Bluts, (*Circulatorius motus sanguinis*.) s. Blutcirculation.

*Circuli cerebelli*, s. Windungen des kleinen Gehirns. — *faciei*, s. Backen. — *iridis*, s. Cirkel der Iris. — *venosi medullae spinalis*, s. Venenringe des Rückenmarks.

*Circulus cordis callosus*, s. Limbus der venösen Ostien des Herzventrikels. — *fossae ovalis*, s. Vieussenischer Zischmus. — *iridis exterior, interior, major, minor*, s. Cirkel der Iris. — *membraneus, s. nervus diaphragmatis*, s. Aponeurotische Expansion des Diaphragmas. — *membranosus caeci*, s. Bahinische Klappe. — *niger corneae*, s. Schwarzer Cirkel der Cornea. — *oculi, i. q. Iris*. — *papillaris, i. q. Areola mammae*. — *sanguinis*, s. Blutcirculation. — *tonsillaris*, s. Tonsillarcirkel. — *uveae*, s. unter Cirkel der Iris, großer Cirkel.

*Circumactores oculi*, s. Schiefe Augenmuskeln.

*Circumagens musculus oculi exterior, s. inferior*, s. untere schiefe Augenmuskeln, unterer Muskel. — — — *interior, major, s. superior*, s. untere Schiefe Augenmuskeln, oberer Muskel.

*Circumcisio*, s. Beschneidung.

*Circumcissus*, s. Beschnittener.

*Circumcolae*, s. Perioeci.

*Circumductionis oculi opifices*, s. Schiefe Augenmuskeln.

*Circumferentia articularis radii*, s. Articularumfang des Radius. — — *ulnae*, s. Articularumfang der Ulna. — *pelvis*, s. Beckenumfang.

*Circumflexa arteria femoris externa et interna*, s. Circumflexe Arterien des Schenkels. — — *humeri anterior, major, minor, posterior, radialis ulnaris*, s. Circumflexe Arterien des Oberarms. — — *ilei, s. ileum, s. ilii, s. ilium*, s. Circumflexe Arterie der Hüfte. — — *ilii externa*, s. untere Circumflexe Arterien der Hüfte. — — *scapulae, s. scapulae posterior, scapularis*, s. Circumflexe Arterie des Schulterblatts. — — *brachii anterior et posterior*, s. Circumflexe Venen des Oberarms. — — *femoris externa et interna*, s. Circumflexe Venen des Schenkels. — — *ilium*, s. Circumflexe Vene der Hüfte. — — *scapulae*, s. Circumflexe Vene des Schulterblatts.

*Circumflexae arteriae humeri*, s. Circumflexe Arterien des Oberarms. — — *metacarpi et digitorum*, s. Circumflexe Arterien



des Metacarpus und der Finger. — *fibrae ventriculi dextri dis*, s. unter Fibern des rechten Herzventrikels. — *venae bra-*  
*i*, s. Circumflexe Venen des Oberarms. — — *femoris*, s.  
Circumflexe Venen des Schenkels.

Circumflexe Arterie der Hüfte, (Circumflexa arteria ilei<sup>1</sup>,  
ileum<sup>2</sup>, s. ilii<sup>3</sup>, s. ilium<sup>4</sup>,) Unterleibsarterie<sup>5</sup>, oder  
Blagader<sup>6</sup>, Bauchpulsader<sup>7</sup>, (Arteria abdominalis<sup>8</sup>,  
abdominalis Halleri<sup>9</sup>, s. iliaca externa minor<sup>10</sup>,) die der  
Leistungsarterie gegenüber, doch meist etwas tiefer, aus der  
äußern Seite der Cruralarterie entspringende Arterie, welche an der  
äußern Fläche des Iliacus aufwärts steigt, und diesen und andern be-  
nachbarten Muskeln und Theilen Zweige gibt. Eine andere Arterie  
nämlich die Äußere circumflexe Hüftarterie, (auch A. cir-  
cumflexa ileum<sup>11</sup>, s. circumflexa ilii externa<sup>12</sup>,) Kranz-  
arterie<sup>13</sup>, oder Umschlagene Pulsader des Darmbeins<sup>14</sup>,  
Kranzarterie des Hüftknochens<sup>15</sup>, welche, als ein unbestän-  
diger Ast der vorigen, auswärts neben der Crista des Hüftknochens  
ihren Verlauf nimmt. S. Cruralarterie.

1) nach Walter. Vgl. Sömmerring's Gefäßl. S. 311, Note. 2) nach  
Waller (Besch. d. Blutgef. S. 159.) 3) Hildebrandt's Lehrb. d.  
Anat. d. M. 4. B. S. 2609. 4) Loderi tab. anat. t. 104. n. 27. 5)  
Sömmerring's Gefäßl. S. 195. 6) Pientaud's Zergliederungsk.  
Vlebers. Leipzig. 1782, 1. B. S. 707, Note. 7) Sömmerring's Gefäßl.  
S. 309, Note. 8) nach Haller (icon. anat. fasc. 4. tab. 1. Nr. a.)  
9) Walther's anglol. Handb. S. 92. 10) Scharschmidt's anglol.  
Tabell. Tab. 5. 11) Sömmerring's Gefäßl. S. 311, Note. 12)  
Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. S. 2611. 13) 14) Sömmerring's  
Gefäßl. S. 311 u. Note das. 15) Loder's anat. Tafeln Taf. 105  
Nr. 27.

Circumflexe Arterie des Schulterblatts, (Circumflexa ar-  
teria scapulae<sup>1</sup>, s. scapularis<sup>2</sup>, s. scapulae posterior<sup>3</sup>,)  
Kranzarterie, oder Hintere Kranzarterie<sup>4</sup>, oder Um-  
schlagene Arterie des Schulterblatts, ein Hauptzweig der  
Scapulararterie, der sich am langen Kopf des Anconaus um das  
Schulterblatt herumschlägt, um sich an dessen hinterer Fläche zu ver-  
zweigen. S. unter Axillararterie, Scapulararterie.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2510. 2) Sömmerring's  
Gefäßl. S. 204. 3) Loderi tab. anat. t. 104. n. 37. 4)  
Loder's anat. Tafeln, Taf. 104, Nr. 37.

Circumflexe Arterien des Metacarpus und der Finger,  
(Circumflexae arteriae metacarpi et digitorum<sup>1</sup>,) So werden  
wohl einzelne, sonst unbeachtet verbleibende arteriöse Seitenzweige  
verstanden, die sich an den hintern Gelenken der Knochen des Me-  
tarpus und den ersten Phalangen herumschlagen, und wieder nach  
dem jeden Finger, und nach der innern oder äußern Seite (als  
radialis und ulnaris<sup>2</sup>,) bezeichnet werden. S. Axillar-  
arterie.

1) Loderi tabulae anat. tab. 90. f. 3, Nr. 27, 28, 40. tab. 92, Nr. 116.  
2) l. c.

Circumflexe Arterien des Oberarms, (Circumflexae arte-  
riae humeri<sup>1</sup>,) Kranzarterien<sup>2</sup>, oder Umschlagene Arte-  
rien (Halleri icon. anat. fasc. III. fr. 4 n. 6. 2) Sömmerring's  
Gefäßl. S. 205 u. 206 nebst Notizen.

rien des Arms, Umschlagene<sup>3</sup>, oder Umschlungene Armpulsadern<sup>4</sup>, (Arteriae humerariae, s. humerales<sup>5</sup>.) Man unterscheidet a) eine vordere kleinere<sup>6</sup>, (anterior<sup>7</sup>, s. minor<sup>8</sup>, s. circumflexa humeri radialis<sup>9</sup>.) und b) eine hintere<sup>10</sup> (posterior<sup>11</sup>, s. major<sup>12</sup>, s. Arteria deltoidea<sup>13</sup>, s. circumflexa humeri ulnaris<sup>14</sup>, s. cubitalis<sup>15</sup>.) Beide sind Aeste der Axillalarterie, die, um den Kopf des Oberarmknochens herumlaufend, sich vorzüglich in die obern Armmuskeln verbreiten. S. Axillalarterie.

5) 4 S. Note 2.

5) Eschenbach's anat. Besch. d. menschl.

R. Nr. 1130 u. 1131.

6) Sömmerring's Gefäßl. S. 205.

Halleri icon. fasc. VI. p. 17.

8) Eschenbach's Besch. u. f. Nr. 1131.

9) Winkler de arteriis brachii diss. n. 12.

Sömmerring's Gefäßl. a. a. D.

11) Halleri icon. l. c. p. 1.

12) 13) Eschenbach's Besch. u. f. w. Nr. 1130.

14) Tarin anthropol.

pot. p. 42.

15) Winkler de art. tr. diss. n. 9.

**Circumflexe Arterien des Schenkels**, (Circumflexae arteriae femoris<sup>1</sup>.) Kranzarterien des Schenkels<sup>2</sup>, Umschlungene Pulsadern der Lende<sup>3</sup>, herumgebogene Schenkelschlagadern<sup>4</sup>, a) eine äußere<sup>5</sup>, (externa<sup>6</sup>.) Neußere Muskelarterie des Schenkels<sup>7</sup>, (muscula cruralis exterior<sup>8</sup>, s. cruris muscularis externa,) und b) eine innere<sup>9</sup> (interna<sup>10</sup>.) welche beide aus der Cruralarterie, in der Gegend des kleinen Trochanters, entspringen und der äußern und innern Seite des Schenkels Blut zuführen. S. Cruralarterie.

1) Pientaud's Zergliederungsf. Uebers. Selpj. 1782, 1. B. S. 720, wo drei unterschieden werden.

2) 3) Sömmerring's Gefäßl. S. 315

317, Not.

4) Pientaud's Zergliederungsf. u. f. w. a. a. D. Not.

5) Sömmerring's Gefäßl. S. 315.

6) Halleri icon. anat. fasc.

V. tab. 1. d.

7) Palfyn's chir. Anat. übers. v. Huth, 1. Th. S. 35

8) Spigellii de c. h. fabr. l. 6. c. 6. 5.

9) Palfyn's chir. Anat. u.

f. w. a. a. D.

10) Sömmerring's Gefäßl. S. 201.

11) Halleri

icon. anat. l. c. c.

**Circumflexe Nerven des Stylopharyngeus**, (Circumflexi nervi musculi stylo-pharyngei<sup>1</sup>.) Umschlagene Nerven des Hebemuskels des Rachens<sup>2</sup>, drei Nervenäste des Stylopharyngeus, die sich um den gleichnamigen Muskel herumbeugen und wovon einer ihn auch durchbohrt. S. unter Gehirnnerven den Glossopharyngeus.

1) nach Andersch (fragm. descr. nerv. card. §. 5.)

2) Mayer's Besch.

d. menschl. R. 8. B. S. 379.

**Circumflexe Vene der Hüfte**, (Circumflexa vena ileum<sup>1</sup>.) Kranzvene des Hüftbeins<sup>2</sup>, gebogene Ader der Weichen<sup>3</sup>, die der gleichnamigen Arterie entsprechende, und in die Cruralvene sich entleerende Vene. Deren werden auch wohl mehrere, als eine äußere, obere<sup>4</sup>, untere<sup>5</sup>, (exterior, superior<sup>6</sup>, inferior<sup>7</sup>.) unterschieden. S. Cruralvene.

1) Mayer's Besch. d. Blutgef. S. 235.

2) Loder's anat. Tafeln, Taf.

131, Nr. 13.

3) Pientaud's Zergliederungsf. Uebers. Selpj. 1782, 1.

B. S. 790, Note.

4) — 7) Loderi tab. anat. und Deutscher Text, tab.

28. fig. 5. Nr. 31 u. 32.

**Circumflexe Vene des Schulterblatts**, (Circumflexa vena scapulae, s. scapulae posterior<sup>1</sup>.) Kranzvene oder Hintere Kranzvene des Schulterblatts<sup>2</sup>, die der gleichnamigen Ar-

1) 2) Loderi tab. anat. und Deutscher Text, Tab. 130. fig. 2. Nr. 106.



entsprechende, und in die Subscapularvene einmündende Vene.  
 Arillarvene.

**Circumflere Venen des Oberarms,** (Circumflexae venae Achilii<sup>1</sup>.) Kranzvenen des Oberarms<sup>2</sup>. Venen, welche gleichnamigen Arterien begleiten, und also auch, wie diese, eine vordere<sup>3</sup> und eine hintere<sup>4</sup>, (anterior<sup>5</sup>, posterior<sup>6</sup>.) welche in die Arillarvene entleeren. S. Arillarvene.

2) Loderi tabulae anat. und Deutscher Text, tab. 123. f. 3. Nr. 118 u. 1130. f. 2 n. 100. 3) — 6) a. a. D.

**Circumflere Venen des Schenkels,** (Circumflexae venae cruris<sup>1</sup>.) Kranzvenen des Oberschenkels<sup>2</sup>, Gebogene Venen des Oberschenkels<sup>3</sup>, die den gleichnamigen Arterien entspringenden und daher auch als eine äußere<sup>4</sup>, und eine innere<sup>5</sup>, externa<sup>6</sup> et interna<sup>7</sup>.) unterschiedenen, in die Cruralvene sich erlegenden Venen. S. Cruralvene.

Mayer's Besch. d. Blutgefäße, S. 233. 2) Loder's anat. Tafeln, Taf. 128. Fig. 2. Nr. 30 u. 31. 3) Bientaud's Zergliederungsk. Uebers. Leipzig. 1782. 1. B. S. 790, Note, wo jedoch nur eine unterschieden wird. 4) — 7) Loderi tab. anat. und Deutscher Text a. a. D.

**Circumflexer Muskel des Gaumens,** (Circumflexus musculus palati<sup>1</sup>.) Umschlagener<sup>2</sup>, oder Umgebogener<sup>3</sup> Gaumenmuskel, Flügel und Gaumenmäußlein<sup>4</sup>, Gaumenmüner<sup>5</sup>, Spannender Muskel des Gaumenvorhangs<sup>6</sup>, Schlingener Gaumenmuskel<sup>7</sup>, (Tensor veli palatini<sup>8</sup>, Musculus pheno-salpingo-staphylinus<sup>9</sup>, s. salpingo-staphylinus externus<sup>10</sup>, s. peristaphylinus externus<sup>11</sup>, s. sphenophagus<sup>12</sup>, s. pterigopalatinus<sup>13</sup>, s. sphaenopterigopalatinus<sup>14</sup>, s. pterygostaphylinus<sup>15</sup>, s. pterygostaphylinus externus<sup>16</sup>, s. novus tubae Eustachianae<sup>17</sup>, s. palato-salpingus<sup>18</sup>, s. tubae novus<sup>19</sup>, s. petro salpingo-pterygo-palatinus<sup>20</sup>.) derjenige Muskel, welcher in der Gegend des spinösen Processes des Sphenoidalknochens an dem Ende der Pyramide entspringt, und etwas vorwärts geht, sich um den pterygoideischen Haken umschlägt, und mit seinen Fasern hinten in den weichen Gaumen übergeht, aber vorzüglich dazu dient, diesen seitwärts anzuspannen. S. Gaumenmuskeln.

1) nach Albin (hist. musc. hom. 4. ed. p. 224) 2) nach Edmerring (Muskellehre S. 162.) 3) Bientaud's Zergliederungsk. Uebers. Leipzig. 1782, 2. B. S. 340. 4) Brown's verdeutschte Besch. d. Musk.

5) Spener, Verh. 1704, S. 31. 6) nach Edmerring (a. a. D.) 7) nach Hildebrandt (Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1727.) 8) Mayer's Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 247. 9) Hildebrandt's Lehrb.

10) f. w. a. a. D. 11) nach Winslow (expos. anat. lat. vers. T. IV. S. 498.) 12) 13) Schaarschmidt's anglol. Tabell. Tab. 8. 14) Spigelii de hum. c. fabr. l. 4. c. 6. 15) 16) nach Cowper (myogr. ref. ed. 1694, c. 17.) 17) nach Cowper (l. c. c. 15.) 18) nach Alston (anthropogr. l. 5. c. 20.) 19) nach Walsalva (de aure P. l. c. 2. S. 18.) 20) nach Douglas (myogr. compar. c. 17.) 21) nach Walsalva (l. c.) 22) nach Schreger (Nomencl. d. Musk. S. 14.)

**Circumflexi nervi musculi stylopharyngei,** s. Circumflere Nerven des Stylopharyngeus.

**Circumflexus nervus humeri,** s. Arillarnerv.

**Circumobstantia,** Uebersetzung des eigentlich Griechischen Antiperistasis.

*Circumossale, Circumossalis membrana*, i. q. Periosteum  
*Circumplexoria, s. Circumpressoria facultas*, f. Anha-  
 tende Facultät.

*Circumpulsio*, f. Periosis.

*Circumsectio*, f. Beschneidung.

*Circumumbres*, i. q. Periscii.

*Circumvallatae papillae, s. papillulae linguae*, f. unter P-  
 pillen der Zunge, hintere Papillen.

*Cirkel der Brustwarzen*, f. Areola der Brustwarzen.

*Cirkel der Iris*, (*Circuli iridis* <sup>1)</sup>) Kreise der Iris <sup>2</sup>  
 werden die an der Iris des Auges bemerkbaren kreisförmigen Strei-  
 genannt, welche sich von der übrigen Fläche der Iris durch dunkler  
 Färbung auszeichnen, von denen man wieder a) einen größern <sup>3</sup>  
 (*Circulus major* <sup>4</sup>, s. uveae,) nach dem äußern Rande der Iris zu, un-  
 b) einen kleinern <sup>5</sup>, (*Circulus minor* <sup>6</sup>;) wiewohl unvollkommen  
 von jenem umgeben, nach der Pupille zu unterscheidet. S. unt-  
 Auge, Iris.

1) — 6) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1520.

*Cirratus*, eigentlich krausköpfiger Knabe <sup>1</sup>. — S. Krauskopf.

1) Persii sat. v. 29. „Tun' *cirratorum* centum dictata fuisse, P-  
 nihilo pendas?“

*Cirri* <sup>1</sup>, eigentlich das krause Haar der Knaben, welches bei de-  
 Römern zuerst im siebenten Jahr geschoren und bis zum vierzehnten  
 cultivirt wurde, wo es dann, nachdem es nochmals geschoren un-  
 wieder gewachsen war, den Rahmen Caesaries erhielt, sonst au-  
 wohl Synonym von krausem Haar überhaupt <sup>2</sup>. Vgl. Haupthaa-

1) Vealingii syt. anat. c. comm. Blasii c. 20 not. ad ungues.

*Cirri uteri*, f. Fallopische Trompeten.

*Cisterna cerebri*, f. unter Hirnhöhlen, vierte Hirnhöhle.  
*chyli, s. lumbaris*, f. Receptaculum des Chylus. — *mammaria*  
 f. unter Milchgänge.

*Clamitatio, Clamor*, f. Geschrei.

*Claudens nasi musculus*, i. q. Compressor nasi.

*Clausor orbicularis* <sup>1</sup>, Augenschließer <sup>2</sup>, eine nach un-  
 gegründeter Eintheilung des Orbicularmuskels der Augenlider frühe  
 angenommene Bezeichnung der obern Hälfte oder des am obern Au-  
 genlide befindlichen Theils dieses Muskels. Vgl Orbicularmus-  
 kel der Augenlider.

1) 2) Browne's verdentschte Beschr. d. Musk. v. Spener, Berl. 1704, S. 11.

*Clastrum gutturis, s. palati*, entsprechend dem gleichbedeuten-  
 den Griechischen Worte <sup>1</sup>, die Grenze zwischen der Mundhöhle un-  
 dem Rachen in der Gegend der Tonsillen. S. unter Rachen, vgl  
 auch Gaumen vorhang.

1) κλειδρον, κλειδρον. Hippocr. de morb. l. 2. c. 28 et Galeni exp. h. v.

*Clastrum virginitatis*, i. q. Hymen.

*Clausura nigromantica*, wird von Paracelsus <sup>1</sup> als ein-  
 eigne Art der Nigromantie unterschieden, zufolge deren in einen  
 menschlichen Körper ohne äußere Belegung etwas widernatürliches ein-  
 gebracht, oder auch herausgenommen werden könne. S. Nigromantie

1) phil. sagacis l. 1. Oper. Straßb. 1616, 2. Th. S. 863.

*Clauthmos, Clauthmyrismus*, in Uebertragung des gleichlau-



den Griechischen Worte <sup>1</sup>, lautes und heftiges Weinen, vorzüglich der Kinder. S. Weinen.

<sup>2</sup>) *κλαυθμος, κλαυθμυρισμῶν*. Vgl. Foessii oec. Hipp. v. *κλαυθμυρισμῶν* und Moschion. de morb. mulier. c. 99.

*Clavae* <sup>1</sup> *similis nervus*, i. q. Olfactorius nervus.

<sup>2</sup>) Clava, eine Keule, oder festsiger Stöck.

*Clavale* <sup>1</sup> *os*, i. q. Processus styloideus, s. Stylsförmiger Proceß der Schläffeln.

<sup>2</sup>) Ein erst in späterer Zeit aus Clavus, Nagel, wie Clavatus, a, um, gebildetes Wort.

*Clavales dentes*, s. Backenzähne.

*Clavatio* <sup>1</sup>, *Claveatio* <sup>2</sup>, s. Gomphose.

<sup>2</sup>) 2) Ebenfalls ein neu gebildetes, von Clavus abgeleitetes Wort.

*Clavicula* <sup>1</sup>, s. Schlüsselknochen,

<sup>2</sup>) Diminutiv von Clavis, Schlüssel, auch Schloß, ingleichen das Gabelchen an Wehranken.

*Claviculae*, i. q. Malleoli, s. Knöchel.

*Claviculare caput sternocleidomastoidei*, s. unter Sternocleidomastoideus.

*Clavicularincisur des Manubriums des Sternum*, (*Clavicularis incisura* <sup>1</sup>, s. *Cavitas articularis* <sup>2</sup> *manubrii sterni*, *Articulus* <sup>3</sup>, s. *Sinus* <sup>4</sup> *clavicularis*,) die auf beiden Seiten der Sternarincisur des Manubriums des Sternum schräg abwärts gehende, überknorpelte Ausbuchtung, durch welche dasselbe mit den vorderen Enden der Schlüsselknochen in Verbindung tritt. S. Sternum.

<sup>1</sup>) Willebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 540. <sup>2</sup>) Leber's Praeclat. anat. ed. nova, Viennae 1772, p. 54. <sup>3</sup>) Eder's anat. Handb. 1. B. S. 201. <sup>4</sup>) Schaarschmidt's osteol. Tabell. Tab. 2.

*Clavicularis bursa mucosa*, s. Clavicularschleimsack. — *cavitas*, s. *incisura manubrii sterni*, s. Clavicularincisur des Manubriums des Sternum.

*Clavicularschleimsack*, (*Clavicularis bursa mucosa* <sup>1</sup>,) Schleimsack des Schlüsselbeins <sup>2</sup>,) der sich zwischen dem Coracoclaviculärproceß und dem Schlüsselknochen, hinter dem trapezoideischen Gelenke nahe da, wo beide Knochen an einander treten, befindet. S. Schleimsäcke.

<sup>2</sup>) Fischer's Anweis. zur Zergliederungsk. 1. Th. S. 160.

*Clavis* <sup>1</sup>, i. q. Clavicula, s. Schlüsselknochen.

<sup>2</sup>) Entsprechend dem Griechischen Worte *κλεις*, Riegel, und in der Bedeutung des Schlüsselknochens (Galen anat. admin. 1. 8. c. 1) gebraucht, indem die Aeltern in den Gebäuden der Alten die S-förmige Krümmung der Schlüsselknochen hatten, nach der Conjectur von Spigel (de h. c. fabr. 1. 2. c. 15.)

*Clavus* <sup>1</sup>, s. Arrhopes.

<sup>2</sup>) In eigentlicher Bedeutung ein Nagel.

*Cleidion*, Clidion, entsprechend dem gleichlautenden Griechischen Worte <sup>1</sup>, i. q. Clavicula. S. Schlüsselknochen.

<sup>2</sup>) *κλειδιον*.

*Cleidomastoideus musculus*, s. unter Sternocleidomastoideus, äußere Portion.

*Cleido-sterno-cutaneus faciei musculus*, i. q. Platysma faciei.

*Cleithron*, in Uebersetzung des gleichlautenden Griechischen Wortes.

*Clastrum gutturis*.

*Clidion*, s. Cleidion.

**Clima**, (*Clima*<sup>1</sup>.) Klima, Himmelsstrich, Erdgegend (Regio terrae, Inclination coeli<sup>2</sup>.) Alles animalische, wie alle vegetabilische Leben ist von außen zunächst von dem cosmischen Verhältnisse bedingt, in dem der von uns bewohnte Erdkörper zu dem Sonnenkörper steht, den er umkreist und dem er in seinem täglichen Umschwung um die eigne Ase, immer wechselnd einen andern Theil seiner Oberfläche zugehrt. Unter Einwirkung des Sonnenlichts auf die Erde, nach bestimmten Graden der Intensität, nach bestimmten Wechsel und nach Verschiedenheit des mehr oder minder schiefen Winkels, unter dem es die Erdoberfläche trifft, bildet sich zunächst alle Vegetation auf derselben aus, die wieder der Boden und der Träger alles animalischen Lebens ist, das aber auch zugleich unter directen Einfluß jener Modificationen der Einwirkung des Sonnenlichts steht und eben dadurch erst in seiner bestimmten Form und Sphäre sich fre entfalten kann.

Die Erdoberfläche ist aber an sich, und abgesehen von dem Stand der Erde gegen die Sonne, höchst verschiedenartig, und noch sind die Principe nicht gefunden, die die Mannigfaltigkeiten erklären, welche sie in Hinsicht der Höhen und Vertiefungen, (also auch ihrer Bedeckung mit Wasser und ihrer gegenseitigen Hervorragung über selbiges, als festes Land oder Inseln,) ingleichen der qualitativen Verschiedenheit der obern Erdlagen zeigt. Durch diese Mannigfaltigkeiten treten aber für das vegetative und animalische Leben, das auf jeder einzeln unterschiedenen Erdoberfläche möglich ist, neue Verhältnisse ein, die für jenes wieder von der höchsten Wichtigkeit sind.

Alle diese Verhältnisse nun bezeichnet man mit dem umfassenden Wort **Clima**, das nach naturphilosophischer Ansicht nichts anders ist, als das Erdenleben selbst, in Bezug auf das animalische und insbesondere auf das Menschenleben, das es selbst in sich aufnimmt, indem es sich nur erst in ihm in freien Gestaltungen veroffenbart.

Durch das Studium des Clima's, oder der climatischen Verschiedenheiten der Erde, tritt die medizinische Wissenschaft, und zwar zunächst die Physiologie, als ihre erste Grundlage, in unmittelbare Berührung mit der Geographie oder Erdbeschreibung, die aber besonders dadurch erst aus der gemeinen Sphäre, innerhalb welcher sie gewöhnlich cultivirt wird, zur Geognosie oder philosophischen Erdkunde sich erhebt, von der indessen hier mehr nicht als einige allgemeine Umrisse gegeben werden können.

Die Alten, denen die Form, der Umfang und die Größe unsere Erdkörpers, wie überhaupt seine organische Verbindung mit der Sonne und den ihm nahen planetarischen Körpern, größtentheils und der Hauptsache nach unbekannt waren, konnten jedoch auf der beschränkten Erdoberfläche, die ihnen zugänglich war, die großen Unterschiede nicht unbeachtet lassen, die in den wechselnden Jahreszeiten, der scheinbar tieferen oder höheren Sonnenstand am Himmel, das längere oder kürzere Verweilen der Sonne über dem Horizont und die davor bedingte mehrere oder mindere Sonnenwärme oder Winterkälte, in von einander südlich oder nördlich entfernten Gegenden, gleichzeitig dar

1) nach dem gleichlautenden Griechischen Worte κλίμα. (Vitruvii de architectura 1. 1. c. 1.) 2) in wörtlicher Uebersetzung von κλίμα. (Vitruvii de archit. 1 c.)



ten. So bildete der Begriff von Clima, oder von Eigenheiten der Erdgegend, sich sehr früh aus. So wenig die Alten aber wä-  
 konnten, daß auf der Grenze, wo die Kunde von Erdenbewoh-  
 ihnen schwand, auch wirklich der Welt Ende sei; so bezogen sie doch  
 Wort Clima einzig nur auf die ihnen wirklich bekannten und bewohn-  
 Erdstriche. Sie bildeten ihre Grenzen nach heutiger Berechnung der  
 breite von etwa  $12^{\circ} 41'$  nördlichen Abstandes vom Aequator, oder  
 östlicher Breite, bis zum  $50^{\circ}$  nach dem Nordpol zu, also von der  
 Gegend an, wo der längste Tag nur etwa  $12\frac{3}{4}$  Stunden hat,  
 zu der, wo er 16 Stunden 20 Minuten dauert. Um die sich in  
 dem Erdbezirk der damals nur bekannten drei Welttheile zeigenden  
 matischen Verschiedenheiten besser zu unterscheiden, nahm man 7  
 mate an, in deren jedem ein damals bekannter Hauptort, oder merk-  
 würdiger Theil der bewohnten Erde, in der Mitte lag, von dem aus  
 an andere unter gleicher Breite liegende Gegenden als Parallele  
 ichnet wurden. Hiernach wurden dann auch die Climate selbst  
 verschieden, so das erste als das von Meroe in Aethiopien, das  
 ite als das von Sienne in Egypten, das dritte als das von Alexan-  
 n, das vierte als das der Insel Rhodus, das fünfte als das von  
 m, das sechste als das des Pontus Eurinus, das siebente als  
 der Mündungen des Borysthenes (Dnipers.) Diesen sieben Cli-  
 ten wurden später noch ein achttes, das der Rhipheischen Gebirge in  
 i Asiatischen Sarmatien und ein neuntes, das der Quellen des Ta-  
 3 (des Don's) zugesügt. Doch finden sich auch Verschiedenheiten  
 dieser ältesten Unterscheidung der Climate.

Eine mehrere Festigkeit erhielt diese Bestimmung in späterer Zeit,  
 man über die kugelförmige Gestalt der Erde, ihre tägliche Ro-  
 von um feste Puncte, oder um ihre Pole, und die Neigung der Erd-  
 (er vermeintlichen Sonnen-) bahn in ihrem jährlichen Lauf zu dem  
 äquator, oder dem größten von beiden Polen gleich entfernten Um-  
 der Erde, in einem ziemlich beständigen Winkel von etwa  $23\frac{1}{2}$   
 d, genauere und bestimmtere Kenntniß gefaßt hatte.

Man hatte nämlich vorzüglich in Beobachtungen am Himmel und  
 h davon gezogene Schlüsse gefunden, daß die Sonne, wenn sie  
 Zeit der Tag- und Nachtgleiche den Bewohnern der Aequitorial-  
 er in der Mittagsstunde über dem Scheitel steht, in den näch-  
 drei Monaten scheinbar allmählig so weit nördlich oder südlich  
 diesem Stand in der Mittagsstunde abweicht, daß sie dann bei  
 Culmination, oder ihrem höchsten Stande im Mittag, bis zu  
 $23\frac{1}{2}$  Grad geographischer Breite gelangt, oder in den unter dem  
 achten Grade nördlich oder südlich gelegenen Erdgegenden allmäh-  
 so hoch am Himmel heraufsteigt, daß sie auch hier in der Mit-  
 stunde den Scheitelpunct erreicht, von da aber scheinbar wieder  
 kehrt, und nachdem sie den Aequator zur Zeit der zweiten Tag-  
 Nachtgleiche wieder überschreitet, in der entgegenstehenden Rich-  
 , oder in der entgegengesetzten durch den Aequator abgegrenzten  
 Hemisphäre, nach sechs Monaten bis zu demselben Grad gelangt,  
 wie jener aber auch ihr Wendepunct wird, so daß sie nach noch  
 Monaten, also nach Jahresfrist, über dem Aequator wieder zu  
 Punct zurück kehrt, von welchem sie nach dieser Zeitbestimmung in

der Vorstellung das erste Mal ausgegangen war. Hiernach bestimmte man auf der Oberfläche der Erdoberfläche, von dem Aequator aus nördlich und südlich einen  $23\frac{1}{2}$  Grad weit, (deren jeder etwa 15 Deutsche Meilen enthält,) reichenden Erdstrich, als den, innerhalb dessen die Sonne jährlich zwei Mal, (an den Grenzen jedoch aber nur einmal mit scheinbarem längern Verweilen,) in der Mittagsstunde den Scheitelpunct erreicht, wo die Punkte des Sonnenaufgangs und Sonnenniedergangs am Horizont das ganze Jahr hindurch theils gar nicht, wie genau unter dem Aequator, theils nur wenig nördlich oder südlich abweichen, und die Sonne entweder gerade, oder nur in geringer Krümmung des Vormittags am Himmel bis über den Scheitel heraufsteigt und sich des Nachmittags eben so ganz oder fast perpendicular wie der zum Horizont herabsenkt, so daß ihr Aufgang wie ihr Untergang auch der Zeit nach das ganze Jahr hindurch keinen, oder doch nur geringen Unterschied zeigt, und die Tage und die Nächte sich immer fort ziemlich einander gleich bleiben.

Man bezeichnete diesen ganzen Erdstrich, als eine gürtelartig um die Erdoberfläche in gleichmäßiger Breite sich erstreckende Fläche, als eine Zone, und zwar zunächst wegen der im ganzen Jahre vorwaltenden Sonnenhitze, als die heiße Zone.

Im Gegensatz von ihr schied man nördlich und südlich in Gedanken von den Polen aus einen Raum der Erdoberfläche ab, der in jeder Richtung hinaus den Abstand der Sonnenwendekreise, oder der Grenzen der heißen Zone von dem Aequator, also ebenfalls  $23\frac{1}{2}$  Grad zur Grenze hat, in dem entsprechend dem scheinbaren Auf- und Niedersteigen der Sonne innerhalb der heißen Zone auch auf jedem der beiden Pole die Sonne, der Richtung des Erdkörpers gegen sie zu Folge zur Zeit der Nachtgleiche nur mit der Hälfte über dem Horizont erhoben erscheinen muß<sup>3)</sup>, und wenn das Aufsteigen in der Hemisphäre desselben Pols geschieht, hier in spiralförmigen Windungen rings am Horizont herum, so wie die Sonne vom Aequator sich bis zur nächsten Sonnenwende entfernt, allmählig auch, entsprechend jener Distanz bis zu  $23\frac{1}{2}$  Grad, über den Gesichtskreis sich erhebt, in dem von dem Pole bis zu dieser Distanz entfernten Erdgegenden aber während sie in ihrem Stand auf derselben Hemisphäre über dem Aequator hinaus sich befindet, längere oder kürzere Zeit, und zum mindesten an den Grenzen, nämlich in der Distanz von  $23\frac{1}{2}$  Grad von dem Pole, oder auf dem  $66\frac{1}{2}$  Grad vom Aequator an gerechnet, einen Tag, (den der Sonnenwende oder des Solstitiums,) nicht unter dem Horizont sich senkt, in der andern Hälfte des Jahres aber, wo die Sonne sich der entgegengesetzten Hemisphäre zuwendet, auf dem Pole, dessen Hemisphäre sie verließ, eine halbjährige Nacht herrscht, indem die Sonne sich hier gar nicht über den Horizont erhebt, in dem gedachten Abstand aber längere oder kürzere Zeit Tage lang gar nicht aufgeht und auf der Grenze selbst, wenigstens einen Tag, (den

3) Es wird in diesen rein mathematischen und einfachen Bestimmungen nicht auf die Refraction der Sonnenstrahlen in der Erdatmosphäre Rücksicht genommen, zufolge welcher bei niederem Stande der Himmelskörper, also auch der Sonne am Horizont dieselben stets um einige Grade höher, heraufgestiegen erscheinen, als sie nach einfacher Berechnung es seyn sollten.



zweiten Sonnenwende,) die Sonne auch in der Mittagsstunde  
einmal bis über die Hälfte zum Vorschein kommt.

Diese Erdgegenden nun wurden, so wenig ihre Form, (als die der  
Oberfläche eines Kugelsegments,) der eines Gürtels entsprach, doch auch  
in Zonen, und zwar als kalte, die von Europäern bewohnte Erd-  
hemisphäre als nördliche, die entgegengesetzte aber, (völlig unbe-  
kannt,) als die südliche bezeichnet.

Die zwischen beiden sonach gleichmäßig abgegrenzten, (deren Flächen-  
inhalt aber wegen der Kugelform der Erde nothwendig bedeutend von  
einander abweichen muß,) auf jeder Erdhemisphäre in der Mitte  
liegenden Gegenden erhielten den Namen der gemäßigten oder  
temperirten Zonen. Ihre Eigenheit ist, daß nie im Jahr die  
Sonne auch nur einen Tag nicht unter den Horizont sich senkt, oder  
dazwischen unter demselben bleibt, oder mit andern Worten, daß die Sonne  
an jedem Tag auf- und untergeht, daß ferner die Sonne sich in der hal-  
bjährigen Jahresfrist, wo sie ihren Stand über dem Aequator auf dersel-  
ben Hemisphäre hat, sich von der Tag- und Nachtgleiche an in der  
Mittagszeit immer mehr und mehr dem Scheitelpunct am Himmel  
nähert, und zwar um so mehr, je näher der heißen Zone ein Ort oder  
Gegend gelegen ist, nie aber ihn erreicht, noch weniger über-  
steigt, sondern von der Zeit der Sonnenwende an wieder zurück-  
geht, dann aber in der zweiten halbjährigen Frist auch in dem größ-  
ten Abstand, oder zur Zeit der zweiten Sonnenwende, in den der kal-  
ten Zone nahen Orten und Gegenden in den Mittagsstunden sich zwar  
wenig über den Horizont erhebt, oder sehr spät auf- und eben so  
spät wieder untergeht, aber doch immer einige Zeit sichtbar bleibt,  
auf die sich von neuem wieder allmählig nähert, und so der Jah-  
reszeitenwechsel bewirkt wird, der mit entsprechendem Wechsel des Ta-  
ges- und der Nachtlänge als Sommer- und Winterszeit bekannt ist.  
Die gemäßigten Zonen also beginnen vom  $23\frac{1}{2}$  Grad Breite, wo sie  
beginnen, weil hier der Parallelkreis des Aequators nur einigen geringern  
Abstand hat, vom Morgen nach Abend rings um die Erde herum, oder  
geographischen Längengraden, die größte Verbreitung haben, und rei-  
nen mit allmählig, der Kugelform der Erde entsprechender Verkleine-  
rung der Parallelkreise, oder der Längengrade, bis zum  $66\frac{1}{2}$  Grad.

Hiernach wird die Eintheilung der Erdkugel in 24 Climate ver-  
vollständigt werden, welche neuere Geographen mathematisch bestimmt  
haben, und wovon der Bestimmungsgrund von der Dauer des läng-  
sten Tages im Jahre hergenommen ist. Man zog nämlich durch die-  
se Grade der geographischen Breite, unter denen die Sonne, die  
unter dem Aequator das ganze Jahr hindurch unverändert 12 Stunden  
auf- und eben so viel unter dem Horizonte ist, den längsten Tag  
oder eine halbe Stunde länger am Himmel steht, bis zum  $66\frac{1}{2}$   
Grad, unter dem sie nämlich am längsten Tage gar nicht untergeht,  
Parallelkreise und zählte die rings um die Erdkugel reichenden Erd-  
grade in dieser Distanz nach einer Scale, wo die Gegend zwischen  
Aequator selbst und dem ersten Parallelkreise das erste Climate bil-

Diese Climate sind dem Flächeninhalt nach sehr von einander  
verschieden und dieser verringert sich in bestimmter Progression; denn  
daß die Längengrade der Kugelkrümmung der Erde wegen von

dem Aequator nach den Polarkreisen zu bedeutend abnehmen, so werden auch aus gleicher Ursache die Distanzen eines hiernach bestimmten Erdclima's von dem Aequator aus nach den Polen zu immer kleiner.

Da die Polarkreise nach dieser Grundlage außer climatischer Berücksichtigung blieben; so glaubte man, für die fernern Unterschieden in ihnen eine andere Bestimmung treffen zu müssen. Man theilte nämlich die fernern Breitengrade, mit ihren Parallelkreisen vom 66 bis zu 90 Grad oder den Pol selbst, nach der Tag- und monatlichen Dauer des längsten Tages, oder vielmehr der Zeit ab, binnen welcher die Sonne, wenn sie derselben Hemisphäre zugewendet ist, nicht wieder unter dem Horizont sich herabsenkt, oder, einmal aufgegangen, nicht wieder untergeht. Man bestimmte die Zeitperioden, innerhalb welcher dieß geschehen mußte, nach halben Monaten und erhielt sonach, da die Sonne unter dem Polarkreise nur 1 Tag, unter den Polen selbst aber 6 Monate lang ganz über dem Horizont bleibt (oder auch gegengesetzt, so lange gar nicht sichtbar wird,) noch 12 Climate für diese Gegenden.

Folgende Tafel zeigt die Breitengrade, bis zu welchen jedes dieser beiderseitigen Climate reicht, und den Unterschied der Zwischenräume. Tafel der Climate in den heißen und den gemäßigten Zonen.

Nummer der Climate	Dauer der längsten Tage		Grade der geogra- phischen Breite		Unterschiede der Cl- mate nach Breiten- graden	
	Stunden	Minuten	Grad	Minuten	Grad	Minuten
0	12	0	0	0	0	0
1	12	30	8	34	8	34
2	13	0	16	43	8	9
3	13	30	24	10	7	27
4	14	0	30	46	6	36
5	14	30	36	28	5	42
6	15	0	41	21	4	53
7	15	30	45	29	4	8
8	16	0	48	59	3	30
9	16	30	51	57	2	58
10	17	0	54	28	2	31
11	17	30	56	36	2	8
12	18	0	58	25	1	49
13	18	30	59	57	1	32
14	19	0	61	16	1	19
15	19	30	62	24	1	8
16	20	0	63	20	0	56
17	20	30	64	8	0	48
18	21	0	64	48	0	40
19	21	30	65	20	0	32
20	22	0	65	46	0	26
21	22	30	66	6	0	20
22	23	0	66	19	0	13
23	23	30	66	27	0	8
24	24	0	66	30	0	3



## Tafel der Climate in den kalten Zonen.

Nummer der Climate.	Dauer der längsten Tage		Grade der Breite		Unterschied	
	Monate	Tage	Grad	Minuten	Grad	Minuten
0	0	1	66	30	0	0
1	0	15	66	44	0	14
2	1	0	67	20	0	36
3	1	15	68	23	1	3
4	2	0	69	48	1	25
5	2	15	71	34	1	46
6	3	0	73	37	2	3
7	3	15	75	57	2	20
8	4	0	78	30	2	33
9	4	15	81	14	2	44
10	5	0	84	5	2	51
11	5	15	87	1	2	56
12	6	0	90	0	2	59

Bei diesen rein mathematischen Bestimmungen darf aber nicht übersehen werden, daß sie bloß die Grundlage der physischen Lehre von Climate sind, indem die mittlere Temperatur zweier Länder oder Gegenden, die unter gleichen Breitengraden liegen, das Jahr hindurch oft sehr von einander verschieden ist, da außer dem Sonnenstand mehrere bedeutende Einflüsse selbige bestimmen, wenn auch gleich die erste Stelle darunter behauptet.

Bei diesen rein physischen Bestimmungen gehört zuvörderst die ungleiche Vertheilung der über die Wasserfläche des Meeres erhobenen Oberfläche, oder des sogenannten festen Landes. Gewöhnlich schätzt man die vom Meere unbedeckte und also bewohnbare Erdoberfläche gegen  $\frac{1}{3}$  der gesammten Erdoberfläche, oder auf etwa 3,000,000 □ Meilen. Von dieser liegt aber bei weitem der größere Theil in der nördlichen Hemisphäre. Wenn man auf einem künstlichen Erdglobus aber die Abtheilung in zwei Hemisphären auf die Weise bewirkt, daß der entfernteste Punct der Theilung, (der bei gewöhnlicher Eintheilung der nördliche Pol ist,) oder der höchste Punct der Kugel, in der Gegend des Ausflusses des Po's ins Adriatische Meer fällt, oder etwa 445° nördlicher Breite und dem 30° der Länge entspricht; so kann man finden, daß kaum  $\frac{1}{8}$  des sämmtlichen festen Landes auf der entgegengesetzten Erdhälfte fällt. Es sind daher die Gegenden der südlichen Hemisphäre, und dann auch der erst in neuerer Zeit bekannt gewordene westliche Continent der Erde im Durchschnitt auch bedeutend kälter als die mit ihnen in denselben Breitengraden gelegenen Gegenden der nördlichen Hemisphäre, und der als alte Welt bekannte Continent, da im allgemeinen die Temperatur des festen Landes in der Atmosphäre über dem offenen Meere und an Seeküsten unter gleichen Verhältnissen übersteigt. Auch sind um deswillen Länder, die mit Meeren durchschnitten sind, kühler, als große zusammenhängende Ländermassen, daher auch die höchste Hitze der Erdoberfläche in die mittlern, um deswillen größtentheils unzugänglichen Gegenden. physiol. Realw. II. B.

und wüsten Gegenden von Afrika fällt. Auch die Höhe eines Landes, oder die Erhabenheit desselben über die Meeresfläche, hat großen Einfluß auf die Temperatur. Die sogenannte Schneelinie, oder die Erhabenheit der Oberfläche der Erde, bei welcher der Schnee wöhnlich auch im Sommer nicht schmilzt, die in den Polargegenden in das platte Land ausläuft, nimmt bis unter die Aequatorialländer mit allmähligem Steigen ihren Fortgang, wo z. E. auf den Cordilleras in Südamerika, in einer Höhe von 14,000 bis 20,000 Fuß ein ewiger Schnee sich erhält. Der mehrere oder mindere Anbau einer Gegend macht gleich erhebliche climatische Verschiedenheiten. Die weit sich verbreitende Wälder machen eine Gegend auf viele Meilen weit rauh. So sind auch die Züge der Berge, je nachdem sie entweder kältende Winde abhalten, oder einen Rückprall der Sonnenstrahlen bewirken, oder auch eine beengte Gegend in Schatten halten, wichtig zu richtiger Würdigung climatischer Verhältnisse. Und die Verschiedenheit der obern Erdschichten, in so fern sie die Annahme der Wärme des Bodens begünstigen oder erschweren, sind nicht zu übersehen.

Im allgemeinen wird aber immer die Erfahrung über die Natur des Clima's einer bestimmten Gegend die sichersten Aufschlüsse geben und ergänzen, was der Theorie in genauer Festsetzung hierher gehöriger Principien abgeht. Zuvörderst deutet schon die Vegetation die Natur des Clima's mit einiger Bestimmtheit an. Man kann hienach für die nördlichere Erdhemisphäre, die uns am nächsten interessiert, wenn man die alte Eintheilung der Climate in das heiße, gemäßigte und kalte beibehält, das heiße im allgemeinen so weit nördlich rücken, als die Vegetation dem Hauptcharakter nach dieselbe, und überhaupt bei nicht ermangelnder Anfeuchtung des Bodens eine üppige ist, und die gemäßigte eben so weit nach Norden ausdehnen, als noch überhaupt eine Vegetation auch in der Sommerszeit nicht allzukummerlich ausfällt.

Man kann also die Grenze der heißen Zone in physikalischer Hinsicht füglich bis zum  $30^{\circ}$  der nördlichen Breite setzen, weil innerhalb dieses Erdkreises kein merklicher Wechsel von Sommer und Winter, sondern nur von trockener und nasser Witterung Statt hat, und die beständige Regenzeit hier meist die Stelle des letztern vertritt. Sie reicht nördlich bis an oder gegen die Mittelländischen Küstländer von Afrika. — Die gemäßigte Zone, die besonders auf der nördlichen Hemisphäre bei weitem den größten Theil der sämtlichen Erdbewohner in sich befaßt, kann wegen ihrer noch immer erheblichen climatischen Verschiedenheiten füglich wieder in drei getheilt werden: a) in die wärmere, bis etwa zum  $45^{\circ}$  der Breite, wo noch die Citrus ohne Pflege gedeiht, die von Europäischen Staaten Spanien, Portugal, Südfrankreich, Italien und den größten Theil der Europäischen Türkei in sich befaßt, wo in der Winterszeit zwar Fröste eintreten, aber doch der gefallene Schnee in der Regel in den Gebirgen sehr bald wieder schmilzt; b) in die mittlere, bis etwa zum  $55^{\circ}$ , wo der Weinstock mit Vortheil cultivirt wird, und die ganze Winterszeit über Frostkälte und Thauwetter abwechseln; c) in die kältere, bis etwa zum  $60^{\circ}$ , wo noch der Getreide- und Obstbau mit Vortheil betrieben werden, und die Erde in der Winterszeit hindurch fro-



ner mit Schnee bedeckt ist. Von Europa befaßt sie Großbritannien, die nördlichen Departements von Frankreich, die Niederlande, nördliche Deutschland, den südlichen Theil des Dänischen und schwedischen Reichs, Polen und den mittlern ansehnlichsten Theil des Europäischen Rußlands. — Der tiefe Europäische Norden, oder die kalte Zone, nach obiger Bestimmung, hebt von der Breite von Stockholm und Petersburg an, ist aber nur bis zum  $65^{\circ}$  theilweise für Cultur fähig. Was darüber hinausliegt, ist unwirthbar, wenn es auch einzeln bis zum  $70^{\circ}$  oder  $71^{\circ}$  Menschen kümmerliche Wohnplätze darbietet.

So wie wir nun in jedem dieser verschiedenen Erdstriche, welche der Begrenzung wir auch annehmen mögen, mit allmählichen Uebergängen des einen in den andern, (wenn nicht die Abscheidungen durch Meere oder hohe Gebirge bewirkt werden,) einen andern allgemeinen Naturcharakter, andere Pflanzen, andere Thiere finden; so zeigt auch der Unterschied der verschiedenen Völkerschaften auf der Erde, ihrer Lebensweise, ihrer Sitten und Gebräuche, ihrer Körper- und Geistesvorzüge, weit mehr noch, als man gemeiniglich glaubt, auf die Eigenheiten des Bodens, auf dem sie heimisch sind. Wenn wir die Einflüsse des Clima's auf die menschliche Natur richtig würdigen wollen, müssen wir nicht übersehen, daß die Nahrungsmittel, die in jeder dieser verschiedenen Länderstriche den Menschen darbietet, mehrere Eigenheiten der Lebensweise, die eine nothwendige Folge des Clima's sind, größtentheils einen nächsten Bezug auf den Charakter und die Natur der Menschen daselbst haben, daß also das Clima zum Theil direct, meist aber erst secundär und indirect den Wohnern desselben die Eigenheiten verleiht, die wir an ihnen beobachten.

Hierauf beruht auch größtentheils die Fähigkeit der Acclimatization, oder das Vermögen eines organischen Körpers, die besondern Wirkungen eines fremden Clima's nicht nur ohne Beeinträchtigung zu ertragen, sondern auch wohl von ihnen Vortheil zu ziehen. Unter allen Organismen besitzt diese Fähigkeit der Mensch in dem höchsten Grade, weil ihm Schutzmittel zu Gebote stehen, um die untheilbaren climatischen Einwirkungen, so z. B. eine zu große Hitze, oder eine zu große Kälte, abzuwehren, und auch seinem Verdauungsvermögen die mannigfaltigsten Nahrungsmittel aus den verschiedensten Materialien nicht widernatürlich sind; daher auch unter den meisten Völkern Menschen wohnen, in deren jedem diese andere Pflanzen, oder Thiere theils heimisch finden, theils zu ihren Bedürfnissen in den Hausstand aufzunehmen und zu ziehen genöthigt sind, und leicht würden auch die bis jetzt noch unbekannten Polarländer und Sandwüsten Afrika's nicht unbewohnt seyn und bleiben, wenn Zugang zu ihnen und ihrer Communication mit der übrigen Welt nicht zu große Schwierigkeiten in dem Wege ständen. Wenn aber auch der Mensch die Fähigkeit hat, unter allen Clima's bei einer denselben entsprechenden Lebensweise, seinen Wohnort zu nehmen; so gedeiht doch nur unter wenigen das körperliche und geistige Leben auf eine seiner Bestimmung völlig genügenden Weise. Hierauf beruht zunächst der verschiedene Zustand der Bevölke-

zung eines Landes, die zwar durch Anbau und Benützung, der Menschen zu Gebote stehenden Culturmittel bis zu einer gewissen Grenze erhöht werden kann, aber nur dann künstlich höher gesteigert wird, wenn der Handel oder die raffinierte Industrie einem Lande eine so lang vermehrte Unterhaltungsmittel zuführt.

Auch der wichtige Unterschied eines günstigen oder ungünstigen, gesunden oder ungesunden Clima's ist hierauf gegründet. Wo der Mensch nur im höchsten Kampf mit der Armut der Natur und den äußern feindlichen Einwirkungen auf das Leben sich erhält, müssen nothwendig alle nicht sehr kräftige Constitutionen, so wie auch der minder begüterte Theil eines dahin gelangten Volkshaufens, dem die künstlichen Waffen abgehen, mit denen der Reiche fast jedes physische Ungemach des Lebens besiegt, unterliegen.

In einem günstigen oder gesunden Clima aber wird erfordert, daß die Temperatur der Atmosphäre das ganze Jahr über weder zu heiß noch zu kalt sei, überhaupt auch einiger, aber doch kein so erheblicher Wechsel von warmer und kalter Jahreszeit, dieser aber zugleich gleichmäßig und in allmählichen Uebergängen Statt finde, welchen Vorzug besonders die mittlern Gegenden der gemäßigten Zone der nördlichen Hemisphäre besitzen, unter der sich auch von jeher das freie Volkserleben am kräftigsten gestaltet und erhalten hat, daß ferner eine einzelne Gegend weder zu hoch, noch zu tief gelegen, weder zu trocken noch zu feucht sei, und daß die Umgebungen die Atmosphäre nicht mit Stoffen erfüllen, die die reine Einwirkung derselben auf den Körper, besonders beim Respirationprocess, beeinträchtigen.

So wenig die besondern Eigenheiten einzelner Climate alle nach Grundsätzen dargestellt werden können, und in wie weit ein Land zum menschlichen Wohnplatz geeignet sei, sich meist erst durch die Erfahrung bewähren muß, und so weit wir die Welt kennen, auch so ziemlich sich überall gezeigt hat; so kann doch aus diesen Erfahrungen hierüber mehreres ausgehoben werden, was in den allgemeinen Grundsätzen des physischen Lebens seinen Erklärungsgrund findet.

In den eigentlichen heißen Climates, wo die mittlere Temperatur nach dem Reaumur'schen Thermometer 22 — 25 Grad, (dagegen in Paris nur auf 10 Grad,) steigt, bemerkt man im allgemeinen einen häufigern Pulsschlag, (gegen 100 in einer Minute.) Um desswillen sind auch Europäer, die dahin kommen, häufigen Hämorrhagien und Entzündungskrankheiten unterworfen. Ueberhaupt werden die Menschen hier nicht alt, und neigen sich zu Krankheiten des venösen Blutsystems hin; alle Lebensbewegungen, Respiration, Verdauung u. s. w. ermangeln eines Theils ihrer Energie; selbst der natürliche Wärmegrad sinkt unter das Normal<sup>4)</sup>; daher auch die allgemeine Geistesabspannung, der weiche Charakter, der Hang zu Ruhe und zum Müßiggang, der allen Bewohnern der tropischen Länder eigen ist. Bei übrigens guter Ernährung sind doch die Muskelkräfte derselben sehr gering, und Europäer verlieren gewöhnlich in Indien die Hälfte ihrer Körperstärke; um desswillen werden sie auch zu allen Arten convulsivischer Krankheiten geneigt. Gegenseitig wird

4) nach Ellisling (Descr. de Curacao, Amst. 1781) soll der Unterschied gegen den Wärmegrad in temperirten Gegenden 2 — 3 Grad betragen.



Sensibilität der Nerven auf das höchste gesteigert. Daher die Bewohnern heißer Länder eigne Liebhaberei für den Tanz, für Spiele, für jede Art von geistiger Exaltation; daher auch unter ihnen so häufige Geistesverrückungen und Ausbrüche aller Arten von Wuth. Alle Leidenschaften, Liebe, Rache, religiöser Fanatismus, gehen hier leicht in wilde Wuth aus. Gegenseitig sind aber auch diese Striche die Wiege der mannigfaltigen religiösen Schwärmerei, der inneren Selbstbeschaunung und strenger Abgeschlossenheit von der Welt. Der höchste Gipfel des geistigen Lebens sucht. Der Mangel reiner Lebenskräfte deutet sich auch durch die Schlassheit der Haut und Muskelsubstanz an. In Uebereinstimmung damit ist die Muthlosigkeit der südlichen Völker im gewöhnlichen Leben, mit der dann wilden Ausbrüche ihrer Wuth in Zuständen von Verzweiflung einen auffallenden Contrast bilden. Aus diesem Mangel an Charakter sind sowohl Sclaverei als Despotismus hier auf ihrem mütterlichen Boden, und im Gefolge davon fast alle Laster, die den Menschen entwürdigen: Grausamkeit, Geiz, List, Treulosigkeit u. s. w. nirgends erhebt sich eine geistige Kraft zu einiger Höhe; alle Künste und Wissenschaften bleiben auf einer gleichförmigen Stufe von Mittelmäßigkeit. Jeder Aufschwung des Geistes artet in Bizarrierie aus.

Uebermaß von Sensibilität wird durch den Gebrauch von Opium und andern betäubenden Substanzen, womit die Bewohner heißer Länder instinctartig vertraut geworden sind, wieder abgestumpft, und so im Gleichgewicht erhalten. Bei der Schwäche der Verdauungsorgane wirkt Fleischgenuß leicht Beschwerden, und wird im allgemeinen nicht vertragen; den Folgen einer zu reichlichen und fast einzigen Nahrungszunahme wird dann theils durch große Vorsicht gegen Uebersättigung, theils und vorzüglich aber durch den Beisatz reichlicher Gewürze vorgebeugt, die überhaupt in diesen Gegenden die Natur verderblicher erzeugt.

Alle diese schädlichen Einwirkungen des Klima's finden in weit heftigerem Maße bei den Negern Statt, denen ausschließlich die heißen Erdstriche zu ihrer Wohnung anwies, und zugleich eine Constitution verlieh, zufolge deren sie im Stande sind, ihr Leben selbst zu bekämpfen. Man weiß, daß der die Menschheit verheerende Negerhandel besonders dadurch bedingt ist, daß einzig die körperlichen Anstrengungen beim Anbau der Pflanzungen in Indien zu ertragen vermögen, denen Eingeborne und Europäer erst nach und nach, und daß Neger, sich selbst überlassen, und nicht gemißbraucht, gemißhandelt, bei mäßiger Kost ein hohes Alter erreichen, und wenigen Krankheiten ausgesetzt sind. Diese Krankheiten sind aber besonders die, an denen das Hautsystem den nächsten Antheil nimmt, welches theils davon herrührt, daß unter allen natürlichen Excretionen die Hautdunstung in heißen Ländern die stärkste ist; nächst dieser kommt insbesondere die Gallenabsonderung in Betrachtung, daher die Häufigkeit galliger Krankheiten, des gelben Fiebers, der Cholera u. s. w., in diesen Gegenden.

So wie die Heftigkeit und der wilde Sturm des Aequatoriallebens den Geschlechtstrieb aufs höchste steigert, so hat er auch eine schnelle Entwicklung der Pubertät zur nächsten Folge. Die Mädchen

sind noch auf der Grenzscheide der Kindheit, wenn sie hier gewöhnlich Mütter zu werden anfangen; aber wie Blumen in der Mittagsgluth verwelken sie auch eben so schnell, als sie ausblühten. Auch die Männer sind gewöhnlich durch Ausschweifungen noch in den Jahren der eigentlichen Manneskraft erschöpft. Im allgemeinen haben Weiber leichte Geburten, sind aber häufigen Mißfällen, Blutfluß und Nervenübeln unterworfen.

Kalte Climate bieten in ihren Einwirkungen auf die physische Constitution das Gegentheil von dem dar, was den heißen eigen ist, jedoch ist in den hohen Breitengraden Schwäche der Constitution gleichfalls die nächste Folge der climatischen Einwirkung, nur daß hier zu Theil aus Mangel der äußern Erregung Schwäche herbeigeführt wird wie dort aus Ueberreizung. Die den größten Theil des Jahres andauernde, und allen Trieb der Natur in organischer Bildung hemmende Kälte der Polargegenden verhindert auch die körperliche und geistige Entwicklung der Bewohner derselben. Bei kleiner Statur bleiben sie im allgemeinen stumpfsinnig, in einem verlängerten Zustand der Kindheit, und die Zaghaftigkeit dieses Alters, Leichtgläubigkeit und Furchtsamkeit begleiten sie durch das ganze Leben. Die Reizungen der Liebe fühlen sie nur spät, und nur in schwachen, eben in ihrem Hauptzweck genügenden Anregungen. Eben so gleichgültig sind sie aber auch gegen körperliche Beschwerden, und selbst gegen physische Schmerzen.

Doch an der Grenze des der höhern Cultur fähigen Erdkreises, wo gemäßigte Zone den Uebergang in die kalte macht, entwickelt sich vorwaltend die körperliche Kraft, während der Geist noch der höhern Lebensblüthe verschlossen bleibt. Eine mäßige, oder durch die hier resultirenden Mittel in ihren zerstörenden Folgen für die Organisation abgewehrte Kälte erhöht, indem sie durch Concentrirung der Lebenskräfte nach innen die Reaction derselben anregt, die Thätigkeit aller Organe. Das arterielle System wird das vorherrschende. Das Muskelsystem bildet sich kräftig aus. Die zurückgehaltene Sensibilität bei innerem kräftigen Lebenstrieb nach außen hemmt diesen nicht, und er bekämpft mit Leichtigkeit Schmerzen und Beschwerden. Alle freien Aeußerungen körperlicher Kraft, jede Art von Muskelanstrengung, Jagd, Krieg, sind des Nordländers eigenthümlichstes Leben. Den damit verbundenen Kraftverlust ersetzt er sehr durch reichliche Kost bei guter Verdauung. Die Weltgeschichte lehrt, daß alle großen Staatsrevolutionen vom Norden ausgingen, und schließlich der Süden immer dem Norden unterlag, wie aber auch gegenseitig geistig der Norden dem Süden, nur nicht diesem in seinen Extremen und schroffen Gegensätzen innerhalb der Sonnenwendekreise in den Aequitorialländern, sondern der durch gleiche Abstufung und Uebergänge, wie dort der Norden schon der temperirten Zone zustellende Süden. Alle höheren Wissenschaften, Mathematik, Astronomie, Philosophie, alle feinen Künste des Raffinements und der Speculation, selbst das Schachspiel entsprossen ursprünglich einem südlichen Boden; nur mechanische Künste, zu denen Beharrlichkeit und andauernde Kraft gehört, wurden von dem Nordländer mit mehrerem Glück cultivirt.



Alle Nordländer sind starke Esser und lieben Fleischnahrung. Zur Abweckung ihrer zurückgedrängten Sensibilität bedürfen sie der spirituellen Getränke, und das Uebermaß in denselben wird hier im Ganzen wenig schädlich. Wie in Südländern der Charakter des männlichen Geschlechts mehr das Gepräge des weibischen hat, so nähern sich in nördlichen Gegenden ihrer Natur nach mehr den Männern. Doch ist die Hautfarbe der Nordländer vorwaltend weiß, weßhalb der mindern Einwirkung der Sonnenhitze, auch das Haar häufig blond und langfallend, als in südlichen Gegenden. Wegen der mangelnden Ausdünstung, und selbst der dichtern Körperbedeckungen, auch die innern Absonderungen und Anhäufungen flüssiger Theile der Nordländern häufiger. Die Milcherzeugung bei Säugenden, der monatliche Blutabgang der Frauen, die Urin- und Speichelabsonderungen sind vermehrt, zugleich der Absatz von Fett in den innern Körperhöhlenräumen. Die Geschlechtsreife tritt erst spät ein. Die natürliche Neigung der Geschlechter zu einander bleibt in gemessenen Grenzen. Der Nordländer kennt nicht die Qualen der leidenschaftlichen Liebe, oder der Eifersucht, aber auch eben so wenig die Enttäuschungen der beglückten Liebe. Das einfache physische Bedürfnis leitet ihn, und bei seiner ungeschwächten Kraft ist eine reichliche Fruchtbarkeit der lange physisch erhaltenen Ehen die natürliche Folge. Die Krankheiten sind zwar im ganzen etwas beschwerlicher, aber werden doch leicht überstanden; die Mütter säugen gewöhnlich ihre Kinder längere Zeit. Auch ist wegen der geringen Consumption der Lebenskräfte ihres steten Ersatzes ein hohes Alter in diesen Gegenden nicht selten. Die größten Feinde des Lebens sind indessen hier der Mißbrauch des Uebermaß der Nahrungsmittel und der spirituellen Getränke, der so häufige Witterungswechsel.

Das gemäßigte Klima vereinigt die Vortheile des heißen und kalten Klima's, ohne, wie diese, die Nachtheile der Extreme zu bringen. Es gleicht dem Menschen von reifern Jahren, der zwischen Jugend und Alter mitten inne steht, von jener noch die Lebhaftigkeit erhalten hat, zu diesem durch verständige Reflexion sich hinneigt, dessen vorstehender Charakter aber volle Kräftigkeit ist. Der Bewohner der gemäßigten Zone hat weder die gefühllose Dürreheit des Nordländers, noch die reizbare Weichlichkeit der südlichen Menschen; er verbindet mit der Muskelkraft des erstern die Empfänglichkeit des letztern für Sinnesindrücke. Er liebt eine Mittellkost, Fleisch und Pflanzennahrung in Verbindung, sein Verdauungsvermögen verträgt Genuß spirituöser Getränke, er bedarf ihrer nicht, um sich gegen Stumpfseinn zu verwahren, aber doch regen sie ihn bei mäßigem Verbrauch zu höherem Leben wohlthätig an, und er gewinnt ihnen nicht Geschmack ab. Mahomed's Weinverbot war, wie seine Lehre überhaupt, nur auf die Bewohner von Arabiens Sandwüsten berechnet, und entspricht bloß der physischen Natur der Südländer, innerhalb welcher der Mahomedismus sich auch nur verbreitet hat.

In allem, worin Nord- und Südbewohner einander entgegenstellen, hält der Bewohner der gemäßigten Zone die Mitte, und steht kräftig zwischen ihnen. Das physische und das geistige Leben, welches dieses wieder in seiner dreifachen Entwicklung, als intellectuelles,

moralisches und ästhetisches, stehen im Verhältniß und unterstüzten gegenseitig einander. Wie geographisch das gemäßigste Clima das heiße und das kalte als mittleres Grenzland verbindet, so bringen auch erst die Bewohner desselben die der beiden letztern mit einander in Verbindung, durch Verbreitung von Wissenschaften und Künsten und durch den Welthandel, unter ihrer Vermittelung wird erst das Menschengeschlecht ein organisches Ganzes. Denn auch der Zutritt zu dem Norden und dem Süden wird nur dem, der nicht selbst ein Extrem von einem und dem andern bildet, und an beide seine Natur nach grenzt, möglich. Noch hat kein Indier aus eigenem Trieb die Polarländer besucht, so wenig als ein Bewohner der letztern durch irgend ein Verlangen getrieben, die Linie passirt, um hier irgend einen von ihm selbst ausgehenden Lebenszweck zu verfolgen, oder jemals seit derselben etwa seine Brüder der andern Hemisphäre aufzusuchen. Alle Weltenentdeckungen, alle große Seereisen sind ursprünglich von Nationen der Mittelländer bewirkt worden; die Weltherrschaft ist von ihnen her von hier ausgegangen, und wird sich immer, wenn auch mit einem gewissem Schwanken, aber doch nie über eine gewisse Grenze hinaus, in dieser Gegend erhalten.

Bisher ist vornehmlich von den climatischen Verschiedenheiten die Rede gewesen, welche die höhere oder niedere Temperatur bewirken. Sie sind es, die zunächst, und fast einzig die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn der Blick die gesammte Erdoberfläche umfaßt, und die mindere oder mehrere Fähigkeit der Erde, das Menschenleben zu unterhalten, im allgemeinen und in großen Länderstrichen berücksichtigt. Aber in einzelnen Theilen der bewohnten Erde, in einander ganz nahen Gegenden machen die qualitativen Ungleichheiten der Erdoberfläche so erhebliche Unterschiede in der allgemeinen Naturform und stehen soiglich auch mit dem menschlichen Leben in so nahe Zusammenhang, daß sie für diese beschränkten Bezirke von derselben Wichtigkeit werden, als die berührten allgemeinen climatischen Einflüsse.

Hierher gehört zuvörderst die tiefere oder höhere Lage eines Ortes oder einer Gegend. Ganz anders ist das Clima eines Thalebewohners, anders das eines Bergvolkes, wieder anders das der Bewohner großer freien Ebenen, anders das derer, die sich an Meeresküsten angesiedelt, anders das derer, die an den Ufern großer oder kleiner Ströme und Flüsse sich angebaut haben, und in jedem all dieser besondern und gleichsam particulären Climate finden wieder die mannigfaltigsten Verschiedenheiten Statt, auf die auch zum Theil zufällige Einwirkungen Einfluß haben.

Das Clima tief gelegener Orte hat häufig und fast gewöhnlich auch die Eigenheit, ein feuchtes zu seyn, theils weil die Gewässer an sich nicht rasch abfließen, theils weil die Winde zu ihm in der Regel keinen freien Zugang haben. Die Feuchtigkeit des Climas wird aber hier sehr erhöht, wenn die Gewässer zugleich stoden und in Sümpfen oder nicht frei liegenden Teichen sich anhäufeln. Die aus den dann entstehenden Sumpfgewächsen und durch die durch begünstigte Fäulniß vegetabilischer und animalischer Stoffe und Körper sich entwickelnde mephitische Luft, die sich ohne Aufhören d



osphärischen zumischt, und so besonders bei dem Athemholen in mittelbaren Contact mit dem Körper kommt, muß zugleich die Gesundheit nothwendig gefährden, und wo sie nicht wirkliche Krankheiten erzeugt, auch die gesund bleibenden Körper in einen Schwächestand versetzen, oder ihnen vielmehr nur eine relative Gesundheit verstaten, bei der das Leben immer mehrere oder mindere Hemmungen erleidet. Die in dergleichen Gegenden sich häufig bildenden Nebel hemmen zugleich den Zutritt des Sonnenlichts, und indem auch die Vegetation dadurch beeinträchtigt wird, und die Nahrungsmittel auch einen weniger der Verdauungskraft entsprechenden Nahrungsstoff darbieten, wirkt ein solches Klima auch noch secundär nachtheilig auf die Bewohner der ihm ausgesetzten Gegend.

Noch höher potenzirt werden aber die Einflüsse feuchter Climate, in diese zugleich auch warme sind. Wenn die nachtheiligen Einwirkungen des feuchten und kalten Klima's, namentlich Erschlaffung der ganzen Constitution, Hemmung der Ausdünstung, Zurückhaltung oder krankhafte Ausartung aller innern kräftigen Triebe, durch eine entsprechende Lebensart bekämpft, theils durch Gesundheit erträglich werden können; so sind nasse und zugleich warme Climate für das Leben von der höchsten Feindseligkeit, indem die zutretende Wärme alles Schädliche, was noch in dem sumpfigen und schlammigen Boden im Samen schlummert, gleichsam erst ausbrüdet und in Thätigkeit setzt. Aus dieser Quelle entstehen auch dann jene verheerenden Seuchen, die ganze Länderstriche entvölkern, oder durch die einzelne Länder, wie Haïca, ein offenes Grab für fast alle neue Ankömmlinge werden.

Das Klima hochgelegener Orte, oder das Bergclima, verhält sich im allgemeinen zu dem Klima der Niederungen, wie der Hochländer zum Südländer. Der schnelle Abfluß der Gewässer, und die natürliche Senkung der Feuchtigkeiten nach den Thälern erhält die Luft meist trocken; die sich an den Bergspitzen bildenden Gewölke werden bald von den Winden weggetrieben. Die Leichtigkeit der Luft verbindet sich mit ihrer Trockenheit, um für eine gesunde Athmung leicht zu machen. Alle Bewegungen der Bergbewohner geschehen mit Leichtigkeit und Munterkeit. Auf den Bergen herrscht Freiheit, aber auch die Kraft und die Genügsamkeit, da das Leben hier an sich schon Vollgenuß gewährt und keine Bürde ist, deren Wegnahme der verfeinerte Mensch so ängstlich nach Genüß hascht, und sich so oft dadurch nur noch inniger in die beschränkenden Bande seines Daseyns verstrickt. Der Urstamm aller wilden Nationen kam von Bergen herab, und erhält sich da am besten, und auch nur hier zuverlässig in seiner Reinheit. Aber die Vortheile der höhern Cultur gehen ihm ab, wenn er sie auch nicht vermist. Er verlebt sein Leben einförmig, wenn ihm auch die Natur an Dauer zulegt, was er an Mannigfaltigkeit desselben entbehrt. Denn ein ausgezeichnet hohes Alter von 90, 100 und mehr Jahren ist nur unter Bergbewohnern keine Seltenheit.

Wie im ganzen weit überwiegenden Vorzüge eines Bergclima's finden wir nur dann Statt, wenn der Boden auch die wirklichen Mittel zur Erhaltung darbietet, also mehr in den hohen Bergthälern als in den Gipfeln der Gebirge, die auch meist völlig unbewohnbar sind,

und, wo diese Thäler doch auch nicht zu eingeschränkt, sondern der Sonne und der Luft zugänglich sind; da hingegen in engen und tiefen Bergschluchten das gehemmte und abgelenkte kräftige Leben sich so häufig in Mißbildungen, Drüsengeschwülsten, Cretinismus und dergleichen darstellt.

Das Clima großer Erdf lächen steht gewissermaßen mit den beiden zuletzt gedachten in demselben mittlern Verhältniß, wie die gemäßigten Zonen zu der heißen und der kalten stehen. Jedoch macht hier die Beschaffenheit der Erdoberfläche, da sie mehr als in abhängigen Gegenden immer eine und dieselbe bleibt, einen bedeutenden Unterschied zwischen mehreren sich sonst ähnlichen Gegenden. Anders ist die einer hohen Bergebene mit Flugsand bedeckt, anders ein Hochland mit Heidegras bewachsen, anders ein zwischen Flüssen von niederem Ufer und langsamem Lauf liegender Moorgrund zu würdigen, anders wenn die Gegend zugleich dicht bewaldet, und anders wenn sie dem Zugang der Luft und der Sonne überall offen ist. Sandige Gegenden bieten immer auch, der Cultur des Bodens große Schwierigkeiten dar. Die Population auf ihnen wird immer nur gering seyn. In ihnen ist das Nomadenleben zu Hause, das die höhere Cultur zwar begründet, aber auch in der Kindheit erhält. Die einfache Lebensart, die Abhärtung der Körper erhält übrigens die Menschen, die Meilen weit mit ihren Heerden nach Weideplätzen und Wasserquellen umherziehen, gesund, und verstattet ihnen ein hohes Alter. Waldige Gegenden sind dagegen gewöhnlich feucht, wenn nicht der Boden zugleich abhängig ist. In ihnen bleibt der Mensch rauh, verwildert, ohne höheres Streben, darauf beschränkt, im Kampfe mit den Thieren des Waldes und der der fruchtbringenden Cultur des Bodens widerstrebenden Natur, ihr seine nothwendigen Erhaltungsmittel abzutrohen.

Das Clima der Meeresküsten hat vor andern Niederungen den Vortheil des freien Abflusses der Feuchtigkeiten und des Zutritts der freien Luft von der Meeresseite her für sich, wo nicht der Boden durch seine wenige Abhängigkeit und Nachgiebigkeit die Gegend zugleich sumpfig macht. Die häufiger hier wehenden Winde entfernen zwar die Feuchtigkeiten der Atmosphäre, bewirken aber auch schnelle Temperaturwechsel, an die der Körper sich gewöhnen muß. Die Schiffahrt und der Fischfang, wozu der Mensch hier die nächste Aufforderung erhält, üben die Körperkräfte. Durch Bekanntschaft mit dem Meere erhält der Mensch eine neue Anregung, und seine Kräfte werden dadurch zu höherem Streben geweckt. Die Erhaltungsmittel und Lebensbedürfnisse werden hier auch von entferntern Orten mit mehrerer Leichtigkeit zugeführt, und über die ganze Welt findet man daher die Meeresküste vor allen Gegenden häufig bevölkert, und die angesehensten Städte und Wohnplätze an ihr, oder doch in ihrer Nähe gelegen.

Allen diesen Verschiedenheiten des Bodens macht aber unter übrigens gleichen Verhältnissen unstreitig das Clima den Vorzug streitig, das sich vom Meere an landeinwärts, in der Nähe der Ströme und der mehreren größern und kleinern Flüsse bildet, die sich nach Verhältniß der Tiefe der Länder zu größern oder kleinern



erwässern vereinen, die dann die Masse alles Wassers, was dem festen Grunde entquillt oder aus der Atmosphäre herabströmt, dem Meere zuzuführen. Die Fähigkeit des Anbaus aller Länder ist zunächst durch die natürlichen Strömungen der Gewässer des Landes und seine unterschiedlichen Flußgebiete bedingt. Bei einigem leichten Abhang des Bodens gedeiht der Landbau, so wie fast alle Pflanzungen, die der Mensch seinem Leben bedarf, am besten. Das erste und dringendste Lebensbedürfniß, nachdem der menschliche Fuß nur erst einen Boden hat, der ihn unterstützt und trägt, ist Wasser, und nur sein drittes ist Feuer auf dem häuslichen Herd, der daher auch in der elendesten Hütte der Wilden das erste und oft einzige Hausbedürfniß ist. Kein Wunder also, daß der Mensch sich überall, wo nicht am Meeresstrand, am Ufer der Flüsse, oder höher ins Land hinauf doch in der Nähe von Bächen ansiedelte, und in dieser Hinsicht als ein Amphibiengeschöpf erscheint, das eigentlich überall zwischen Wasser und Land lebt. Hier völlig frei im Leben stehend, sich einen Wohnplatz auf der Welt nach eigener Willkür aussuchen dürfte, würde einen andern als in einer mittlern Temperatur, an dem Ufer eines großen Flusses, wo auf schattigem Boden Nebenhügel und Fruchtfelder, Obstgärten und grüne Wiesen mit einander wechseln, so z. B. im südlichen Deutschland an einem seiner herrlicher Ströme, wählen?

Um endlich den Bezug des Elima's auf das menschliche Leben allseitig zu würdigen, darf nicht übersehen werden, daß der Mensch die Freiheit viel vermöge, um ein ihm ungünstiges Elima in ein günstigeres umzuwandeln, durch Austrocknung sumpfiger Gegenden, Ableitung stehender Gewässer, durch Canäle, Niederhauung von Waldungen u. s. w., aber auch gegenseitig durch Pflanzungen oder Erwerbe, die mit der Gesundheit schädlichen Ausdünstungen verbunden sind, Vernachlässigung der Landescultur u. s. w. ein vorher gesundes Elima zu einem schädlichen zu machen. Man weiß aus der Geschichte, daß das Elima ganzer Länder, wie das des alten Germaniens, durch Cultur milder geworden ist; man kennt den Gewinn, den die Bewohner des Kirchenstaats vom Austrocknen der Pontinischen Sümpfe zu erlangen haben und noch erlangen; der Reißbau in Italien hat wegen klimatischer Einflüsse der Staatspolizei unterworfen werden müssen u. s. w.

So wie endlich der einzelne Mensch in einer begünstigten Lage des Lebens fast alles überwindet, was den Menschen, der dem Stande der Natur näher steht, hemmt und beengt; so würde man auch sehr irren, wenn man den allgemeinen Gesundheitszustand eines Menschen oder einer Familie, die unter einem unfreundlichen Himmelsstrich wohnt, aber durch raffinirte Künste des Lebens sich den Einwirkungen desselben zu entziehen weiß, nach dem Elima beurtheilen wollte.

Eine junge Russin von guter Erziehung wird in ihrem wohldurchheizten und verwahrten Winterpalais und der freien Luft in gut verblössenen Wagen und reichem Pelzwerk trogend, eben die feine Körperconstitution erlangen, als eine junge Römerin, die den Winter wie im Sommer in Seide und dünne Stoffe sich kleidet, und im Freien nur dem Italienischen Sonnenbrand scheut, und ihn so sorgfältig entzogen

wird, als jene der erstarrenden Winterkälte, wenn auch die Nationalverschiedenheiten sich dadurch nicht verwischen und ausgleichen.

### Hierher gehörige Schriften:

Hippocratis de aëre, aquis et locis (ed. princeps: gr. lat. J. Cornario interpr. Bas. 1529, 4. kritisch bearbeitet mit Griechischem u. Französischem Text unter dem Titel: Traité d'Hippocrate des airs, des eaux et des lieux par Corey, Vol. I et II, à Paris an IX. (1800) 8.)

Grüger de zonis et climatibus diss. Wirteb. 1660, 4.

Fr. Hartmann dissertationes II de climate, ejusque notitia, medico admodum necessaria, Regiomont. 1729, 4.

de Büchner diss. de differentiis naturarum respectu climatum, Hal. 1746, 4.

Al. Wilson observations relative to the influence of climat on vegetable and animal Bodies, London 1780, 8. (überf. W. Wilson's Beobachtungen über den Einfluß des Klima auf Pflanzen und Thiere, Leipzig. 1781, gr. 8.)

J. A. M. Gouiffès dissertation sur l'influence des climats et de l'atmosphère en particulier, à Paris 1804, 4. (H.)

*Climacteres*, nach dem Griechischen gleichlautenden Worte <sup>1</sup>. S. Stufenjahre.

1) κλιμακτῆρες, Treppin, oder Pelterstufen, bildlich in der Bedeutung von vermehrtlichen besondern Einschnitten im Leben.

*Climacterici anni*, s. Stufenjahre.

*Climax*, in Uebersetzung des gleichlautenden Griechischen Wortes <sup>1</sup>. S. Stufen des Lebens.

1) κλίμαξ, eine Treppe oder Pelter, bildlich in der Bedeutung von Lebensscale.

*Clinoidalis sinus*, s. Ridley'scher Gehirnsinus.

*Clinoidae apophyses*, s. Clinoidische Proceß des Sphenoidalknochens.

*Clinoidische Proceß des Sphenoidalknochens*, (Clinoides <sup>1</sup>, s. Clinoides <sup>2</sup> processus ossis sphenoidaei,) Abhangsfortsätze, Sattelfortsätze <sup>3</sup>, Bettfortsätze <sup>4</sup>, Bettstellenförmige <sup>5</sup>, oder Bettförmige <sup>6</sup> Fortsätze, Geneigte Fortsätze <sup>7</sup>, Keilbeinspigen <sup>8</sup>, Spigen des Sattels <sup>9</sup>, (Processus inclinati ossis sphenoidaei <sup>10</sup>, s. cphippialis <sup>11</sup>, Apophyses clinoidae <sup>12</sup>, s. clynoideae <sup>13</sup>), kleine Knochenerhabenheiten auf beiden Seiten der obern Fläche des Körpers des Sphenoidalknochens und am hintern Theile der kleinen Flügel desselben, deren man drei Arten unterscheidet: a) vordere <sup>14</sup>, (anteriores <sup>15</sup>), welche sich am hintern Ende der kleinen Flügel befinden, b) mittlere <sup>16</sup>, (medii <sup>17</sup>, s. pyramidales <sup>18</sup>), welche auf beide Seiten am vordern obern Theile derselben, ober des Türkensattels, und c) hintere <sup>19</sup>, (posteriores <sup>20</sup>),

1) nach dem Griechischen gleichlautenden Worte κλινωειδης, bittförmig, bei welcher Vergleichung aber die kleinen Flügel des Sphenoidalknochens mit zu den vordern Proceß gerechnet wurden. Vgl. C. Bauhini theat. anat. l. 3. c. 7.

2) Mayer's Besch. d. menschl. K. 1. B. S. 330.

3) Lieutaud's

Zergliederungsk. überf. Leipzig. 1782, r. B. S. 83.

4) Valsen's Hist.

Anat. überf. v. Huth, 1. Th. S. 95.

5) Heuermann's Physiol. 2.

Th. S. 151.

6) Loder's anat. Tabellen, Taf. 5. Fig. 9. Nr. 23.

7) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D.

8) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 1. B. S. 539.

9) Sommering's Angew. S. 120.

10) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D.

11) Leber prael. anat. ed. u.

Vind. 1778, p. 32.

12) Schaarschmidt's osteol. Tabellen.

13) nach Walter (Abb. von den trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 102 u. 103) aber bildl.

14) — 17) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. 1. B. S. 193 u. 200.

15) nach Walter a. a. D.

16) 19) 20) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. 1. B. S. 201.



sich an der Stelle befinden, wo sich der Basilarproceß des Occipitalknochens mit dem Körper des Sphenoidalknochens nach oben vereinigt. Oft sind jedoch die mittlern kaum bemerkbar, nicht selten auch mit den vordern so verbunden, daß sich ein Loch darunter bildet, zwischen, doch selten, gehen die hintern und die mittlern, oder wenn die mittlern fehlen, die vordern und hintern eine Verbindung dieser Art an. S. Sphenoidalknochen.

(*Clinoides*, s. *Clinoides processus*, s. Clinoidische Proceß des Sphenoidalknochens, ingleichen unter Sphenoidalsflügel, kleiner Flügel.

(*Clinopale*. Dieses aus der Griechischen Sprache entnommene <sup>1</sup> und in Sueton <sup>2</sup> in der Bedeutung von Weischlaf, gebrauchte Wort wird auch von neuern Schriftstellern <sup>3</sup>, doch mehr scherzhaft als in directer Bezeichnung, in gleichem Sinne angewendet. Vgl. Begattung.

1) κλινοναλη, wörtlich Bettkampf. 2) Domitiani l. 22. „Libidinis nimiae assiduitatem, concubitus velut exercitationis genus, clinopalem vocabat. 3) J. Langii epist. med. l. 2. c. 9. „Clinopale nudipedalis, ein mit Mühe vollzogener Weischlaf.

*Cliscometer* <sup>1</sup>, (*Cliseometron*,) Inclinationsmesser <sup>2</sup>, Neigungsmesser <sup>3</sup>, ein trigonometrisches Instrument, dazu dienen soll, um die schiefe Fläche der untern Oeffnung des Beckens zu finden; und also aus dem Winkel des plani inclinationis die Abweichung der Ase des Beckens zum Horizont, das Verhältniß derselben zur Centrallinie des Körpers, und überhaupt die individuelle, gegen den Horizont natürlich abhängige, wahre Lage des Beckens jedem Subject anzugeben und zu bestimmen. Da Stein d. Welt. Marburg unter obigem Namen ein solches Instrument zuerst bekannt machte <sup>4</sup>, so hat es auch den Namen Steinscher Cliscometer <sup>5</sup> erhalten. Neuerdings hat Osiauer <sup>6</sup> ein einfacheres Instrument dieser Art angegeben. Die nähere Beschreibung beider Instrumente kann hier um so eher unangewandt werden, da der Gegenstand überhaupt mehr den Geburtshelfer als den Anatom und Physiologen interessiert. Vgl. den Artikel Becken <sup>7</sup>.

aus den Griechischen Worten κλεις, Neigung, und μετρον, Maß, gebildet. (Stein's Anleit. zur Geburtshilfe, 7. Aufl. 1. Th. S. 69. 2) ebendasebst.

3) v. Siebold's Lehrb. der Entbindungsk. 3. Aufl. 7. B. S. 101. 4)

(Stein's Anleit. n. s. w. a. a. D. Note. 5) In der angef. Schrift befindet sich auf der 11ten Kupfertafel eine ausführliche Darstellung desselben, woraus mit Benutzung der beigelegten Erklärung der Mechanismus desselben ersichtlich ist. 6) in der in der K. Societät der Wissenschaften zu Göttingen den

27. Oct. 1810 gehaltenen Vorlesung de instrumentis et machinis, ad perueniendam optimam aequae ac vitiosae pelvis mulieb. formae et inclinationem facientibus, ab ipso inventis multoque usu comprobatis, illustrata adumbrationibus commentatio. G. Götting. gel. Anzeigen 1811, ingl. Mediz. Chir. Zeit. 1811, 1. B. S. 61. 7) 1. B. S. 681.

*Clitoridea arteria, vena*, s. Clitorisarterie, — vene.

*Clitorideus nervus*, s. Clitorisnerv.

*Clitoris* <sup>1</sup>, (*Clitoris* <sup>2</sup>,) Clitoris <sup>3</sup>, Rißler <sup>4</sup>, Weib-

Maner's Beschr. d. menschl. K. 5. B. S. 168. 2) entsprechend dem

Griechischen von Ruffus, Pollux, Hesychius u. a. zur Bezeichnung dieses Theils gebrauchten Wortes κλειτορις, (κλειτορις, κλειτορις, κλειτορις.)

3) Stephani dict. med. 1564, p. 586. Rioli anthropol. l. 2. c. 34. 4) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 5. B. S. 2342. 5) Note 5) 6)

liche Ruthe<sup>5</sup>, Weiberruthe<sup>6</sup>, Schaamzünglein<sup>7</sup>, Empfindliches Glied<sup>8</sup>, (Nympha<sup>9</sup>, Amor<sup>10</sup>, Amor Veneris<sup>11</sup>, Dulcedo Veneris<sup>12</sup>, s. amoris<sup>13</sup>, Caro columnaris, Oestrum Veneris<sup>14</sup>, Tentigo<sup>15</sup>, Columella<sup>16</sup>, Albathara<sup>17</sup>, Virga<sup>18</sup>, s. Penis muliebris<sup>19</sup>, Penis femineus<sup>20</sup>, Coles foeminarum<sup>21</sup>, Mentula<sup>22</sup>, s. Cauda muliebris, Libidinis sedes, s. irritamentum, Caruncula quae prominet inter alas<sup>23</sup>, Tunicula<sup>24</sup>, Myrtum<sup>25</sup>, Myrtus, Cercosis<sup>26</sup>), der den Alten zwar nicht unbekannte, doch von Avicenna<sup>27</sup> zuerst und nachmals noch bestimmter von Galoppia<sup>28</sup> deutlich unterschiedene und beschriebene, von Vesal<sup>29</sup> zwar als ein beständiger Theil noch geläugnete, von allen folgenden Anatomen aber als ein seiner Structur nach dem männlichen Penis entsprechendes und analoges Organ anerkannte, beim weiblichen Geschlecht schon in Embryonen wahrnehmbare und ausgebildete Theil, welcher an sich schon von geringerer Größe, und außer Verbindung mit der weiblichen Harnröhre, bis auf das als Eichel bezeichnete Endstück nach innen zurückgezogen ist, welches im Zustand der Erection, (die sowohl durch Geschlechtsreiz als äußere Reizung anzuregen ist,) dann mehr oder minder oberhalb der Oeffnung der weiblichen Harnröhre nach außen hervorragt, und deutlich wahrnehmbar wird. S. unter Genitalien des weiblichen Geschlechts.

- 5) 6) Maner's Besch. n. f. w. G. B. S. 164 u. 165. 7) Meientaub's Bergliederungsk. Uebers. Leipz. 1782, 2. Th. S. 655. 8) Oslander's Lehrb. d. Hebammenk. S. 203. 9) nach gleicher Bezeichnung im Griechischen (νυμφα. Veslingii synt. an. c. comm. Blasii c. 7 nota ad clitoris.) 10) Veslingii synt. l. c. 11) 12) nach Columb (de re anat. l. 11. c. 15.) 13) 14) Veslingii synt. an. l. c. 15) nach Albucaes. S. Bauhini theatr. an. l. 1. c. 11. 16) nach Hippocrates (κίωv.) Vgl. Riolani anthropogr. l. 2. c. 34. 17) nach Avicenna (In Uebertragung des Griechischen Wortes, im Lateinischen Virga. S. ebendaf.) 18) Riolani anthr. l. c. 19) Veslingii synt. an. l. c. 20) nach Laurentius (hist. an. l. 7. c. 12.) 21) Aristotel. de hist. an. Th. Gaza interpr. l. 10. c. 3. 22) nach Laurentius (l. c.) 23) Berengarii Carpi iag. an. Rom. 1727, p. 208. 24) Bonacioli de utero et part. gener. c. 6. 25) nach dem gleichlautenden Griechischen Worte μυστρον. 26) S. dieß Wort. 27) canon med. l. 3. fen. 21. 28) obs. anat. p. 193. 29) exam. observ. Fallop. p. 148.

**Clitorisarterie**, (Clitoridea arteria<sup>1</sup>, Clitoridis arteria<sup>2</sup>), Pulsader<sup>3</sup>, oder Arterie<sup>4</sup> der weiblichen Ruthe, Rislerarterie<sup>5</sup>, der zweite Zweig, in welche sich auf jeder Seite die innere Schamarterie beim weiblichen Geschlecht theilt, und die ebenso, wie die Penisarterie beim männlichen Geschlecht verläuft. S. unter Hypogastrische Arterie, innere Schamarterie.

- 1) Hildebrandt's Lehrb. v. Anat. d. M. 4. B. S. 2601. 2) 3) Maner's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 181. 4) Pöder's anat. Tafeln, Taf. 104. Fig. 55. 5) Gömmerring's Gefäß. S. 304.

**Clitorismus**, (Clitorismus.) Von einem obscönen Griechischen Worte<sup>1</sup> ist obiges Wort in neuerer Zeit zur Bezeichnung der Frankhaft, (oder auch als Folge von Ueberreizung,) vergrößerten und

- 1) κλητορικειν, lascive semen effundere vel puellitari, s. clitoridem intemperanter atrectare. Vgl. Riolani anthropogr. l. 2. c. 34, ed. Paris 1676, p. 293.



vorragenden Clitoris gebraucht worden<sup>2</sup>, sodann auch zur Bezeichnung des Mißbrauchs dieses Theils zu regelloser Befriedigung des Geschlechtstrieb's zweier Personen weiblichen Geschlechts unter sich<sup>3</sup>. Vgl. Tribade, ingleichen Masturbation.

2) Vgl. Linné gener. morbor. Nr. 298. 3) Vgl. Dictionnaire méd. T. V. mot Clitorisme.

**(Clitorisnerve, (Clitorideus<sup>1</sup>, s. Clitoridis<sup>2</sup> nervus,) Nerve des Riglers<sup>3</sup>, der obere Schamnerve beim weiblichen Geschlecht. Pudentalnerven.**

1) — 3) Maier's Besch. d. menschl. K. 8. B. S. 101.

**Clitorisvene, (Clitoridea vena<sup>1</sup>, Clitoridis vena.) Rig-  
rvene, Rückenvene der weiblichen Ruthe<sup>2</sup>, (Vena dor-  
salis clitoridis<sup>3</sup>,) die nur einfach auf dem obern Theil der Clitoris,  
gleich der Dorsalvene des Penis,) zwischen beiden Clitorisarterien in  
der Mitte laufende, und in zwei Äste sich zertheilende, ihr Blut in  
die innere Schamvene jeder Seite ergießende Vene. S. unter Hy-  
pogastrische Vene, innere Schamvene.**

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 666. 2) 3) Eoder's  
anat. Tafeln, Taf. 125. Fig. 2. Nr. 26.

**Clivus des Körpers des Sphenoidalknochens, (Clivus<sup>1</sup>,  
Volumenbachii<sup>2</sup>, s. ossis sphenoidaei<sup>3</sup>,) Abdachung<sup>4</sup>  
des Körpers des Sphenoidalknochens, die von den hintern  
sphenoidischen Processen des Sphenoidalknochens zu dem Basilartrande  
des Occipitalknochens in vielen Schädeln schräg ablaufende Knochen-  
rinne, welche, wo sie vorhanden ist, vorwärts die Stelle bedeutend  
verengert, dagegen hinterwärts den Raum von den hintern clinoidei-  
schen Processen zum großen Occipitalloch eben so bedeutend verläu-  
fert, und das Profil des Körpers des Sphenoidalknochens, im ver-  
thicalen Durchschnitt aus einem Quadrat, das es ohnedieß bildet,  
in durch Hinzufügung dieser eignen schiefen Fläche in ein Penta-  
gon verwandelt. S. Sphenoidalknochen.**

1) In eigentlicher Bedeutung ein Hügel. 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat.  
d. M. 1. B. S. 204. 3) 4) nach Volumenbach der Ihn (Gesch. u. Besch.  
d. Knoch. 7. Abschn. S. 61) zuerst unterschied.

**Clunes, s. Hinterbacken. — cerebri, s. unter Vierhügel des  
Gehirns, vordere.**

**Clunium os, i. q. Os ileum, s. Darmstück des Hüftknochens.**

**Clynoideae apophyses, (vitiös,) s. Clinoidische Prozesse des  
Sphenoidalknochens.**

**Clypealis<sup>1</sup> cartilago, s. Thyreoideischer Knorpel. — — sterni,  
Xiphoidischer Proceß.**

1) ein erst in späterer Zeit aus Clypeus, Schild, gebildetes Weltwort.

**Clypeus cordis, s. Schulterblatt. — oris stomachi proces-  
sus, s. Xiphoidischer Proceß. — thoracis, s. Schulterblatt.**

**Cneme, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte<sup>1</sup>, i. q. Tibia.  
κνέμη. (Galen comm. 4 de art. c. 28)**

**Cnemo-dactylaeus-musculus, s. unter Extensoren der Beine,  
langen Extensor.**

**Cnismos, Cnismus, nach dem gleichlautenden Griechischen Wor-  
te. S.ucken, ingleichen Krachen.**

κνησμος. (Galen comm. 5 in 6 libr. Epid. Hipp. c. 4.)

**Coagmentatio, s. Harmonie.**

**Coagulable Lymphhe, (*Coagulabilis lymphæ*),** f. Eiweißstoff.

**Coagulation, (*Coagulatio* <sup>1</sup>),** Gerinnung <sup>2</sup>, Erstarrung <sup>4</sup>, ist in allgemeinsten Bedeutung der Uebergang eines flüssigen Stoffs in den Zustand von Festigkeit, oder dem Wortsinne nach die Nöthigung oder der Zwang einer Flüssigkeit aus der Formlosigkeit zur Gestaltung, sei dieß durch bloße Entziehung der Wärme, wie beim Gerinnen des Deyls, oder durch einen höhern Grad von Temperatur, wie beim Gerinnen des Eiweißes, oder durch den Zusatz eines Körpers, der die gleichförmige Mischung einer Flüssigkeit aufhebt, wie beim Gerinnen der Milch. Auch das Eindicken durch Evaporation der leicht in Dunstgestalt zu versetzenden flüssigen Stoffe eines Gemisches, oder auch durch Einfangung der dazu fähigen, kann hierher gerechnet werden, obgleich dieß Wort hier so wenig gebraucht wird, als im eigentlichen Sinne, bei der Gestaltung durch Crystallisiren, wo der entstehende feste Körper nicht bloß die zufällige Gestalt des Gefäßes, worin er seine Flüssigkeit verliert, oder einzig dem Gesetz der Schwere gehorchend, nicht bloß sich klumpt, sondern vermöge innerer Bildungsgesetze nach bestimmten Richtungen linearisch, lamellos oder auch cubisch sich formt. Auch wird die chemische Präcipitation, wodurch an sich feste Körper aus einer Flüssigkeit, in der sie bloß aufgelöst waren, durch Zusatz eines dritten Körpers wieder in den vorigen Zustand der Festigkeit zurückgebracht werden, und nun ihrer Schwere nach in der Flüssigkeit sich zu Boden setzen, nicht eigentlich als eine Coagulation betrachtet. Vielmehr wird die Coagulation in beschränkterem und eigentlichem Sinne nur von der Formänderung gebraucht, wodurch die ganze Flüssigkeit, oder, wenn diese heterogener Art und gemischt ist, ein Theil derselben zwar fest wird, aber doch noch weiche Consistenz und zugleich Gleichförmigkeit der Substanz zeigt.

Die mehrsten thierischen Säfte, so wie viele Pflanzensäfte, sind zur Coagulation geneigt, erstere besonders wegen ihres Antheils an Eiweißstoff und Faserstoff. Um deswillen bezeichnet man auch den lymphatischen Theil der thierischen Säfte mit dem Namen der coagulablen Lymphhe. Die höchste Neigung zur Coagulation hat das Blut. S. Blut.

Alle Uebergänge der flüssigen Stoffe in feste in den organischen Körpern, also auch alle Ernährung und alles Wachsthum, geschehen durch und unter einer solchen Coagulation, wobei indessen immer auch der Bildungstrieb geschäftig ist, um den neuen Gestaltungen diejenige Form zu verleihen; die für den Zweck ihrer Bildung erheischt wird; in so fern ist dann jede neue Bildung des Festen im thierischen Körper zugleich Crystallisation. Vgl. Bildungstrieb. (H)

<sup>1</sup>) Plinii hist. mund. l. 23. c. 10: „Prima lactis coagulatio.“ <sup>2</sup>) 3)

Döllinger's Grundr. d. Naturl. d. menschl. Organismus, S. 69.

**Coagulum <sup>1</sup>, (*Coagulum* <sup>2</sup>),** Geronnener Stoff oder Theil, das durch den Proceß der Coagulation aus vorher flüssiger

<sup>1</sup>) Lucä's Entw. e. Syst. d. med. Anthropol. t. V. S. 247. <sup>2</sup>) von cogo (coago,) gebildet, zunächst geronnene Milch, nach Montus (de propr. serm. l. 1. n. 202,) auch Wand oder Verbindung überhaupt. (Vgl. Gallii nost. Att. l. 12. c. 1.)



erm ohne Masseverlust in die eines festen Körpers, jedoch von weicher Consistenz übergegangene Naturproduct, wozu sowohl thierische vegetabilische Stoffe unter gegebenen Verhältnissen fähig und geeignet sind. S. Coagulation. Vgl. auch Same.

*Coalescentia, Coalitio, Coalitus*, s. Verwachsen.

*Coalitus nervorum opticorum*, s. Decussation der Sehnerven. *ossium*, s. Symphyse der Knochen.

*Coarticulatio*, s. Articulation, ingleichen Synarthrose.

*Coccygea arteria*, s. Coccygeische Arterie. — *cornua*, s. Hörn des Coccyxknochens. — *ligamenta*, s. Sacrococcygeische Ligamente.

*Coccygeae eminentiae*, s. Sacralhörner.

*Coccygei musculi*, s. Coccygeische Muskeln.

**Coccygeische Arterie**, (*Coccygea<sup>1</sup> arteria*,) Steißbeinarterie<sup>2</sup>, Schwanzbeinpulsader<sup>3</sup>, ein Zweig der ischiadischen Arterie, der sich vorzüglich in den Sphincter des Afters vertheilt, unter Hypogastrische Arterie, ischiadische Arterie. 1) — 3) *Sömmerring's* Geschl. S. 300.

**Coccygeische Ligamente**, s. Sacrococcygeische Ligamente.

**Coccygeische Muskeln**, (*Coccygei musculi*,) Coccyrmusculi, der Spinosococcygeus und Sacrococcygeus. S. diese Artikel, 1) unter Aftermuskeln.

**Coccygeisches Ganglion**, (*Coccygeum ganglion<sup>1</sup>*,) Steißknoten<sup>2</sup>, Steißknötchen<sup>3</sup>, Steißbeinknötchen<sup>4</sup>, Schwanzbeinnervenknoten<sup>5</sup>, der erst in neuerer Zeit unter Ebene<sup>6</sup> kleine Nervenknoten, der aus der Verbindung der Enden des Intercoastalnerven von beiden Seiten vor dem Coccyxknöchel sich bildet, und aus dem drei Nervenfasern bis in die Spinosaligamente sich deutlich verfolgen lassen, einer aber sich in dem untern Theile des Mastdarms verbreitet. S. Intercoastalnerv.

2) *Wagner's* Besch. d. menschl. K. 8. B. S. 194. 3) *Sömmerring's* Atl. u. Nervenk. S. 332. 4) *Hildebrandt's* Lehrb. d. Anat. d. M.

44. B. S. 5162. 5) *Voder's* anat. Tafeln, Taf. 169, Fig. 2, Nr. 153.

6) *Willis*, *Weyssens*, *Wusslow* sprechen bloß von einer bogenartigen Verbindung oder von Nervengestirnten, welche beide Enden des Intercoastalnerven gemeinschaftlich bilden. *Walter* (tab. nerv. thor. et abd. t. 1. f. 2) war der erste, der ihn genau abbilden ließ.

**Coccygeus**, s. *coccygeus anterior musculus*, i. q. Spinosococcygeus. — *posterior musculus*, i. q. Sacrococcygeus.

**Coccygio-analis musculus**, s. *Coccygio-cutaneo-sphincter*, s. unter Sphincteren des Afters, den äußern Sphincter.

**Coccyx**, (*Coccyx*,) nach dem Griechischen gleichlautenden Worte<sup>1</sup>, s. Coccyxknochen.

1) *Κοκκυξ*, eigentlich der Kuckuck, und von der gefundenen Ähnlichkeit mit einem Kuckuckschnabel zu Bezeichnung des gedachten Knochens. S. *Rufi de appell. part. h. l.* in *Stephani dict. med.* 1564, p. 536.

**Coccyx os**, s. Coccyxknochen. — *tertius*, s. Kreuzknochen.

**Coccyxknochen**, (*Coccygis os<sup>1</sup>*, s. *ossa<sup>2</sup>*,) Kuckucksbein<sup>3</sup>, 1) *C. Bauhini theat. an. l. 1. c. 48.* 2) *Meckel's* Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 497. Seit *Galen* ist man gewohnt, die einzelnen Coccyxknochen für einen einzigen Knochen zu achten. Nach *Sömmerring's* Vorgange wies Stüde angesehenen Knochen auch als eben so viele besondere eigne. 3) *Blumenbach's* Gesch. u. Besch. d. Knoch. 22. Abschn.

*Anat. physiol. Realiu* II. B.

oder beine<sup>4</sup>, Rückstuckknochen, Schwanzbein<sup>5</sup>, oder beine<sup>6</sup>, Schwanzknochen, Steißbein<sup>7</sup>, oder beine<sup>8</sup>, Steißknochen, Würzelbein<sup>9</sup>, oder beine, Würzelknochen, Würzel, Eißbein<sup>10</sup>, Starrknochen<sup>11</sup>, Beweglicher Endknochen des Rückgraths<sup>12</sup>, (Coccyx<sup>13</sup>, Coccyx os<sup>14</sup>, Os, s. Ossa cuculi<sup>15</sup>, s. caudae<sup>16</sup>, Cauda<sup>17</sup>, Vertex ossis sacri<sup>18</sup>, Spina sacra<sup>19</sup>, Epiphysis ossis sacri<sup>20</sup>, Spondylium<sup>21</sup>, Acumen ossis sacri, Os ultimum spinæ dorsi mobile<sup>22</sup>, Osamiuum<sup>23</sup>, Osanum<sup>24</sup>, Orrhopygion<sup>25</sup>, Uropigium<sup>26</sup>.) Vier abgesonderte Knochen, die das eigentliche Ende der Wirbelsäule ausmachen, und unterhalb des Kreuzknochens zwischen den Ligamenten liegen, welche den Ausgang des Beckens begrenzen. Ungewöhnlich ist es, wenn die einzelnen Stücke zu einem Knochen verwachsen, oder wenn fünf oder nur drei Stücke vorhanden sind.

Der oberste Coccyrknochen hat noch einige Aehnlichkeit mit einem Wirbelbein ohne Bogen; der mittlere Theil oder Körper ist an der vordern Fläche etwas ausgehöhlt, und an der hintern gewölbt, der obere ausgeschweifte, und mit einer Knorpelfläche überzogene Rand des Körpers schließt an die Spitze des Kreuzknochens, der untere flach gewölbte und überknorpelte Rand nimmt den obern Rand des zweiten Coccyrknochens auf. In beiden Seiten des Körpers gehen die stumpf-abgerundeten Querproceß hervor, und statt der obern Gelenkproceß steigen zu beiden Seiten des obern Randes ein Paar Hörnchen empor, (Cornua coccygea,) die entweder die ähnlichen Hörnchen des Kreuzknochens unmittelbar berühren, oder doch wenigstens durch Ligamente allemal mit ihnen verbunden sind.

Der zweite Coccyrknochen ist kleiner als der erstere, mehr rundlich und hat oben einen flach ausgehöhlten Rand für die Verbindung mit dem ersten, unten einen flach gewölbten Rand für die Verbindung mit dem dritten Coccyrknochen. Zu jeder Seite verschmälert sich der Knochen in einen stumpfen Seitenfortsatz.

Der dritte Coccyrknochen ist wieder kleiner und rundlicher als der vorige, oben mit einem flachen überknorpelten Rand zur Verbindung mit dem vorigen, und unten mit einem kleinern überknorpelten Rand für die Verbindung mit dem folgenden Knochen versehen. Seltener hat dieser Knochen noch so hervorragende Seitenenden, daß er größer als der zweite Coccyrknochen ist.

4) Sömmerring's Knochenl. S. 291.

5) Kulmus anat. Tabellen,

Tab. 5.

6) Sömmerring's Knochenl. S. 291.

7) Walter's

Abhandl. v. d. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 353.

8) Sömmerring's

Knochenl. S. 291.

9) Oflander's Lehrb. d. Hebammenf. S. 103.

10)

Weitbrecht's Synthesm. im Ausz. Straßb. 1779, S. 241.

11) Kul-

mus anat. Tab. a. a. D.

12) nach Oflander (a. a. D.)

13)

Vgl. dieß Wort. S. auch Riolani comm. de ossib. c. 11, wo auch mehrere Conjecturen über die Etymologie des Wortes sich finden.

14) Vesali-

d. h. corp. fabr. l. ind.

15) Vesalii de h. corp. fabr. l. 1. c. 18.

16) 17) Columbi de re anat. l. 1. c. 18.

18) in Uebersetzung des Griechischen von Pollux (in onomast. p. 244) in gleicher Bedeutung gebrauchten Wortes κορυφή.

19) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2 B. S. 147, Note.

20) nach Galen (de ossib. l. c. 21.)

21) Monro's Knochenl. überf.

v. Krause, S. 299, Note.

22) nach Oflander (a. a. D.)

23) 24)

Vesalii de c. hum. l. 1. ind. ad fin. obgleich diese Worte gewöhnlicher dem

Kreuzknochen beigelegt werden.

25) 26) Vgl. diese Worte, auch Würzel.



Der vierte Coccyrknöchel ist der kleinste und ganz rundlich, nur oben noch mit einer abgeglätteten Fläche versehen, durch welche er mit dem dritten Coccyrknöchel in Verbindung steht.

Die sämmtlichen Coccyrknöchel sind sehr schwammig und weich. Die ungewöhnliche Verwachsung der einzelnen Coccyrknöchel findet am häufigsten beim männlichen Geschlecht Statt, weit seltener bei dem weiblichen, wo eine größere Beweglichkeit wegen der Erweiterung des Beckenausganges während der Entbindung nothwendig war<sup>27</sup>. Auch findet man die Mehrzahl der Coccyrknöchel meistens nur an weiblichen Körpern<sup>28</sup>, wo die einzelnen Knochen in ihrer Zusammenfügung auch mehr vorwärts gekrümmt sind.

Bei der Frucht sind die einzelnen Stücke als abgesonderte Knorpel vorhanden, die erst späterhin von der Mitte aus verknöchern.

Zum Schlußende des Rückenmarkcanals tragen beim Menschen die Hörner des obern oder ersten Coccyrknöchels etwas bei. Bei Affen aber, (den Orang-Utang ausgenommen,) sind die Coccyrknöchel nicht nur für den Canal des Rückenmarks durchbohrt, sondern haben auch noch zur Seite Löcher zum Durchgang der Nerven. Bei geschwänzten Affen sind 22 bis 28 Schwanzwirbel, bei dem kleinsten zweizehigen Ameisenbär 40 vorhanden. Bei den Vögeln zählt man 5 bis 9 Schwanzwirbel; bei den Reptilien, z. B. der Riesenschlange 20, bei dem Tupiram bis 104 einzelne Coccyrknöchel. Auch sind die einzelnen an der Rücken- und Bauchseite mit doppelten Dornfortsätzen versehenen Schwanzwirbel durch Nußgelenke miteinander vereinigt. Bei den Fischen lassen sich 15 bis 38 Schwanzwirbel unterscheiden. Meistens ist bei ihnen das letzte Schwanzwirbelbein steif und glatt, und an seinem hintern Rand mit Spuren von Vertiefungen zur Anlage der die Schwanzflossen stützenden Knöchel versehen.

Der Vampir gehört zu den wenigen Thieren, welche gar keine Schwanzwirbel haben. Vgl. auch Schwanz<sup>29</sup>. (Rosenmüller.)

1) Doch soll sie bei Welbern, die viel reiten, auch unter wilden Nationen besonders leicht entstehen. Am häufigsten verwächst der erste Coccyrknöchel mit dem Kreuzknöchel, sodann der letzte mit dem vorletzten. Vgl. Blumenbach's Gesch. d. Knochen, 18. 255, Note 4. (N. d. H.) 28) Um deswillen legte Casp. Baughin (theatr. anat. l. 1. tab. 4. Fig. 9) obwohl mit Ungrund, dem weiblichen Körper fünf Coccyrknöchel, dem männlichen dagegen nur vier als Normalbildung bei. (N. d. H.) 29) Vgl. den Artikel Becken, ingleichen Beckenligamente; über den Nutzen aber, den sie für die Anlage des tiefern Theils des Mastdarms und dessen Functionen haben, besonders den Artikel Aftermuskeln. (N. d. H.)

Coccyrmuskeln, s. Coccygeische Muskeln.

Cochlea, (Cochlea<sup>1</sup>), Schnecke<sup>2</sup>, Schneckenförmige Höhle<sup>3</sup>, Ohrschnecke, (Cavitas cochleata<sup>4</sup>, s. buccinata<sup>5</sup>,

Schon Aristoteles kannte die schneckenhausförmige Bildung des innern Ohrs. 23. dessen hist. animal. l. 1. c. 11: „pars (auris) interior forma anfractuosa cochleae similis.“ Indessen hat besonders Faloppla (observ. anat. p. 30) den richtigen Rahmen dem seit dieser Zeit allgemein lediglich darunter begriffenen Theile vorgelegt, und Enstach ihn zuerst abgebildet. C. dess. tab. anat. tab. 46, f. 2.

1) Winslow's anat. Abb. Übers. Berl. 1755, 1. B. S. 148. 3) Enslin's anat. Tabellen, Tab. 19. 4) 5) Th. Bartholini anat. hist. Tab. 4. c. 6.

Antrum buccinosum<sup>6</sup>, s. Foramen caecum<sup>7</sup>, s. Cavitas caeca<sup>8</sup>, s. Trochlea, s. Pelvis<sup>9</sup>, s. Concha<sup>10</sup> labyrinthi,) ein in Schneckenhausform ausgehöhlter Theil des sogenannten Labyrinth des innern Ohrs, innerhalb des petrosen Theils des Schläfenknochens, der, indem sich ein Hauptast des acustischen Nerven in ihm verbreitet, einen wesentlichen Bestandtheil des Gehörorgans ausmacht. S. unter Ohr, inneres Ohr.

6) nach Vesal (de c. h. fabr. l. 1. c. 8.) 7) 8) Veslingii synt. an. c. comm. Blasii, Pat. 1627, p. 237, nota. 9) Laurentii hist. anat. l. 11, c. 13. 10) Morgagni ep. 12. n. 10.

**Cochleaarterie**, (*Cochleae arteria*<sup>1</sup>), Schneckenarterie, Pulsader, oder Schlagader der Schnecke, ein Zweig der Auditivarterie des innern Ohrs, der durch das vordere Loch des acustischen Sinus zur Cochlea dringt, wo ihre Hauptfortsetzung auch den Namen Centralarterie des Modiolus erhält. S. unter Subclaviculararterie, Basilararterie.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2487.

**Cochleannerv**, (*Cochleae nervus*<sup>1</sup>), Nerv der Schnecke, der vordere Ast des acustischen oder weichen Gehörnerven, der der Cochlea bestimmt ist, und indem er sich in derselben ausbreitet, den Hauptantheil an der Perception der Töne hat. S. Gehirnnerven, in gleichen Gehörsinn.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 3071.

**Cochlear auris**, *Cochleare os auris*, f. Orbicularknöchelchen des Ohrs.

**Cochlearis cavitas labyrinthi**, i. q. Cochlea. — *meatus*, f. Acustischer Sinus.

**Cochleata cavitas labyrinthi**, i. q. Cochlea.

**Cochleavene**, (*Cochleae vena*<sup>1</sup>), Schneckenvene, Blutader der Schnecke<sup>2</sup>, die das Blut aus der Schnecke aufnehmende, durch einen eignen Knochencanal hindurchgehende, und in den Quersinus der harten Hirnhaut einmündende Vene. H. Ohrvenen.

1) 2) Mayer's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 456.

**Cochone**, in Uebersetzung des gleichlautenden Griechischen Wortes<sup>1</sup>, die Gegend des Hüftgelenks. S. Ischiadische Region.

1) *κοχων*. Galeni exeg. et Foessii oecon. Hipp. h. v.

**Coction**, (*Coctio*<sup>1</sup>), Kochung, (Concoctio<sup>2</sup>.) Von den bekannten Veränderungen, welche Nahrungsmittel durch das Kochen erfahren, nahmen die ältern Physiologen Veranlassung, die mancherlei Umwandlungen von Stoffen in dem thierischen Körper eben so zu bezeichnen. So wurde insbesondere die Veränderung der Nahrungsmittel in thierischen Stoff darunter begriffen, und in dieser Hinsicht gewöhnlich eine erste, zweite und dritte Coction unterschieden. Die erste entspricht der Chylose, die zweite der Hämatoze, die dritte als Homonose der Assimilation. (S. alle diese Artikel.) Auch die Scheidung der dem Körper überflüssigen und schädlichen Stoffe als Excrement wurde als ein Product der Coction betrachtet, woraus besonders für die Krankheitslehre Bestimmungen hergenommen wurden<sup>3</sup>. Vgl. Verdauung, in gleichen Excretion.

1) Riolani univ. med. comp. physiol. c. 11. 2) D. J. Th. Schenckii diss. de tribus concoctionibus corp. h. Jen. 1658, 4. 3) Vgl. C. Hoffmanni apol. p. Gal. p. 313.



Cöcalarterie, f. Cäcalarterie. — vene, f. Cäcalvene.

Coecus, a, um, i. q. Caecus, a, um.

Coeleste fluidum, f. Aether.

Coelestis mathematica, f. Astronomie. — natura, f. Himmels Natur. — physiognomia, f. Astrologie.

Coelia, in Uebersetzung des Griechischen gleichlautenden Wortes <sup>1</sup>, obgleich es überhaupt auch von jeder Höhle des Körpers gebraucht wird, doch gemeinlich in Hippokratischen Schriften den Darmcanal und einzelne Theile desselben, besonders den Magen oder auch den Dickdarm, auch wohl den Darmabgang bezeichnet. Vgl. Darmcanal, auch Magen.

κοιλια Vgl. Poesii occ. Hipp. h. v.

Coeliaca arteria, f. Cöliacische Arterie. — ganglia, f. Cöliacische Ganglien.

Cöliacische Arterie <sup>1</sup>, (Coeliaca arteria <sup>2</sup>), Cöliacische Arterie <sup>3</sup>, Baucharterie, Bauchpuls <sup>4</sup> = oder Schlagader <sup>5</sup>, Nabelgabelarterie <sup>6</sup>, Innere Bauchpulsader <sup>7</sup> oder Arteria <sup>8</sup>, Oberbauchpulsader <sup>9</sup>, Magenarterie <sup>10</sup>, Große Nabelschlagader <sup>11</sup>, (Arteria caelica <sup>12</sup>, fälschlich als Coeliaca dextra et sinistra <sup>12</sup> unterschieden,) ist der erste unpaarige Stamm, welcher von der vordern Seite der Aorta in der Abdominalgegend gleich da abgeht, wo sich in der Gegend des letzten Rückenmarks die Aortenspalte nach oben schließt. Der kurze Stamm geht sogleich herab und theilt sich so schnell in Zweige, daß er nicht leicht die Länge eines Fusses überschreitet, ja meistens weit kürzer ist. Nur in dem Stamme der obern mesenterischen Arterie so nahe, daß beide mit einander verschmolzen zu seyn scheinen.

Im normalen Zustand hat die cöliacische Arterie drei Zweige: 1) die Kranzarterie des Magens, 2) die Leberarterie, 3) die Milzarterie. Bisweilen kommen die untern phrenischen Arterien so nahe dem Stamme der cöliacischen Arterie aus der Aorta, daß man sie für Zweige der erstern halten könnte. Selten sind nur zwei Zweige der cöliacischen Arterie vorhanden, wenn nämlich die Leberarterie aus der obern mesenterischen Arterie entspringt, und eben so selten, wenn ihr ein Verbindungsweig zu der obern mesenterischen Arterie oder einem ihrer Zweige, nämlich der linken oder mittlern Grimmesarterie herab.

Der Stamme ist der Stamme der cöliacischen Arterie von den Fäden des Plexus oder dem Mittelpunkt des großen sympathischen Nerven verknüpft.

Kranzarterie, oder Coronararterie des Magens, (Arteria coronaria ventriculi sinistra.) Selten ist sie ein unmittelbarer Zweig des Aorta u. Nervens. G. 335. 2) Riolaui anthropogr. 1. 2. c. 18. 3) In sprachrichtiger Uebersetzung des Griechischen Wortes κοιλιακη, ventralis. 4) Winslow's anat. Abb. Uebers. Berl. 1733, 5. B. G. 76. 5) Meusnier's Zergliederungsk. Uebers. Leipz. 1742, 1. Th. G. 795. 6) 7) Edmerrling's Gefäß. G. 165 u. Note. 8) Meusnier's anat. Tafeln, Taf. 91, Nr. 416. 9) Meusnier's Besch. d. menschl. Anat. 8. B. G. 197. 10) Palsyn's Anat. übers. v. Guth, 1. Th. G. 543. 11) Jadelot's Lehre von d. Natur d. gesunden M. übers. v. Meusnier, G. 371. 12) Winslow's, Spigelii de c. hum. fabr. 1. 6. c. 4. 13) Kulmus anat. Tabellen, Tab. 16.

telbarer Zweig der Aorta, oder ein Zweig einer untern phrenischen Arterie, oder der Milzarterie; auch hat man die Abweichung bemerkt, daß sie aus dem Stamm der Aorta hervorging, und die beiden untern phrenischen Arterien zu Zweigen hatte, oder sich noch zum rechten Leberlappen verbreitete, oder aus dem linken Aste der Leberarterie hervorkam. Der Lage nach ist die Coronararterie der mittelste, der GröÙe nach aber der dünnste Zweig der cöliacischen Arterie. Sie nimmt ihre Richtung erst vorwärts, um die Cardia des Magens zu erreichen, und dann geht sie in der kleinen Curvatur des Magens von der linken zur rechten Seite gegen den Pfortner hin.

Immer spaltet sie sich in zwei Hauptzweige, in einen vordern und einen hintern.

Die erstern kleinem und der Zahl nach unbestimmten Zweige, welche aus dem Stamm unmittelbar hervorgehen, verästeln sich von vorn und hinten um die Cardia herum; mehrere verzweigen sich aufwärts zu dem Oesophagus, und verbinden sich mit Zweigen der oesophageischen Arterien; andere kleine Zweige endigen sich in dem Diaphragma und dem Peritonäum, ja nicht selten gelangen zarte Zweige bis zur Nebenniere der linken Seite und dem Nierenfett, die dann auch Verbindungen mit der Renal- und Suprarenalarterie der linken Seite eingehen. Bis zu dem blinden Sack des Magens erstrecken sich kleinere, unmittelbar aus dem Stamm der Coronararterie kommende Ästchen. Der vordere Hauptzweig des Stammes nimmt in der kleinen Curvatur des Magens seine Richtung gegen den Pylorus hin, und gibt nur einzelne Ästchen aufwärts zu dem kleinen Netz; die meisten Ästchen senken sich an der vordern Wand des Magens herab, so daß die Endreiser sich mit den vorwärts aufsteigenden Endzweigen der beiden gastroepiploischen Arterien vollkommen verbinden. Der hintere Hauptzweig der Coronararterie läuft zwar auch, nur weiter nach hinten herab in der kleinen Curvatur des Magens hin, geht aber immer an dem rechten Ausgang der Curvatur unmittelbar in die Pylorarterie über. Auch dieser Zweig versieht das kleine Netz mit aufsteigenden Zweigen, die bis zur Oberfläche der Leber gelangen; andere Ästchen gehören dem Pankreas und den in der Nähe desselben befindlichen Lymphdrüsen an; die Mehrzahl der Zweige läuft aber an der hintern Wand des Magens, den von den beiden gastroepiploischen Arterien aufsteigenden Zweigen entgegen, um sich mit ihnen zu verbinden. Die weitem oder dickern Zweige der Coronararterie verbreiten sich zu der äußern Haut und zu der Muskularhaut des Magens, schicken aber ihre zartesten Zweige zu der Gefäßhaut desselben, wo sie sich netzartig mit einander, und mit den übrigen zarteren Arterienzweigen des Magens verbinden, und endlich in HaargefäÙchen ausgehen, die sich an der innern Fläche des Magens theils als aushauchende GefäÙchen endigen, theils in den kleinen Schleimfollikeln der innern Haut verschlingen und zur Absonderung des Magenschleimes beitragen.

2) Leberarterie, hepatische Arterie, (Arteria hepatica). Sie geht gegen die rechte Seite hinter dem Pankreas und dem Magen in die Höhe.

Anfangs kommen aus dem Stamm nur kleine, unbestimmte Äste



für das kleine Netz und das Pancreas; dann geht an dem Pylorus die Pylorarterie, (*A. pylorica*,) ab, die in der kleinen Curvatur des Magens gegen die linke Seite läuft, und mit dem hintern Ast der Coronararterie eine beständige Verbindung eingeht, eigens sich aber an dem Magenende und an dem Anfang des Duodenums verästelt, wo ihre Zweige noch mit Zweigen der rechten gastroepiploischen Arterie anastomosiren.

Ein zweiter beträchtlicherer Zweig der hepatischen Arterie ist die gastroduodenalis Arterie, (*A. gastro-duodenalis*,) die hinter dem Anfang des Duodenums abgeht und sich sogleich wieder in zwei Zweige spaltet: in die Pancreaticoduodenal-Arterie und die rechte gastroepiploische Arterie.

Die Pancreaticoduodenal-Arterie, Bauchspeichel- und Zwölffingerdarmarterie, (*A. pancreatico-duodenalis*,) ist in seltenen Fällen als Zweig der obern mesenterischen Arterie gegeben worden, oder als unmittelbarer Zweig der cöliacischen Arterie.

Sie liegt genau hinter dem Pylorus und gibt Anfangs zarte Äste, welche sich oberflächlich zur Leber verästeln, und sich mit den Ästen des kleinen Netzes vermischen, ab. Ihre meisten Zweige gehen aber abwärts, um sich zu dem Kopf des Pancreas und zu dem untern und mittlern Stück des Duodenums zu verzweigen, wo immer Verbindungen dieser Arterien mit Zweigen der obern mesenterischen Arterie Statt finden.

Die rechte gastroepiploische Arterie, rechte Magen- oder Netzarterie, (*A. gastro-epiploica dextra*,) ist etwas ansehnlicher als die vorige, und geht zwischen dem obern Stück des Duodenums und dem Kopf des Pancreas vorwärts herab, gelangt zur größern Curvatur des Magens, und geht an derselben von der rechten zur linken Seite, ungefähr bis zur Mitte der größern Curvatur hin, wo sie sich unmittelbar in den Stamm der ihr entkommenden gastroepiploischen Arterie der linken Seite fortsetzt. Zweige, welche während dieses Verlaufes aus der Arterie hervorkommen, verbreiten sich theils abwärts zum großen Netz, theils an der vordern und hintern Wand des Magens aufwärts, um zuletzt Verbindungen mit den Zweigen der Coronararterie des Magens einzugehen, indem sie sich völlig wie die Zweige dieser Arterien zu den Ästen des Magens verästeln. Außer den angeführten beständigen Ästen der Arterie kommen noch, gleich bei ihrem Entstehen, in bestimmter Zahl dünnere Zweige hervor, die sich im Kopf des Pancreas strahlenförmig verästeln, zum Theil aber mit der obern mesenterischen Arterie verbinden, und bis zu dem Theil der Bauchhaut dehnen, hinter welchem die rechte Niere liegt.

Nachdem die Leberarterie die genannten Zweige abgegeben hat, nähert sich ihr Stamm der queren Furche, (*Fossa transversa*,) der Leber, indem sie unter dem Spigelschen Lappen hinget, und nicht in einen Eindruck in demselben hinterläßt. Hier spaltet sie sich in zwei eigentlichen Endzweige: in den rechten und linken Leberast. Der rechte ist der dünnste, und tritt an dem linken Ende der Querfurche, dem linken Zweig der Pfortader bedeckt, in die Substanz der Leber ein, um sich vorzüglich in dem linken und dem Quadratlappen

der Leber zu verästeln. Denn der Spigelsche Lappen erhält nur kleine Zweige von diesem Aste.

Der rechte dickere Leberast ist sogleich wieder in einen vorderen und hintern Zweig getheilt. Der hintere Ast dringt in das Innere des rechten Leberlappens am tiefsten ein, und verästelt sich hier in unendlich viele Zweige; der vordere Zweig verästelt sich nur oberflächlicher als der vorige, in dem rechten Leberlappen, vorzüglich aber in dem Quadrat- und Spigelschen Lappen und aus ihm kommt noch die cystische Arterie, Gallenblasenarterie (*A. cystica*), hervor, die von dem Hals gegen den Grund der Gallenblase läuft und sich bald in zwei Zweige theilt, die sich am Grund der Gallenblase wieder vereinigen, und in den Häuten der Gallenblase so verästeln, daß sich auch die feinsten Zweige netzartig miteinander verbinden. Kleine Aestchen dieser Arterie verzweigen sich auch noch oberflächlich zur Leber und der sogenannten Glissonischen Capsel.

3) Die Milzarterie, Lienalarterie, (*A. splenica*, *s. lienalis*), als der stärkste Zweig der cöliacischen Arterie, nimmt sogleich ihre Richtung gegen die linke Seite zur Milz hin, welcher die Endzweige bestimmt sind. Da aber der Stamm der Arterie weit länger ist, als es die Entfernung der Milz von dem Stamm der Aorta erfordert, so hat er einen mehr oder weniger geschlängelten Lauf, indem er mit der Milzvene an dem obern Rand des Pankreas hinter dem Magen hingehet, für welchen auch die Milzarterie beträchtliche Zweige abgibt; denn außer den kleinern Zweigen, die zur hintern Wand des Magens herablaufen, gehen drei bis fünf ziemlich starke, aber kurze Zweige, (kurze Arterien,) (*Arteriae breves*), zum blinden Sack des Magens hin, und verästeln sich da zu den Häuten desselben; dann senkt sich aber zwischen dem Magen und der Milz die linke gastroepiploische Arterie, (*A. gastro-epiploica sinistra*), als Zweig der Milzarterie herab, und geht von der linken zur rechten Seite, dicht an der großen Curvatur, der gastroepiploischen Arterie der rechten Seite entgegen, mit welcher sie sich verbindet. Sie verhält sich auch in Rücksicht ihrer Verästelung so wie diese Arterie, indem von ihr theils abwärts Zweige zu dem großen Netz, theils aufwärts Zweige zur vordern und hintern Wand des Magens verbreitet werden; überdies versieht sie aber auch noch die Wände der Milz mit kleinen Zweigen.

Außer diesen für den Magen bestimmten Zweigen der Milzarterie gibt ihr Stamm noch zahlreiche Zweige zu dem Pankreas ab, von denen die meisten sich in der Drüse selbst verzweigen, andere aber durch die Drüse hindurchgehen und noch das Mesocolon und dessen Saugaderdrüsen mit Zweigen versehen.

An dem Lienalhilus theilt sich der Stamm der Milzarterie in vier bis zehn ziemlich starke Endzweige, die sich sogleich in die Substanz der Milz einsenken und hier büschelförmig in innere feinere Zweige verästeln, deren Haargefäße endlich mit den feinsten Venenzweigen zusammenmünden. Diese eigentlichen Milzzweige haben eine besondere Weichheit und Dehnbarkeit, so daß sie eine große Menge vom Blut aufnehmen können. Ehe die Milzzweige sich in der Substanz der Milz selbst verästeln, geben sie immer noch vorher kleine Zweige für



die Oberfläche der Milz und für die Bänder derselben, so wie für das große Netz ab. Dst kommen auch die vorhin beschriebenen kurzen Magenarterien nicht unmittelbar aus dem Stamm, sondern zum Theil, oder wohl auch sämmtlich aus einzelnen Milzweigen. Ist eine überzählige Milz vorhanden, so erhält diese gewöhnlich ihr Blut aus einer Arterie, die von einem größeren Milzweig, selten aus dem Stamm der Milzarterie entspringt. (Mosenmüller.)

Cöliacische Ganglien oder Knoten <sup>1</sup>, (Coeliaca ganglia <sup>2</sup>), Oberbauchsknoten <sup>3</sup>, die einzelnen in dem cöliacischen Nervengeflecht unterschiedenen Ganglien, deren etwa 11 — 12 auf jeder Seite unterschieden werden, wo dieß Wort nicht, wie häufig, mit jenem für synonym genommen wird. S. Cöliacischer Nervenplexus.

1) 2) Sömmerring's Hirn- und Nervenl. S. 336. 3) Mayer's Besch. d. menschl. K. 8. B. S. 199.

Cöliacischer Nervenplexus, Cöliacisches Geflecht <sup>1</sup> oder Nervengeflecht <sup>2</sup>, (Coeliacus plexus <sup>3</sup>), Oberbauchgeflecht <sup>4</sup>, Oberbauchgeflecht <sup>5</sup>, Bauchgeflecht <sup>6</sup>, Bauchflechte <sup>7</sup>, Bauchadergeflecht, Bauchaderflechte, Bauchschlagadergeflechte <sup>8</sup>, Bauchnervengeflechte <sup>9</sup>, Halbmondförmiges Geflecht <sup>10</sup>, Halbmondförmige Flechte <sup>11</sup>, Halbmondförmiger Nervenknötchen <sup>12</sup>, Halbmondförmiger <sup>13</sup>, oder Großer halbmondförmiger <sup>14</sup>, oder Quergelegener <sup>15</sup> Knötchen, Unterleibsknötchen <sup>16</sup>, Knötchen der Eingeweidenerven <sup>17</sup>, Großer Oberbauchsknötchen <sup>18</sup>, Magenarteriegeflechte <sup>19</sup>, Mittelgeflechte, Mittelbauchnervengeflechte <sup>20</sup>, Sonnengeflecht <sup>21</sup>, Sonnenflechte <sup>22</sup>, Sonnenförmige Flechte <sup>23</sup>, Gehirn des Unterleibs <sup>24</sup>, (Plexus mesenterii proprius et maximus <sup>25</sup>, s. ganglioformis semilunaris <sup>26</sup>, s. semilunaris <sup>27</sup>, s. solaris <sup>28</sup>, Ganglion coeliacum, s. coeliacum magnum <sup>29</sup>, abdominale <sup>30</sup>, s. semilunare <sup>31</sup>, s. semilunare magnum <sup>32</sup>, Meussenii <sup>33</sup>, s. transversale <sup>34</sup>, s. magnum, s. maximum <sup>35</sup>,

1) Sömmerring's Hirn- und Nervenl. S. 337 u. 335. 2) 3) nach Haller (elem. physiol. T. IV. l. 10. s. 6. §. 46.) 4) Mayer's Besch. d. menschl. K. 8. B. S. 196. 5) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 3166. 6) Sömmerring's Hirn- und Nervenl. S. 335. 7) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1753, 3. B. S. 338. 8) Steudtner's Zerlegungsgef. Uebers. Leipz. 1782, 2. B. S. 156, Note. 9) Leber's Vorles. über d. Zerlegungsgef. S. 359. 10) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. S. 197. 11) Winslow's anat. Abh. u. f. w. a. a. D. S. 337. 12) Leber's Vorles. u. f. w. a. a. D. S. 338. 13) — 18) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. S. 193 u. 199. 19) Valsalva's chir. Anat. übers. v. Huth, 1. Th. S. 404. 20) Leber's Vorles. u. f. w. a. a. D. 21) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. S. 197. 22) Valsalva's chir. Anat. u. f. w. a. a. D. S. 405. 23) Winslow's Abh. u. f. w. a. a. D. S. 341. 24) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. S. 198. 25) nach Willis (cerebri anat. etc. c. 27 in oper. Anat. 1682, p. 96.) 26) nach Wlenk's (uevragr. univ. ed. Frof. 1690, p. 387 et tab. 23, n. 57.) 27) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. S. 196. 28) nach Willis so benannt, weil dieser ihn (a. a. D.) so beschr. ist, daß er wie die Sonne unter andern Planeten hier seine Stelle habe. Vgl. Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. S. 197. 29) — 32) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. S. 198 u. 199. 33) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. 34) wegen der Querlage auf der Aorta. Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. S. 198. 35) Burdach's Encycl. d. Heilk. 2. B. S. 840.

s. splanchnicum <sup>36</sup>, s. solare <sup>37</sup>, Cerebrum abdominale <sup>38</sup>, Centrum nervosum <sup>39</sup>.) das wichtige, aus Nerven und Nervenknoten in der Gegend der cöliacischen Arterie und um sie herum, auf beiden Seiten gebildete und innigst unter sich verbundene Gewebe, in welches sich nicht nur die splanchnischen Nerven einsenken, sondern an dem auch bedeutende Aeste des vagen Nerven, und mehrere Fortsetzungen des Intercoastalnerven Theil nehmen, von welchem aus theils unmittelbar, theils mittelbar, durch innige Verbindung mit dem obern und untern mesenterischen Nervenplexus, alle Abdominaleingeweide Nerven bekommen, und das für das Nervenleben im Unterleib, vorzüglich für seine reproductive Seite, eine Centralbildung constituiert, und in Hinsicht des Gehirns, wie besonders die Erscheinungen des animalischen Magnetismus zu erweisen scheinen, einen merkwürdigen Gegensatz bildet. S. Intercoastalnerv.

36) S. ebendas. 37) 38) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. 39) Burdach's Encycl. u. f. w. a. a. D.

*Coeliacum ganglion, Coeliacus plexus*, f. Cöliacischer Nervenplexus.

*Cöliacische Arterie*, f. Cöliacische Arterie.

*Coelum*, f. Himmel. — *oris*, f. Knöcherner Gaumen.

*Coenaesthesia* <sup>1</sup>, f. Gemeingefühl.

<sup>1</sup>) aus den Griechischen Worten κοινος, gemein, und αἰσθησις, Empfindung, gebildet.

*Corper*, f. Körper.

*Coerulea tunica, Coerulei oculi, Coeruleum Berolinense*, f. *Caerulea tunica, Caer. oculi, Caer. Berol.*

*Cogitamen, Cogitamentum*, f. Denken.

*Cogitatio*, f. Denken, ingleichen Gedanke.

*Cogitationis os*, f. Stirnknochen.

*Cogitatorium*, f. Denkorgan.

*Cogitatum*, f. Gedanke.

*Cogitatus*, f. Denken.

*Cognatio*, f. Verwandtschaft.

*Cognitio, Cognoscentia*, f. Erkenntniß.

*Cohabitatio*, f. Begattung.

*Cohärenz*, (*Cohaerentia*, f. Cohäsion.

*Cohäsion* <sup>1</sup>, (*Cohaesio* <sup>2</sup>.) Zusammenhang <sup>3</sup>, Zusammenhängen <sup>4</sup>, Cohärenz, (*Cohaerentia* <sup>5</sup>.) Man bemerkt bei sehr vielen Dingen ein Streben nach gegenseitiger Vereinigung und setzt dasselbe in die anziehende Kraft, (Attraction,) die als Grundkraft der Körperwelt gilt. Cohäsion unterscheidet man nur in so fern von derselben, als diese in kleinen Abständen oder in unmittelbarer Berührung wirkt. Diese Kraft vereinigt zwei sich nahe gebrachte Quecksilber- oder Wassertropfen; sie erhält die Form und Gestalt der Körper, bis eine überwiegende äußere Gewalt solche aufhebt; wir schreiben ihr die Tropfenbildung der Flüssigkeiten, die Beständigkeit aller tellurischen Anordnungen zu.

Die Erscheinung der Haarröhrchen kann ebenfalls hierher bezogen werden. Dieses Saugen enger Röhren finden wir, obgleich durch vi-

<sup>1</sup>) Succow's Anfangsgr. d. Phys. u. Chemie, 1. Th. S. 29.

<sup>2</sup>) Ham-

bergeri physiol. §. 830.

<sup>3</sup>) <sup>4</sup>) Succow's Entw. einer Naturs. 3. Cap.

<sup>5</sup>) Winkleri inst. philos. univ. ed. 3. T. I, §. 421.



se Kräfte modificirt, in den Spiralgefäßen der Pflanzen, in dem capillarsysteme der Thiere wieder. (Zicinus.)

**Cohäsionskraft**<sup>1</sup>, (*Cohaesio*nis, s. *Cohaesiva*vis,) als bei der Cohäsion thätige Princip, welches sich von der Attractionskraft nur in so fern unterscheidet, daß es erst bei wirklicher Berührung in Wirksamkeit tritt. S. Cohäsion, ingl. Attraction.

<sup>2</sup>) Succow's Anfangsgr. d. Phys. u. Chemie, 1. Th. S. 23.  
**Cohos**, ein Paracelsischer Ausdruck<sup>1</sup> für Chaos, in der Bedeutung des von der Haut des Körpers umschlossenen Raums, mit allen darin befaßten Theilen. Vgl. Chaos.

<sup>2</sup>) S. Paracelsi Schrift von offenen Schäden und Geschwüren, Cap. 9.  
**Coilosomos**, in Uebersetzung des gleichlautenden Griechischen Wortes<sup>1</sup>, s. Nasenredner.

<sup>2</sup>) κοίλοσοςμος.  
**Coiteri**<sup>1</sup> *corrugator*, s. Corrugirender Muskel der Augenbraunen.

<sup>2</sup>) nach Kohter (Prof. in Gröningen, nachmals zu München,) so benannt. S. dess. ext. et int. c. h. part. tabul. Norimb. 1575, fol.  
**Coitio**, **Coitus**, s. Begattung.

**Coitus nervorum opticorum**, s. Decussation der Sehnerven.  
**Cola**, nach dem Griechischen gleichlautenden Worte<sup>1</sup>, i. q. Arterien, s. Glieder, auch in der Bedeutung von Colatorien.

<sup>2</sup>) κολαα.  
**Colatorien**, (*Colatoria*<sup>1</sup> *organa*, Cola,) werden im allgemeinen diejenigen absondernden Organe des Körpers genannt, welchen man nach crasser Ansicht der Humoralpathologie eine Reinigung des Bluts durch Abscheidung solcher flüssigen Stoffe daraus beizuschreiben, deren Zurückhaltung man für schädlich erachtete, so die Leber, die Galle, die Nieren für den Urin, die Haut für die Ausdünstungsmaterie. Vgl. Excretionsorgane.

<sup>2</sup>) als Adjectiv vom Verbum colare, durchsieben, gebildet.  
**Colatoria pelvis**, s. Infundibulum des Gehirns.  
**Colatorium**<sup>1</sup>, **Colatorii os**, s. Ethmoidalknochen, auch Sphenoidalknochen.

<sup>2</sup>) als Substantiv in der Bedeutung von Durchsiebungswerkzeug erst von den Arabern gebildet, in obiger Bedeutung, in der leeren Voraussetzung, daß durch die Pöcher jener Knochen Feuchtigkeiten aus dem Gehirn abfließen.

**Coleata**<sup>1</sup> *cuspis*, i. q. Penis.  
<sup>2</sup>) Coleatus, mit Hoden versehen. „Coleatus equus.“ Turnebii advers. 1. 6. c. 9.  
**Colci**, s. Testikeln.

**Coles**, i. q. Penis. Vgl. auch Urethra. — *feminarum*, i. q. Vagitoris.

**Colica arteria**, *dextra*, *media et sinistra*, s. Colonarterien.  
*vena*, s. unter Colonvenen. — *impressio hepatis*, s. unter ComPRESSIONEN der Leber.

**Colicae arteriae**, s. Colonarterien. — *venae*, s. Colonvenen.

**Colicogastricum omentum**, s. Gastrocolicisches Netz.

**Colicum omentum**, Colonne.

**Colis**, i. q. Penis.

**Coliten**, (*Colitae*<sup>1</sup>, Phalloides<sup>2</sup>.) Bildsteine oder Nasenspiele aus dem Geschlechte der Stalactiten, welche einem männlichen

<sup>2</sup>) a) Wallerii syst. mineral. T. II. gen. 73, sp. 629. h

den Gliede mit oder ohne Testikeln zufällig ähneln. S. Anthropoglyphen.

*Colla*, f. Leim, auch Kleber.

*Collare<sup>1</sup> dentis*, f. Hals der Zähne. — *Helvetii*, f. Sphincter der Cardia.

<sup>1)</sup> eigentlich ein Stragen oder Halsband.

**Collateralarterien<sup>1</sup> des Arms**, (*Collaterales arteriae<sup>2</sup> brachii*.) Deren unterscheidet man, a) die große, (*magna*), als Synonym der tiefen Brachialarterie; b) am Vorderarm die Collateralarterien oder Verbindungsarterien<sup>3</sup>, oder Nebenseitige Pulsadern<sup>4</sup>, oder Nebenarterien<sup>5</sup>, oder Nebenschlagadern<sup>6</sup>, oder Seitenarterien, oder Seitenschlagadern<sup>7</sup> u) des Radius, oder äußere<sup>8</sup> Speichencollateralarterien<sup>9</sup>, (*Arteriae collaterales radiales<sup>10</sup>*, s. *radiales communicantes*), ein Paar, (*primariae et secundariae<sup>11</sup>*.) Zweige der Brachialarterie, welche am äußern Winkel des Oberarmknochens herabsteigen und zu mehreren Muskeln des Vorderarms gehen, häufig aber auch nur einfach vorkommen, und β) der Ulna, oder innere, Elbogencollateralarterien<sup>12</sup>, (*A. collaterales ulnares<sup>13</sup>*, s. *ulnares*, s. *cubitales communicantes*, *primariae et secundariae<sup>14</sup>*.) auch gewöhnlich aus der Brachialarterie, zuweilen auch nur einfach ihren Ursprung nehmend, und in ihrem Verlauf am Olecranon herab Muskeln des Vorderarms dieser Seite mit Blut versorgend. S. Axillararterie.

- 1) Pöder's anat. Tafeln, Taf. 91, Nr. 319, 321, 326, 329. 2) Winslow exp. anat. lat. vers. T. III. tr. de art. §. 140. 3) Edmunder's Gefäßl. S. 213. 4) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1753, 3. B. S. 63. 5) Palsyn's chir. Anat. übers. v. Huth, 1. Th. S. 340. 6) Meientaud's Zergliederungsk. Uebers. Leipz. 1782, 1. Th. S. 695, Note. 7) Leber's Vorles. d. Zergliederungsk. nach S. 296. 8) Palsyn's chir. Anat. u. f. w. a. a. D. 9) Pöder's anat. Tafeln, Taf. 91, Nr. 319 u. 326. 10) 11) Mayer's Besch. d. Blutgef. S. 99. 12) Pöder's anat. Tafeln a. a. D. Nr. 321, 329. 13) 14) Mayer's Besch. d. Blutgef. a. a. D.

**Collateraleminenz des Gehirns**, (*Collateralis eminentia cerebri<sup>1</sup>*.) Seitenerhabenheit<sup>2</sup>, oder Längliche Seitenerhabenheit<sup>3</sup>, oder Nebenerhabenheit<sup>4</sup> des großen Gehirns, (*Eminentia collateralis Meckelii<sup>5</sup>*.) der neben der als großer Hippocampusfuß bekannten Formation des Gehirns nach außen liegende schmale, vorwärts in dem äußern Theile des herabsteigenden Schenkels der Seitenhöhle ebenfalls mit herabsteigende Wulst. S. Gehirn.

- 1) nach Meckel, der sie zuerst beachtete. Vgl. Mayer's Besch. d. menschl. K. 6. B. S. 138. 2) 3) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. 4) Meckel's Deutsch. Arch. f. d. Physiol. 1. B. 3. P. S. 595. 5) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. §. 2866.

*Collaterales arteriae*, f. Collateralarterien des Arms. — *dentis*, f. Eckzähne. — *venae*, f. Collateralvenen des Arms.

*Collateralis eminentia cerebri*, f. Collateraleminenz des Gehirns. — *musculus penis*, i. q. Erector penis. — *transversalis colli*, f. Absteigender Cervicalmuskel.



**Collateralvenen<sup>1</sup> des Arms**, (*Collaterales venae brachii<sup>2</sup>*), in ihrem Verlauf den Collateralarterien entsprechenden, eben so als Speichencollateralvenen<sup>3</sup> und Elbogencollateralvenen<sup>4</sup>, (*Venae collaterales radiales<sup>5</sup> et ulnares<sup>6</sup>*), unterschiedenen in die Axillarvene sich ergießenden Venen. S. Axillarvene.  
 1) Pöder's anat. Tafeln, Taf. 130. Fig. 1. Nr. 112, 113. Fig. 2. Nr. 95 u. 96. 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2678. 3) — 4) Pöder's anat. Tafeln a. a. D.

(*Collegia anatomica*, s. unter Anatomische Lehrbücher.

(*Collegium anatomicum*, s. Anatomischer Unterricht.

(*Colliciae<sup>1</sup> punctorum lacrymalium*, s. Lacrymalcanäle.

1) eigentlich Wassergräben oder Rinnen.

(*Colliculi<sup>1</sup> cerebri*, s. unter Bierhügel. — *glandis*, s. Hügel Eichel. — *hepatis*, s. Lappen der Leber. — *nervorum optorum*, s. Sehnervenhügel. — *vaginae*, s. Nymphen. — *vesicae*, s. Eminente Linien der Harnblase.

1) eigentlich Hügelchen, als Diminutiv von Collis.

(*Colliculus ossis sacri*, i. q. Promontorium ossis sacri. — *terminalis*, s. Hahnenkopf der männlichen Harnröhre.

(*Colligamenta*, *Colligamina*, *Colligati nervi*, s. Ligamente.

(*Colligatio*, s. Syndesmose.

(*Colliquamenta*, s. Excremente.

(*Colliquamentum*, s. Rudiment des Fötus.

(*Collulum*, s. Hälschen.

(*Collum*, s. Hals. — *breve uteri*, s. Uterushals. — *costarum*, s. Hals der Rippen. — *coxendicis*, s. Darmstück des Hüftknochens. — *dentium*, s. Hals der Zähne. — *glandis*, s. Hals Eichel. — *mallei*, s. Hals des Malleus. — *ossis*, s. Hals des Knochens. — — *brachii*, s. Hals des Oberarmknochens. — *capitati carpi*, s. Hals des Kopfknochens des Carpus. — *femoris*, s. Hals des Schenkelknochens. — *processus condyloidei maxillae inferioris*, s. Hals des condyloideischen Processes des Unterkiefers. — — *odontoidei*, s. Hals des odontoideischen Processes. — *radii*, s. Hals des Radius. — *scapulae*, s. Hals des Schulterblatts. — *tali*, s. Hals des Talus. — *ulnae*, s. Hals der Ulna. — *uteri*, s. Uterushals, ingleichen Vagina. — *majus*, s. Vagina. — *vesicae*, s. Blasen Hals.

(*Collus*, s. Hals.

**Colon**, (*Colou<sup>1</sup>*) Grimmdarm<sup>2</sup>, (*Colum<sup>3</sup>*, *Intestinum con<sup>4</sup>*, s. majus, s. cellulatum<sup>5</sup>, s. crassum et plenum<sup>6</sup>, s. grande<sup>7</sup>, s. laxum<sup>8</sup>, *Venter inferior<sup>9</sup>*, *Alvus<sup>10</sup>*), der mittlere Theil des Dickdarms, dessen rechtes Stück mit unbestimmter 1) entsprechend dem Griechischen Worte κωλον (Galenide administr. anat. 1. 6. c. 9.) Vesalii de c. h. fabr. 1. 5. c. 5. Ueber die zweideutige Etymologie dieses Wortes vergl. Riolani anthropogr. 1. 2. c. 12. 2) Mayer's Beschv. d. menschl. M. 4. B. S. 415. 3) Caelii Aurel. tard. pass. 1. 2. c. 1. 4) Verheyen c. hum. an. tr. 2. c. 11. 5) nach den Arabern. S. C. Bauhini theatr. an. ed. 1621, p. 62, nota. 6) s. ebendas. 7) 8) Stephani dict. med. ed. 1564, p. 542. 9) nach Ruffus (ἡ κατὰ κοιλία.) S. ebendas. 10) Cellii noct. Att. 1. 12. c. 5.

Grenze als Aufsteigendes Colon vom Blinddarm ausgeht, als Quercolon seinen Fortgang unter dem Magen nimmt, und als Niedersteigendes Colon, ebenfalls mit unbestimmter Grenze in den Mastdarm übergeht. Vgl. Dickdarm. S. auch Darmcanal.

*Colon ascendens*, s. Aufsteigendes Colon. — *descendens*, s. Niedersteigendes Colon. — *dextrum*, i. q. C. ascendens. — *sinistrum*, i. q. C. descendens. — *transversum*, s. Quercolon.

**Colonarterien**, (*Colicae arteriae*<sup>1)</sup>) Grimmdarmarterien<sup>2</sup> oder Schlag<sup>3</sup>, oder pulsadern<sup>4</sup>, Dickdarmarterien<sup>5</sup>, Zweige der obern und untern mesenterischen Arterie, die sich in dem Colon verbreiten. Gemeinlich unterscheidet man a) eine rechte<sup>6</sup>, (*A. colica dextra*<sup>7</sup>, s. *superior*<sup>8</sup>), b) eine mittlere<sup>9</sup>, (*media*<sup>10</sup>), aus der obern, und c) eine linke<sup>11</sup>, (*sinistra*<sup>12</sup>), aus der untern mesenterischen Arterie, welche mit einem Aste der rechten, oder auch der mittlern einen großen Bogen bildet. Auch wird noch eine zuweilen aus der obern mesenterischen Arterie zu dem linken Theil des Colons gelangende Arterie als eine linke obere, (*sinistra superior*<sup>13</sup>), unterschieden. S. Mesenterische Arterien.

- 1) Mayer's Besch. d. Blutgef. S. 135. 2) Valgyn's chir. Anat. übers. v. Huth, 1. Th. S. 546. 3) Pientaud's Zergliederungsf. Uebers. Leipz. 1782, 1. Th. S. 710. 4) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1733, 5. Th. S. 86. 5) 6) Sömmerring's Gefäßl. S. 266. 7) 8) Schaarschmidt's anglol. Tabellen, Taf. 4. 9) — 12) Sömmerring's Gefäßl. a. a. D. 13) Mayer's Besch. d. Blutgef. a. a. D.

**Colonnetz**, (*Colicum omentum*<sup>1)</sup>) Netz des Grimmdarms<sup>2</sup>, oder dicken Darms<sup>3</sup>, Grimmdarmnetz<sup>4</sup>, (*Omentum Halleri*<sup>5</sup>), der kleinere rechte Theil des großen Netzes, der bloß dem Colon anhängt. S. Netz.

- 1) nach Haller's Unterscheidung und Benennung. S. dess. el. physiol. T. VI. 1. 20. s. 1. § 16. 2) Pientaud's Zergliederungsf. Uebers. Leipz. 1782, 2. B. S. 491, Note. 3) Sömmerring's Eingeweidef. S. 142. 4) Haller's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v. Leveking, 2. Th. S. 716. 5) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 2154.

**Colonvenen**, (*Colicae venae*<sup>1)</sup>) Grimmdarmvenen<sup>2</sup>, Grimmdarmadern<sup>3</sup>, Grimmdarmsblutadern<sup>4</sup>, Dickdarmvenen, die den Colonarterien ihrem Lauf und ihrer Vertheilung nach entsprechenden Venen, deren vorzüglichste auch nur als Eine unterschieden worden, (*Vena colica*<sup>5</sup>), welche in die mesenterischen Venen sich ergießen. S. Pfortader.

- 1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2704 u. 2705. 2) Pönder's anat. Tafeln, Taf. 123, Fig. 1, Nr. 25 u. f. w. 3) Pientaud's Zergliederungsf. Uebers. Leipz. 1782, 1. Th. S. 788 u. 781, Note. 4) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1735, 3. B. S. 243, 244. 5) Riolaui anthropogr. 1. 2. c. 17.

*Color aurantius*, s. unter Gelbe Farbe. — *caeruleus*, s. Blaue Farbe. — *flavus*, s. Gelbe Farbe. — *Indicus*, dunkelblaue Farbe, s. unter blaue Farbe. — *luteus*, s. Gelbe Farbe. — *purpureus*, i. q. C. Indicus. — *ruber*, s. Rother Farbe. — *violaceus*, s. Violette Farbe. — *viridis*, s. Grüne Farbe.

*Colores*, s. Farben. — *oculi*, s. Farben der Iris,



**Colostrum**, (*Colostrum*<sup>1</sup>, *Colostrum lacteum*<sup>2</sup>, *colostra*<sup>3</sup>, *Colustrum*, *Colustra*,) die erste wässerige Milch: Kindbettetinnen den ersten oder noch den zweiten Tag nach der Entbindung, deren Genuß bei den Säuglingen den Abgang des Meconiums befördert. S. Milch.

1) Plinii hist. n. l. 11. c. 41: „Ex primo lacte semper a partu colostrum fiunt.“ J. J. Goeckel diss. de colostro, Ald. 1758, 4. 2) Muraldi Vademecum anat. exerc. 1. p. 23. 3) Columellae de re rust. l. 7. c. 3, auch als Flecksung von Plautus (Poem. act. 1. sc. 2. v. 154: „Meum mel, meum cor, mea colostrum“) gebraucht.

**(Colpos**, nach dem Griechischen gleichlautenden Worte<sup>1</sup>, i. q. nus.

1) κολπος.

**(Colum**, s. Colon, ingleichen Ethmoidalknochen.

**Columbische ungenannte Augenhaut**, (*Columbi tunica innominata*<sup>1</sup>, *Tunica innominata oculi*<sup>2</sup>,) der aponeurotische Ueberzug der Augenmuskeln über die Sclerotica, welchen Columbus<sup>3</sup> als eine eigne Augenhaut ansieht, aber die nachfolgenden Anatomen nicht dafür erkennen. Vgl. Augenmuskeln.

1) Jul. Placentini nov. anat. l. 3. c. 22. 2) Spigelii de hum. c. fabr. l. 10. c. 9. 3) de re anat. l. 10.

**Columella**<sup>1</sup>, s. Clitoris, ingleichen Uvula. — *modioli cochleae*, s. *Columella* des *Modiolus* der *Cochlea*.

1) Diminutiv von *Columna*, Säule.

**Columella des Modiolus der Cochlea**, (*Columella modioli cochleae*<sup>1</sup>,) Stifft des *Modiolus* der *Cochlea*<sup>2</sup>, das Ende der Mitte des Infundibulums und aus der Spitze des *Modiolus* oben hervorstehende kleine stiftartige Knochenstückchen, um welches das Ende der Spirallamina der *Cochlea* windet. S. Dhr.

1) 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. 5. 1629.

**Columellares dentes**, s. Eckzähne.

**Columna**, i. q. Uvula. — *dorsalis*, s. *dorsi*, s. Rückgrath. — *media glandulae thyreoideae*, s. unter Isthmus der thyreoidischen Drüse. — *nasi*, s. Spitze der Nase. — *rugarum carnicum-papillosarum cervicis uteri anterior et posterior*, s. Stämmchen der baumartigen Streifen des Uterushalses. — *septarium*, s. Häutiger Anhang der Nasenscheidewand. — *spinalis, vertebralis*; s. Rückgrath.

**Columnae carnae**, s. *carnosae cordis*, s. Fleischbündel der Herzventrikel. — *corticales pyramidum renalium*, s. Scheidewände der Ferreinischen Pyramiden. — *expansionis tendineae musculi obliquae descendens*, s. Schenkel des Abdominalrings. — *musculi obliquae descendens*, s. Schenkel des Fornix des Gehirns. — *liberae cordis*, s. *murales cordis*, s. unter Fleischbündel des Herzens. — *renalium*, s. Scheidewände der Ferreinischen Pyramiden. — *rugarum carnicum-papillosarum cervicis uteri*, s. Stämmchen der baumartigen Streifen des Uterushalses. — *sanguinis*, s. Blutsäulen. — *transversales cordis*, s. unter Fleischbündel des Herzens. — *valvulae cerebri*, s. Säulen der Gehirnklappe.

**Columnaris caro**, i. q. Clitoris.

**Colustra**, **Colustrum**, s. *Colostrum*.

*Coma, Comae*, das Haupthaar, sowohl das natürliche<sup>1</sup>; als das mit einiger Zierde gelegte<sup>2</sup>. Vorzüglich war bei den Römern das noch unbeschnittene Haar der Knaben vor dem 7ten Jahre so bezeichnet, und dann bei Frauenzimmern im Gegensatz von *caesaries* S. Haupthaare.

- 1) wenn es an sich ein gefälliges Aussehen hat (*Ovidii amor. l. 1. eleg. 14. v. 55: „naturali conspiciere coma.“*) 2) letzteres nach Festus. Vgl. auch Verheyen *synth. anat. c. comment. Blasii c. 20. not. ad ungues* daher auch in medizinischen Schriften dieß Wort nicht sehr gebraucht wird.

**Combination**, (*Combinatio*<sup>1</sup>.) eine Benennung aus der höhern Mathematik hergenommen<sup>2</sup>. Combination ist eine von den drei Functionen des Verstandes, vermöge welcher er die Wahrheit oder Richtigkeit eines Urtheils aus einem andern erkennt, d. h. zwei Urtheile dergestalt verknüpft, combinirt, daß er das eine als allgemeine Regel aufstellt, und das andere als besondern Fall unter jenen begriffen, und mithin die Wahrheit des erstern, als auf das zweit anwendbar, erkennt und urtheilt. Ein solches Urtheil heißt ein Schluß eine Combination. Es gehören mithin zu einem Schlusse drei Stücke 1) eine allgemeine Regel als Grund, ein Obersatz, (*Propositio major*;) 2) ein besonderer, unter die Regel zu subsumirender Fall oder ein Urtheil als Untersatz, (*minor*.) und 3) die Folgerung aus der Regel, der Schluß, (*Conclusio*.) Jenes beides heißen auch die Prämissen, und das Prädicat des Untersatzes heißt der *Terminus medius*.

**B. B. Prop. major:** Alle Körper sind schwer.

— **minor:** Die Luft ist ein Körper, (*Term. medius*.)

**Conclusio:** Also ist die Luft schwer.

Die Verfahrensart des Verstandes bei der Combination ist folgende: Wenn der Grund der Verknüpfung eines Prädicats mit einer Subjecte, (die Wahrheit eines Urtheils,) nicht aus dem Subject selbst einleuchtet, so sucht er einen höhern Begriff, oder Urtheil auf, welches mit dem zu beweisenden in dem Verhältnisse der Regel zu einem besondern Falle steht, oder von dem das Prädicat des Urtheils ein Merkmal, und welcher (Begriff) zugleich selbst ein Merkmal des Subjectes ist, und subsumirt nun das zu beweisende Urtheil unter das höhere, oder urtheilt, daß das zu beweisende Urtheil sich zu dem höhern als ein besonderer Fall zur Regel verhalte, und erkennt somit die Wahrheit des Urtheils. **B. B.** um das Urtheil: der Raum ist eine Anschauung, zu beweisen, kann er es mit dem allgemeinen Urtheil verbinden: Alles, was durch den Sinn wahrgenommen wird, ist eine Anschauung, und nach dieser Regel ferner schließen: Nun wird der Raum durch den Sinn wahrgenommen; also ist er eine Anschauung.

Das Vermögen des Verstandes, auf diese Weise thätig zu seyn

- 1) in eigentlicher Bedeutung Zusammenstellung zweier Dinge, *Conjunctio binarium*. 2) Leibnitz nannte Combinationskunst eine höhere Analysis, welche die Wahrheit durch eine Art von Calcul finden lehre. Die für seine Combinationskunst noch zu erfindenden Elementarzeichen waren ihm ein Alphabet aller menschlichen Begriffe. In neuerer Zeit hat besonders Hindenburg die Combinationslehre, oder combinatorische Analysis, sehr vervollkommenet, indem er auf sie einen neuen Theil der Analysis gründete. (S. dess. Fragmente über combinatorische Analysis und Derivationscalculus, Leipzig 1803, 8.) (M. d. 2.)



das Combinationsvermögen, oder das Vermögen zu schließen, Schluffkraft, genannt. Ob es nun gleich kein abgesondertes, für sich bestehendes Vermögen ist, so kann es doch mit eben dem Rechte ein Vermögen genannt, und von den andern unterschieden werden, als B. das Erinnerungs- oder das Bezeichnungsvermögen u. s. w.

Ein hoher Grad der Vollkommenheit dieses Vermögens beruht auf einer lebhaften, thätigen Einbildungskraft, verbunden mit einem gro- ßen Verstande, und ist eine ausgezeichnete Vollkommenheit eines end- lichen Geistes, würde aber eine Unvollkommenheit eines unendlichen Geistes seyn. — Wenn es eine leicht zu erregende Gewandtheit hat, selbst aus unbedeutenden Prämissen mit Sicherheit und Schnel- keit treffende Schlüsse macht, heißt es *Sagacität*. (Dzondi.)

*Combinaciones nervorum*, s. Nervenpaare.

*Combinationsvermögen*, (*Combinacionis facultas*, *facultas*,) Schluffkraft, Vermögen zu schließen. S. unter *Com- binacion*.

*Comitas*, s. Freundlichkeit.

*Commanducatio*, s. Rauen.

*Commentarii anatomici*, s. Anatomische Lehrbücher.

*Commercium*, vgl. *Confluxio*.

*Commissur*, (*Commissura*,) Verbindung, besonders in den Fällen gebräuchlich. Vgl. auch *Junctur*.

*Commissur der Sehnervenhügel*, (*Commissura thalamo- optica inferior*<sup>1</sup>, s. *mollis*<sup>2</sup>,) Weiches Verbindungsband der Sehhügel<sup>3</sup>, Eingelegeter markiger Streif der Sehhügel<sup>4</sup>, Querstück der Sehhügel, (*Processus transversus*<sup>5</sup>, s. *Funiculus albus*<sup>6</sup>, s. *Funiculus medullaris transversus*<sup>7</sup>, *Trabs transversa cinerea thalamorum opti- corum*,) eine, jedoch nicht immer gleich deutliche, von Corticalsub- stanz bewirkte Querverbindung beider Sehnervenhügel. S. Gehirn.

<sup>1</sup> Glinz progr. de cerebr. II. p. 12. <sup>2</sup> 3) Loderi tab. anat. und Deutscher Text, Taf. 156, Fig. 4. Nr. 13. <sup>4</sup> 4) Sommerling's Plin. und Nervenl. S. 48. <sup>5</sup> 5) Willisii cerebr. anat. c. 10. <sup>6</sup> 6) Pana- zol. Pentecost. V. obs. 38. <sup>7</sup> 7) Halleri el. physiol. T. IV. l. 10. c. 1. S. 24.

*Commissura cardinata brachii*, s. Cubitalproceß des Ober- armknochens. — *cerebri anterior et posterior*, s. Commissuren des großen Gehirns. — — *maxima*, s. Callöser Körper des Ge- hirns. — *cranii*, i. q. *Sutura*. — *labiorum*, s. Lippen-schluf.

*mentis*, s. Symphyse des Unterkiefers. — *nervea*, s. Syndes- mose. — *ossium*, s. Knochenverbindung. — — *carnea*, s. Syn- desmose. — — *pubis*, s. Synchondrose der Schooßknochen. — *thalamorum optica inferior*, s. *mollis*, s. Commissur der Sehnervenhügel. — *trochoides*, i. q. *Rotatio*.

*Commissurae cerebri*, s. Commissuren des großen Gehirns. — *cranii*, s. Suturen der Hirnschale.

*Commissuren*<sup>1</sup> des großen Gehirns, (*Commissurae cere- bri*,) Querbalken<sup>2</sup>, oder Querbändchen<sup>3</sup>, oder Quersaden, (Hall's u. Wutenreth's Arch für d. Physiol. 9. B. S. 157. <sup>2</sup> 2) Hal- leri elem. physiol. T. IV. l. 10. s. 1. S. 28 et 33. <sup>3</sup> 3) Meusaud's Zergliederungsk. Uebers. Leipz. 1782, 2. B. S. 39. <sup>4</sup> 4) Sommerling's Plin. und Nervenl. S. 49.

*Anatom. physiol. Realw* II. B.

oder Markige Quersfaden<sup>5</sup>, oder Verbindungen<sup>6</sup>, oder Verbindungsbündel<sup>7</sup>, oder Kleine Querbalken<sup>8</sup> des großen Gehirns, Bänder, oder Zusammenfügungen<sup>9</sup> des Gehirns. Deren werden zwei, a) eine vordere<sup>10</sup> größere, (C. anterior<sup>11</sup>) und b) eine hintere<sup>12</sup> kleinere, (C. posterior<sup>13</sup>) unterschieden. Es sind band- oder fadenartige Verlängerungen des Hirnmarks, die zwischen dem vordern Theile der Sehnervenhügel unter den vordern Schenkeln des Fornix, und zwischen dem hintern Theile derselben vor den Vierhügeln von einer Gehirnhälfte zur andern gehen. S. Gehirn.

5) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2875.

6) —

Mayer's Besch. d. menschl. K. 6. B. S. 150.

9) Winslow's and

Abb. Uebers. Berl. 1733, 4. B. S. 116.

10) — 13) Sommering

Glin- und Nervenl. a. a. D.

*Commotio*, f. Bewegung.

*Communia integumenta*, f. Integumente des Körpers.

*Communicans arteria carotidis cerebialis*, f. Communicirende Arterie der innern Carotis. — — *cubitalis et radialis*, f. unter Collateralarterien des Arms. — *nervus faciei*, f. Facialnerv.

*Communicantes arteriae cerebri*, f. Communicirende Arterien des Gehirns. — — *cubitales et radiales*, f. unter Collateralarterien des Arms.

*Communicirende Arterie*<sup>1</sup> der innern Carotis, (*Communicans arteria*<sup>2</sup> *Carotidis cerebialis*), Verbindungsarterie des Gehirns, einer der Hauptzweige, in welche sich die innere Carotis, nach Abgabe der ophthalmischen Arterie, vertheilt, so benannt wegen der dadurch bewirkten Anastomose mit der tiefen Gehirnarterie aus der Basilararterie, wodurch der sogenannte Willische Cirkel auf der Basis des Gehirns gebildet wird. In Bezug auf sie wird auch ein zuweilen vorhandener Verbindungszweig des zur Sylvischen Grube gehenden Hauptastes der innern Carotis und der tiefen Gehirnarterie als *Arteria communicans secundaria*<sup>4</sup> unterschieden. S. Gehirnarterien.

1) Sommering's Gefäßl. S. 120.

2) Halleri el. physiol. T. IV.

1. 10. s. 5. S. 10.

5) Sommering's Gefäßl. a. a. D.

4) Mayer's

er's Besch. d. Blutgef. S. 74.

*Communicirende Arterien des Gehirns*, (*Communicantes arteriae cerebri*<sup>1</sup>), die in dem Gehirn überhaupt Arterien aus verschiedenen Hauptstämmen verbindenden stärkern Aeste. S. Gehirnarterien.

1) Halleri icon. anat. fasc. VII. t. I.

*Communis bursa mucosa radialis inferior externa*, f. Radialmuskelschleimsäcke. — *canalis hepatis*, f. Choledochischer Gang. — *carotis*, f. Gemeinschaftliche Carotis. — *membrana oculi*, f. Retina. — *nervus oculi motor*, s. *ocularis*, s. *oculomotorius*, f. Bewegungsnerv des Auges. — *sensus*, f. Gemeinssinn. — *tunica oesophagi*, f. unter Oesophagushäute, inwendige Haut. — — *vaginalis testis et funiculi*, f. unter Vaginalhäute des Hoden, gemeinschaftliche Haut. — — *ventriculi et intestinorum*, f. unter Häute des Magens und der Gedärme.



äußere Haut. — *vesicae*, f. unter Harnblasenhäute, äußere Haut.  
*vagina testis*, f. unter Vaginalhäute des Hoden, gemeinschaft-  
 liche Haut.

*Compactio*, *Compages*, *Compagmatio*, *Compago*, f. Zu-  
 sammensetzung. — *ossium*, f. Knochenverbindung. — *vertebra-*  
*rum*, f. Rückgrath.

*Comparata anatomia*, f. Anatomia comparata.

*Comparative Wärme*, f. Specifische Wärme.

*Compassio*, f. Sympathie.

*Compendia anatomica*, f. unter Anatomische Lehrbücher.

*Complantatus aer*, f. Angeborne Luft.

*Complexion*, (*Complexio*.) dem Wortsinn nach eine Ver-  
 setzung, wird gewöhnlich von der Beschaffenheit und Mischung der  
 festen und flüssigen Körpertheile gebraucht, wovon die Temperamente  
 abhängig sind, und ist in so fern Synonym von Temperament.

*Complexio choleric*, *melancholic*, *phlegmatic*, *sanguini-*  
*ca*, f. Cholerisches, Melancholisches, Phlegmatisches, Sanguini-  
 sches Temperament.

*Complexus*, f. Umarmung.

*Complexus des Nackens*, (*Complexus musculus*<sup>1</sup>, s.  
*complexus musculus major*<sup>2</sup>.) Durchflochtener Muskel<sup>3</sup>,  
 Rechteckmuskel<sup>4</sup>, Großer durchflochtener Muskel<sup>5</sup>, Um-  
 fließendes Mäuflein des Kopfs<sup>6</sup>, Dreifacher oder Zusam-  
 mengesetzter Muskel des Kopfs<sup>7</sup>, (*Musculus trigemi-*  
*us*<sup>8</sup>, s. *compositus*<sup>9</sup>, s. *transverso-mesoccipitalis*<sup>10</sup>, s. *trache-*  
*lo-occipitalis*<sup>11</sup>, s. *dorso-trachelo-occipitalis*<sup>12</sup>.) der an  
 seinen fleischichten Theile wie mit flechtichten Fasern durchwebte läng-  
 liche Muskel, welcher gewöhnlich von der hintern Fläche der Quer-  
 löcher der untern Hals- und der obern Thoraxwirbel mit sehnichten  
 Insertionen entspringt, sich aufwärtssteigend neben dem Biventer des  
 Nackens und mit diesem verbunden, an die obere semicirculäre Linie  
 des Occipitalknochens ansetzt, und den Kopf hinterwärts etwas seit-  
 wärts, mit dem gleichnamigen aber zusammen, gerade nach hinten  
 zieht. S. Kopfmuskeln.

1) nach Meolan (anthropogr. l. 5. c. 22) der aber ihn und den Biventer des  
 Nackens als Einen Muskel betrachtete. Albin unterschied ihn unter derselben  
 Benennung (hist. musc. hom. 4. ed. p. 318.) 2) nach Winslow  
 (expos. anat. lat. vers. T. II, p. 258.) 3) Meurer's Besch. d. menschl.  
 K. 2. B. S. 322. 4) Palfyn's chir. Anat. übers. v. Huth, 1. Th.  
 S. 255. 5) nach Schaarschmidt (myol. Tabellen, Tab. 9.) 6) nach  
 Kulmus (anat. Tabellen, Tab. 28) 7) Browne's verteutschte Besch.  
 d. Musc. v. Spener, Berl. 1704, S. 51 und Uebersetzung v. M. trigeminus.  
 Vgl. Note 8. 8) 9) in Verbindung mit dem Biventer und Trochelomasto-  
 ideus als Ein Muskel betrachtet. (Spigelii de h. corp. fabr. l. 4. c. 7.)  
 10) nach Schreger (Nomencl. d. Musc. S. 15.) 11) (*Trachelo-occip-*  
*itien*) nach Dumeril (in Cuvier's Vorles. über vergl. Anatom. S. 286.)  
 12) nach Dumas (système method. de nomenclat. des musc. p. 134.)

*Complexus musculus major*, f. Complexus des Nackens. —  
*minor*, i. q. Trochelomastoideus.

*Composita cavitas ossium*, f. Zusammengesetzte Knochenhöhle.  
*gangliae*, f. Zusammengeleszte Ganglien.

*Compositae glandulae*, f. Conglomerirte Drüsen.

# 196 Compositio chemica Comprimirender Nasenmuskel.

*Compositio chemica*, f. Chemische Mischung. — ossium, Knochenverbindung.

*Compositus musculus cervicis*, f. Complexus des Nackens.

*Compressi et conferti globuli minutissimi renum*, f. Klümpchen der Nierenrinde.

**Compressor der Prostata**, (*Compressor prostatae*<sup>1</sup> Vorsteherdrüsendrücker, Drückmuskel der Samenrüs Drucker der Vorsteherdrüse<sup>2</sup>, Zusammendrückend Muskel der Prostata<sup>3</sup>, Oberer Vorstehermuskel<sup>4</sup>, (Mus prostaticus superior<sup>5</sup>, s. pubo-prostataeus<sup>6</sup>, s. pubio-prostaticus<sup>7</sup>), der von einigen Anatomen unterschiedene, von der inner Fläche des absteigenden Astes des Schoofstücks des Hüftknochens kommende, rückwärts zur Prostata gehende, und diese umfassende dünne Muskel, welcher die Harnröhre vorwärts zieht, und zugleich auf die Prostata preßt. Gewöhnlich werden diese Muskelfasern zum Harnblasenmuskel gerechnet. S. unter Genitalien des männlichen Geschlechts, Prostata, ingleichen Harnblasenmuskel.

- 1) nach Albin (hist. musc. hom. 4. ed. p. 299.) 2) nach Sommering (Muscell. S. 218.) 3) Pientaud's Vergliederungsf. Uebers. Leipz. 1782. 2. Bd. S. 647 in der Anmerk. 4) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1773, 3. B. S. 650. 5) nach Winslow (exp. anat. lat. vers. IV. p. 164, tr. de bas-ventre, S. 574.) 6) nach Schreger (Nomenclat. d. Musf. S. 24.) 7) Pubio-prostatique) nach Dumas (système method. de nomenclat. des musc. p. 154.)

**Comprimirender Nasenmuskel**, (*Compressor narium*, s. *narium*, s. *nasi*<sup>1</sup>.) Zusammendrücker<sup>2</sup>, oder Schließmuskel<sup>3</sup> der Nase, Zusammenzieher des Nasenlochs, Zusammendrückender Nasenmuskel<sup>4</sup>, Zusammenzieher des Nasenlochs, Pyramidenförmiger<sup>5</sup>, oder Myrtenförmiger<sup>7</sup> Muskel der Nase, Zugespitztes Mäulein der Nase<sup>8</sup>, (Elevator alae nasi<sup>9</sup>, Constrictor nasi<sup>10</sup>, Musculus pyramidalis<sup>11</sup>, s. myrtiformis<sup>12</sup>, s. parvus<sup>13</sup>, carneus nasi<sup>14</sup>, s. adducens<sup>15</sup>, s. constringens<sup>16</sup>, s. claudens<sup>17</sup>, s. transversus nasi<sup>18</sup>, s. maxillo-superpinnalis<sup>19</sup>, s. maxillo-superpinnalis<sup>20</sup>, s. fronto-nasalis<sup>21</sup>), der von der Seite der Nase aus nach dem Rücken derselben hinlaufende, und hier mit dem gegen seitigen in eine Sehnenhaut übergehende Muskel, welcher durch seinen Druck auf die Nase in gemeinschaftlicher Wirkung mit dem deprimirenden Muskel des Nasenflügels das Nasenloch seiner Seite verengert, mit dem Levator des Nasenflügels aber zugleich wirkend, auf

- 1) nach Albin (hist. musc. hom. 4. ed. p. 145.) 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 2. B. S. 1072. 3) Leber's Vorles. über die Systemat. S. 185. 4) nach Sommering (Muscell. S. 124.) 5) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 177. 6) nach Schaarschmidt (myol. Tabell. Tab. 4.) 7) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1773, 4. B. S. 510. 8) nach Kulmus (anat. Tabell. Tab. 28.) 9) nach Cowper (myotom. ref. c. 10.) 10) nach Leber (praelect. anat. nova, Vienn. 1778, p. 144.) 11) Heisteri compend. anat. p. 14. 12) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. d. V. 13) nach Cafferius (pentasthesion l. 3. s. 1. c. 9.) 14) nach Faloppia (obs. anat. Vesal. opp. T. II. p. 711.) 15) — 17) nach Spigel (de hum. c. fabr. l. 4. c. 5.) 18) nach Santorini (obs. anat. c. 1. S. 12.) 19) 20) nach Schreger (Nomenclat. d. Musf. S. 11.) 21) (Fronto-nasal) nach Dumas (système method. de nomenclat. des musc. p. 102.)



Erweiterung des Nasenlochs beiträgt. S. Gesichtsmus-  
an.

*Conarium*, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte <sup>1</sup>, f. Zir-  
keise.

*κωνάριον*, Diminutiv von *κωνος*, Kegels, oder kegelförmiger Zapfen der Na-  
delhöhlzer.

*Concamerata pars superior renum*, f. unter Becken der Nieren.

*Concameratio corticulis Ferreinii*, f. unter Ferreinsche  
Samiden.

*Concaruatio*, f. Syssarchose.

*Concave Fläche* <sup>1</sup> oder *Seite*, (*Concava* <sup>2</sup>, s. *Concavata* <sup>3</sup>  
*facies*, s. *superficies*,) innere Hohlseite eines Theils. Vgl.  
*Concavität*.

<sup>1</sup> Pöder's anat. Handb. x. B. S. 44. <sup>2</sup> Cicero. de nat. Deor.  
11. 2. c. 29. <sup>3</sup> Columell. de re rust. 1. 8. c. 5.

*Concava faciei*, s. *superficies hepatis*, f. unter Flächen der  
Leber, untere Fläche.

*Concavata facies*, s. *superficies*, f. Concave Fläche.

*Concavität* <sup>1</sup>, (*Concavitas*,) Ausbühlung in rundlicher Form,  
Gegensatz der *Convexität*. Vgl. auch *Cavität*.

<sup>1</sup> Pöder's anat. Handb. x. B. S. 42.

*Concavitas communis ventriculorum cerebri dextri et si-  
nistri*, f. unter Ventrikeln des Gehirns, dritter Ventrikel. — *cou-  
chularis*, f. Infundibulum des Gehirns.

*Concentration* <sup>1</sup>, (*Concentratio* <sup>2</sup>,) Concentrirung <sup>3</sup>.

Bei diesem Worte bezeichnen die Physiker und Chemiker die in-  
nere Verbindung von Dingen, worauf es eben ankommt, in der  
Vergleichung mit Radien eines Kreises, die nach einem gemeinschaft-  
lichen Mittelpunkt streben. So werden die Lichtstrahlen durch ein  
dunkles Glas concentrisch gebrochen, und das dadurch im Focus des-  
selben entstehende Bild gewinnt an Bestimmtheit und an Deut-  
lichkeit. Dasselbe bewirkt die Crystalllinse mit den übrigen durchsich-  
tigen Theilen des Auges, und Concentrirung der Lichtstrahlen von äus-  
seren erhellen Gegenständen auf der Netzhaut des Auges ist noth-  
wendige Bedingung des Sehens. So concentriert der Chemiker die zu  
seinem Zweck nöthigen Bestandtheile eines Körpers, indem er die an-  
deren, hierzu untauglichen durch Evaporation oder sonstige chemische Pro-  
zesse entfernt. Auch Säfte des Körpers, Galle, Samenfeuchtigkeit  
&c. w., erfüllen ihre Bestimmung erst dann, wenn sie durch einen  
ähnlichen Vorgang im Körper so ausgebildet werden, daß das thätige  
Princip in ihnen in verhältnißmäßiger Quantität vorhanden ist, und  
ihnen zum Behuf dienende wässerige oder schleimige Feuchtigkeit  
mit das Uebergewicht hat. Auch Kräfte werden concentrirt, wenn  
sie auf einen und denselben Zweck zusammenwirken. So nimmt die  
Verdauung bei reichlicher Nahrung auch den Antheil der Nervenkraft,  
sonst zu andern Functionen verwendet wird, in Anspruch. Bei  
scharfer Aufmerksamkeit, bei einem sinnlichen Eindruck, der ein  
großes Interesse für den Geist hat, bei leidenschaftlichem Streben nach  
einem bestimmten Ziel werden alle Gedanken und Sinne auf Einen

<sup>1</sup> Stahl's fundamenta chymiae, P. III. p. 96.

<sup>2</sup> Vogel instit.

chymiae, S. 276. Uebrigens ist dieß Wort dem classischen Alterthum fremd.

<sup>3</sup> Gren's Handb. d. Chemie, S. 57

Gegenstand concentrirt; der Mensch lebt für den Augenblick nur für einen Punct, den er in die Mitte aller seiner Umgebungen stellt. Die Erscheinungen des thierischen Magnetismus haben uns mit einer noch innigern Concentrirung des geistigen Lebens bekannt gemacht, bei dem nicht wie dort das Gehirn, sondern das Gangliensystem des Unterleibs den Focus zu bilden scheint! (H.)

**Concentricität** kommt nach mathematischer Bestimmung zweier krummen Linien zu, die für ihre Construction einen und denselben Mittelpunkt, nur mit verschiedenen Radien haben, oder mit andern Worten, die einander umschließend, in ihrem Verlauf immer gleich weit von einander abstehen. Nach dieser Bestimmung könnten aber nicht nur Circel, sondern auch Ellipsen und anderer Curven concentrisch seyn. Concentrische Linien unterscheiden sich also von parallelen dadurch, daß jene krumm, diese gerade laufen, doch wird der Unterschied nicht immer so streng beobachtet, indem auch obiges Verhältniß krummer Linien als Parallelismus betrachtet wird, ingleichen auch geraden Linien zusammengesetzte regelmäßige Polygone, aber mit gleichem Mittelpunkt, concentrisch genannt werden:

In der Beschreibung der Richtung von Fasern, Knochenränder und andern Formationen bedienen sich die Anatomen wohl auch obigen Wortes, um ihre Gestalt und ihr Verhältniß zu andern ähnlichen anschaulich zu machen. (H.)

**Concentrirung**, f. Concentration:

*Concentus*, f. Harmonie.

*Conceptacula seminaria*, f. Samenbläschen.

*Conceptaculum*, f. Cavität, ingleichen Uterus.

**Conception**, (*Conceptio*), f. Empfängniß.

*Conceptum*, *Conceptus*; f. Begriffe, auch Ei.

*Concha*<sup>1</sup>, der eigentlichen Bedeutung nach eine Muschel, wird zur directen oder figürlichen Bezeichnung verschiedener Körpertheile gebraucht. S. die folgenden Artikel.

1) entsprechend dem Griechischen Worte κοχλη.

**Concha des Ohrs**, (*Concha auris*<sup>1</sup>), Muschel<sup>2</sup>, Höhr vor dem Gehörgange<sup>3</sup>, Ohrmuschel<sup>4</sup>, der mittlere concha Theil des Ohrknorpels, oben und hinten vom Anthelix, unten vom Anttragus begrenzt. S. unter Ohr, äußeres Ohr.

1) Riolani anthropogr. l. 4. c. 5.

2) Meutaud's Zergliederung

Uebers. Leipz. 1782, 2. Th. S. 300.

3) Kulmus anat. Tabell. Tab. 1

4) Meier's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 419.

**Concha mulierum**, i. q. Vulva. — *genu*, f. Kniescheibe. — *interna*, f. Tympanum. — *labyrinthi*, i. q. Cochlea. — *oculi*, f. Augenhöhle. — *quarta*, s. *Santorini*, s. *Santorianae*, f. Santorinische Muschel.

**Conchae mediae**, f. unter Muscheln des Ethmoidalknochens, mittlere Muscheln. — *Morgagnianae*, f. ebendas. obere Muscheln. — *nasarium*, f. Muscheln des Ethmoidalknochens, ingleichen Muschelförmige Knochen. — *ossis ethmoidei*, f. Muscheln des Ethmoidalknochens. — *superiores*, s. *supremae*, f. unter Muscheln des Ethmoidalknochens, obere Muscheln.



*Concho - anthelicaeus musculus*, s. *Concho - anthelix*, s. Quersattel des Ohrs. — *helicaeus musculus*, s. *Concho - helix*, s. unter Helixmuskeln, den kleinern. — *tragicus musculus*, i. q. tragicus.

*Conchula* <sup>1</sup> genu, s. Kniescheibe.

Diminutiv von *Concha*.

*Conchularis cavitas*, s. Infundibulum des Gehirns.

*Conchus*, nach dem Griechischen gleichlautenden Worte <sup>1</sup>, s. Hirnschel.

*Conchylus*, *concha*, Polluc. onomast.

*Conchus oculi*, s. Augenhöhle.

*Conchylia inferiora*, s. Muschelförmige Knochen. — *media et superiora*, s. Muscheln des Ethmoidalknochens.

*Concinnitas*, s. Harmonie.

*Concipere*, s. Begreifen.

*Conclavatio*, s. Gomphose.

*Concoctio*, s. Coction. — *ciborum*, s. Verdauung.

*Concoctorium organum*, s. Verdauungsorgan.

*Concordanz* <sup>1</sup>, (*Concordantia* <sup>2</sup>,) Confluenz <sup>3</sup>, (*Concortia* <sup>4</sup>, Confoederatio <sup>5</sup>, Conformitas, Congruentia, Concinnitas <sup>6</sup>,) Paracelsische Ausdrücke zu Bezeichnung der Uebereinstimmung der astralischen und der menschlichen Natur, wie auch der einzelnen Kräfte und Vorgänge im menschlichen Körper unter sich. S. der Theosophistische Systeme der Natur.

<sup>1</sup> Theophrast Parac. Abzug. Bücher und Schriften, Straßb. 1618, 1. Th. S. 380. <sup>2</sup> Libavii de philos. harmonica mag. frat. Ros. Cr. p. 283.

<sup>3</sup> Theophr. Par. Abz. u. s. w. c. a. D. S. 361. <sup>4</sup> Ejusd.

de podagra l. 2. <sup>5</sup> Ejusd. tr. de tabe. <sup>6</sup> Ejusd. paragram. tr. 4.

*Concretio*, *Concrementum*, *Concrescentia*, s. Verwachsen.

*Concossium*, s. Symphyse.

*Concubitus*, s. Begattung.

*Concupiscentia*, *Concupiscibilis facultas*, s. Gelüst.

*Conditura cadaveris*, s. Balsamirung der Leichen.

*Condylen der Tibia*, (*Condyli tibiae* <sup>1</sup>,) Gelenkhüpfen <sup>2</sup>, oder Gelenkflächen <sup>3</sup> der Tibia, Schienbeinknorpel <sup>4</sup>, die am obern stärkern Ende der Tibia zu beiden Seiten befindlichen Hervorragungen, welche an ihrem Umfange rauh, oberwärts überknorpelt und so zur Articulation mit den beiden Condylen des Oberschenkels geeignet sind, und von denen a) die innere <sup>5</sup>, *condylus internus* <sup>6</sup>,) etwas größer und etwas tiefer liegende, zur Annäherung des innern Condylus des Oberschenkels, b) die äußere <sup>7</sup>, *condylus externus* <sup>8</sup>,) etwas höher liegend, mit dem äußern Condylus des Oberschenkels in Verbindung steht. S. Tibia.

<sup>1</sup> 2) Foder's anat. Handb. 1. B. S. 293. <sup>3</sup> 3) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 328. <sup>4</sup> 4) Meßel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 258.

<sup>5</sup> 5) — 8) Foder's anat. Handb. a. a. D.

*Condylen des Oberarmknochens*, (*Condyli ossis humeri* <sup>1</sup>,) Hüpfen <sup>2</sup>, oder Rauhe Hügel <sup>3</sup>, oder Knorren <sup>4</sup>, oder Gelenkhüpfen <sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Winslow exp. anat. lat. vers. T. I. tr. de oss. sicc. §. 642. <sup>2</sup> 2) Hildebrandt's Lehrs. d. Anat. d. M. 1. B. §. 693. <sup>3</sup> 3) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 229. <sup>4</sup> 4) Meßel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. §. 675.

lenkhügel<sup>5</sup>, oder Gelenkknöpfe<sup>6</sup> des Oberarmknochens (Tubera<sup>7</sup>, s. Tubercula<sup>8</sup>, s. Processus<sup>9</sup> ossis brachii.) die an dem untern Ende des Oberarmknochens seitwärts befindlicher Hervorragungen, namentlich a) eine innere<sup>10</sup>, (Condylus internus<sup>11</sup>, s. posterior<sup>12</sup>, s. major<sup>13</sup>, s. flexorius<sup>14</sup>), Beugeknorren<sup>15</sup>, welche neben der Trochlea des Oberarmknochens nach innen, und etwas nach hinten liegt und nebst andern auch einiger Beugemuskeln zur Anlage dient, b) eine äußere<sup>16</sup>, (Condylus externus<sup>17</sup>, s. anterior<sup>18</sup>, s. minor<sup>19</sup>, s. extensorius<sup>20</sup>), Streckknorren<sup>21</sup>, die sich neben der kopfförmigen Erhabenheit des Oberarmknochens mehr nach vorn und außen befindet, und von welcher mehrere extensorische Muskeln entspringen. S. Oberarmknochen.

5) Loder's anat. Handb. 1. Th. S. 233.

6) Leber's Vorles. über d.

Bergliederungsk. Wien 1776, S. 95.

7) 8) Spigelii de h. c. fabr. 1.

2. c. 25.

9) Bartholini anat. libell. 4. c. 20.

10) — 11) Lo-

der's anat. Handb. a. a. D.

15) Meckel's Handb. u. f. w. a. a. D.

16) — 20) Loder's anat. Handb. a. a. D.

21) Meckel's Handb.

u. f. w. a. a. D.

**Condylen des Schenkelknochens**, (Condyli<sup>1</sup> ossis femoris, Gelenkknöpfe<sup>2</sup>, oder Hügel, oder Knöchel<sup>3</sup>, oder Köpfe<sup>4</sup>, oder Knöpfe<sup>5</sup> des Schenkelknochens, Gelenkhügel des Knieknochens<sup>6</sup>, Oberschenkelknorren<sup>7</sup>, (Capita inferior ossis femoris<sup>8</sup>), die am untern Ende des Schenkelknochens zu beiden Seiten befindlichen starken überknorpelten Erhabenheiten, welche mit den am obern Ende der Tibia befindlichen Gelenkvertiefungen articuliren, und von denen a) die äußere<sup>9</sup>, (Condylus externus<sup>10</sup>), etwas weniger hervorragt, b) die innere<sup>11</sup>, (Condylus internus<sup>12</sup>), aber etwas weiter als jene besonders nach unten hervorsticht. S. Schenkelknochen.

1) Winslow exp. anat. lat. vers. T. I. tr. de oss. sicc. §. 749.

2) 3)

Sömmering's Knochenl. §. 548.

4) Pleuraud's Bergliederungsk.

Uebers. Pesp. 1782, 1. Th. S. 203.

5) Palfyn's chir. Anat. übers. v.

Huth, 1. B. S. 170.

6) Maier's Besch. d. menschl. K. 2. B.

S. 318.

7) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. 254.

8) Ve-

salii de corp. h. fabr. 1. c. 30.

9) — 12) Loderi tab. anat.

und Deutscher Text Taf. 13 Flg. 1. Nr. 9 u. 10.

**Condylen des Unterkiefers**, (Condyli<sup>1</sup> maxillae inferioris, Knöpfe oder Gelenkhügel<sup>2</sup> des Unterkiefers<sup>3</sup>, (Capitula<sup>4</sup> s. Apophyses<sup>5</sup> maxillae inferioris,) das obere länglich runde Ende des condyloideischen Processes des Unterkiefers, welches in der Articulationshöhle des Schläfelenkknöchens die Articulation des Unterkiefers vermittelt. S. Unterkiefer.

1) Winslow exp. anat. lat. vers. T. I. tr. de oss. sicc. §. 356.

2)

Palfyn's chirurg. Anat. übers. v. Huth, 1. Th. S. 117.

3) 4)

der's anat. Handb. 1. B. S. 132.

5) Winslow exp. etc. 1. c.

**Condyli digitorum**, s. Phalangen der Finger. — **maxillae inferioris**, s. Condylen des Unterkiefers. — **oblongi ossis occipitis**, s. Condyloideische Prozesse des Occipitalknochens. — **ossis femoris**, s. Condylen des Schenkelknochens. — — **humeri**, s. Condylen des Oberarmknochens. — — **occipitis**, s. Condyloideische Prozesse des Occipitalknochens. — **tibiae**, s. Condylen der Tibia.



*Condyllo - achillaeus biventer musculus*, s. *Gastrocnemius*. — *unconaeus musculus*, s. unter *Anconâen*, den kleinen *Anconâus*. — *calcaneus biventer musculus*, i. q. *Gastrocnemius*. — *musculus simplex*, i. q. *Plantaris*. — *carpiacus internus musculus*, s. *Ulnarflexor* der Hand. — *dorso - phalangeus musculus*, s. *Extensor* der Finger.

*Condylloidea apophysis*, s. *Condylus*. — *cavitas*, s. *fossa*, *Glenoidalgrube*. — *eminentia*, s. *Condylus*. — *foramina*, s. *Foramina anteriora*, s. *Condylloideische Löcher* des *Occipitalknöchens*, — *posteriora*, s. *Condylloideische Canäle*.

*Condylloideae apophyses maxillae inferioris*, s. *Condylloideische Proceſſe* des *Unterkiefers*. — *fossae*, s. *fossulae*. s. *foveae ossis occipiti*, s. *Condylloideische Grübchen* des *Occipitalknöchens*. — *partes ossis occipitis*, s. *Condylloideische Theile* des *Occipitalknöchens*.

*Condylloidei canales*, s. *Condylloideische Canäle* des *Occipitalknöchens*. — *anteriores*, s. *Condylloideische Löcher* des *Occipitalknöchens*. — *posteriores*, i. q. *Condylloidei canales*. — *processus maxillae inferioris*, s. *Condylloideische Proceſſe* des *Unterkiefers*. — *ossis occipitis*, s. *Condylloideische Proceſſe* des *Occipitalknöchens*.

*Condylloideische Canäle* des *Occipitalknöchens*, (*Condylloidei canales*<sup>1</sup>, s. *Condylloidei canales posteriores*<sup>2</sup>), *Hinterere Gelenkcanäle*<sup>3</sup>, oder *Knopflöcher*<sup>4</sup> des *Hinterhauptbeins*, (*Foramina condylloidea posteriora*<sup>5</sup>), die beiden kleinen Canälchen zur Seite des *Jugularstücks* des *Occipitalknöchens*, welche nur uneigentlich und dann zum Unterschied der weiter vordwärts gelegenen *condylloideischen Löcher*, die *hintern Löcher* bezeichnet werden, die sich vom *Boden* des *condylloideischen Grübchens* bis zur *hintern äußern Seite* des *anonymen Proceſſes* erstrecken, und kleinen *Venen*, die von außen sich in den *Seitensinus* der *harten Hirnhaut* ergießen, zum *Durchgange* dienen, nicht selten jedoch auch auf einer oder auf beiden Seiten ganz fehlen. S. *Occipitalknochen*.

1) nach *Walter* (*Abh. v. trockn. Knoch.* 2. Aufl. S. 57.) 2) *Foder's anat. Handb.* 1. B. S. 47. 3) *Meckel's Handb. d. menschl. Anat.* 2. Th. S. 533. 4) *Palfyn's Hdt. Anat. übers. v. Huth*, 1. Th. S. 83. 5) *Leberi praelect. anat. ed. nova*, Vienn. 1778, p. 23.

*Condylloideische Grübchen* des *Occipitalknöchens*, (*Condylloideae fossae*<sup>1</sup>, s. *fossulae*<sup>2</sup>, s. *foveae*<sup>3</sup>, s. *ossis occipitis*), *Knopfsgruben*<sup>4</sup>, oder *Gelenkgruben*<sup>5</sup>, oder *Gruben* der *Gelenkfortsätze*<sup>6</sup> des *Hinterhauptbeins*. Deren werden a) zwei vordere, (*anteriora*<sup>7</sup>) und b) zwei hintere, (*posteriora*<sup>8</sup>) unterschieden, wovon erstere vor den *condylloideischen Proceſſen* liegen und *Muskeln* zur *Anlage* dienen, letztere gleich *hinten* denselben befindlich sind, und einige *Gelenkdrüsen* aufnehmen. S. *Occipitalknochen*.

1) *Walter's Abh. v. trockn. Knoch.* 2. Aufl. S. 57. 2) *Winslow exp. anat. lat. vers. T. I. tr. de oss.* S. 225. 3) *Leberi praelect. anat. ed. nova*, Vienn. 1778, p. 23. 4) *Palfyn's Hdt. Anat. übers. v. Huth*, 1. Th. S. 83. 5) *Meckel's Handb. d. menschl. Anat.* 2. B. S. 533. 6) *Foder's anat. Tafeln*, Taf. 5. Plg. 5. Nr. 13. 7) 8) *Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M.* 1. B. S. 138.

Condylloideische Löcher des Occipitalknochens, (Condylodea foramina<sup>1</sup>.) Löcher des Zungenfleischnerven, Vordere Knopflöcher<sup>2</sup>, oder Gelenkcanäle<sup>3</sup>, oder Vordere Canäle der Gelenkfortsätze<sup>4</sup> des Hinterhauptbeins, zwei ansehnliche, zuweilen doppelte Löcher vor und über den condylloideischen Processen des Occipitalknochens auf jeder Seite, zum Durchgang des als Hypoglossus bezeichneten Nerven bestimmt. Man gibt gewöhnlich auch diesen Löchern den Beinamen, die vordern<sup>5</sup>, (Foramina anteriora<sup>6</sup>, Canales condylodei anteriores<sup>7</sup>.) im Gegensatz der auch als condylloideische Löcher und dann als hintere, bezeichneten condylloideischen Canälen. S. Occipitalknochen.

- 1) Walter's Abh. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 67. 2) Palsyn's chir. Anat. übers. v. Puth, 1. Th. S. 84. 3) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 333. 4) 5) Pöder's anat. Tafeln, Taf. 5. Fig. 3. Nr. 14. 6) Walters Abh. u. s. w. a. a. D. 7) Pöder's anat. Handb. 1. B. S. 48.

Condylloideische Prozesse des Occipitalknochens, (Condylodei processus<sup>1</sup> ossis occipitis,) Gelenkknöpfe<sup>2</sup>, oder Gelenkhügel<sup>3</sup>, oder Gelenkfortsätze<sup>4</sup>, oder Knöpfichte<sup>5</sup>, oder Knopfförmige Fortsätze<sup>6</sup>, oder Knöpfe<sup>7</sup> des Hinterhauptbeins, (Condyli<sup>8</sup>, Apophyses condylodeae<sup>9</sup>, s. condylosae<sup>10</sup>, s. Condyli oblongi<sup>11</sup>, s. Capita<sup>12</sup>, s. Appendices<sup>13</sup>, s. Tubera<sup>14</sup>, s. Coronae<sup>15</sup> ossis occipitis,) die beiden äußerlich auf jeder Seite am Occipitalknochen befindlichen, länglichen, gewölbten Erhabenheiten, welche auf den ihnen entsprechenden Vertiefungen des ersten Halswirbels articuliren. S. Occipitalknochen.

- 1) Walters Abh. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 56. 2) Sömmerring's Knochenl. S. 114. 3) Mayer's Besch. d. menschl. K. 1. B. S. 294. 4) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 333. 5) Winslow's anat. Abh. übers. Berl. 1753, 1. Th. S. 75. 6) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 137. 7) Palsyn's chir. Anat. übers. v. Puth, 1. Th. S. 85. 8) Leber's praelect. anat. ed. nova, Vienn. 1778, p. 25. 9) Schaarschmidt's osteol. Tabell. Tab. 6. 10) Riolani anthropogr. Par. 1626, p. 794. 11) Böhmer's Entw. zur Knochenl. S. 66. 12) 13) Spigelii de c. h. fabr. l. 2. c. 3. 14) Columbi de re an. l. 1. c. 5. 15) nach Galen (l. de ossib.) aber unrichtig. Vgl. Columbi de re an. l. c.

Condylloideische Prozesse des Unterkiefers, (Condylodei processus maxillae inferioris<sup>1</sup>.) Gelenkhügel<sup>2</sup>, oder Knorrenfortsätze, oder Gelenkknöpfe<sup>3</sup>, oder Knopfförmige Fortsätze<sup>4</sup>, oder Knopffortsätze<sup>5</sup>, oder Gelenkfortsätze<sup>6</sup>, oder Knebel förmige Winkel<sup>7</sup> des Unterkiefers, (Processus posteriores<sup>8</sup>, s. Anguli superiores posteriores, s. Apophyses condylodeae<sup>9</sup> maxillae inferioris,) die von den Kassen des Unterkiefers nach hinten und oben abgehenden, in einen von außen nach innen länglichen Gelenkknopf auslaufenden Knochenproceß, welche mit

- 1) Leber's praelect. anat. ed. nova, Vienn. 1778, p. 46. 2) Pöder's anat. Handb. 1. B. S. 132. 3) Sömmerring's Knochenl. S. 218. 4) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 402. 5) Fleury's Bergliederungsf. Uebers. Leipz. 1782, 1. B. S. 104. 6) Mayer's Besch. d. menschl. K. 1. B. S. 45. 7) Walter's Abh. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 186. 8) Palsyn's chir. Anat. übers. v. Puth, 1. B. S. 116. 9) Winslow expos. anat. lat. vtrs. T. I. tr. de oss. sicc. S. 43.



an Articularhöhlen der untern Maxille am Schläfenknochen auf jeder Seite das Kinnbackengelenk bilden. S. Unterkiefer.

**Condylloideische Theile des Occipitalknochens**, (*Condylloideae partes ossis occipitis* <sup>1)</sup>, Knopfstücke des Hinterhauptbeins <sup>2)</sup>, Gelenktheile <sup>3)</sup>, oder Seitentheile <sup>4)</sup> des Hinterhauptstücks des Grundbeins, (*Partes jugulares* <sup>5)</sup>, *articulares* <sup>6)</sup> *ossis occipitis*,) die beiden Seitenstücke des gedachten Theils, vorwärts an dem großen Occipitalloch, welche beim Fötus getrennt sind, und sich überhaupt erst nach der Geburt ausbilden, d. Occipitalknochen.

1) 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 137. 3) 4) Schlemmering's Knochenl. S. 122. 5) Loder's anat. Handb. 1. B. S. 24. 6) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 532.

**Condylloideus sinus**, s. Glenoidalhöhle.

**Condylometacarpiaeus musculus internus**, s. Radialflexor der Hand. — **palma-phalangeus musculus**, s. unter Flexoren der Finger, den oberflächlichen Muskel. — **palmaris musculus**, unter Palmarmuskeln, den langen. — **phalangeus auricularis musculus**, s. Extensor des kleinen Fingers. — **posttibialis musculus**, i. q. Popliteus. — **radiales musculi externi**, i. q. Supinator. — **radialis-internus rotundus musculus**, s. unter Pronatoren der Hand, den obren Pronator. — — — **quadratus musculus**, s. ebendasselbst den untern Pronator. — **radio-metacarpiaeus musculus**, s. Radialextensoren der Hand. — **ulno-metacarpiaeus musculus**, s. Ulnarextensor der Hand.

**Condylus**, s. Condylus.

**Condyllosae apophyses ossis occipitis**, s. Condylloideische Prozesse des Occipitalknochens.

**Condylus**, (*Condylus* <sup>1)</sup>,) Kondylus, Knopf <sup>2)</sup>, Bein-  
knopf, Knorren <sup>3)</sup>, Gelenkknopf <sup>4)</sup>, Gelenkhügel <sup>5)</sup>, (*Con-*  
*dylos* <sup>6)</sup>, *Tuberculum* <sup>7)</sup>, *Articulus* <sup>8)</sup>, *Gibberus* <sup>9)</sup>, *Nodus* <sup>10)</sup>,  
*eminentia*, s. *Apophysis condyloidea* <sup>11)</sup>,) eigentlich eine rundliche,  
den etwas abgeflachte Knochenhabenheit, welche ein Gelenk bilden  
kann, auch ein wirklich rundes Gelenkende eines Knochens, das seit-  
wärts auch wohl nur an einer Gelenkvertiefung liegt. S. Knochen-  
habenheiten.

1) nach dem Griechischen Worte *κονδυλος*, welches Galen (*de musculor. motu* l. c.)  
in der Bedeutung eines etwas platten Knochenkopfs braucht, übrigens aber in seinen  
andern Schriften dieser Bestimmung nicht treu bleibt. Vgl. über die verschiedene  
Bedeutung dieses Wortes Vesalii de c. h. fabr. l. 1. c. 4. 2) Mon-  
ro's Knochenl. übers. v. Krause, S. 37. 3) Winslow's anat. Abb.  
Uebers. Berl. 1733, 1. B. S. 15. 4) Schlemmering's Knochenl. S. 58.  
5) Loder's anat. Handb. 1. B. S. 16. 6) Riolani anthropogr. l. 5.  
c. 50. 7) — 9) In ungehöriger Ausdehnung d. Wortes *condylus* nach  
dessen vagen Gebrauch in Galen'schen Schriften. 10) Stephani dict. med.  
ed. 1564, p. 552. 11) Mayer's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 226.

**Condylus capitatus ossis brachii**, s. Köpfchen des Cubital-  
processes des Oberarmknochens.

**Condylus der Ulna**, (*Condylus ulnae* <sup>1)</sup>,) Kopf <sup>2)</sup>, oder

1) Kulmus anat. Tabellen, Tab. 5. 2) Monro's Knochenl. übers. v.  
Krause, S. 389.

Köpfchen<sup>3</sup>, oder Knopf<sup>4</sup> der Ulna, (Caput<sup>5</sup>, s. Capitulum<sup>6</sup> ulnae,) der untere dünnere, in ein rundliches Ende auslaufende Theil der Ulna, welcher sowohl vorwärts mit dem Radius, als unterwärts mit der Handwurzel in Verbindung steht. S. Ulna.

3) Sömmerring's Knochenl. §. 482.

4) Hildebrandt's Lehrb. d.

Anat. d. M. 1. B. §. 713.

5) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2. B.

S. 237.

6) Leber's praelect. anat. ed. nova, Vienn. 1778, p. 81.

Condylus des Radius, (Condylus radii<sup>1</sup>), Kopf<sup>2</sup>, oder Knopf<sup>3</sup> der Speiche, (Capitulum superius, s. excavatum<sup>4</sup>, s. Caput<sup>5</sup> radii, Capitellum radii,) das obere, dünnere, in einem etwas eingedrückten Kopf auslaufende Ende des Radius, welches mit der kopfförmigen Erhabenheit des Oberarms und mit der kleinen sigmoidischen Cavität der Ulna in Verbindung steht. S. Radius.

1) Blumenbach's Besch. d. Knoch. §. 358.

2) Walter's Abh. v. trockn.

Knoch. 2. Aufl. S. 306.

3) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B.

§. 720.

4) Vesalii de c. h. fabr. l. 1. c. 29.

5) Winslow

exp. anat. lat. vers. T. I. tr. de oss. sicc. §. 665.

Condylus des Schulterblatts, (Condylus scapulae<sup>1</sup>), Knopf<sup>2</sup>, oder Körper<sup>3</sup>, oder Vorderer Winkel<sup>4</sup> des Schulterblatts, (Corpus<sup>5</sup>, s. Caput<sup>6</sup>, s. Angulus anterior<sup>7</sup> scapulae,) das den vordern, obern Winkel bildende, stärkste Knochenstück des Schulterblatts, welches durch eine Gelenkfläche mit dem Kopf des Oberarms in Verbindung steht, und zugleich nach unten dem langen Kopfe des Triceps, nach oben aber dem langen Kopfe des Biceps zur Anlage dient. S. Schulterblatt.

1) 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. §. 675.

3) Mayer's

Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 224.

4) Walter's Abh. v. trockn.

Knoch. 2. Aufl. S. 283.

5) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D.

6) Winslow exp. anat. lat. vers. T. I. tr. de oss. sicc. §. 613.

7) Le

ber's praelect. anat. ed. nova, Vienn. 1778, p. 75.

Condylus radii, s. Condylus des Radius. — scapulae, s. Condylus des Schulterblatts. — ulnae, s. Condylus der Ulna.

Conferti et compressi globuli minutissimi renum, s. Klumpchen in der Nierenrinde.

Confidentia, s. Vertrauen.

Configuratio planetarum, s. Aspecten.

Confluenz, (Confluentia,) s. Concordanz.

Confluxio, Conspiratio, commercium, Consortium, Xymrhoa, gleichbedeutende Ausdrücke der Hippokratishen Schulen zur Bezeichnung der mit einander übereinstimmenden Aeuserung der Lebenskräfte in Körpern<sup>1</sup>. Vgl. Harmonie, ingl. Sympathie.

1) besonders in Bezug der Stelle in Hippocr. l. 4 de aliment. c. 24: „Confluxio una, Conspiratio una, Consentientia omnia.“

Confoederatio, s. Concordanz, ingl. Sympathie.

Conformatio corporis, s. Körperform.

Conformitas, s. Concordanz, ingl. Sympathie.

Confusio substantiae nervorum opticorum, s. Decussation der Sehnerven.

Congeneres musculi, s. Gleichwirkende Muskeln.

Congeniti pili. So bezeichnet Bartholin<sup>1</sup> diejenigen Haare des menschlichen Körpers, welche gleich bei der Geburt ein Kind m

1) Anat. l. 3. c. 1.



ur Welt bringt, im Gegensatz von den postgenitis, welche erst bei mehrerer Körperreife entstehen. Vgl. Haare.

*Congenitus aer*, s. Ungeborne Luft.

*Conglobatio*, s. Kugelbildung.

**Conglobirte Drüsen, (*Conglobatae glandulae*<sup>1</sup>),** zusammengewickelte, oder Runde<sup>2</sup>, oder Abgerundete<sup>3</sup>, oder Kugelförmige<sup>4</sup>, oder Klumpige, oder Geballte, oder lymphatische Drüsen<sup>5</sup>, Saugaderdrüsen<sup>6</sup>, Flußwasserdrüsen<sup>7</sup>, (*Glandulae globosae*, s. *vesiculares*<sup>8</sup>, s. *mucosae*<sup>9</sup>, s. *lymphaticae*<sup>10</sup>.) wurden zuerst im Gegensatz der conglomerirten Drüsen als solche unterschieden, die mit gleichmäßiger Oberfläche auch der Substanz nach gleichmäßige Bildung zeigen, also auch einfache darunter begriffen, deren innere vermeintliche Höhlung auch als Bläschen<sup>11</sup> der Drüsen, (*Folliculi*.) unterschieden wurden. Neuerer Zeit und nachdem die Annahme eines solchen blasigen Baues durch Einspritzungen widerlegt worden, begreift man die Ausführungsgänge entziehenden lymphatischen Drüsen, und die dem Bau nach jenen analogen Drüsen, wie die Zirbeldrüse oder die Stüttdrüse des Gehirns, darunter. S. Drüsen.

- 1) nach Sylvius de Boe (Oper. med. ed. Traj. ad Rhen. 1695, p. 23.) 2) Leber's Vorles. über die Zergliederungsk. S. 355. 3) nach Mayer (Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 78.) 4) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1753, 4. Th. S. 448. 5) mit besonderer Beschränkung, Lieutaud's Zergliederungsk. Uebers. Leipz. 1782, 1. B. S. 870. 6) mit besonderer Beschränkung, Edmerring's Gefäßl. S. 438. 7) d. d. Winslow's anat. Abh. u. f. w. a. a. D. S. 444. 8) Nuck's adenograph. ed. Lugd. B. 1693, p. 8. 9) nach Nuck (l. c. p. 37.) 10) Haller's elem. physiol. T. VII. l. 25. s. 1. §. 7. 11) Heuermann's Physiol. 1. B. S. 428.

**(Conglomerirte Drüsen, (*Conglomeratae glandulae*<sup>1</sup>),** zusammengehäufte<sup>2</sup>, oder Zusammengesetzte<sup>3</sup>, oder Vielförnige<sup>4</sup> Drüsen, (*Glandulae laxae*<sup>5</sup>, s. *vasculares*<sup>6</sup>, s. *compositae*<sup>7</sup>, s. *secernentes*<sup>8</sup>.) Drüsen, an denen sich ein körniger Bau unterscheiden läßt, die also aus einzelnen Körnern (*acini*.) mit gleichfalls körnigem Bau bestehen. S. Drüsen.

- 1) wörtlich in Knäule zusammenverbunden, Celsi de med. l. 7. c. 18: „*Venae intortae conglomerataeque*.“ 2) nach Sylvius de Boe (Oper. med. ed. Traj. ad Rhen. 1695, p. 23.) 3) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1768. 4) nach Mayer (Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 77.) 5) Leber's Vorles. über d. Zergliederungsk. S. 355. 6) nach Marlinus (s. Galeni de semine l. 2.) 7) Nuck's adenograph. c. 1. 8) Mayer's Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 77 u. 78. 9) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. S. 77 Note, jedoch mit Beschränkung auf die wirklich Absonderungen bewirkenden Drüsen.

**(*Conglutinatio squamosa*, s. Schuppenfatur.**

**(Conglutinirte Drüsen, (*Conglutinatae glandulae*<sup>1</sup>),** zusammengesetzte<sup>2</sup>, oder Zusammengehäufte<sup>3</sup> Drüsen, (*Glandulae conglutinatae et congregatae*, Lossii<sup>4</sup>, s. *agmi-*

- 1) wörtlich zusammengeklebt. 2) Haller's elem. physiol. T. II. l. 7. s. 2. S. 19. 3) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1768. 4) nach Mayer (Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 76.) 5) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. Lossius (de nat. glandul. Viteb. 1683, n. 30) unterschied gl. conglutinas, die den abgesonderten Schleim in eine gemeinschaftliche Höhlung absetzen, und congregatas, die jede ihren besondern Excretionsgang haben.

natae<sup>6)</sup> einfache Drüsen, die bloß in größerer Zahl neben einander liegen, und deren fernere Unterscheidung vernachlässigt werden kann. S. Drüsen.

6) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D.

*Congregatae glandulae Lossii*, f. Conglutinirte Drüsen.

— *Monroi*, f. unter Thränendrüse, untere Thränendrüse.

*Congressus*, f. Begattung. — *nervorum opticorum*, f. Dichtung der Sehnerven.

*Congruentia*, *Congruitas*, f. Concordanz.

*Coni renum*, f. Ferreinsche Pyramiden. — *vasculosi epididymidis*, s. *Halleri*, f. Conische Gefäßstränge der Epididymis.

*Conica formatio*, f. Conische Bildung.

*Conicae papillae linguae*, f. unter Papillen der Zunge, vordere Papillen.

**Conische Bildung**, (*Conica*, s. *Conoidea formatio*), Kegelförmige, oder Kegelförmige Bildung, der mathematischen Form eines Kegels, d. i. eines Körpers, dessen runde Grundfläche in eine Spitze ausläuft, entsprechende Bildung. S. Körperliche Formen.

**Conische Gefäßstränge der Epididymis**, (*Coni vasculosi epididymidis*<sup>1)</sup>, s. *Coni vasculosi Halleri*<sup>2)</sup> Kegelförmige Stränge<sup>3)</sup>, oder Gefäßkegel<sup>4)</sup> des Nebenhoden (Corpora pyramidalia<sup>5)</sup> epididymidis,) die häutige geschlängelte Röhrchen bildenden Fortsetzungen der Graafischen Samenröhrchen, an denen der Kopf der Epididymis besteht, und welche sich in dem Canal der Epididymis vereinen. Vgl. Epididymis.

1) Halleri primae lineae physiol. §. 813. 2) 5) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. §. 2235. 4) Haller's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v. Leveiling, 2. Th. §. 370. 5) Mayer's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 112.

*Conjugalia ossa*, f. Backenknochen.

*Conjugatio*, *Conjugium Syzygia*, nach Galen<sup>1)</sup> die Zusammenfassung von zwei Dingen im Körper, die einander gleich und symmetrisch gebaut sind. Vgl. Symmetrie.

1) de usu part. 1. 15. c. 2.

*Conjugationes*, s. *Conjugia nervorum*, f. Nervenpaare.

*Conjugium*, f. *Conjugatio*, ingl. Ehe.

*Conjunctio*, f. Verbindung. — *nervorum opticorum*, f. Dichtung der Sehnerven. — *vasorum*, f. Anastomose.

**Conjunctiva**<sup>1)</sup>, (*Conjunctiva*<sup>2)</sup>, *Conjunctiva tunica*<sup>3)</sup> oculi,) Verbindungshaut<sup>4)</sup>, oder Bindhaut, oder Verbindungshäutchen<sup>5)</sup>, oder Vereinigende<sup>6)</sup>, oder Angewachsene Haut, oder Verknüpfungshaut<sup>7)</sup> des Auges, Zusammenfügendes<sup>8)</sup>, oder Weißes Häutlein<sup>10)</sup> des Auges, (*Tunica*

1) Haller's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v. Leveiling, 1. Th. §. 547. 2) Th. Bartholini anat. 1. 3. c. 8. 3) Jul. Placentini nov. anat. 1. c. 21. 4) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. §. 1448. 5) Taylor's Mechanism. d. Aug. Uebers. Frankfurt. 1750, S. 4. 6) Haller's Grundr. d. Physiol. u. f. w. a. a. D. 7) Meientaud's Vergleichungsf. Uebers. Leipzig. 1782, 2. B. S. 254. 8) Winslow's anat. M. Uebers. Berl. 1733, 4. B. S. 245. 9) 10) nach Altmus (anat. Tabell. Tab. 9.)



adnata<sup>11</sup>, s. adnata alba<sup>12</sup>, s. ohnata, s. agnata<sup>13</sup>, s. alba<sup>14</sup>, adhaerens<sup>15</sup> oculi, s. albuginea<sup>16</sup>, Album<sup>17</sup>, s. Album<sup>18</sup>, s. Candidum<sup>19</sup>, s. Albamentum<sup>20</sup>, s. Corolla<sup>21</sup>, s. Runda<sup>22</sup> oculi,) die das Auge vorwärts überziehende, und also sowohl den vordern Theil der Sclerotica, als die Cornea bedeckende, sich abwärts und aufwärts gegen die Augenlider fortsetzende, und auch diese überkleidende, feine, äußerst empfindliche und durchsichtige Haut, welche die Augenlider unter sich und mit dem Augapfel verbindet, an sich zwar eine Fortsetzung der allgemeinen Integumente des Körpers ist, zugleich aber auch durch die Lacrymalpuncte und den membranösen Lacrymalcanal mit der Schneider'schen Haut der Nase zusammenhängt, und als eine für sich bestehende Schleimmembran betrachtet werden kann. Der dem Augapfel gehörige Theil wird auch als das Bindungshäutchen des Auges<sup>23</sup>, (Membrana conjunctiva oculi<sup>24</sup>), der den Augenlidern zugehörige aber als Bindungshäutchen der Augenlider<sup>25</sup>, (Tunica conjunctiva palpebrarum<sup>26</sup>), unterschieden. S. Auge.

11) nach Vesal (de h. c. fabr. l. 7. c. 14.)

19) Bartholini anat.

1. c. 13) H. Fabricii et Aquap. de oculo l. 1. p. 1. l. 1. c. 3.

14) Jul. Placentini n. anat. l. c.

15) Vesalii de hum. c. fabr.

1. c. 16) Kulmus anat. Tabell. a. a. D.

17) — 20) in Uebersetzung

des von Aristoteles dafür gebrauchten Wortes λευκον, wobei aber auf die durchscheinende weiße Farbe der Sclerotica Rücksicht genommen ist. (S. Aristot. de hist. anim. vert. Gaza, l. 1. c. 9, Galeni comm. 1 prorrh. Hipp. Laur. Laurentiano interpr. c. 13. Vgl. auch J. Placentini n. anat. l. c.)

21) Galeni comm. prorrh. Hipp. l. c. 22) nach Alex. Benedictus (anat.) 23) — 26) S. Taylor's Mechanism. d. Aug. übers. Frankf. a. M. 1750, S. 4.

(Conjungeus sutura, i. q. Sagittalis sutura.

(Connatum calidum wird von v. Linden<sup>1</sup> vom calido nativo durch unterschieden, daß jenes von der Mischung der Theile abhängig ist, und für dieses das Material abgibt. Vgl. Angeborne Wärme.

) melet. med. Hipp. med. phys. §. 40, 50.

(Connectens membrana testem et epididymidem, s. Vasculor-Reg der Hoden.

(Connectentia ligamenta, s. Verbindende Ligamente.

(Connervatio, wörtliche Uebersetzung des Griechischen Wortes συνδεσμος, s. Synthesmose.

(Conuexio, s. Verbindung. — cartilaginea, s. Synchondrose.

(claviculae cum acromio, s. Capselligament des Schulterblatte.

— — sterno et costa prima, s. Capsularligament des Schlüssel- und des Sternum's. — ligamentosa, s. Synthesmose.

(ossis metatarsi quinti et cuboidei, s. unter Tarseische Dors- ligamente der Knochen des Metatarsus, das des fünften Knochen's Metatarsus. — ossium carnosa, s. Syssarcose. — phalan-

n digitorum pedis cum metatarsi ossibus et inter se, s. Capselligamente der Zehenglieder.

(Conuexus, s. Verbindung.

(Conniventes valvulae intestinorum tenuium, s. Kerkrin-, s. Kerkringsche Falten.

(Connubium, s. Ehe.

**Conoide**, (Conoides.) eine mathematische Körperform, die durch Umdrehung irgend einer Curve um ihre Ase gebildet wird, sonst auch ein Conus mit einer länglich runden Basis. Vgl. Conus.

**Conoidea formatio**, s. Conische Bildung.

**Conoideae papillae linguae**, s. unter Papillen der Zunge, vordere Papillen.

**Conoideischer Proceß des Malleus**, (Conodeus processus mallei<sup>1</sup>.) Körper =<sup>2</sup> oder Kegelförmiger<sup>3</sup>, oder Stumpfrunder<sup>4</sup> Fortsatz des Hammers, Fortsatz des Hestes<sup>5</sup>, (Processus brevis<sup>6</sup>, s. minor, s. obtusus<sup>7</sup> mallei, Tuberculum mallei<sup>8</sup>, Apophysis manubrii<sup>9</sup>.) der kurze rundliche Knochenproceß zwischen dem Halse und dem Manubrium des Malleus im innern Ohr, der auswärts abgehend, sich an die Membran des Tympanums, so daß die Spur davon äußerlich sichtlich anlegt. S. unter Ohrknochen.

- 1) Walter's Abb. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 87. 2) Schmezzring's Knochenl. S. 151. 3) 4) Mayer's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 43. 5) Winslow's anat. Abb. Uebers. Berl. 1773, 1. B. S. 144. 6) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1606. 7) Blumenbach's Besch. d. Knoch. S. 142. 8) Schnarschmidt's osteol. Tab. 16. 9) Winslow exp. anat. lat. vers. T. I. tr. de oss. sic S. 416.

**Conoideisches Ligament des Schulterblatts**, (Conoideum Conoideum ligamentum scapulae<sup>1</sup>.) Kegelförmiges<sup>2</sup>, oder Kegelförmiges gemeinschaftliches<sup>3</sup>, oder Rundes<sup>4</sup> Band des Schulterblatts, (Ligamentum conoideum scapulae<sup>5</sup>, commune scapulae conoideum<sup>6</sup>, s. rotundum scapulae, s. scapulae commune primum,) das schlaffe, aber doch aus festen Fasern bestehende rundliche Ligament, welches vom hintern Theile der Wurzel des coracoideischen Processes des Schulterblatts aus sich strahlenförmig an den hintern Rand der Scapularextremität des Schlüsselknochens ansetzt, und in Verbindung mit dem trapezoidischen Ligamente verhindert, daß sich das Schulterblatt zu weit von dem Schlüsselknochen entferne. S. Schulterglenke.

- 1) nach Weitbrecht (syndesm. a. 1. c. 2. 3. 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 684. 3) Loder's anat. Tafeln, Taf. 19. S. 2. Nr. 8. 4) Weitbrecht's Syndesm. Uebers. Straßb. 1779, S. 15. 5) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. O. 6) Loder's Handb. Anat. 1. B. S. 395.

**Conoides**<sup>1</sup>, s. Conoide. — **corpus**, s. **glandula**, s. Zirbeldrüse. **processus**, i. q. **Odontoideus processus**.

- 1) nach dem Griechischen Worte *κωνοειδης*, zapfenförmig.

**Conoideum ligamentum cricothyreoideum**, s. unter Eriothyreoideische Ligamente. — **scapulae**, s. **scapulae commune**, Conoideisches Ligament des Schulterblatts.

**Conoideus processus mallei**, s. Conoideischer Proceß des Malleus.

**Consanguinei**, s. Blutsverwandte.

**Consanguinitas**, s. Blutsverwandtschaft.

**Conscientia**, s. Bewußtseyn, ingl. Gewissen.

**Consectio cadaveris**, s. Anatomische Technik.

**Consensiens nervus magnus capitis**, s. Vager Nerv.

**Consensorius nervus capitis medius**, s. Fünfter Gehirnnerve.



*Consensorius nervus capitis parvus*, f. Facialnerv.

*Consensualis nervus magnus*, f. Intercostalnerv.

**Consistenz**, (*Consistentia*<sup>1</sup>.) Festigkeit<sup>2</sup>, der bestimmte Grad der innern Vereinigung der einen Körper wesentlich constituirenden Theile unter sich, dem entsprechend der Körper einer äußern Gewalt Widerstand leistet, und sich in seiner Verbindung behauptet. Es ist der Dichtigkeit der Körper und dann der Cohäsionskraft ihrer Bestandtheile proportionirt. S. Cohäsion.

1) ein von den spätern Scholastikern gebildetes Wort. 2) Succow's Anfangsgr. d. Phys. u. Chemie, 1. Th. S. 29.

**Consonanten**, (*Consonantes*<sup>1</sup>, sc. *litterae*.) Mitlauter<sup>2</sup>, Gedämpfte oder Beschränkte Selbstlauter<sup>3</sup>, oder menschlichen Sprache diejenigen Elemente, welche nicht, wie die Vocale, den eigentlichen Ton oder Laut bewirken, wohl aber diesen durch Anlegen oder Anstoßen der Zunge an irgend einen Theil der Mundhöhle modificiren, und so die wichtigen Unterschiede der Wortbedeutungen begründen, welche in allen Sprachen der Grundlage nach zwar dieselben doch aber auch selbst nach Nationaleigenheiten ebenfalls charakteristisch verschieden sind. S. Sprache.

1) Quintilian's inst. orat. l. 1. c. 4. 2) 3) Sommering's Eingewidel. S. 115.

*Consortium*, vgl. Confluxio.

*Conspectus*, f. Blick. — *planetarum*, f. Aspecten.

*Conspiratio*, f. Confluxio.

*Constantes dentes*, f. Bleibende Zähne.

*Constantia*, f. Standhaftigkeit.

*Constellation*, (*Constellatio*.) f. Aspecten.

*Consternation*, (*Consternatio*.) f. unter Verlegenheit.

**Constitution**, (*Constitutio*<sup>1</sup>, *Catastasis*<sup>2</sup>.) die Art und Weise des Zusammenseyns der einzelnen Theile, welche ein Ganzes wesentlich bilden, und wodurch es eben das ist, als was es sich stellt. Besonders wird dieß Wort von Witterungsbeschaffenheit, insofern sie auf das organische Leben Einfluß hat, und dann von dem Gesundheitszustand des lebenden Körpers gebraucht. Vgl. Gesundheit.

1) 2) Vgl. Foessii oec. Hipp. v. καταστασις.

*Constitutio cholericæ, melancholicæ, phlegmaticæ, sanguineæ*, Cholericisches, Melancholisches, Phlegmatisches, Sanguinisches Temperament.

*Constitutivæ partes corporum proximæ et remotæ*, f. Theiliche Bestandtheile der Körper.

*Constrictio*, f. Contraction. — *arteriarum et cordis*, f. Systole.

*Constrictiones uteri*, f. Wehen.

*Constrictions musculus vesicæ*, f. Sphincter der Harnblase.

*Constrictor alae nasi*, s. *alarum nasi*, f. Deprimirender Muskel des Nasenflügels. — *ani*, f. Sphincteren des Afters. —

*superi*, f. Deprimirender Muskel des Nasenflügels. — *cunni*,

Constrictor der Vagina.

**Constrictor der Vagina**, (*Constrictor vaginae*<sup>1</sup>.) Zusammenziehender Schammuskel<sup>2</sup>, Scheidenschließer<sup>3</sup>, Zu-

1 — 3) Mayer's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 180.

anat. physiol. Realw. II. B.

sammenzieher der Scheide<sup>4</sup>, Scheidenbeenger<sup>5</sup>, Schließmuskel der Mutterscheide<sup>6</sup>, (Constrictor cunni<sup>7</sup>, s. os vaginae<sup>8</sup>, Sphincter vaginae<sup>9</sup>, Musculus orbicularis vaginae<sup>10</sup>, s. clitoridis inferior, latus et planus<sup>11</sup>, s. labiorum<sup>12</sup>, s. anischio-vulvo-clitorideus<sup>13</sup>, s. anulo-syndesmo-clitorideus<sup>14</sup>), der dünne Muskel des weiblichen Körpers, welcher theils seine Fasern vom äußern Sphincter des Afters, theils von der innern Fläche des aufsteigenden Afters des Sitzstücks des Hüftknochens zieht, an der Nymphen seiner Seite vor- und aufwärts steigt, und in dem gleichnamigen der andern Seite das untere Ende der Vaginaringsringförmig umgibt, und so bei seiner Wirkung dieselbe verengt. Zu gleicher Zeit hängt er mit der Clitoris zusammen, daher er auch wohl zu den Muskeln der Clitoris gerechnet wird. Mehrere Anatomen betrachten diesen Muskel, und mit mehrerem Recht, als einen unpaarigen. C. Genitalien des weiblichen Geschlechts.

- 4) 5) Schmerring's Muscell. §. 226. 6) Leber's Vorles. über Zergliederungskf. Wien 1776, S. 278. 7) nach Albin (hist. musc. hom. 4. ed. p. 288.) 8) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. §. 232. 9) nach Diemerbroeck (anat. corp. h. 1679, p. 151.) 10) nach Laurentius (obs. anat. c. 38.) 11) nach Nodding (anthrop. l. 5. c. 30.) 12) nach Vescot (Koenig regn. anim. p. 187.) 13) nach Schlegel (Nomenclat. d. Musc. S. 24.) 14) (Anulo-syndesmo-clitoriden) nach Dumars (système méthod. de nomenclat. des musc. p. 154.)

*Constrictor glottidis major*, s. Thyreoarytanoideische Muskeln. — *minor*, s. unter Arytanoideische Muskeln. — *isthmus faucium*, s. Glossostaphylinus. — *labiorum*, s. Orbicularmuskel der Lippen. — *nasi*, s. Comprimirender Nasenmuskel. — *os vaginae*, s. Constrictor der Vagina. — *palpebrarum*, s. Orbicularmuskel der Augenlider. — *major*, s. ebendasselbst, äußerste Faserlage. — *vaginae*, s. Constrictor der Vagina.

**Constrictoren der Glottis**, (*Constrictores glottidis*.) Als solche werden auch die thyreoarytanoideischen und die aryanoideischen Muskeln, und zwar erstere als der größere, (Constrictor major,) diese als der kleinere, (Constrictor minor,) bezeichnet. C. Thyreoarytanoideische und Arytanoideische Muskeln.

**Constrictoren des Pharynx**, (*Constrictores pharyngis*.) Zusammenziehende Rachenmuskeln<sup>1</sup>, Schlundkopfschnürer<sup>2</sup>, Zugschnürmuskeln, oder Schließmuskeln des Schlundes, Fleischhaut des Schlundes<sup>3</sup>, (Tunica carnea pharyngis<sup>4</sup>, Oesophageus musculus<sup>5</sup>, Sphincter gulae<sup>6</sup>), die durch die hinterwärts auf der Mitte des Pharynx von beiden Seiten her zusammenlaufenden Muskelfasern gebildete Fleischhaut, welche den Pharynx nach oben umgibt, vorzüglich beim Niederschlucken thätig ist, und wieder aus drei über einander liegenden, auch besonders benannten Muskelpartien besteht, von denen also a) der untere Constrictor<sup>7</sup>, (Constrictor pharyngis inferior, s. infimus<sup>8</sup>)

- 1) nach Albin (hist. musc. hom. 4. ed. p. 209.) 2) Mayer's Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 286. 3) nach Schmerring (Muscell. §. 157.) 4) Leber's Vorles. über d. Zergliederungskf. Wien 1776, S. 197. 5) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. §. 1982. 6) nach Nodding (anthropogr. l. 5. c. 18.) 7) nach Cowper (myotom. ref. p. 10.) 8) Mayer's Besch. n. f. w. a. a. D. S. 288. 10) Albin hist. musc. l.



musculus thyro- et crico-pharyngeus <sup>11</sup>, s. adeno-pharyngeus <sup>12</sup>, s. thyro-adenoides <sup>13</sup>, s. tracheo-pharyngeus <sup>14</sup>, s. thyro-pharyngeus et cricopharyngeus <sup>15</sup>, s. crico-thyro-pharyngeus <sup>16</sup>,) auf jeder Seite vom cricoideischen Knorpel, von dem äußern Horne und der Seitenfläche des thyreoidischen Knorpels und an dessen oberem Horne und dem an diesem befestigten hyothyreoidischen Ligamente entspringt <sup>17</sup>, b) der mittlere Constrictor <sup>18</sup>, (Constrictor pharyngis medius <sup>19</sup>,) Zungenbein- = Schlund- = Muskel <sup>20</sup>, (Musculus hyopharyngeus <sup>21</sup>, s. cerato-pharyngo-occipitalis <sup>22</sup>, s. hyo-glosso-basi-pharyngeus <sup>23</sup>,) dagegen vom großen und kleinen Horne, und auch von der Basis des Zungenknorpels kommt, und mit der durch das Zusammentreten der beiderseitigen Muskelfasern gebildeten Spitze bis an den Occipitalknochen reicht <sup>24</sup>, endlich c) der oberste Constrictor <sup>25</sup>, (Constrictor pharyngis superior, s. supremus <sup>26</sup>, Musculus pharyngeus alticeps <sup>27</sup>, s. pterigo-syndesmo-staphilo-pharyngeus <sup>28</sup>,) herwärts an der innern Fläche des innern Flügels des pterygoideischen Processes des Sphenoidalknochens, am Hamulus desselben, an der Pyramide, an der Flechte des circumflexen Muskel des Gaumens, über schiefen Linie des Unterkiefers, an der Wurzel der Zunge, und theilen auch an dem Gaumenknochen und dem Levator des Gaumens ihren Ursprung hat, auch einige Fasern von dem Buccinator und dem Styloglossus in sich aufnimmt <sup>29</sup>. C. Pharynxmuskeln.

11) Valsalva de aure h. P. 1. c. 2. §. 20. 12) 13) nach Winslow (exp. anat. lat. vers. T. IV. tr. de capite, §. 474 et 484. 14) Morgagni advers. anat. I. §. 28. 15) nach Schreger (Nomenclat. d. Musk. S. 13.) 16) (Crico-thyro-pharyngien,) nach Dumas (Système méthod. de nomenclat. des musc. p. 118.) 17) die besondern Bezeichnungen der einzelnen Portionen s. unter den Artikeln: Thyreopharyngeus, Cricopharyngeus und Syndesmospharyngeus. 18) Maner's Besch. u. f. w. a. a. D. S. 290. 19) Albini hist. musc. etc. p. 212. 20) nach Schaarschmidt (myol. Tabellen, Tab. 7.) 21) Santorini obs. an. c. 6. §. 8. 22) nach Schreger (a. a. D.) 23) (Hyo-grosso-basi-pharyngien,) nach Dumas (a. a. D. S. 116.) 24) die besondern Bezeichnungen der einzelnen Portionen s. unter den Artikeln: Ceratopharyngeus, Basipharyngeus, Chondropharyngeus und Cephalopharyngeus. 25) Maner's Besch. u. f. w. a. a. D. S. 293. 26) Albini hist. m. etc. p. 213. 27) nach Schreger (a. a. D.) 28) (Pterigo-syndesmo-staphili-pharyngien,) nach Dumas (a. a. D.) 29) die besondern Bezeichnungen der einzelnen Portionen, s. unter den Artikeln: Pterygopharyngeus, Mylopharyngeus, Buccopharyngeus, Glossopharyngeus, Geniopharyngeus, Petropharyngeus und Salpingopalatinus.

Constringens musculus labiorum, s. Orbicularmuskeln der Lippen. — — nasi, s. Comprimirender Nasenmuskel.

Construction, (Constructio<sup>1</sup>,) jede Art von Schaffen, Bauen, Zusammenfügung der Natur und der Kunst, in der Körper- wie der Geisterwelt. Von letzterer Art ist die Construction der Wissenschaften <sup>2</sup> zum Behuf der Vernunftkenntniß von Größenverhältnissen. Ueber Construction der Materie <sup>3</sup> überhaupt, wie der geistlichen Producte <sup>4</sup> insbesondere, als höchste Aufgabe der Wissenschaft, vgl. Dynamischer Proceß.

Cicéron. acad. quaest. I. 4. c. 24. 2) Vgl. Kant's Crit. d. reinen Vernunft, 3. Aufl. S. 865. 3) 4) Meil's Entw. etc. allg. Pathol. I. B. S. 26.

*Constructio corporis et partium*, f. Körperform und Körperliche Form.

*Consuetudo*, f. Gewohnheit.

*Contact*, (*Contactus* <sup>1</sup>), die unmittelbare Berührung zweier Körper oder Körpertheile, ohne Cohärenz, oder wobei ihre Cohärenz wegen Geringsfügigkeit nicht in Betrachtung kommt, und die also immer noch als zwei verschiedene Körper zu betrachten sind. Vgl. Continuität.

<sup>1</sup>) Virgil. Aen. l. 3. c. 241.

*Contactus nervorum opticorum*, f. Decussation der Sehnerven.

*Contemplation*, (*Contemplatio* <sup>1</sup>), innere Beschauung der ernstesten Gegenstände, die dem Geiste gleichsam vor Augen schweben. Vgl. Nachdenken, ingl. Phantasie, Tieffinn.

<sup>1</sup>) Ciceronis de nat. Deor. l. 1. c. 19.

*Contemplatives Leben*, (*Contemplativa vita*), Theosophie.

*Contemptio*, *Contemptus*, *Contentio*, *Contemtus*, f. Achtung.

*Contenta*, f. Enthaltende und Enthaltene Theile.

*Contentio*, f. Spannung.

*Contextura*, *Contextus*, f. Gewebe.

*Contextus cellulosus*, f. Zellgewebe. — *choroides cerebri*, f. Choroideische Plexus des Gehirns. — *fibrosus*, s. *mucosus*.  
*Contextus spongiosus*, f. Zellgewebe. — *spongiosus mirabilis ossium*, f. Reticularstellung der Knochen.

*Contigua corpora*, *Contignae partes*, f. unter Continuität.

*Contiguität*, (*Contiguitas*), f. unter Continuität.

*Continentes partes*, f. Enthaltende und Enthaltene Theile.

*Continentia*, f. Enthaltbarkeit.

*Continua spina*, f. Crista.

*Continuität*, (*Continuitas* <sup>1</sup>), Berührung mit Zusammenhang, so daß dadurch Einheit bewirkt wird. Der Gegensatz von ist Contiguität, (*Contiguitas*); sie findet Statt zwischen zwei Körpern, die sich bloß einander berühren, ohne zusammenzuheften, (*Corpora contigua* <sup>2</sup>). Mathematisch aber ist der Continuität das Discrete entgegengesetzt. Vgl. Cohäsion.

<sup>1</sup>) Plinii hist. nat. l. 8. c. 30. <sup>2</sup>) Winkleri inst. phil. nov. ed. 2. §. 2.

*Contractilität*, (*Contractilitas*.) Sobald Wärme oder eine andere ausdehnende Kraft aufhört, auf einen elastischen Körper wirken, so kehrt er wieder in seinen vorigen Umfang zurück. Die Zusammenziehbarkeit haben einige Naturforscher von der Elasticität oder der Fähigkeit, nach vorausgegangener Zusammendrückung sich auszuweiten, getrennt, obgleich beide auf derselben Verschiebbarkeit der Theilchen beruhen. Man kann jedoch die gemeinhin elastisch genannten Körper, nachdem die Zusammenziehbarkeit, oder Ausdehnbarkeit in ihnen vorherrscht, in contractile und elastische unterscheiden. In solchem Sinne zählen wir zu den contractilen den elastischen Haaren, so wie viele weiche Organe der Organismen. Man erklärt daher die Erscheinungen, welche niedrig organisirte Thiere, Gewürme, Schlangen, in ihrem ganzen Umfange zu erkennen geben, die Contract



des nach der Geburt entleerten Uterus, die Wirkung der Schließmuskeln, der Bewegungsmuskeln, der Arterien, welche dadurch nach dem Tode des Körpers noch im Stande sind, sich zu entleeren. Vgl. Irritabilität. (Ficinus.)

**Contraction**<sup>1</sup>, (*Contractio*<sup>2</sup>.) Zusammenziehung, Zusammenrumpfung, Verkürzung, (*Contractura*<sup>3</sup>, *Contractio*<sup>4</sup>.) das theils von der Elasticität der einzelnen Theile des Körpers, theils von der Irritabilität, insbesondere der muskulösen Organe begründete innigere Zusammengehen oder Kürzerwerden der kleinsten Fibern, wovon insbesondere die Lebensbewegungen abhängen. Vgl. Contractilität, ingl. Irritabilität.

1) Döllinger's Grundr. d. Natur d. menschl. Organism. S. 54. 2) Cicero de nat. Deor. 1. 2. c. 60: „Contractio digitorum.“ 3) Vitruvii de archit. 1. 5. c. 7. 4) Macrobiani saturn. 1. 7. c. 6.

**Contractiones uteri**, s. Wehen.

**Contractive Kraft**, s. Attraktionskraft.

**Contractura**, s. Contraction.

**Contraextensio**, s. Antitaxis.

**Contrafactur**, schlecht gebildetes Wort statt Bildung<sup>1</sup>.

So in dem Buchtitel: Summar. Erklärung der anatomischen Contrafactur eines Mannesbildes, Strassburg 1606, 8.

**Contrahens musculus communis buccarum labiorumque**, i. q. cecinator.

**Contrahuararis mulier**<sup>1</sup>, eine während ihrer Menstruation verlängerte Frau. Vgl. Menstruation.

1) Dieterichii Iatrum Hippocr. Nr. 586.

**Contuitus**, s. Blick.

**Contumbres**. i. q. Antiscii.

**Conus**, (*Conus*<sup>1</sup>.) Kegelform<sup>2</sup>, eine bekannte Körperform mit einer Basis, die von allen Punkten aus concentrisch in einen über die eigne Fläche erhabnen Punkt, oder in eine Spitze ausläuft.

Conoide ist ein Kegel mit nicht cirkelrunder Basis. So wird das Herz wohl auch als eine Conoide (*Conoides*.) bezeichnet. Von dem Worte werden die Adjective Conisch oder Conoideisch abgeleitet, deren in den frühern Artikeln gedacht ist.

Entsprechend dem Griechischen Worte *κωνος* (*Galenus de usu part. 1. 10. c. 12.*) 2) Wolf's Ausz. a. den Anfangsgr. aller mathemat. Wissenschaften, Frankfurt. u. Leipzig. 1752, S. 147.

**Conus arteriosus ventriculi cordis anterioris**, s. Arterioförmiger Ausfluß des vordern Herzventrikels. — **cochleae**, s. Mobiolus der Schale. — **cordis**, s. Spitze des Herzens.

**Convalescentia**, s. Reconvalescenz.

**Convenienz**, (*Convenientia*.) vgl. Harmonie.

**Convergente Richtung**, (*Convergens*<sup>1</sup> *directio*,

**Convergenz**, (*Convergentia*<sup>2</sup>.) Hinneigung mehrerer geraden Linien zu einem gemeinschaftlichen Punkt, sowohl in der Lage als in der Bewegung, so besonders der Lichtstrahlen beim Durchdringen in das Auge. Vgl. in dieser Hinsicht Sehen.

2) in den neuen physischen Schulen dem Gegensatz *devergens*, *devergentia*, analog gebildetes Wort.

**Conversor**, i. q. Atlas.

**Convexe Fläche**<sup>1</sup> oder **Seite**, (*Convexa*<sup>2</sup> *facies*, *superficies*,) äußere gewölbte Seite eines Theils. S. **Convexität**.

<sup>1</sup>) Eoder's anat. Handb. 1. Th. S. 27.    <sup>2</sup>) Ovid. met. l. 6. v. 697.

**Convexe Fläche der Leber**, (*Convexa facies*, *superficies hepatis*,) s. unter **Flächen der Leber**, ob Fläche.

**Convexität**<sup>1</sup>, (*Convexio*<sup>2</sup>, *Convexitas*<sup>3</sup>,) äußere Wölbung eines Theils, besonders im Gegensatz ihrer innern Hohlheit oder der **Concavität**.

<sup>1</sup>) Eoder's anat. Handb. 1. B. S. 27.    <sup>2</sup>) Gelli noct. Att. l. 14. c.

<sup>3</sup>) Plinii hist. m. l. 18. c. 25.

**Coopercula**<sup>1</sup> *oculorum*, s. **Augenslider**.

<sup>1</sup>) Im eigentlichen Sinne **Deckel**.

**Coopertoria cartilago**, s. **Thyreoidischer**, ingleichen **Erioidischer Knorpel**.

**Coordinatio ossium**, s. **Knochenverbindung**.

**Coostrium**, s. **Diaphragma**.

**Copiosiores papillae linguae**, s. unter **Papillen der Zunge**, mittlere Papillen.

**Copros**, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte<sup>1</sup>, i. **Stercus**, s. **Darmkoth**.

<sup>1</sup>) κωπος.

**Copula**<sup>1</sup>, jede Art von Bindemitteln, auch Verbindung selbst, daher auch **Ligament**, auch **Begattung**<sup>2</sup>. Vgl. **Verbindung**.

<sup>1</sup>) ursprünglich das Band, womit Jagdhunde zusammengehalten werden, daher das Deutsche Wort **Kuppel**. (Corn. Nep. vit. ill. imp. v. 14. c.)

<sup>2</sup>) Zachiae quaest. med. leg. v. 1.

**Copula cartilaginea**, s. **Synchondrose**. — **nervorum optici**, s. **Decussation der Sehnerven**.

**Copulativi nervi**, s. **Ligamente**.

**Cor**, s. **Herz**, auch **Herzgrube**, ingleichen **Cardia**, auch **Diaphragma**, vgl. auch **Geist**, **Gemüth**. — **abdominale**, s. **Abdominale cor**.

**Cora**, i. q. **Core**, s. **Pupille**.

**Coraco-Acromialligament**, (*Coraco-acromiale ligamentum*<sup>1</sup>,) **Hackengrathenband**<sup>2</sup>, **Borderes**<sup>3</sup>, oder **Größeres**<sup>4</sup>, oder **Dreieckiges**<sup>5</sup> eignes **Schulterband** (*Ligamentum scapulae triguetrum*<sup>6</sup>, s. **proprium major**<sup>7</sup>.) **Acromio** = **Coracoideisches Ligament**.

<sup>1</sup>) — <sup>7</sup>) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 331.

**Coracobrachialis**<sup>1</sup>, (*Coraco-brachialis*<sup>2</sup>, *Coracobrachiaeus*, s. **Coraco-brachieus**, sc. **musculus**,) **Hackenarmmuskel**<sup>3</sup>, **Hackenmuskel**<sup>4</sup>, **Krähenschnabelmuskel**<sup>5</sup>, **Durchbohrter Muskel**<sup>6</sup> des Oberarms, **Durchgebohrter Achselmuskel**<sup>7</sup>, **Durchbohrter Muskel** des **Casserius**<sup>8</sup>, **Nabenschnabelmuskel** des Arms<sup>9</sup>, **Nabenschnabelarmmuskel**<sup>10</sup>.

<sup>1</sup>) Eoder's anat. Tafeln, Taf. 26. Nr. 72.    <sup>2</sup>) nach Cowper (myol. ref. c. 25.)    <sup>3</sup>) nach Sommering (Muskel. S. 244.)    <sup>4</sup>) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. Th. S. 498.    <sup>5</sup>) Hildebrandt's Lehrb. Anat. d. M. 2. B. S. 1181.    <sup>6</sup>) Browne's verteilte Besch. d. M. v. Spener, Berl. 1704, S. 54, Anmerkung.    <sup>7</sup>) Mojer's Berl. d. menschl. A. 3. B. S. 363.    <sup>8</sup>) Kleutaud's Vergliederungsf. Uebers. 1782, 1. B. S. 376.



19, Rabenmäuslein <sup>10</sup>, (Musculus coracoideus <sup>11</sup>, s. perforatus humeri <sup>12</sup>, s. perforatus Casserii <sup>13</sup>, s. coraco-humeralis <sup>14</sup>,) der gemeinschaftlich mit dem kurzen Kopfe des Coracobrachialis vom coracoideischen Prozesse des Schulterblatts entspringende, vorwärts gehend und von dem Muskelhautnerven des Brachialnervens aus durchbohrt, sich an der innern Fläche des Oberarmknochens, von dessen Mitte hin, ansetzende Muskel, dessen Wirkung ist, den Oberarm vorwärts in die Höhe heben zu helfen. S. unter Armmuskeln, Oberarmmuskeln. Vgl. auch unter Coracobrachialis den kurzen Kopf.

9) Palfyn's chr. Anat. übers. v. Huth, 1. Th. S. 275. 10) nach Kulmus (anat. Tabellen, Tab. 28) 11) nach Rolan (anthropogr. 1. S. c. 21.) 12) nach Casserius (tab. anat. tab. 19 in oper. Spigelii.) 13) Hildebrandt's Lehrb. u. s. w. a. a. O. Casserius bezeichnete diesen Muskel zwar, aber entdeckte ihn nicht, da ihn schon Vesalius und Columbus beschrieben haben. 14) (Coraco-humeral) nach Chaussier (expos. sommaire des musc. etc. p. 20 et 11.)

Coracobrachialis Schleimsack, (Coraco-brachialis bursa mucosa <sup>1</sup>,) Schleimsack des Rabenschwabel-Armmuskels <sup>2</sup>, hat seine Lage zwischen dem Insertionspunkte des Coracobrachialis, dem Kopfe des Coracobrachialis und dem Capselligamente des Oberarmknochens. S. Schleimsäcke.

2) nach Fischer (Anweis. zur Zergliederungsk. 1. Th. S. 160.)

Coraco-brachius, sc. musculus, s. Coracobrachialis.

Coracoclaviculärligament, (Coraco-claviculare ligamentum <sup>1</sup>,) Hackenschlüsselband <sup>2</sup>, das coracoideische und trapezeische Ligament des Schulterblatts zusammen als ein einziges bezeichnet, da beide eigentlich nur als zwei in der Richtung ihrer Fasern etwas verschiedene Bündel erscheinen. S. Schultergelenke.

2) nach Meckel (Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 530.)

Coraco-costoideum ligamentum, s. Coracoideisches Ligament.

Coraco-humeralis musculus, i. q. Coracobrachialis.

Coraco-hyoideus, s. coraco-hyoideus, s. coraco-hyoideus musculus, i. q. Omohyoideus.

Coracoidea apophysis, s. Coracoideischer Proceß des Schulterblatts. — bursa mucosa, s. Coracoideischer Schleimsack.

Coracoideischer Proceß des Schulterblatts, (Coracoideus <sup>1</sup>, Coracoideus <sup>2</sup> processus scapulae,) Rabenschwabel <sup>3</sup>, Rabenschwabelfortsatz <sup>4</sup>, Ankerförmiger Fortsatz <sup>5</sup>, Schulterhaken, Schwabelfortsatz <sup>6</sup>, oder Hackenfortsatz <sup>7</sup>, oder Rabenschwabelförmiger <sup>8</sup>, oder Rabenschwabelähnlicher <sup>9</sup> Fortsatz des Schulterblatts, processus rostriformis <sup>10</sup>, s. cornicularis <sup>11</sup>, s. unciformis <sup>12</sup>.

1) nach der Griechischen gleichen Benennung κορακοειδης, einem Raben, eigentlich aber einem Rabenschwabel ähnlich. (Galenii de oss. 1. v. c. 14.) S. auch Bartholini anat. libell. 4. c. 19. 2) Leberi prael. anat. ed. nov. Vindob. 1778, p. 76. 3) Feder's anat. Tafeln, Taf. 11. Fig. 5. Nr. 17. 4) 5) Kulmus anat. Tabellen, Tab. 5. 6) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 676. 7) Edmerring's Knochenl. S. 463. 8) Walter's Abb. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 284. 9) Meutaud's Zergliederungsk. Uebers. Leipz. 1782, 1. B. S. 179. 10) Monto's Knochenl. übers. v. Krause, S. 371, Note. 11) S. Note 12.

mis, s. ancoralis, s. anchoralis <sup>12</sup>, s. ancyroides <sup>13</sup>, anchoroides <sup>14</sup>, s. anchoroides, s. anchoraeformis <sup>15</sup>, s. ancoriformis, s. ancistroides, s. digitalis, s. sigmoides <sup>16</sup>, Apophysis coracoidea <sup>17</sup>,) der von dem obern Theile des Halses des Schulterblatts schräg auf- und vorwärts abgehende, und dann in schräger Richtung nach außen und vorn in eine stumpfe Spitze auslaufende, besonders an seiner vordern obern Fläche rauhe Knochenproccus, welcher dem großen Pectoralis, dem Coracobrachialis und dem kurzen Kopfe des Coracoradialis zur Anlage, aber auch vorwärts zum Schulter- und zur Sicherheit des Schultergelenks dient. S. Schulterblatt.

12) Böhmer's Knochenl. S. 495.

13) 14) dem Griechischen Worte *αγκυροειδης* entsprechend. Verheyen c. hum. anat. tr. 5. c. 12.

15) S. gelii de h. c. fabr. l. 1. c. 17.

16) Bauhini theatr. anat. l. c. 31.

17) Winslow exp. an. lat. v. T. I. tr. de oss. sicc. S. 61.

**Coracoideischer Schleimsack**, (*Coracoidea bursa mucosa*) Schleimsack des rabensch nabelähnlichen Fortsatzes <sup>2</sup>, findet sich zwischen dem innern Theile der Wurzel des coracoideischen Processes, der Sehne des Subscapularmuskels und dem Capsellimente des Oberarmknochens. Dessen sind ihrer zwei oder drei. Schleimsäcke.

1) 2) nach Fischer (Anweis. zur Zergliederungsk. 1. Th. S. 160.)

**Coracoideisches Ligament**, (*Coracoideum ligamentum* <sup>1</sup>,) Eigenes hinteres <sup>2</sup>, oder Kleines Band <sup>3</sup>, oder Oberes Querband <sup>4</sup> des Schulterblatts, Hackenband, Hackenrippenband <sup>5</sup>, (*Ligamentum coraco-costoideum* s. *scapulae transversum* <sup>8</sup>, s. *proprium posterius* <sup>9</sup>, s. *minus* s. *obliquum* <sup>11</sup>, s. *suprascapulare transversum* <sup>12</sup>,) das die Ligament, welches sich von einem Ende der Suprascapular-Inci zu dem andern begibt, dieselbe oberwärts verschließt, und so den diesem Ausschnitt befindlichen Gefäßen und Nerven des Schulterblatts eine sichere Lage gewährt, aber auch zuweilen verknöchert, oder auch doppelt gefunden wird. S. Schulterblatt.

1) nach Meckel (Handb. d. menschl. Anat. 2. Th. S. 332.)

2) Edm. ring's Wandel. S. 40.

3) nach Meckel (a. a. D.)

4) nach Mayer (Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 223.)

5) — 7) nach Meckel (a. a. D.)

8) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 677.

9) nach Weber (syndesm. p. 19.)

10) 11) Meckel's Handb. u. f. w. a. d.

12) nach Mayer (a. a. D.)

**Coracoideus musculus**, s. Coracobrachialis, vgl. auch Deltoides.

**Coracomoplatto-radialis biceps musculus**, i. q. Coracoradialis.

**Coraco-pectoralis musculus**, i. q. Serratus pectoris anterior.  
**Coracoradialis**, (*Coracoradialis* <sup>1</sup>, sc. *musculus* Zweifbüchiger <sup>2</sup>, oder Zweifköpfiger <sup>3</sup> Armmuskel, Zweifköpfiger Muskel <sup>4</sup>, oder Zweifköpfiges Mäuflein <sup>5</sup> des Arms, Beuger des Vorderarms, Rabensch nabelsehnend.)

1) nach Winslow (expos. anat. lat. vers. T. II. tr. de musc. S. 227.)

2) Edm. ring's Musc. S. 245.

3) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 2. B. S. 1183.

4) Cuvier's Zergliederungsk. Uebers. 2. 1782, 1. B. S. 386.

5) nach Kulmus (anat. Tabellen, Tab. 28.)



Armrohrenmuskel<sup>6</sup>, oder Zweiköpfiger Beuger<sup>7</sup>, oder Speichenbeuger<sup>8</sup>, (Musculus biceps brachii<sup>9</sup>, s. biceps manus<sup>10</sup>, s. biceps internus<sup>11</sup>, s. radio-scapularis, s. scapulo-coraco-radialis<sup>12</sup>, s. coracomoplatto-radialis biceps<sup>13</sup>, scapulo-radialis<sup>14</sup>, Pisciculus<sup>15</sup>,) der länglich runde, an der innern Seite des Oberarms liegende Muskel, welcher mit zwei in der Mitte des Oberarms zusammentretenden Köpfen vom Schulterblatte entspringt, abwärts steigt, sich mit einer runden Fledse, in welcher eine Fortsetzung schräg nach innen zur Muskelscheide des Vorderarms übergeht, an die Tuberosität des Radius befestigt, und nicht nur den Vorderarm beugt, sondern auch zur Supination beizugt. Merkwürdig ist der Ursprung dieses Muskels vom Schulterblatt, indem nämlich a) dessen kürzer Kopf<sup>16</sup>, (Caput breve<sup>17</sup> bicipitis,) auch Hackenspeichenmuskel<sup>18</sup>, (M. coracobrachialis<sup>19</sup>,) in Verbindung mit dem Coracobrachialis vom coracoideischen Proceß des Schulterblatts entspringt, b) sein langer Kopf<sup>20</sup>, (caput longum<sup>21</sup> bicipitis, Musculus glenoradialis<sup>22</sup>,) aber eine schmale Sehne vom obern Rande der Glenoidalhöhle desselben nimmt, über den Kopf des Oberarmknochens und durch dessen Capselliment geht, und in dem Sulcus des Oberarmknochens in fleischig, dann zu seiner Vereinigung mit seinem kurzen Kopfe fleischig sich fortsetzt. unter Arm muskeln, Unterarm muskeln.

- 6) Palfyn's chir. Anat. übers. v. Huth, 1. Th. S. 279. 7) 8) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 501. 9) nach Riolan (anthropogr. 1. 5. c. 25.) 10) Stenonis elem. myol. 51.) 11) nach Douglas (myogr. compar. c. 31. 12) (Scapulo-coraco-radial) nach Chaussier (expos. sommaire des musc. p. 11.) 13) nach Schreger (Nomenclat. d. Muskl. S. 18.) 14) (Scapulo-radial) nach Dumeril (Euvier's Vorl. über vergl. Anatom. S. 356.) 15) (Ital. Piscette.) Spigelii de hum. c. fabr. 1. 4. c. 15. 16) 17) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 2. B. S. 1183. 18) 19) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. Th. S. 501. 20) 21) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. 22) Meckel's Handb. u. f. w. a. a. D. S. 502.

(Corcillum, Corculum, Diminutiv von Cor, f. Herzchen.

(Corculus, f. Weiser.

(Cordae, ungewöhnliche Paracelsische Bezeichnung<sup>1</sup> der männlichen Geschlechtstheile.

1) Th. Paracelsi von den Granjosen, 7. Buch 11. u. 8. Buch 3. Cap.

(Cordatus, f. Weiser.

(Cordiformis cartilago manubrii sterni, f. Herzförmiger Knorpel des Manubriums des Sternum's.

(Core, in Uebersetzung des gleichen Griechischen Wortes<sup>1</sup>, eigentlich ein Mädchen, sodann in der Bedeutung von Pupille.

1) κορη. Vgl. Foessii oec. Hipp. h. v.

(Coricillum, f. Herzchen.

(Coriformes plexus cerebri, f. Choroideische Plexus des Gehirns.

(Corium, (Corium<sup>1</sup>, s. Corius<sup>2</sup>,) Haut<sup>3</sup>, Leder der 1) Ciceronis de nat. Deor. 1. 2. c. 47: „Animantium aliae coriis tectae sunt, etc.“ 2) nach Plautus (Poemat. Act. 1. s. I. v. 11.) 3) Ambros. Paracelsus Wunderarznei, übers. v. P. Uffenbach, 1601, S. 96.

Haut<sup>4</sup>, Lederhaut<sup>5</sup>, Fell<sup>6</sup>, (Cutis<sup>7</sup>, Pellis<sup>8</sup>, Tergus<sup>9</sup>, Vagina membrorum, Membrana corporis, Bursa<sup>10</sup>, Velamen s. Tegmen<sup>11</sup>, s. Vestimentum nativum. Exuvium, Anthrope<sup>12</sup>, Byrsa<sup>13</sup>, Derma<sup>14</sup>.) die eigentliche Grundlage der allgemeinen Bedeckungen des Körpers, welche durch ihre Stärke, Zähigkeit, Elasticität und Ausdehnbarkeit, auch dadurch, daß sie mit vielen Blutgefäßen, Nerven und absorbirenden Gefäßen versehen ist, sich von dem über ihr liegenden Malpighischen Schleim und der Epidermis, die beide ihr zum Ueberzug dienen, auszeichnet, und zugleich mit jenen den ganzen Körper überzieht, und ihm zur äußern Hülle dient. Sie wird nach innen zu lockerer, und erscheint dann als Zellgewebe, (Tela cellulosa subcutanea.) Im weitern Sinne begreift man auch unter einigen obigen Benennungen, vorzüglich unter Haut, (Cutis,) Fell, die Körperbedeckungen zusammen, nämlich das Corium, den Malpighischen Schleim und die Epidermis. *Integumente des Körpers.*

4) Hildebrandt's Lehrb. Anat. d. M. 2. B. S. 1310. 5) Hildebrandt's

pells Anfangsgr. d. Anat. 2. Aufl. S. 114. 6) Hildebrandt's Lehrb.

u. s. w. a. a. D. 7) Persii satyr. 3. v. 63: „Cutis aegra tum-  
bit“ etc. Vesalii de hum. c. fabr. l. 2. c. 5. 8) eigentl. abgezogene

Haut; doch sagt Horaz auch „in propria quiescere pelle,“ (sat. l. 1. s. 1. v. 64.) Spigelii de hum. c. fabr. l. 8. c. 1. 9) Virgil.

Aeneid. l. 17. v. 215: „tergora diripiunt costis.“ 10) nach dem Griechischen Worte *βύρσα*, das aber eigentl. eine abgezogene Haut bedeutet. 11)

eigentl. nur von abgezogenen Thierhäuten gebräuchlich, wie auch Exuvia. 12) nach Herodot, vgl. Vesalii de corp. h. fabr. l. 2. c. 5. 13) Vgl. dieß Wort, auch Note 10. 14) Meckel's Handb. d. menschl. Anat.

1. B. S. 580.

*Cornea*, (*Cornea*<sup>1</sup>.) Hornhaut<sup>2</sup>, Äußere, Hart, Feste, Derbe Augenhaut, (Tunica cornea<sup>3</sup>, s. cornicularis s. corniformis<sup>4</sup>, s. cornularia<sup>5</sup>, Membrana cornea<sup>6</sup>, s. ceratoides<sup>7</sup>, s. ceratois<sup>8</sup>, s. ceratodes,) die denjenigen runden Raum, welchen vorwärts die Sclerotica oder auswendige Haut des Augapfels offen läßt, in einer größern Wölbung als jene ausfüllende im natürlichen Zustand völlig durchsichtige Haut des Augapfels. Doch befaßen ältere Anatomen<sup>8</sup> auch unter dem Namen Cornea die Sclerotica und die eben gedachte zusammen, und nennen dann jetzt die undurchsichtige Hornhaut<sup>9</sup>, (Cornea opaca<sup>10</sup>.) die aber durchsichtige Hornhaut<sup>11</sup>, durchsichtiges Hornhäutlein<sup>12</sup>, (Tunica transparen<sup>13</sup>, s. pellucida<sup>14</sup>.) *Cornea* Auge.

1) wörtlich hornartig. Spigelii de hum. corp. fabr. l. 1. c. 9.

2) Taylor's Mechanism. d. menschl. Auges, Uebers. Franff. a. M. 1756, S. 23) Bartholini anat. l. 3. c. 3. 4) Vesalii de hum. c. fabr. l. c. 14. 5) Stephani diction. med. 1564, p. 540. 6) Halle

elem. physiol. T. V. l. 16. S. 3. 7) Vgl. dieß Wort. 8) nach Gien's Vorgang (de usu part. l. 10. c. 3.) 9) — 11) Hildebrandt

Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1431. 12) Kalmus anat. Tabell. Tab. 13) 14) Hildebrandt's Lehrb. u. s. w. a. a. D.

*Cornea membrana*, s. Cornea. — *opaca*, s. Sclerotica.

*pellucida*, s. Cornea. — *substantia dentium*, s. Hornige Matter der Zähne. — *transparens tunica*, s. Cornea.

*Corneae striae cerebri*, s. Wieussens halbeisförmiger Mittelpunct.



*Cornicula* <sup>1</sup> *cartilaginum arytaenoidarum semiligamentosa*, f. Santorinische Körperchen. — *ossis hyoidei interna*, unter Hörner des Zungenknochens, die kleinern Hörner. — *sphenoidalea*, f. Sphenoidalhörner.

2) Diminutiv von *Cornua*, Hörner.

*Coriicularis processus scapulae*, f. Coracoideischer Proceß.

*Corniculo-lingualis musculus* <sup>1</sup> i. q. Chondroglossus.

*Corniiformis tunica*, f. Cornea.

*Cornix*, f. Coronoidischer Proceß.

*Cornu Ammonis*, f. unter Hypocampusfüße, größerer Fuß. — *glandulae thyreoideae medium*, f. unter Isthmus der Schilddrüse. — *ossis hyoidei majus et minus*, f. Hörner des Zungenknochens. — — *pubis inferius*, f. unter Aeste des Schooßstücks Hüftknochens, absteigender Ast. — *ventriculi cerebri lateralis*, *anterius, descendens, s. inferius, s. laterale, s. medium, posterius*, f. Hörner der großen Hirnhöhlen.

*Cornua acetabuli*, f. Hörner des Acetabulum. — *arytaenoidalea*, f. Santorinische Körperchen. — *cartilaginea ossis hyoidei*, f. unter Hörner des Zungenknochens, die kleinern. — *cartilaginis thyreoideae*, f. Hörner des thyreoideischen Knorpels. — *cartilaginum semilunarium genu*, f. Hörner der semilunären Knorpel des Kniegelenks. — *cerebri*, f. Hörner der großen Hirnhöhlen. — *coccygea*, f. Hörner des Coccyxknochens. — *glandulae thyreoideae*, f. Loben der thyreoideischen Drüse. — *lacrymalia, limacum*, f. Lacrymalcanäle. — *maxillae inferioris*, f. Aeste Unterkiefers. — *ossis frontis*, f. Zygomatischer Proceß des Stirnknochens. — — *hyoidei*, f. Hörner des Zungenknochens. — *pericardii*, f. Hörner des Pericardiums. — *sacralia*, f. Sacralhörner. — *sphenoidalia*, f. Sphenoidalhörner. — *uteri*, f. Fallopische Trompeten. — *ventriculorum cerebri lateralia*, f. Hörner der großen Hirnhöhlen.

*Cornularis tunica oculi*, f. Cornea.

*Cornuta pars ventriculi lateralis cerebri*, f. unter Hörner der Ventrikel des Gehirns, absteigendes Horn.

*Corolla oculi*, f. Conjunctiva.

*Corona*, in gewöhnlicher Bedeutung eine Krone, wird in der anatomischen Nomenclatur metaphorisch zur Bezeichnung unterschiedlicher Theile, namentlich der folgenden gedachten gebraucht. Vgl. aber auch *Corone*.

*Corona ciliaris*, f. Ciliarkörper, auch Ciliarzona. — *cordis* <sup>1</sup>, f. Grundfläche des Herzens. — *basidis*, f. Basis des Herzens. — *denticulata*, f. Krone der Zähne. — *glandis*, f. Krone der Eichel. — *maxillae inferioris*, f. Coronoidischer Proceß des Unterkiefers. — *oculi*, f. Iris. — — *denticulata*, f. Mucöser Ring des Auges. — — *media*, f. Iris. — — *nigra ciliaris*, f. Mucöser Ring des Auges. — *ulnae*, f. Coronoidischer Proceß der Ulna. — *uteri*, f. Uterusmund. — *vasculosa tympani*, f. Arteriöser Kranz des Tympanums.

2) Mayer's Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 102.

*Coronae ossis occipitis*, f. Condylloideische Proceſſe des Occipitalknochens. — *palpebrarum*, i. q. Tarsi palpebrarum.

*Coronale os*, f. Stirnknochen.

*Coronales arteriae cordis*, f. Coronariſche Herzerterien.

*Coronalis margo ossis bregmatis*, f. Coronaland des Scheitelsknochens. — *sutura*, f. Coronalsutur. — *vena cordis*, f. unter Coronariſche Herzvenen, vordere Vene.

**Coronaland des Scheitelsknochens**, (*Coronalis margo ossis bregmatis* <sup>1)</sup>, Kranzrand <sup>2)</sup>, oder Stirnrand, oder Kronenrand <sup>3)</sup> des Scheitelbeins, der gezackte vordere Rand des Scheitelsknochens, welcher mit dem Coronalande des Stirnknochens gemeinſchaftlich die Coronalsutur bedeckt. S. Scheitelsknochen.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 143. 2) Sommering's Knochenl. S. 101. 3) Foder's anat. Tafeln, Taf. 5. Fig. 3. Nr. 4.

**Coronalsutur**, (*Coronalis sutura* <sup>1)</sup>, Kranznaht <sup>2)</sup>, Kronennaht <sup>3)</sup>, Kronnath, Cronnath, Stirnath <sup>4)</sup>, (*Sutura coronaria* <sup>5)</sup>, s. *stephaniaea* <sup>6)</sup>, s. *sincipitis* <sup>7)</sup>, s. *arcualis* <sup>8)</sup>, s. *puppis* <sup>9)</sup>, s. *calvariae transversa prior* <sup>10)</sup>, s. *anterior* <sup>11)</sup> die durch das Zusammentreten der vordern gezackten Ränder der beiden Scheitelsknochen mit dem hintern, ebenfalls gezackten Rande des Stirnknochens gebildete Knochennaht, welche ſich quer über den vordern obern Theil des Gehirnschädels erſtreckt. S. Hirnschädel.

1) Riolani anthropogr. Paris. 1626, p. 784. 2) Sommering's Knochenl. S. 100. 3) Foder's anat. Handb. 1. B. S. 39.

Medel's Handb. d. menschl. Anat. 1. B. S. 245. 5) — 7) nach Ryfus von Aegyptiſchen Aerzten ſo bezeichnet. Vgl. Stephani dict. med. 156 p. 538. 8) 9) nach den Arabern. S. Laurentii anat. 1. 2. c. 10) 11) C. Bauhini theatr. an. 1. 3. c. 5.

**Coronararterien**, f. unter Coronariſche Gefäße. — gefäße f. ebendaſ.

*Coronaria arteria cordis anterior, dextra, inferior, posterior, sinistra, superior*, f. Coronariſche Herzerterien. — *labii inferioris et superioris*, s. *labiorum*, f. Coronariſche Lippenarterien. — *stomachica*, s. *ventriculi dextra, inferior, major, minor, sinistra, superior*, f. Coronariſche Magenarterien, ingauch Gastroepiploische Arterien. — *sutura*, f. Coronalsutur. — *stomachica vena, Coronaria vena, Coronaria vena stomachi*, f. unter Coronariſche Magenvenen, größte Vene. — *vasa* f. Coronariſche Gefäße. — *vena cordis anterior, media, posterior, superior*, f. Coronariſche Herzvenen. — *stomachica s. stomachi dextra, major, minor, sinistra*, f. Coronariſche Magenvenen.

*Coronariae arteriae et venae*, f. Coronariſche Gefäße. — *labiorum*, f. Coronariſche Lippenarterien. — *ventriculi*, Coronariſche Magenarterien. — *venae cordis*, f. Coronariſche Herzvenen. — *ventriculi*, f. Coronariſche Magenvenen.

*Coronarii plexus nervosi cordis*, f. Coronariſche Herznerven geflechte.

**Coronario - stomachicus plexus**, f. unter Gaſtriſche Nervengeflechte, vorderer Plexus.



**Coronarische Gefäße**, (*Coronaria vasa*<sup>1</sup>.) Kranzgefäße<sup>2</sup>, Coronargefäße, Coronararterien, Coronarvenen, (*Coronariae arteriae et venae*.) Arterien und Venen, die gewisse Theile, namentlich das Herz, die Lippen, den obern Theil des Magens kränzig umgeben. S. die folgenden Artikel.

1) 2) Mayer's Besch. d. Blutgef. d. menschl. K. S. 17

**Coronarische Herzarterien**, (*Coronariae arteriae*<sup>1</sup> cordis,) Kranzarterien<sup>2</sup>, oder Kranzschlagadern<sup>3</sup> des Herzens, oder Kranzpulsadern<sup>4</sup>, (*Arteriae coronales cordis*<sup>5</sup>, s. *cardiacae*<sup>6</sup>.) die aus der Aorta unmittelbar nach ihrem Austritt aus dem Herzen entspringenden, das Herz selbst mit Blut versiehenden Arterien. Man unterscheidet ihrer wieder zwei, nämlich a) eine rechte<sup>7</sup>, oder untere<sup>8</sup>, oder vordere<sup>9</sup>, und b) eine linke<sup>10</sup>, oder obere<sup>11</sup>, oder hintere<sup>12</sup>, auch wohl c) eine mittlere, (*A. coronaria cordis dextra*<sup>13</sup>, s. *inferior*<sup>14</sup>, s. *anterior*<sup>15</sup>, *A. cor. sinistra*<sup>16</sup>, s. *superior*<sup>17</sup>, s. *posterior*<sup>18</sup>, *A. cor. media*<sup>19</sup>.) unter Aorta, auch Herzarterien.

1) Spigelii de c. h. fabr. l. 6. c. 2. 2) Sömmerring's Gefäß. S. 101. 3) Leber's Vorles. über d. Zergliederungsf. Wien 1776, S. 285. 4) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1753, 3. B. S. 20. 5) Vesalii de c. h. fabr. l. 6. c. 15. 6) Schaarschmidt's angiolog. Tabellen, Tab. 3. 7) 8) Sömmerring's Gefäß. S. 102. 9) Pleuraud's Zergliederungsf. Uebers. Leipz. 1782, 1. Th. S. 670. 10) 11) Sömmerring's Gefäß. S. 103. 12) Pleuraud's Zergliederungsf. u. f. w. a. a. D. 13) 14) Halleri elem. physiol. T. I. l. 4. s. 3. S. 52. 15) Mayer's Besch. d. Blutgef. S. 26. 16) 17) Hall. el. ph. l. c. S. 53. 18) 19) Mayer's Besch. u. f. w. S. 27.

**Coronarische Herznervengeflechte**, (*Coronarii plexus cordis*<sup>1</sup>.) Kranzadernervengeflechte des Herzens<sup>2</sup>. Als solche werden Nervengeflechte aus Zweigen des tiefen Herznervenplexus unterschieden, wovon a) eine vordere<sup>3</sup>, (*anterior*<sup>4</sup>.) die rechte, eine hintere<sup>5</sup>, (*posterior*<sup>6</sup>.) die linke coronarische Arterie abgibt. S. Herznerven.

1) — 6) Loderi tab. anat. und Deutscher Text, Taf. 167, Nr. 93 u. 168. Fig. 1. Nr. 95.

**Coronarische Herzvenen**, (*Coronariae venae cordis*<sup>1</sup>.) Kranzvenen<sup>2</sup>, oder Kranzblutadern<sup>3</sup> des Herzens, Zuführende Kranzadern<sup>4</sup>, oder Kranzblutadern<sup>5</sup> des Herzens, (*Venae cardiacae*<sup>6</sup>.) die beiden größern der von der Herzsubstanz selbst das Blut in das linke Atrium des Herzens zurückführenden Venen, von denen man wieder a) die vordere<sup>7</sup>, oder große<sup>8</sup>, oder eigentliche Kranzvene des Herzens<sup>9</sup>, (*Vena coronaria cordis*<sup>10</sup>, *strictesic dicta*, s. *anterior*<sup>11</sup>, s. *superior*<sup>12</sup>,

1) Pleuraud's Zergliederungsf. Uebers. Leipz. 1782, 1. Th. S. 757. 2) Sömmerring's Gefäß. S. 240. 3) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1753, 3. B. S. 122. 4) 5) Pleuraud's Zergliederungsf. u. f. w. a. a. D. 6) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1866. 7) Sömmerring's Gefäß. S. 240. 8) Haller's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v. Lebelling, 1. Th. S. 187. 9) Palfyn's chir. Anat. Uebers. v. Huth, 1. Th. S. 258. 10) Halleri elem. physiol. T. I. l. 4. s. 3. S. 54. 11) Sömmerring's Gefäß. a. a. D. 12) nach Vieussen's (tr. du coeur tab. 1. fig. 2.)

## 222 Coronarische Lippenarterien Coronarische Magenarter.

Vena coronalis <sup>13</sup>, s. magna cordis <sup>14</sup>, s. magna Galeni <sup>15</sup> die sich in dem hinten Theil. des Atriums hinter der Thebessischen Valvel einmündende Vene, und b) die hintere <sup>16</sup>, kleinere oder auch mittlere <sup>18</sup> Kranzvene, oder Mittelvene <sup>19</sup>, oder Mittlere Blutader <sup>20</sup> des Herzens, (Vena coronaria cordis posterior <sup>21</sup>, Vena cordis media <sup>22</sup>, s. cordis Galeni <sup>23</sup> eine kleinere, von der Spitze des Herzens, an der Mündung der vorderen mit ihr zusammenfließende unterscheidet. S. Herzvenen.

- 13) Vesalii de c. h. fabr. l. 6. c. 15. 14) Sömmerring's Gefäßl. a. a. D. 15) Indem schon Galen (de arter. et ven. dissect. c. 1) ihrer gedenkt. S. Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. 16) — Sömmerring's Gefäßl. a. a. D. 17) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. 18) Sömmerring's Gefäßl. a. a. D. 19) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. 20) Sömmerring's Gefäßl. a. a. D. 21) Sömmerring's Gefäßl. a. a. D. 22) Sömmerring's Gefäßl. a. a. D. 23) Sömmerring's Gefäßl. a. a. D.

Coronarische Lippenarterien, (Coronariae arteriae labiorum <sup>1</sup>.) Kranzarterien der Lippen <sup>2</sup>, zwei Zweige der Facialisarterie, deren einer zur Oberlippe, der andere zur Unterlippe geht, wornach auch beide als Kranzarterie der Oberlippe <sup>3</sup> und der Unterlippe <sup>4</sup> unterschieden werden, (A. coronaria labii superioris <sup>5</sup> et A. coronaria labii inferioris <sup>6</sup>.) Beide werden auch wohl nur als Eine Kranzarterie, oder Kranzschlagader <sup>7</sup>, oder Kranzpulsader <sup>8</sup>, (A. coronaria labiorum <sup>9</sup>.) betrachtet. S. unter Carotis, äußere Carotis.

- 1) Mayer's Besch. d. Blutgef. S. 42. 2) — 4) Sömmerring's Gefäßl. S. 139. 5) 6) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. 7) Sömmerring's Besch. über d. Zergliederungsgef. Wien 1776, S. 286. 8) nach Winslow (expos. anat. lat. vers. T. III. tr. de arteriis, §. 56, u. anat. Abh. Uebers. Berl. 1733, 3. Th. S. 32.

Coronarische Magenarterien, (Coronariae arteriae ventriculi <sup>1</sup>.) Kranzarterien <sup>2</sup>, oder Schlag- oder pulsadern des Magens, Magenkranzarterien, (Arteriae gastricae.) Als solche werden unterschieden a) zunächst und vornehmlich die größere oder linke, oder obere, oder eigentlich Kranzarterie <sup>3</sup>, oder Kranzschlagader <sup>4</sup>, oder Kranzpulsader <sup>5</sup> des Magens Obere Magenarterie <sup>6</sup>, oder Magenpulsader <sup>7</sup>, (A. coronaria ventriculi major <sup>8</sup>, s. sinistra <sup>9</sup>, s. superior <sup>10</sup>, A. coronaria <sup>11</sup>, s. coronaria stomachica <sup>12</sup>, s. coronaria ventriculi <sup>13</sup>, A. gastrica major <sup>14</sup>, s. sinistra <sup>15</sup>, s. superior <sup>16</sup>, s. gastrohepatica sinistra <sup>17</sup>, s. stomachico-coronaria <sup>18</sup>, s. epigastrica <sup>19</sup>.) der erste Ast der coliacischen Arterie, der sich vornehmlich in der concaven Seite des Magens kranzartig verbreitet, b) die kleinere <sup>20</sup>

- 1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. §. 2552 u. 2559. 2) Sömmerring's Gefäßl. §. 166. 3) Leber's Vorles. über d. Zergliederungsgef. Wien 1776, S. 282. 4) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1733, 3. Th. S. 77. 5) Winslow's anat. Abh. Uebers. v. Huth 1. Th. S. 344. 6) Winslow's anat. Abh. u. f. w. a. a. D. 7) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. §. 2552. 8) Winslow's anat. Abh. Uebers. v. Huth 1. Th. S. 344. 9) Winslow's anat. Abh. u. f. w. a. a. D. 10) Winslow's anat. Abh. Uebers. v. Huth 1. Th. S. 344. 11) Winslow's anat. Abh. u. f. w. a. a. D. 12) Winslow's anat. Abh. Uebers. v. Huth 1. Th. S. 344. 13) Winslow's anat. Abh. Uebers. v. Huth 1. Th. S. 344. 14) Winslow's anat. Abh. Uebers. v. Huth 1. Th. S. 344. 15) Winslow's anat. Abh. Uebers. v. Huth 1. Th. S. 344. 16) Winslow's anat. Abh. Uebers. v. Huth 1. Th. S. 344. 17) Winslow's anat. Abh. Uebers. v. Huth 1. Th. S. 344. 18) Winslow's anat. Abh. Uebers. v. Huth 1. Th. S. 344. 19) Winslow's anat. Abh. Uebers. v. Huth 1. Th. S. 344. 20) Winslow's anat. Abh. Uebers. v. Huth 1. Th. S. 344.



chte<sup>21</sup>, auch Pylorus = oder Pfortnerarterie<sup>22</sup>, Pforterschlag = oder pulsader<sup>23</sup>, Schlagader der untern Magenmündung<sup>24</sup>, (A. coron. ventriculi, s. dextra<sup>25</sup>, s. minor<sup>26</sup>, A. gastrica dextra<sup>27</sup>, s. minor<sup>28</sup>, s. pylorica<sup>29</sup>, s. pylorica superior<sup>30</sup>,) ein Zweig der Leberarterie, der sich vom rechten Ende des concaven Bogens des Magens aus mit der vorigen vereinigt. c) Als untere, rechte und linke, (A. coron. ventr. anterior dextra et sinistra<sup>31</sup>,) ist sie Synonym von der rechten und linken gastropiploischen Arterie. S. Coliacische Arterie.

21) S. Note 20. 22) Palsyn's chir. Anat. u. s. w. a. a. D. 23) Winslow's anat. Abh. u. s. w. a. a. D. S. 78. 24) Leber's Vorles. über d. Zergliederungsk. Wien 1776, S. 298. 25) 26) Hildebrandt's Lehrb. u. s. w. a. a. D. S. 2559. 27) Verheyen c. hum. an. tr. 7. c. 1. 28) Halleri elem. physiol. l. c. S. 18. 29) Winslow exp. an. etc. l. c. S. 182. 30) Sömmerring's Gefäßl. S. 260, Note 5. 31) S. ebendas. Note 3.

Coronarische Magenvenen, (Coronariae venae ventriculi,) Kranzvenen des Magens<sup>2</sup>, Magenkranzvenen, über größern und der kleinern coronarischen Magenarterie entsprechenden, und auch so besonders als größere<sup>3</sup>, linke und kleinere rechte, (major et sinistra<sup>4</sup>, minor<sup>5</sup> et dextra<sup>6</sup>,) untergeordnet, in die splenische und mesenterische Vene einmündenden Venen, von denen besonders erstere auch als eigentliche Kranzvene<sup>8</sup>, oder Kranzader<sup>9</sup>, oder Kranzblutader<sup>10</sup> des Magens, (Vena coronaria<sup>11</sup>, s. coronaria stomachica<sup>12</sup>, s. stomachica<sup>13</sup>, s. gastrica major<sup>14</sup>,) letztere aber auch als Pylorusvene, oder Pfortnervene<sup>15</sup>, Pfortnerblutader<sup>16</sup>, (V. pylorica<sup>17</sup>, s. gastrica minor<sup>18</sup>,) unterschieden wird. S. Pfortader.

Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2704 u. 2705. 2) Sömmerring's Gefäßl. S. 273. 4) Maner's Besch. d. Blutgef. S. 239. 5) 6) Hildebrandt's Lehrb. u. s. w. a. a. D. 7) Maner's Besch. d. Blutgef. a. a. D. 8) Palsyn's chir. Anat. übers. v. Huth, 12. Th. S. 379. 9) Leber's Vorles. über d. Zergliederungsk. Wien 1776, S. 316. 10) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1733, 3. Th. S. 196. 11) Spigellii de h. c. fabr. l. 5. c. 5. 12) Winslow exp. an. lat. vers. T. III. tr. de ven. S. 234. 13) Palsyn's chir. Anat. u. s. w. a. a. D. 14) Maner's Besch. d. Blutgef. a. a. D. 15) Sömmerring's Gefäßl. a. a. D. 16) Winslow's anat. Abh. u. s. w. a. a. D. 17) Winslow exp. anat. lat. v. T. III. tr. de ven. S. 258. 18) Maner's Besch. d. Blutgef. S. 240.

Coronarisches Ligament der Leber, (Coronarum ligamentum hepaticum, s. hepatis<sup>1</sup>,) Kronband<sup>2</sup> oder Kronband<sup>3</sup> oder Kranzband<sup>4</sup> der Leber. Mit diesem nicht schicklichen Nahmen wird die Verbindung bezeichnet, welche die Leber an ihrer obern convexen Fläche mit dem Diaphragma eingeht, indem sich das Peritonäum von der als suspensorisches Ligament bezeichneten Duplicitur, von der Mitte aus, über den rechten und den linken Leberlobus wegzieht, und mehr oder minder deutlich durch festsitzendes Zellgewebe von dem gleichen, vom Peritonäum bewirkten Ueberwallungen getrennt ist. Halleri elem. physiol. T. VI. l. 20. s. 1. S. 4. 2) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1733, 3. Th. S. 526. 3) Leber's Vorles. über d. Zergliederungsk. Wien 1776, S. 417. 4) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 2101.

zug der untern Fläche des Diaphragma's geschieden ist. Die seitwärts deutlicher bandartig werdenden Fortsetzungen nach dem Leberrand hin terwärts werden auch als rechtes und linkes coronarisches Ligament, oder Kranzband, (*Ligamentum coronarium hepaticum*, s. *hepatis dextrum et sinistrum*<sup>5</sup>), besser jedoch als Lateral- oder Seitenligamente, oder Seitenbänder<sup>6</sup> der Leber, (*Ligamenta hepatis lateralia*<sup>7</sup>, *dextrum*, *triangulare*<sup>8</sup>, *sinistrum*, s. *Adhaesio lobi hepatis posterioris*<sup>9</sup>), bezeichnet. S. Leber 5) — 7) *Sommerring's* Eingeweidel. S. 62. 8) *Stephani de diss.* part. c. h. p. 116. 9) *Fantoni's anat. c. h. p. 1. diss. 6. p. 105.*

*Coronarium ligamentum radii*, s. Annularligament des Radius.

*Coronarius plexus cardiae*, s. *ventriculi*, s. unter Gasterische Nervengeflechte, vorderer Plexus.

Coronarvenen, s. unter Coronarische Gefäße.

Corone, (*Corone*), Corona, Coronon, entsprechend den gleichlautenden Griechischen Worte<sup>1</sup>, s. Coronoidischer Proceß.

1) *κορωνη*, eine Krähe, und wegen Ähnlichkeit mit einem Krähenschnabel von Hippokrates und Galen zu Bezeichnungen von Knochenfortsetzungen, namentlich den nachbenannten gebraucht. Vgl. *Foesii oecon. Hipp. h. v.*

Corone des Elbogens, i. q.

*Corone maxillae inferior*, s. Coronoidischer Proceß des Unterkiefers. — *ulnae*, s. Coronoidischer Proceß der Ulna.

*Coronoidea apophysis*, — *maxillae inferioris*, — *ulnae*, s. die folgenden Artikel.

Coronoidischer Proceß, (*Coronoides*<sup>1</sup>, s. *Coronoideus processus*), Kranzförmiger Fortsatz<sup>2</sup>, Krone<sup>3</sup>, Kronenfortsatz, Cronförmiger Fortsatz, Crone, Cronspitze<sup>4</sup>, (*Corona*<sup>5</sup>, *Corone*<sup>6</sup>, *Coronon*<sup>7</sup>, *Cornix*<sup>8</sup>, *Rostrum*<sup>9</sup>, *Glanis*<sup>1</sup>, *Apophysis coronoidea*), nach Galenischer Bezeichnung ein Knochenfortsatz mit abgestumpfter Spitze, ist in neuerer Zeit nur zur Bezeichnung der folgenden beiden Processe üblich geblieben. Vgl. Knochenhabenheiten.

1) *Rioli anthropogr. Paris. 1626, p. 682.* 2) 3) *Meutaud's* 3. Gliederungsf. Uebers. Leipz. 1782, 1. B. S. 31. 4) *Böhm's* Unterricht in der Knochenl. S. 84, übrigens wie das folgende Wort ungebührlich übersetzt, weil das übersetzte Wort nicht Lateinisch, sondern Griechisch ist. 5) *Columbi de re anat. 1. 1. c. 2.* 6) 7) *Gleni de ossib. 1. Balanano Sic. interpr. prooem. „Cum vero mucronem processus definit, non cervix, sed Corone, Coronon nuncupatur“* 8) in wörtlicher Uebersetzung von *κορωνη*. *Vesalii de hum. c. fabr. 1. 1. c. 3.* 9) 10) *Monro's* Knochenl. übers. v. Krause, 37, Note.

Coronoidischer Proceß der Ulna, (*Coronoides*<sup>1</sup>, s. *coronoideus*<sup>2</sup> *processus ulnae*), Krähenfortsatz<sup>3</sup>, oder Kronfortsatz, oder Kronenfortsatz<sup>4</sup>, oder Kronenförmiger Fortsatz<sup>5</sup>, oder Crone<sup>6</sup>, oder Cronspitze<sup>7</sup>, oder Cronförmiger Fortsatz, oder Corone<sup>8</sup>, oder Kleiner Höcker, oder Spitziger, oder Vorderer<sup>9</sup> Fortsatz des Elbogens, Elbogen-

1) *Heisteri comp. anat. ed. 2. p. 35.* 2) *Walter's* Abhandl. v. troch. Knoch. 2. Aufl. S. 300. 3) *Mayer's* Besch. d. menschl. K. 2. S. 246. 4) *Sommerring's* Knochenl. S. 480. 5) *Walter's* Abh. u. f. w. a. a. D. 6) 7) *Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1794. 1. Th. S. 229.* 8) *Palfyn's* chr. Anat. übers. v. Puth, 1. Th. 1788. 9) *Leber's* Werkes über d. Zergliederungsf. Wien 1779, S. 10.



ne<sup>10</sup>, oder Vorsprung des Ellbogens, (Corona<sup>11</sup>, s. Coronoideischer Proc. d. Unterk. s. Processus<sup>12</sup>, s. Tuberositas<sup>14</sup> minor, s. Rostrum intern<sup>15</sup>, s. Apophysis coronoidea<sup>16</sup> ulnae,) die von dem obern Ende der Ulna vorwärts und aufwärts abgehende, in einen gebogenen, aufgeworfenen Rand auslaufende Knochenverlängerung, die sich bei der Beugung des Arms mit jenem Rande in die an der vordern Seite des Oberarms über der Trochlea desselben befindliche Articulatio humeri legt. S. Ulna.

10) Eustach. d. Zergliederungsk. Uebers. Selpj. 1782, 1. B. S. 185. 11) Eustach. opusc. anat. p. 187, 188. 12) Blumenbach's Besch. d. Knoch. S. 382. 13) Leberi prael. anat. ed. nova, Vind 1776, pp. 80. 14) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. 15) Verheyen c. h. anat. tr. 5. c. 14. 16) Winslow exp. anat. lat. v. T. I. tr. de oss. sicc. §. 654.

Coronoideischer Proceß des Unterkiefers, (Coronoideus processus maxillae inferioris<sup>1</sup>,) Krähensfortsatz<sup>2</sup>, oder Schnabelfortsatz<sup>3</sup>, oder Kronenfortsatz<sup>4</sup>, oder Cronsförmiger Fortsatz<sup>5</sup>, oder Vorderer<sup>6</sup>, oder Spitziger Fortsatz<sup>7</sup>, oder Stachelfortsatz<sup>8</sup>, oder Crone, oder Cronspitze des Unterkiefers, (Corone<sup>9</sup>, s. Corona<sup>10</sup>, s. Processus anterior acutus<sup>11</sup>, s. Angulus superior anterior<sup>12</sup>, s. Apophysis coronoidea<sup>13</sup>, s. anterior<sup>14</sup> maxillae inferioris,) der von dem Roste des Unterkiefers auf jeder Seite nach vorn und oben abgehende, scharf abgerundete Knochenfortsatz, welcher unten breiter, oben in eine stumpfe Spitze auslaufend, dem Temporalmuskel zur Anlage dient. S. Unterkiefer.

Leberi praelect. anat. ed. nova, Vind. 1778, p. 46. 2) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 45. 3) Leber's Vorles. über d. Zergliederungsk. Wien 1776, S. 57. 4) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 404. 5) 6) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1753, 1. Th. S. 120. 7) Sömmerring's Knochenl. §. 219. 8) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 614. 9) Spigelii de h. c. fabr. l. 2. c. 13. 10) Verheyen c. h. anat. l. 1. tr. 5. c. 6. 11) Winslow exp. anat. lat. v. T. I. tr. de oss. sicc. §. 355. 12) Walter's Abh. v. trochn. Knoch. 2. Aufl. S. 186. 13) 14) Winslow exp. an. etc. l. c. §. 354 et 355.

Coronoides, s. coronoideus processus, s. Coronoideischer Proceß — maxillae inferioris, s. Coronoideischer Proceß des Unterkiefers. — ulnae, s. Coronoideischer Proceß der Ulna.

Corpora albicantia, s. candicantia cerebri, s. Mammillarproceß des Gehirns. — cavernosa clitoridis, s. Cavernöse Körper der Clitoris. — penis, s. Cavernöse Körper des Penis. — contigua, s. unter Continuität. — folliculosa vestibuli vaginae, s. Graafische Schleimsäcke des Vestibulum der Vagina. — gliformia uteri, s. Mucöse Höhlen des Uterus. — geniculata cerebri, s. Geniculirte Körper des Gehirns. — glandularia cerebri, s. Mammillarproceß des Gehirns. — glandulosa palpebrarum, s. Meibomische Drüsen. — penis, s. Prostata. — papillosa linguae, s. Papillen der Zunge. — humana mineralis, s. Mineralisirte Anthropolithen. — lateralia clitoridis, s. Cavernöse Körper der Clitoris. — lutea, s. Gelbe Körper in den Ovarien. — mammillaria cerebri, s. Mammillarproceß des Gehirns. anat. physiol. Realw. II. B.

hirns. — *nerveo - spongiosa*, s. *nervosa*, s. *nervosa ligamentosa penis*, f. Cavernöse Körper des Penis. — *olivari* f. Olivarkörper, auch Pyramidalkörper des verlängerten Hirnmark. — *pyramidalia epididymidis*, f. Conische Gefäßstränge der Epididymis. — *medullae oblongatae*, f. Pyramidalkörper des verlängerten Hirnmarks. — *renum*, f. Ferreinische Pyramiden. — *quadrigemina cerebri*, f. Vierhügel des Gehirns. — *restiformis* f. Strickförmige Körper. — *spongiosa penis*, f. Cavernöse Körper des Penis. — *striata cerebri interiora, anteriora medulla* f. Gestreifte Körper des Gehirns. — — — *posteriora superiora* f. Sehnervenhügel. — *tendinea penis*, f. Cavernöse Körper des Penis.

*Corporalitas*, f. Körperlichkeit.

*Corporatura*, f. Körperbeschaffenheit.

**Corpulenz**, (*Corpulentia* <sup>1</sup>), Körperdicke, (*Crassitudo*, s. *Crassitudo*, s. *Amplitudo corporis*), jenes bekannte verdächtige Uebermaß von Gesundheit, das sich durch zu reichlichen Abfluß des ernährenden Stoffes als Fett, besonders in den Abdominalbeugeungen zu erkennen gibt. S. *Gesundheit*.

1) Plinii hist. mundi l. II. c. 53: „Somno concoquere, corpulentiam quam firmitati utilius.“

**Corpus**. f. Körper, vergl. auch *Fleisch*. — *calcanei*, f. Körper des Calcaneus. — *callosum cerebri*, f. Callöser Körper des Gehirns. — *carneum oculi*, f. Lacrymalcarunkel. — *cavernosum*, s. *cellulosum urethrae virilis*, f. Cavernöser Körper der männlichen Harnröhre. — *cerebelli ciliare*, s. *dentatum*, s. *medullare*, s. *rhomboidenum*, s. *serratum*, f. Medullarkörper des Cerebellums. — — *vermiforme*, f. Intermediärer Lobus des Cerebellums. — *ciliare*, f. Ciliarkörper. — *conoides*, f. Birbeldrüse. — *costae*, f. Körper der Rippen. — *cribrosum Hippocretis*, f. Zellgewebe. — *crystallinum*, f. Crystalllinse. — *dentatus* f. Krone eines Zahns. — *exanimatum*, f. Cadaver. — *fibrosum cerebri*, f. Fimbria des Gehirns. — *glandosum urethrae muliebris*, f. Graafische Prostata. — *glandosum*, s. *glandosum assistens urethrae virilis*, f. Prostata. — *glandulosum*, *glandulosum assistens*, desgl. — *Higmorei*, s. *Higmoreum*, f. Higmoreischer Körper. — *includis*, f. Körper des Includis. — *mammæ glandosum*, s. *glandulosum*, f. Brustdrüse. — *maxillae inferioris*, f. Körper des Unterkiefers. — *mucosum cuticulae*, f. Malpighischer Schleim. — *musculi*, Bauch eines Muskels. — *olivare auris*, f. Stapedius. — *olorium testiculi*, f. Higmoreischer Körper. — *ossis hyoidei* f. Körper des Zungenknochens. — — *ileum*, f. Körper des Hüftknochens. — — *ischii*, f. Körper des Sitzstücks des Hüftknochens. — — *pubis*, f. Körper des Schoosstücks des Hüftknochens. — — *sphenoidei*, f. Körper des Sphenoidalknochens. — — *zygomatici* f. Körper des Backenknochens. — *ossium*, f. Diaphyse. — *ovalis crinis*, f. Haarwurzel. — *palati*, f. Horizontaler Theil des Gaumenknochens. — *papillare*, f. unter Papillen der Haut.



*psalloides*, s. *psalloideum*, f. Psalterium. — *pyramidale*, f. Benöser Plerus des Hoden. — *quadratum*, f. Vierseitiger Mensch. — *reticulare*, s. *reticulare Malpighii*, Malpighischer Schleim. — — *Valsalvae*, f. Valsalvaisches Horn. — *scapulae*, f. Condylus des Schulterblatts. — *spongiosum urethrae virilis*, f. Cavernöser Körper der männlichen Harnröhre. — *sterni*, f. Körper des Sternums. — *striatum cerebri*, f. Gestreifter Körper des Gehirns. — *tali*, f. Körper des Fußes. — *trigouum vesicae urinae*, f. Dreieckiger Körper der Harnblase. — *turbinatum*, f. Zirkelblase. — *uteri*, f. Uteruskörper. — *varicosum testis adstans*, s. *assistens*, f. Varicöser Plerus des Hoden. — *vermiforme cerebelli*, f. Interspirärer Lobus des Cerebellums. — *vertebrarum*, f. Körper der Wirbel. — *vesicae urinae*, f. Blasenkörper. — *vitreum*, f. Glaskörper.

*Corpuscula globosa cervicis uteri*, f. Nabothische Eier. — *uniformia*, f. unter Hörner des Zungenknochens, die beiden kleinen Hörner. — *primitiva*, f. Atomen. — *Santoriniana*, f. Santorinische Körperchen. — *triticea*, f. unter Hörner des Zungenknochens, die beiden kleinern Hörner. — *Wrisbergiana*, f. Wrisbergische Körperchen.

*Corpuscularis philosophia*, f. Atomistik.

*Corpuscularphilosophen*, f. Atomisten. — *philosophie*, Atomistik.

*Corpusculum*, Diminutiv von *Corpus*, f. Körperchen. — *trichurum ligamenti hyo-thyreoides*, f. unter Hyothyreoideische Ligamente.

*Corre, Corse*, wörtlich das, was geschoren werden kann<sup>1</sup>, das Synonym von Haar, von den Schläfen, von den Backen, dem Kiefer, von den Kopf überhaupt.

nach den Griechischen Worten κορρη, κορση, von κείρω, tondeo.

*Corrugans oris musculus*, f. Orbicularmuskel des Mundes.

*Corrugatio*, f. Runzeln der Haut.

*Corrugator, Coiteri*, i. q. *Corrugator superciliaris*. —

*Coiti*, f. Levator des Kinns. — *superciliaris*, s. *supercilio-*

*musculus*, f. Corrugirender Muskel der Augenbraunen.

*Corrugatores musculi auris postici*, f. Retrahirende Ohrmuskel.

*Corrugirender Muskel der Augenbraunen*, (*Corrugator superciliarum*<sup>1</sup>), *Augenbraunrunzler*<sup>2</sup>, *Augenbraunmus-*  
*runzler*<sup>3</sup>, oder *Kräuselnder*<sup>4</sup> *Muskel*, oder *Kräu-*  
*muskel*<sup>5</sup> *der Augenbraunen*, *Kleiner Augenbraunmus-*  
*kel*<sup>6</sup>, *Runzeln machendes Mäuslein*<sup>7</sup>, (*Corrugator su-*  
*ciliaris*<sup>8</sup>, s. *Coiteri*<sup>9</sup>, *Musculus frontalis verus*<sup>10</sup>, s.

<sup>1</sup> Cowper myotom. ref. c. 6. <sup>2</sup> nach Sumnerling (Muskellehre, S. 115.)

<sup>3</sup> Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 2. B. S. 1074.

<sup>4</sup> Mayer's Weich. d. menschl. K. 3. B. S. 169. <sup>5</sup> Pöder's anat. Tafeln, Taf. 1, Nr. 3.

<sup>6</sup> Meutaud's Zerastfederangef. Uebers. Leipzig. 1782, 1. B. S. 251. <sup>7</sup> Browne's veraltete Besch. d. Mäus.

<sup>8</sup> v. Spener, Berl. 1704, S. 10. <sup>9</sup> Schaarschmidt's myolog. Tabellen, Tab. 2. <sup>10</sup> nach Douglas (myogr. compar. c. 4.) Bgl. Coiteri

obs. anat. chir. p. 109.

frontalis <sup>11</sup>, s. meso-superciliaris <sup>12</sup>, s. cutaneo-superciliaris <sup>13</sup>, Antagonista occipito-frontalis <sup>14</sup>,) der dünne, seitwärts von der Glabella des Stirnknochens entspringende, und in die H. unter den Augenbraunen sich einsenkende, zugleich aber auch mit dem Orbicular- und Frontalmuskel in Verbindung stehende Muskel, welcher die Augenbraunen gegen die Nase hin bewegt, so daß, wenn beide wirken, der Raum über der Nasenwurzel in Falten gelegt wird. **S. Augenbraunen.**

<sup>11</sup>) nach Parsons (of physiognomy, p. 5 — 8.) <sup>12</sup>) nach Schreder (Nomenclat. d. Musf. S. 10.) <sup>13</sup>) (Cutaneo-sourcillier,) nach Dumas (système méthod. de nomenclat. des musc. p. 94.) <sup>14</sup>) Walter (tenetior. musc. h. c. anat. Lips. 1731, p. 4.)

**Corse, f. Corre.**

**Cortex, Rinde, f. Corticalsubstanz.** — **cerebri, f. Corticalsubstanz des Gehirns.** — **dentium, s. lapideus dentium, Schmelz der Zähne.** — **renum, f. Corticalsubstanz der Nieren.** — **tunica vaginalis, f. unter Vaginalhäute des Testikels.**

**Corticale tuberculum nervi olfactorii, f. Bulbus des olfactorischen Nerven.**

**Corticales columnae renum, s. pyramidum renalium, Scheidewände der Ferreinschen Pyramiden.**

**Corticalis concameratio Ferreinii, f. unter Ferreinschen Pyramiden.** — **pars cerebri, f. Corticalsubstanz des Gehirns.** — **substantia, f. Corticalsubstanz.** — **cerebri, f. Corticalsubstanz des Gehirns.** — **hepatis et lienis, f. Corticalsubstanz der Leber und der Milz.** — **renum, f. Corticalsubstanz der Nieren.** — **sutura ossis temporum, f. Schuppensutur des Schläfenknochens.**

**Corticalsubstanz, (Corticalis substantia,) Rindensubstanz, Rindige Substanz, Rinde, Borke, Borkehaut, Rindenhafte Wesen, (Cortex,) wird in der anatomischen Nomenclatur in Uebertragung der bekannten organischen Pflanzenbildung zu Bezeichnung äußerer, von der tiefern sich deutlich qualitativ unterscheidenden, übrigens aber unmittelbar in diese übergehender Theile einzelner Theile gebraucht. Vgl. die nächst vorhergehenden und folgenden Artikel.**

**Corticalsubstanz der Leber und der Milz, (Corticalis substantia hepatis et lienis,) Rindensubstanz der Leber und der Milz<sup>1</sup>. Eine solche ist nach Autenrieth<sup>2</sup>, analog der des Gehirns und der Nieren, im Gegensatz einer Medullarsubstanz auch in den gedachten Organen unterscheidbar, nur in jedem ihrer kleinen Körnchen besonders geschieden. S. Leber und Milz.**

<sup>1</sup>) Reil's und Autenrieth's Arch. für d. Physiol. 7. B. 2. St. S. 29. <sup>2</sup>) a. a. D.

**Corticalsubstanz der Nieren, (Corticalis substantia renum,) Äußere Nierensubstanz, Nierenrinde, Äußere Masse<sup>2</sup>, oder Rinde<sup>3</sup>, oder Rindenhafte Wesen<sup>4</sup>, oder Rindige<sup>5</sup>, oder Rindige<sup>6</sup>, oder Drüsenhafte<sup>7</sup> Substanz.**

<sup>1</sup>) Haller's elem. physiol. T. VII. l. 25. s. 1. §. 7. <sup>2</sup>) 3) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. §. 2172. <sup>4</sup>) Winslow's anat. Abb. Nebel. Berl. 1733, 3. Th. §. 54. <sup>5</sup>) Palfyn's chir. Anat. übers. v. Puchelt. 2. B. S. 129. <sup>6</sup>) 7) Pennermann's Physiol. 4. B. S. 62.



äusensubstanz<sup>8</sup> der Niere, (Cortex renum, Substantia externa, s. glandulosa<sup>9</sup>, s. carnos<sup>10</sup>, s. fibrosa, s. rubicunda<sup>11</sup> renum, Cortex renum,) die die Nieren nach außen organisch sende, sich durch röthliche Farbe auszeichnende Substanz, deren ringenförmig verlaufende Blutgefäße mit den hier entspringenden Arterien sich vereinigen, die sogenannten Nierenklümpchen bilden. S. Nieren.

nach einer irrigen Ansicht. S. Maier's Besch. d. menschl. K. 5. Th. S. 14, Note. 99) nach Malpighi (opp. d. renibus c. 11. p. 280) vgl. Note 8. 10) Bartholini anat. l. 1. c. 17. 11) Maier's Besch. u. f. w. a. a. D. S. 14.

Corticalsubstanz des Gehirns, (Corticalis substantia cerebri<sup>1</sup>), Rindensubstanz<sup>2</sup>, oder Rinde<sup>3</sup>, oder Rindige, oder Rindigte, oder Graue<sup>4</sup> Substanz, oder Grauer Theil<sup>5</sup>, Äußere Borke<sup>6</sup>, oder Borkehaut<sup>7</sup>, oder Graues<sup>8</sup>, Drüsenhaftes<sup>9</sup> Wesen des Gehirns, (Cortex<sup>10</sup>, s. substantia corticalis<sup>11</sup>, s. Substantia cinerea<sup>12</sup>, s. cineritia<sup>13</sup>, s. cineritia<sup>14</sup>, s. vitrea, s. pellucida, s. crystallina, s. oleosa<sup>15</sup>, s. cerebri, Materies<sup>16</sup>, s. Substantia cerebri externa<sup>17</sup>, Cerebrities, s. Corpus cinericium cerebri<sup>18</sup>, Cerebrum<sup>19</sup>), durch ihr graues, ins Röthliche fallende Colorit von der eigentlichen, weißen Gehirnschubstanz sich unterscheidende Gehirnmasse, als rindig betrachtet, weil sie das große und kleine Gehirn nach außen abgrenzt, und hier die Medullarsubstanz, deren Gegensatz sie ist, umschließt und einschließt, ihre Eigenheit hauptsächlich den reichlicheren Blutgefäßen verdankend, und in die Medullarsubstanz allmählig, doch ohne Unterbrechung einer gelblichen Mittelschubstanz, übergehend. S. Gehirn.

1) nach Willis (cerebr. anat. c. 10. Oper. ed. Amst. 1682, p. 34. 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2840. 3) Maier's Besch. d. menschl. K. 6. B. S. 87. 4) 5) Schumerring's Hist. und Nervenl. S. 36. 6) Leber's Vorles. über d. Zergliederungsk. Wien 1776, S. 521. 7) Fink's Gesch. u. Physiol. d. Thiere, 2 Th. S. 94. 8) 9) Kalmus anat. Tabell. Tab. 8. 10) 11) Halleri cl. physiol. TT. IV. l. 10. s. 1. S. 10. 12) Vicussens nevrogr. l. 1. c. 10. 13) Winslow exp. anat. lat. vers. T. IV. S. 54. 14) Leberi praelect. anat. ed. nova, Vienn. 1778, p. 406. 15) Leuwenhoek arcan. anat. p. 30. 16) 17) Haase cerebri nervorumque anat. S. 26. 18) 19) nach Piccolhomini (praelect. anat. p. 252,) dem fälschlich die erste Unterscheidung derselben beigegeben wird, da vor ihm Vesal sowohl (de h. corp. fabr. l. 7. c. 4) als Dryander (anat. Mundini 1541, p. 64) daran gedenken.

Coryphe mesenterii, so bezeichnete Galen<sup>1</sup> und nach ihm seine Übersetzer, Apex, s. Principium, s. Vertex<sup>2</sup>, s. Vinculum<sup>3</sup> mesenterii, die Befestigung, welche das Mesenterium, hinterwärts verlaufend und verengend, an den vordern Flächen der Lendenwirbel hat. S. Mesenterium.

1) κορυφή, (de usu part. l. 16. c. 10.) 2) libro cit. Nic. Regio Calabriae interpr. l. c. 3) in gleicher Uebersetzung des Wortes κορυφή, welches Galen an einem andern Orte (de admin. anat. l. 6. c. 4) in gleicher Bedeutung braucht. S. Hofmann's comment. in Galeni de usu part. l. 14. n. 216.)

**Coschwizens**, oder **Coschwizischer Gang**<sup>1</sup>, oder **Speichelgang**<sup>2</sup>, (*Coschwizii*<sup>3</sup>, s. *Coschwitzianus*<sup>4</sup> *ductus salivalis*,) ein vermeintlich von Coschwiz, (Prof. Halle,) im Jahr 1724 entdeckter neuer Speichelgang<sup>5</sup>, der auf Oberfläche der Zunge sich öffnen, und mannigfaltige Verbindungen mit andern Speichelgängen, mit Speicheldrüsen, lymphatischen Gefäßen, selbst mit der thyreoidischen Drüse eingehen sollte, der zufolge genauerer Untersuchungen nichts anders als ein Venennetz der obern Fläche der Zunge ist. Vgl. **Speicheldrüsen**.

- 1) 2) Mayer's Beschr. d. menschl. K. 4. B. S. 158 u. 269, Noten. 3) Vernouli disqu. anat. de Coschwizii ductu salivari, Tüb. 1725. 4) Halleri experimenta et dubia circa ductum salivalem. novum Coschwizianum, Lugd. B. 1727, 4. 5) G. D. Coschwiz Ductus salivalis novus per glandulas maxillares, linguales, linguamque excurrans, cum variis lymphaticis variis communicans et in lingua locum excretionis habens, nuperrime detectus, 1724, 4 et ejusd. Continuatio observationum etc. Hal. 1729, 4.

**Cosmica scientia**, s. **Astronomie**, ingleichen **Cosmologie**.

**Cosmici sensus**, s. **Cosmische Sinne**.

**Cosmisch**, (*Cosmicus*<sup>1</sup>, a, um, **Mundanus**<sup>2</sup>,) imallgemeinen der Welt angehörig, besonders auch im Gegensatz des Tellurisch oder bloß auf den Erdplaneten Bezug habenden. Vgl. **Cosmologie**.

- 1) 2) Cicero n. Tusc. quaest. l. 5. c. 37: „Socrates quidem, cum garetur, cuiatem se esse diceret, mundanum (*κοσμικον*,) inquit.“

**Cosmische Sinne**, (*Cosmici sensus*,) So bezeichnet **Gress**<sup>1</sup> die beiden höhern, auf Wahrnehmung der äußern Vorgänge gerichteten Sinne des Gesichts und des Gehörs, im Gegensatz niedern oder chemischen Sinne. S. **Sinne**.

- 1) Erpof. d. Physiol. S. 229.

**Cosmographie**, (*Cosmographia*<sup>1</sup>,) **Kosmographische Weltbeschreibung**, **Weltkunde**<sup>2</sup>, Darstellung des Universums, wie es sich den Sinnen darstellt, mit minderer Beachtung des Zusammenhangs desselben. S. **Cosmologie**.

- 1) nach den Griechischen aus *κοσμος*, Welt, und *γραφη*, Beschreibung, bestimmten Worten. 2) 3) Burdach's Literat. d. Heilwiss. 1. Th. S. 215.

**Cosmogenie**, **Cosmogonie**, (*Cosmogenia*<sup>1</sup>, *Cosmogonia*<sup>2</sup>,) **Kosmogenie**<sup>3</sup>, **Kosmogonie**, die Entstehung und Ausbildung des Universums, oder auch die Lehre derselben. S. **Cosmologie**.

- 1) 2) nach den Griechischen Worten *κοσμογενια* und *κοσμογονια* aus *κοσμος* *γενεσθαι*, nascor, gebildet. Bruckeri inst. hist. philos. p. 107. Burdach's Encycl. d. Heilwiss. 1. Th. S. XVIII.

**Cosmologie**, (*Cosmologia*<sup>1</sup>,) **Kosmologie**<sup>2</sup>, **Weltlehre**, **Weltenkunde**, (*Scientia cosmica*,) der Inbegriff dessen, was für unsere Sinne und unsern Verstand von der Welt als **Universum**, von der Welt, (im weitesten Sinne dieses Wortes) oder den Welten, (wenn das Wort Welt nur auf einzelne Himmelskörper bezogen wird,) erkennbar ist.

- 1) nach Wolf, der zuerst dieselbe als einen Theil der Metaphysik aufstellte. deff. *Cosmologia generalis, methodo scientifica pertractata, quae solidam, imprimis Dei atque naturae, cognitionem via sterni* Francof. et Lips. 1731, (1737) 4. 2) Burdach's Encycl. d. Heilwiss. 1. B. S. 280.



Wenn der menschliche Geist das Universum, oder die Welt als Ganzes umfassend betrachtet; so bieten sich ihm folgende große Probleme, die zugleich für eine wissenschaftliche Kenntniß jeder Art als obersten Anknüpfungspunkte, erscheinen, und gegen die alles Uebrige, was der Mensch zu erforschen und zu erkennen trachtet, höchst beschränkt und bedeutungslos erscheint: 1) Was ist die Welt? 2) Wie weit reicht sie? 3) Wie entstand sie? 4) Was erhält sie? 5) Was ist der Zweck ihres Seyns?

Daß diese Fragen sich jedem denkenden Geiste bei nur einiger Reflexion aufdringen, und ihn auf das lebhafteste anregen, verbürgt dem wenigstens ein universelles Seyn, von dem er selbst nur ein Theil ist, so wie aber auch das gänzliche Unvermögen des menschlichen Verstandes, aus eignen Principien und durch bloß sinnliche Erkenntniß geleitet, auch nur eine dieser Fragen genügend zu beantworten, ihm die Ueberzeugung abnöthigt, daß der Standpunct, den der Mensch selbst im Universum einnimmt, ein viel zu tiefer sei, um darauf Anspruch machen zu können, daß sich ihm das hohe universelle Seyn als in einem klaren Spiegel rein darstellen solle, während nur einige matte Strahlen in gebrochnem Lichte bis zu ihm gelangen.

Der menschliche Verstand ist seiner Natur nach durchaus nur ein Erkenntnisvermögen für das Endliche, und vermag von dem Unendlichen sich keinen andern, als einen negativen Begriff zu bilden. Selbst das Wort Unendlichkeit besagt nichts anders als die Negation der Endlichkeit, so wie das neuere Wort Absolutes bloß das Geistes Seyn von allen Bestimmungen, wodurch die Welt Gegenstand unserer (d. i. sinnlichen,) Erkenntniß wird. Jene Fragen aber verlieren durchaus ihre hohe Bedeutung, oder ihren universellen Charakter, wenn man nur in irgend einer Art der Gedanken einer Begrenzung an sie anknüpft, oder die Auflösung derselben durch Endlichkeiten versucht.

Nur der religiöse Sinn des Menschen vermittelt in den Tiefen seines geistigen Lebens ein Erfassen des Unendlichen als Solchen, von der positiven Seite, aber nicht zum Behuf seiner Erkenntniß, sondern seines Vertrauens, zur Läuterung seiner Gefühle und zu seiner geistlichen Erhebung und Erkräftigung im Kampfe mit seiner ihn abwärts ziehenden sinnlichen Natur.

Wenn wir also auch für ein wirkliches Wissen, oder eine gelehrte Erkenntniß, darauf Verzicht leisten müssen, Principien zu besitzen, die wir uns je zu verschaffen, welche selbst keiner höhern bedürfen, und also nicht bloß Principe in relativer Beziehung sind, zugleich aber auch völlig hinreichen, um uns eine klare und lebendige Anschauung der uns umgebenden Gegenstände, und unserer selbst in dieser Umgebung zu gewähren; so bleibt uns doch für unsere höhere intellectuelle Cultur die Aufgabe: dahin zu streben, das Besondere und Niedrige unsern Sinneskenntnissen unter dem Allgemeinen und Höhern so weit zu befragen, bis wir gestehen müssen, daß wir uns wirklich an der Grenze der Endlichkeit für unser Anschauungsvermögen befinden, so also für uns das Endliche sich von dem Unendlichen abscheidet, und aus ihm hervortritt, ohne jedoch zu voreilig zu wähnen, daß immer eine solche Grenze wirklich auch eine absolute und nicht bloß

eine relative sei, die bei Erweiterung der Erkenntnißmittel unsers Zustandes nicht noch weiter zurückgestellt werden dürfte. Cosmologie ist also hiernach Kenntniß der Welt, als eines Ganzen, nicht wie sie ist, sondern wie sie sich, so weit das menschliche Forschungsvermögen reicht, uns darstellt.

Betrachten wir aber die Welt wirklich als ein Ganzes, so schwindet in diesem allgemeinen Begriff das Menschengeschlecht selbst mit dem Erdplaneten, der ihm zur Wohnung dient und dessen materlicher Boden ist, als ein geringfügiger Punct. Das Auge des Geistes faßt hier alle jene großen Weltenkörper, die der beobachtende Astronom am heitern nächtlichen Himmel staunend bewundert in seinem Blick. Er erhebt sich hier in wissenschaftlicher Betrachtung, von der Erde, als dem ihm gegebenen Standpunct der sinnlichen Beschauung, mit seinem Verstande zu dem Sonnensystem, von dem selbst unser Erdenplanet bei weitem noch nicht ein Millionentheil ist, und dann die Myriaden von Sonnen in einem Riesenbegriff auf, die eine der geringern nur unsere Sonne seyn mag, die zusammen in der Milchstraße als ein ungeheurer Lichtkranz sich darstellen, und von denen alle in Sternenbilder unterschiedene uns lichtere Sonnen nur Seitenpartien zu seyn scheinen, und erkühnt sich endlich, die unzähligen aus den tiefften Himmelsräumen uns nur matt heraufdämmern Sterngruppen, oder Nebelflecke des Sternenhimmels, als gleiche Weltenformationen, wie diese unsere Milchstraße, anzusprechen. Hier aber ist unser Verstand an der Grenze des Räumlichen, und sträubt sich, wenn er nun aussprechen soll, was noch hinter und jenseits dieser seinen Grenzen des Universums sei, gegen die Idee einer allseitig ewig hinausreichenden Finsterniß, jene Conglomeration von Myriaden Welten, gleich einer unendlichen hohlen und leeren Schale umschwebend, eben so sehr als gegen die einer allseitig in den unendlichen Raum hinausreichenden körperlichen Erfüllung desselben, oder einer Unendlichkeit der Welten eben so dem Raume nach, wie er auch in Hinsicht der Zeiterfüllung durch Weltendaseyn in gleiches Schwanzergeräth.

Diese letztere Betrachtung insbesondere wird als Cosmogenie bezeichnet, in deren Gegensatz dann Cosmologie, in beschränkterer Bedeutung also, bloß darauf bezogen wird, was wir von der Welt als Ganzem, in der Weise, wie sie sich unsern Sinnen, also insbesondere bei Betrachtung des Sternenhimmels darstellt, erkennen, wo dann Cosmographie insbesondere noch dadurch sich unterscheidet, daß hier mehr das Zusammen- und Nebeneinanderseyn, als die gegenseitige Verbindung nach Causalbestimmungen beachtet wird, welche jedoch der Cosmologie zugleich zu ihrer Aufgabe hat. Sie fällt nach diesem Begriff ziemlich mit dem der Astronomie zusammen. Das unsern Erdenplaneten aber insbesondere angehende wird dagegen gewöhnlich als Geologie davon gesondert.

Cosmogenie hat also das, was wir durch unsern Verstand von der Entstehung der Welt überhaupt, oder auch einzelner Weltenkörper insbesondere zu erfassen vermögen, oder vielmehr zu erfassen uns bestreben, zur Aufgabe, weil dem Verstand zu deren Lösung in dem ganzen Schos seiner Erkenntnisse, woraus er sich Systeme bildet, reell nichts ge-



den ist, hingegen für die Erkenntniß des Seyns der Welten Raume ihm doch die Mathematik wichtige Unterstützung leistet. Wenn dann in Betrachtung der allgemeinen Geseze, welche durch ganze Natur verbreitet sind, und durch deren Uebertragung, nach wir auf der Erde mit ihnen bekannt geworden, auf Erklärung Bewegungen der Himmelskörper und ihrer Wirkungen auf einander in diese Bewegungen und Wirkungen unser Verstand einige höhere Einsicht erlangt; so kann auch diese, von andern Erkenntnissen des Universums geschieden, wohl als Cosmonomie unterschieden werden, deren wissenschaftliche Realität also gar wohl zu vertheidigen ist, wenn wir keine andern als die polarischen Urkräfte, die in allen Naturwirkungen als dieselben erscheinen, die der Attraction und Repulsion, oder der Schwere und des Lichts, auch hier uns in unserer Forschung leiten lassen, da hingegen Cosmosophie, wenn man darunter das Bestreben versteht, vermittelt innerer Contemplation oder göttlicher Weisheit, nach besonderer Vergünstigung zu ihr emporgehoben, in die Geheimnisse des großen Weltenlebens, nicht bloß unsichtbaren und sichtbaren Körpermassen, sondern auch nach einem unerschöpflichen geistigen Seyn zu bringen, und so dessen jetzige und künftige Uebersicht, und uns als Vernunftwesen völlig Genüge leistende Zwecke zu enthüllen, selbst der Möglichkeit einer wissenschaftlichen Construction entbehret, und einzig der Mystik zufällt. (H.)

**Cosmonomie**, (*Cosmonomia*<sup>1</sup>.) Kosmonomie<sup>2</sup>, Weltwissenschaft<sup>3</sup>, Kenntniß der Geseze, nach denen das Universum gestaltet und erhält. Vgl. Cosmologie.

1) nach den Griechischen Worten *κοσμος* und *νομος*, Gesetz, gebildet. 2) 3) Vgl. dach's Literatur d. Heilwissenschaft, 1. Th. S. 215.

**Cosmopolit**, (*Cosmopolita*<sup>1</sup>.) Weltbürger, s. unter Cosmopolitismus.

1) nach dem Griechischen Worte *κοσμοπολιτης*, aus *κοσμος* und *πολις*, Stadt oder Staat, gebildet.

**Cosmopolitismus**, (*Cosmopolitismus*<sup>1</sup>.) Kosmopolitismus, Weltbürgerlichkeit, Weltbürgerlicher Sinn, die überwiegende Richtung des Gemüths, nach welcher der Mensch ein eignes Interesse, so wie das seiner nächsten Umgebungen und engeren Cirkel, innerhalb deren er sich im Leben befindet, dem gemeinern der gesamten Menschheit unterordnet. Cosmopolitismus ist in practischer Hinsicht der reine Gegensatz des Egoismus, wiewohl neben Patriotismus, Castengeist, Freundschaft, Familienanhanglichkeit, Geschlechtsliebe eben so viele Mittelglieder bilden. Ein Mensch, der in seinen Handlungen und Lebensansichten vornehmlich Cosmopolitismus leitet, wird ein Cosmopolit genannt. Wenn der Charakter eines Cosmopoliten darin besteht, daß er zu jeder Zeit bereit ist, sein eignes Glück dem seiner Familie, sein Familienglück dem seines Vaterlandes, dieses aber dem der Menschheit aufzuopfern; so steht der Egoist dagegen unbedenklich das Wohl seines Vaterlands auf Kosten des menschlichen Geschlechts, sein Familienglück aber noch lieber auf Kosten seines Vaterlandes zu fördern, seinem eignen Glück zu opfern er ohne allen Anstand jene wie diese auf.

Cosmopolitismus ist Grundbedingung jeder wahren Tugend, und 1) aus den Griechischen Worten *κοσμος* und *πολις*, gebildet.

gleichsam der peripherische Theil derselben, aber hat nur dann reellen moralischen Werth, wenn er in harmonischem Verein mit den Rücksichten steht, die jeder Mensch auch gegen die engeren Verbindungen in welche ihn seine Lebensverhältnisse zu andern Menschen fesseln, zu beachten hat. Die moralische Kraft wird nothwendig gleich einem Lichte, das einen weiten Raum erleuchten soll, in dem Verhältniß geschwächt, als die Sphäre ihrer Thätigkeit umfassender ist. Ist ein Mensch im Leben äußerlich nicht auf Einen der allerhöchsten Punkte gestellt, so kann dem einzelnen Bewohner einer freien Gegend es wenig interessiren, in der Ferne von einem seiner Mitmenschen geliebt oder gehaßt zu seyn. Ein Mensch, der in seinen Handlungen zunächst dem Zuge seines Herzens folgt, wird auch immer von dem Glück oder Unglück derer am lebendigsten zur Theilnahme angeregt werden, die das Schicksal durch seine mannigfaltigen Bande im Leben ihm auch am nächsten gestellt hat. Gewöhnlich sind Menschen, die sich ihres cosmopolitischen Sinnes rühmen, reflectirende Moralisten, deren Handlungsweise weniger durch innerlich begründetes sittliches Gefühl, als durch Verstandesgrundsätze von außen bestimmt ist. Dergleichen engherzige Menschen überreden sich und andere, die Neger, die Feuerländer und die Kamtschadalen als ihre Brüder im Herzen zu tragen, während ihr Herz selbst liebeleer ist, ja sie würden, wenn die Welt für das practische Leben nicht mit der Oberfläche des Erdplaneten abgegrenzt wäre, mit ihrem excentrischen moralischen Sinn den Bewohnern des Mondes, der Planeten und aller Sonnensysteme sich zuwenden, und so, indem sie auch ihre Mitmenschen selbst aus den Augen verlieren, die letzten Bande zerreißen, die sie noch als Erdbewohner an Mitbürger, Freunde, Gatten und Kinder knüpfen. (H)

**Cosmosophie, (Cosmosophia<sup>1</sup>.)** Kosmosophie, Erkenntniß der Natur des Universums nach mystischen Principien. Vgl. Cosmologie.

<sup>1</sup>) nach den Griechischen Worten *κοσμος* und *σοφια*, Weltseht, gebildet.

*Cossa*, obsolet, für *Caxa*.

*Costa ossis ilei*, s. Crista des Darmstücks des Hüftknochens. — *prima*, s. Erste Rippe. — *scapulae inferior et superior*, s. unter Ränder des Schulterblatts. — *posterior*, s. Basis des Schulterblatts. — *superior*, s. *suprema*, s. Erste Rippe.

*Costae*, s. Rippen. — *adjutoriae*, i. q. *Costa septima octava*, s. unter Rippen. — *adulterinae*, i. q. *C. spuriae*. — *distractae*, i. q. *C. adjutoriae*. — *falsae*, i. q. *C. spuriae*. — *firmae*, i. q. *Costa tertia et quarta*, s. unter Rippen. — *fluctuantes*, s. Fluctuirende Rippen. — *genuinae*, s. *germanae*, i. q. *C. verae*. — *illegitimae*, i. q. *C. spuriae*. — *legitimae*, i. q. *C. verae*. — *mendosae*, i. q. *C. spuriae*. — *molles*, i. q. *C. fluctuantes*. — *nothae*, i. q. *C. spuriae*. — *pectorales*, i. q. *Costa quinta et sexta*, s. unter Rippen. — *recurvae*, s. *retortae*, s. *Antistrophae*. — *robustae*, i. q. *C. firmae*. — *scapulae*, s. Ränder des Schulterblatts. — *spuriae*, s. Unächte Rippen. — *sterno ipsi infixae*, i. q. *C. pectorales*. — *sternales*, i. q. *C. verae*. — *verae*, s. Rechte Rippen.



(*Costales adhaesiones diaphragmatis*, s. unter Adhäsionen  
3 Diaphragma's. — *cartilagineae*, s. Rippenknorpel. — *nervi*,  
Dorsalnerven. — *vertebrae*, s. Thoraxwirbel, ingleichen Pleu-  
rae.

(*Costalis pars diaphragmatis*, s. Costaltheil des Diaphrag-  
ma's. — *processus manubrii sterni*, s. Costalproceß des Manu-  
briums des Sternum's. — *tunica*, s. Pleura.

(Costalproceß des Manubriums des Sternum's, (*Costa-  
processus manubrii sterni*'), Rippenfortsatz<sup>2</sup> des Griffs  
des Brustbeins des Sternum's, eine besondere Unterscheidung  
auf beiden Seiten des Randes des Manubriums des Sternum's  
in der Mitte desselben bemerkbaren knorpelichen Erhöhung, durch welche  
das Manubrium mit der ersten Rippe in Verbindung steht. S.  
Sternum.

1) 2) Eoder's anat. Handb. 1. B. S. 201.

(Costaltheil des Diaphragma's, (*Costalis pars diaphrag-  
matis*'), Rippenheil<sup>2</sup>, oder Vorderer Theil<sup>3</sup> des Zwerch-  
fells, Großer<sup>4</sup>, oder Größerer<sup>5</sup> Zwerchfellsmuskel,  
*pars thoracica*, s. anterior<sup>6</sup>, s. *Musculus diaphragmatis mag-  
nus*<sup>7</sup>, s. major<sup>8</sup>,) der an den sechs untern Rippen und dem hy-  
oideischen Knorpel seinen Ursatz habende, vordere muskulöse Theil  
des Diaphragma's, hinterwärts und einwärts in den sehnigen Theil  
der die aponeurotische Expansion desselben übergehend. Sein Ge-  
ursatz ist der Lumbaltheil des Diaphragma's. S. Diaphragma.

1) 2) nach Mayer (Besch. d. menschl. K. 3. B. S. 289. 3) Hildebrandt's  
Lehrb. d. Anat. d. M. 2. B. S. 1164. 4) Winslow's anat. Abh. Übers.  
Berl. 1753, 2. Th. S. 556. 5) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D.

6) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. 7) Winslow exp. anat.  
lat. vers. T. II. S. 556. 8) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D.

(*Costo-abdominalis musculus*, s. Absteigender Abdominalmus-  
kel. — *basis*, s. *cantho-scapularis musculus*, i. q. *Serra-  
tus musculus magnus*.

(Costo-Claviculärligament, (*Costo-claviculare li-  
amentum*'), Verstärkungsfasern, welche das vordere Capselliga-  
ment des Schlüsselknochens von den äußern Flächen des Sternum's  
und dem ersten Rippenknorpel her erhält. Vgl. Capselligament des  
Schlüsselknochens und des Sternum's, auch Rhomboi-  
deisches Ligament des Schulterblatts.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 660.

(*Costo-clavicularis musculus*, i. q. *Subclavius*. — *clavio-  
humeralis musculus*, i. q. *Pectoralis*. — *coracoideus mus-  
culus*, i. q. *Serratus musculus anticus*. — *hyoideus muscu-  
lus*, i. q. *Omohyoideus*. — *ileo-puberis musculus*, s. Ab-  
steigender Abdominalmuskel. — *lumbileo-linearis transversus  
musculus*, s. *Querabdominalmuskel*. — *scapularis musculus*,  
i. q. *Serratus musculus magnus*. — *subclavius musculus*,  
i. q. *Subclavius*. — *thoracica arteria et vena*, s. unter  
Thoraxarterien und venen, die untere. — *tracheliaei muscoli*,  
i. q. *Scaleni*. — *transversalis musculus humilis*, s. Abstei-  
gender Cervicalmuskel. — — — *altior*, i. q. *Scalenus muscu-  
lus anticus*, s. *Scalenen*.

*Cotis*, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte <sup>1</sup>, i. q. *Ocuput*, s. Hinterhaupt.

<sup>1</sup>) *cotis*, vgl. *Foessii oec. Hipp. h. v.*

*Cotunnii aquaeductus*, s. *Cotunni's Aquäducte*. — *aquila*, s. *Cotunni's Feuchtigkeit*.

*Cotunni's* <sup>1</sup>, oder *Cotunnische* <sup>2</sup> *Aquäducte*, oder *Canäle*, oder *Wassergänge*, oder *gefäße*, oder *leiter*, oder *Leitungen*, (*Cotunnii aquaeductus* <sup>3</sup>, s. *canales*), *Aquäducte*, oder *Canäle*, oder *Kanäle* <sup>4</sup>, oder *Wassergänge*, oder *Wassergefäße* <sup>5</sup>, oder *Wasserleiter*, oder *Wasserleitungen* <sup>6</sup>, oder *Wasserableitungsgänge* <sup>7</sup>, oder *Trichterförmige Gänge* <sup>8</sup>, oder *Ableitungsgänge* <sup>9</sup> des *Wasser*, oder *Abtheilungsgänge* <sup>10</sup> des *Labyrinth's*, (*Aquaeductus* s. *Diverticula* <sup>11</sup> *auris internae*, *Diverticula Meckelii* <sup>12</sup> zwei im petrosen Theile der Schläfeknochen für eben so viele Lymphgefäße bestimmte Canäle, oder auch diese selbst, wodurch nämlich die als *Cotunnische Feuchtigkeit* bezeichnete, die innern Räume des Labyrinth's im Ohr erfüllende Wasser, nach außen, und wie es scheint, in Venen der harten Hirnhaut gelangt. Man unterscheidet hiernach wieder die *Wasserleitung* u. s. w. der *Schnecke* <sup>13</sup> und des *Bohrens* <sup>14</sup>, (*Aquaeductus cochleae* <sup>15</sup> et *vestibuli* <sup>16</sup>.) *S. unten*, *Labyrinth*.

<sup>1</sup>) <sup>2</sup>) nach *Domin. Cotunni*, Prof. in Neapel, so benannt. *S. dessen de aquaeductibus auris humanae internae diss. anat. Neap. 1761, (Vienne. 1774.)*

<sup>3</sup>) <sup>4</sup>) *Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1634.* <sup>5</sup>) *Wienbach's Gesch. u. Besch. d. Knoch. S. 56.* <sup>6</sup>) *Leber's Vorles. u. d. Zergliederungsk. Wien 1776, S. 499.* <sup>7</sup>) <sup>8</sup>) *Mayer's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 450.* <sup>9</sup>) *Haller's Grundr. d. Physiol. umgearb. von Leveiling, 1. Th. S. 429.* <sup>10</sup>) <sup>11</sup>) *Mayer's Besch. u. s. w. a. a. D.*

<sup>12</sup>) nach *Cotunni* (a. a. D.) <sup>13</sup>) nach *Meckel* (de *labyrinth. a. contentris diss. Argent. 1777, S. 26.*) <sup>14</sup>) — <sup>15</sup>) *Hildebrandt's Lehrb. u. s. w. a. a. D.*

*Cotunni's* oder *Cotunnische Feuchtigkeit* <sup>1</sup>, oder *Wasserchen* <sup>2</sup>, (*Cotunnii aquula* <sup>3</sup>), *Wasser* des *Labyrinth's*, *Gehörwasser*, (*Aqua* <sup>4</sup>, s. *Humor* <sup>5</sup> *labyrinthi*, *Aquula acustica* <sup>6</sup>, s. *auditoria*), die das *Labyrinth* im *Ohr* erfüllende, namentlich zum *Gehör* dienende *lymphatische Feuchtigkeit*, welche durch die *Cotunnischen Canäle* ausgeführt wird. Vgl. *Cotunni's Aquäducte*.

<sup>1</sup>) <sup>2</sup>) *Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1633.* <sup>3</sup>) *Haller's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v. Leveiling, 1. Th. S. 429.* <sup>4</sup>) —

*Mayer's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 450.* <sup>5</sup>) *Hildebrandt's Lehrb. u. s. w. a. a. D.* <sup>6</sup>) *Hempel's Anfangsgr. d. Anat. S. 393.*

*Cotunnii recessus etc.* s. *Cotunni's Vertiefungen* u. s. w. — *vaginalis sinus*, s. *unter Vaginalsinus* der *Gehirnnerven*.

*Cotunni's Vertiefungen im acustischen Sinus*, (*Cotunnii recessus pori acustici interni* <sup>1</sup>), *Löcher* der *Grund* des *Gehörnerven* <sup>2</sup>, (*Foramina sinus acustici* <sup>3</sup>), die innerhalb des *acustischen Sinus* sich zeigenden drei verschiedenen *Öffnungen* wovon a) die eine, *Oberes Loch* <sup>4</sup>, (*Foramen superius* <sup>5</sup>), die innere *Apertur* des *Faloppischen Ganges* zum *Durchgang* des *harten Nerven*

<sup>1</sup>) *Foder's Anat. Handb. 1. B. S. 63.* <sup>2</sup>) — <sup>3</sup>) *Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1630 — 1632.*



7, b) die zweite, Vorderes unteres Loch <sup>6</sup>, (Foramen cochleae <sup>7</sup>, s. anterius <sup>8</sup>), der Basis der Cochlea, und c) die dritte, hinteres unteres Loch <sup>9</sup>, (Foramen <sup>10</sup> vestibuli, s. posterius <sup>11</sup>), der des Vestibulums zugekehrt ist. Beide letztern, (Cavitas major <sup>12</sup> et minor <sup>13</sup>), sind mit kleinen Löchern durchbohrt, durch welche feine Zweige der beiden Hauptäste des acustischen Nerven in das innere Ohr dringen. Vgl. Acustischer Sinus.

6) — 11) S. Note 2) — 5) 12) 13) Eoder's anat. Handb. a. a. D.  
Cotyla, Cotyle, Cotyledon, Cotylis, nach den Griechischen gleichlautenden Worten <sup>1</sup>, wörtlich Höhle, wird insbesondere von Knochen im Gegensatz von Glene gebraucht, und bedeutet dann eine tiefe Knochenhöhle, (Cavitas ossis profunda <sup>2</sup>.) Vgl. Acetabulum.

1) κοτυλη, κοτυληδων, κωτυλις. (Galenil. de ossib. prooem. Hipp. de oss. nat. l. c. 1. 2) Riolani sag. de ossib. c. 4.

Cotyledonen <sup>1</sup>, (Cotyledones <sup>2</sup>), Milchdrüsen der Gebärmutter, (Acetabula <sup>3</sup>, s. Acceptabula <sup>4</sup> uterina, Glandulae uterinae <sup>5</sup>, Placentulae <sup>6</sup>), die an dem befruchteten Uterus von Thieren mit gespalttenen Klauen auf seiner innern Seite sich ausbildenden fleischigen Auswüchse, die bei Schafen und Ziegen, dem Fortverstand entsprechend, wirklich napfförmig sind, in welche eben viele genau damit correspondirende Gefäßbündel, (Carunculae,) auf der Außenseite des Chorions der Frucht gleichsam eingewurzelt sind, so, daß die Gefäße beider Theile in der Regel nicht in einander übergehen, sondern vielmehr sich ohne Schwierigkeit scheiden lassen, und eine milchartige Feuchtigkeit zwischen sich enthalten, die von den Gefäßen des dem Uterus zugehörigen Theils abgesondert, und in denen des Chorions der Frucht eingesogen wird. Die Annahme der ältesten Physiologen, daß auch in dem geschwängerten menschlichen Uterus und der Placenta des menschlichen Fötus der gleiche Bau statt habe, ist längst widerlegt, und werden die Ungleichheiten der Thiere nur uneigentlich eben so benannt <sup>7</sup>. S. Ei.

1) Blumenbach's Handb. d. vergl. Anat. 2. Aufst. §. 354. 2) 3) entsprechend dem Griechischen Worte κοτυληδones. (Galenii comm. ad Hipp. aph. l. 5. aph. 18.) S. Foessii occ. Hipp. h. v. ingl. Fabricii ab Aquapendente de formato foetu, p. 1. c. 4. 4) Caes. Scaliger de hist. animal. l. 10. c. 5. 5) Blumenbach's Handb. u. s. w. a. a. D. 6) Halleri el. physiol. T. VIII. l. 29. s. 5. §. 29. 7) S. Mayer's Besch. d. menschl. K. 1. B. S. 278.

Cotyloidea cavitas, i. q. Acetabulum. — glandula, f. cotyloideische Drüse: — incisura, f. Incisur des Acetabulum.

Cotyloideische Drüse oder Drüsen, (Cotyloidea glandula <sup>1</sup>), Schleimdrüsen <sup>2</sup>, oder Gelenkdrüsen <sup>3</sup> der Pfaunenhöhlgkeit, (Glandula mucilaginosae <sup>4</sup>, s. Glandulae mucilaginosae <sup>5</sup>, s. articulares acetabuli,) die Masse von Drüsen, für welche im Acetabulum eine eigne Knochenvertiefung sich findet. Vgl. bipos: glandulöse Masse des Acetabulum.

1) nach Winslow (exp. anat. lat. vers. T. I. tr. de oss. rec. §. 145. 2) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1733, 1. Th. S. 371. 3) Palafin's Chr. Anat. übers. v. Huth, 1. B. S. 168. 4) 5) Winslow exp. etc. l. c. §. 129, und Ueberschrift über §. 128.

Cotyloides os carpi, i. q. Scaphoideum os carpi.

Cotyloideus cestillus, f. Knorpelring des Acetabulum.

**Cowper's oder Cowper'sche Drüsen**<sup>1</sup>, (*Cowperi*, s. *Coperianae glandulae*<sup>2</sup>, s. *glandulae majores*, s. *mucosae*<sup>3</sup>.) Größere Cowperische Drüsen, Gegenvorsteher<sup>4</sup>, Untere Vorsteher<sup>5</sup>, oder Vorsteherdrüsen<sup>6</sup>, Schleimdrüsen der Harnröhre, (*Antiprostatae*<sup>7</sup>, *Antiprostata*<sup>8</sup>, *Prostatae inferiores*<sup>9</sup>, *Glandulae rotundae*<sup>10</sup>, s. *novae*<sup>11</sup>, s. *minores*<sup>12</sup>, s. *inferiores urethrae*.) zwei kleine rundliche, in die Classe der conglomerirten gehörige Drüsen hinter dem Bulbus der männlichen Harnröhre, deren dünne Ausführungsgänge sich schief durch die Haut der Urethra nach Vorwärts öffnen, und einen etwas dicklichen Schleim absondern. In seltenen Fällen findet sich auch eine dritte unter der Synchondrose zwischen Schooßstücke des Hüftknochens. Sie führen ihren gewöhnlichen Namen von Will. Cowper, (Anat. und Chirurg zu London,) der sie zuerst vollständig beschrieb<sup>14</sup>. S. unter Genitalien des männlichen Geschlechts.

1) Mäner's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 61. 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 5. B. S. 2270. 3) Schaarschmidt's adeny. Tabell. Tab. 6. 4) 5) Winslow's Anat. Abh. Uebers. Berl. 1733 S. 641 u. 642. 6) Meientand's Vergliederungsf. Uebers. Leipz. 1722. B. S. 645, Note. 7) nach Littre (chem. de l'acad. de Par. 1710 p. 312) obgleich seine Beschreibung nicht völlig auf die gedachten Theile paßt. 8) Littre's Drüse. 9) nach Winslow (exp. anat. lat. vers. T. I. p. 17. de abdom. S. 536.) 10) Winslow exp. etc. I. c. 11) — 12) — 13) Haller's elem. physiol. T. VII. l. 27. s. 1. S. 28. 14) Jean Meientand beschrieb sie zuerst (im Journ. des sçavans. 1684; n. 17,) auch Taur. Letzterer hat sie, nach Blanchi's Bericht (de nov. in genitalibus partibus in Mem. de Valentuomini III. p. 124) schon im Jahr 1698 öffentlich gezeigt, so wie später (de glandulis etc. Taur. 1709) beschrieben. Cowper machte zuerst (in den Philos. transact. 1699, n. 17 und dann in der seiner Eulenburg'schen angehängten Schrift: Glandularum quarundam nuper detectarum ductuumque earum excretoriorum descriptio, London 1702, 4) bekannt. Er erkennt drei Drüsen als Normalbildung.

**Cowperi flexurae**, s. Flexuren der Cerebralcavität. — **glandulae**, s. Cowper's Drüsen. — **genitalium muliebrum**, s. Bartholinische Prostata. — **musculi annuentes**, s. unter Anatomische Muskeln des Kopfs, den dritten Muskel.

**Coxa**, veraltet *Cossa*, der obere Theil des Schenkelknochens. Bezug auf seine Articulation mit dem Hüftknochen, auch die Gegend des Hüftgelenks. S. Hüfte, auch Schenkelknochen.

**Coxale os**, s. Hüftknochen.

**Coxendix**, s. Hüfte.

**Craepule**, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte<sup>1</sup>; i. q. Crapula.

1) κραπαλή (Hipp. aph. I. 5. aph. 6.)

**Craniologie**, (*Craniologia*.) Hirnschädellehre, Schädellehre, im allgemeinen der Inbegriff alles dessen, was der menschliche Schädel bei Menschen und Thieren denkwürdiges darbietet, insbesondere aber gleichbedeutend mit Cranioscopie.

**Cranioscopie**<sup>1</sup>, (*Cranioscopia*<sup>2</sup>, *Cranioscopia Galliana*<sup>3</sup>.) Schädellehre<sup>4</sup>, Hirnschädellehre<sup>5</sup>, Schädellehre<sup>6</sup>, Organenlehre<sup>7</sup>, Gall's oder Galls Schädellehre<sup>8</sup>.

1) 2) aus den Griechischen Worten κρανιον, Schädel, und σκοπια, Erspähung oder Erforschung, gebildet. 3) Sprengel instit. med. T. II. S. 117.

4) — 7) S. die Literatur zum Schluß des Artikels.



ellehre<sup>8</sup> u. s. w., Gall'sches System, Gall'sche Theorie<sup>9</sup>, der Lehre<sup>10</sup>, Schädelphysiognomie<sup>11</sup>, (Craniologia, Docina Galliana.) Die Cranioscopie ist die Wissenschaft, welche das Innere und äußere Hervortreten der materiellen Bedingungen der geistigen Anlagen — Organe — im Gehirn der Thiere und Menschen forscht und nachweist. Ihr Erfinder ist der D. Joh. Jos. Gall, welcher sie in den letzten Jahren des vergangenen Jahrhunderts zuerst in Wien, wo er als Arzt lebte, in öffentlichen Vorträgen bekannt machte, und als diese von der Regierung untersagt wurden, auf einer Reise durch Deutschland, auf welcher er diese seine Theorie in den vornehmsten Städten in öffentlichen Vorlesungen mit großem Beifall vortrug, sich nach Paris begab, wo er in Verbindung mit seinem Freunde Spurzheim mit der Herausgabe eines größeren Werkes über seine Untersuchungen des Gehirns beschäftigt ist. Zwar haben die Physiologen von jeher sowohl der Seele im allgemeinen, als einzelnen Vermögen derselben, irgend einen Theil des Körpers zum Sitz angewiesen, wie allgemein bekannt ist; allein in diesem Sinne und dem Umfange und mit der Bestimmtheit, wie Gall es thut, hat noch keiner es gethan, so daß er mit Recht als der Urheber dieser Theorie angesehen werden muß. Sie behaupteten theils im allgemeinen und a priori, daß der Sitz der Seele, oder der geistigen Fähigkeiten im Gehirn oder irgend einem Theile desselben ist; theils stellten sie nicht den Begriff eines Organs in dem Sinne, wie Gall, auf; theils endlich übergingen sie ihr Hervortreten nach innen gänzlich mit Stillschweigen.

Der Urheber dieser Theorie hingegen gelangte zu den Grundsätzen derselben ganz auf empirischem Wege, indem er bemerkte, daß gewisse ausgezeichnete Geistesvermögen eine bestimmte äußere Schädelbildung entsprechen, und umgekehrt. Durch fortgesetzte Aufmerksamkeit, Untersuchung und Vergleichen der Form von Thier- und Menschenschädeln mit ihren Anlagen, ausgezeichneten Fähigkeiten und Fertigkeiten glaubte er, folgende Behauptungen, als durch die Erfahrung bezeugte Hauptsätze der Cranioscopie aufstellen zu können.

Die Geistesvermögen sind nicht weniger durch materielle Organe thätig, als die Vermögen des Körpers.

Jedem besondern Geistesvermögen entspricht ein besonderer Theil des Gehirns, durch welchen es ist und wirkt.

Je größer und hervorstechender irgend eine Fähigkeit des Geistes ist; desto größer an Umfang und Masse ist der ihr entsprechende Gehirntheil; desto mehr tritt er nach außen hervor, und spricht sich hauptsächlich in den Windungen des Gehirns, und in der mit ihnen zunächst verbundenen innern Substanz des Gehirns aus.

Wenn diese Gehirnthteile, diese Organe der Geistesanlagen und Fähigkeiten in einem hohen Grade entwickelt sind, so werden sie äußerlich durch Erhabenheiten am Schädel sichtbar, und können durch das Gesicht und Gefaßt erkannt werden. Sie sind insgesamt doppelt.

Die Bildung der Thierschädel ist in Hinsicht der geistigen Fähig-

keiten, Anlagen und Kunsttriebe, in wie fern sie den menschlich gleich sind, ganz der Bildung des menschlichen Schädels analog. Vorstellungsvermögen, Gedächtniß, Beurtheilungsvermögen und Phantasie haben keine eigenen Organe, sondern kommen jedem einzelnen Geistesvermögen zu, in wie fern es in einem niedern oder höhern Grade der Vollkommenheit und Selbstthätigkeit entwickelt ist, z. B. das Organ des Tonsinns im niedrigsten Grade entwickelt, als Vorstellungsvermögen, bedinge die Fähigkeit, Töne zu unterscheiden, einem etwas höhern Grade, als Gedächtniß, die Töne zu behalten und wieder hervorzubringen, im noch höhern Grade, als Urtheilskraft, das Verhältniß der Töne unter einander einzusehen und zu beurtheilen, im höchsten Grade endlich, als Einbildungskraft oder Phantasie, Töne in allen Verhältnissen und Reihenfolgen als Melodie und Harmonie selbstthätig zu schaffen und zu ordnen.

Auch das Begehrungsvermögen in seinen verschiedenen Modificationen ist nicht als ein eignes für sich bestehendes Vermögen zu betrachten, sondern als eine Modification eines jeden einzelnen Geistesvermögens. Ihm entspricht daher auch kein einzelnes Organ. Das Organ des Tonsinns z. B. wird, je nachdem es mehr oder weniger entwickelt oder cultivirt ist, zu gleicher Zeit auch mehr oder weniger nach Tönen und der durch sie erregten Vorstellungen und Empfindungen verlangen, einen Gang darnach haben, der durch öftere Befriedigung zur Begierde und endlich zur Leidenschaft werden kann.

Bewußtseyn und Vernunft endlich sind das freie Wechselspiel, die freie Thätigkeit aller Vermögen, indem keines das andere ganz verbündet und unterdrückt, sondern alle mit klarem Bewußtseyn thätig sind. Es kommen ihnen mithin eben so wenig eigene Organe zu, als dem Begehrungsvermögen.

Was nun noch endlich das Gewissen betrifft, so gibt es ein natürliches: entweder ein natürliches, angebornes, und ein künstliches, erworbenes. Jenes hängt theils von den angeborenen Neigungen ab, besteht in dem unangenehmen Gefühl, das aus dem Widerspruch unserer Handlungen mit den herrschenden natürlichen Neigungen entsteht; dieses, das künstliche, wird durch Erziehung, Unterricht und Gesetzgebung in cultivirten Staaten gebildet, und besteht in dem unangenehmen Gefühle, das aus dem Widerspruche unserer Handlungen mit den uns eigenthümlichen Grundsätzen und allgemeinen Gesetzen entspringt. Es kann ihm mithin auch kein eignes Organ zukommen.

Dies sind die allgemeinen Grundsätze der Cranioscopie, welche, wenn eine genauere Betrachtung lehrt, in zwei Haupttheile zerfällt, in denen der eine die Organenlehre, der andere die Schädellehre genannt werden kann. Die Organenlehre nämlich beruht auf dem Grundsätze, daß die Geistesvermögen nur vermittelt materieller Organe, welche im Gehirn ihren Sitz haben, thätig seyn können. Die Schädellehre aber geht noch einen Schritt weiter, und behauptet, daß die einzelnen Organe des Gehirns an äußern Erhantheiten des Schädels erkannt werden können. Beides sind verschiedene Theorien und können unabhängig von einander bestehen. Man muß die Richtigkeit der erstern zugeben, und der zweiten läugnen, je



mehrere der scharfsinnigsten Physiologen thun, welche das Daseyn materieller Organe der Geistesvermögen nicht bezweifeln, wohl aber die Möglichkeit, sie durch die äußere Form und Bildung des Schädels zu erkennen.

Zur Begründung der Cranioscopie, oder der Schädellehre in weiterer Bedeutung, sind zwei Dinge erforderlich, von denen das eine so schwierig als das andere ist.

Erstlich ist hierzu erforderlich eine genaue, umfassende, philosophische Einsicht in die Natur und das Wesen der Geistesvermögen, sowohl in Hinsicht ihrer eigenthümlichen Beschaffenheit, als ihrer Verwandtschaft und des Unterschiedes, der zwischen ihnen Statt findet, also der tiefste, scharfsichtigste Blick in das Innere des menschlichen Geistes. Denn wie wäre es möglich, die materiellen, äußerlich hervortretenden Organe ihren geistigen Grundlagen beizugesellen, wenn wir das Princip nicht erst kennen?

Zweitens eine genaue und vollständige Aufzählung, Untersuchung und Vergleichung aller oder der vorzüglichsten Schädelbildungen der Thiere und Menschen, in wie fern sie einander ähnlich oder von einander verschieden sind, mit der steten besonnensten Rücksicht auf ihre individuell geistigen Vermögen, in Verbindung mit einer genauen Kenntniß derselben. Zwei Erfordernisse, welche eben so wichtig und verlässlich, als selten und schwierig zu vereinigen sind.

Der einzige mögliche und ausreichende Beweis für die Wahrheit und Richtigkeit der Cranioscopie kann nur allein a posteriori, aus der Erfahrung geführt werden, indem durch eine hinlängliche Anzahl von Belegen an Menschen- und Thierschädeln dargethan wird, daß eine bestimmte äußere Form des Schädels in der Regel einer bestimmten innern Anlage, Bildung oder Eigenschaft des Geistes entspreche, so daß z. B. eine Wulst überm Ohre jedes Mal ein Zeichen des Daseyns der Schlaueit in dem Charakter eines Menschen oder Thieres sei, und umgekehrt, daß wo Schlaueit in einem bedeutenden Grade entwickelt ist, jederzeit diese Ausbildung angetroffen werde.

Dieser einzige Beweis, vollständig geführt, ist ausreichend, allein auch der einzige, durch welchen die Wahrheit dieser Theorie begründet werden kann. Alles Philosophiren a priori pro und contra, und selbst die scharfsinnigsten und wahrscheinlichsten Gründe, daß sie möglich oder nicht möglich sei, sind von weniger Bedeutung, und können eben so wenig in Erwägung kommen, als alles Demonstriren, daß die Erscheinungen des animalischen Magnetismus nicht möglich seien, weil sie aller bisherigen Erfahrung und allen allgemein angenommenen physiologischen Grundsätzen geradezu widersprechen. Es hat in dieser Hinsicht die widersinnig scheinende Exception des gemeinen Menschenverstandes gegen philosophische Demonstrationen: „wenn es gleich nicht möglich ist, so ist es doch wahr,“ eine unbezweifelbare Wahrheit.

Dies ist der Weg, auf welchem Gall auf diese Theorie geleitet worden ist, dieß der Beweis, auf welchen er den größten Werth setzt, und dessen er sich im allgemeinen zur Ueberzeugung des Sach-Anat. physiol. Reahv. II. B.

verständigen, so wie des Wißbegierigen bedient. In wie fern es gelungen sei, und gelingen werde, durch fortgesetztes Studium u. Vergleich des Innern und Aeußern des thierischen Organismus seine Theorie zu begründen, vermag wohl nur derjenige zu entscheiden, welcher in Hinsicht auf Scharfsinn, Kenntniß der geistigen Natur Menschen und der Thiere und einer umfassenden vergleichenden Beobachtung des Aeußern des Organismus mit dem geistigen Innern auf einer höhern, oder doch wenigstens derselben Stufe der Vollkommenheit, wie ihr Urheber steht.

Bis jetzt ist daher dieser Beweis noch nicht widerlegt worden. Die die beschränkenden Bedingungen der Allgemeingültigkeit dieser Theorie als krankhafte Anomalien, Mißbildungen, mechanische Störungen, hohes Alter und einige Ausnahmen von der Regel, können nicht gegen aufgeführt werden, eben so wenig als die Schwierigkeit, welche aus denselben bei Untersuchung und Erforschung der einzelnen Organe sich ergibt.

Abgesehen nun von diesem einzigen ausreichenden Beweise für die Cranioscopie lassen sich nun sowohl dafür als dagegen mancherlei Gründe angeben, von welchen die wichtigsten kurz und unparteiisch aufgeführt werden sollen, und zwar erstlich in Betreff der Organenlehre, dann in Bezug auf die Schädellehre.

Die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseyns materieller Organe im Gehirn für die Geistesfähigkeiten hat folgendes für und wider sich.

Für das Daseyn derselben im allgemeinen spricht:

1) die allgemeine analoge Beobachtung, daß keine Kraft eines thierischen Organismus sich äußern könne, es sei denn vermittelt eines Organs, und umgekehrt, daß wir von dem Daseyn eines Organs auf irgend eine Function desselben mit Recht schließen können. Dieß allgemeine Gesetz des thierischen Organismus läßt sich auch auf die geistigen Vermögen anwenden, und die Wahrscheinlichkeit des Daseyns materieller Organe für dieselben daraus herleiten.

Allein wenn die Somnambule im Zustande des Hellsehens, oder die Cataleptische im Zustande des Parorysmus mit der Magengegend hören, sehen, schmecken und riechen kann; wenn sie weit entfernt für menschliche Augen nicht wahrnehmbare Gegenstände sieht, und von Dingen, die Meilen weit entfernt sind, in dem Momente Veränderungen mit ihnen vorgehen, Kenntniß hat, welcher Organ bedient sie sich dann? —

2) Das große Gehirn scheint keine andere Bestimmung zu haben als den geistigen Vermögen zu Organen zu dienen. Denn auch hat sonst keine bekannte Function. b) Es ist zum Leben nicht nöthig. Es gibt Thierclassen, die gar kein Gehirn haben. c) Es nimmt an Umfang und Vollkommenheit der Ausbildung zu, je höher die Stufe ist, auf welcher das Thier in Hinsicht seiner geistigen Vollkommenheiten steht. Am vollkommensten ist es bei dem Menschen.

Dagegen werden folgende Bemerkungen aufgestellt:

1) Wenn Organe da sind, so müssen sie in fortwährender Thätigkeit seyn, sonst verschwinden sie nach der Analogie. Ein Muskel, der nicht geübt wird, schwindet endlich ganz dahin, und atrophirt.



eine Membran aus. Wer also das Organ des Würgsinnes hat, muß todtschlagen, oder das Organ verschwindet; alle Organe, welche daher nicht von Kindheit an geübt wurden, müssen verschrumpfen und auf immer verloren gehen, u. s. w. (Acker mann.)

Allein diese Behauptung widerspricht der Analogie; denn z. B. die Muskeln des Drees schwinden nie ganz, obgleich die wenigsten Menschen sie üben. Auch kann ein geistiges Organ, z. B. des Entwendungs- oder Würgsinnes, durch Aufregung des Triebes zum Stehen oder Tödtlen häufig thätig seyn, ohne daß die freie Willkür der Vernunft ihm zu Willen wäre.

2). Wenn aber das vernünftige Ich sich frei gegen den Antrieb der Organe selbstthätig bestimmen kann; so muß es auch ohne Organe und abgesondert von ihnen handeln können. Kann es aber dieß in einem Falle; warum nicht in allen Fällen? Warum soll es bisweilen Organe nöthig haben, bisweilen nicht? Heißt es daher nicht, die Schwierigkeiten vervielfältigen, wenn man erst Organe annimmt, um die Thätigkeit der geistigen Vermögen zu erklären (Berard und Montegre im Dict. des scienc. medic. art. cranioscopie.)

Allein wenn sich das vernünftige Ich gegen den Antrieb irgend eines Organs bestimmt, so folgt daraus noch nicht, daß es ohne Organ, sondern bloß, daß es nicht durch dieß thätig sei; kann es nicht im hellen Augenblick dem Antriebe eines andern Organs folgen? Und wenn es sich ganz frei entschließt, muß es nicht durch sein Wesen thätig seyn, und ist dieß nicht Resultat der Organisation?

3) Das System der Cranioscopie beruht auf der Hypothese von angeborenen Ideen, da diese aber längst durch Locke und andere Philosophen widerlegt ist, so fällt mit ihr auch jene Theorie. (Ebend. Art. Cranioscopie.)

Nicht angeborne Begriffe und Ideen setzt die Theorie der Cranioscopie voraus, sondern angeborne Anlagen, Fähigkeiten und Neigungen; diese aber hat niemand geläugnet. Oder was ist's, das den Viber bestimmt, einen künstlichen Bau aufzuführen, und nicht das Schaf? —

4) Manche Organe setzen aber angeborne Ideen voraus, z. B. das Organ des Entwendungssinnes setzt den Begriff des Eigenthums voraus. (Acker mann.)

Allein das Organ des Entwendungssinnes setzt nicht den Begriff des Eigenthums, sondern bloß den Trieb nach Eigenthum und Besitz voraus, und dieser ist Menschen und Thieren angeboren, und, gehörig geregelt, eine notwendige Bedingung des gesellschaftlichen Lebens. Außer den von Gall angeführten Beispielen der Tyroler Kühe, des Wildes und der Vögel, welche sich ein Eigenthum eines gewissen Bezirks erkämpfen, kann ich ein merkwürdiges Beispiel von einer niedern Thierklasse anführen. Ich fing einst eine Menge Ratten zusammen, und beobachtete sie eine Zeit lang. So oft als ich eine neugefangene Ratte zu den schon vorhandenen hinzuthat, wurde sie von diesen als eindringlich todt gebissen. Nur wenn ich die vorhandenen auf 24 Stunden aus ihrem Behältniß herausnahm, und die neugefangene so lange allein hineinsperrte, respectirten die nun hinzugekommenen alten Ratten das Besitzrecht des neuen Ankömmlings, und selbst nur auf diese Weise konnte ich ihm den Grad von Muth ge-

ben, den das Gefühl eines frühern Besizes selbst den Thieren gibt und, welcher ihnen im entgegengesetzten Falle gänzlich mangelte.

5) Sollten die Gefühle, Affecten, oder das Gefühl im allgemeinen kein Organ haben? Ganz gewiß! Allein könnte dieß seine Sitz auch im Gehirn haben? Höchst wahrscheinlich nicht, denn die Gefühle sprechen sich in der Gegend der Herzgrube aus; auch würde dieß allzunahes Zusammenseyn der Organe der Gefühle mit den Organen der höhern Geisteskräfte zu nachtheilig auf diese einwirken.

Eine andere Frage, deren Entscheidung weit schwieriger ist, betrifft die Art des Seyns der Organe. Ist das Gehirn im allgemeinen das Organ der Geistesfähigkeiten, oder sind einzelne Theile desselben einzelnen Fähigkeiten zugetheilt?

Für jenes sprechen folgende Bemerkungen:

1) Man kann im Gehirne nicht so verschiedne modificirte Gebilde entdecken, als z. B. zur Aufnahme der Sinnesindrücke in den Sinnesorganen gefunden werden. Denn wie verschieden ist nicht das Auge vom Ohre; das Gehirn scheint vielmehr eine gleichartige, aus weißer und grauer Substanz bestehende Masse zu seyn.

Es ist wahr, das Gehirn scheint aus einer homogenen Masse zu bestehen; allein ist dieß nicht bloße Täuschung, und der Stumpfheit unserer Sinneswerkzeuge zuzuschreiben? Der Nerv des Auges scheint mit dem Geruchsnerve die ganze innere Structur gemein zu haben; allein ist dieß auch wirklich so? Gewiß nicht!

2) Die Einheit der animalischen Functionen und des moralischen Handelns scheint eine Einheit des Organs oder des Urquells dieser Thätigkeiten vorauszusetzen, welche nicht in disparate Organe zersplittert seyn kann. (Dict. des sc. m. ibid.)

Allein die Einheit des thierischen Seyns ist durch mancherlei Organe bedingt, ohne daß dadurch irgend eine Störung im gesunden Zustande entstünde; und können denn die verschiedenen Organe des Geistesvermögens nicht auch einen gemeinschaftlichen Vereinigungsplatz haben?

Für das Daseyn einzelner Organe kann angeführt werden:

1) die stete Analogie im ganzen thierischen Organismus. In jeder Function desselben gibt es ein bestimmtes Organ. Dieses Organ kann quantitativ und qualitativ verschiedene, im ganzen Organismus immer sich gleichbleibende Producte hervorbringen, z. B. die Niere viel oder wenig, hellen oder trüben Urin. So können die Organe des Gehirns nicht allein von einander verschieden seyn, sondern jedes wieder in quantitativer und qualitativer Hinsicht besondere Thätigkeiten äußern, z. B. als Vorstellungskraft, Gedächtniß, Urtheilungskraft, Phantasie.

2) Es gibt eine Menge Windungen auf der Oberfläche des Gehirns, wozu diese Windungen? Wozu die mannigfaltigen Faltungen des Gehirns, wenn sie nicht bestimmten und verschiedenen Zwecken entsprechen?

Es ließe sich aber wohl auch denken, daß ein und dasselbe Organ alle die mannigfaltigen Windungen zu seiner Construction bedürft.

3) Der Mensch kann mit den Gegenständen des Denkens umgehen, und wenn das eine Vermögen des Geistes ermüdet ist, ein-



veres mit neuer Kraft, ohne erst auszuruhen, in Thätigkeit setzen. Dieß scheint auf Verschiedenheit der Organe hinzudeuten.

Alein kann diese Erscheinung nicht eben so natürlich aus dem allgemeinen Gesetze des Organismus erklärt werden, nach welchem die durch eine Art Reize erschöpfte Erregbarkeit desselben durch eine andere und verschiedene Art Reize von neuem wieder in Thätigkeit gesetzt wird?

4) Die Anlagen und Fähigkeiten der Menschen und Thiere sind so äußerst verschieden und mannigfaltig. Woher diese Verschiedenheit? Wäre das Gehirn im allgemeinen das Organ, so müßten sie bei der ziemlichen Gleichheit desselben in Hinsicht auf Größe und Bildung auch so ziemlich einander alle gleich seyn. Sind aber verschiedene Theile desselben für verschiedene Anlagen des Geistes bestimmt, so kann der eine Theil auf Kosten des andern sich entwickeln, und diese bemerkte große Verschiedenheit begründen.

5) Die Erfahrung lehrt, daß sich nicht alle Anlagen und Fähigkeiten gleichzeitig entwickeln, sondern die eine früher, z. B. der Beobachtungsgeist, die andere später, z. B. der Geschlechtstrieb. Wäre das Gehirn im allgemeinen das Organ der Geistesanlagen, so würden sie sich gleichzeitig entwickeln müssen; sind es aber einzelne Theile, so werden sich bloß diejenigen Fähigkeiten am zeitigsten entwickeln, deren Organe am frühesten hervortreten.

6) Hierher gehört die Beobachtung, daß einzelne Fähigkeiten, z. B. Gedächtnißarten, gänzlich verloren gingen, durch Krankheit, Verletzungen u. s. w., während daß die andern unversehrt blieben.

7) Manche Erscheinungen am Menschen lassen sich am bequemsten aus dieser Theorie erklären, z. B. das Nachtwandeln, die fixen Ideen, der Wahnsinn, indem wir annehmen, daß einzelne Organe einseitig oder übermäßig thätig sind u. s. w.

Dieß sind kürzlich die Gründe und Gegengründe, auf welchen die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit des Daseyns verschiedener Organe im Gehirn beruht, nicht die Wirklichkeit derselben, welche einzig auf dem oben angeführten Wege der Induction bewiesen werden kann.

Was nun aber den zweiten Theil der Cranioscopie, die eigentliche Schädellehre, betrifft, so kann für und gegen die Behauptung, daß die Organe des Gehirns äußerlich durch eine analoge Schädelbildung erkannt werden können, folgendes angeführt werden.

Dafür scheint zu sprechen:

1) daß nach der Analogie des thierischen Organismus von der bildenden Natur befolgte Gesetz: große Kraft durch viel Masse zu bedingen. Wohin sie nur viel Kraft und Energie legt, dahin legt sie auch viel Masse. Beispiele liefert die Anatomie der Thiere und Menschen, z. B. im Mark des Rüssels des Elephanten, im Rückenmark der Schlange u. s. w. Dasselbe Gesetz gilt auch von der Bildung der Gehirnorgane.

2) Jede Thierklasse hat eine ihrem Naturell und Charakter entsprechende Schädelbildung, so daß man schon aus der äußern Form bestimmen kann, welchem Thier ein Schädel angehöre. Indem ich also sage, dieß ist ein Fuchschädel, so erkenne ich zugleich aus dem

Menschen das Innere; dasselbe muß der Analogie nach vom Menschen Schädel gelten, nicht bloß im allgemeinen, sondern auch in Hinsicht einzelner Organe, z. B. der Schläuheit, wenn sie analog in einem hohen Grade entwickelt sind.

3) Die äußere Figur des knöchernen Schädels hängt von der Form und Gestalt des Gehirns ab, und wird genau nach ihr gebildet, nicht allein im Mutterleibe, sondern auch während des ganzen Lebens. Dieß beweisen

a) der Augenschein, z. B. die eingedrückten Gefäße u. s. w.

b) Die Beobachtung, daß das Gehirn vor der Hirnschale im Embryo vorhanden ist, welche sich erst vom dritten Monate an aus verschiedenen Knochen über und um das in seine drei Häute eingeschlossene, mit einer bestimmten Gestalt versehene Hirn allmählig zu crystallisiren beginnt.

c) Die Form des äußern Schädels wird durch den steten Wechsel der Materie während der ganzen Lebenszeit nach dem Gehirn gebildet. Dieß beweist nicht allein die allmähliche Umbildung des Schädels im kindlichen und spätern Alter, wo einige Theile heraus, andere zurücktreten, (z. B. die nach vorn gewölbte Stirn der Kinder platzt sich in der Folge ab,) sondern auch die Veränderungen der Hirnschale, welche durch Krankheiten des Hirns bewirkt werden, z. B. beim Werserkopf u. s. w. Zwei merkwürdige Fälle hatte ich in diesem Jahre beobachtet, welche hierher gehören. In dem einen war die linke Seite des Schädels eines Landmanns, auf welche er vor zwei Jahren von einem Kosaken einen sehr heftigen Schlag mit der Faust erhalten hatte, seit der Zeit unter fortwährenden Schmerzen immer mehr nach außen zu getreten, so daß das Seitenwandbein dieser Seite um einen Zoll weiter nach außen zu stand, und die beiden Hälften des Schädels ganz ungleich machte. Es war keine äußere Geschwulst, sondern ein wirkliches Entwickeln der Knochentheile. Das andere war dem ähnlich. Hierher gehört auch die Bemerkung, daß die innere Lamelle sich nach mechanischen Eindrücken wieder aufhebt.

d) Die beiden Lamellen laufen im gesunden Zustande, wenige Stellen ausgenommen, mit einander parallel.

Dagegen kann angeführt werden:

1) Größe und Menge der Masse ist nicht die einzige Bedingung der Vollkommenheit eines Organs im thierischen Körper, sondern auch die innere Energie; das Qualitative ist sowohl dabei zu berücksichtigen, als das Quantitative, dieß muß eben so gut von den Theilen des Gehirns gelten, z. B. kleine Augen sehen oft schärfer als große. — Allein im Kleinen kann der Nerv mehr entwickelt, und die Form richtiger und vollkommener seyn.

2) Durch Krankheiten können die innern Gehirnthteile vergrößert oder verkleinert, und dadurch zugleich die äußern Schädelbildung anomal verändert werden.

3) Im hohen Alter verdicken sich die Wände des Schädels, und ihre äußere Form entspricht nicht mehr der innern. Dieß gibt Gelegenheit zu.

4) Nicht auf allen Stellen läuft die äußere Lamelle mit der inneren



ern parallel, z. B. an der Gegend der Stirnhöhlen, wo gerade eine Menge Organe ihren Sitz haben sollen.

Doch wird selbst an diesen Stellen eine ganz verschiedene Schädelbildung bei gleichmäßiger Entwicklung der Hirnhöhlen wahrgenommen. Diese muß doch auch vom Gehirn herrühren. Vgl. übrigens Gehirn, Hirnschädel und Organe des Gehirns. (Dzondi.)

### Hierher gehörige Schriften:

2. F. Froiep's Darstellung der ganzen, auf Untersuchungen und Verrichtungen des Gehirns gegründeten Theorie der Physiognomie des Dr. Gall, Weimar 1801, 1802) 8.

W. . . : kritische Darstellung der Gall'schen anatomisch-physiologischen Untersuchungen des Gehirns und Schädelbaus, Zürich 1802, 3. und J. Ad. Walther's neue Darstellungen der Gall'schen Gehirn- u. Schädellehre u. s. w., München 1804, 8.

Ch. Villers lettre à G. Cuvier sur une nouvelle théorie du cerveau par Gall, à Metz au 10. 8. (Gall's Darstellung des Gehirns, als Organ der Seelenfähigkeiten, und Gemüthsseigenschaften, von Villers, Uebersetzung mit Zusätzen; Wien u. Leipzig. 1805; 8.)

J. Ad. Bergk's Bemerkungen und Zweifel über die Gehirn- und Schädeltheorie des Dr. Gall, Leipzig. 1803, 8.

J. A. F. Penne's Entwicklung der Gall'schen Theorie über das Gehirn, Leipzig. 1803, 8.

Fr. H. Martens leicht faßliche Darstellung der Gehirn- und Schädellehre und der daraus entspringenden physiologischen u. psychologischen Folgerungen des Dr. Gall, mit Kupfern, Leipzig. 1803, 4.

J. D. Meßger über den menschlichen Kopf in anthropologischer Rücksicht, nebst einigen Bemerkungen über Gall's Hirn- u. Schädeltheorie, Königsb. 1803, 8.

J. G. Walter Etwas über Gall's Hirnschädellehre, Berl. 1803, 8.

K. P. Schundeniuss (Dzondi) die Organe des Gehirns nach Dr. Gall's Beobachtungen, eine Vorlesung, Wittenberg 1804, 8.

Jos. Gall's Vorlesungen über die Verrichtungen des Gehirns, herausgegeben v. J. H. E. Selpert, Berl. 1804, 8.

Ch. H. E. Vischoff's Darstellung der Gall'schen Gehirn- u. Schädellehre, nebst Bemerkungen über diese Lehre, v. E. W. Hufeland, Berl. 1805, (verm. Aufl. 1806,) 8. (trad. en français, sur la seconde édition, avec des notes, par J. M. Barheguière, à Berlin 1806, 8.)

K. A. Blöde Gall's Lehre über die Verrichtungen des Gehirns, nach dessen zu Dresden gehaltenen Vorlesungen, Dresd. 1805, (verm. Aufl. 1806,) 8.

G. A. Flemming's Ideen zu einer künftigen Beurtheilung der Gall'schen Untersuchungen über die Verrichtungen des Gehirns, oder der Gehirn- und Schädeltheorie des Dr. Gall, Berl. 1805, 8.

H. E. Kessler's Prüfung des Gall'schen Systems der Hirn- und Schädellehre, Jena 1805, 8.

H. Steffens drei Vorlesungen über Gall's Organenlehre, Halle 1805, 8.

J. G. Ackermann die Gall'sche Hirn-, Schädel- und Organenlehre, vom Gesichtspunct der Erfahrung aus beurtheilt und widerlegt, Heidelberg. 1806, 8.

Antwortung der Ackermann'schen Beurtheilung und Widerlegung der Gall'schen Hirn-, Schädel- und Organenlehre. von einem Schüler des Hrn. Dr. Gall und von ihm selbst berichtigt, Halle 1806, 8.

J. B. Demangeon physiologie intellectuelle, ou Développement de la doctrine du professeur Gall, à Paris 1806, (sec. éd. corr. et augmentée, 1808,) 8.

E. Bartels anthropologische Bemerkungen über das Gehirn und den Schädel des Menschen, mit beständiger Beziehung auf die Gall'schen Entdeckungen, Berlin 1806, 8.

J. E. W. Himlin's Erörterung des Gall'schen Versuchs einer Gehirnlehre, nach seinem psychologischen Gehalte, Halle 1806, 8.

Al. Moreschi sul sistema cranio-copico, Discorso, Bologna 1807, 8.

Huber Gall's Lehre und das Gesetz der Gewohnheit, Bnfel 1808, 8.

J. B. Nacquart traité sur la nouvelle physiologie du cerveau, ou Ex-

position de la doctrine de Gall sur la structure et les fonctions de cet-  
gane, à Paris 1808, 8.

J. Verrier la crânomancie du Docteur Gall anéantie au moyen de l'An-  
tomie et de la physiologie de l'ame, à Paris 1808, 12.

Vgl. die Literatur zu dem Artikel Gehirn.

*Cranium*, s. Hirnschädel.

*Crantes*<sup>1</sup> *dentes*, s. Weisheitszähne.

1) nach dem Griechischen Worte *κραντε*, von *κρανω*, perficio. Uneigentlich  
wird dieß Wort jedoch nicht nur den Backenzähnen überhaupt, sondern auch  
Zähnen überhaupt beigelegt. (Rufi de appell. part. c. h. Stephani de  
med. 1564, p. 531.)

*Crapula*, s. Rausch.

*Crisis*, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte<sup>3</sup>, überhaup-  
t Mischung, insbesondere Temperament.

1) *κρασις*.

*Crassa arteria*, s. Aorta. — *intestina*, s. Dickdarm. —  
*membrana cerebri*, s. *meninx*, s. Harte Hirnhaut. — *os*,  
s. Dicke Knochen.

*Crassament*, (*Crassamentum sanguinis*), s. Etwas  
des Bluts.

*Crassissimus nervus brachii*, s. Radialnerv.

*Crassities*, s. *Crassitudo corporis*, s. Corpulenz.

*Crassum intestinum*, s. Dickdarm, ingl. Colon.

*Crateravchen*, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen  
Wortes<sup>1</sup>, ein Mensch mit starkem kräftigen Nacken. Vgl. Hals.

1) *κρατερωνυχεν*. (Hipp. epid. l. 6. s. 1. aph. 1.)

*Cratismus*, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte<sup>1</sup>,  
Maß einer vollen Körperkraft in der vollen Höhe des Lebens. 5.  
Körperkraft.

1) *κρατισμος*. (Hipp. epidem l. 6. s. 8. aph. 26.)

*Cratos*, beßgl.<sup>1</sup>, im allgemeinen Kraft, uneigentlich die  
nere Hand, weil dadurch die Körperkraft im Druck und Fassen  
äußert. Vgl. Hohlhand.

1) *κρατος*.

*Creatio*, s. Schöpfung.

*Creator*, s. Schöpfer.

*Creatura*, s. Geschöpf.

*Cremaster*<sup>1</sup>, (*Cremaster*<sup>2</sup>), Muskel des Samenstrang<sup>3</sup>,  
Fleischige Scheide der Scheidenhaut des Sam-  
stranges<sup>4</sup>, Hodenmuskel<sup>5</sup>, Hodenmäuslein, Hängem-  
Muskel<sup>6</sup>, oder Aufhebemuskel<sup>7</sup>, oder Hebemuskel<sup>8</sup>, oder Auf-  
hänger<sup>9</sup> des Hoden, Hodenaufziehendes Mäuslein<sup>10</sup>,  
(*Musculus testis*<sup>11</sup>, s. *virilis testis*<sup>12</sup>, s. *testiculi*<sup>13</sup>, s. testis).

1) Mayer's Beschr. d. menschl. K. 5. B. S. 96. 2) nach dem Griechischen  
Worte *κρεμαστρον*, nach Celsus (de med. l. 7. c. 18) der Strang, (nervus),  
an dem der Hoden hängt, in der besondern Bedeutung von Muskelhaut  
nach Vesal (de h. corp. fabr. l. 2. c. 33) ingl. Nodlan (anthropogr. 15  
c. 34.) 3) nach Sommering (Muskel. S. 215.) 4) 5) nach  
bebrannt (Lehrb. d. Anat. d. M. 2. B. S. 1150 u. 3. B. 2228.) 6) 7)  
Flentaub's Zergliederungsk. Uebers. Leipz. 1782, 2. B. S. 632. 8) 9)  
Mayer's Beschr. u. f. w. a. a. D. 9) Winslow's anat. Abb. Uebers.  
Berl. 1733, 3. B. S. 628. 10) Browne's verteutschte Beschr. d. Anat.  
v. Spener, Berl. 1704, S. 9. 11) nach Galeppia (obs. anat.  
Vesal. opp. T. II. p. 718.) 12) nach Vesal (l. c.) 13) nach  
Columbus (de re an. l. 3. c. 23.)



condus <sup>14</sup>, Elevator testiculi <sup>15</sup>, Suspensor <sup>16</sup>, s. Suspensorium <sup>17</sup> testis,) der von den untersten mit einander verbundenen Muskelfasern des aufsteigenden Abdominalmuskels und des Queralbdominalmuskels gemeinschaftlich gebildete muskulöse Ueberzug des Samenstranges und des Testikels, der bei seiner Wirkung diesen letztern aufwärts zieht und zugleich gelinde preßt, so selbst beim Coitus thätig mitzuwirken scheint. S. unter Genitalien des männlichen Geschlechts, Hoden.

- 14) nach Schreger (Nomencl. d. Musk. S. 24.) 15) Scharschmidt's myol. Tabellen, Tab. 14. 16) Bartholini anat. l. 1. c. 22. 17) Browne's verteutschte Beschr. u. f. w. a. a. D.

**Cremaster des weiblichen Körpers, (*Cremaster mulieris* <sup>1</sup>.)** So wurden von ältern Anatomen die kaum bemerkbaren, doch auch in neuern Zeiten anerkannten <sup>2</sup>, von dem aufsteigenden Abdominalmuskels aus über das runde Ligament des Uterus, nachdem dasselbe durch den Abdominalring hervorgetreten, sich verbreitenden Muskelfasern genannt, oder es wurde auch dem runden Ligamente des Uterus, in Voraussehung einer muskulösen Natur dieses Theils, dieser Name selbst gegeben <sup>3</sup>. S. unter Genitalien des weiblichen Geschlechts, Uterus.

- 1) Riolani anthropogr. l. 5. c. 35. 2) Vgl. unter dem Artikel Abdominalmuskeln, Note 16. 3) S. Vesalii de h. c. fabr. l. 2. c. 33.

**Crementum corporis**, f. Wachsthum des Körpers.

**Cremni**, in Uebersetzung des gleichlautenden Griechischen Worts <sup>1</sup>, c. q. Alae muliebres. S. Schamlefzen.

- 1) *κρημναι*, eigentlich Berg- oder Uferländer, in obiger Bedeutung von Hippocrates (de loc. in homine ed. Foesii p. 423) gebraucht. Vgl. Foesii oec. Hipp. h. v.

**Cremor lactis**, f. Rahm.

**Crena calami scriptorii**, f. Federkiel. — **cordis**, f. Kerbe des Herzens.

**Crenatus margo lienis**, f. unter Ränder der Milz, äußerer Rand.

**Crepido <sup>1</sup> extremi canalıs spinalis**, f. Bogenförmiges Ende des Rückenmarkcanals.

- 1) die Unterlage oder Basis, daher auch metaphorisch „Crepido dorsi,“ (Stalii Achill. l. 1. v. 448) sonst auch Uferwand, oder sonst eine feste Einfassung, ingl. hervorspringender Theil eines Gebäudes.

**Crepitus ventris <sup>1</sup>, Bombulus, Bombus <sup>2</sup>**, lauter Abgang von Blähungen. S. unter Blähungen <sup>3</sup>.

- 1) 2) Fieni de flatibus c. 6. 3) Note 5.

**Crescitiva vis**, f. Ernährungskraft.

**Kreuz**, f. Sacralregion.

**Kreuzbänder u. f. w.**, f. Kreuzligamente u. f. w. — **bein**, Kreuzknochen. — **blutader**, f. Sacralvene.

**Kreuzförmige Bänder**, f. Kreuzligamente. — **Erhebung des Hinterhauptbeins**, f. Kreuzförmige Spina des Occipitalknochens. — **nerven**, f. Sacralnerven. — **pulsadern**, f. Sacralarterien. — **Rinne des Hinterhauptbeins**, f. Kreuzförmige Spina des Occipitalknochens.

**Kreuzigung**, **Kreuzung**, f. Decussation.

*Cribriforme*<sup>1</sup>, s. *Cribrosum*<sup>2</sup> os, s. Ethmoidalknochen.

1) 2) wörtlch siebförmig, von *cribrum*, Sieb.

*Cribriformis lamina ossis ethmoidei*, s. Cribrose Platte Ethmoidalknochens.

*Cribrose Incisur des Sphenoidalknochens*, (*Cribrosa incisura ossis sphenoidi*<sup>1</sup>, *Sulcus ethmoidalis ossis sphenoidi*<sup>2</sup>.) der an dem vordern Rande der kleinen Flügel des Sphenoidalknochens unterschiedene Einschnitt, mit welchem sich das hintere gespitzte Ende der cribrosen Platte des Ethmoidalknochens verbindet an dessen Stelle aber auch öfters eine spinöse Hervorragung kommt, wo dann am gegenseitigen Knochen ein Einschnitt befindlich ist. S. Sphenoidalknochen.

1) Eoder's anat. Handb. 1. B. S. 71.  
Knoch. 2. Aufl. S. 112.

2) Walter's Abh. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 112.

*Cribrose Maceln des Vestibulums*, (*Cribrosae maculae vestibuli*<sup>1</sup>.) So werden drei Stellen des Vestibulums bezeichnet die von einer Menge dafelbst befindlicher kleinen Löcher, durch welche kleine Nerven des hintern Astes des Gehörnerven in das Vestibulum treten, herrühren, und diesen Stellen ein siebförmiges Ansehen geben. S. unter Ohr, inneres Ohr.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1632.

*Cribrose Platte des Ethmoidalknochens*, (*Cribrosa*<sup>1</sup>, s. *cribriformis lamina*<sup>2</sup> *ossis ethmoidei*.) Siebplatte<sup>3</sup>, Siebbeinplatte<sup>4</sup>, Siebchen<sup>5</sup>, Siebförmiges Blatt<sup>6</sup>, Horizontalplatte des Siebbeins<sup>7</sup>, (*Lamina horizontalis ossis ethmoidei*, *Cribrum*<sup>8</sup>.) die durchlöcherzte obere horizontale Fläche des Ethmoidalknochens, welche vorwärts in der vom Sphenoidalknochen gebildeten Ethmoidalincisur sich mit diesem, nach hinten aber weder durch eine Spitze, oder durch einen Ausschnitt mit dem vordern obern Theile des Körpers des Sphenoidalknochens verbindet, und hauptsächlich dem Geruchsnerven; außerdem aber noch einigen kleinen Venen die sich in dem sichelförmigen Sinus ergießen, zum Durchgang dienen. S. Ethmoidalknochen.

1) Schaaarschmidt's osteol. Tabell. Tab. 10.

2) 3) Walter's Abh. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 113 u. 114.

4) Mayer's Besch. d. menschl. Knoch. 2. Aufl. S. 318.

5) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 58.

6) 7) Eoder's anat. Handb. 1. B. S. 80.

8) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 58.

u. s. w. a. a. D.

*Cribrose Spina des Sphenoidalknochens*, (*Cribrosa spina ossis sphenoidi*<sup>1</sup>.) Siebbein Spitze des Keilbeins<sup>2</sup>, (*Apophysis*<sup>3</sup>, s. *Processus ethmoidalis ossis sphenoidi*.) die an dem vordern Rande der kleinen Flügel des Sphenoidalknochens unterschiedene scharfe Hervorragung, welche mit dem hintern abgeschnittenen Ende der cribrosen Platte des Ethmoidalknochens in Verbindung steht, wenn nämlich nicht der unter Cribrose Incisur u. s. w. gedachte Fall Statt hat. S. Sphenoidalknochen.

1) Eoder's anat. Handb. 1. B. S. 71.

2) Eoder's anat. Tafeln, 1. S. 11.

Fig. 9. Nr. 10.

3) Walter's Abh. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 112.

*Cribrosa incisura ossis sphenoidi*, s. Cribrose Incisur des Sphenoidalknochens. — *lamina ossis ethmoidei*, s. Cribrose Platte des Ethmoidalknochens. — *membrana foetus*, s. Hunterische Membran.



n. — spina ossis sphenoides, f. Cribrose Spina des Sphenoidknochens.

Cribrosae maculae vestibuli, f. Cribrose Makeln des Vestibulums.

Cribrosum corpus Hippocratis, f. Zellgewebe.

Cribrum, f. Ethmoidalknochen, auch Cribrose Platte des Ethmoidalknochens. — renum, f. unter Becken der Nieren.

Cricoarytanoideische Ligamente, (Crico-aryteaenoidae<sup>1</sup>, s. Crico-arytaenoidae capsularia<sup>2</sup> ligamenta<sup>3</sup>, oder Kapselmembranen<sup>4</sup> der gießförmigen Knorpel, die die Gelenkflächen der arytanoideischen Knorpel umgebend und an den cricoideischen Knorpel befestigenden Ligamente. S. Larynx.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1879. 2) Maner's Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 120. 3) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. 4) Weltbrecht's Synthesm. Uebers. Straßb. 1779, S. 233.

Cricoarytanoideische Muskeln, (Crico-arytaenoidae<sup>1</sup>, s. Crico-arytaenoidae<sup>2</sup> musculi,) Ring- und Schnepfknorpelmuskel<sup>3</sup>, Ring- und Gießkannenförmige Knorpelmäuflein<sup>4</sup>, Ringgießbeckenmuskel, zwei kleine Muskeln, welche auf jeder Seite des Larynx von dem cricoideischen zum arytanoideischen Knorpel gehen; vorzüglich zur Bewegung des letztern dienend; und von denen a) der hintere Crico-Arytanoideus<sup>5</sup>, posterior<sup>6</sup>, s. posticus<sup>7</sup>,) Hinterer erweiternder Kehlmuskel<sup>8</sup>, Hinterer breiter Muskel der Luftröhre<sup>9</sup>, Dilator glottidis posterior<sup>10</sup>, Musculus crico-creto-aritaeideus<sup>11</sup>,) hinterwärts und äußerlich vom cricoideischen Knorpel ausgeht, schräg auf- und auswärts gehend, an das Tuberkel des arytanoideischen Knorpels ansetzt, und mit dem gegenseitigen gemeinschaftlich wirkend, beide arytanoideische Knorpel von einander zieht, durch die Stimmrinne erweitert wird, b) der innere, oder Seiten- Crico-Arytanoideus<sup>12</sup> (C. lateralis<sup>13</sup>,) Seiten- Ringgießbeckenmuskel, Unterer Seitenmuskel der Kehle der Luftröhre<sup>14</sup>, (Musculus crico-latero-aritaeideus<sup>15</sup>,) der von dem Seitentheile der äußern Fläche des vordern Bogens des cricoideischen Knorpels entspringend, schräg ein- und aufwärts zur äußern Seite des arytanoideischen Knorpels geht, diesen Knorpel anwärts zieht, und so ebenfalls die Stimmrinne erweitert. S. Larynxmuskeln.

- 1) Spigelii de hum. c. fabr. l. 4. c. 6. 2) nach Douglas (myogr. compar. c. 14.) 3) nach Sommering (Musf. S. 165 u. 166.) 4) Browne's verteutschte Besch. d. Musc. v. Spener, Berl. 1701, S. 27 u. 28. 5) Maner's Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 127. 6) Winslow exp. anat. lat. vers. T. IV. S. 450. 7) Cowperi anat. reform. Lond. 1694, c. 15. 8) Pleutaud's Vergliederungsk. Uebers. Lelpz. 1782, 2. Bd. S. 379. 9) Schaarschmidt's myolog. Tabellen, Tab. 7. 10) Sommering's Musf. a. a. D. u. Pleutaud's Vergliederungsk. a. a. D. 11) (Crico-creti-aritaeoidien) nach Dumas (système method. de nomenclat. des musc. p. 110.) 12) Maner's anat. Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 124. 13) Cowperi an. etc. l. c. 14) Schaarschmidt's myol. Tabellen, Tab. 7. 15) (Crico-lateri-aritaeoidien) nach Dumas (système method. de nomenclat. des musc. p. 110.)

252 Crico-arytaenoides musc. later. Cricothyreoid. ligar

*Crico-arytaenoides musculus lateralis, posterior, s. silius*, f. Cricoarytanoideische Muskeln. — *superior*, f. Arytanoideische Muskeln, schräge Muskeln.

*Crico-creto-arytaenoides musculus*, f. unter Cricoarytanoideische Muskeln, den hintern.

*Cricoepiglottideus*<sup>1</sup>, (*Crico-epiglottideus musculus*<sup>2</sup>.) Muskelfasern, welche von dem cricoideischen Knorpel zur glottis gehen, sind an Dicken unterschieden worden<sup>3</sup>. Bei Menschen kommen sie nicht vor. Vgl. Larynx.

- 1) Mayer's Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 131, Note. 2) Haller's el. physiol. T. III. l. 9. s. 1. §. 17. 3) nach Verheyen's Uebers. (S. dess. Anat. c. h. tr. 3. c. 11.)

*Cricoideischer Knorpel*, (*Cricoidea*<sup>1</sup>, s. *Cricoid cartilago*.) Ringförmiger Knorpel<sup>2</sup>, Ringknorpel (*Cartilago crycoidea*<sup>3</sup>, s. *annularis*<sup>4</sup>, s. *anularis*<sup>5</sup>, s. *anulariformis*<sup>6</sup>, s. *coopertoria*, s. *cymbularis*, s. *innominata* s. *anonyma*<sup>10</sup>.) der unterste der den Kehlkopf bildenden Knorpel in ringförmiger Gestalt, dessen hintere Seite aber viel höher ansteigt als die vordere. S. Larynx.

- 1) nach dem Griechischen von Galen (de vocis instrumentis c. 4) gebildet. Borte *κρικοειδης*, ringförmig, (nämlich von der Form eines Ringes hergenommen, wie ihn die Perser und andere orientalische Völker beim Bogenschießen brauchten.) Leber's praelect. anat. ed. nova, Vienn. 1778, p. 369. Verheyen c. hum. an. tr. 3. c. 11. 3) Winslow's anat. Uebers. Berl. 1733, 4. B. S. 357. 4) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. §. 1875. 5) diltlos wie in den unbemerkten Zusatzen fügen damit (Walter's Abh. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 206.) Mayer's Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 118. 7) Haller's el. physiol. T. III. l. 9. s. 1. §. 2. 8) Vesalii de c. hum. fabr. c. 38. 9) Bartholini anat. l. 2. c. 11. 10) *ανωνυμη* Galen (a. a. D.)

*Crico-latero-arytaenoides musculus*, f. unter Cricoarytanoideische Muskeln, den innern.

*Crico-Oesophageus*<sup>1</sup>, (*Crico-oesophageus musculus*.) So werden auch wohl die an den cricoideischen Knorpel nach wärts sich ansetzenden, zum Schlund bogenförmig herabsteigenden Muskelfasern unterschieden, die aber füglich zum Cricopharyngeus gerechnet werden können.

- 1) Mayer's Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 289.

*Cricopharyngeus*<sup>1</sup>, (*Crico-pharyngeus*<sup>2</sup>, s. *Cricopharyngaenus*<sup>2</sup>, s. *musculus*.) Schlundmuskel oberhalb des Ringknorpel, diejenigen Muskelfasern des untern Constrictors des Pharynx, welche seitwärts vom Bogen des cricoideischen Knorpels entspringen. S. unter Constrictoren des Pharynx, den untern.

- 1) Mayer's Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 288. 2) Winslow's anat. lat. vers. T. IV. §. 483. 3) nach Balsa (de aur. c. 3. §. 20.)

*Cricothyreoidische Ligamente*, (*Crico-thyreoidische Ligamenta*<sup>1</sup>.) Ringschildknorpelbänder, sind Verbindungsbänder des cricoideischen und des thyreoidischen Knorpels. Man unterscheidet a) zwei Seitenligamente, (*Ligamenta crico-thyreoidica lateralia*<sup>2</sup>, s. *scapularia*<sup>3</sup>.) Seitenringchildknorpelbänder.

- 1) 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. §. 1877. 3) *veit* Urecht syndesm. §. 21.



ader, Gelenkkapsel = 4, oder Kapselbänder<sup>5</sup>, oder Kapsel-  
membranen<sup>6</sup>, (*Ligamenta thyro-cricoidea posteriora*<sup>7</sup>), die die En-  
der Hörner des thyreoideischen Knorpels an den dafür geeigneten Gelenk-  
den des cricoideischen Knorpels selbst befestigen, b) ein mittleres,  
gelförmiges Band<sup>8</sup>, (*Ligamentum crico-thyreoideum me-  
m*<sup>9</sup>, s. *conoideum*<sup>10</sup>), ein dickes starkes Ligament, welches in der  
te vom untern Rande des thyreoideischen Knorpels zum obern Rande  
vordern Bogens des cricoideischen Knorpels herabgeht. *S. Larynx*.  
4) Maier's Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 118. 5) Hildebrandt's  
Lehrb. u. f. w. a. a. D. 6) Weitbrecht's Synthesm. Straßb. 1779,  
S. 232. 7) (*thyrocricoidien posterior*) nach Bertin (*lett. sur le nouv.  
système de la voix*, p. 285. 8) Maier's Besch. d. menschl. K. 4. B.  
S. 117. 9) nach Weitbrecht a. a. D. S. 217. 10) nach Bertin a. a. D.  
*Cricothyreoideus*<sup>1</sup>, (*Crico-thyreoideus*<sup>2</sup>, *Crico-  
yreoidea*<sup>3</sup>, s. *Cricothyreoides*<sup>4</sup>, s. *Crīco-  
yreoideus anticus et lateralis*<sup>5</sup>, s. *exterior et  
erior*<sup>6</sup>, s. *musculus*), Ringschildmuskel<sup>7</sup>, Ring-  
Schildknorpelmuskel<sup>8</sup>, Vorderer und unterer Mus-  
der Kehle, oder Luftröhre<sup>9</sup>, Ring- und Schildför-  
ges Mäuflein<sup>10</sup>, Vorderer erweiternder Kehlmus-  
<sup>11</sup>, (*Dilatator glottidis anterior*<sup>12</sup>), ein kleiner Muskel, wel-  
auf jeder Seite vorwärts und in der Mitte des Bogens des cri-  
eischen Knorpels entspringt, sich über dem untern Rande des Schild-  
pels ansetzt, und indem er beide Knorpel gegen einander zieht, die  
mmrige erschlaßt. *S. Larynxmuskeln*.

Eoder's anat. Tafeln, Taf. 51. Fig. 1. Nr. 33. 3) nach Comper  
(*myotom ref. ed. 1724*, o. 17.) 3) nach Douglas (*myogr. compar.*  
c. 14.) 4) nach Santorini (*obs. anat. c. 6. §. 6.*) 5) nach Kio-  
lan, der zwei Muskeln daraus macht (*anthropogr. l. 5. c. 18.*) 6) nach  
Unterscheidung älterer Anatomen. Vgl. Halleri *elem. physiol. T. III. l. 9.*  
s. 1. §. 15. 7) 8) nach Schmerring (*Muskell. §. 157 u. 164.*) 9)  
nach Schaarschmidt (*inhol. Tabell. Tab. 7.*) 10) Brogne's vertauschte  
Besch. d. Mnsk. v. Spener, Berl. 1704, S. 27. 11) 12) Lieutaud's  
Zergliederungsk. Uebers. Leipz. 1782, 2. B. S. 379.

*Crico-thyro-pharyngeus musculus*, s. unter Constrictoren des  
Larynx, den mittlern.

*Cricotrachealligament*, (*Cricotracheale ligamen-  
m*), ein ringförmiges, den cricoideischen Knorpel mit dem ersten  
epeligen Ringe der Luftröhre verbindendes Ligament. *S. Larynx*.  
Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. §. 1876.

*Crines*, eigentlich Haupthaar<sup>1</sup>, besonders Hinterhaupts Haare, sonst  
h Haare überhaupt. *S. Haare*, Haupthaare.

1) Festus (*de veter. verb. sign. l.*) leitet das Wort *crinis* von *discretionis* her.  
*Crinuli*, s. Härchen.

*Criniger*, mit langen Haaren versehen. *S. Haarreich*.

*Crinitae partes corporis*, s. Behaarte Theile des Körpers.

*Crinitus*, a, um, s. Haarreich.

*Crispatura capillorum*, *Crispi capilli*, s. Krauses Haar.

*Crispicapillus*, *Crispulus*, s. Krauskopf.

*Crissatio*<sup>1</sup>, *Cinchesis*<sup>2</sup>, *Cinclismus*<sup>3</sup>, wollüstige Bewegung  
Lenden beim Beischlaf.

*Crissare mulierum*, *Cevere*, *virorum est*. Juvenal. sat. 2. v. 21  
et 6. v. 52. Vgl. Priapejn (*ed. Patav. 1664*, *carm. 19 et indice.*) 2)  
3) *S. diese Worte*.

**Crista, (Crista<sup>1</sup>), Kamm<sup>2</sup>, Hahnenkamm, Hahnkammähnliche Erhöhung, (Spina continua<sup>3</sup>),** eine schneckenartige Hervorragung an einem Knochen, welche, in beträchtlicher Länge auf der Oberfläche desselben hinlaufend, Muskeln oder andern Theilen zur Anlage dient. S. unter Knochenerhabenheiten.

- 1) eigentlich der Kamm der Vögel, besonders des Hahns, sonst auch ein Gebüsch, in der Vergleichung mit dem Hahnenkamm in die anatomische Nomenklatur übertragen. Leberi praelect. anat. ed. nova, Vienn. 1778, p. 11. Schimmering's Knochenl. S. 58. 3) Walter's Abh. v. trockn. Sch. 2. Aufl. S. 29.

**Crista der Fibula, (Crista fibulae<sup>1</sup>), Vorderer Winkel oder Vordere hervorstehende Linie des Wadenbeins (Angulus anterior fibulae,) der vordere vorzüglich scharf hervorstehende Winkel des Wadenknochens, vom obern Theil des Mittelfußes an bis unterwärts zu dem äußern Knöchel, in welchem er sich flächend verliert. S. Fibula.**

- 1) Walter's Abh. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 368. 2) Monro's Anat. d. menschl. übers. v. Krause, S. 447. 3) Mayer's Besch. d. menschl. 2. B. S. 136

**Crista der Nasenknochen, (Crista ossium nasi<sup>1</sup>), Kamm der Nasenknochen<sup>2</sup>, (Crista nasalis<sup>3</sup>),** die an der hintern innern Fläche beider Nasenknochen meistens durch das Zusammentreten der innern Ränder dieser Knochen sich bildende erhabene Kante, welche den hohlen Rand der Scheidewand des Ethmoidalknochens aufnimmt. S. Nasenknochen.

- 1) Walter's Abh. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 166. 2) Mayer's Anat. d. menschl. R. 2. B. S. 33. 3) Loder's anat. Handb. 1. B. S. 15.

**Crista der Tibia, (Crista tibiae<sup>1</sup>), Schienbeinscharf, Kamm des Schienbeins<sup>2</sup>, Vorderer Winkel der Tibia (Angulus anterior<sup>3</sup>, s. acutus<sup>6</sup>, s. primus<sup>7</sup> tibiae, Spina s. Spina anterior<sup>9</sup> tibiae, Anticnemion<sup>10</sup>, Anticnemium<sup>11</sup>, Ocrea<sup>12</sup>, Linea prima<sup>13</sup>, s. anterior tibiae, Prima et anterior tibia<sup>14</sup>, Antetibiale<sup>15</sup>, Protibiale<sup>16</sup>),** die vordere scharf hervorstehende Kante der Tibia, welche von der Tuberosität derselben an in etwas geschwängelter Richtung abwärts läuft, und die dieselbe von der innern Fläche trennt. S. Tibia.

- 1) Loder's anat. Handb. 1. B. S. 298. 2) Meientaud's Ser. derungsk. Uebers. Leipz. 1782, 1. B. S. 209. 3) Monro's Anat. d. menschl. übers. v. Krause, S. 444. 4) Walter's Abhandl. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 363. 5) Leberi praelect. anat. ed. nova, Vienn. 1778, p. 94. 6) Bauhini theatr. anat. l. 4. c. 41, nota m. 8) Piccolhomini. S. ebendas. 8) Bartholini anat. libell. 4. c. 1. 9) Blumenbach's Besch. d. Knoch. S. 387. 10) 11) S. die Tibia, wobey aber mehr die ganze vordere, bloß von Haut bedeckte Fläche des Schienbeins verstanden wird. S. Stephani dict. med. 1664, p. 575. in wörtlicher Uebersetzung des vorigen Wortes, eigentlich ein Beinhardtisch. nach Vesal (de c. h. fabr. l. 1. c. 31.) 14) Foessii oec. Hipp. 15) 16) Wölher's Anweis. zur Knochenl. S. 609. αὐτὴν ὑπομύον.

**Crista des Darmstücks des Hüftknochens, (Crista ilei ossis ilei, s. ileum<sup>2</sup>, s. ilii<sup>3</sup>, s. ilium<sup>4</sup>), Oberer Rand**

- 1) Heisteri comp. anat. ed. 2. p. 32. 2) Walter's Abhandl. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 260. 3) Winslow expos. anat. lat. vers. oss. sicc. S. 580. 4) Mayer's Besch. d. menschl. R. 2. B. S. 7. 5) Kulmus anat. Tabellen, Tab. 5.



er Kamm <sup>6</sup>, oder Hahnenkammähnlicher Rand des Darmbeins, Darmbeinstachel <sup>7</sup>, (Costa <sup>8</sup>, s. Spina <sup>9</sup>, Margo superior <sup>10</sup>, s. supremus <sup>11</sup> ossis ilium,) der obere, ebene Rand des Darmstücks des Hüftknochens, welcher nach vorn konförmig in die vordere obere Spina des Darmstücks übergeht, und hinten aber in einer stark abwärts geneigten Richtung als Zuspitzung dieses Theils ausläuft, und mehreren Muskeln und Ligamenten zur Anlage dient. S. Hüftknochen.

6) Walter's Abh. u. f. w. a. a. D. 7) Pientaud's Zergliederungsk. Uebers. Leipz. 1782, 1. B. S. 161. 8) Riolani anthropogr. Paris. 1626, p. 876. 9) Th. Bartholini anat. libell. 4. c. 16. 10) Schaarschmidt's osteol. Tabellen, Tab. 18. 11) Leberi praelect. anat. ed. nova, Vienn. 1778, p. 70.

Crista des Ethmoidalknochens, (Crista ossis ethmoidei <sup>1</sup>,) Kamm des Hahnenkamm, Hahnenkamm <sup>2</sup>, Kamm des Darmbeins <sup>3</sup>, (Crista galli <sup>4</sup>, Apophysis superior ossis ethmoidei <sup>5</sup>, Processus crista galli, s. acutus <sup>6</sup>, s. cristatus <sup>7</sup> ossis ethmoidei,) die in der Mitte der cribrosen Platte des Ethmoidalknochens von vorn nach hinten auslaufende, und so auch an Dicke zunehmende Knochenerhabenheit, welche sich mit ihrem vordern Rande der Ethmoidalincisur mit dem Stirnknochen verbindet, und demelförmigen Fortsatz der harten Hirnhaut vorwärts zur Anlage dient. S. Ethmoidalknochen.

1) Schmerring's Knochenl. S. 155. 2) Walter's Abh. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 112. 3) Schmerring's Knochenl. a. a. D. 4) wegen der Aehnlichkeit mit einem Hahnenkamm schon von ältern Anatomen so benannt. 5) Vesalii de c. h. fabr. 1. r. c. 6. 6) Schaarschmidt's osteol. Tabell. Tab. 10. 7) Bartholini anat. libell. 4. c. 8. 8) Eustachii tab. an. t. 46. fig. 12 et 14.

Crista des Schooßstücks des Hüftknochens, (Crista ossis pubis <sup>1</sup>,) Oberer <sup>2</sup>, oder Scharfer Rand <sup>3</sup>, oder Leiste <sup>4</sup>, Kamm <sup>5</sup> des Schooßbeins, (Margo superior ossis pubis <sup>6</sup>, Pecten pubis <sup>7</sup>,) die oberwärts am horizontalen Theile des Schooßstücks des Hüftknochens etwas nach hinten zu befindliche längliche Erhabenheit, welche nach vorn ins Tuberculum des Schooßstücks, und hinten und außen aber in die innere semicirculäre Linie, als Fortsetzung sie anzusehen ist, übergeht und dem Pectineus, so dem innern Schenkel des geraden Abdominalmuskels zur Anlage dient. S. Hüftknochen.

1) Walter's Abhandl. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 272. 2) Pöder's anat. Handb. 1. B. S. 184. 3) Pientaud's Zergliederungsk. Uebers. Leipz. 1782, 1. B. S. 165. 4) Meaer's Besch. d. menschl. K. 3. B. S. 182. 5) Schmerring's Knochenl. S. 420. 6) Leberi praelect. anat. ed. nova 1778, p. 75. 7) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 610.

Crista fibulae. s. Crista der Fibula. — frontalis, s. Frontospina. — galli, s. Crista des Ethmoidalknochens. — ilei, s. Crista des Darmstücks des Hüftknochens. — interna ossis frontalis, s. Frontalospina. — lacrymalis, s. Nasalercrista des Thränenknochens. — maxillae superioris, s. Lacrymalercrista des Oberkiefers. — longitudinalis partis adscendentis ossis parietalis, s. Longitudinalercrista des aufsteigenden Nasenstücks des Gaumens.

menknochens. — *muliebris*, f. Schamleszen. — *nasalis. maxillae superioris*, f. Nasalcrista des Oberkiefers. — — *os lacrymalis*, f. Nasalcrista des Thränenknochens. — — *ossis nasi*, f. Crista der Nasenknochen. — — — *palati*, f. Nasalcrista des Gaumenknochens. — *occipitalis externa, interna*, f. Occipitalspina. — *ossis ethmoidei*, f. Crista des Ethmoidalknochens. — — *ilei*, s. *ileum*, s. *ilii*, s. *ilium*, i. q. C. i. — — — *intermedia*, f. Intermediäre Linie des Darmstücks des Hüftknochens. — — *pubis*, f. Crista des Schooßstücks des Hüftknochens. — *ossium nasi*, f. Crista der Nasenknochen. — *palatina*, f. Nasalcrista der Gaumenknochen. — *processus pterygoidei ossis palati*, f. Eminenz des pterygoideischen Processes des Gaumenknochens. — *sphenoidalis*, f. Sphenoidalcrista. — *tibiae*, f. Crista der Tibia. — *turbinalis ossis palati inferioris et superioris*, f. Querlinien des Gaumenknochens.

*Cristae vulvae*, f. Nymphen.

*Cristatum os*, f. Ethmoidalknochen.

*Cristatus margo lienis*, f. unter Ränder der Milz, äußerer Rand. — *processus ossis ethmoidei*, f. Crista des Ethmoidalknochens.

*Critici anni*, f. Stufenjahre.

*Cronband der Spindel*, i. q. *Coronarium ligamentum radii*, f. Annularligament des Radius. — *bein*, f. Stirnknochen.

1) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1733, 2. B. S. 420.

*Crone*, f. Coronoidischer Proceß. — *der Zähne*, f. Krone der Zähne. — *des Elbogens*, — *des Unterkiefers*, f. Coronoidischer Proceß der Ulna — des Unterkiefers.

*Cronsförmiger Fortsatz*, — — *des Elbogens*, — — *untern Kinnbackens*, f. Coronoidischer Proceß der Ulna, — des Unterkiefers. — *gräthe*, f. Frontalspina. — *nase*, f. Coronalsutur. — *spitze*, — — *des Elbogens*, — — *Unterkiefers*, f. Coronoidischer Proceß der Ulna — — des Unterkiefers. — *stachel*, f. Frontalspina.

*Crothaphi*, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wortes, f. Schläfe, auch Schläfeknochen.

1) *κροταφοι*. Rufi Eph. de appell. part. c. h. initio.

*Crotaphita*, *Crotaphites*, beßgl. 1, f. Temporalmuskel.

1) *κροταφίτης*. Rufi Eph. de appell. c. h. l. Vgl. Stephani dict. d. 1564, p. 339.

*Crotapho-coronoides musculus*, f. Temporalmuskel.

*Cruces eminentes ossis occipitis*, f. Kreuzförmige Spina des Occipitalknochens.

*Cruciata ligamenta*, f. Kreuzligamente. — — *digitorum*, f. Kreuzförmige Ligamente der Finger und Zehen. — — *genu in poplite*, f. Kreuzligamente des Knies. — *spina ossis occipitis*, f. Kreuzförmige Spina des Occipitalknochens.

*Cruciatae lineae ossis occipitis*, f. Kreuzförmige Spina des Occipitalknochens.

*Cruciatum ligamentum atlantis*, f. Querligament des Halses. — — *tarsi*, f. Kreuzligament des Tarsus.



*Cruciformes eminentiae ossis occipitis*, f. Kreuzförmige Spina  
Decipitalknochen.

*Cruciformia ligamenta etc.* f. Kreuzligamente u. f. w.

*Crudelitas*, f. Grausamkeit.

*Cruentae lacrymae*, f. Blutweinen.

*Cruentus sudor*, f. Blutschweiß.

*Cruor*, f. Blut, auch Cruor des Bluts. — *chyli*, f. Cruor  
Chylus.

*Cruor*<sup>1</sup> des Bluts, (*Cruor*<sup>2</sup>, *Cruor sanguinis*,) Blut-  
schen<sup>3</sup>, Blutinsel<sup>4</sup>, Rothes Blut<sup>5</sup>, Grassament<sup>6</sup>,  
Grassamentum<sup>7</sup>, s. Gruma sanguinis, Placenta cruoris<sup>8</sup>, s.  
sanguinis<sup>9</sup>, Insula sanguinis<sup>10</sup>,) der in außer Bewegung und  
seinem vitalen Verhältnisse gesetztem Blute sich von selbst ab-  
scheidende, und mit Zurücklassung des ihn dann umgebenden Blut-  
stoffs in eine gleichförmige Masse gerinnende, selbst aber wieder in  
den fibrösen und rothfärbenden Theil zu scheidende Hauptbestandtheil.  
Blut.

1) Burdach's Encycl. d. Heilkwiss. 2. B. S. 864. 2) Halleri elem.  
physiol. T. II. l. 5. s. 2. S. 5. 3) — 5) Maier's Besch. d. menschl.  
K. 4. B. S. 62. 6) Pucca's Entw. e. Syst. d. mediz. Anthropol. 1. B.  
S. 236. 7) Halleri primae lineae physiol. S. 138. 8) — 10)  
Maier's Besch. u. f. w. a. a. D.

*Cruor*<sup>1</sup> des Chylus, (*Cruor chyli*,) Cruorähnlicher An-  
theil<sup>2</sup>, oder Coagulum<sup>3</sup> des Chylus, (*Coagulum chyli*<sup>4</sup>,)  
auch im Chylus unterscheidbare, zu Gerinnung in Art des Blut-  
stoffs geneigte Antheil. S. Blut und Chylus.

1) — 5) nach Emmert. (S. Reil's u. Autenrieth's Arch. für d. physiol.  
8. B. 2. St. S. 169 n. 191.) 4) Sprengel inst. physiol. P. I. p. 367.

*Cruor sanguinis*, f. Cruor des Bluts.

*Cruorähnlicher Antheil des Chylus*, f. Cruor des Chylus.

*Crura*, f. Schenkel. — *annuli abdominis*, f. Schenkel des  
Abdominalrings. — — *membranae tympani*, f. Schenkel des  
Ringes der Membran des Tympanums. — *aponeurosis palma-*  
ris, f. unter Palmaraponeurose. — — *plantaris*, f. unter Plan-  
taraponeurose. — *arcuum vertebrarum*, f. Schenkel der Wirbel-  
bögen. — *cerebelli*, f. Schenkel des kleinen Gehirns. — *cere-*  
bri, f. Schenkel des großen Gehirns. — *clitoridis*, f. Nymphen.  
*diaphragmatis*, f. Schenkel des Diaphragma's. — *fornicis*  
*cerebri*, f. Schenkel des Fornix des Gehirns. — *incudis*, f. Schen-  
kel des Incus. — *medullae oblongatae*, s. *medullaria cerc-*  
bri, i. q. C. cerebri. — — *glandulae pinealis*, f. Schenkel  
der Hirnsdrüse. — *musculi recti abdominis*, f. Schenkel des  
rechten Abdominalmuskels. — *stapidis*, f. Schenkel des Stapes.

*Cruraeus musculus*, i. q. Cruralis.

*Cruralarterie*, (*Cruralis arteria*<sup>1</sup>,) Schenkelarterie<sup>2</sup>,  
Schenkel Schlagader<sup>3</sup>, oder. Pulsader<sup>4</sup>, Aeußere Hüft-  
Pulsader<sup>5</sup>, oder Beckenschlagader<sup>6</sup>, (*Arteria fe-*  
moralis, Th. Bartholini anat. libell. 2. c. 6. 2) Sommering's Gefäßk.

1) S. 191. 3) Leber's Vorles. über d. Zergliederungskf. Wien 1776, S. 304.  
4) Winslow's anat. Alth. Uebers. Berl. 1735, 5. B. S. 105. 5) Wins-  
low's anat. Alth. u. f. w. a. a. D. S. 96. Vgl. Note 8. 6) Leber's  
Vorles. u. f. w. a. a. D. Vgl. Note 8.

anatom. physiol. Realw. II. B.

moralis <sup>7</sup>, s. iliaca externa <sup>8</sup>.) Sie ist einer der beiden Hauptzweige, in welche sich die iliacische Arterie oder Hüftarterie (*Arteria iliaca communis*,) spaltet. Während der andere Zweig, die hypogastrische Arterie, sich im Becken verzweigt, und also in die Tiefe desselben herabsenkt, geht der Stamm der Cruralarterie an der innern Seite des großen Psoasmuskels gegen das Poupart'sche Band hin, um unter demselben das Becken zu verlassen und an den Schenkel zu gelangen, wo er seinen Namen bis an die Stelle beibehält, an welcher er sich der Kniekehle nähert, von welcher aus er seine Zweige, nur mit verändertem Namen, bis zu der Spitze der Extremität von der Cruralarterie und ihren Zweigen mit Blut versorgt werden <sup>9</sup>.

Die Cruralarterie der rechten Seite liegt anfänglich an der innern Seite der gleichnamigen Vene; dann geht sie aber vor die Vene her nach außen, so daß sie unterhalb des Poupart'schen Bandes an der äußeren Seite der Vene erscheint. Die Cruralarterie der linken Seite liegt gleich von ihrem Entstehen an an der äußeren Seite der sie begleitenden Vene, so daß also die Arterie da, wo sie unterhalb des Poupart'schen Bandes zuerst am Schenkel sichtbar wird, zwischen der Cruralvene und dem Cruralnerven in der Mitte liegt. In dieser Stelle kommen, außer sehr kleinen Ästchen für den Psoasmuskel und den hintern Umfang des Peritonäums, folgende bedeutendere Zweige aus dem Stamm:

1) Die epigastrische Arterie, untere Bauchdecke (A. epigastrica.) Sie entspringt an der innern Seite des Stammes, wo er in dem Hiatus unter dem Poupart'schen Band liegt, und geht nach innen und hinten in das Becken zurück, um sich von hinten den Samenstrang beim männlichen, das Mutterband aber beim weiblichen Geschlecht, und nähert sich oberhalb des Bauchringes dem äußern Rand des geraden Abdominalmuskels, zwischen dessen Muskelbündeln sie nun bis über den Nabel in gerader Richtung aufsteigt. Schon an ihrem Ursprung gibt die epigastrische Arterie einen Zweig ab, welcher hinter der Aufhängung der Abdominalmuskeln an den Schambein nach innen geht, um mit dem ähnlichen Zweig der epigastrischen Arterie der entgegengesetzten Seite sich verbindet, und in dem Zellgewebe und den Sehnen der geraden Abdominalmuskeln, so wie in dem Pyramidenmuskel verästelt. Oft durchbohrt dieser Zweig die Sehnen der Bauchmuskeln und verästelt sich im Venusberg.

Ein zweiter Zweig, die äußere spermatische Arterie (A. spermatica externa,) geht von der epigastrischen Arterie hinter dem Bauchring ab, und verästelt sich beim männlichen Geschlecht in

7) Maner's Besch. d. Blutgef. S. 145.

8) Verheyen c. mu.

anat. tr. 7. c. 1. Sie führt diese Benennung gewöhnlich nur in Hinsicht auf den obern Theil, ehe sie an den Schenkel gelangt. Neuere Schriftsteller vermeiden diese Benennung, um Mißverstand zu vermeiden. Vgl. Maner's Besch. d. Blutgef. f. w. a. a. O.

9) Für die intuitive Kenntniß derselben verdient besonders Haller icon. anat. fasc. V Bemerkung. Auch A. Murray diss. anat. in aneurisma femoris observationes, Ups. 1781, ingl. Scarpa sull' aneurisma tab. 1 — 4. (N. d. P.)



den Scheidenhäuten des Samenstranges und Hodens, indem sie mit dem Samenstrang durch den Bauchring heraustritt. In dem weiblichen Körper gesellt sich diese Arterie zum runden Mutterband, und verästelt sich bis zum Grund des Uterus. Die übrigen Zweige der epigastrischen Arterie, welche sehr zahlreich sind, gehören sämmtlich dem geraden und dem breiten Abdominalmuskel an, und verästeln sich auch in der vordern Wand des Peritonäums und den Hautdecken. Die äußern Zweige, welche sich bis zu den breiten Abdominalmuskeln erstrecken, anastomosiren mit Zweigen der Lumbalarterien und der untersten Intercoastalarterien, die aufsteigenden Zweige aber münden mit den herabsteigenden Zweigen des epigastrischen Zweiges der innern Mammaria ein. Die epigastrische Arterie ist zuweilen ein Zweig der hypogastrischen Arterie, indem sie aus der Obturatoria entspringt.

2) Die Abdominalarterie, (*A. abdominalis*.) entspringt als ein dünner Zweig an der äußeren Seite der Cruralarterie, der vorigen Arterie gegenüber, aber etwas höher. Sie ist jedoch kein vollständiger Zweig des Stammes, indem sie oft aus der unwundenen iliacischen Arterie entspringt. Immer nimmt sie ihre Richtung etwas nach außen, und verästelt sich dann aufwärts zu den breiten Bauchmuskeln und den Hautdecken, so daß ihre Zweige um den äußern Umfang des Bauchringes herum sich vertheilen, und zuletzt mit Zweigen der vorigen und folgenden Arterie verbinden.

3) Die unwundene iliacische Arterie, Kranzarterie des Darmbeins, (*A. circumflexa ilei*.) Sie hat denselben Durchmesser wie die epigastrische Arterie, und entspringt ihr gerade gegenüber, also weiter unten als die vorige, an der äußern Seite des Stammes. Sie erhebt sich auch nach außen, gelangt so hinter das Poupart'sche Band, und geht nun hinter den breiten Bauchmuskeln zum vordern obern Darmbeinstachel, (*Spina ilei anterior superior*.) hin. Bis zu dieser Stelle gibt sie Zweige ab, welche schrägs nach innen laufen, um sich zu den Inguinaldrüsen und in das umgebende Zellgewebe zu verbreiten, und bisweilen auch die Abdominalarterie, immer aber noch außer dieser, Zweige, welche an dem äußern Umfang der breiten Bauchmuskeln sich verästeln, so wie in dem Peritonäum und den Hautdecken, und welche Verbindungen mit den untern Lumbalarterien eingehen. An dem vordern obern Darmbeinstachel, bisweilen auch unterhalb desselben, geht ein Zweig ab, der von manchen äußere unwundene iliacische Arterie, (*A. circumflexa ilei externa*.) genannt wird, und dicht an der äußern Lefze des Darmbeinkammes hinget, so daß dieser Zweig anfanglich den geraden Femoralmuskel und den Fascialmuskel, Tensor der Schenkelbinde, dann den mittlern Gesäßmuskel, (*Glutaeus medius*.) und endlich die breiten Abdominalmuskeln und die Haut der Hüften mit Zweigen versieht. Im Gegensatz zu diesem Zweig geht dann die Fortsetzung des Hauptastes in die unwundene iliacische Arterie, (*A. circumflexa ilei externa*.) genannt, sie beugt sich an der innern Lefze des Darmbeinkammes bis zum letzten Lumbarwirbel aufwärts, verbindet sich hier mit Zweigen der Lumbalarterie, und, außer den zahlreichen Zweigen, welche der äußeren iliacischen Muskel von ihr erhält, gibt sie noch Aestchen an das

Peritonäum, und Zweige an das Periosteum des Hüftknochens, und an mehreren Stellen in den Knochen selbst eindringen und sich zu Diploe desselben verästeln.

4) Die äußere Pudendalarterie, äußere Schamarterie, (A. pudenda externa.) Sogleich unterhalb des Popartischen Bandes entspringt diese Arterie an der innern Seite der Cruralarterie, sie ist zwar von geringerm Durchmesser als die vorhergehende, verbreitet aber doch zahlreiche Zweige; ihr Hauptrichtung geht nach innen, gegen die äußern Schamtheile hin, welchen sich, zwischen der Schenkelbinde und der Haut fortlaufend, nähert; die ersten Zweige gelangen zu den Inguinaldrüsen und der Haut der Inguinalgegend; andere Zweige gehen zu dem Gracilismuskel herab; die meisten Hautzweige verästeln sich in dem Zellgewebe und Fett des Leistenhügels, und ein besonderer Zweig geht in männlichen Körpern als vordere Scrotalarterie zum obern Theil des Hodensackes und zur Haut der Ruthe bis an das Präputium hin. In weiblichen Körpern verbreitet sich ein ähnlicher Zweig als vordere Labialarterie zu dem obern Theil der Labien und zur Haut der Clitoris. Die angeführten Zweige kommen nicht alle Mal aus einer, sondern bisweilen aus zwei oder drei schwachen Zweigen, die unmittelbar und nahe über einander aus der Cruralarterie hervortreten, so daß also dann eine doppelte oder dreifache Pudendalarterie vorhanden ist.

Der Stamm der Cruralarterie liegt Anfangs am Schenkel vor dem mit dem Psoasmuskel verbundenen iliacischen Muskel, und ist von den Inguinaldrüsen bedeckt; dann nimmt er aber seine Richtung mehr nach innen, so daß er bis gegen den untern Theil des Schenkels dicht neben dem innern Vastusmuskel, vor dem Pectinausmuskel und den Adductoren des Schenkelbeins, und hinter dem quer vor ihm herabsteigenden Sartormuskel liegt, endlich aber zwischen der runden Sehne des großen Abductors und dem inneren Vastusmuskel rückwärts zur Kniekehle fortschreitet. In diesem ganzen Verlauf wird die Cruralarterie von der Cruralvene und dem Cruralnerven begleitet, und ist mit vielem Zellgewebe umgeben. Die Zweige, welche ferner am Schenkel selbst von ihr abgehen, sind folgende:

5) Die tiefe Crural- oder Femoralarterie, tiefe Schenkelarterie, (A. femoris profunda,) entspringt in der Gegend des kleinen Trochanters von der hintern Seite des Stammes, und geht bogenförmig rückwärts zwischen dem Pectinaus und dem langen Abductor herab; entweder durch den Zwischenraum zwischen den angeführten Muskeln, oder zwischen den Muskelbündeln des langen Abductors verschwindet sie an der vordern Seite des Schenkels, und spaltet sich auch sogleich in mehrere beträchtliche Zweige, die alle ihre Richtung nach hinten nehmen, und sich bis gegen das Knie herab in den Adductoren verästeln. Durch diese Muskeln dringen aber noch Zweige hindurch, die sich nicht nur vorwärts, bis zum innern Vastus, dem Sartorius und Pectinaus, sondern auch rückwärts, bis zu den Beugemuskeln des Unterschenkels, ausbreiten, und endlich in der Haut am innern und mittlern Theil des Schenkels verschwinden. Ueberdies kommen aus der tiefen Femoralarterie noch mehrere ernährenden Arterien, (Arteriae nutritiae fem-



is,) welche sich theils in dem Periosteum des Schenkelknochens verzweigen, theils in das Innere des Knochens bringen, und sich dort in den Markzellen ausbreiten.

6) Die innere Kranzarterie des Schenkels, (*A. circumflexa femoris interna.*) Sie entspringt mit der folgenden sehr nahe bei der vorigen, und ist oft ein Zweig von ihr. Gewöhnlich gehen an einer und derselben Stelle in der Mitte die tiefe Femoralarterie und zu beiden Seiten derselben die Kranzarterien aus dem Stamm der Cruralarterie heraus; die innere Kranzarterie geht an der innern Seite des Stammes ab, und beugt sich an der vordern Seite des Schenkels um den obern Theil des Schenkelknochens herum, indem sie zwischen dem Pectinäus und dem Psoas und intern iliacischen Muskel nach außen geht, und so den Verästelungen der äußern Kranzarterie entgegenkommt. Nicht nur die eben genannten Muskeln erhalten von der innern Kranzarterie Zweige, sondern auch der äußere Obturator, der Gracilis, der lange und kurze Obturator und das Periosteum des Schambeines. Kleinere Zweige gelangen bis zur Fetthaut des Venusberges und bis zur Scrotalhaut beim männlichen, oder bis zur Haut der Labien beim weiblichen Geschlecht. Bisweilen ist sogar die äußere Pubealarterie ein Zweig der innern Kranzarterie. Immer stehen die Zweige der Arterie, welche sich in dem äußern Obturator verästeln, in Verbindung mit den Zweigen der innern Obturatorarterie, die von der hypogastrischen in dem Becken erzeugt wird. Die tiefsten Zweige der innern Kranzarterie sind zwar dünn, aber sehr zahlreich, und verästeln sich in der Capselmembran des Schenkelgelenks. Meistens werden diese Zweige durch einen eignen Ast, die Articulararterie des Pfannengelenks, (*A. articularis acetabuli.*) verbreitet, der um den Kopf des Schenkelbeins vorwärts herumgeht, und von welchem auch durch die Incisur des Acetabuli ein Zweig in das Innere der Gelenkapsel geleitet wird, und in dem runden Band des Schenkelgelenks zu dem Fett und den Synovialbrüsen geht, die in dem Grund der Pfanne gelagert sind. Die äußersten oder Endzweige der innern Kranzarterie verlieren sich endlich in dem Quadratmuskel des Schenkelbeins, und anastomosiren mit den Zweigen der folgenden Arterie.

7) Die äußere Kranzarterie des Schenkels, (*A. circumflexa femoris externa.*) kommt sehr nach außen und hinten aus dem Stamm der Cruralarterie, oder der tiefen Cruralarterie, und geht von hinten um den obern Theil des Schenkelbeins herum, indem sie zwischen dem geraden Femoralmuskel und dem äußern Vastus erst ihre Richtung nach außen und dann nach hinten und innen nimmt. Außer kleinern Zweigen, die zum innern iliacischen Muskel, zum Sartorius, dem geraden Femoralmuskel und dem äußern Vastus sich verbreiten, ist immer ein bedeutender Ast wahrzunehmen, welcher zwischen dem äußern Vastus und dem geraden Femoralmuskel, bis gegen das Kniegelenk herab, Zweige in eben erwähnte Muskeln selbst schickt, und überdieß auch noch nach innen, bis zum innern Vastus und dem Gracilis und bis zur Schenkelbinde und der Haut, am äußern Umfange des Schenkels Zweige aussendet.

Ein oberflächlicherer Zweig verästelt sich zu dem Tensor der Schenkelbinde, zu den Gefäßmuskeln und der Haut, welche den großen Trochanter bedeckt, gibt noch Zweige abwärts zu den obern Enden des äußern Vastus und des geraden Femoralmuskels, und Zweige, welche dicht am Hüftknochen um das Pfannengelenk herumgehen und mit Zweigen der innern Kranzarterie in Verbindung treten. Ein tieferer Zweig der äußern Kranzarterie geht zwischen dem innern Vastus und dem Schenkelknochen nach hinten, verbindet sich an der Capselmembran des Schenkelgelenks auch mit Zweigen der innern Kranzarterie, und bringt selbst in den großen Trochanter ein, nachdem er sich zuvor mit Zweigen der großen Gefäßarterie verbunden hat.

8) Die übrigen Zweige, welche noch vom Stamm der Cruralarterie in unbestimmter Zahl nach verschiedenen Richtungen abgehen, verzweigen sich in dem innern und äußern Vastus, dem Sartoriusmuskel, dem geraden Femoralmuskel, dem Cruralmuskel und Gracilis. Auch durch die Adductoren gehen Zweige nach hinten, und endigen sich in dem zweibäuchigen Schenkelmuskel, in dem semimembranösen und dem semitendinösen Muskel. Viele dieser Muskelzweige durchdringen endlich die Schenkelbinde, und verästeln sich in der Hautbedeckungen am ganzen Umfang des Schenkels.

9) Die popliteische Arterie, Kniekehlenarterie, (*poplitea*), ist eigentlich nicht als Zweig der Cruralarterie, sondern vielmehr als Fortsetzung des Stammes anzusehen. Sie gelangt, Begleitung der gleichbenannten Vene, zwischen dem untern Theil des Schenkelknochens und dem sehnigen Schenkel des großen Adductors in die Kniekehle, wo sie, von vielem Fett umgeben, neben ihrer Vene und dem ischiadischen Nerven, Anfangs hinter dem Schenkelbein, zwischen dem Biceps des Schenkels und dem semitendinösen und semimembranösen Muskel, dann zwischen den Condylen des Schenkelbeins und endlich hinter der Tibia, zwischen den Köpfen der Gastrocnemiusmuskeln herabgeht. Die ersten Zweige, welche nach oben von der Arterie abgehen, sind für die angeführten Beugemuskeln des Unterschenkels, zwischen welchen sie liegt, bestimmt, verästeln sich aber auch noch zur Haut an dem hintern und innern Umfang des Schenkels und stehen sowohl mit Zweigen der äußeren Kranzarterie des Schenkels als mit Zweigen der tiefen Cruralarterie in Verbindung. Weit unten treten wenigstens vier Articulararterien hervor; denn viel sind ihrer immer, bisweilen aber auch mehrere, vorhanden. Sie haben alle das mit einander gemein, daß ihre Richtung gegen die vordere Seite des Kniegelenks geht, und daß sie hier alle Verbindungen unter sich haben, und ein großes Gefäßnetz um das Kniegelenk herumbilden, dessen Zweige in die Gelenkapsel selbst eindringen.

a) Die obere innere Articulararterie, Gelenkarterie, (*A. articularis superior interna*), geht oberhalb des innern Condylus des Schenkelbeins ab, läuft zwischen dem großen Adductor und dem innern Vastus vorwärts, verbindet sich an dem innern Lateralligamente des Kniegelenks mit der untern innern Articulararterie und versieht das Periosteum des Schenkels, die Capselmembran des Kniegelenks, die Kniescheibe und die Sehnen der Beugemuskeln des Unterschenkels mit Zweigen. Statt dieser einen Arterie kommen



ei bis drei über dem innern Condylus hervor, und verzweigen sich in den angeführten Theilen.

b) Die obere äußere Articulararterie, (*A. articularis superior externa*.) geht zwischen dem Schenkelknochen und dem fernern Vastus vorwärts, und gibt, außer den Zweigen für die Gelenkscapsel und dem Periosteum des Schenkelbeins, noch Muskelzweige zu dem äußern Vastus, zu dem äußern Gastrocnemiusmuskel und zu dem Kopf des Biceps, dessen Arterie sich oft mit Zweigen der tiefern Schenkelarterie verbindet.

c) Die untere äußere Articulararterie, (*A. articularis inferior externa*.) ist an ihrem Ursprung von dem äußern Gastrocnemiusmuskel bedeckt, und nimmt ihre Richtung zwischen diesem und dem Popliteusmuskel, zur vordern Seite des Kniegelenks, indem sie zwischen den äußern Lateralligamenten hindurchgeht und sich so von unten und außen zu dem Kniegelenk und in dem vordern Tibialmuskel verzweigt. Ein oberflächlicher Zweig dieser Arterie geht außen zur Kniescheibe in die Höhe und versieht auch die Semimembranose und die innern Bänder des Kniegelenks mit Aestchen, so wie die gemeinschaftliche Sehne der Extensoren des Unterschenkels. Ein tieferer Zweig gelangt zwischen dem Patellenband und der Tibia ins Innere der Gelenkscapsel, und endigt sich mit seinen Aestchen in den innern Bändern und den Synovialdrüsen.

d) Die untere innere Articulararterie, (*A. articularis inferior interna*.) geht von ihrem Entstehen an zwischen der hintern Fläche des Schienbeins und dem innern Gastrocnemiusmuskel in die Höhe bis zu den Extensoren des Unterschenkels, indem sie zwischen den Sehnen hindurchgeht, die sich an die innere und vordere Seite der Tibia anlegen. Indem sie in diesen Muskeln Zweige zufließt, gehen andere von ihr ab, welche sich theils in den innern Bändern des Kniegelenks von hinten verästeln, theils hinter der Kniescheibe in die Gelenkhöhle eindringen, und sich in den Synovialdrüsen endigen.

Da, wo die popliteische Arterie zwischen den beiden Gastrocnemiusmuskeln herabsteigt, gibt sie jedem derselben einen bedeutenden Zweig, welcher sich nicht nur in dem Muskel verästelt, sondern auch die Haut der Wade mit Zweigen versorgt.

Hinter dem Popliteusmuskel, bisweilen unterhalb desselben, spaltet sich die popliteische Arterie in ihre beiden Endzweige: in die vordere und hintere Tibialarterie.

e) Die vordere Tibialarterie, (*A. tibialis antica*.) ist von der hintern durch das interossische Band geschieden, indem sie durch ein besonderes Loch an dem obern Theil dieses Bandes zur vordern Seite des Unterschenkels gelangt, und hier von dem vordern Tibialmuskel und dem langen gemeinschaftlichen Extensor der Zehen bedeckt wird. Zwischen diesen Muskeln geht der zurücklaufende Zweig, (*A. tibialis recurrens*.) vorwärts in die Höhe, gibt zu den besagten Muskeln Aestchen, und verliert sich an dem untern Umfang der Synovialmembran des Kniegelenks durch Verzweigungen, welche mit den andern Articulararterien vielfache Verbindungen eingehen. Eine Menge kleiner Zweige gehen von beiden Seiten der Tibialarterie aus, um sich

in dem vordern Tibialmuskel, dem gemeinschaftlichen langen Extensor der Zehen und dem langen Extensor der großen Zehe, so wie in dem Zwischenknochenbände und dem Periosteum der Unterschenkelknochen zu vertheilen. Zwischen den Sehnen des vordern Tibialmuskels und des langen Extensors der großen Zehe kommt endlich die vordere Tibialarterie, oberhalb des Fußgelenks, unter der Haut zum Vorschein. Hier verbreitet sie Zweige zu den Sehnen der Extensoren der Zehen und ihren Schleimscheiden und zur Haut. Dann geht über dem äußern Knöchel unter einem stumpfen Winkel die äußere Malleolararterie, äußere Knöchelarterie, (*A. malleolaris externa*) ab, und verbreitet sich bis zur Fußwurzel herab, zu dem Periosteum, den Bändern und den Hautdecken am äußern Knöchel. Sie geht von vorn nach hinten um den äußern Knöchel herum, und verbindet sich dann bogenförmig mit einem von der Fibulararterie herabsteigenden Zweig. Auch die kurzen Extensoren der Zehen, besonders der großen Zehe, erhalten von dieser Arterie Nistchen. Auch oberhalb des innern Knöchels geht ein ähnlicher Zweig: die innere Malleolararterie, innere Knöchelarterie, (*A. malleolaris interna*) von der vordern Tibialarterie ab, und verbindet sich am innern Knöchel mit Zweigen der hintern Tibialarterie. Sie verästelt sich in dem Periosteum, in den Bändern des Fußgelenks und dem Abductor der großen Zehe.

Hinter dem Kreuzband der Suralbinde erreicht nun der Stamm der vordern Tibialarterie das Fußgelenk, von welchem er, neben dem kurzen Extensor der großen Zehe, weiter zum Rücken des Fußes fortschreitet. Zuerst geht hier nach innen die innere Dorsalarterie der großen Zehe, (*A. dorsalis tibialis hallucis*), hinter der Sehne des vordern Tibialmuskels ab, und verästelt sich zur Haut und den Sehnen am Rücken der großen Zehe; dann folgt nach außen die tarsische Arterie, Fußwurzelarterie, (*A. tarsea*), welche Anfangs von dem kurzen Extensor der Zehen bedeckt wird, welche sie auch Nistchen mittheilt, dann aber sich als äußere Dorsalarterie der kleinen Zehe; (*A. dorsalis fibularis digiti minimi*), in der Haut und den Sehnen am Rücken der kleinen Zehe zeigt. Zuletzt spaltet sich die vordere Tibialarterie in ihre beiden Endzweige: in die äußere und innere metatarsische Arterie.

Die äußere metatarsische Arterie, (*A. metatarsea externa*), durchbohrt den kurzen Extensor der Zehen, geht an der Dorsalfläche der Mittelfußknochen der zweiten bis vierten Zehe nach außen und gibt die lateralen Arterien für die drei äußersten Zwischenräume zwischen den Mittelfußknochen ab. Außerdem, daß diese drei Zweige den intermetatarsischen Muskeln, an welchen sie vorwärts gehen, Zweige mittheilt, spaltet sich jede, sobald sie das Ende eines Mittelfußknochens erreicht hat, in zwei Dorsalarterien der Zehen, so daß eine Zehe eine innere und die zunächst gelegene eine äußere Dorsalarterie erhält. Die äußeren Dorsalarterien werden Fibulararterien, die innern Tibialarterien genannt. Alle Dorsalarterien gehen bis zur Wurzel des Nagels hin, verästeln sich zu dieser, gehen in der Haut am Rücken der Zehen zarte und häufige negartige Verbindungen ein, und schicken Verbindungs Zweige zu den Plantararterien der Zehen.



Die innere metatarsische Arterie, (*A. metatarsæ interna*,) geht zu dem Zwischenraum zwischen den Metatarsusknöcheln der großen und der zweiten Zehe hin, und erscheint also hier als erste interossische Arterie. Sie theilt den Muskeln, über welchen sie hinzieht, Zweige mit, und spaltet sich dann in zwei Dorsalarterien, nämlich in die Fibulararterie der großen Zehe, und in die Tibialarterie der zweiten Zehe.

Der zweite Endzweig der popliteischen Arterie, die hintere Tibialarterie, (*A. tibialis posterior*,) kann als Fortsetzung des Stammes betrachtet werden, und geht hinter dem interossischen Bande, zwischen dem Soleusmuskel, dem hintern Tibialmuskel und dem langen Flexor der Zehen herab bis hinter den innern Knöchel. Außer vielen Zweigen, welche sie den ihr zunächst gelegenen Muskeln mittheilt, hat sie noch folgende bestimmte Zweige:

Die Fibulararterie, Wadenbeinarterie, (*A. fibularis peroneæ*,) entspringt am Anfang des hintern Tibialmuskels, und verläuft anfänglich zwischen diesem Muskel und dem Soleusmuskel, dann zwischen dem interossischen Bande und dem Flexor der großen Zehe zum äußern Knöchel nach hinten herab. Sie versieht aber nicht diese Muskeln, sondern auch den langen Flexor der Zehen, den andern Gastrocnemiusmuskel und die Fibularmuskeln, (*Musculi peronei*,) mit Zweigen. Oben geht von ihr die Ernährungsarterie, (*A. nutritia fibulae*,) ab, die sogleich in den Knochen eintritt, und sich in dessen Diploe verbreitet. Unterhalb der Mitte des Unterschenkels kommt aus der Fibulararterie ein Zweig, der das interossische Ligament durchbohrt, zur vordern Seite des Unterschenkels gelangt, und sich mit der äußern Malleolararterie verbindet, um aber Zweige zu der Capselmembran des Fußgelenks und dem kurzen Extensor der großen Zehe verbreitet. Endlich spaltet sich die Fibulararterie in zwei Endzweige: in den Transversalzweig und in den herabsteigenden Zweig.

Der Transversalzweig geht über dem äußern Knöchel ab, und verläuft an der hintern Fläche der Tibia nach innen, um sich hier mit der hintern Tibialarterie zu vereinigen. Von diesem Zweig gehen viele zarte Nistchen zu dem Fettpolster hin, welches den Raum zwischen der Achillissehne, dem Calcaneus und der Tibia ausfüllt; auch in der Weinhaut der Tibia verbreiten sich kleine Nistchen.

Der herabsteigende Zweig senkt sich gerade hinter dem äußern Knöchel herab, und nimmt unter demselben seine Richtung an der innern Fläche des Calcaneus vorwärts, um an diesem Knochen durch die Verbindung mit der äußern Malleolararterie einen Gefäßbogen zu bilden, dessen zahlreiche Zweige theils den benachbarten Ligamenten, theils der Fetthaut der Ferse angehören. Oberhalb der Mitte der Tibia schickt die hintere Tibialarterie in diesen Knochen durch ein kleines Loch die ernährende Arterie, (*A. nutritia tibiae*,) die sich in der Markhöhle des Knochens verzweigt.

Nachdem nun die hintere Tibialarterie mit dem Transversalast der Fibulararterie verbunden worden ist, neigt sie sich hinter dem innern Knöchel herab, und geht dann an der innern Fläche des Calcaneus vorwärts, begleitet die Sehne des langen Flexor der großen Zehe

durch ihre Sehnnenscheide, und verbindet sich vorher mit der inn. Malleolararterie. Endlich gelangt sie aber zwischen dem Calcaneus und dem Abductor der großen Zehe zur Fußplatte, und spaltet hier in ihre Endzweige: in die äußere und innere Plantararterie.

Die innere Plantararterie, innere Sohlenarterie (*A. plantaris interna*), ist der schwächere Zweig, theilt sich aber gleich in mehrere Zweige, die dem Abductor und kurzen Flexor der großen Zehe, den interossischen Muskeln, den Bändern der Fußwurzelknochen angehören, und sich mit Zweigen der vordern Tibialarterie besonders mit den Dorsalarterien der großen Zehe verbinden. Am dem Metatarsusknöchel der großen Zehe spaltet sie sich in die innere Plantararterie der großen Zehe und in einen kurzen Zweig, der sogleich wieder in die äußere Plantararterie der großen und die innere Plantararterie der zweiten Zehe spaltet; außerdem geht noch ein Zweig von ihr ab, welcher sich mit einem Zweig der äußern Plantararterie bogenförmig vereinigt.

Die äußere Plantararterie, äußere Sohlenarterie (*A. plantaris externa*), geht zwischen der Plantaraponeurose, dem kurzen Flexor der Zehen und den übrigen Muskeln der Fußplatte nach außen, bis zum Metatarsusknöchel der kleinen Zehe; von hier beugt sie sich zwischen den hintern Enden der Metatarsusknöchel und den Sehnen der Flexoren der Zehen nach innen und vereinigt sich mit der innern Plantararterie zu dem Plantarbogen, (*Arcus plantaris*.) Dieser Bogen verbreitet drei interossische Arterien, (*Arteriae interosae plantares*.) Jede derselben versieht die zwischen den Metatarsusknöcheln liegenden Muskeln mit Zweigen, die auch mit den Dorsalarterien der Zehen in Verbindung treten, und spaltet sich dann am dem hintern Ende der ersten Phalanx einer Zehe in zwei Plantararterien der Zehen. Diese Plantararterien der Zehen sind so eingerichtet, daß am dem äußern Rand jeder Zehe eine äußere, oder Fibulararterie, und am dem innern Rand eine innere, oder Tibialarterie bis zur Spitze des dritten Gliedes jeder Zehe fortläuft. Hier verbindet sich die Fibular- und Tibialarterie jeder Zehe bogenförmig, und gibt noch die feinsten Zweige zur Spitze der Zehe in der Haut. Verbindungen der beiden Plantararterien jeder Zehe unter sich sind besonders an den Gelenken der Zehen zahlreich, und finden auch sehr häufig mit den Dorsalarterien Statt. Alle Zehenarterien verbreiten aber ihre Aeste zur Haut, zu den Sehnen und Sehnnenscheiden der Zehen und der Schleimscheiden. Die drei interossischen Arterien, welche aus der Plantari entspringen, versetzen die zweite Zehe mit der Fibulararterie, die dritte und vierte Zehe jede mit einer Fibular- und Tibialarterie, die fünfte Zehe aber nur mit einer Tibialarterie, weil die Fibulararterie unmittelbar aus dem Stamm der äußern Plantararterie entspringt. Außer den Zehenarterien gibt die äußere Plantararterie auch noch einzelne Zweige zu den Muskeln der kleinen Zehe und zur Haut am dem äußern Rand des Fußes, an welchem sich diese Zweige mit der tarsischen Arterie verbinden. (Rosenmüller.)

**Cruralgeflecht**, s. Cruralnervenplexus, vgl. auch Cruralnervenplexus.



**Cruralis**, (*Cruralis* <sup>1</sup>, sc. *musculus*.) Schenkelmuskel <sup>2</sup>, Schenkelmåslein <sup>3</sup>, Schenkelbeinmuskel <sup>4</sup>, Eigenthümlicher Lendenmuskel <sup>5</sup>, Tieferer, mittlerer Unterschenkrecker <sup>6</sup>, (*M. crurens* <sup>7</sup>, s. *cruræus* <sup>8</sup>, s. *femoreus* <sup>9</sup>, s. *cræus* <sup>10</sup>, s. *femoro-tibialis* <sup>11</sup>.) der länglich platte, dicke, mittelbar auf dem Knochen des Schenkels liegende Muskel, welcher von der vordern intertrochanterischen Linie aus, abwärts laufend von der vordern Fläche des Schenkelknochens immer durch neue Nerven verstärkt, in eine ihm, dem innern und äußern Vastus und Rectus des Unterschenkels gemeinschaftliche, über die Patelle hinziehende, an die Spina der Tibia befestigte starke Flesche übergeht, mit den eben genannten Muskeln zur Streckung des Unterschenkels oder auch im Stehen zur Aufrechterhaltung des Körpers dient. Unter Schenkelmuskeln, Muskeln des Unterschenkels. *Albini hist. musc. ed. 4. p. 477.* 2) *Brown's vortauschte Besch.* Musc. v. *Spener*, Berl. 1704, S. 83. 3) nach *Kulmus* (anat. tabellen, Tab. 28) 4) nach *Sömmering* (Muskell. S. 299.) 5) *Mayer's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 474.* 6) nach *Meckel* (Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 1227. 7) nach *Engelstus* (tagoge 1. 2. c. 7.) 8) nach *Douglas* (myogr. compar. c. 41.) 9) nach *de Marchettis* (comp. anatom. Patav. 1652, c. 19.) 10) *Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. M. 2. B. S. 1269.* 11) nach *Schröger* (Nomenclat. d. Muskl. S. 42.)

**Cruralis aponeurosis**, s. Fascia des Unterschenkels. — **arteria**, s. Cruralarterie. — **tunica**, s. Tiefe Schenkelarterie. — **musculus**, s. Cruralis. — **triceps**, s. Abductoren des Schenkels. — **nervus**, s. Cruralnerv. — — **anterior**, s. *anticus*, s. Cruralnerv. — — **internus**, s. Obturatorischer Nerv. — — **magnus**, s. Ischiadischer Nerv, ingl. Cruralnerv. — — **medius**, s. Cruralnerv. — — **internus**, s. Obturatorischer Nerv. — — **posticus**, s. Ischiadischer Nerv. — — **plexus nervosus**, s. Cruralnervenplexus. — — **vagina lymphaticorum**, s. unter Plexus lymphatischer Gefäße. — **vena**, s. Cruralvene.

**Cruralnerv**, (*Cruralis nervus* <sup>1</sup>.) Schenkelnerve <sup>2</sup>, Vorderer <sup>3</sup>, oder Mittlerer <sup>4</sup>, oder Kleinerer <sup>5</sup> Schenkelnerve, oberer Nerv des Schenkels <sup>6</sup>, oder Oberschenkels <sup>7</sup>, Kleinerer Beinernerv, (*Nervus cruralis magnus* <sup>8</sup>, s. *medius* <sup>9</sup>, s. *anticus* <sup>10</sup>, s. *anterior* <sup>11</sup>, *Nervus femoralis* <sup>12</sup>, s. *femorale magnus* <sup>13</sup>, s. *anterior* <sup>14</sup>.) Er ist vorzüglich für die Haut und Muskeln am vordern Umfang des Oberschenkels bestimmt, und theilt sich nur mit einem Zweig bis zur Haut an der innern Seite der großen Fußzehe herab. Genau genommen entspringt er aus einem Nervenplexus, welches in der Bauch- und Beckenhöhle, zwischen Psoas, dem Lumbarquadratmuskel und dem innern iliatischen Muskel liegt. *Winslow exp. anat. lat. v. T. III. tr. de nerv. S. 303.* 2) *Mayer's Besch. d. menschl. K. 8. B. S. 321.* 3) 4) *Leber's Vorles. über d. Vergliederungsk. Wien 1776, S. 347.* 5) nach *Hildebrandt* (Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 5208) 6) 7) *Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. 2. 322 u. 325.* 8) *Berretin tabul. anat. II.* 9) nach *Meutaud* (essays anat. T. II. s. 6) 10) nach *Meussens* (névrogr. univ. tab. 28) 11) *Palfyn's chr. Anat. übers. v. Guth, 1. Th. S. 415.* 12) *Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. S. 321.* 13) 14) nach *Haller* (el. physiol. T. IV. 1. 10. 2. 6. S. 33.)

Muskel liegt, und Cruralgeflecht (Plexus cruralis,) gen<sup>nt</sup> wird. Dieses Geflecht, welches zugleich den Obturatornerven zeugt, wird durch die Zusammenkunft des zweiten, dritten <sup>15</sup> vierten Lumbarnerven gebildet; doch wird es auch bisweilen von dem vordern Zweig des ersten, seltener durch den vordern Zweig fünften Lumbarnerven verstärkt.

Als abgesonderter Stamm tritt der Cruralnerv eigentlich erst unterhalb des Querfortsatzes des dritten Lumbarwirbels hervor, bleibt anfänglich in seinem Heraussteigen nach außen, zwischen dem gro<sup>ßen</sup> Psoas und dem innern iliacischen Muskel verborgen.

Hier kommen aus ihm: 1) viele zarte Zweige, welche sich fächerförmig in dem innern iliacischen Muskel ausbreiten und unter sich, theils mit den von dem Lumbargeflecht abgehenden Nerven des Schenkels geflechtartig verbunden sind;

2) mehrere Zweige für die Psoasmuskeln, vorzüglich für den Psoas major; einer der letztern Zweige geht häufig zwischen den Muskeln rückwärts in die Höhe, und verbindet sich wieder mit dem Stamme (Nervus recurrens psoae.)

Nachdem diese Zweige abgegangen sind, wird der Nerv an den äußern Rand des Psoas vor dem innern iliacischen Muskel sichtbar; hier fügt er sich an die äußere Seite der Cruralarterie, geht mit ihr unter dem Poupartschen Bande aus dem Becken heraus.

3) Kleine Zweige, welche die Schenkelgefäße begleiten und versorgen.

4) Ein Zweig für den Pectineusmuskel der noch innerhalb der Bauchhöhle von der innern Seite des Nerven und durch das Poupartsche Bande hervorgeht.

5) Ein Zweig für den kleinen Abductor, welcher hinter der Cruralarterie aus dem Becken herauskommt.

6) Der innere Cutannerv des Schenkels, (Nervus cutaneus femoris internus, anterior et superior,) geht an der innern Seite des Stammes, hinter dem Poupartschen Bande hervor und kommt unterhalb desselben weiter nach innen als der Stamm mit mehrern Zweigen zum Vorschein, deren jeder einzeln die Schenkelbinde durchbohrt, und sich dann in der Haut am innern Umfang des Schenkels verästelt. Der längste dieser Zweige geht bis unter das Knie herab; alle stehen theils unter sich, theils mit den übrigen Hautnerven des Schenkels in Verbindung und meistens vereinigt mit dem Stamme des Nerven mit einem der Muskelzweige, so dass der Cruralnerv von sich gibt.

7) Der äußere Cutannerv des Schenkels, (Nervus cutaneus femoris externus anterior et superior,) ist in der Nähe des Ursprunges einer der ersten Zweige des Cruralnerven, weil er an der äußern Seite des Stammes schon da sichtbar wird, wo der Stamm seine Wurzel von dem dritten Lumbarnerven erhält. Zwischen der Sehne des Tensor der Schenkelbinde und dem obern Theil des Sartormuskels kommt der Nerv unter dem Poupartschen Bande hervor, und

15) Winslow unterscheidet (exp. anat. T. III. tr. des nerfs, §. 287) zwischen einem von dem dritten Lumbarnerven entspringenden accessorischen Cruralnerven. Vgl. Lumbarnerven. (N. d. 2.)



sich nur in mehrere Hautzweige, welche an verschiedenen Stellen die Schenkelbinde durchbohren, an der vordern Seite des Schenkels nach außen in der Haut herablaufen und sich bis zum mittlern Theile des Unterschenkels erstrecken.

Die folgenden Zweige des Cruralnerven entspringen zwar auch innerhalb des Beckens aus dem Stamm, liegen aber von ihrem Ursprung an, bis sie durch das Poupart'sche Band aus dem Becken herausgetreten sind, so dicht neben einander, daß sie eigentlich den fortgesetzten Stamm ausmachen.

1) Der äußere Muskelzweig spaltet sich sogleich unter dem Poupart'schen Band, von dem Sartormuskel bedeckt, in mehrere Zweige, die theils an der hintern Fläche des genannten Muskels herablaufen, theils sich in dem Tensor der Schenkelbinde, dem äußeren Obturator und dem Cruralmuskel verzweigen.

2) Der mittlere Cutannerv des Schenkels, (*Nervus cutaneus medius*,) gelangt schon in der Mitte des vordern Umfanges des Schenkels, sogleich unter dem Poupart'schen Bande zur Haut, und verzweigt sich in derselben vor dem geraden Femoralmuskel bis zum Knie herab. Er entspringt zuweilen mit dem vorigen Nerven verbunden, und ist auch mit den Endzweigen desselben und des folgenden vereinigt.

3) Der vordere Cutannerv des Schenkels, (*Nervus cutaneus anterior femoris*,) sondert sich unterhalb des Poupart'schen Bandes von den übrigen Nerven ab, durchbohrt sogleich die Schenkelbinde, und geht mit seinen Zweigen in der Haut weiter nach innen, als der vorige Nerv, mit dessen Zweigen die seinigen verbunden sind, zum Knie herab. Oft sind seine Zweige nur kurz und werden durch Zweige des langen Sartormuskelnerven ersetzt.

4) Der Nerv des geraden Schenkelmuskels entspringt von dem vorigen, und verbreitet sich zur hintern Seite des geraden Femoralmuskels, gibt aber auch noch Zweige nach außen an den äußeren Vastus ab.

5) Ein größerer Muskelzweig geht unten ab, und verzweigt sich zwischen dem geraden Femoralmuskel und dem Cruralmuskel, um diese und die beiden Vastusmuskeln mit Zweigen versieht.

6) Der lange Sartormuskelnerve, (*Nervus musculi sartorii longus*,) entspringt gemeiniglich zugleich mit dem innern Cutannerven, geht an der hintern Seite des Sartormuskels, zwischen dessen Muskelbündeln herab, verbreitet beträchtliche Zweige zu dem äußeren Vastus, durchbohrt den Sartormuskel, und endigt sich über dem Knie in der Haut des Schenkels.

7) Der lange Cutannerv, Nerven des Fußes, (*Nervus cutaneus longus, s. internus et anterior pedis, Nervus saphenus*,) ist der längste Zweig des ganzen Cruralnerven, entspringt an der innern Seite des Stammes und geht ungetheilt bis zum Sartormuskel, von den Weichendrüsenscheiden bedeckt herab, verbirgt sich aber alsdann unter diesem Muskel, und kommt erst wieder unterhalb der Kniescheibe desselben an der Tibia, an der innern Seite des Kniegelenks zum Vorschein. Bis dahin gibt er zu beiden Seiten mehrere Zweige ab, welche die Schenkelbinde durchbohren, und sich, mit andern Haut-

zweigen verbunden, zur Haut am vordern Umfang des Schenkels zweigen. Vom Knie an geht der Nerv neben der großen saphirischen Vene zum Fuß herab. Hier tritt er hinter das Kreuzligament geht dann an der innern Seite des Fußrückens vorwärts, und entspringt an der innern Seite der großen Zehe. In diesem ganzen Verlauf verbreitet er zahlreiche Zweige zur Haut des Knies, der Innenseite und der innern Seite des Unterschenkels, so wie zum Rücken des Fußes, und umstrickt mit zarten Zweigen die ihn begleitende Vene<sup>16</sup>. (Rosenmüller.)

16) Der Cruralnerv war auch den ältesten Anatomen nicht unbekannt, und Galen gekennt selner (de usu part. I. 16. c. 18.) Genauer beschrieb ihn doch zuerst Vesal (de c. h. fabr. I. 4. c. 11) und unterschied ihn als zweiten Nerven des Schenkels. Auch gab er (a. a. O.) die erste Abbildung. In den Eustachischen Tafeln (Taf. 19 u. 21) sind seine Hautäste etwas genauer folgt. Kleussens (nevrogr. Taf. 28) gab auch eine, wiewohl noch unvollständige Darstellung. In den Verretinschen Tafeln, (Taf. 3 u. 4) sind mehrere Windungen in der Vertheilung dieser Nerven richtig bemerkt. Vorzüglich abzuheben dient als Monographie Bemerkung: Mart. Ern. Stryx descriptio anatomica nervi cruralis et obturatorii icones illustrata, welche zuerst als Dissertation zu Jena 1782 u. 1784 als eine eigene Abhandlung in 4. erschienen. Noch vollendeter ist der Cruralnerv in seinem ganzen Verlauf in Fischers descriptio anat. nervor. lumbalium, sacralium et extremitatum inferiorum Lips. 1791, fol. max. tab. 2. fig. 1. tab. 3. fig. 1 u. tab. 4. fig. 1 dargestellt worden. Vgl. auch die Ender'schen Tafeln, Taf. 174 — 175. (M.)

**Cruralnervengeflecht**, (Cruralis plexus nervosus,) Cruralnervengeflecht, die vornehmlich aus dem Zusammentritt des zweiten, dritten und vierten Lumbarnerven entstehende Nervenverbindung, und außer dem obturatorischen Nerven dem Cruralnerven zum Ursprung dient. S. Cruralnerv.

**Cruralsaugadergeflecht**, s. unter Plexus lymphatischer Gefäße.

**Cruralvene**, (Cruralis vena<sup>1</sup>), Schenkelvene<sup>2</sup>, oder Vorder<sup>3</sup>, Brandader<sup>4</sup>, Inwendige<sup>5</sup>, oder Hintere<sup>6</sup> Schenkelblutader, Zurückführende Schenkel- oder Brandader<sup>7</sup>, Äußere zurückführende Beckenader<sup>8</sup>, (Vena cruralis<sup>9</sup>, s. ilaca interna<sup>10</sup>, s. posterior<sup>11</sup>.) Der Stamm der Vene ergießt das Blut der ganzen untern Extremität in die iliacale Vene seiner Seite. Die Cruralvene der rechten Seite liegt im Becken an der äußern Seite der Cruralarterie, geht aber hinter die Arterie vorwärts nach innen. Die Cruralvene der linken Seite liegt aber an dem innern Rand ihrer Arterie. In dem ganzen Verlauf des Schenkels liegt jede Cruralvene Anfangs an der innern Seite der sie begleitenden Arterie, unten aber vor derselben. In der Kniekehle heißt der Stamm popliteische Vene, (Vena poplitea.) In der Kniekehle liegt mehr nach hinten und außen als die gleichbenannte Arterie. Wie der Stamm der Cruralarterie und Cruralvene einander begleiten, so ist es auch, die Hautvenen ausgenommen, der Fuß

1) Th. Bartholini anat. libell. I. c. 9.

2) Sommering's anat.

3) S. 263.

4) 4) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1733, S. 3. S.

5) 6) Winslow's anat. Abh. u. f. w. a. a. O. S. 172. Vgl. M.

7) Leber's Vorles. über d. Zergliederungskf. Wien 1776, S. 314.

8) ebendaf. Vgl. Note 9.

9) Verheyen c. hum. anat. II. 7. c. 1.

10) besonders in Hinsicht ihres obern Theils, nachdem sie den Schenkel verlassen

benannt.) 11) Winslow's anat. Abh. u. f. w. a. a. O.



sämmtlichen übrigen Zweigen, nur mit der Abweichung, daß jeder Arterienzweig von zwei Venenzweigen begleitet wird, zwischen denen er in der Mitte liegt. Die Venenzweige haben daher dieselben Benennungen wie die gleichlaufenden Arterienzweige, und es ist nach unnöthig, sie besonders aufzuzählen.

Die Venen der Haut sind auch an der untern Extremität weit und größer als die Arterien, und durch Seitenzweige vielfach mit einander verbunden. Die Zwischenräume zwischen diesen netzartigen Verbindungen sind an der Haut des Schenkels und Unterschenkels, wo sich die stärksten Hautvenen befinden, weiter, an der Haut des Fußes aber, wo die Venenzweige zarter und zahlreicher, enger.

Am feinsten sind die Venen der Haut der Fußplatte, welche das Plantarvenennetz, (*Rete venosum plantare pedis*), bilden; kleinere Venen setzen am Rücken des Fußes das Dorsalvenennetz, (*Rete venosum dorsale pedis*), zusammen. Beide Venennetze vereinigen aber an den Rändern des Fußes in unmittelbarer Verbindung mit einander. Die sämmtlichen Hautvenen der untern Extremität werden übrigens durch zwei beständige und größere Hautvenen, die saphenösen Venen, mit dem Stamm der Cruralvene in Verbindung gesetzt.

Die große saphenöse Vene, Rosenvene, (*Vena saphena magna*), entspringt aus dem Dorsalvenennetz des Fußes in der Gegend der großen Zehe, geht gegen den innern Knöchel hin, und steigt demselben an der innern Seite des Unterschenkels, vor dem Rand des innern Gastrocnemiusmuskels, ferner an der innern Seite des Kniegelenks und des Schenkels aufwärts, nimmt in ihrem Durchmesser immer mehr zu, je weiter sie aufwärts steigt, und endigt sich endlich unterhalb des Poupartschen Bandes in dem Stamm der Cruralvene.

In diesem ganzen Verlauf stoßen überall kleinere Subcutanen zu ihr, um sich mit ihr zu vereinigen, und bisweilen auch größere mit ihr parallel laufende Subcutanvene. Ueberdies entspringt sie noch die äußere Pudendalvene von den Labien oder dem Perineum auf.

Die kleine saphenöse Vene, äußere Hautvene des Fußes, (*Vena saphena parva*) entspringt in der Gegend der kleinen Zehe von dem Dorsalvenennetz des Fußes, geht um den äußern Knöchel herum zur äußern und hintern Seite des Unterschenkels, und verläuft hier bis zur popliteischen Vene in die Höhe, in welcher sie sich endlich endigt. Doch findet man auch nicht selten, daß sie in die große saphenöse Vene übergeht, mit welcher sie auch immer durch mehrere größere Verbindungszweige, (*Venae communicantes*), Gesellschaft hat, die theils am vordern, theils am hintern Umfang des Unterschenkels liegen. Ueberdies steht sie auch durch kleinere Zweige mit tiefer liegenden Venen in Verbindung". (*Rosenmüller*.)

Vorzügliche und eigne Abbildungen der oedachten Vene enthalten die 127. u. 128. Tafel der Pöderschen anatomischen Tafeln. (*N. d. Z.*)

*Crureus musculus*, s. *Cruralis*.

*Crus*, der ganze Fuß von der Hüfte an bis zur Sohle, unci-

gentlich der Oberschenkel, gewöhnlicher der Unterschenkel. auch Schenkelknochen.

*Crus incudis descendens et transversum*, s. Schenkel. — *Incus*. — *parvum ossis ischii*, s. unter Kette des Sitzstücks Hüftknochens, aufsteigender Ast.

*Crusta*<sup>1</sup> *adamantina*, s. *marmorea dentium*, s. Schmelz der Zähne. — *vermicularis*, s. *villosa ventriculi et intestinum*, s. unter Häute des Magens und Darms, innerste Haut.

1) eigentlich Rinde oder rindeartiger Ueberzug.

*Crustosa tunica ventriculi et intestinorum*, s. ebendasselbe.

*Cruz*, s. Kreuz. — *occipitis*, s. Kreuzförmige Spina des Hinterhauptknochens.

*Cryoidea cartilago*, vitiös statt *Cricoidea cartilago*.

*Crypsochis*, (*Crypsorchis*<sup>1</sup>, *Cryptorchis*<sup>2</sup>, s. *Torchis* <sup>3</sup>) ein Knabe, oder auch Erwachsener männlichen Geschlechts, bei dem die Hoden in der Abdominalhöhle zurückgeblieben, und nicht in den Hodensack herabgetreten sind. Vgl. unter *Genitalia* des männlichen Geschlechts, Hoden.

1) entsprechend dem Griechischen Worte *κρυφορχις*. Galeni defin. med. Stephani dict. med. 1564, p. 382. 2) 3) Hildebrandt's d. Anat. d. M. 3. B. S. 2254.

*Crypta Morgagni*<sup>1</sup>, s. *Navicularfossa* der männlichen Harnröhre.

1) nach eigentlicher Bedeutung (*κρηπτη*) eine Brust oder Höhle.

*Cryptae cutis*, s. Talgdrüsen der Haut. — *mucosae*, s. Schleimhäute. — *palpebrarum*, s. Meibomische Drüsen. — *sebaceae*, s. Talgdrüsen der Haut. — *uteri*, s. Venen des geschwängerten Uterus.

*Cryptorchis*, s. *Crypsochis*.

*Crystallene Feuchtigkeit*, s. *Crystalllinse*.

*Crystallenes Behältniß*, *Crystallenhaut*, s. *Capsula* der *Crystalllinse*.

*Crystallfeuchtigkeit*, *Crystallglas*, s. *Crystalllinse*.

*Crystallina capsula*, s. *Capsel* der *Crystalllinse*. — *laminar capsulae lentis crystallinae*, s. *Crystallmembran* der *Capsel* der *Crystalllinse*. — *lens*, s. *Crystalllinse*. — *membrana*, s. *Membran* der *Crystalllinse*. — *substantia cerebri*, s. *Corticalsubstanz* des Gehirns. — *tunica*, s. *Capsel* der *Crystalllinse*. — *vasa lymphica*, s. *Lymphgefäße*.

*Crystallinum corpus*, s. *Crystalllinse*.

*Crystallinus*, *Crystallinus humor*, s. *Crystalllinse*.

*Crystallisation*<sup>1</sup>, (*Crystallisatio*<sup>2</sup>) *Crystallisirung* <sup>3</sup>, *Crystallisation* <sup>4</sup>, *Crystallisirung* <sup>5</sup>, *Anschließen* <sup>6</sup>. Die Cohärenz fester Theile ist ungleichförmig, die der Flüssigkeiten gleichförmig; von jener Ungleichförmigkeit entsteht das verschiedene Gelingen von dieser Gleichförmigkeit die Tropfenbildung.

Geht ein flüssiger Körper in den festen Zustand über, so bezeichnet man diesen Vorgang als *Crystallisation*.

1) Succow's Anfangsgr. d. Phys. u. Chemie, 1. Th. S. 26. 2) Succow's mann inst. chemiae ed. 2. S. 55. 3) Gren's Handb. d. Chem., Aufl. 1. Th. S. 291. 4) 5) in sprachlichiger Bezeichnung, da dieselbe ursprünglich aus dem Griechischen Worte *κρυσταλλος* gebildet ist. 6) in iii fundamenta chem. ed. 2. P. III. p. 153.



dieser Uebergang, (Congelatio,) Erstarrung, durch Veränderung Cohäsion; die Theilchen ziehen sich nicht mehr nach allen Seiten gleicher Stärke an, sie bilden regelmäßige, eckige Gestalten und Rippen, die wir Crystallen nennen. Um eine anschauliche Vorstellung davon zu haben, ist es nöthig, naturgemäß aufzustellen, daß der Uebergang tropfenweise geschehe, daß nämlich zuerst ein Tropfen Flüssigkeit erstarre, und diese Erstarrung auf die nahe gelegenen Tropfen übergehe, welche sich dann um den ersten herum ordnen, ihn umfassen und seine Rundung zu so vielen Seiten abplatten, als ihre Zahl groß ist. So construiren sich die einfachsten primitiven Crystallen: die dreiseitige Pyramide von vier anliegenden Tropfen erzeugt; die dreiseitige Säule und die vierseitige Pyramide durch fünf Tropfen; der Würfel, der Parallelopipedum, die vierseitige Säule durch sechs Tropfen, die sechsseitige Pyramide durch sieben Tropfen, die sechsseitige Säule durch acht Tropfen u. s. w. Durch Zusammensetzung mehrerer primitiven Formen entstehen größere secundäre Crystallen; so z. E. geben zwei mit den Basen vereinigte vierseitige Pyramiden das Octaeder. Haug hat diesen Gegenstand mit vieler Genauigkeit, obgleich aus einem andern Gesichtspuncte, untersucht. Er sagt nämlich die Grundgestalt aus der Zertheilung der secundären Crystallen stellt alle nach ihm nicht weiter zu analysirenden als primitive an. Außer dem Würfel, Tetraeder und der sechsseitigen Säule, nimmt er noch das Octaeder, das pyramidale Dodecaeder und das rhomboidale Dodecaeder als primitive Crystallen an.

Das solide Organische crystallisirt ebenfalls aus dem allgemeinen Saft der Ernährung, aus dem Blute; doch werden diese Erstarrungen durch andere Geseze modificirt, und sie erzeugen andere, doch weniger regelmäßige Gestalten. Man kann mit Nutzenrieth<sup>2</sup> behaupten, daß zwar im Blut noch chemische Polarität herrscht, daß aber erlischt, sobald sich Niederschläge daraus bilden, die zu Körnern werden. Von jetzt an entsteht organische Polarität, nach zwei entgegengesetzten Richtungen in die Länge wirkt, und die runde, als die primitive Form des organischen, bildet. (Ficinus.)

Die Bemerkungen über die Verschiedenheit beider Geschlechter und ihrer Absonderungsorgane in Keil's u. Nutzenrieth's Arch. für d. Physiol. 7. B. S. 1 u. f.

Crystallische Feuchtigkeit, s. Crystalllinse.

Crystallisirung, s. Crystallisation.

Crystalllinse<sup>1</sup>, (Crystallina lens<sup>2</sup>), Crystallfeuchtigkeit, Crystallenglas<sup>3</sup>, Crystallische<sup>4</sup>, oder Crystallene Feuchtigkeit<sup>5</sup>, Linsenförmiger Crystall, oder Körper<sup>6</sup>, Auglinse, (Humor crystallinus<sup>7</sup>, Crystallinus<sup>8</sup>, Crystalloides<sup>9</sup>, Lens<sup>10</sup>, Humor glacialis<sup>11</sup>, Corpus crystallinum,

Wallcr's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v. Seveling, 1. Th. S. 564.

1) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1733, 4. B. S. 232. 3) Haller prim. lineae physiol. S. 517. 4) Kulmus anat. Tabellen, Tab. 9.

5) 6) Taylor's Mechanism. d. Aug. Uebers. Berl. 1750, S. 35. 7)

8) Vesalii de c. hum. fabr. l. 7. c. 14. 9) nach den Griechischen

Worten κρυσταλλινος und κρυσταλλοειδης. (Ruffi de nomin. c. h. 1.)

10) Fabricii ab Aquapendente de ocul. l. 1. c. 7 in operib. p. 193.

11) Eleutaub's Fergliederungsf. Uebers. Leipz. 1792, 2. Th. S. 288. 12)

13) Vesalii de corp. h. l. c.

anat. physiol. Realw. II. B.

# 274 Crystallmembran d. Capsel d Crystalllinse Cubitalflexur

Crystallus, s. Anima <sup>12</sup>, s. Centrum <sup>13</sup>, s. Specillum interius s. Gemma oculi <sup>15</sup>, Grando, Gutta <sup>16</sup>, Gutta humoris <sup>17</sup>, der Gestalt nach linsenartige, völlig durchsichtige, in der Achse Auges liegende, von einer eignen Capsel eingeschlossene, und mit dieser vorn an die Iris grenzende, hinten in einer eignen Befestigung des Glaskörpers aufgenommene gallertartige Körper, der stärksten die Refraction der Lichtstrahlen sichtbarer Körper im Auge wirkt und daher eine wesentliche Bedingung des deutlichen Sehe-  
 ist. S. Auge.

12) — 14) Laurentii anat. l. xi. c. 7. 15) C. Bauhini thes. anat. l. 3. c. 40. 16) nach Avicenna. S. ebendas. 17) Ruffus (a. a. D.) S. ebendas.

Crystallmembran <sup>1</sup> der Capsel der Crystalllinse, (Crystallina lamina <sup>2</sup> capsulae lentis crystallinae,) die besonders verschiedene vordere Lamelle der Capsel der Crystalllinse.

1) Maier's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 403.

Crystalloidea membrana, s. tunica, f. Capsel der Crystalllinse.

Crystalloides, f. Crystalllinse. — capsula, s. membrana s. tunica, f. Capsel der Crystalllinse.

Crystallus oculi, f. Crystalllinse.

Ctedones, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wortes i. q. Fibrae, f. Fibern.

1) κτητορες

Cteis, beßgl. <sup>1</sup>, i. q. Pubes.

1) κτεϊς, eigentlich pecten.

Cteues, beßgl. <sup>1</sup>, f. Schneidezähne.

1) κτευες.

Cubica ossa, f. Würflichte Knochen.

Cubacula visus, f. Augen.

Cubicum, s. Cubiforme os, f. Cuboideischer Knochen des Tarsus.

Cubiforme os carpi, f. unter Multanguläre Knochen des Carpus, größerer Knochen.

Cubiformia ossa, f. Würflichte Knochen.

Cubitaeus musculus externus et internus, f. Ulnar- und Ulnarflexor der Hand.

Cubitale ligamentum inter os lunatum et triquetrum, Brachialligament des semilunären und triangulären Knochens des Carpus. — — — naviculare et lunatum, f. Brachialligament des scaphoideischen und semilunären Knochens des Carpus.

Cubitales arteriae communicantes, f. unter Collaterales des Arms. — venae, f. Ulnarvenen.

Cubitalflexur, (Cubitalis, s. Cubiti flexura <sup>1</sup>,) Abbiegung, Armbeuge, (Incurvatio brachii <sup>2</sup>, Ancon <sup>3</sup>,) der oder kleinere Winkel, den der Vorderarm in seiner Biegung gegen den Oberarm bildet. Vgl. Arme.

1) 2) Spigellii de hum. corp. fabr. l. i. c. 6.

3) entsprechend

Griechischen Worte αγκυον, Beugung, (Stephani dict. med. 1564, 53)

Doch wird dieß Wort gewöhnlich zu Bezeichnung des Olecrani gebraudt.



*Cubitalis arteria*, f. *Ulnararterie*. — — *circumflexa humeri*, unter Circumflexe Arterien des Oberarms, hintere Arterie. — *curva*, f. *Cubitalflexur*. — *musculus externus et internus*, *Ulnarextensor* und *Ulnarflexor* der Hand. — — *gracilis*, f. unter *Palmar* Muskeln der Hand, den langen. — — *Rioli*, f. unter *Unconden*, den kleinen. — *nervus*, f. *Ulnarnerv*. — — *cutaneus*, f. unter *Eutannerven* des Arms. — *processus ossis brachii*, f. *Cubitalproceß* des Oberarmknochens. — *vena externa*, f. unter *Vasifica*.

*Cubitalproceß* des *Oberarmknochens*, (*Cubitalis processus ossis brachii* <sup>1)</sup>, *Gelenkfortsatz* <sup>2)</sup>, oder *Gelenkfortsatz* <sup>3)</sup>, *Articulirende Eminenzien* <sup>4)</sup> des *Oberarmknochens*, *processus articulares* <sup>5)</sup>, s. *Eminentiae articulares ossis humeri*, *Cardinamentum* <sup>6)</sup>, s. *Cardinata commissura* <sup>7)</sup> *brachii*, nach unten auslaufende Ende des *Oberarmknochens*, welches in *Gelenkerhabenheiten*, der *Trochlea* und dem *Köpfchen*, sich mit dem Knochen des *Vorderarms*, nämlich dem *Radius* und der *Ulna*, verbindet. S. *Oberarmknochen*.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 694. 3) Klein's Handb. d. Vergleichend. Anat. d. M. 1. B. S. 181. 4) Walther's Abb. v. trochn. Knoch. 2. Aufl. S. 294. 5) Foder's anat. Handb. 1. B. S. 233. 6) entsprechend der Hippokrat'schen Bezeichnung τοῦ βραχίου. 7) Fallopi's oper. T. I. ind.

*Cubitea arteria*, f. *Ulnararterie*.

*Cubiteus musculus externus et internus*, f. *Ulnarextensor* und *Ulnarflexor* der Hand.

*Cubitio*, f. *Liegen*.

*Cubito-carpianus*, s. *carpiens musculus*, f. *Ulnarflexor* der Hand. — *digitalis nervus*, f. *Ulnarnerv*. — *metacarpiæus pollicis musculus*, f. unter *Abductoren* des *Daumens*, den langen *Abductor*. — *palmaris arteria*, f. unter *Ulnararterie*. — *phalangianus musculus*, f. unter *Flexoren* der *Finger*, den tiefern *Flexor*. — *radialis bursa mucosa*, f. *Radius* Schleimsäcke. — — *musculus*, f. unter *Pronatoren*, den kurzen. — *radio-sub-metacarpæus*, s. *sub-metacarpæus musculus pollicis*, f. unter *Abductoren* des *Daumens*, den langen *Abductor*. — *sub-phalangietianus*, s. *phalangietiens musculus indicis*, f. *Extensor* des *kleinen Fingers*. — *supra-metacarpianus*, s. *metacarpæus musculus*, f. *Ulnarextensor* der Hand. — — *palmaris arteria*, f. unter *Ulnararterie*. — — *phalangietianus*, s. *phalangietiens musculus*, f. unter *Extensoren* des *Daumens*, den größern *Extensor*. — — *phalangius musculus pollicis*, f. unter *Extensoren* des *Daumens*, den kleinern *Extensor*.

*Cubitum*, ungewöhnlich statt *Cubitus*.

*Cubitura*, f. *Liegen*.

*Cubitus*, i, im allgemeinen der *Vorderarm*, insbesondere die *Elbogenröhre*, in noch besonderer Beschränkung der *Knorpel*, oder das *Diaphranum*.

*Cubitus*, us, f. *Liegen*.

*Cuboidea ossa*, f. *Würfliche Knochen*.

**Cuboideischer Knochen des Tarsus**, (*Cuboides*<sup>1</sup>, s. *hoidium*<sup>2</sup>, s. cubiforme<sup>3</sup>, s. cubicum os,) Würfelknochen<sup>4</sup>, Würfelförmiger Knochen<sup>5</sup>, Würfelbein<sup>6</sup> (*Os cyboides*<sup>7</sup>, s. quadratum<sup>8</sup>, s. grandinosum<sup>9</sup>, s. muforme<sup>10</sup>, s. polymorphon<sup>11</sup>, s. tesserac<sup>12</sup>), der einigermaßen einem Würfel ähnliche Knochen des Oberfußes oder Tarsus, welcher durch überknorpelte Flächen und straffe Gelenke mit den benachbarten Knochen, namentlich durch seine hintere, etwas concave Fläche mit dem Calcaneus, durch die vordere mit der Basis der Knochen Metatarsus der vierten und fünften Zehe, durch die innere vorwärts mit dem dritten phalangeischen, hinterwärts aber mit dem scaphoideischen Knochen des Tarsus in Verbindung steht. S. Fußknochen.

- 1) nach dem Griechischen Worte κυβοειδης. (Galenus de oss. l. c. 24) 2) Bartholini anat. libell. 4. c. 21. 3) Mayer's Besch. d. menschl. Anat. S. 368. 4) C. Bauhini theatr. anat. l. 4. c. 43. 5) Diderot's Besch. u. f. w. n. a. d. 6) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. M. 1. B. S. 961. 7) Walter's Abh. v. trochn. Knoch. 2. Aufl. S. 7) Riolani de ossib. comm. c. 23. 8) Fallopii de oss. c. 9) nach den Arabern, vgl. Bartholini anat. l. c. 10) 11) entspricht der Griechischen Bezeichnung πολυμορφον. S. Bartholini anat. 12) Bartholini anat. l. c.

**Cucularis musculus**, s. Cucullaris.

**Cuculi**<sup>1</sup> os, s. ossa, s. Coccyxknochen.

- 1) Cuculus, der Ruckuck.

**Cuculli**<sup>1</sup> Hippocratis, s. Muschelförmige Knochen.

- 1) Cucullus, eine Kappe, besonders Mönchskappe.

**Cucullaris**, (*Cucullaris*<sup>1</sup>, sc. musculus,) Kappenförmiger Muskel<sup>2</sup>, Kappenmuskel<sup>3</sup>, Mönchskappen-<sup>4</sup>, Tisch- oder Tischförmiger<sup>5</sup>, oder Mönchskappenförmiger<sup>6</sup>, ungleich viereckiger<sup>7</sup> Muskel, Mönchskappe<sup>8</sup>, (*Musculus cucularis*<sup>10</sup>, s. trapezius<sup>11</sup>, s. trapezius<sup>12</sup>, s. scapularis<sup>13</sup>, s. occipito-spinoso-acromialis<sup>14</sup>, s. occipito-dorso-sub-acromialis<sup>15</sup>, s. dorso-sub-acromialis<sup>16</sup>, s. occipito-dorso-clavi-sub-acromialis<sup>17</sup>), der unmittelbar unter der Haut an der hintern Seite des Halses und dem obern Theile des Rückens liegende breite, platte Muskel, welcher auf jeder Seite von der

- 1) nach Columbus (de re anat. l. 5. c. 15) wegen seiner Ähnlichkeit mit einer Mönchskappe, indem nämlich die Muskeln auf beiden Seiten des Rückgraths im Zusammenhang als ein Muskel betrachtet worden. 2) 3) Sommering's Muscell. S. 232. 4) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 2. B. S. 961. 5) in Beziehung auf die lateinische Benennung trapezius. Winslow's Anat. Tabell. Uebers. Berl. 1733, 2. B. S. 65. 6) Schaarschmidt's Anat. Tabellen, Tab. 15. 7) Meutaud's Bergliederungskf. Uebers. Leipz. 1. B. S. 359. 8) Palfyn's Anat. übers. v. Huth, 1. Th. S. 65. 9) nach Kalmus (anat. Tabell. Tab. 28.) 10) vitiös. Spigelius h. c. fabr. l. 4. c. 15. 11) nach Riolan (anthropogr. l. 3. c. 21) in Vergleichung mit einem geschobenen Viereck, (trapezium von τραπεζα Tisch) beide Muskeln nämlich als Einen betrachtet. 12) Winslow's anat. lat. vers. T. II. S. 140. 13) Verheyen syntagm. anat. c. 12. Blasii c. 12, nota 1. 14) nach Schreger (Nomencl. b. Musc. S. 15) Occipiti-dorso-sus-acromien, nach Chaussier (expos. syst. des musc. etc. p. 6) 15) (Dorso-sus-acromien,) nach Dumeril's v. Biers Vorles. über vergl. Anatom. S. 511. 17) (Occipiti-dorso-sus-acromien,) nach Dumas (système méthod. de nomenclat. des musc. p. 130.)



1 Protuberanz und der obern semicirculären Linie des Occipital-  
 schens, so wie an den spinösen Processen der Hals- und Brust-  
 bel, wo er auch mit dem der andern Seite zusammenhängt, breit  
 springt, stich dann mit stark convergirenden Fasern tendinos an die  
 ge Länge der Spina des Schulterblatts bis zum Acromium hin  
 gt, und so, je nachdem seine obern, mittlern oder untern  
 ern wirken, den Kopf zurück, das Schulterblatt quer nach hinten,  
 nach unten zieht. S. Schultermuskeln.

*Culcitra* <sup>1</sup> *venae portae*, s. Spigelscher Leberlappen.

in eigentlicher Bedeutung ein Polster oder Kissen.

*Culmination* <sup>1</sup>, oder *Culminationspuncte* <sup>2</sup> *des Lebens*,  
*culminatio vitae*,) Höhe, oder Höhe puncte des Lebens,  
*evolutionis vestigia* <sup>3</sup>.) Culmination ist ein von den Astronomen  
 huter Ausdruck, welche nämlich von einem Stern sagen, daß er  
 minire, wenn er in ihren Beobachtungen durch den Meridian geht,  
 denjenigen ideellen Halbkreis am Himmel durchschreitet, der von  
 einem Himmelspole, über den Scheitelpunct nach dem ent-  
 gegengesetzten Pol zu sich wegzieht, und der, so wie der Standpunct  
 Beobachters in östlicher oder westlicher Richtung sich ändert, auch  
 ein anderer ist. Er führt den Namen Meridian oder Mittags-  
 s, weil die Sonne zur Mittagszeit ebenfalls denselben durch-  
 schreitet. Alle Himmelskörper haben ihre scheinbar höchste Erhe-  
 g, am Himmel, oder kommen dem Scheitelpunct am nächsten,  
 an ihn nicht einer oder der andere selbst erreicht,) während ihres  
 nachganges durch den Meridian, oder in dem Moment ihrer Cul-  
 nation. Sterne, die, (wie alle, die von dem über den Horizont er-  
 haen Himmelspol nicht so viele Grade entfernt sind, als der Ort  
 der Erde, von dem aus die Beobachtung angestellt wird, Pol-  
 hat,) auch bei ihrem tieffsten Stand nicht unter dem Horizont  
 absinken, gehen aber täglich zwei Mal durch den Meridian, einmal  
 lich zwischen dem Pol und dem Scheitelpunct, das andere Mal  
 er dem Pole, zwischen ihm und dem Horizont. Alle übrigen dage-  
 , die für den Standpunct des Beobachters sichtbar werden, he-  
 sich, während der täglichen Umdrehung der Erde um ihre Ase, zu  
 mmmten Zeiten über den Horizont herauf, oder gehen auf, steigen  
 an in einem Bogen am Himmel immer höher, und nähern sich  
 an ihrem Culminationspunct, nach dessen Erreichung sie dann  
 lich sich eben so wieder zum Horizont herabsenken und untergehen,  
 aus dem Gesichtskreis verschwinden.

Geburt und Tod ist von den ältesten Zeiten an mit dem Auf- und  
 vergange himmlischer Gestirne verglichen worden. Auf beiden Le-  
 gzenzen steht der Organismus gleichsam in der Tiefe, oder befindet  
 in einem Zustand von Schwäche und Inferiorität. Mit der Ge-  
 t tritt der Mensch in die Erscheinung. Sein Leben steigert sich  
 in allen Richtungen, während er als Kind heranreift. Auch der  
 vergang zum Tode erfolgt, wenn dieser nicht widernatürlich be-  
 unnigt wird, eben so allmählig. Von den tausendfachen Fäden,  
 denen des Menschen Daseyn verschlungen ist, löst sich einer

2) Burdach's Encycl. d. Heilkunst. 2. B. 3. Abth. 2. Abschn. 4 u. 5. Cap.

3) Sprengel inst. physiol. P. I. §. 100.

nach dem andern los. Jedem seiner frühern Lebensinteressen streift der Mensch gleichsam einzeln ab; nur der Tod selbst ist, wie die Geburt, analog dem Auf- und Niedergange der Sterne, ein Moment.

Wie alle Vergleiche, so ist aber auch dieser nur relativ. Die Vortheile des Lebens bieten sich dem Menschen seiner Natur nach nicht zu einer und derselben Lebenszeit auf einmal und in Verbindung. Man kann sagen, daß selbst die früheste Kindheit, wie das hohe Lebensalter seine ihm eigenthümlichen Vortheile hat, so z. B. die Spielbarkeit und die Ruhe; aber hierdurch wird doch nur die Gebräulichkeit und die Schwäche jener Lebensperioden in etwas ausgeglichen, und es sind eigentlich dieses nur negative Vortheile. Aber auch hiervon abgesehen, so hat auch die zwischenliegende Lebenszeit, während welcher das Leben nach allen seinen Richtungen sich entfaltet, so frei hervortritt, als nur die Beschränkung der Organisation es verleiht, die um Erhaltung des Ganzen willen nöthig ist, mehrere Vortheile dieser relativ höchsten Freiheit. Mit andern Worten, das Leben culminirt nicht mit einem Male, sondern es hat mehrere Culminationspuncte, wo eine oder die andere Seite desselben sich in seiner relativ höchsten Vollendung zeigt.

Besonders kann man in den Hauptrichtungen, nach welchen das Leben sich offenbart, einen zweifachen Culminationspunct unterscheiden. In derjenigen Richtung, in welcher der lebendige Organismus der Außenwelt, in so fern diese sein Leben erhöht, angezogen wird, und sich dieser nach dem Maße seiner Receptivität willig hingibt, ist der Genuß der Gipfel des Lebens; in der entgegengesetzten, in welcher sich der Organismus der Außenwelt gegenüber stellt, und sie nach dem Maße seiner Kräfte sich unterwürfig macht, ist freie Thätigkeit in den sich erweiternden Kreisen des Lebens höchstes Gut. Ersteres erstrebt und erreicht am vollkommensten die frische Jugend. Das Leben gleicht hier einem in voller Blüthe stehenden Baume. Des Lebens höchste Wonnen werden nur in dem Blüthenalter der Empfindung am innigsten empfunden. Das Genußleben culminirt, aber da das Leben nur in und unter der Spannung entgegengesetzter Kräfte sich erhält, nur auf kurze Zeit und in sehr raschem Herabsinken zum Wiederuntergang in dem Maße, in welchem der Genuß volle Befriedigung erhält; wogegen es nur mit allmählichem Sinken wieder dem Horizont sich nähert, wenn es durch die Kraft der Kräfte, die nach außen strebt, selbst auch als ein Aeußeres beherrscht wird. Der Culminationspunct der Kraft fällt in das spätere männliche Alter, wenn die Wurzel, aus der dieses hervorsproßt, nicht in den Jahren des Genusses selbst durch Uebermaß desselben ihren frischen Trieb verlor. Hier gleicht das Leben dem Fruchtbaren, dessen Blüthen weder von innen, noch von außen eine feindselige Gewalt zerstörte. Durch weise Vertheilung und durch vorsichtige Benutzung der Kräfte kann dann das Leben selbst bis gegen das natürliche Lebensziel hin, wo nicht auf dem Culminationspunct, doch in der Nähe desselben sehr nahe erhalten werden, und auch nur dann tritt der verfallene Fall ein, wo auch ein dritter Culminationspunct, der der Ruhe, unterschieden werden kann, der von einem höhern Standpunkte aus aber auch eine positive Seite erhält, wenn nämlich an das Ende der Erschöpfung und des Dahinsinkens der individuellen Kraft



ere Bewußtseyn eines wohlbenutzten Lebens sich knüpft, und der Mensch in der Schule des Lebens selbst weise genug geworden ist, Leben nicht zu überschätzen, und sich als unendlichen Geist, von dem nur als Hülle befaßt, hoch über dasselbe erhaben zu erachten; Ziel, das das äußerste und würdigste ist, welches der Mensch im Strom der Zeit zu verfolgen vermag. Denn wer sollte nicht den Greis glücklich preisen, der nach einer genussreichen Jugend, und einem thätigen Leben in den Jahren der Kraft, am Abend seiner Tage, in edigem Gefühl, sein Erdenleben nicht verloren zu haben, und in Erwartung eines Eintritts in höhere Lebenskreise, die Ueberzeugung gewonnen hat, daß dieß irdische Leben gerade nur für die Spanne, mit es uns zugemessen ward, vollen Werth besitzt, und bereit ist, eben so willig wieder hinzugeben, als der Müde nach verlebtem Tage sich dem Schlummer überläßt; oder mit Horazens Worten <sup>4</sup> dem Leben als ein gesättigter Gast von einem köstlichen Mahle bedet?

(H.)

*recedere a vita ut conviva satur.*

**Culter**, s. Messer, auch unter Lappen der Leber, dritter Lappen.

**Cultralis cartilago sterni**, i. q. Xiphoidens processus sterni.

**Cultur**, (*Cultura*<sup>1</sup>.) Bildung, Ausbildung, hat dem Sprachgebrauch nach eine zweifache Bedeutung: 1) die einer geistlichen Einwirkung auf etwas, was jedoch an sich schon einer eigentlichen Entwicklung fähig ist, um diese noch höher zu steigern und für einen bestimmten Zweck zu lenken, (in diesem Sinne sagt man z. B., ein Acker, eine Pflanzens- oder Thiergattung einer Cultur fähig) 2) die des Zustandes dieser Entwicklung, unter solchen gegebenen äußern Bedingungen selbst.

Jede Cultur setzt einen Vernunftzweck voraus. Von Natur selbst, in der gemeinen Bedeutung dieses Wortes, wird also nichts cultivirt; denn dieß würde eine höhere Steigerung der Natur, als sie selbst ist, durch sie selbst seyn, was also einen Widerspruch mit sich selbst enthält. In einer Naturlehre von nicht mit Vernunft begabten Wesen kann daher von Cultur nur in so fern die Rede seyn, als diese einer Cultur nach Vernunftzwecken fähig sind. Die Cultivirung selbst aber liegt außer ihrem Bezirk. So würde in der Naturlehre des Pferdes die Kunst, ein Pferd zum Reit- und Zugpferde zu bilden, am ungeeigneten Ort seyn. In der Naturlehre des Menschen aber ist die Vernunft selbst ein Gegenstand der Betrachtung. Denn Vernunft ist eben der hervorstechendste Charakter des Menschen, und, wie man will, die Spitze, in die alles, was den Menschen bezeichnet, convergierend zusammentritt, oder auch das Radical, aus dem das ganze Menschenleben in die Erscheinung tritt; denn alles, was der Mensch im Leben beobachtet, ist auf einen Zweck gerichtet, oder geht selbst zweckmäßig hervor.

Durch seine Vernunft aber cultivirt der Mensch nicht nur die Natur in seiner nächsten Umgebung, sondern auch sich selbst, sowohl individuell, als auch, und zwar noch mehr, im Geschlechte; der früher Cicero. Tusc. qu. 1. 2. c. 5: „Ager, quamvis fertilis, sine cultura fructuosus esse non potest,“ u. Horat. epist. 1. v. 40: „Nemo adeo securus est, ut non miterescere possit, Si modo culturae patientem commo-

det aurem.“

ins Daseyn getretene Mensch den spätern, die frühere und reineren Generation die nachfolgende und heraufwachsende, das zu einem höhern Grad von Entwicklung seiner Kräfte gelangte Volk noch auf einer niedern Staffel seiner Ausbildung befindliche, rohere Volk.

Die Betrachtung der menschlichen Cultur, oder dessen, was der Mensch im Ganzen, oder das Menschengeschlecht durch seine Vernunft allseitig geworden ist, oder auch theilweise noch werden kann, ist eine rein physiologische, indem der Mensch alles dieß lediglich durch seine Menschennatur, nämlich als Vernunftwesen, wozu ihm seine menschliche Organisation verliehen wurde, geworden ist, oder werden kann. Da nun aber eben durch die Cultur des Menschen alle Wissenschaften und Künste selbst hervorgehen, und in dem Fortgange derselben erst besonders unterschieden worden sind, und Abgrenzungen erhalten haben; so müßte eigentlich die Physiologie des Menschen auch alle umfassen. Der ungeheure Umfang der menschlichen Kenntnisse aber hat es nöthig gemacht, sie durch gemessene Schranken voneinander zu scheiden, und eine solche Hauptgrenze bildet dann der höhere Culturstand des Menschen selbst. Nämlich es wird hier von der Physiologie des Menschen alles das, was der Mensch als cultivirter Mensch ist, thut und treibt, ausgeschlossen, nicht aber ihr gegenüberstehend, da vielmehr alle eigentlichen Wissenschaften in einer gehörigen Zusammenstellung die Physiologie des Menschen umgeben, sondern nur außerhalb des engern Kreises stehen, der den Menschen bloß nach seinem Thierleben, und als Mensch lediglich nach seinen Anlagen zu einem humanistischen Leben befaßt.

Diese Anlagen selbst aber erhellen weder aus der Untersuchung einzelner Theile, oder auch nur der Proportionen dieser, noch aus der einfachen Beobachtung des Lebens eines einzelnen isolirt gestellten menschlichen Individuums; denn wenn auch der Bau des menschlichen Körpers und besonders mehrerer in dem Menschen vorzugsweise ausgebildeten Theile, z. E. des Gehirns, der Zunge und der Hand, der Hand, des Plattfußes, seiner höhern Bestimmung vollkommen entspricht: so kann dieß doch nur dann erst eingesehen werden, wenn der bereits cultivirte Mensch sie zum Gegenstand seiner Reflexion macht, und auch dann bleibt noch in Hinsicht des nähern Bezugs dieser Theile zu der humanistischen Ausbildung vieles in Dunkel. Der Mensch, als Mensch, sich bloß in menschlicher Gesellschaft und unter Menschen von höherer Reife ausbilden. Ein Mensch, der aus Thieren ausgewachsen, erhebt sich auch nicht über das Thier, und auch die niedere Staffel von Cultur, auf der isolirt lebende Nationen von geringem Umfang noch jetzt, nach dem Verlauf von Jahrhunderten von ungewisser Anzahl sich befinden, deutet darauf hin; der Mensch auch im Geschlecht nur sehr langsam sich selbst heben zieht, sondern, wenn er seine volle Bestimmung erreichen soll, erzogen werden muß.

Wozu der Mensch Anlage besitze, erhellt vollständig nur aus der Betrachtung dessen, was er über dem ganzen Erdbreis, der ihm Wohnplatz angewiesen wurde, in dem Laufe der Zeit, so weit die



ichte reicht, oder mit andern Worten, was das menschliche Geschlecht geworden ist. Das Socialleben des Menschen, in so viel, als solches theils durch die Organisation des Menschen überhaupt, theils durch climatische Verhältnisse, (indem die auch zufällig einwirkenden Schicksale der Völker doch immer auch in der Natur des Menschen und den Einwirkungen jener climatischen Verhältnisse ihren Hauptgrund haben,) bedingt ist, sich gestaltet hat, und noch jetzt sich gestaltet, ist im Grunde nur ein höher potenzirtes Menschenleben, in so fern der physiologischen Betrachtung nahe gelegt, und gleichsam das zweite Hauptstück der Physiologie des Menschen, als nur in der Bestimmung des Menschen und der Zweck seines Daseyns, soweit die Sphäre der menschlichen Vernunft überhaupt reicht, wirklich erkannt wird.

Nur in dem Socialleben gestaltet sich das ideelle Leben, nach welchem der Mensch mit und unter Menschen mehrere Generationen hindurch, unter Prädominanz des vegetativen und thierischen Lebens, durch die niedern Stadien der Cultur durchgegangen ist, in dem großen Völkerverkehr, der die Vortheile der entgegengesetzten Himmelsstriche gegenseitig einander umtauscht, und den einzelnen Menschen der Sorge für die dringendsten Lebensbedürfnisse überhebt, durch die der Mensch an die Erde gefesselt ist, der ihn trägt und ihm den Nothbedarf seiner Existenz reicht. In dem ideellen Leben aber findet die Vernunft den einzigen in sich befriedigenden Zweck des menschlichen Daseyns, und erhebt sich selbst, ihrer höhern Abkunft nach, in ihm wieder. Was materiell sich noch an das Daseyn knüpft, und in dasselbe eingeht, wird lediglich als nothwendiges Bedingniß des Erdenlebens erkannt, das, wie der Ballast dem Schiffe, nach dem Schwerprincip seine äußere Haltung gibt, und das individuelle Leben gegen Entfaltung in höhere Kreise sichert, wo es von dem Allleben selbst vertrieben und in dasselbe aufgenommen werden würde.

Für das ideelle, (rein geistige,) Leben aber zeigen sich insbesondere in dem Socialleben aller Völker, die mit andern mehrere Generationen hindurch in Verbindung sich befunden haben, drei verschiedene Richtungen des höhern Strebens, die aber wieder unter sich in dem engsten Zusammenhang stehen. Ihre Endziele sind die drei Ideale: Wahrheit, Gerechtigkeit, Schönheit. Die Erhebung des Menschen zu ihnen, individuell oder nationell, oder die Anerkennung derselben ist nur auf dem Wege der Cultur möglich, die also selbst die Leitung zu jenen Idealen nach Verschiedenheit derselben, oder mehrerem Vorwalten eines derselben, selbst als intellectuelle, moralische und ästhetische Cultur unterscheidbar ist.

Die intellectuelle Cultur befaßt also hiernach das Reich des Wissens. Das Wissen selbst kann auch schon für niedere Zwecke des Lebens, so für Erhaltung des Körpers nützlich, ja nothwendig seyn, z. B. die Kenntniß der essbaren Naturproducte, selbst den rohesten Menschen. Je mehr sich aber, nach Befriedigung der dringendsten Naturforderungen, des Lebens Kreise erweitern; desto reger wird der Hang des menschlichen Geistes, alles das in seine Vorstellung aufzunehmen, was das Leben nach außen Reiches, Großes und Neues darbietet. Die innern Bedingungen der intellectuellen Cul-

tur sind ein umfassendes und tren des Empfangene bewahrendes Gedächtniß, und eine durch Uebung erlangte Fertigkeit und Reife Verstandes in Verbindung der Gedanken zu Urtheilen und Schlüssen. Die intellectuelle Cultur führt zur Gelehrsamkeit, die nach verschiedenen Fächern des menschlichen Wissens auch eben so verschieden, und, je nachdem vorwaltend das Gedächtniß oder der Verstand in Anspruch genommen wird, mehr historisch oder mehr philosophisch ist, obgleich sie nie nur eines allein seyn kann. Bedingungen der höhern intellectuellen Cultur sind, daß wenn dem Gelehrten eines besondern Fachs auch die besondern Gegenstände anderer wissenschaftlichen Fächer fremd seyn können, doch die Principien aller Wissenschaften und das organische Band, das sie sämmtlich zusammenhält, ihm nicht unbekannt seyn dürfen.

Die moralische Cultur hat das Handeln der Menschen zum nächsten Zweck. Die dringendsten Forderungen des Lebens halten die Menschen in den engeren Kreisen seines physischen Daseyns gefesselt. Noth kennt kein Gebot. Selbsterhaltung ist dem rohen Menschen der einzige Zielpunct alles dessen, was er unternimmt. Der Moment ist sein Gebieter. Aber dieser niedern Bande entzogen, in geselligen Verbindungen einen mit Leichtigkeit die Erhaltungsmittel seines physischen Lebens zu erringend, oder auch sie ohne eigne Bemühung von andern empfangend, fühlt der Geist sehr bald den sich regenden Trieb eines Fortschritts nach außen, einer Erweiterung seiner Lebenskreise, in der der Mittelpunkt er sich nun stellt, um von da aus nach allen Richtungen Spielraum für seine Kraft zu gewinnen. Durch die moralische Cultur erhebt sich der Mensch zur Freiheit, und erhält nun jene Spannung, wodurch allein das Socialleben sich gegen den Egoismus, die Grundbedingung alles individuellen Lebens, behaupten kann. Statt des Naturtriebes gebieten nun Gesetze, und in ihnen werden die Grundpfeiler des Sociallebens gelegt. Aber um sie anzuerkennen und zu achten, muß die Idee der Gesetzmäßigkeit überhaupt, das Ge-  
von Recht und Unrecht, sich bereits in dem Menschen gleichzeitig entwickeln. Indem aber in diesem Antagonismus des Sociallebens der Egoismus selbst in die gezogenen weitem Kreise mit übergeht, und von diesem höhern Standpunct aus den moralischen Sinn von dem jenseits aller gemessenen Kreise liegenden höchsten Gute auf sich selbst der zurücklenkt, entstehen daraus die mannigfaltigen doppelte Gestaltungen des Sociallebens, die Ueberwältigungen des Rechts durch die Macht, und der Kampf dieser mit der List, als des Schwachen natürlicher Waffe, und alle die unter tausend Gestalten immer wieder von neuem hervortretenden Gebrechlichkeiten und Unvollkommenheiten aller bestehenden völker- und staatsrechtlichen Verfassungen und aller Rechtsverhältnisse im bürgerlichen, ja selbst im Familienleben, während dessen die öffentliche Meinung über das, was in dem Handeln der Menschen, in ihren Verbindungen mit einander ordentlich und edel, recht und billig ist, auch selbst bei Nationen, die noch auf einer mittlern Stufe der Cultur stehen, nur wenig schwankt. Die höhere Ausbildung des moralischen Sinnes aber stellt sich als Ehrgeiz dar, das, auch ohne von außen gegebenes Gesetz, nichts des Einzigen Menschen in seinen geselligen Verbindungen Unwürdiges zu thun.



tet, und gegenseitig mächtig zu allem Erhabenen anspornt, was  
 erhalb des Kreises seiner Kräfte zur Erhöhung des Sociallebens  
 ihm geschehen kann.

Die ästhetische Cultur bezieht sich zunächst auf das Gefühl  
 Menschen, das aber, so lange die dringendsten Lebensbedürfnisse  
 Menschen noch nicht befriedigt sind, ebenfalls zu schwach ist, um  
 über die engsten Begrenzungen des individuellen Lebens zu erhe-

Doch denken auch schon die rohesten und verwildertsten Natio-  
 wenigstens auf einige Körperzierden. Denn auch in der vollendet-  
 (Entwicklung des Schönheitssinnes ist es immer nur das Zierende,  
 an wir dieß Wort in Ermangelung eines andern in einer edlern,  
 in der gewöhnlichen Sprachbedeutung nehmen,) was den ästhetischen  
 an anspricht. Das Vergnügen aber, was die Schönheit in der hö-  
 Bedeutung, die Plato zuerst in ihrem Wesen erkannte, dem  
 ern Sinne gewährt, beruht auf dem Gefühle der Vollendung, da-  
 alles Schöne zugleich harmonisch ist, und die Harmonie der Töne  
 wieder dem, allem Materialismus am entfremdetesten Sinne als  
 Schönes darstellt. Auch hier erhebt sich der Egoismus, der, selbst  
 ausklos hervortretend, immer auch als der Gegensatz des Schönen,  
 als häßlich und widerlich erscheint, um in dem Gebiete des Schö-  
 sich mit einem ihm fremden Glanz zu umgeben. So wird die  
 die Maske der Eitelkeit, die aber der höhere Sinn verschmählt,  
 sich in Anschauung und Aneignung des Schönen zu einem Kunstle-  
 zu erheben, indem der von ihm geleitete Mensch, entweder selbst  
 sich entwickelndes Talent einer besondern Kunst huldigt, und  
 sich weihet, oder mit mehrerer oder minderer Vorliebe für eine  
 die andere allem dem, was ihn das Socialleben gezogen, des-  
 n eigentlichen Schmuck ausmacht, sich zuwendet und davon an-  
 gt wird. Diese innigste Erfassung des Gemüths von dem Schö-  
 es sei in der sittlichen Welt, oder in dem eigentlichen Reiche  
 Wissenschaften und der Künste, ist als Enthusiasmus bekannt,  
 dem der Mensch nichts Großes und Edles erreicht oder bewirkt.  
 So sind Wissenschaft und Kunst, und als Bedingung beider unb sie  
 wieder zur Einheit verbindend, ein freithätiges Wirken in durch-  
 gtober auch äußere Verhältnisse bestimmten Kreisen, auch das Höchste,  
 der einzelne Mensch im Socialleben erzwecken kann, und wenn  
 den obern Staffeln der Cultur gelangt, so lange ihn das irdische  
 cicip des Egoismus nicht wieder abwärts zieht, ihn selbst auch im Le-  
 hoch hält. In dem steten Conflict mit diesem besteht aber das in-  
 duelle Leben jedes, auch des edelsten Menschen. Innere Haltung  
 a dann nur der gleichmäßig mit Ausbildung des Geistes, des Her-  
 und des Geschmacks cultivirte religiöse Sinn verleihen, der  
 nichts ist als die Erfassung des Unendlichen nach den höchsten  
 dicamenten, welche der menschliche Geist aus sich selbst zu ent-  
 nen vermag. Ohne die Fähigkeit des menschlichen Geistes, von dem  
 hren, dem Guten und Schönen, als Idealen, ergriffen zu wer-  
 und ihnen mit Abstreifung aller irdischen Bande sich zuzuneigen,  
 de der Mensch selbst auch im entferntesten nie den Gedanken einer  
 theit gefaßt haben, und nur in und durch diese Ideale hat sich  
 Gottheit dem Menschen in der Geschichte, während der fortschrei-

tenden Cultur des menschlichen Geschlechts, in den unterschiedlichen Religionen, nach denen die Völker die Gottheit verehren, in wenigsten getrübbten Lichte aber in dem Christenthum, in dessen Funden, und in den Wundern seiner frühern Gestaltung, wie se allmählichen Verbreitung und noch dauernder Erhaltung, und in den Verschiedenheiten der der Nationen und den Zeiten entsprechen bisherigen Entfaltung, geoffenbart. Die Ausbildung des religiösen Sinns oder die Weihe zu einem göttlichen Leben, unterscheidet man auch eine eigne Art, oder als religiöse Cultur, ungeachtet auch sie zu selben Idealen des Wahren, Guten und Schönen, nur in höhere Region gestellt, aber doch auch dem Menschen in seinen frühesten Versuch frei die Augen zum Himmlischen zu erheben, (wie aus der Empfindlichkeit erhellt, welche schon Kinder und ganz ungebildete Naturen schon für religiöse Eindrücke zeigen,) leuchtend entgegen strahlt durch Glaube, Liebe und Hoffnung hinleitet.

In dem, was bisher von der menschlichen Cultur und ihren verschiedenen Zweigen gedacht wurde, ist diese selbst rein ideell gedacht. Menschengeschlecht aber kann nur als Ganzes als etwas Vollkommenes sich darstellen; ja unsere Kenntniß des Menschengeschlechts, eines-Ganzen und seiner Geschichte in der frühern Zeit, reicht weitem nicht aus, um aus der Erfahrung die von der Vernunft gestellte Idee: das Menschengeschlecht erreicht als Ganzes seine Bestimmung, zu rechtfertigen. Im einzelnen finden wir durchgängig nur Annäherungen zu jenen Idealen, Bruchstücke von Cultur, Vorschreiten und Rückschreiten derselben, - sowohl bei Individuen als einzelnen Nationen, einseitige Cultur und ein Ueberspringen derselben, durch Aufhebung der Harmonie, die allein den Menschen Haltung und persönlichen Werth gibt, was man als Affekt-cultur bezeichnet, eine Cultur des Außern, (Politur,) bei Vernachlässigung des Innern u. s. w.

Durch solche Ablenkungen, Beschränkungen und Auswüchse der Cultur hat natürlich auch dieselbe für einzelne Individuen und deren nächste Bedingungen ihre unverkennbaren Nachtheile, oder ihre Kehrseiten. In dem das vielseitige Streben der Menschen, sich zu cultiviren, werden zugleich die Spannungen vermehrt, die zwar zur Erhaltung des Menschen als nöthige Bedingungen erscheinen, häufig aber auch die Vernunftfahrt einzelner mannigfaltig stören, und manchem individuellen Leben zum Untergange gereichen.

Rousseau<sup>2</sup> ließ durch Wahrnehmung des häufigen Nachtheils, den die höhere Cultur einzelnen Individuen bringt, sich zu dem paradoxen Satze verleiten, daß Cultur selbst nicht des Menschen wahre Bestimmung sei, und daß er aus dem Stande der Natur trete, wenn die Kreise seines Lebens zu erweitern strebe, ohne zu bedenken, daß ohne Cultur selbst die Bevölkerung der Menschen nur auf ein sehr beschränktes Maß zurückgedrängt seyn würde, daß also die Menschen, deren Leben in dem großen Conflict untergeht, welcher von der höheren Cultur unzertrennlich ist, ohne diese bei weitem zum größten Theil gar nicht zum Daseyn gelangt seyn würden, und daß des Menschen Werth nicht sowohl in seiner Extension als in seiner Inten-

2) in seiner Schrift sur l'inégalité parmi les hommes.



besteht, die immer in dem Verhältniß zunimmt, je mehr sich die Interessen des Lebens vervielfältigen, welche aber selbst wieder mit Cultur in gleicher Weise steigen und sinken.

Hieraus ergibt sich auch das Verhältniß, in welchem die Cultur der Menschen zu ihrem allgemeinen Gesundheitswohl steht. Die Gesundheit selbst ist wohl so ziemlich auf allen Stadien der Cultur gleich, d. i. die Gesundheit ist stets beeinträchtigt, wenn der Mensch eine Lebensordnung beobachtet, die den äußern Verhältnissen, welche er durch seine mindere oder mehrere Cultur gelangt, angeeignet ist. Ein Mensch, der viel geistig lebt, vermag mit seiner verfeinerten Organisation kein so kräftiges physisches Leben zu führen, wie ein anderer, dessen Gesamtleben vorwiegend materiell ist. Seine Nahrung ist schwach; aber da er verhältnißmäßig nur wenig Stoff in seinem Körper consumirt, genügt sie völlig zu seiner Erhaltung, und die Berücksichtigung dessen, was sein Körper fordert und verträgt, und was ihm nicht bedarf und nicht verträgt, erreicht der Gebildete eben so leicht ein hohes Alter, als der nur in niedern Lebenskreisen sich bewegende Mensch, wie die häufigen Fälle in späten Jahren gestorbener Dichter, Künstler und höherer Staatsbeamten beweisen.

Das Leben des Einzelnen wird freilich auch durch Steigerung der menschlichen Bedürfnisse, als Culturmittel, in Anspruch genommen. Ich denke an die Tausende, die in Bergwerken, Schmelzhütten und mannigfaltigen Gewerben zur Producirung von Gegenständen des Luxus und des feinern Lebensgenusses alljährlich frühzeitig ihren Tod finden. Aber gegenseitig werden auch durch die höhere Cultur die Mittel zur Erhaltung und zur Abwehrung der Feindseligkeiten des Lebens erhöht, so zu allen Zeiten und auf allen Stadien der Cultur starb und sterbt bei weitem der größere Theil der Generation vor dem Ziele, das nur mit Berücksichtigung der Möglichkeit für Einzelne unter gegebenen Verhältnissen, in welche nie alle gleichmäßig kommen können, als das natürliche und also normale Lebensende bestimmt ist. Mehr ist es Naturbestimmung und gehört zur Erhaltung des Ganzen als Geschlechtes, daß der größere Theil der zugleich auf der Erde lebenden Menschen noch in den Jahren der Kraft wieder von dem Hauptlag abtritt, und der Alten und Abgelebten verhältnißmäßig immer nur eine geringe Zahl zugleich auf der Erde zurückbleibt. Denn nicht nur im offenen, sondern auch in dem unaufhörlich kleinen und steten Kriege, in dem und durch den Staaten und Völkern, und in allen Arten von Menschenvereinen ihren innern Bestand haben, weil immer wieder neue Thätigkeit und neue Kräfte aufregt, gilt der beste Satz: daß wo das Leben nicht eingesetzt wird, auch das Leben nicht gewonnen werden kann. (H.)

*Culus*, i. q. Anus, s. After.

Vom Griechischen Worte ουλος, doch hauptsächlich nur von Dichtern gebraucht. Martial. epigr. 3. v. 98 u. epigr. 9. v. 58. Catulli carm. 3. v. 19.

*mealis sutura*, *Cuneatio*, i. q. Sphenosis.

*cuneiforme os*, s. Sphenoidalknochen. — *carpi*, s. Handknochen, ingl. Triangulärer Knochen des Carpus.

*cuneiformia ossa tarsi*, s. Sphenoidische Knochen des Tarsus.

*Cuneiformis* e, keilförmig, gebräuchlich in den nächst vorher und nachfolgenden Zusammensetzungen.

*Cuneiformis apex capituli costae*, f. Keilförmige Spitze des Köpfchens der Rippen.

*Cuniculi* <sup>1</sup> *uteri*, f. Venen des geschwängerten Uterus.

<sup>1</sup>) eigentlich unterirdische Gänge.

*Cunus*, i. q. Vulva, ingl. Vagina.

*Cupedo*, *Cupido* *Cupientia*, *Cuppedo*, f. Begierde.

*Cuprei anthropolithi mineralisati*, f. Kupferhaltige Menschenkörper.

*Cupula infundibuli cochleae*, f. Kuppel des Infundibulums der Cochlea.

*Cura*, f. Sorge.

*Curiositas*, f. Neugierde.

*Cursus*, f. Laufen. — *anatomicus*, f. Anatomischer Cursus.

*Curvator coccygis*, f. Sacrococcygeus, ingleichen Spino-coccygeus.

*Curvatura sigmoidea coli*, f. S-förmige Beugung des Darms. — *ventriculi inferior*, *major*, *minor*, *superior* Curvaturen des Magens.

*Curvaturae carotidis cerebialis*, f. Flexuren der Cerebralcarteren.

*Curvaturen des Magens*, (*Curvaturae* <sup>1</sup> *ventriculi*) Krümmungen <sup>2</sup>, oder Bogen <sup>3</sup>, oder Ränder <sup>4</sup> des Magens Krümmungen <sup>5</sup>, (*Arcus* <sup>6</sup> *ventriculi*), die zwei an dem Magen unterschiedenen, einander entgegengesetzten schmälern, die vordere und hintere Fläche verbindenden bogenförmig gekrümmten Theile des Magens, wovon a) die kleinere <sup>7</sup>, oder *curvatura* <sup>8</sup>, (*minor* <sup>9</sup>, s. *superior* <sup>10</sup>, *Arcus concavus* <sup>11</sup>), in connection mit der hinteren Fläche der Leber in sich aufnimmt, b) die größere <sup>12</sup>, oder untere <sup>13</sup>, (*major* <sup>14</sup>, s. *inferior* <sup>15</sup>, *Arcus convexus* <sup>16</sup>), aber in convexer Krümmung dem Colon zugekehrt ist. *Magens*.

<sup>1</sup>) nach Winslow (exp. anat. lat. vers. T. III. tr. de abdom. §. 45. 2) Mayer's Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 360. 5) Walsby's Anat. übers. v. Huth, 2. Th. S. 48.

<sup>6</sup>) Winslow exp. etc. 7) — 16) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D.

*Cuspidata extremitas pancreatis*, f. Spitze des Pankreas.

*Cuspidati dentes*, f. Eckzähne.

*Cuspis* <sup>1</sup> *coleata*, i. q. Penis. — *cordis*, f. Spitze des Herzens.

<sup>1</sup>) im eigentlichen Sinne eine Spitze.

*Custodes virginittatis* <sup>1</sup>, f. Abductoren des Schenkels.

<sup>1</sup>) beim weiblichen Geschlecht, doch mehr in scherzhaftem Sinne.

*Custodia virginittatis*, i. q. Hymen.

*Cutanea absorptio*, f. Hautabsorption. — *appendix nasarium*, f. Häutiger Anhang der Nasenscheidewand. — *exhalatio*, f. Hautexhalation.

*Cutanae glandulae*, f. Talgdrüsen der Haut. — *papillae*, f. Papillen der Haut. — *venae*, f. Hautvenen.

*Cutanei nervi brachii*, f. Cutannerven des Arms. — *cruris*, f. Subcutannerven des Halses.



ferschenfels. — — *femoris*, f. Cutannerven des Oberschenfels.  
 — — *nasales*, f. unter Nasalnerven. — — *natum*, f. Cutan-  
 nen des Hintern. — — *temporales*, f. unter Temporalner-  
 — — *volae manus*, f. Cutannerven der Hohlhand.

*Cutaneo-anastomoticus adscendens nervus colli*, f. unter  
 Subcutannerven des Halses. — *superciliaris musculus*, i. q.  
 rugator superciliorum.

*Cutaneum ligamentum ossis coccygei*, f. Cutanligament der  
 Coccyfnochen. — *ostium urethrae*, f. unter Oſtien der Urethra,  
 röhre. — *rete*, f. Malpighiſcher Schleim. — *systema*, f.  
 Nervenſystem.

*Cutaneus musculus carpi*, f. unter Palmar-muskeln, den Kur-  
 — — *colli*, i. q. Platysmamyoides. — *nervus antila-*  
*gens colli*, f. unter Subcutannerven des Halses. — — *bra-*  
*chialis externus*, f. Äußerer Hautnerv des Arms. — — — *internus*,  
*brachialis*, f. unter Cutannerven des Arms. — — *cervicis*, *hu-*  
*meri*, *claviculae et colli communis*, f. unter Subcutannerven  
 des Halses. — — *colli descendens*, *inferior*, *medius*, *supe-*  
*rior*, f. unter Subcutannerven des Halses. — — *cruralis an-*  
*terior et exterior*, f. Äußerer Hautnerv des Schenkels. —  
*cruris posterior*, *interior*, *externus primus*, s. *sura-*  
*lis*, f. unter Cutannerven des Unterschenfels. — — *dorsi pedis*  
*anterior*, f. unter Cutannerven des Unterschenfels. — — *faciei*  
*anterioris*, f. unter Subcutannerven des Halses. — — *femoris*,  
*anterior*, *brevis*, *externus*, *inferior*, *internus*, *medius*, *mi-*  
*dius*, *posterior*, *superior*, f. Cutannerven des Oberschenfels. —  
*gluteus inferior*, f. unter Cutannerven des Oberschenfels, die  
 vorn, außen und hinten. — — *genu posterior*, f. unter Cu-  
 nerven des Oberschenfels, die oben und hinten. — — *humeri*  
*externus superior*, f. unter Cutannerven des Arms, äußerer und  
 oberer Hautnerv des Oberarms. — — *lateralis faciei*, f. unter  
 Facialnerven. — — *longus posterior cruris*, s. *tibiae*, f. un-  
 ter Cutannerven des Unterschenfels. — — *longus volae manus*,  
 f. unter Cutannerven der Hohlhand. — — *maxillae inferioris*  
*anterior*, f. unter Facialnerven. — — *nasalis inferior*, *me-*  
*dius*, *superior*, f. unter Nasalnerven. — — *natum inferior*,  
*brachialis superior*, f. Cutannerven des Hintern. — — *labii in-*  
*ferioris et superioris*, s. *labiorum*, f. Coronariſche Lippenarte-  
 ren. — — *peroneus*, f. unter Cutannerven des peroneiſchen Ner-  
 — — *sublaryngeus*, f. unter Subcutannerven des Halses.  
 — *subsuralis externus superior*, *inferior*, *internus supe-*  
*rior*, *inferior*, f. unter Cutannerven des Unterschenfels. — —  
*temporalis anterior primus*, *secundus et tertius posterior*,  
 f. unter Temporalnerven. — — *tragi*, f. Cutannerv des Tragus.  
*sphincter ani*, f. unter Sphincteren den innern, ingl. auch äu-  
 ßern Sphincter.

Cutanligament der Coccyfnochen, (*Cutaneum ligamentum*  
*os coccygis*'), Hautband am Steißbeine<sup>2</sup>, oder des Steiß-

Winslow exp. anat. lat. v. T. III. tr. de abdom. S. 181.

2) Weibrecht's Synonymol. in Ausg. Straßb. 1779, S. 249.

beins<sup>3</sup>. Unter diesem Nahmen wird einer faserigen runden Vergerung gedacht, welche, (jedoch nicht immer,) von der Spitze des ten Coccyrknöchens gegen den After herabsteigt, in der Haut um Seiten der Mündung des Afters verschwindet und besonders den tern Muskelfasern des äußern Sphincters des Afters zum Ansatze d. S. unter Aftermuskeln, äußerer Schließmuskel des- ters.

3) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1733, 3. Th. S. 496.

**Cutannerv des Tragus**, (Cutaneus nervus tragi<sup>1</sup>), Hautnerv des Bocks<sup>2</sup>, der vordere Auricularnerv, oder auch der Hauptast desselben, der sich in die Haut des Tragus verbro- Vgl. Auricularnerven.

1) 2) Loderi tab. anat. u. Deutscher Text, Taf. 160. Nr. 368.

**Cutannerven der Hohlhand**, (Cutanei nervi volae manus), Als solche werden besonders, a) der lange Hautnerv der rechten Hand<sup>1</sup>, (N. cutaneus longus volae manus<sup>2</sup>), der durch seine Länge sich auszeichnende, vom oberflächlichen Ast des Medianerven entspringende unterschieden, b) als Hautnerv der linken Hand<sup>3</sup> aber auch der vordere bis zur flachen Hand sich streckende Ast des innern Cutannerven des Arms bezeichnet. S. ter Brachialnervenplexus, Medianernv.

1) — 3) Maner's Besch. d. menschl. K. 8. B. S. 280, 281 u. 300.

**Cutannerven des Arms**, (Cutanei nervi brachii,) Hautnerven des Arms.) Als solche werden unterschieden: a) der größere Hautnerv des Arms, (vgl. diesen Artikel,) auch Hautmuskelnerv des Arms<sup>1</sup>, dessen oberflächlicher Hautast insbeson- dere obigen Nahmen verdient, b) die innern Hautnerven des Arms<sup>2</sup>, (N. cutanei interni brachii<sup>3</sup>), dergleichen von neuern Anatomen<sup>4</sup> wieder zwei unterschieden werden, α) der mittlere Cutan- oder Hautnerv<sup>5</sup> des Arms, (N. cutaneus medius brachii<sup>6</sup>), der innere Hautnerv der ältern Anatomen<sup>7</sup>, β) der innerer Hautnerv des Arms<sup>8</sup>, (N. cutaneus internus longus brachii<sup>9</sup>, N. cutaneus brachii<sup>10</sup>, s. cutaneus internus<sup>11</sup>, s. subcutaneus basilicus<sup>12</sup>), der aus dem achten Cervicalnerven und dem ersten Dorsalnerven seinen Ursprung nimmt, sich mannigfaltig in der Haut des Oberarms und Vorderarms, namentlich an der Ulnarseite des letztern, ingleichen auf dem Rückenf der Hand verzweigt, β) der innere Cutan- oder Hautnerv des kleiner innerer<sup>13</sup>, oder Kürzer innerer<sup>14</sup> Hautnerv des Arms, (N. cutaneus internus minor<sup>15</sup>, brachii, s. cutaneus ulnaris<sup>16</sup>), der gewöhnlich aus dem Ulnarnerven entspringt, vorzüglich die innere Haut des Oberarms mit Zweigen versorgt, c) der äußere und mittlere Hautnerv des Arms<sup>17</sup>, (N. cutaneus medius brachii<sup>18</sup>), ein Nervenast des Radialnerven zur Ver-

1) — 3) Maner's Besch. d. menschl. K. 8. B. S. 270 u. 297.

4) Klint (diss. de nerv. brachii, Goett. 1784, c. 5.) 5) — 7) Maner's Besch. u. f. w. S. 297. 8) 9) nach Maner (a. a. D.) 10) Maner anat. of hum. body, p. 242. 11) Duvernoy ouvr. an. T. I. p. 112. 12) (the subcutaneous basilic nerve) nach Monro d. j. (observ. on the nervous system p. 154.) 13) — 16) ebenfalls nach Klint oder nach Wrisberg. S. Maner's Besch. u. f. w. a. a. D. S. 297 u. 300. Not. 21. 17) 18) Maner's Besch. u. f. w. a. a. D. S. 309, 318, 290.



hintern Theils des Oberarms, d) der äußere und obere Hautnerv des Oberarms<sup>19</sup>, (N. cutaneus humeri exterior<sup>20</sup> superior,) einer der größern Zweige des Axillarnerven, der an der äußern Seite des Oberarms in der Haut sich verbreitet, e) der unbeständige Hautast, (N. subcutaneus cubitalis<sup>21</sup>), aus dem Ulnarnerven unter dem Ellbogengelenk zur Haut des Vorderarms gelangt, f) der als Hautnerv des Ellbogens<sup>22</sup> unter dem Ellbogen hindere kleinere Ast des mittlern Cutannerven. S. Brachialnervenplexus.

(19) — (22) S. Note 17) 18)

Cutannerven des Hintern, (Cutanei nervi natium,) Hautnerven des Gesäßes. Als solche werden ein oberer<sup>1</sup>, mittler<sup>2</sup> und unterer<sup>3</sup>, (superior<sup>4</sup>, medius<sup>5</sup>, inferior<sup>6</sup>), unterschieden, die von dem Ursprunge des ischiadischen Nerven aus in die Haut des Hintern sich verfolgen lassen. S. Ischiadischer Nervenplexus.

— 6) Eoder's anat. Tafeln, und lat. Text, Taf. 164. Fig. 2. Nr. 40. 46 u. 47.

Cutannerven des Oberschenkels, (Cutanei nervi femoris,) Hautnerven des Oberschenkels. Als solche werden unterschieden:

a) der obere äußere und vordere<sup>1</sup>, (N. anterior, superior et exterior<sup>2</sup>), aus dem zweiten und dritten Lumbarnerven, bis zum Knie herab in der Haut des Oberschenkels sich vertheilt, b) der untere äußere und vordere<sup>3</sup>, (N. externus anterior et inferior<sup>4</sup>), der von der äußern Seite des Cruralnerven hergehend, dann in der Haut der äußern Seite des Oberschenkels und des obern Theils des Unterschenkels sich verzweigt, c) der obere innere und obere<sup>5</sup>, (N. internus anterior et superior<sup>6</sup>, s. brevis et minor<sup>7</sup>), der von der innern Seite des Cruralnerven aus, an der Haut des Schenkels auf der innern Seite, bis zum Knie herab sich verzweigt, d) der mittlere<sup>8</sup>, (N. medius<sup>9</sup>), ebenfalls aus dem Cruralnerven, der in der Mitte des Oberschenkels auf seiner vordern Fläche zur Haut gelangt, und bis zum Knie herab sich vertheilt, e) der vordere<sup>10</sup>, (N. anterior<sup>11</sup>), der unter dem Poupartschen Ligamente, vorwärts vom Cruralnerven zur Haut des Oberschenkels tritt und nach innen zu zum Knie verläuft, f) der lange oder innere vordere<sup>12</sup>, (N. longus, internus et anterior pedis<sup>13</sup>, N. saphenus<sup>14</sup>), der als der letzte Zweig des Cruralnerven von der innern Seite desselben, unter dem Poupartschen Ligamente, neben dem Sartorius, bis zum Knie hergeht, und dann neben der saphenischen Vene bis zum Fuß geht, und an der innern Seite der großen Zehe sich endigt, g) die hintern und hintern<sup>15</sup>, (N. posteriores et superiores<sup>16</sup>), aus dem ischiadischen Nervenplexus und zwar α) der äußere oder große hintere und obere<sup>17</sup>, auch Hautnerv des Knies<sup>18</sup>, (N. cutaneus anterior superior major, s. externus femoris<sup>19</sup>, N. cutaneus anterior genu<sup>20</sup>), der sich im hintern und äußern Theil der Haut des Oberschenkels bis unter das Knie herab verbreitet, β) der innere oder kleinere obere und hintere<sup>21</sup>, (N. posterior superior

— 21) Meier's Besch. d. menschl. K. 8. B. S. 88, 328 — 335, 348 — 350, 360.

rior minor, s. internus <sup>22</sup>), der nach innen sich am Gefäß am hintern und innern Theil der Haut des Oberschenkels bis zur Mitte desselben herab verbreitet; anstatt beider ist auch nur Ein Nerv vorhanden, der dann als hinterer und oberer Hautnerv <sup>23</sup>, oder auch als unterer Hautnerv des Oberschenkels <sup>24</sup>, (N. cutaneus posterior superior femoris <sup>25</sup>, s. cutaneus glutaeus inferior <sup>26</sup>), bezeichnet wird, h) zwei untere vordere und hintere <sup>27</sup>, (N. posteriores inferiores et externi Zweige des ischiadischen Nerven), die zwischen der Mitte des Oberschenkels und der Kniekehle von ihm abgehen, und sich im hintern und fernern Theil der Haut des Oberschenkels, wie auch am Unterschenkel bis zum Fuß herab vertheilen, an deren Statt aber auch wohl nur Ein Nerv vorkommt, i) der hintere, innere und untere <sup>29</sup>, (N. posterior inferior et internus <sup>30</sup>), ebenfalls ein Zweig des ischiadischen Nerven, der sich von der innern Seite des Knies an bis unter die Wade verbreitet. S. Lumbarnerven, Cruralnerven, Ischiadischer Nerv.

22) — 30) S. Note 1) — 21)

**Cutannerven des peroneischen Nerven**, s. unter Cutannerven des Unterschenkels.

**Cutannerven des Unterschenkels**, (Cutanei nervi cruris) Hautnerven des Unterschenkels. Unter diesen werden besonders unterschieden: a) der lange hintere <sup>1</sup>, (N. cutaneus longus posterior cruris <sup>2</sup>, s. tibiae <sup>3</sup>), ein Ast des popliteischen, oder des peroneischen Nerven, der vorzüglich die hintere Haut der Wade in der Gegend des äußern Knöchels mit Zweigen versieht, b) die Cutannerven des peroneischen Nerven, α) den eigentlichen peroneischen Cutannerven, (N. peroneus cutaneus <sup>4</sup>), äußerer Hautnerv des Unterschenkels <sup>5</sup>, Wadenbeinnerv <sup>6</sup>, Wadenhautnerv, (N. cutaneus posterior cruris), der als ein kleiner Ast vom peroneischen Nerven an der äußern Seite der Wade zwischen der Vene zum Fußrücken herabsteigt, dessen oberer Theil auch als besonderer Rahmen Aeußerer Verbindungs-nerv der Wade (N. communicans peroneus <sup>7</sup>), so wie dessen unterer Theil als Erster hinterer, äußerer und unterer Hautnerv des Unterschenkels <sup>10</sup>, oder Wadenerv <sup>11</sup>, (N. cutaneus posterior, inferior, externus primus <sup>12</sup>, s. suralis <sup>13</sup>), führt, dessen fernere Ramificationen auch als oberer <sup>14</sup> und unterer äußerer <sup>16</sup> und innerer <sup>17</sup> Wadenhautnerv, (N. cutaneus subsuralis externus superior <sup>18</sup> et inferior <sup>19</sup>, internus superior et inferior <sup>21</sup>), unterschieden werden, β) den vordern Hautnerven des Fußes <sup>22</sup>, (N. cutaneus dorsii pedis anterior <sup>23</sup>, pedalis cutaneus <sup>24</sup>), γ) Vorderer äußerer Wadenbeinnerv <sup>25</sup>, Oberflächlicher Wadenbeinnerv <sup>26</sup>, (N. peroneus anterior externus <sup>27</sup>, s. peroneus superficialis <sup>28</sup>), der zwei

1) 2) Maner's Besch. d. menschl. N. 8. B. S. 364. 3) unschärflich ebendaf. S. 365, Note. 4) — 7) Maner's Besch. u. f. w. a. S. 381. 8) — 13) nach Fische (desc. anat. nerv. lumbal. sac. extremit. inferiorum tab. 3. Vgl. Maner's Besch. u. f. w. a. 14) — 21) ebenfalls nach Fische. Vgl. Eoder's anat. Tafeln u. lat. Taf. 174, Nr. 42, 104, 108 u. 111. 22) Maner's Besch. u. f. a. D. S. 383. 23) 24) nach Martin (inst. nevrol. s. 2. p. 25) — 27) Maner's Besch. u. f. w. a. a. D. 28) nach Fische (a. D.



langen und kurzen peroneischen Muskel aus dem peroneischen Nerven entspringt, und vor dem äußern Knöchel zu dem Fußrücken verläuft. S. Ischiadischer Nerv.

*Cuticula*, Diminutiv von *Cutis*, s. Epidermis.

*Cuticulares carunculae vulvae*, s. Schamlefzen.

*Cuticularis membrana*, s. *tunica cerebri*, s. Harte Hirnhaut.

— *vesicae*, s. unter Häute der Harnblase, innere Haut. —

*cutis oesophagi*, s. unter Oesophagushäute, inwendige Haut.

*Cuticulosus musculus ani*, s. unter Sphincteren des Mastdarms, äußern.

*Cutis*, s. Haut, ingeleichen *Corium*. — *anserina*, s. Gänse-

— *callosa*, s. Callöse Haut. — *extima*, i. q. Epider-

— *musculosa*, s. Fleischhaut. — *rugata*, s. *ruginosa*,

*rugosa*, s. Runzelichte Haut. — *summa*, i. q. Epidermis.

*Cyathus*, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte <sup>1</sup>, s. In-

trabulum des Gehirns.

*κυαδος*, ein Becher.

*Cybitos*, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wor-

tes, i. q. Cubitus.

*κυβίτος*.

*Cyboideus* <sup>1</sup> *os*, s. Cuboideischer Knochen des Tarsus.

*κυβοειδής*, cubiformis.

*Cyclophoria sanguinis*, nach Griechischen Worten gebildete<sup>1</sup> Be-

zeichnung von Circulation des Bluts. S. Blutcirculation.

von *κυκλος*, circulos, und *φέρω*, fero.

*Cyclopion*, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wor-

tes, daß Weiße im Auge.

*κυκλωπιον*. (Aristotel. de hist. animal. l. 4. c. 8.)

*Cyclus* <sup>1</sup>, (*Cyclus* <sup>2</sup>), ein Kreis, besonders auch eine Zeitreihe, nach

Ablauf gewisse Vorgänge in der Zeit regelmäßig wiederkehren.

Zeit.

<sup>2</sup>) entsprechend dem Griechischen Worte *κυκλος*. Vgl. Cicero, de nat.

deor. l. 2. c. 18.

*Cyema*, in Uebertragung des gleichen Griechischen Wortes <sup>1</sup>, i. q.

ceptus. S. Ci.

*κυεμα*.

*Cylindrus*, s. unter Cylindrische Bildung.

*Cylindracea formatio*, s. Cylindrische Bildung. — *ossa*, s.

Cylindrische Knochen.

*Cylindri intestinorum*, s. Willen der Därme. — *membrana-*

*renum*, s. Becher der Nieren.

*Cylindrica formatio*, s. Cylindrische Bildung.

*Cylindrische Bildung*, (*Cylindracea*, s. *Cylindrica for-*

*matio*), Walzenförmige, oder Röhrenartige Bildung, die

mathematischen Form eines Cylinders, (*Cylindrus*), oder eines

Kegels, der von zwei gleichen und parallelen Kreisen als Grundflä-

chen und einer einzigen krummen Seitenfläche eingeschlossen ist, ent-

stehende Bildung. S. Körperliche Formen.

*Cylindrische Knochen*, (*Cylindracea* <sup>1</sup>, s. *Cylindrica ossa*),

Walzenförmige Knochen <sup>2</sup>, Röhrenknochen <sup>3</sup>, Weintröhren, (*Ossa*

— 3) Eoder's anat. Handb. 1. B. S. 8.

292 Cylindrische Röhre d. Nebenh. Cystico-hepatische Gänge longa<sup>4)</sup> röhrenförmig gebildete, am Ende meist dickere Knochenbeinen überhaupt die Länge die Breite bedeutend übertrifft. Knochen.

4) Walter's Abhandl. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 25.

Cylindrische Röhre des Nebenhoden, s. Canal der Epididymis. *Cylindrus*, s. unter Cylindrische Bildung. — *Höllern*, Gubernaculum des Hoden.

*Cymbalaris*<sup>1</sup> *cartilago*, s. Cricoideischer Knorpel.

1) cymbelartig, von *Cymbalum*, Cymbel.

*Cymbiforme*<sup>1</sup> *os*, i. q. *Scaphoideum os tarsi*.

1) nachenförmig, von *cymba*, Nachen.

*Cynodesmion*, in Uebersetzung des gleichen Griechischen Wortes<sup>1</sup>, i. q. *Frenulum praeputii*.

1) *κυνodesμιον*, nach Pollux (onomast. in Stephani dict. med. 1564, p. 600) i. q. *κυνος*, Hund, und *οδους*, Zahn, gebildet, dem ent-

*Cynodontes*, d. h. *zähne*, s. Eckzähne.

1) *κυνodontes* von *κυνων*, Hund, und *οδους*, Zahn, gebildet, dem ent- dieselben auch im Lateinischen als *dentis canini*, und im Deutschen als Eckzähne unterschieden werden. (Galen de ossib. c. 4.)

*Cynolopha*, *Cynolophi*, d. h. *Spinöse Proce-* Wirbel.

1) *κυνολοφα*, *κυνολοφι*. S. Pollux. onomast. in Stephani dict. med. 1564, p. 600. Inl. Alex. Benedicti de hist. part. hum. c. 1. et l. 5. c. 24.

*Cyphoria*, d. h. *die Zeit des Schwangerseyns*. S. *Schwangerschaft*.

1) *κυφορια*.

*Cyphus*<sup>1</sup> *Diogenianus*, s. *Becher des Diogenes*.

1) vom Griechischen Worte *κυφος*, Krümmung, hohles Gefäß.

*Cypsele*, *Cypselis*, in Uebersetzung der gleichlautenden Griechischen Worte<sup>1</sup>. S. *Dhrenschnalze*.

1) *κυψελη*, *κυψελis*. (Galen de simpl. fac. l. 10.)

*Cysos*, *Cyssaros*, *Cystaros*, d. h. *i. q. Anus*, d. h. *After*.

1) *κυσος*, *κυσσαρος*, *κυσταρος*. Vgl. Foesii occ. Hipp. v. *κυσταρος*.

*Cysthepatica vasa*, *Cysthepatici ductus*, s. *Cystico-hepatische Gänge*.

*Cystica arteria*, s. *Cystische Arterie*. — *bilis*, s. *Galle*. — *fossa*, s. unter *Furchen der Leber*, *Gallenblase*.

— *vena*, s. *Cystische Vene*.

*Cysticae arteriae et venae*, s. *Cystische Arterien und Venen*.

— *glandulae*, s. *Cystische Drüsen*.

*Cystico-hepatische Gänge*, (*Cystico-hepatici ductus*<sup>1</sup>) *Leberblasen*,<sup>2</sup> oder *Blasen der Leber*.

1) nach Parraut, der besonders einen durch seine Größe sich auszeichneten constanten Bildung in diesen entdeckt haben wollte. S. descr. d'un conduit de la bile, in dessen *Essays de physique* T. III. p. 339; früher war derselbe von der Amsterdamer Gesellschaft (coll. priv. An. p. 16 und Blas misc. p. 287) beschrieben worden. Bianchi (hist. tab. 5 et c. 20) unterscheidet nach hypothetischen Ansichten: *ductus hepaticus* und *ductus hepaticocysticus*, indem erstere die Galle aus der Leber in die Gallenblase führen sollen. Uebrigens haben die Schriftsteller der letztern Benennung den Vorzug vor der erstern gegeben. besonders Verheyen c. h. anat. tr. 2. c. 17. 2) Palfy Anat. übers. v. Huth, 2. Th. S. 122. Note, besonders in Verh. des Bianchischen Unterscheidung. S. Note 1.



(Vasa cysthepatica<sup>4</sup>, Ductus hepaticystici<sup>5</sup>, s. hepaticystici<sup>6</sup>, s. jecori-vesiculares<sup>7</sup>, s. Glissoni<sup>8</sup>.) Gefäße oder Gänge, die man beim Rindvieh und andern Thieren von der Leber zur Gallenblase verfolgen kann, und die einen unmittelbaren Uebertritt der Galle zu vermitteln scheinen, dergleichen man aber in menschlichen Leichen in der Regel nicht deutlich darzustellen vermag. S. Leber.

1) S. Note 2. 4) Feuermann's Physiol. 3. Th. S. 768 5) nach Berheyen (a. a. O.) 6) Mager (resp. Loewel) diss. de ductibus hepatico-cysticis, Traj. ad Viad. 1783, in welcher Schrift ein genau beobachteter Fall beschrieben ist, wo in einer Leiche sich einige Zweige der Gallengänge der Leber in den Gallenblasengang öffneten. 7) nach Berheyen (a. a. O.) 8) indem Glisson dergl. (anat. hepat. Lond. 1654, 8.) zuhelfe nach eignen Beobachtungen beschreibt. S. Halleri elem. physiol. T. VI. 23. s. 2. §. 8.

*cysticus canalis*, s. *ductus*, s. *meatus*, f. Cystischer Gang. *cervus*, f. Cystischer Nerv.

*cystis*, entsprechend dem gleichlautenden Griechischen Worte<sup>1</sup>, im Allgemeinen eine Blase, oder blasenförmiges Gefäß, insbesondere auch ohne Beisatz, der dann darunter verstanden wird, die Harnblase, oder auch Gallenblase.

*cystitis*. Vgl. Foessii oec. Hipp. v. κυστις.

*cystis bilis flavae*, s. *Cystis fellea*, f. Gallenblase. — *uraria*, f. Harnblase.

*cystische Arterie*, (*Cystica<sup>1</sup> arteria*.) Gallenblasenarterie<sup>2</sup>, ein Zweig der Leberarterie, die zum Hals der Gallenblase geht und auch zuweilen doppelt ist. Vgl. Gemellen. S. unter hepatische Arterie, Leberarterie.

1) Meubrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. §. 2562. 2) Sommering's Gefäßl. S. 261.

*cystische Arterien und Venen*, (*Cysticae arteriae et venae*.) die Arterien und Venen der Gallenblase überhaupt. Vgl. Gemellen.

Laurentii hist. anat. l. 6. c. 20.

*cystische Drüsen*, (*Cysticae glandulae<sup>1</sup>*.) Als solche werden Schleimdrüsen unterschieden, die man nicht selten auch in der Wand des Halses der Gallenblase findet. S. unter Leber.

Schaarschmidt's adenes. Tabellen, Tab. 5.

*cystische Galle*, (*Cystica bilis<sup>1</sup>*.) Blasengalle<sup>2</sup>, Gallenblasengalle, die in der Gallenblase sich sammelnde Galle, im Gegensatz der hepatischen Galle, welche unmittelbar in ihrer Absonderung, jedoch mit jener vermischt, in das Duodenum sich ergießt, und an Bitterkeit, Zähigkeit und Intensivität nachsteht. S. Galle. Boerhaave prael. acad. Vol. I. § 97. 2) Haller's Grundr. d. Physiol. 2. Aufl. von v. Leveiling, 2. Th. §. 758.

*cystische Vene*, (*Cystica vena<sup>1</sup>*.) Gallenblasenvene<sup>2</sup>, dem Lauf der cystischen Arterie entsprechende Vene, deren gewöhnlich jedoch zwei sind, (vgl. Gemellen,) und deren Endigung in dem rechten Ast der Pfortader, oder auch in dem Stamm derselben ist. S. Pfortader.

2) Loderi tab. anat. und Deutscher Text, Taf. 124. Fig. 1. Nr. 44.

**Cystischer Gang**, (*Cysticus ductus*<sup>1)</sup>, Blasengang<sup>2</sup>, Gallenblasengang<sup>3</sup>, oder canal<sup>4</sup>, Gallenblasengang<sup>5</sup>, canal<sup>6</sup>, oder Gallengang<sup>7</sup> der Gallenblase, Blasenlengang, (*Meatus*<sup>8</sup>, s. *Canalis*<sup>9</sup> *cysticus*, s. *vesiculae bilis*, s. *vesiculae bilis nerveus*,) der durch Verlängerung des Halses der Gallenblase sich bildende, mit dem von der Leber kommenden hepatischen Gange zusammentretende, in den choledochischen, in das Duodenum die Galle leitenden Gang übergehende häutige Canal. Leber.

- 1) Halleri elem. physiol. T. VI. l. 24. s. 2. § 4. 2) Haller's G. d. Physiol. umgearb. von v. Leveiling, 2. Th. §. 754. 3) 4) Winslow anat. Abh. Uebers. Berl. 1753, 3. B. S. 539. 5) Meutaud's Anat. übers. v. Puth, 2. Th. S. 568. 6) Valsgna Anat. übers. v. Puth, 2. Th. S. 122. 7) Mayer's Besch. d. m. R. 4. B. S. 453. 8) Blancardi anat. ref. Lugd. B. 1687, p. 54. 9) Winslow exp. anat. lat. vers. T. IV. tr. de abd. §. 10) Vesalii de h. c. fabr. l. 5. c. 8.

**Cystischer Nerv**, (*Cysticus nervus*<sup>1)</sup>, Gallenblasenerv<sup>2</sup>, ein Ast des hepatischen Nervenplexus, der in der Mucosa der cystischen Arterie verschwindet. S. Intercostalner

- 1) 2) Loderi tab. anat. und Deutscher Text, Taf. 172, Nr. 131.



# D. D.

**D**, der durch nur leichten Anschlag der Zungenspitze an dem Theil des Gaumens sich bildende Consonant der menschlichen Sprache, und in so fern dem **B** analog, daß bei ihm die Zunge be-  
was bei diesem durch die Lippen geschieht. **S. Sprache.**

**Dachdecker** <sup>1</sup>, (**Scandularius** <sup>2</sup>.) Diesen Nahmen <sup>3</sup>, den frühere  
omen dem Quermuskel des Fußes beileigten, weil Dachdecker wie  
Kletterer sich dessen vorzüglich bedienen müssen, findet **Wins-**  
<sup>4</sup> mehr auf den von ihm unterschiedenen großen und kleinen Pa-  
nar anwendbar. **S. Quermuskel des Fußes und Para-**  
**ar.**

**Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1753, 2. B. S. 555.** <sup>2</sup>) **Wins-**  
**ow expos. anat. lat. vers. Vol II. tr. de musc. S. 555.** <sup>3</sup>) Französisch  
**ouvreur a. a. D.** <sup>4</sup>) **a. a. D.**

**dacrygelos**, in Uebertragung des gleichen Griechischen Wortes <sup>1</sup>,  
lensch, der zugleich weint und lacht. **Vgl. Lachen und Weinen.**

**δακρυγελως.** **Jos. Laurent. amalth. onom. p. 237.**

**dacryon**, desgl. <sup>1</sup>, eine Thräne. **S. Thränen.**

**δακρυων.**

**dactyli**, desgl. **f. Finger.**

**δακτυλοι.**

**dactylion**, **Dactylios**, in Uebertragung der gleichlautenden  
hischen Worte <sup>1</sup>, die Mündung des Mastdarms, auch der Mast-  
überhaupt. **Vgl. After, ingleichen Mastdarm.**

**δακτυλιον, δακτυλιος**, eigentlich ein kleiner Ring, in der Bedeutung von  
anus, (**Galenus in prod. l. c. 10**)

**daemon**, **f. unter Dämonen.**

**Dämonen**, (**Daemones** <sup>1</sup>.) Der Glaube der Menschen an Wes-  
welche, selbst körperlos, mit mehrerer oder minderer, aber im-  
übermenschlicher Macht auf zufällig erscheinende Ereignisse, und  
ders auf menschliche Schicksale einzuwirken fähig sind, und un-  
ständen wirklich einwirken, ist vielleicht so alt als das Men-  
geschlecht selbst. Er war und ist unter allen Nationen älterer  
neuerer Zeit gleich verbreitet, und die höhere Cultur eines Volkes  
gewöhnlich nur den Einfluß auf ihn, daß die frühern rohern For-  
unter welchen jene Wesen in der Vorstellung erscheinen, um-  
delt, oder gegen solche aufgegeben werden, die mit der Religion,  
Sitten und den Naturkenntnissen des emporreisenden Volkes in  
Einstimmung stehen, bis auf der höchsten Staffel der Verstandes-  
ärung die Vorstellung von solchen höhern Wesen sich in eine rein  
ische Idee auflöst.

Das sich in der Geschichte der Menschheit allgemein verbreitet fin-  
muß wohl in der menschlichen Natur selbst gegründet seyn. In  
entsprechend dem Griechischen Worte **δαίμονες**. **Vgl. Galeni de usu part.**  
**l. 10. c. 13** und **Hofmanni comm. n. 761**, ferner **Galenus in progn.**  
**lipp. comm. 1. c. 4** et **de consuetud. l. c. 4**, ferner **Tertullian**  
**pol. c. 22.**

dieser Hinsicht hat der Glaube an Geister, die, selbst außer der Kreise der Natur heimathlich, in diese eintreten und auf sie einwirken, auch eine physiologische Seite.

Indem der Mensch sich in seiner geistigen Entwicklung von der Außenwelt unterscheiden gelernt hat, was schon auf den niedrigen Stadien seiner Cultur geschieht, fühlt er sich seiner geistigen Natur nach zwar größtentheils der ihn umgebenden Körper- und Thierwelt überlegen, und macht sie bald, so weit seine Lebensbedürfnisse erheischen, sich unterwürfig; eben so abhängig aber erkennt er auch von den Naturvorgängen um ihn herum. Er steht geistig der Natur so allein da, während er sich körperlich in der Mitte einer unermesslichen Schar anderer Wesen sieht, die ihrer Körperkraft theils über, theils unter ihm stehen. Die Handlungen der Thiere mit denen er sich in Bekanntschaft setzt, besonders derer, die seine nähere Kreise zieht, sind den seinigen in Hinsicht so vielen der Lebensbedürfnisse analog. Er legt ihnen, deren Körpertheile seinen so nahe kommen, daher auch ein geistiges Seyn, eine Seele bei; aber tief unter ihm steht, nach aller äußern Andeutung, jede Thierseele. Ihnen allen ermangelt der Grundcharakter seiner eigenen geistigen Natur, Verstand und Vernunft, wodurch er eben allein die Thierwelt und zugleich auch die Pflanzenwelt sich unterwürfig macht. Gleichwohl ist er selbst nur ein Mittelwesen. Das Gefühl seiner Abhängigkeit, die so häufig völlige Ohnmacht ist, leitet ihn also dahin, zunächst in solchen Naturvorgängen, die er nicht nach seinem Verstand zu leiten vermag, die ihm öfterer Gefahr und Unheil bringen, zum Vortheil gereichen, auch geistige Impulse voraussetzen, um in sich selbst erkannte geistige Natur, Vorstellung, Leidenschaft, &c. wird nun von ihm auch auf jene Naturereignisse übertragen, um sie zu verstehen und sich über sich selbst in und unter ihnen zu verständigen. Die bleibenden Dunkelheiten und Zweifel in dieser Naturverbindung sind nicht, weil der menschliche Geist in Erforschung seiner Verhältnisse zu seinen Umgebungen immer sich beruhigt, wenn er nur über etwas unmittelbar vor oder hinter, über oder unter ihm im Leben sich Klarheit verschafft zu haben glaubt, und nur dann weiter dringt, wenn er durch Reflexion sich selbst über das Leben erhebt, und seinen eigentlichen Lebenskreisen tritt.

Auf den niedrigen Stadien der Cultur bildet sich auf diesem Wege die Religion selbst aus. Jene höhern geistigen Wesen werden Gegenstand der Verehrung, und zu ihnen erhebt sich der Mensch zuerst zu einem dann vertrauend, um sie durch Bitten oder Opfer zu versöhnen oder sich geneigt zu machen. In der fortschreitenden Bildung entwickeln sich auch, nach Verschiedenheit des Volkscharakters, der von Zeit und Ortsverhältnissen abhängig ist, Ideen höherer Wesen, die in verbreiterten Kreisen der Natur, als der Menschen enger beschränkt seyn ausfüllt, frei walten. Hiernach hat sich denn insbesondere der Glaube an solche geistige Mittelwesen zwischen jenen Mächten und den Menschen entfaltet, die jede Nation im Zustande der Rohheit anders bezeichnet und sich phantastisch ausgebildet, aber ihrem Grundcharakter nach alle sich gleich sind.

Das Wort Dämon ist Griechischen Ursprungs. In der Geschie-



Kultur der Griechischen Nation, die vorwaltend Einfluß auf die allgemeine Kultur der neuern Zeit gehabt hat, ist die Dämonenlehre auch jeder Zeit von Wichtigkeit gewesen. Indessen hat sie selbst aber das alte Griechenland nicht ihren ursprünglichen Boden, sondern ist von denjenigen Nationen, von denen die Griechen ihre Mythologie hauptsächlich erhielten, zu ihnen übergegangen. Noch jetzt finden wir die Dämonenlehre in allen Religionen des Orients vorzüglich ausgebildet. Die Hindu zählen außer dem höchsten Wesen, Para, Prama, 300 Götter und eine unaussprechliche Zahl von Götterdienern. Am aller-systematischen ist diese Lehre in dem Chaldäisch-Persischen Zoroastrismus, oder der Religion Zoroasters, entwickelt. Neben einem guten Princip gibt es nach Zoroasters Lehre auch ein böses, dem Reiche des Lichts gegenüber ein Reich der Finsterniß. In jenem Reich steht Ormuzd, der Quell alles Guten, in diesem Ahriman, der Quell alles Bösen, des moralischen wie des physischen. Um den guten Ormuzd's stehen die sieben Amshaspands oder Fürsten des Lichts, unter denen er selbst der erste ist; ihnen sind die Izobds, die Genien von allem, was gut ist, diesen aber wieder die Feends untergeordnet. Den Thron Ahrimans umgeben die sieben bösen Dews, oder Fürsten des Bösen, unter denen wieder eine ähnliche Menge niederer Dews stehen. Die reinen Menschen, Thiere und Gewächse gehören zu Ormuzd's, die unreinen aber Ahriman's Reiche.

Es bleibt unausgemittelt, ob die uralte Dämonenlehre der Aegypten mit der Persisch-Chaldäischen aus einer Quelle geflossen sei, ob sie gleich wahrscheinlich ist. Auch hier war der Kreis des Mondes, der Erde und Luft mit Dämonen angefüllt, und die ganze Natur mit den Menschen selbst ihrer Macht untergeordnet. Im Osiris Typhon war späterhin in der Aegyptischen Religionslehre ein gutes und böses Princip einander entgegengestellt. Die in die Mythen der Aegyptier eingeweihten Griechischen Weltweisen trugen auch wahrscheinlich dort empfangene sublimere Lehre der Dämonen nach Griechenland über, und bildeten sie nach ihren philosophischen Ansichten noch mehr aus. Schon die ältesten Griechischen Dichter reden sich des Wortes Dämonen. In den Homerischen Dichtungen sind dieses die Gottheiten selbst. Hesiodus aber redet von „Unsterblichen rings um den Erdbreis, heiligen Dienern des Zeus, der sterblichen Menschen Behüter, welche die Dohut tragen des Rechts und des schnöden Vergehens, dicht in Nebel gehüllt, ringsum durchwandeln das Erdreich.“ Nach Plutarch unterschied Hesiodus vier Klassen vernünftiger Wesen: Götter, Dämonen, Heroen und Menschen. Auch Aristoteles unterscheidet die Unsterblichen in Götter und Dämonen, die Sterblichen in Heroen und Menschen.

Thales und Pythagoras, Sokrates, Xenophon und Empedokles stellten jeder eine eigne Ansicht von den Dämonen auf. Am merkwürdigsten ist aber Plato's Dämonenlehre<sup>2</sup>. Nach ihm ist „alles Dämonische zwischen Gott und den Sterblichen und die Botschaft, zu verdolmetschen und zu überbringen den Göttern, und von den Menschen, und den Menschen, was von den Göttern kommt, der einen Gebete und Opfer und der andern Befehle. Das ist im Gajimaht.“

Dämonische ist die Ergänzung zwischen Gott und Mensch, damit Ganze in sich selbst verbunden sei; durch dieß Dämonische geht Weissagung und die Kunst der Priester in Bezug auf Opfer, Thungen, Besprechungen, und allerlei Wahrsagung und Bezauberung dieser Umgang und Gespräch der Götter mit den Menschen geschah durch die Dämonen sowohl im Wachen als im Schlaf." Und an andern Orten gedenkt er von ihnen, „sie seien in Luft gekleidet, und wohnen über dem Himmel, schweben über den Sternen, und verwohnen auf der Erde; sie schauen unverhüllt in die Geheimnisse der Zukunft und verwalten sie nach Gefallen; jeder Sterbliche erhalte mit jedem neuen Leben einen eigenthümlichen, der ihn bis an das Ende begleitet und seine Seele zu dem Orte der Reinigung und Strafe führe."

Während die Dämonenlehre so zu den Griechen kam und als Theil der höhern Weisheit der Griechischen Philosophen auf die letzten Jahrhunderte überging, wurden auch die Hebräer mit derselben vertraut. In den ältern geschichtlichen Denkmälern dieser Nation die zugleich einen Theil der Urkunden des christlichen Glaubens bilden, werden schon der Elohim's oder Engel gedacht. Zugleich aber wurde die Theorie der höhern Geister, die über der Menschlichen Geschick walteten, zur Zeit des Babylonischen Exils dieses Wesens ausgebildet. Hier schöpften die Hebräer nämlich unmittelbar aus der Quelle des Chaldäisch-Persischen Magismus. In den neuern Zeiten des alten Testaments ist von guten und bösen Dämonen die Rede; sie werden classificirt und bekommen eigne Nahmen. So gute Dämonen machen den Staatsrath Jehova's aus, und sitzen immer vor seinem Throne<sup>3</sup>. Unter den Seleuciden und Ptolemäern kam diese Nation auch mit Aegypten und den Griechen in lebhaften und dauernderen Verkehr, besonders in Alexandrien, und es stellten sich zu den bisherigen Vorstellungen auch die aus Griechischen Philosophemen entnommenen. Es bildete sich nun die Hellenistische Philosophie der Juden aus. Der Begriff eines Dämons trat bestimmter als der eines bösen und plagenden Geistes hervor. In dieser Periode bildete sich auch der Wahn von der Macht der Dämonen, in den Leib von Menschen und Thieren zu fahren, aus, der sich bis auf die neuesten Zeiten erhalten hat. Die Dämonen erkennen nun in dem allgemeinen Volksglauben als Untergeister eines höhern Plagegeistes, eines obern Princip's alles Bösen; besonders moralischen in der Welt, eines Satans oder Beelzebubs. Die Monomanie, oder Lehre von den Teufelsbesitzungen und teuflischen Krankheiten, liegt als ein pathologischer Gegenstand außer dem Rahmen der gegenwärtigen Erörterung. Aber die Macht des Teufels auf menschliche Gemüth, besonders in Bestimmung seiner moralischen Handlungen, welches Glaubenslehre der aus dem neuern Judentum und dem Neuplatonismus gemeinschaftlich sich bildenden christlichen Dogmatik wurde, würde den Physiologen als ein zweites hinzukommendes Princip der Willensbestimmung des Menschen gelten müssen, nicht die Idee eines Teufels und eines teuflischen Reichs selbst die Wurzel nach in der moralischen Natur des Menschen nachgegraben werden könnte.



Indem nämlich der Mensch, wie in seiner physischen Natur, so auch in seiner moralischen, sich in einem steten Conflict entgegenge-  
 setzter Principe befindet, und in und unter diesem einzig nur das mo-  
 sche wie das physische Leben besteht, unaufhörlich schwankt, zu  
 m Ziele strebt, und doch auch wieder davon abgezogen wird, stehen  
 ) im innersten Bewußtseyn eines jeden Menschen Gut und Böse  
 schroffe Gegensätze einander unaufhörlich gegenüber. Was der ein-  
 e Mensch in seinen Beziehungen zu seinen Mitmenschen, in einer  
 nünstwelt, von der er nur ein Kettenglied ist, als gut anerken-  
 muß, sagt gewöhnlich nicht den Forderungen seines individuellen  
 ens zu. Der Egoismus eines jeden Menschen in jenem morali-  
 en Conflict ist sein eigentlicher böser Dämon, ein Theil seines  
 en nothwendigen Seyns, den er aber in der Vorstellung von sich  
 trennt, und indem er ihm Persönlichkeit verleiht, nun der Ein-  
 ungskraft freies Spiel läßt, um die Einkleidung hinzuzufügen, wie  
 de den Ansichten und den anderweitigen religiösen Ueberzeugungen  
 dem Zeitalter und den Völkern angemessen ist, in und unter denen  
 eigne Böse der individuellen Naturen hinter der Teufelsmaske  
 zu verbergen sucht. (h.)

**Daemonium**, Dämonischer Natur<sup>1</sup>, auch i. q. Daemon.

Cicero. de Divinat. l. 1. c. 54: „Esse divinum quiddam, quod  
 Daemonium (Socrates) appellat.

**Dämonologie**, (*Daemonologia*,) Lehre von Dämo-

**Därme**<sup>1</sup>, Gedärme<sup>2</sup>, (Intestina<sup>3</sup>, Chordae<sup>4</sup>, Entera<sup>5</sup>,  
 ae<sup>6</sup>, Chirae<sup>7</sup>, Hillae<sup>8</sup>, Pandices<sup>9</sup>, Pendices<sup>10</sup>, Fendi-  
<sup>11</sup>), die nach ihrer Lage oder Form von den ältesten Zeiten an  
 rschiedenen, und als so viele besondere Theile betrachteten einzelnen  
 ecken des vom Magen an bis zum After in ununterbrochenem Zu-  
 menhange fortlaufenden Darmcanals, welche wieder in dünne und  
 ee Därme. (Intestina tenuia et crassa,) unterschieden wer-

S. diese Artikel mit ihren Unterabtheilungen. Vgl. auch Darm-

aal.

Haller's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v. Leveking, 2. Th. S. 635.  
 2) Im Singular und im Plural, das Gedärme und die Gedärme. Ambrosii  
 Parat. Vindarjnet, übersetzt v. Liffenbach, Frankfurt. a. M. 1601, 1. Th.  
 S. 118. 3) Cicero. de nat. Deor. l. 2. c. 55: „Reliquiae cibi

depelluntur, tum adstringentibus se intestinis, tum relaxantibus.”

4) entsprechend dem Griechischen Worte *Xogdai*, doch mehr uneigentlich und zu-  
 nächst von Thierdärmen gebraucht, in so fern Salten daraus bereitet werden.

5) Vgl. dleß Wort. 6) — 11) Ueber diese zum Theil corrupte Worte s.

die einzelnen Artikel, überhaupt aber v. der Linden sel. med. ex. 9. 53 — 58.

**Damm**, f. Perinäum.

**Damm der Venenvalveln**<sup>1</sup>, (Agger valvularum venarum<sup>2</sup>,)

Grundfläche der Venenklappen, in welcher sie wie ein Stück vom  
 gen eines Cirkels aus der Vene hervorgehen. S. Venen.

Haller's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v. Leveking, 1. Th. S. 57.

2) nach Morgagni (epist. anat. 15. n. 39.)

**Dammarterie**, f. Perinäumarterie.

**Dammerde**<sup>1</sup>, (Humus<sup>2</sup>,) der Rest aller organischen Stoffe,

den diejenige freiwillige, aber langsame Zersetzung, die wir Zer-

2) Gren's Handb. d. Chemie, 2. Aufl. 2. Th. S. 1374 u. 2036.

wesung nennen, übrig läßt. Die schnelle Fäulniß liefert andere Producte; durch sie treten die Körperelemente, unterstützt durch die Wirkung und die Bestandtheile der Luft, durch dabei nöthiges Wasser und Wärme, größtentheils zu Stoffen zusammen, die sich in Luft und Dunstgestalt verflüchtigen, so daß wenig übrig bleibt. Die Verwesung hingegen hat nicht nur einen langsamern Gang, sondern auch weniger luftförmige, dafür mehr feste Producte, die als Dampferde, von branner bis ins Schwarze ziehender Farbe und einer gewissen Auflöslichkeit im Wasser, übrig bleiben. Es fällt in die Augen, daß der Humus verschieden seyn müsse, nach den Organismen, ihn liefern; Pflanzen müssen einen andern als Thiere geben, in diese durch ihren großen Gehalt an Stickstoff, Schwefel, Phosphor sich sehr von jenen unterscheiden.

Chemisch nimmt man aber zwei Classen von Humus an, welche sich durch ihr neutrales oder saures Verhalten auszeichnen. Der saure Humus ist im Wasser auflöslich, gleich einem Extractstoffe; saugt, der Atmosphäre ausgesetzt, Sauerstoff ein, wodurch seine Auflöslichkeit verliert<sup>3</sup>; er enthält mehrere Salze, die Phosphor-, Schwefel- Salpetersäure zur Basis haben, als welche während der Verwesung aus ihren Grundlagen erst bildeten und den vorrätigen Alkalien und Erden zusammentreten. Der saure Humus<sup>4</sup> ist im Sumpf- und Moorlande anzutreffen, enthält freie Phosphor- und Phosphorsäure, welche ihn fest anhängen und ihn an Luft nicht, gleich jenem, unlöslich werden lassen. Nehmen wir Salze und Säuren als außerwesentliche Beimischungen an, so ist eigentliche Humus ein Gemisch aus Kohle, Wasserstoff und auch Stickstoff. Saurssure<sup>5</sup> zerlegte Humus aus Eichenholz durch trockne Destillation in gekohltes Wasserstoffgas, in Kohlensäure, in Wasser, in Ammonium, in schwarzes Oehl und Kohle. Er ist nebst dem Wasser das Hauptnahrungsmittel aller Vegetabilien, welche ihn durch Capillarsystem ihrer Wurzeln aufnehmen und assimiliren. (Fäulniß.)

3) nach Crome in Hermstädt's Archiv d. Agriculturchemie IV. 4)

Einhof (in Hermstädt's Archiv der Agriculturchemie. III u. IV.)

Recherches chimiques sur la végétation, Paris 1804.

**Dammuskeln**, s. Quermuskeln des Perinäums. — **venöse Perinäumvene**.

**Dampf**, Dunst, (Vapor<sup>1</sup>.) Jeder flüchtige, liquide oder gasförmige Körper, wenn er in den Zustand der Verdunstung geräth, hat dann seine Form so weit verändert, daß er an Elasticität, Ausdehnung und Durchsichtigkeit dem permanent elastischen ähnlich wird. Erhielt er diese luftförmige Form durch starke Einwirkung der Wärme, so legt man ihm den Namen Dampf bei; Dunst hingegen, wenn der Vorgang durch Sonnenwärme oder Lufttrockenheit langsam geschieht. Dampf ist also anzusehen als ein durch die Repulsivkraft der genommenen Wärme luftförmig gewordener Körper. Jeder äußerliche mechanische Druck, welcher jene Repulsivkraft überwiegt, so auch, der kältere Körper, welcher ihm die anhängende Wärme entzieht, bewirkt den Dampf in seine frühere Form zurück. Durch diese letz-

1) Cicéron, de nat. Deor. l. 2 c. 10.



Bildung der Wärme unterscheidet sich der Dampf von der permanenten Luft; in beiden nehmen wir die Wärme, als fortleitende Flüssigkeit, für die Ursache der Elasticität und Ausdehnung; sie ist aber dem Dampfe mit seiner Grundlage durch seine so starke Affinität, als der Luft vereinigt. Luft bleibt unter jedem Drucke und jeder Temperatur elastisch; dem Dampfe hingegen kommt diese Form nur beziehungsweise zu. Wird z. B. Wasser durch angebrachte Wärme, (Sieden,) oder Sonnenwärme und Lufttrockenheit in Dampf verwandelt; so erscheint dasselbe als luftförmige Flüssigkeit von 1720 Mal größerem Umfange, die von der atmosphärischen Luft nicht zu unterscheiden ist, und sich mit ihr vermischt, auch so lange ihr gleich bleibt, die Schwere der überstehenden, drückenden Luftsäule oder ihre Kälte dem Wasserdunst die anhängende Wärme entzieht, und denselben in die liquide Form zurückführt; hier erscheint es in Gestalt zusammenhängender Bläschen<sup>2</sup>, als Wolken, die noch von der Luft getragen werden, oder als herabfallendes atmosphärisches Wasser, als Regen, Thau, Schnee, Hagel, Reif. Das Freiwerden der Wärme bei der Zersetzung des Dampfes läßt sich an der zum Heizen bestimmten Dampfmaschine bemerken, wo kaltes Wasser durch zugeführten Wasserdampf schnell in den Zustand des Siedens geräth.

Der in der Atmosphäre befindliche Dampf eines Körpers muß da, um Dampf zu bleiben, ihrem Drucke mit einer gleichen oder kleineren Elasticität begegnen. Diese kann mit der Zusammendrückung vermehrt werden<sup>3</sup>, wie die Dampfmaschinen erläutern, welche zur Bewegung großer Lasten bestimmt sind.

Im großen Laboratorium der Natur gehen Bildungen und Zersetzungen von Dämpfen immerwährend vor sich. Wie schon gesagt, erhebt sich alles Wasser, was aus der Atmosphäre niederschlägt zuvor als Dunst aus den Wasserhältern der Erde, so daß, wenn die jährliche Verdunstung 30 Zoll beträgt, und die Wasseroberfläche der Erde 100,000 Quadratmeilen angenommen wird, sich von ihr jährlich 100,000 Cubikmeilen Wasser als Dunst erheben, und die Atmosphäre als ein großes Magazin aller dieser Dunstumwandlungen anzusehen ist. Sie muß aber noch eine Menge Dünste andrer Körper enthalten, deren dunstförmiges Vorkommen sonst kaum geahndet wird, wovon aber diejenigen atmosphärischen Niederschläge überzeugen, welche Schwefelregen, Sandregen, Blutregen, Feuerkugeln und Meteorsteine vorkommen.

Die Thierwelt liefert hierzu einen bedeutenden Zufluß. Durch jedes Ausathmen wird dunstförmiges Wasser in die Atmosphäre gebracht, welches bei kalter Temperatur als verdichteter Hauch sichtbar erscheint. Die Haut bereichert durch ihr der Lunge ähnliches Geschäft<sup>4</sup> den Luftkreis mit andern Dünsten, denen Wasser wahrscheinlich zum Mittel dient, welche aber außerdem noch öhlige und saure Bestandtheile haben<sup>5</sup>. Endlich sind noch die ätherischen und betäubenden

1) Vgl. Saussure *essai sur l'hygrométrie*, Neuch. 1783. 3) Vgl. *Mémoire sur la force expansive de la vapeur de l'eau*, à Paris 1792. 4)

5) Vgl. *Rapports de l'air, avec les êtres organisés tirés des journaux d'observations d'expériences de L. Spallanzani* p. J. Senebier, Genève 1807, 8. 5) Nach Thénard's Untersuchung des Schweißes im *Ann. de Chimie*, T. LIX. p. 262.

Ausflüsse der Pflanzen zu erwähnen, welche sich zwar in vielen Stellen verdichtet, nicht darstellen lassen, deren körperliche Natur aber zunehmen und die Analogie genugsam berechtigt. . . . (Ricinus  
 6) Boyle exerc. de mira subtilitate effluviatorum, in dessen Oper. Genev. 17.

**Dankbarkeit, Dankgefühl, Erkenntlichkeit.** Dankbarkeit, als Gefühl, ist das Vergnügen über empfangene Wohlthaten verbunden mit dem Gefühle der Abhängigkeit und der wohlwollenen Neigung zu vergelten. Sie ist mithin ein gemischtes Gefühl, aus angenehmen Gefühle des Vergnügens und Wohlwollens, und dem unangenehmen Gefühle der Abhängigkeit zusammengesetzt, und mit dem Vergnügen verbunden, dem Wohlthäter zu vergelten. Die Grundzüge der Dankbarkeit, so wie eines jeden gemischten Gefühls, sind Vergnügen und Schmerz, Begehren und Verabscheuen; denn diese letztern sind in der Sinnlichkeit wie im Geistigen mit den erstern unzertrennlichen verbunden. Bloß aus dieser Mischung lassen sich die Eigenthümlichkeiten der Dankbarkeit erklären und begreifen. Die Unruhe und das Lästige des Gefühls der Dankbarkeit, welches gefühlvolle Seelen empfinden, wenn sie die unbekannte wohlthätige Hand nicht entdecken können, läßt sich eben so leicht aus dem Triebe zu vergelten erklären, als es bei dem gefühllosen Stolzen und Mächtigen; dem Gefühl der Abhängigkeit sich ergibt, so daß er selbst durch Verschönerung der Wohlthat sich lieber sogleich dagegen verpanzert. Denn wenn er zur Dankbarkeit verpflichtet fühlen kann, muß irgend ein Mal abhängig gewesen seyn, daher die Gottheit nicht dankbar seyn kann, weil ihr nie Wohlthaten erzeugt werden können. In diesem Gefühle der Abhängigkeit dem wohlwollenden Triebe wurzelt auch der Abscheu, den wir gegen die Wohlthaten schlechter und böser Menschen haben; denn das Gemüth kann die Last der Dankbarkeit gegen solche Menschen nicht ertragen, welche sich Wohlwollens unwürdig sind, es eilt daher, eben so wie der Stolz, aus einem andern Beweggrunde, durch Erkenntlichkeit von dieser Last sich zu befreien.

Hieraus läßt sich auch der Unterschied, welcher zwischen Dankbarkeit und Erkenntlichkeit ist, abnehmen. Erkenntlichkeit nämlich ist die in Erwidderung oder Vergütung der erhaltenen Wohlthaten übergegangene Dankbarkeit: thätige Dankbarkeit. Wir erkennen dadurch öffentlich die erhaltenen Wohlthaten an. Erkenntlichkeit ist ein Handeln, Dankbarkeit ein Gefühl.

Dankbarkeit wird in fühlenden Wesen eben so nothwendig naturgemäß durch Wohlthaten erweckt, als Unwille durch Beleidigung, oder Schmerz durch Kränkung. Sie kann daher, als Gefühl, eben so wenig, wie irgend ein anderes Gefühl, Liebe, Furcht, Hoffnung u. s. w., zur Pflicht gemacht werden, — denn wir können kein Gefühl nicht willkürlich in uns erwecken, wohl aber, die dem Gefühle gemäße Denkungs- und Handlungsart. In wie fern aber im Sprachgebrauch die Dankbarkeit auch als ein dem Gefühle angemessenes Handeln ausspricht, und sie als eine Tugend der Gerechtigkeit betrachtet ist, gehört sie nicht hierher, sondern in die Moral.

Das Gefühl der Dankbarkeit ist mehr oder weniger angenehm, nachdem die Abhängigkeit, in welcher der Empfänger dadurch dem Wohlthäter gesetzt wird, ihm mehr oder weniger angenehm ist. Im erstern Falle kann das Gefühl der Dankbarkeit sich bis zum zwanghaften



de des Affectes erheben, und dann alle die nachtheiligen Einflüsse Freiheit und andere Geisteskräfte haben, welche andere Affecten haben pflegen. (S. d. Art. Affect.)

Dank (von Danken,) ist eine durch Zeichen, Worte oder Handlungen ausgesprochne Aeußerung der Dankbarkeit, oder der Anerkennung einer erhaltenen Wohlthat. (Diondi.)

Darmarterien, s. Intestinalarterien.

Darmausleerung, Darmexcretion<sup>1</sup>, Ausleerung des Aufzuges<sup>2</sup>, oder des Mastdarms<sup>3</sup>, Entladung des Mastdarms<sup>4</sup>, des Öffnungs<sup>5</sup>, Austreibung des Unraths<sup>6</sup>, Absetzen der Elemente<sup>7</sup>, (Excretio alvi, s. alvina<sup>8</sup>, s. faecum alvina<sup>9</sup>, Dejectio<sup>10</sup> alvi, Secessio<sup>11</sup>, Expulsio<sup>12</sup>, s. Ejectio<sup>13</sup> am.) Alle organischen Körper (Pflanzen und Thiere,) nehmen von der Außenwelt, welcher sie als Individuen entgegenstehen, Stoffe von Inneres auf, und geben Rückstände derselben, mannigfaltig modificirt, und ihrer Natur nach verändert, an sie zurück. Man bezeichnet den organischen Proceß, wodurch das letztere geschieht, unter der allgemeinen Benennung Excretion. Thiere unterscheiden sich insbesondere, ihrem universellen Bau nach, von Pflanzen dadurch, daß sie zu ihrer Subsistenz erforderlichen äußern Stoffe in einen allgemeinen Behälter in sich, (in einen verschiedentlich gebanten Darmcanal) aufnehmen, von dem aus das zur Unterhaltung des Thierkörpers Nützliche gleichsam mittelst nach innen gerichteter Wurzeln<sup>14</sup> abgezogen wird, worauf das Untaugliche, und zugleich durch jene Absonderung, durch innere chemische Zersetzung und neue Verbindung Bestandtheile, wie auch durch Zumischung von Stoffen aus dem übrigen Körper Umgewandelte, nachdem es sich eine Zeit lang angehalten hatte, auf ein Mal und in größern Massen, als es in Verbindung zusammen in den Körper gelangte, wieder ausgestoßen wird.

In der größern Zahl der Thiere und durchgängig bei allen Quadrupeden, Vögeln, Fischen, Amphibien, wie auch bei Insecten, tritt zur Unterhaltung des Thiers nöthige Nahrungsstoff durch den Mund ein, dessen Rückstand aber als Darmkoth durch den After wieder ab; beide Körperöffnungen sind durch eine gemeinschaftliche Röhre, den Darmcanal, (im weitesten Sinne des Wortes,) in unzertrennbarem Zusammenhange. In der niedrigsten Classe von Thieren tritt aber die Polypen hiervon eine Ausnahme, indem wenigstens die besten derselben von dem eingenommenen Nahrungsstoff das, was für sie untauglich ist, durch den Mund wieder zurückgeben; mit andern Worten, die Darmausleerung dieser Thiere erfolgt nicht durch den After.

1) auch's Entwurf e. Syst. u. mediz. Anthropologie, 1. B. S. 518. 2) Cuvier's Beschr. d. menschl. K. 4. B. S. 503. 3) 4) Sömmerring's Eingeweidel. S. 247. 5) Fenermann's Physiol. 5. Th. S. 621. 6) Sömmerring's Eingeweidel. S. 246. 7) Wattenmann über d. Vorrichtungen in d. Leistengegend, S. 21. 8) Fr. Hoffmanni syst. med. 1. T. I. l. 2. c. 8. 9) Stahl theoria med. Hal. 1708, p. 351. 10) Celsi de med. l. 2. c. 8. 11) v. d. Linden meletemat. med. Hippocr. med. physiol. S. 115. 12) Halleri elem. physiol. T. VII. S. 4. S. 1. 13) Hamburger physiol. c. 9. s. 7. 14) nach Borelli, der den Unterschied der Pflanzen von den Thieren darnach bestimmt, daß Pflanzen ihre Wurzeln außer sich, Thiere aber sie in sich haben. S. Halleri el. physiol. T. VII. p. 1.

den After, (dessen sie entrathen,) sondern durch den Mund <sup>15</sup>.  
 dere Thiere, wie z. E. die Blutigel, haben zwar am Schwanz  
 einen After, aber es geht nur selten durch denselben etwas ab, und  
 gewöhnliche Auswurf dieser Thiere erfolgt ebenfalls durch den Mund.

Darmausleerung ist also, in einen allgemeinen Begriff  
 zusammenbefaßt, dieser von jedem thierischen Körper von Zeit zu  
 bewirkte Auswurf des Rückstandes der Nahrungsmittel, welcher  
 Aufnahme in die eigentliche Körpersubstanz untauglich ist, oder  
 haupt der in den Darmcanal gelangten, oder daselbst gebildeten,  
 zur Assimilation des Körpers untauglichen Stoffe. In der U  
 scheidung des Innern und Außern des thierischen Körpers ge  
 aber der Darmcanal selbst nur relativ zu den innern Theilen;  
 die der Höhlung des Magens und der Gedärme zugekehrte Fläche  
 fer Gebilde kann eben so gut als eine Außenseite des thierischen  
 pers angesehen werden, als die Epidermis, oder der äußere Ueber  
 der Hautdecken, eine solche ist; denn der Unterschied beider be  
 wesentlich doch nur darin, daß erstere, indem sie sich vom Mund  
 bis zum After durch den Körper hindurchzieht, im Leben und im  
 verletzten Zustand kein Gegenstand der sinnlichen Wahrnehmung  
 So wenig als aber ein fremder Körper, der in den Mund ge  
 men und darin verschlossen gehalten wird, dadurch aufhört, ein  
 der Körper zu seyn, und dadurch schon ein Bestandtheil des ei  
 Körpers wird; eben so wenig kann er durch das bloße Niederschlucken  
 das tiefere Herabgleiten in den Magen und in den Darmcanal  
 solcher werden. Alles, was als Nahrungsmittel oder auch sonst  
 den Mund dahin gelangt, bleibt vielmehr, auch wenn es da  
 Umänderungen erleidet, immer noch etwas Fremdartiges, ein  
 der Außenwelt, und steht zwar in wichtigem Bezug mit der  
 bendigen Organismus, aber doch in keinem nähern, als  
 Außendinge, in und unter deren steter oder unterbrochener Ei  
 fung auf den Körper, durch die Sinne, durch die Hautbede  
 gen, durch die innere Haut der Bronchien in den Lungen, (eben  
 eine Außenseite des Körpers,) einzig das Leben seine Dauer be  
 ten kann. Indem aber das innerhalb des Darmcanals Enth  
 Zumischungen von eigenthümlichen Stoffen des Körpers, oder  
 lichen Excretionsstoffen erhält, die dann durch die Darmausle  
 zugleich mit ausgeworfen werden, bekommt diese Function des  
 schen Körpers eine doppelte Seite der Würdigung.

Im allgemeinsten Sinne würde unter Darmausleerung jeder  
 gang fester oder flüssiger Stoffe aus dem ganzen Darmcanal,  
 viel, auf welchem Wege, befaßt werden müssen. Dem Sprachge  
 zu Folge wird aber sowohl der Auswurf des Magens durch  
 Mund, (mittelfst Erbrechens, das selbst unter Umständen, nach  
 füllung oder auf gefühlvollen Reiz der innern Haut des S  
 des nicht eben bestimmt ein pathologischer Gegenstand ist,) als  
 der Ausfluß der in dem Darmcanal befaßten Stoffe durch Darm  
 den davon ausgeschlossen, wenn nicht im letztern Fall eine solch  
 fere Oeffnung als ein stellvertretender, oder ein künstlicher Af

<sup>15</sup>) Vgl. unter dem Artikel After den Zusatz, 1. B. S. 112      16) S.  
 menbach's Handb. d. vergl. Anat. 2. Aufl. S. 179.



et wird. In bestimmterem Sinne aber ist der organische Theil, die Function der Darmausleerung zukommt, immer der After, in dem auch durchaus angemessen ist.

Die Lebensbewegungen aber, die auf diese Function Bezug haben, 1) diejenigen, welche der Ausleerung vorhergehen, indem sie auszuwandernden Stoff bis zum After bringen, und 2) dann diejenigen, welche die Ausleerung selbst bewirken.

3) Zu jenen, oder zur Vorbereitung der Darmausleerung, gezählt zunächst das als peristaltische Bewegung bekannte eigentliche Zusammenziehungsvermögen des Darmcanals in seiner ganzen Strecke, wodurch, wenn auch theilweise die in dem Darmcanal enthaltenen Stoffe dadurch wieder aufwärts gelangen, sie doch im Ganzen und in der überwiegenden Richtung dieser Bewegungen nach und vom Magen aus, abwärts und mit rascherem Gang durch den dünnern Theil des Darmcanals durch, zum dickern übergetrieben werden, wo sie mit längerem Verweilen, und unter fortgehendem mechanisch-chemischen Prozesse, durch den sie zu eigentlichem Excrementsstoff (Darmkoth,) sich bilden, endlich bis in den tiefern Theil des Dickdarms gelangen, wo dann erst das physische Bedürfnis ihrer Ausleerung eintritt.

Der Forttreibung der zur Ausleerung bestimmten Stoffe bis zum After, welche in Hinsicht auf diese als eine mechanische Wirkung erscheint, verdient aber insbesondere die Umänderung der Stoffe selbst Berücksichtigung. Unter dem Darmabgang finden sich noch unterscheidbare Ueberbleibsel von den Nahrungsstoffen, wenn auch die Verdauungskräfte einen zu großen Widerstand leisteten. Sie gehören, außer wirklich unverdaulichen Stoffen, z. E. harten von Obstfrüchten, Hülsen von genossenen Vegetabilien, Fragmente von Knorpeln oder selbst Knochen, (welche letztere z. E. bei Menschen den als album Graecum bekannten weißen Abgang wesentlich bilden.) Größtentheils aber ist der Speisebrei während seines Aufenthaltes in dem Magen und selbst noch in dem dünnern Theil des Darmcanals, oder der Chymus, (vgl. diesen Artikel,) von dem Darmkoth in den dicken Gedärmen nach allen sinnlichen Eigenschaften verschieden, daß beide als völlig heterogene Stoffe erscheinen. So nämlich der Chymus in dem dünnern Theil des Darmcanals, zeigt der Zumischung des pancreatischen Saftes, des Darmschleims und vorzüglich auch der Galle nur graduelle Unterschiede, während der Rückstand der Speisen, sobald solcher in den Blinddarm, am Anfang des dickern Theils des Darmcanals oder des Dickdarms gelangt ist, als Gegensatz des Chymus mit scharfem Unterschiede. Dieser Gegensatz besteht wesentlich in der Untauglichkeit zur Verdauung, während der Chymus ein, seinem Hauptcharakter nach, der Verdauung fähiger Stoff ist. Die chemische Natur des Darmkoths ist Gegenstand eines eignen Artikels. Hier ist nur der Kothbildung im allgemeinen zu gedenken.

Diese ist also die eigentliche und Hauptfunction des Dickdarms, nämlich Naturbestimmung, daß die Speiserückstände, wenn auch das Taugliche, so viel der Körper davon zu seiner Subsistenz braucht aus ihnen eingesogen ist, noch eine Zeit lang im Körper verweilt. *physiol. Realw. II. B.*

weilen, theils damit noch das unter dem der Hauptmasse nach tauglichen doch noch zur Assimilation nicht Ungeeignete, gleichsam einem secundären Einsaugungsproceß für den Körper benutzt werden möge, theils damit eine gewisse Menge des Excretionsstoffes sich sammelte, die dann, mit größerer Bequemlichkeit und ohne bedeutende Störung für die höhern Lebenszwecke, auf einmal und also in von neuem erst langen Zwischenräumen, ausgeleert werden könne. Der dickere Theil des Darmcanals eben so gut als der dünnere sauge, lehren augenscheinlich Klystiere, die, in mäßiger Quantität eingebracht, oft nicht nur nicht wieder durch den After abgehen, dern auch zum Theil, (wie z. E. Rhubarber,) auffallende Veränderungen im Urin zur Folge haben; ja durch nährende Klystiere vermag man in Fällen, wo der Genuß von Nahrungsmitteln durch den Darm verwehrt ist, wenigstens kümmerlich das Leben zu fristen. Auch die festere Consistenz, welche der Stuhlabbgang hat, wenn er längere Zeit in dem Dickdarm verweilt, ein evidenter Beweis der Einsaugung der flüssigen Theile desselben.

Über immer bleibt diese Einsaugung untergeordnete Function der Hauptzweck des Dickdarms so wie insbesondere der des als Enddarms bekannten Anfangstheils desselben, ist der, ein Behälter für Darmercretionsstoffe und Egestionsorgan zu seyn. In dieser Hinsicht bildet derselbe auch mit dem Magen einen merkwürdigen Gegensatz, indem die hierher, (in den Dickdarm,) gelangten Stoffe ihrer Bestimmung nach während ihres Verweilens, sich immer mehr von der Befestigkeit entfernen, nach der sie fähig sind, ein körperlicher Bestandtheil zu werden, während sie dort, (in dem Magen,) durch Verdauung demselben immer angeeigneter werden.

So wie hier der Assimilationsproceß unter zunehmender Fluidität erfolgt, so erfolgt jener Desassimilationsproceß unter zunehmender Condensirung der Stoffe.

Ist die peristaltische Bewegung des Dickdarms überhaupt antwortend, wie unter krankhafter Weise oder auch leidenschaftlichen Einwirkungen, erhöhter Sensibilität, oder auch wenn reizende Substanzen von dem Magen aus durch den Dünndarm hindurch bis zum Enddarm gelangen; so hat der Darmabgang eine geringere Consistenz, ist flüssig oder doch breiartig, und das Bedürfniß des Abganges kehrt zuweilen in kürzern Zeiträumen wieder. Im Gegentheil wird der Abgang immer in entsprechendem Grade fest seyn, und in locker zusammenhängenden Ballen abgehen. Hieraus ist erklärbar, warum auch im Alter flüssige und häufige, alte Personen aber seltne und härtere Darmausleerungen haben, warum reizende Stoffe, als Speisen, Getränke oder auch Arzneien genossen, Diarrhöen bewirken, (wobei es nicht auf Reiz überhaupt, sondern auf Erhöhung der specifischen Empfindbarkeit der Gedärme und dieser angemessene Reize ankommt,) warum das Verhalten der Darmausleerung, wenn die Natur dazu auffordert, Hartleibigkeit zur Folge hat, warum Angst, Schreck, bei besondern Dispositionen auch Zorn, leicht Diarrhœe bewirken, u. s. w.

Die wirklich und normal abgehenden Stoffe sind nun aber bloß Speiseüberbleibsel, wie die Trester nach dem Keltern, dern es sind ihnen, wie bereits erwähnt wurde, thierische Abg-



selbst beigemischt, und in der Verbindung beider hat sich in dem Behälter des Dickdarms ein chemischer Proceß entwickelt, dessen Product nun eben dieser Abgang ist. Dieser Behälter mußte allein so weit seyn, um jene festen Stoffe selbst zu fassen, sonst müßte noch für das Gas, was unter jenem Proceß sich, (nach Verschiedenheit der Bedingungen in ungleichen Graden,) entbindet, den nöthigen Raum gewähren. Dieses Gas selbst wird nun, wenn es übermaß entbunden wird, vor der wirklichen Darmentleerung, auch während derselben, ebenfalls durch den After ausgestoßen. (Blähungen.) Zum großen Theil aber wird es in die flüssigen und festen Stoffe, die den Darmkoth bilden, selbst aufgenommen, trägt dazu bei, diese wesentlich zu constituirten.

Daß aber der Körper selbst von seinen eigenthümlichen Stoffen zu Excrementen einen Beitrag gibt, erhellt aus mehreren Beobachtungen, wo man in Leichen von Personen, die lange vor ihrem Tode keine Nahrung genossen hatten, doch feste Stoffe in dem Dickdarm fand, (obgleich auch das Gegentheil vorkommt, wo die Gedärme leer gefunden werden<sup>17</sup>), so auch aus den Erfahrungen, daß in Krankheiten, wo vielleicht Wochen lang keine festen Speisen genossen, ja auch wohl durch Abführungsmittel die früher noch rückständigen Darmstoffe abgeführt worden waren, doch noch in der letzten Zeit Darmkoth abgeht. Auch das Meconium neugeborner Kinder kann zum Beweise dafür aufgeführt werden. Wesentlich mag der feste Darmkoth, in so fern er Auswurf des thierischen Körpers ist, aus Darm Schleim, vielleicht auch aus einem Rückstand des pancreatischen Saftes, vorzüglich aber aus Gallenstoff bestehen, der bekanntlich krankhafte Einwirkung sich als Gallenstein zu ganz fester Consistenz umgestalten kann.

Die runden Formen, in welche der Darmkoth gewöhnlich erscheint, sind von den innern Falten des Dickdarms bewirkt, doch während der Fortbewegung des Darmkoths ihm theilweise entstehenden, und durch die überhaupt auch das zu schnelle Vorwärtsgelangen desselben verhütet wird. Sie sind in dem Verhältnisse beider, als der Darmkoth mehrere Consistenz hat. Die cylindrische (würstförmige) Form aber, in der diese kleinen Ballen wieder zusammengehen, hängt zunächst von dem letzten Durchpressen des Koths durch den After ab, und steht mit dem Grade der Nachgiebigkeit des inneren und äußern Sphincters in übereinstimmendem Verhältnisse, die Nachgiebigkeit und Weite zwar von Alter und Körpergröße abhängt, aber auch, eben so wie die mehrere oder mindere Mundöffnung, individuell verschieden ist. Krankhafte Zustände des After, wie z. B. Entzündungen desselben durch Hämorrhoidalknoten, haben daher auch, sie überhaupt die Darmausleerung erschweren, auf die Form des abgehenden Darmkoths nothwendig Einwirkung.

Die Function der Excretion selbst wird sollicitirt, wenn eine reichliche Quantität von Darmkoth in dem tiefern Theile des Mastdarms angehäuft hat, und nun diesen durch Ausdehnung, auch durch eigene Schärfe reizt. Dessen ist jedoch das hinzukommende Moment eine erhöhte Reizfähigkeit des Mastdarms, wie

<sup>17</sup> Vgl. Halleri cl. physiol. T. VII. l. 24. s. 4. §. 4.

wir aus der schnellen Wirkung von Gemüthsaffecten auf den D. zur Darmausleerung ersehen. Militärs wissen, daß, so wie ein Reszug einer Schlacht entgegeneilt, oder sich zum Treffen zu entf. im Begriff ist, immer eine ungewöhnliche Zahl von der Manns für dieß Naturbedürfniß auszutreten begehrt. Ungeachtet das willkürliche Drängen, die angesammelten Stoffe bis zum After fördern, nicht geeignet ist, so hat doch auch die angestrenzte Ansammlung und der auf diese Function gerichtete Wille einen Ein. um die ersten Bewegungen zu wirklichem Auswurf von bereits gesammelten Darmstoffen zu erregen, wie man weiß, daß man fortgesetzte Bemühungen, dieß Naturgeschäft zu einer gewissen bestimmten Zeit zu verrichten, es meist dahin bringen kann, daß der D. der Natur dazu bald auch ohne willkürliche Aufregung zur gleichen Stunde wiederkehrt.

Es ist nämlich die Darmausleerung eine solche Lebensfunction zum Theil, und besonders in ihrem Beginnen, der Willkür entgegen, zum Theil, und besonders in ihrem Fortgange, aber derselben unterworfen ist. Kinder gewöhnen sich sehr bald daran, den Trieb eine Zeit lang anzuhalten, bis sie mit ihrer eignen Bequemlichkeit ihm sich überlassen können. Auch die den Menschen näher stehenden Hausthiere, (Hunde, Ragen,) lernen bald dem Triebe zur Darmausleerung so lange entgegenzuwirken, bis sie ohne Furcht einer Bel. ung selbigem nachgeben können.

Der Trieb selbst entsteht von unwillkürlicher Zusammenziehung untern Theils des Mastdarms, also der peristaltischen Bewegung tiefern oder Endtheils des Dickdarms. So lange diese Bewegung bloß in dem obern Theile des Darms angeregt ist, wird das in Darms Enthaltene zwar theilweise auch zurück, mehrentheils und durch die Bewegung im Ganzen abwärts getrieben. Bei Menschen im Stehen und Sitzen kann dann auch das Gewicht der Stoffe etwas beitragen, daß sie in dem tiefern Theile des Mastdarms sich anhäufen, der, wenn auch gekrümmt, doch nicht mehr so gerade, wie der Ausgang des Colons, an sich den in ihn eindringenden Stoffen einen größern Raum darbietet, und auch in seinen Umgebungen nicht so viel Widerstand der Ausdehnung findet, als das Colon. Daß aber durch diese Zusammenziehung des Mastdarms, ob sie wegen stärkerer Muskelfibern desselben zugleich energischer ist, als der übrigen Gedärme, die in ihm befaßten Stoffe nicht sogleich dem After gepreßt werden, verhindern die beiden Sphincteren, Schließmuskeln des After, deren Thätigkeit beim geflissentlichen Halten der Darmausleerung noch bedeutend erhöht werden kann, sie gleich nicht ausreicht, um bei immer stärkerer Ansammlung Darmkoth und immer mehrerer Reizung des Mastdarms durch denselben, oder unter erhöhter Reizbarkeit des Mastdarms, besonders in pathologischen Zuständen, die endliche Auspressung des Koths zu verhindern, wenn sie nicht etwa durch einen äußern mechanischen Druck auf den After unterstützt wird, wobei jedoch im Fortgange des Drängens endlich das belästigende Gefühl sich zur Unerträglichkeit steigert, das, wenn die Natur auch dann noch nicht ihr Recht erhält, p



ie Zustände, Krämpfe, Entzündung, Brand, Zerreißung der  
re und den gewissen Tod zur Folge hat.

as die Willkür zur Darmentleerung beizutragen vermag, besteht  
slich darin, daß, mit Aufhebung der Richtung des Willens auf  
schließmuskeln des Afters das Diaphragma und die Abdominal-  
eln gemeinschaftlich auf sämtliche Eingeweide des Unterleibes  
Zusammenziehung pressen. Diese Wirkung ist also bloß unter-  
d; sie ist um so nöthiger und erleichtert den Abgang um so  
je weniger die peristaltische Bewegung des Mastdarms ange-  
ist, je festere und größere Ballen von Koth sich bereits auf den  
Sphincter gelegt haben, und je weniger noch die Thätigkeit  
Sphincters selbst überwunden ist. Bei lange unterlassener Aus-  
g von consistentem Darmkoth, wie z. E. bei Reconvalescenten  
sichern, in den ersten Darmausleerungen, nachdem sie wieder zu  
Kost zurückgekehrt sind, sind gewöhnlich die ersten Anstrengun-  
dazu die beschwerlichsten und nicht selten erschöpfend, weil  
contractilität der Sphincteren durch das längere Unterbleiben einer  
tzußmäßigen Erweiterung erhöht ist. Indem das Diaphragma  
rts und vorwärts nach dem Nabel zu, der Gesamintapparat der  
ninalmuskeln aber von da aus nach dem letzten Lendenwirbel zu  
t, ist die mittlere Richtung dieses zweifachen Drucks der hie-  
und tiefere Theil des Beckens, eben da, wo der Mastdarm sei-  
Ausgang nimmt. Diese gemeinschaftliche Pressung erfolgt mit  
mehrerer Leichtigkeit, wenn der Thorax, durch die Inspirations-  
eln gehoben und fest gehalten, dem Diaphragma sowohl, als  
ntheils auch den Abdominalmuskeln feste Punkte zur Insertion  
t, die Schenkel aber in die Höhe gezogen sind, und die Brust  
et ist, wie in sitzender oder knauernder Stellung, indem hier die  
ung jener Bewegung noch mehr auf die Gegend des Ausganges  
Mastdarms hingeleitet wird <sup>18</sup>.

ährend der Darmkoth durch den geöffneten After hindurchgeht,  
i besonders die als Levatoren oder Aufheber des Afters bekann-  
Muskeln denselben fest, daß vorzüglich die innere Haut nicht all-  
t mit herausgepreßt wird <sup>19</sup>, und ziehen, während die letzte Por-  
des Koths durchgeht, den After über denselben wieder in die Höhe,  
ann die Zusammenziehung der Sphincteren den Auswurf selbst mit  
uert, der daher auch bei hinlänglicher Consistenz immer in seiner  
zugespitzt erscheint. Die übrigen Aftermuskeln dienen mehr oder  
er den Levatoren in ihrer Wirkung zur Unterstützung <sup>20</sup>.

e Darmausleerung erfolgt entweder in einer zusammenhängenden  
e, oder in mehreren einzelnen Stücken mit kürzern oder längern  
henräumen, wobei die Gewöhnung der Menschen große Unter-  
e macht, so daß längere oder kürzere Zeit zu dieser Function er-  
lich ist. Der aus den besonders am Ausgange des Mastdarms  
lichen Drüsen abgesonderte Schleim macht, indem er während

Vgl. hierüber auch unter dem Artikel Abdominalmuskeln, 1. B. S. 21.  
9) Bei manchen Thieren, wie z. E. bei den Pferden, tritt die innere Haut des  
Mastdarms bei jeder Ausleerung der hier immer im Normalzustand kugelförm-  
gen Excremente bedeutend und sich gleichsam umstülpend, aus dem After hervor,  
was bei dem Menschen immer ein pathologischer Zustand ist, und Erschlaffung der  
Haut voraussetzt. 20) S. den Artf. Aftermuskeln, 1. Th. S. 122 — 125.

des Drängens zur Ausleerung stärker zufließt, die Theile schlüß und erleichtert so den Auswurf. Ein völlig consistenter Darm läßt daher auch, indem er auf der feuchten Hautoberfläche derselben leicht vorbeigleitet, keine unreine Spur seines Durchganges zurück, die bei weicherer Consistenz desselben, oder bei Trockenheit des After's besondere Reinigung des Theils erheischt. Ein überreifer Abgang dieses Schleims, oder gar ein Mitabgang von Blut, ist bekanntlich unter die pathologischen Zustände, und nur das Vortheil der Schulen früherer Zeit rechnete die Hämorrhoiden in dem tern Lebensalter zu dem gesunden Zustande, ob sie gleich unter Umständen, wie aber auch andere pathologische Vorgänge im Körper, relativ der Gesundheit zuträglich seyn können.

Die Darmausleerung ist, wie alle Functionen, die naturgemäß periodisch vor sich gehen, wenn sie in der Ordnung erfolgt, mit dem besondern Gefühl von Wohlbehaglichkeit verbunden, das um so mehr sich steigert, je größer die Anstrengungen waren, die ihm vorhergegangen, wenn diese nur nicht mit einem widernatürlichen und ungesunden Zustande verbunden sind.

Es scheint in den normalen Kreis des täglichen Lebens zu gehören, so wie eine Hauptmahlzeit zu halten, so auch einmal eine Darmausleerung zu haben. Die Morgenstunden sind für die mehrheit der Menschen diejenigen, wo der Trieb dazu sich gewöhnlich äußert, und nach den Grundsätzen einer guten Lebensordnung wahrgenommen und beachtet, hat eine solche tägliche regelmäßig erfolgende Darmausleerung auf das Verdauungsgeschäft überhaupt einen wohlthätigen Einfluß. Gewisse Lebensgewohnheiten, so wie der Genuß des Frühstücks, oder eine Pfeife Tobak des Morgens, haben eine entschiedene Wirkung, um den stockenden Trieb zur Darmausleerung anzuregen, und das Unterbleiben desselben zeigt dann schon eine krankliche Disposition an. Indessen finden sich auch hier zahlreiche Ausnahmen. Im allgemeinen haben Frauen häufig nicht täglich bestimmt einmal Darmausleerung. Bei alten Personen findet man überhaupt gewöhnlich auch, daß eine geringe Anhäufung des Kothes erforderlich ist, um den Trieb zur Ausleerung anzuregen. Bei veränderter Lebensordnung, z. E. auf Reisen, unterbleibt nicht selten, ohne den geringsten Nachtheil, die Darmausleerung mehrere Tage lang. Regt sich dagegen im reiferen Lebensalter das Bedürfniß dazu mehrere Male des Tages; so deutet gewöhnlich schon auf Schwäche der Verdauungsorgane hin. Es gibt nicht an Beispielen von Personen, die in der Regel nur nach mehreren Tagen, mit mehrerer oder minderer Ordnung der periodischen Wiederkehr, Darmausleerungen haben. Haller hat mehrere Fälle gesammelt, wo nicht nur wöchentlich nur ein einziges Mal, sondern gar auch monatlich, ja erst nach Verlauf mehrerer Monate erst eine Darmausleerung erfolgte. Die letztern Fälle gehören offenbar zu pathologischen Erscheinungen, und noch weit mehr die auch ohnedießtentheils hinlänglicher Weglaubigung entzathenden Fälle von Personen, die binnen einem Viertel- oder halben Jahre, nach Jahren, ja sogar erst nach zwei, drei, sechs oder mehrern Jahren eine Darmausleerung hatten <sup>21</sup>.

21) S. Halleri elem. physiol. 1. c. §. 10.



Die Menge des jedesmaligen Abgangs hängt, wie leicht zu ermessen, zunächst von der Quantität und der Beschaffenheit der genossenen Nahrungsmittel ab. Vegetabilische Kost bewirkt einen reichlicheren Abgang als animalische. Im allgemeinen schätzt man den Betrag der Excremente eines Tages von Personen, die sich gut nähren, auf  $4\frac{1}{2}$  bis etwas über 5 Unzen, bei bloß vegetabilischer Kost aber auf 16 Unzen <sup>22</sup>.

Halleri elem. physiol. 1. c.

**Darmbein**, s. Darmstück des Hüftknochens. — **gegen den**, s. iaciſche Regionen. — **mauslein**, oder **muskel**, s. Iliacische Regionen. — **stachel des Darmstücks des Hüftknochens**, s. Crista iliaca. — **beins- und Hüftpulsader**, s. Ileo-Lumbalarterie. — **blutadern**, s. Intestinalvenen. **Darmcanal** <sup>1</sup>, **Darmkanal** <sup>2</sup>, **Speisrohr**, **Gedärme** <sup>3</sup>, **der erste Wege** <sup>4</sup>, **Kanal der ersten Wege** <sup>5</sup>, (**Canalis** <sup>6</sup>, s. **Canalis intestinalis**, **Canalis**, s. **Tubus**, s. **Tractus** <sup>8</sup> **intestinalis**, **Canalis** <sup>9</sup>, s. **Tubus** <sup>10</sup> **cibarius**, **Tubus alimentarius**, **Primae viae** <sup>11</sup>, **Coelia** <sup>12</sup>.) Man kann das Wort Darmcanal in weiterem und engerem Sinne nehmen; in jenem bezeichnet es die lange häutige Röhre, welche von der Mundhöhle anfängt, und mit dem After endigt; in diesem bezeichnet es nur den Canal, durch welchen die Därme von den Pfortner des Magens an bis zu dem Aftermuskel des After bilden. Der Bau und die Bestimmung der einzelnen Theile dieses Canals sind zwar einander ähnlich; alle sind aus drei in einander gelegten theils zellstoffigen, theils faserigen Geweben gebildet, in denen sich Gefäße, Nerven und Schleimdrüsen befinden; alle haben den Zweck, die Nahrungsmittel aufzunehmen, zu leiten, die Verdauung zu bewirken, und eine große Fläche darzustellen zum innigen Conflict mit mannigfachen Außendingen, zur Aufnahme- und Einsaugung des nahrhaften Stoffes. Es sind aber auch einige Partien desselben in ihrem Bau und Wirken einigermaßen verschieden, daher sondert man diese und bezeichnet sie mit eigenen Benennungen.

Diese sind folgende:

- 1) der Schlund, Schlundkopf, (Pharynx,) der weite Anfang von der Mundhöhle oder dem Rachen an;
  - 2) die Speiseröhre, (Oesophagus,) der engere Fortgang aus dem Halse und durch die Brusthöhle;
  - 3) der Magen, (Ventriculus,) die größte Ausdehnung in dem obern Theile der Unterleibshöhle;
  - 4) die dünnen Därme, (Intestina tenuia,) die vielfachen Windungen in dem mittleren und untern Theile der Unterleibshöhle;
  - 5) der Dickdarm, (Intestina crassa,) die letzten Windungen in dem untern Theile der Unterleibshöhle;
  - 6) der After, (Anus,) der Endpunkt des Darmcanals.
- Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1733, 3. B. S. 463. 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1978. 3) Schmmerring's Eingeweidel. S. 105. 4) Gaubius Anfangsgr. d. mediz. Krankheitslehre, Uebers. v. Gruner, S. 359. 5) Meutaud's Vergliederungsk. Uebers. Leipz. 1782, 2. B. S. 255, Note 2. 6) Winslow expos. anat. lat. vers. T. IV. p. 1. S. 89. 7) Schmmerring's Eingeweidel. a. a. O. 8) Mayer's Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 393. 9) Halleri elem. physiol. T. VI. 1. 19. s. 1. S. 1. 10) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. O. 11) Gaubii instit. pathol. ed. 2. Lip. 1771, 444. 12)

Vgl. dass Wort.

5) die dicken Därme, (*Intestina crassa*,) die französische Windung um die dünnen Därme herum bis zu dem Schließmuskel des Mastdarms hin.

Da der Schlund, die Speiseröhre, der Magen ingeleichen der After ihren Muskeln unter eignen Artikeln näher beschrieben werden ist hier nur der Darmcanal nach der engeren Bezeichnung des dicken, der dünnen und dicke Darm bis zu dem Ausgange des Mastdarms zu betrachten.

Auch diese Därme werden nach ihrer Lage und ihrem Bau in kleinere Theile getrennt und man unterscheidet:

- 1) den Zwölffingerdarm, (*Duodenum*),
- 2) die dünnen Därme, (*Intestina tenuia*),
- 3) die dicken Därme, (*Intestina crassa*),

von denen ein jeder wieder in noch kleinere Partien abgetheilt wird.

Es ist zuerst die Lage und Bildung zu beschreiben, welche Gebilden im allgemeinen zukommt, dann diejenige, wodurch sich jede Partie von der andern unterscheidet, welche ihr eigenthümlich ist.

- 1) Lage und Bildung der Därme im allgemeinen

Die Därme liegen in der mittlern und untern Gegend der Unterleibshöhle, und füllen auch die Seitentheile nach vorn zu aus, fangen von dem Pfortner des Magens in dem rechten Hypochondrium an, ziehen sich in vielfachen Windungen durch die Nabelgegend und ihre Seitentheile, die Weichen und das linke Hypochondrium hin bis in die Höhle des kleinen Beckens; welches sie größtentheils füllen. Da sie in spiralförmigen Windungen dicht neben einander liegen, so sind sie von beträchtlicher Länge, wenn sie gleich nur beschränkten Raum einnehmen. Man nimmt gemeinlich an, die Därme fünf bis sechs Mal so lang sind als der Körper des Menschen, von welchem sie einen Theil ausmachen. Allein diese Art ist nicht ganz richtig; denn es findet kein bestimmtes Verhältniß zwischen der Länge des Körpers und der der Eingeweide der Unterleibshöhle Statt; sie sind öfters bei sehr großen Menschen nicht größer und öfter gefunden worden, als bei viel Kleinern.

Der Theil des Darmcanals, welcher in der Unterleibshöhle liegt, wird größtentheils aus drei über einander gelegten Häuten gebildet.

Die erste oder äußere Haut, (*Tunica externa*), ist eine seröse Haut, (*Tunica serosa*;) sie kommt von derjenigen Haut des Bauchfells, welche sich über die Eingeweide der Unterleibshöhle hinlegt, und die Oberfläche derselben, wenige Stellen ausgenommen, überzieht, und indem, dieses geschieht, werden zugleich diese Theile mehr oder weniger tief in den Sack hineingezogen, welchen das Bauchfell in der vordern und größern Theil der Unterleibshöhle bildet. Nach hinten zu tritt das Bauchfell, welches den Darm überzogen hat, entweder aus einander, um sich zu den Seitentheilen hin fortzusetzen, wie beim aufsteigenden Grimmdarm, oder es vereinigt sich mit zwei Theilen, wie bei den dünnen Därmen. Geschieht jenes, so bleibt ein größerer oder kleinerer Theil der hintern Fläche des Darmes von der serösen Haut unbedeckt, und wird nur durch Zellgewebe an die nachbarten Theile befestigt; geschieht dieses, so ist nur ein schmaler



reifen mit dem Bauchfelle nicht dicht vereinigt, und es bleibt zwischen den beiden Platten dieser Haut und jenem unbedeckten Streifen Darmes ein kleiner dreieckiger Raum, der nur mit Zellenstoff gefüllt ist, hinter welchem das Gefröse an die dünnen Därme befestigt ist.

Die Bildung dieser serösen Haut ist dem Bauchfelle ganz gleich, sie nur ein Theil derselben ist; die äußere Fläche ist platt und glatt, die innere mit Zellgewebe an die zweite Haut des Darmes befestigt. (Vgl. Peritoneum.)

Die zweite Haut ist eine Muskelhaut, (*Tunica carnea, fibrosa*) sie ist dünn, viel dünner als die Muskelhaut des Schlundes und der Speiseröhre; ihre Farbe ist blaßröthlich. Sie ist niemals im gesunden Zustande so stark geröthet, als die Muskeln, welche nach außen hin wirken, oder doch zu lebhaften Zusammenziehungen bestimmt sind; verliert sich die dunklere Röthe der Muskelfasern, so wie sie vom Schlunde zu dem Magen und den Därmen fortgehen; sie kehrt wieder allmählig stärker vom Anfange des Mastdarmes zu seinem Schließmuskel hin. — Eine doppelte Schicht von Fasern bildet die muskulöse Haut; die äußere liegt der Länge nach, (*Fibrae longitudinales*;) sie kann als Fortsetzung der länglichen Fasern angesehen werden, welche man in der Speiseröhre findet, die sich durch den ganzen Darmcanal hinzieht; sie sind nicht so dicht, und ein lockeres Zellgewebe vereinigt sie. Die innere Schicht ist dichter, und besteht aus kreisförmigen Muskelfasern, (*Fibrae circulares*.) Man findet auch diese schon in der Speiseröhre, sie bilden aber nicht, wie die länglichen Fasern, über einen großen Theil der Länge fortlaufende und zusammenhängende Muskelfasern, sondern jede schlägt sich einzeln um den Darm herum, ohne daß man einen Punct bemerkt, von welchem sie anfängt; der Anfang und das Ende der Faser gehen in Form eines Kreises in einander über, und in das unter dieser Haut ausgebreitete Zellgewebe scheinen sich kleine Fasern zu verlieren, und dichtes Zellgewebe reiht sich von oben noch abwärts an einander.

Die dritte Haut ist eine Schleimhaut, (*Membrana mucosa*.) Gewöhnlich nimmt man an, daß die Därme von vier Häuten gebildet werden, und unterscheidet die eigene Haut, (*Tunica propria, s. nervea*;) und die innere Haut, (*Tunica intima, mucilaginosa*;) welche wir hier gemeinschaftlich mit dem Rahmen der Schleimhaut bezeichnen, denn eine solche ist es ihrer Structur nach, und das, was man noch als besondere eigene Haut aufgezählt hat, ist eine Schicht von dichtem Zellgewebe, welches die Schleimhaut mit der Muskelhaut verbindet. — Es ist diese Haut eine Fortsetzung der gleichen Haut des Magens und also auch mittelbar der Haut, welche die Oberfläche des Körpers bedeckt, und welche, indem sie sich in die Mundhöhle und den Schlund in die Höhle des Körpers hinabrollt, ihre Structur in die einer Schleimhaut verändert. Ihre Farbe ist halbröthlich, ihre Masse ist weich, aber doch dicht; die äußere Fläche ist mit einem dichten Zellgewebe bedeckt, durch welches sie an die Muskelhaut befestigt wird, in welchem sich viele Blutgefäße und Saugadern verbreiten, die mit ihren feinsten Endi-

gungen auf der innern Fläche in zarten Flocken hervorrage, wodurch die innere Fläche ein flockiges, sammtartiges Ansehen bekommt. Den kleinen Flocken, welche unter dem Mikroskop eine cylindrische Gestalt zeigen, öffnen sich Saugadern, in dem Ende einer jeden Flocke findet sich eine zellige Erweiterung, (*Ampulla chyliifera*, *Lieberkuhniana*<sup>13</sup>), wahrscheinlich ist diese das Ende einer Saugader; die Gefäße verbreiten sich in Form der feinsten Netze um den Darm herum. Zwischen den Flocken findet man Oeffnungen Schleimdrüsen, oder Höhlen, (*Folliculi mucosi*.)

Von dem herabsteigenden Theil des Zwölffingerdarms an bis zum Ende des Mastdarms hin ragt die Schleimhaut nach der Form des Canals zu in Falten hervor, die man Kerkringische Falten (*Valvulae conniventes*, s. *Kerkringianae*), nennt. Die innere Haut beträchtlich länger als die beiden andern Häute; trennt sich daher in Zwischenräumen von einem Viertel- bis ganz von der Muskelhaut, senkt sich in die Höhle des Canals hin, schlägt sich rückwärts um, bildet so eine Falte und gelangt wieder an die Muskelhaut, mit welcher sie vereint abwärts geht, bis sie eine Bildung einer andern Falte sich abermals trennt. Die Klappen Falten haben die Gestalt halber Kreise, in der Mitte sind sie am breitesten; von dieser gehen in entgegengesetzter Richtung zwei Seiten aus, die allmählig schmaler werden, und endlich ganz verschwinden. Durch diese Falten wird die innere Fläche der Därme beträchtlich länger, und für die einsaugenden Gefäße ein größerer Raum ihrer Ausbreitung bereitet.

Durch Fortsetzungen und Falten des Bauchfells werden die Därme in ihrer Lage erhalten und an benachbarte Theile befestigt; sie erhalten verschiedene Benennungen nach den Theilen, mit denen sie verbunden sind.

II. Lage und Bildung, welche den einzelnen Theilen des Darmcanals besonders zukommt.

Die beiden Haupttheile der Därme sind: der enge oder dünne und der weite oder dicke Darm.

1) Der enge oder dünne Darm, (*Intestinum tenue*, s. *arustum*), ist derjenige Theil des Darmcanals, welcher bei dem Pfortner des Magens anfängt, und mit der Klappe des Grimmdarms endet. Es wird dieser Darm in drei Theile abgetheilt: a) Zwölffingerdarm, b) der Leerdarm, c) der gewundene Darm.

a) Der Zwölffingerdarm, Gallendarm, (*Intestinum duodenum*), unterscheidet sich durch mehrere Eigenthümlichkeiten von den übrigen Theilen des dünnen Darms, so daß man ihn mit Recht durch eine besondere Benennung bezeichnet. Er macht den Anfang des dünnen Darmes bei dem Pfortner des Magens und endet da, wo derselbe durch das Grimmdarmgekröse tritt; er ist gemeinlich

<sup>13</sup>) Vgl. hierüber insbesondere J. N. Lieberkuhn de diss. fabrica et actione villorum intestinorum tenuium, L. B. 1745, 4. rec. cur. J. Seddon, Lond. 1782, 4., Bleuland vasculorum in intestinorum subtilior. anatom. oper. detegend. descriptio, Traj. 1797, 4. über die Darmzotten in J. Senflammer's u. Rosenmüller's Vetr. 2. H. Nr. 4. R. 4., Rudolphi hb. d. Darmzotten, in Reil's Arch. 1. H. S. 63. Nr. 2. 3. H. Nr. 1. S. 339.



so lang als zwölf quere Finger des Körpers, zu welchem er gehört; her sein Nahme. Mit dem Magen liegt dieser Darm über dem Gefäße des queren Grimmdarms, welches die Unterleibshöhle in einen kleinern, und untern größern Theil trennt. Die obere Platte desselben setzt sich fort, um seiner vordern Fläche, die untere Platte, um einem kleinen Theil des untern horizontalen Stücks den Vorzug einer fettsen Haut zu geben; die hintere Fläche des Zwölffingerdarms ist nur mit Zellgewebe bedeckt, und da auch die vordere Fläche nur mit lockereim Zellgewebe an die Fortsetzung der Bauchplatte befestigt ist, so kann dieser Darm stärker ausgedehnt werden, als die übrigen dünnen Därme. Nach oben und mit der nach der rechten Seite zu gekehrten Fläche liegt er an der Leber und der linken Seite der Gallenblase, nach unten ruht er auf der untern Platte des Grimmdarmgefäßes, so daß er nach vorn und unten zwischen den Fortsetzungen der beiden Platten des Grimmdarmgefäßes zum Theil geschlossen wird; hinter ihm liegt ein Theil der rechten Niere, die untere Hohlvene, die Aorta, der rechte mittlere und innere Schenkel des Zwerchfells, und hinter diesen Theilen die vordere und Seitenfläche der obern Lendenwirbel.

Der Zwölffingerdarm beschreibt im Herabsteigen einen halben Kreis, dessen convexen Rand nach der rechten, dessen concaven nach der linken Seite zu gekehrt ist. In der concaven Fläche liegt die Bauchspeicheldrüse, (Pancreas,) und ist ringsum, so wie ein Gefäß, an die Platte des Darms befestigt. Diese Krümmung des Zwölffingerdarms theilt die Unterabtheilung desselben in drei Theile oder Aeste. Der obere horizontale Theil geht von dem Pfortner an horizontal rückwärts, nach der Krümmung des ersten Lendenwirbels, und rechts bis zu dem Hals und der linken Fläche der Gallenblase, vor diesem Theil liegt ein Stück der untern Fläche des rechten Leberlappens, vor ihm der Anfang des queren Grimmdarms, hinter ihm die Aorta, der sympathische Nerv, und die Nervenäste, welche das Lebergeslecht, das Geflecht für den Zwölffingerdarm und das Pancreas bilden. — Neben der Gallenblase macht der Darm einen Winkel, von welchem aus der mittlere herabsteigende Theil fast senkrecht, nur wenig nach der linken Seite zu hinabgeht; die vordere Fläche dieses Theils bedeckt das Ende des aufsteigenden Theiles des queren Grimmdarms und die rechte Beugung desselben; die hintere Fläche ruht vor dem innern Theil der vordern Fläche der rechten Niere. — Um einen deutlich hervorstechenden Winkel zu bilden, geht dieser mittlere Theil mit einer schwach convexen Beugung in das untere horizontale Stück über; dieses hat hinter sich die untere Hohlvene, die Aorta und viele Nervenäste, welche die Geflechte zusammensetzen, die in dieser Gegend sich bilden; vor ihm liegt der quere Grimmdarm und die Aeste der obern Gefäßarterie, mit denen er sich kreuzt, breitet sich vor ihm aus.

Es wird der Zwölffingerdarm nicht, wie die übrigen Därme, durch das Gefäß in dieser Lage befestigt, sondern es geschieht dieses durch das Pancreas, welches sich wie ein Gefäß an ihn fest setzt, durch das Zellgewebe an der hintern Fläche, und durch einige Falten, welche das Bauchfell bildet, indem es über seine vordere Fläche zu den be-

nachbarten Theilen hingeht. Die eine dieser Falten geht von oberm Theil des mittlern Stückes dieses Darmes neben der Gallase zu der untern Fläche der Leber, (*Ligamentum duodeni paticum*,) die andere geht von dem obern Stück des Zwölffingerdarms zu dem mittlern herab, und zu der vordern Fläche der Pankreas hin, (*Ligamentum duodeni renale*.) Von diesen Falten aus sich dann auch die seröse Haut der vordern Fläche des Zwölffingerdarms zu der des Magens fort.

Die muskulöse Haut dieses Darmes ist stärker, als die der übrigen dünnen Därme, und Gefäße sowohl als Nerven verbreiten vorzüglich zahlreich in demselben, daher ist er auch gewöhnlich röthlich. Die innere Fläche der Schleimhaut ist gelblich, oder gelbbraunlich, färbt von der Galle, die sich hier ergießt, und in der Nähe des Pankreas liegen vorzüglich viele Schleimdrüsen, (*Folliculi mucosi*,) beisammen, man nennt sie Brunnerische Drüsen, (*Glandulae Brunneri*,) weil Brunner auf sie aufmerksam gemacht hat, glaubte aber, es seien Drüsen besonderer Art, die einen eignen Verdauungssaft absonderten.<sup>14</sup>

Da, wo der mittlere Theil des Darmes in den untern überdringen die Ausführungsgänge des Pankreas und des gemeinsamen Gallenganges schräg durch die Häute desselben hindurch, öffnen sich entweder in einer Mündung, oder mit zwei Mündungen, die aber dicht neben einander liegen; über der Mündung liegt eine kleine Falte, (*Diverticulum Vatri*,) und um diese herum befinden sich mehrere Kerkringische Falten, eine kleine ovale Erhabenheit.

Die meisten Arterien des Zwölffingerdarms sind mittelbar durch hepatische Arterie Äste der Cöliaca; die Gastroduodenalarterien diesen versorgen vorzüglich den obern und mittlern Theil, die mesenterische Arterie versorgt den untern horizontalen Theil.

Die Venen vereinigen sich in der Gastroduodenalvene, die sich in die Pfortader ergießt.

Die Nerven kommen aus dem cöliacischen und hepatischen Plexus; sie bilden ein eignes, woder das Pancreaticoduodenalganglion, der obere horizontale Theil erhält Zweige aus dem vagen Nerven, den gastrischen Geflechten.<sup>15</sup>

b) Der Leerdarm, (*Intestinum jejunum*,) und der wundene Darm, Hüft Darm, oder Krummdarm, (*Intestinum ileum*,) sind einander so ähnlich, daß man die Grenzen zwischen beiden durch deutliche Merkmale nicht genau bestimmen kann. Jener fängt da an, wo der dünne Darm als Ende des Zwölffingerdarms durch das Gefröse des queren Grimmdarms von der vordern Fläche des dritten Lebewirbels gegen die linke Seitenfläche

14) Vgl. J. Conr. Brunner diss. de glandulis duodeni, s. pancreas secundario, Heidelberg. 1687, 4. (cum diss. de glandula pituitaria, Frankfurt. 1715, 4.) S. den Artikel Brunnersche Drüsen. 15) Vgl. Clausen de intestini duodeni situ et nexu, Lips. 1757, 4. (r. Sandifort, thes. III.), E. Sandifort tabulae intestini duodeni B. 1780, Bleuland tract. de difficili aut impedito alimentorum exitu in duoden. progress. L. B. 1787, Bleuland icon tunicae intest. duodeni juxta felic. vascul. replet. ipsis colorib. qui in pariet. conspiciuntur. Ultraj. 1789.



n zu hindurchgeht; er lenkt sich hierauf zuerst rechts, und geht in vielfachen Windungen in der Nabelgegend herum, und geht in gewundenen Darm über, der sich eben so mannigfach windet; die- lenkt sich in die Höhle des kleinen Beckens hinab, und endigt in der rechten Weichen- oder Darmbeingegegend bei dem Anfange dicken Darms mit der Grimmdarmklappe. Rings um diese Därme m liegen die dicken Därme, nach oben trennt sie das Gefröse queren Grimmdarms von dem Magen, der Leber, dem Pankreas, Milz; hinter ihnen liegen unmittelbar die Platten des Bauch- welche sich ausbreiten, um das Gefröse des Grimmdarms zu n, hinter diesem liegen die untere Hohlvene, die Azyga und He- yga, die Aorta mit ihren Ästen, beträchtliche Nervenverzweigung Saugadern und der Milchbrustgang mit seinem Anfange vor vordern und Seitenfläche der Lendenwirbel; ihre vordere Fläche ft das große Netz; nach unten haben sie zu beiden Seiten die i Därme, indem sie die Höhle des kleinen Beckens ausfüllen, unten und vorn die Harnblase, nach unten und hinten den rdarm, an den Seitentheilen das große Geflecht der Lendennerz- die Beckengefäße und den Aufhebemuskel des Mastdarms un- ch; in dem weiblichen Geschlechte legen sie sich auch noch auf ebärmutter und um sie herum. Die vordere convexe Fläche der anwindungen liegt an der hintern Fläche der Bauchwände, an die re concave befestigt sich das Gefröse. — Der Leerdarm und der endene Darm werden durch das Gefröse, (Mesenterium,) in Lage erhalten; dieses wird durch die Vereinigung der beiden en des Bauchfells gebildet, von welchem die eine die obere, die ee die untere Fläche dieser Därme überzieht; da wo diese Platten er hintern concaven Fläche der Därme zusammentreten, um sich zu nigen, bleibt ein schmaler Streif des Darms unbedeckt, und so bildet in enger dreieckiger Zwischenraum zwischen jenem Streifen und eiden Platten des Bauchfells, der mit Zellgewebe ausgefüllt ist; cheinlich wird durch diese Bildung die Ausdehnbarkeit der Därme ert, weil sie nicht in ihrem ganzen Umfange straff anliegt, und arin beschränkt; denn die beiden innern Häute sind noch aus- arer als die seröse. An der vordern Fläche der Lendenwir- rd das Gefröse durch Zellgewebe befestigt, und geht von aus in zwei Platten wieder aus einander, um das Grimmdarm- e zu bilden.

sind diese Därme enger als der Zwölffingerdarm und als die Därme; wodurch sich diese beiden Därme übrigens von jenen scheiden, wird bei der besondern Beschreibung derselben an- en.

s Unterscheidungsmerkmale zwischen dem Leerdarm dem gewundenen Darm gibt man folgende an: der Leer- ist gefäßreicher als der gewundene Darm, daher ist er röther; mehrere Saugadern verbreiten sich in demselben, daher ist die hme des Speisefastes in ihm reichlicher; die Falten der Schleim- (Valvulae Kerkringianae,) sind in dem Leerdarm breiter liegen dichter an einander. Als künstliche Grenze nimmt man

an, daß der Leerdarm zwei Fünftel, der gewundene Darm drei Fünftel der Länge des ganzen dünnen Darmes betrage.

Schleimdrüsen, (Folliculi mucosi,) sieht man in der Schleimhaut am deutlichsten da, wo das Gekröse ansieht <sup>16</sup>. Peyer hieß für besondere Drüsen, und man nennt sie nach seinem Namen Peyersche Drüsen, (Glandulae Peyerianae. <sup>17</sup>;) es sind aber Schleimhöhlen, die an einigen Stellen in kleinen Häufchen beisammen liegen, und dadurch kenntlicher werden, als die andern kleinen Schleimdrüsen.

Die Arterien sind Aeste der obern mesenterischen Arterie, Venen gehen zu der mesenterischen Vene, und durch diese zu Pfortader. Die Nerven kommen von dem obern mesenterischen Geflecht.

Die Saugadern, welche sich in den Därmen verbreiten, wiewohl Milchgefäße, (Vasa lactea,) genannt, wegen der weißen Milch, welche sie haben, wenn sie mit Chylus angefüllt sind. Sie sind zahlreichsten in dem Zwölffingerdarm und dem Leerdarm; sie nehmen allmählig ab, je mehr der Darmcanal seinem Ende sich nähert. Mündungen liegen in den Flocken der Schleimhaut. Die kleinen vereinigen sich zu größern, die mit den Blutgefäßen die Haut der Därme netzförmig umgeben; sie gehen mit diesen, immer größere bildend, in das Gekröse, winden sich in den Saugaderdrüsen, Gekrösdrüsen, (Glandulae mesentericae,) genannt, spiralförmig zusammen, vereinigen sich zu kleinen, und diese zu größern Stämmchen, welche alle in dem Milchbrustgang sich endigen <sup>18</sup>.

2) Der weite, oder dicke Darm, (Intestinum ampullaceum, s. crassum,) unterscheidet sich von den dünnen Därmen durch folgende Eigenthümlichkeiten seiner Lage und seines Baues.

Er liegt in Form eines nicht ganz geschlossenen Kreises in dem tern größern Raum der Unterleibshöhle; er fängt in der rechten Hüfte beinegend an, geht in dem rechten Hypochondrium bis zu der Leber in die Höhe, unter dem Magen quer hinüber bis zu der Milz in das linke Hypochondrium, dann durch die linke Hüfte beinegend über das Hüftbein weg in die Höhle des kleinen Beckens, wo er sich als Mastdarm vor dem Kreuzbeine endigt; auf diese Weise umgibt er die andern Därme wie ein Kranz, diese liegen zwischen seinen Windungen in vielfachen Windungen herumgeschlungen.

Man unterscheidet an dem dicken Darm drei Theile: a) den Blinddarm, b) den Grimmdarm, c) den Mastdarm.

a) Der Blinddarm, (Intestinum caecum,) füllt die rechte Hüfte beinegend fast ganz aus, er fängt da an, wo der gewundene Darm mit der Grimmdarmklappe sich in ihm endigt, und geht genau bezeichnete Grenze in den Grimmdarm über, welcher von ihm aus in die Höhe steigt. Er ist der weiteste der Därme, und durch die Ausbreitung des Bauchfells und durch Zellgewebe ziemlich dicht an die hinter ihm liegenden Theile den innern Darmbein

16) Vgl. Roederer de morbo mucoso, tab. 3. fig. 3. Rudolphi physiol. Abhandl. Tab. 1. Fig. 1. 2. 17) Peyer ex deglandulis intestini, Schafhus. 1677.

18) Vgl. Christ. Bern. Albini descriptionum intestinorum tenuium hom. Lugd. B. 1722, 4. (1742, 8.)



und den Psoasmuskel befestigt; nach innen krümmen sich die  
Därme neben ihn in das kleine Becken hinab, nach außen  
über ihm die Bauchwand.

Nach unten und vorn ist er in Gestalt eines verschlossenen Sackes  
gehebt, (daher sein Name;) nach aufwärts geht er in den  
Dickdarm über; an der innern Fläche öffnet sich in ihm der ge-  
wundene Darm so, daß die Häute beider Därme unmittelbar in ein-  
ander übergehen. — Wo der gewundene Darm in die Höhle des Blind-  
darms hineintritt, bildet sich eine Klappe, die Grimmdarm- oder  
Blinddarmklappe, (*Valvula Bauhini*, s. *coeci*;) sie wird  
geöffnet, indem die Schleimhaut des gewundenen Darmes, welche  
dick ist, als die seröse und muskulöse Haut, durch die Oeffnung,  
durch welche diese zwischen sich lassen, in die Höhle des Blinddarms schräg  
hinaus nach außen, von oben noch abwärts sich hineinsenkt, und  
so ebenfalls längern hervorragenden Schleimhaut des Blinddarms  
Falten bildet, die eine längliche Spalte zwischen sich lassen, die  
geschlossen werden kann, wenn sich die untern Theile der innern Flä-  
che dieser Falten an einander legen. Die Enden der Klappen sind  
knorpelartig, und werden *Frenula Morgagni*, genannt.  
Die äußere seröse Haut des gewundenen Darmes geht ganz, die mus-  
kulöse Haut wenigstens größtentheils, ohne etwas zur Bildung der  
Haut beizutragen, in die gleichnamigen Häute des Blinddarms  
über, von der muskulösen Haut sieht man in stark muskulösen Kör-  
pern doch einige Fasern in die untere Falte hinabgehen <sup>19</sup>.

Auf der linken und hintern Fläche des Blinddarms ragt der wurm-  
artige Fortsatz, (*Processus vermiformis*, s. *vermicularis*,)  
hervor, und krümmt sich in verschiedenen Richtungen nach dieser oder  
jener Seite hin. Er wird als ein enger cylindrischer Canal, dessen  
stumpfe Ende verschlossen ist, von denselben Häuten gebildet,  
welche den Darmcanal umgeben, in der Schleimhaut liegen viele  
Drüsen, der in beträchtlicher Quantität abgesonderte Schleim  
tritt durch eine kleine Oeffnung nahe bei der Grimmdarmklappe  
in die Höhle des Blinddarms. Eine kleine dreieckige Falte des Bauch-  
felles ist eine Fortsetzung des Gefäßes, befestigt ihn an den Blinddarm.  
Die Eigenthümlichkeiten rücksichtlich der Bildung der Häute kom-  
men mit denen des Grimmdarms ganz überein <sup>20</sup>.

Der Grimmdarm, (*Intestinum colon*,) fängt von dem  
Dickdarm an, und endet an dem Mastdarm; er beschreibt einen  
Bogen, und man unterscheidet drei Theile desselben. Der aufstei-  
gende Grimmdarm, (*Intestinum colon ascendens*,) steigt  
auf der rechten Hüftbeingegend, vor der rechten Niere in die Höhe,  
bis zum rechten Leberlappen hin, hier macht er die erste Krüm-  
mung, (*Flexura coli dextra*,) und geht als querer Grimmdarm,  
(*Intest. colon transversum*,) neben dem concaven Rand

Vgl. Lieberkuhn diss. de valvula coli et usu process. vermicularis,  
1759, in Halleri diss. anat. T. I. p. 381, u. cur. J. Schel-  
lon Lond. 1782, 4., Heister diss. de valvula coli Altd. 1718, Hal-  
leri de valvula coli observ. Goett. 1741, in diss. anat. T. I., Roe-  
rer diss. de valv. coli Argent. 1768, c. lat. aer. inc. 20) Vgl. noch  
Vosse diss. de intestino caeco ejusd. append. vermic. Goett. 1742, 4.  
c. in Halleri coll. VIII. p. 157.)

des Magens weg in das linke Hypochondrium; es ist dieses der längste Theil des dicken Darms, seine obere Fläche ist zum Theil nach der untern Fläche der Leber, zum Theil gegen die große Krümmung des Magens zu gekehrt, an der untern Fläche liegen die dünnen Därme an die vordere convexe Krümmung ist das Mesenterium befestigt und unmittelbar vor ihr liegt die Bauchwand, an die hintere convexe Fläche befestigt sich das Grimmdarmgekröse. An dem untern Theil der innern Fläche der Milz macht der Grimmdarm die zweite Krümmung, (*Flexura coli sinistra*), und geht nun als absteigender Grimmdarm, (*Intest. colon descendens*.) über die innere Fläche des linken Darmbeins hinab; indem es sich über dessen untern Theil in die Höhle des kleinen Beckens hineinkrümmt, macht es eine starke Krümmung, welche man die Hüftbein- oder S förmige Krümmung, (*Flexura iliaca*, oder *S romanum*.) nennt.

Die äußere Haut des dicken Darmes ist eine seröse Haut, welche von der Bauchhaut kommt, deren Fortsetzungen, die zur Befestigung des Darms dienen, den Namen Grimmdarmgekröse, (*Mesenterium colon*.) und Bänder, (*Ligamenta*.) erhalten. Aber nicht so wie die dünnen Därme werden die dicken in ihrem ganzen Umfange auf einen kleinen Streifen von dieser Haut überzogen, sondern bleibt an den meisten Stellen eine breitere Fläche unbedeckt, die mit Zellgewebe überzogen ist. Es sind auch die Fortsetzungen der Bauchhaut, welche zur Befestigung dieses Darms dienen, kürzer als die, welche zu den dünnen Därmen gehen, es ist daher der Grimmdarm nicht so beweglich, als diese Därme. Nach den verschiedenen Theilen des Grimmdarms ist eben sowohl der Umfang des Ueberzugs durch die Bauchfell, als die Beweglichkeit verschieden. Der Blinddarm ist größtentheils überzogen; nur ein kleiner Theil der hintern Fläche bleibt frei, welcher durch Zellgewebe an den innern Darmbeinmuskel befestigt wird. Der aufsteigende Grimmdarm ist nur an seiner vordern Fläche von dem Bauchfelle bedeckt, die hintere Fläche wird durch Zellgewebe an den innern Darmbeinmuskel, an den Psoasmuskel und die vordere Fläche der rechten Niere befestigt. Der quere Grimmdarm ist von dem Bauchfelle fast ganz überzogen, nur an der hintern Fläche bleibt ein schmaler Streifen frei, wo die beiden Platten des Grimmdarmgekröses nicht ganz dicht an einander liegen. Der absteigende Theil des Grimmdarms wird, eben so wie der aufsteigende, von dem Bauchfelle überzogen, und Zellgewebe befestigt seine hintere Fläche an die linke Niere, den innern Darmbein- und Psoasmuskel. — Indem das Bauchfell von den Krümmungen des Grimmdarms aus zu den benachbarten Theilen hingeht, entstehen Falten, welche man Bänder, (*Ligamenta*.) nennt; diese sind: das *Ligamentum coli hepaticum*, an der rechten Krümmung zu der Leber, das *Ligamentum coli lienale*, von der linken Krümmung zu der Milz.

Von der äußern Fläche dieser serösen Haut hängen viele kleine haarförmige Verdopplungen herab, die mit einem gelblichen, halbfestigen Fett angefüllt sind; sie gleichen kleinen Nesen; man nennt sie *Fettanhänge*, (*Appendices epiploicae*, s. *adiposae*.) An dem



ren Grimmdarm ist das große Netz zum Theil befestigt, und hängt ihm aus vor den dünnen Därmen herab.

Die muskulöse Haut weicht durch die eigene Beschaffenheit ihrer glatten Muskelfasern von dem Bau der muskulösen Haut der dünnen Därme sehr ab. Denn

11) liegen die länglichten Muskelfasern nicht rings um den Darm herum, sondern dicht neben einander in drei Strängen vereinigt, welche schmalen Bändern gleichen, die man Bänder des Grimmdarms, (*Ligamenta coli*,) nennt. Sie fangen von dem wurmförmigen Fortsatz an, und endigen sich an dem Mastdarme, wo die einzelnen Fasern wieder aus einander treten, und sich gleichmäßig verbreiten. Eines dieser Bänder liegt da, wo das Gefröse sich ansetzt; das andere, wo das große Netz sich an den Grimmdarm befestigt; das dritte liegt nach den dünnen Därmen zu, ohne mit einem nachbarten Theil verbunden zu seyn.

12) Die länglichten Muskelfasern sind viel kürzer als die Häute des Darms, daher werden diese durch die muskulösen Stränge, welche hier gespannt sind, der Länge nach zusammengezogen; so entstehen kistförmige Hervorragungen auf der äußern Fläche der dünnen Därme und in der Höhle diesen entsprechende zellartige Vertiefungen, (*Cellulae, Loculamenta*,) und der Darm ist nicht so eng als er seyn würde, wenn sich seine Häute ganz ausdehnen könnten.

Die kreisförmigen Muskelfasern sind eben so beschaffen, wie die der dünnen Därme.

Auf der innern Fläche der Schleimhaut ragen nicht so viele Flocken, (*Alvi*,) hervor, als bei den dünnen Därmen; es verbreiten sich in den dünnen nicht so viele Gefäße, und die Falten, (*Valvulae conniventes*,) sind der Weite des Darmes gemäß zwar breiter, allein weiter voneinander entfernt, als in den dünnen Därmen, so daß sie verhältnißmäßig die Schleimhaut des dicken Darmes doch nicht so viel verengen, als dieses durch die ähnlichen Falten bei dem dünnen Darm der Fall ist.

Die Weite des dünnen Darmes zu der des dicken soll sich auf folgende Weise verhalten: wenn der Durchmesser des dünnen Darmes maßig ausgedehnt 1 Zoll beträgt, so soll der des dicken  $2\frac{1}{2}$  Zoll betragen.

Der Blinddarm erhält sein Blut aus der ileo-colischen Arterie, der aufsteigende Grimmdarm aus der rechten, der quere Grimmdarm aus der mittlern, der absteigende aus der linken Colonarterie. Das Blut kehrt durch Venen zurück, welche mit den Arterien gleiche Namen haben, und die sich sämmtlich in die mesenterische Vene vereinigen. — Die Nerven kommen aus dem obern und untern mesenterischen Geflechte.

13) Der Mastdarm, Afterdarm, (*Intestinum rectum*,) ist das unterste Stück des Darmcanals, welches da anfängt, wo der aufsteigende Grimmdarm in der S-förmigen Krümmung über die innere Fläche des Darmbeins sich herumbiegt, und auf die vordere Fläche des letzten Lendenwirbels legt; von hier geht er dann in den hintern Theil der Beckenhöhle vor über die vordere Fläche des Kreuz-

Knorpels, Anfangs etwas schief von links nach rechts, dann fast gerade von oben nach unten, aber nach der Höhlung des Kreuzbeins gekrümmt, nach hinten zu convex, nach vorn zu etwas concav gegen bis zu dem letzten falschen Wirbels des Coccyxknorpels hin, wo er sich mit dem After endigt. — An den beiden Seitentheilen liegt lockeres Zellgewebe und Fett der Beckenhöhle, unter diesem all weiter nach außen zu liegen die Beckengefäße, das Beckengeflecht, Nerven und die Sacralnerven, der Aufhebemuskel des Afteres. — Die Theile, welche vor dem Mastdarm, zwischen ihm und der hinteren Fläche der Schambeinvereinigung liegen, sind nach dem Geschlechte verschieden. In dem männlichen Geschlechte liegt vor dem obern Theile die Harnblase, aber nicht mit demselben vereinigt, sondern durch das Bauchfell getrennt, welches sich zwischen diese beiden Theile so einlegt, daß es ungefähr den dritten Theil der vorderen Fläche des Mastdarms und den größten Theil der hinteren Fläche der Harnblase überzieht; weiter hinabwärts ist die vordere Fläche dieses Darms mit dem Zellgewebe mit dem dreieckigen Theil der hinteren Fläche der Harnblase verbunden, welcher zwischen beiden Samenbläschen liegt, nach den Seiten zu liegt sie an der hinteren Fläche dieser Bläschen; vor dem untersten Theil der vorderen Fläche liegt die Prostata, vor dieser der Hals der Harnblase und der Anfang der Harnröhre. — In dem weiblichen Körper liegt vor dem obern Theil des Mastdarms die Gebärmutter, welche eben so wie die Harnblase durch das Bauchfell mit ihm getrennt ist; vor dieser liegt die Harnblase, der untere Theil der vorderen Fläche aber ist mit der hinteren Fläche der Mutterscheide durch ein Gewebe von Gefäßen und Zellgewebe verbunden.

Die Oberfläche des Mastdarms ist glatt und eben, man bemerkt auf ihr nicht die wulstförmigen Erhabenheiten, wie bei dem Grimmdarm, denn die länglichten Fasern der muskulösen Haut bilden nicht einzeln straff angezogene Stränge, welche bei diesen Därmen die Häute zusammenziehen und verkürzen. — Er ist regelmäßiger cylindrisch, als der Grimmdarm, gewöhnlich enger als dieser; doch kann er beträchtlich erweitert werden, und sein unteres Ende ist gemeinlich etwas ausgedehnt.

Es wird dieser Darm nicht, so wie die meisten Därme, durch einen vollständigen Ueberzug von dem Bauchfelle in den Sack, nach dem dieses bildet, hineingezogen, sondern er liegt größtentheils außerhalb desselben, und von Zellgewebe umgeben.

Die Häute, welche den Mastdarm bilden, weichen rücksichtlich ihrer Structur von denen der übrigen Därme so ab, daß dieses Ende des Darmcanals, dem Anfange desselben, dem Schlund und der Speiseröhre wieder ähnlicher wird.

a) Eine seröse Haut findet sich nur an einem kleinen Theil des Mastdarms; allein die vordere Fläche ist von einer Platte des Bauchfelles bedeckt, und auch diese nicht ganz, sondern nur vom Anfange desselben, von dem letzten Lendenwirbel an, bis zu dem zweiten oder dritten falschen Wirbel des Kreuzknorpels hinab. So weit geht das Bauchfell in die Beckenhöhle hinein, kommt hier mit der Platte zusammen, welche im männlichen Geschlechte die hintere Fläche der Harnblase, im weiblichen dieselbe Fläche der Gebärmutter üb



cht, und bildet auf diese Weise in jeder Seite eine Falte, (*Plica milunaris Douglasii*,) welche eine Höhle oder sackförmige Vertiefung zwischen den genannten Theilen an den Seitentheilen ließt. Die ganze hintere Fläche und ungefähr zwei Dritttheile des ungen Mastdarms sind ohne seröse Haut, als äußerste Decke und ist Zellgewebe überzogen, wie die Speiseröhre.

β) Die Fleischfasern der muskulösen Haut sind stärker als die der Därme; die länglichten Muskelfasern liegen nicht wie bei dem Grimmdarme in einzelne Stränge zusammengedrängt, sondern rings um den Darm herum, dicht an einander, indem die Fasern, welche diese Stränge bilden, da wieder aus einander treten, wo der Mastdarm anfängt; daher kommt es, daß in diesem sich weder wulstförmige Hervorragungen, noch Zellen bilden. — Die circulären Muskelfasern sind auch stärker, sie liegen desto näher und dichter an einander, je mehr sie sich dem After nähern, und in diesem die Schließmuskeln, (*Sphincteres ani*,) bilden. Beim Anfange des Mastdarms ist die Farbe der Muskelfasern noch blaßröthlich, sie wird nach und nach dunkler roth, bis sie in den Schließmuskeln die Röthe der Muskeln erreicht, die dem Einfluß des Willens ganz oder doch größtentheils unterworfen sind. Auch hierin gleicht das Ende des Darmcanals dem Anfange desselben, wie die Muskelfasern des Schlundes und der Speiseröhre sind auch die des Mastdarms röther und stärker als die der Därme, und wenigstens größtentheils nur mit Zellgewebe umgeben.

γ) Die Schleimhaut des Mastdarms ist etwas stärker, als die der übrigen Därme, gegen den After zu vorzüglich röther; Falten (*valvulae Kerkringii*,) bildet sie nicht, weil die länglichten Muskelfasern nicht kürzer sind, als die innere Haut, und diese daher überall gleichmäßig an jenen anliegt; nur nahe am After liegt eine ringförmige Falte, (*Plica annularis*,) die um so mehr in den Darm hineinragt, je mehr derselbe durch die länglichten Muskelfasern verkürzt wird; geschieht dieses, so bilden sich noch mehrere kreisförmige Falten über einander; auch findet man hier und da eine kleine halbmondförmige Falte, die kleine Höhlen bilden, in welchen viele Oeffnungen von Schleimdrüsen liegen. Statt dieser kreisförmigen Falten zeigen sich oben der Länge nach heruntergehende Falten, die gegen den After zu mehr hervorragen und dichter an einander liegen, (*Columnae intestini recti*.) Viele Schleimdrüsen liegen in dem Zellgewebe unter dieser Haut, die Oeffnungen derselben auf der innern Fläche sind zahlreich, und man sieht sie besonders deutlich in der Nähe des After.

Der Theil des Mastdarms, welcher in der Höhle des Bauchfells liegt, wird durch eine Falte des Bauchfells, welche mit dem Gefröse des Grimmdarms zusammenhängt, befestigt; man nennt diese Falte, das Gefröse des Mastdarms, (*Mesorectum*.) Den untern Theil des Mastdarms befestigen die beiden Seitenfalten (*Plicae semilunares Douglasii*,) vorzüglich aber das Zellgewebe, welches ihn mit dem Kreuzknochen, der Harnblase und Prostata, oder der Muthscheide verbindet.

Im Verhältniß zu seiner Größe erhält der Mastdarm viele Blutgefäße. Die Arterien sind theils Aeste der untern mesenterischen

Arterie, theils der hypogastrischen Arterien. Von jener kommt die innere Hämorrhoidalarterie für den obern Theil, aus diesen kommen die mittlern und untern Hämorrhoidalarterien für den mittlern und untern Theil des Darmes.

Die Venen gehen als Aeste, welche mit den Arterien gleichen Namen haben, theils in die linke Colonvene, theils in die hypogastrische Vene.

Die Saugadern gehen in den hypogastrischen Plexus.

Die Nerven kommen aus dem hypogastrischen Plexus, eine Aeste für den untersten Theil des Mastdarms aus den Sacralnerven. Ueber die Geschichte der Bildung dieser Theile und den Verlauf desselben im Embryo s. den Artikel Embryo.

Die Bestimmung des Darmcanals ist: die Nahrungsmittel aufzunehmen, fortzuleiten, die Verdauung zu bewirken, den Chylus abzuscheiden und den Saugadern eine große Oberfläche zur Aufnahme des Nahrungsaftes darzubieten. Dazu dient die langsame Bewegung der Därme von oben nach unten, oder die peristaltische Bewegung derselben, die durch die eigenthümliche Reizbarkeit der Muskelhaut der Därme ununterbrochen unterhalten wird; durch diese Bewegung, die Wärme, die Beimischung des pancreatischen Saftes dem Zwölffingerdarm, und die Flüssigkeit, welche in den Därmen selbst abgesondert wird, (Succus entericus,) wird die Verdauung und Veräuhlichung bewirkt; die in den Zwölffingerdarm ergossene Galle scheidet den Chylus aus dem Chymus ab, und befördert durch Beimischung ihres lymphatischen Theils die Veräuhlichung, so wie durch Verbindung ihren andern färbenden Bestandtheile dem Darmabgang die gelbliche Farbe gibt, und die peristaltische Bewegung fördert. Der Schleim, welchen die Schleimdrüsen absondern, überzieht die innere Fläche der Därme und schützt sie gegen schädliche Einflüsse; der Schleim, welcher sich aus dem wurmförmigen Anhang in den Blinddarm ergießt, scheint insbesondere bestimmt zu seyn den Durchgang der Darmunreinigkeiten zu befördern, und die Grimmdarmklappe soll den Rücktritt dieser Unreinigkeiten in die dünnen Därme verhüten. Ueber die Vorgänge bei der Verdauung und Veräuhlichung oder Assimilation der Nahrungsmittel s. aber, nach mehreren die einzelnen hierher gehörigen Gegenstände betreffenden Artikeln, den Artikel Verdauung. (Seiler.)

Darmende des Magens, s. Pylorus. — excretion, s. Darmausleerung. — fell, s. Peritonäum. — fortsäge, s. Diverticulum am Darmcanal. — häute, s. Häute des Magens und der Därme. — canal, s. Darmcanal. — Klappe, s. Bauhinische Klappe.

Darmkoth<sup>1</sup>, Darmunrath, Menschenkoth<sup>2</sup>, Excremente<sup>3</sup>, Unrath<sup>4</sup>, Abgang<sup>5</sup>, Koth<sup>6</sup>, Unflath, Stuhlgaug<sup>7</sup>, Stühle, (Faeces, Feces,<sup>7</sup> Excrementa<sup>8</sup>, Faex, s. Fex alvina<sup>9</sup> Faeces, s. Feces alvi<sup>10</sup>, s. alvinae<sup>11</sup>, Stercora<sup>12</sup> alvinae)

1) Mayer's Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 301.

2) 3) John's An

Tabell. d. Thierreichs, S. 8.

4) — 6) Edmerring's Eingeweide

S. 132.

7) 8) J. Bapt. Montani l. 2 de excrementis, und

de fecibus, alter de urinis, Patav. 1554. 9) 10) Halleri ele

physiol. T. VII. l. 24. s. 4. §. 2 et 10. 11) Stahl theoria med. H

1708, p. 351.

12) Halleri el. phys. l. c. §. 5.



ercus humanum <sup>13</sup>, Excrementa alvina <sup>14</sup>, Excrementum  
vinum <sup>15</sup>, Excreta, Excretiones per alvum, Onera alvi <sup>16</sup>,  
apuritates alvinae <sup>17</sup>, Egesta <sup>18</sup>, s. Dejecta <sup>19</sup> alvina, Re-  
ementa <sup>20</sup>, s. Purgamenta alvi <sup>21</sup>, Sordes ventris <sup>22</sup>, Alvus <sup>23</sup>,  
sulphur occidentale <sup>24</sup>, Zibethum occidentale <sup>25</sup>, Oletum  
humanum <sup>26</sup>, Merda <sup>27</sup>, Homerda <sup>28</sup>, Aphodos <sup>29</sup>, Apho-  
um <sup>30</sup>, Apopathesis <sup>31</sup>, Apopathema <sup>32</sup>, Carbon huma-  
um <sup>33</sup>, Copros <sup>34</sup>, Diachorema <sup>35</sup>, Perittoma <sup>36</sup>, Scybala <sup>37</sup>.)

Die verkleinerten Speisen werden im Magen durch Zumischung  
des Mund- und Eingeweidespeichels, des Magensaftes weiter  
den dünnen Gedärmen durch beigemischte Galle, und Darmsaft  
Chymus verwandelt, worin der Eiweißstoff schon vorherrscht.  
Nachdem daraus der Chylus abgesondert ist, und der Rest seinen  
Weg durch die dicken Gedärme genommen hat, kommt er, schon in  
Fäulniß begriffen, als Auswurfstoff, (bei den Säugethieren, Fäul-  
wier und Viber ausgenommen, ohne Urin, bei den Vögeln mit die-  
sem vermischt,) im Mastdarm an. Seine Fäulniß ist hier so weit  
vorge schritten, als sie ohne atmosphärischen Einfluß durch eigne Be-  
standtheile kommen kann; einige derselben (Schwefelwasserstoff,) son-  
dern sich luftförmig ab, andere und die meisten geben den festern  
Zustand, oder eigentlichen Darmkoth. Wir müssen in seinen Be-  
standtheilen diejenigen als beständig annehmen, welche sich von den  
beigemischten Säften der Eingeweide herschreiben, und diejenigen als  
flüchtig, welche den Rest der Speisen ausmachen. Aus der Gleich-  
zeit der Speisen der Thiergeschlechter resultirt eine Gleichheit und Be-  
ständigkeit ihres Darmkoths, und eine Verschiedenheit mit dem an-  
dern Geschlechter. Daher die verschiedene Farbe des Darmkoths der  
Menschen, des Hornviehes, der Pferde, Schweine, Marder, Vögel  
u. s. w., seine verschiedene Festigkeit, sein verschiedener Geruch. Im  
gemeinen ist die Farbe zwischen braun und grün, und desto grüner  
oder schwärzer, je stärker sich Galle beimischte, oder je länger der  
Koth im dicken Darne verweilte, heller bis zum grauweißen beim  
Mangel der Galle, (in der Gelbsucht.) Doch scheint der Hund davon  
eine Ausnahme zu machen. In der Festigkeit steht der Koth der Hunde  
und Marder zuerst, dann folgt der von Menschen, noch weicher fin-  
det er sich bei dem Pferde, bei dem Hornvieh, sehr weich bei den  
Schweinen u. s. w. Der Geruch ist meist widrig, und von der Ent-  
wickelung des Schwefelwasserstoffs stinkend; doch finden sich auch hier  
Modifikationen, wovon der Koth des Hornviehes, der nach Wisam  
schmeckende vom Marder, der als Leckerbissen bekannte Darmkoth der  
Schneppen Beispiele geben. Die chemische Untersuchung des Koths

- 13) C. Mett 12. 14) — 19) Schurig chylologia c. 9. §. 3. 20)  
Stahl theor. med. 1. c. 21) Fr. Hoffmann med. rat. syst. T. I.  
1. 2. c. 3. 22) Gruneri semiotice pars 2. subsect. 7. §. 511. 23)  
Celsi de med. 1. 2. c. 3. 24) nach Theophrastus Paracelsus. Vgl.  
Dan Becker microcosm. med. 1. 1. c. 10. 25) 26) C. Moys. Charas  
pharmacop. chymic. Genev. 1683, 1. 2. p. 167. Vgl. Decidantalischer  
Zibeth. 27) Horatii sat. 1. 1. sat. 8. v. 38. 28) v. der Lin-  
den meletem. Hipp. med. physiol. §. 115. 29) — 36) C. diese Ar-  
tikel. 37) verhärteter Darmkoth. Halleri el. physiol. 1. c. c. 10.

verdankt man zuerst Gombert<sup>38</sup> und Bridet<sup>39</sup>, später haben sich damit folgende beschäftigt: Berzelius<sup>40</sup> fand im menschlichen Kot 73,3 Wasser, 5,7 auflösliche Stoffe, bestehend aus 0,9 Galle, Eiweißstoff, 2,7 Extractivstoff und 1,2 kohlensaurem, salzsaurem, schwefelsaurem, phosphorsaurem Natrum, Bittererde und Kalksalze die übrigen Bestandtheile, welche bei dem Durchsiehen der mit Wasser ausgezogenen auf dem Tuche zurückblieben, waren Galle, Darm Schleim, faserige Reste der Speisen und thierischer Stoff. Ein Hof gibt vom Darmkoth der mit Rübenblättern gefütterten Rühre folgende an. Er war 1,045 spec. schwer, gelbgrün, von Moschusgeruch zeigte keine freie Säure, gab durch Destillation aus dem Wasserbad 71,875 wässerige Flüssigkeit und 28,225 feste Masse. Schwefelsäure entwickelte daraus Essig, oxydirte Salzsäure zerstörte seine Farbe. Uebrigens lieferte er Pflanzenfasern, thierischen Stoff, Galle, phosphorsaure und salzsaure Kali und Kalksalze. Der Koth der Vögel enthält zugleich den Harn und eine große Menge Kalksalze. Nach v. Humboldt's Nachrichten finden sich auf den Flotsinseln bei Peru mächtige Lager solchen Kothes, Guano genannt, unter der Dammerde von Vögeln und Phönicoptern abgesetzt. Dieser Guano verbreitet seinen ammoniakalischen Geruch zu einer Viertelmeile weit, besteht nach Baquelin<sup>42</sup> aus Harnsäure, Harn und sauerklee-saurem Kali und Ammonium, zu denen sich noch eben solche phosphorsaure, schwefelsaure und salzsaure Salze gesellen; außerdem enthält er etwas Fettigkeits, Quarz und Eisensand. (Ficinus.)

38) Mem. de l'Acad. Roy. des Sciences de Paris 1711.

39) Biblioth.

que physico-économique Ann. 1790 et 1792.

40) Im neuen allg.

nen Journal der Chemie, VI. 509.

41) in Hermbstadt's Archiv f.

Agriculturn-Chemie, 1. B. S. 255.

42) Ann. du Museum d'hist.

turell. T. XVII. p. 310.

**Darmpulsadern**, s. Intestinalarterien. — **rohr**, s. Darmcanal. — **säft**, s. Enterischer Saft. — **schlagadern**, s. Intestinalarterien. — **schleim**, s. unter Enterischer Saft. — **schwarz**, s. Vermicularproceß des Blinddarms. — **sinn**, s. unter All.

**Darmstück des Hüftknochens**<sup>1</sup>, Hüftstück des Hüftknochens<sup>2</sup>, Hüftbein<sup>3</sup>, Hüftknochen<sup>4</sup>, Darmbein<sup>5</sup>, Hüftknochen<sup>6</sup>, Hüfte<sup>7</sup>, (Ileum<sup>8</sup>, Os ileum<sup>9</sup>, s. ilium<sup>10</sup>, s. ilei<sup>11</sup>, s. ilii<sup>12</sup>, s. coxae<sup>13</sup>, s. lumbare<sup>14</sup>, Scaphium<sup>15</sup>, Os cernium<sup>16</sup>, s. clavium<sup>17</sup>, Collum, s. Dorsum<sup>18</sup> coxendic, Ancha<sup>19</sup>), der obere und hintere ansehnlichste Theil des Hüftknochens, welcher mit seinem untern dickern Ende mit dem Schooß- oder Sitzstücke desselben Knochens in Verbindung steht, nach oben aber eine breitere nach innen ausgehöhlte Fläche darstellt, und die obere Seite

1) Sommering's Knochenl. S. 415.

2) Meckel's Handb. d. menschl.

Anat. 2. B. S. 732.

3) Monro's Knochenl. übers. v. Krause,

306, Note.

4) Blumenbach's Besch. d. Knoch. S. 261.

5) Ruyss anat. Tabellen, Tab. 5.

6) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2.

S. 175.

7) Monro's Knochenl. a. a. O.

8) Heisteri comp.

ed. 2. p. 31.

9) Schaarschmidt's osteol. Tabell. Tab. 38, Nr.

10) Vesalii de h. c. fabr. l. 1. c. 29.

11) Leberi praelect. anat.

nov. Vind. 1776, p. 70.

12) Winslow exp. an. lat. v. T.

tr. de oss. sicc. S. 577.

13) — 17) Monro's Knochenl. u. s. w. a. a.

18) eigentlich die Außenseite, so wie die entgegengesetzte dann Costa. S. S.

gelii de h. c. fabr. l. 2. c. 24.

19) Monro's Knochenl. a. a.



and des Beckens ausmacht, so wie er nach oben und außen die Hüfte bedet, und mit dem gegenseitigen Darmstücke einem großen Theile der Gedärme zur Unterlage dient. S. Hüftknochen.

**Darmsystem**, s. Verdauungssystem. — **unrath**, s. Darmkoth. — **venen**, s. Intestinalvenen. — **Zotten**, s. Zotten der Därme. — **Darti**, s. Säcke der Dartos.

**Dartos**<sup>1</sup>, (*Dartos*<sup>2</sup>, *Dartos tunica*<sup>3</sup>, *Dartus*.) Hodenhaut<sup>4</sup>, Fleischhaut<sup>5</sup>, oder Innere, oder Röhrlche Haut<sup>6</sup> des Hodensacks, oder Gailensacks, Muskulöser Beutel<sup>7</sup>, oder Lederner Umschlag des Hodens<sup>8</sup>, Fleischiges Stück vom Beutel<sup>9</sup>, (*Membrana carnea*<sup>10</sup>, s. *Tunica muscularis*, s. *coriabilis*<sup>11</sup>, s. *rubicunda*<sup>12</sup> *scroti*, *Tunica erythroides*<sup>13</sup>, *sarsupium musculosum*<sup>14</sup>.) die unmittelbar unter der äußern Haut des Hodensacks unterscheidbare, aus dichtem Zellgewebe bestehende, und mit vielen feinen Blutgefäßen, auch Nerven, durchzogene Haut, der von mehreren ältern Anatomen, (wiewohl mit Unrecht,) ein muskulöser Bau beigelegt wurde, (worauf auch mehrere obige Bezeichnungen hindeuten,) obgleich sie auf eigne Reize einer Zusammenziehung fähig ist. Indem sie in der Mitte, besonders unterwärts, eine Scheidewand bildet, entstehen zwei besondere Säcke der Dartos. (Vgl. diesen Artikel.) S. unter Genitalien des männlichen Geschlechts, *Scrotum*.

1) Mayer's Beschr. d. menschl. K. 5. B. S. 92. 3) nach dem Griechischen Worte *dartos*. Rufi de appell. part. c. h. in Stephani dict. med. 1564, p. 544, dem Wortsinne nach abgehäutet, weil sie sich leicht von den übrigen Häuten des Hodens absondern läßt. S. auch Winslow exp. anat. lat. vers. T. IV. p. 1. ix. de abdom. §. 499. 5) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. §. 2219. 4) Haller's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v. Leveiling, 2. Th. §. 860. 5) Mayer's Beschr. u. s. w. a. a. D. 6) Palfyn's chir. Anat. übers. v. Huth, 2. Th. S. 155. 7) — 9) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1753, 4. B. S. 619 u. 621. 10) Vesalii de c. hum. fabr. l. 5. c. 13. 11) wörtliche Uebersetzung von *dartos*. Spigelii de h. c. fabr. l. 8 c. 17. 12) in Uebersetzung der folgenden Benennung, s. ebendas. 13) s. ebendas. auch Th. Bartholini anat. l. 1. c. 21. 14) Winslow exp. an. etc. l. c. §. 491.

**Daum**<sup>1</sup>, **Daumen**<sup>2</sup>, (*Pollex*<sup>3</sup>, *Allus pollex*<sup>4</sup>, *Mannus parva majori adjutrix*<sup>5</sup>, *Digitus primus*<sup>6</sup>, s. *magnus*<sup>7</sup>, *Anticheir*<sup>8</sup>, *Promanus*<sup>9</sup>.) der durch seine Stärke und Kürze sich vorzüglich vor den übrigen auszeichnende erste Finger der Hand, welcher zugleich durch mehrere ihm eigne Muskeln einer vorzüglich freien Beweglichkeit und Kraftäusserung fähig, und indem er den übrigen Fingern gleichsam entgegengesetzt ist, bei der den Fingern eignen Function des Greifens vorzüglich wirksam ist. S. Hand.

1) Mayer's Beschr. d. menschl. K. 1. B. S. 144. 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. §. 781. 3) quasi digiti pollentior. Horatii epod. 5. v. 47. 4) von Festus (de veter. verbor. significatione l.) gebraucht. 5) Albini de skeleto 6, p. 465. 6) Th. Bartholini anat. libell. 4. c. 1. 7) Monro's Knochent. übers. v. Krause, S. 421, Note. 8) gleichsam Gegenhand, vgl. dies Wort. 9) Uebersetzung des vorlgen Worts. Spigelii de h. c. fabr. l. 1. c. 5.

**Daumenabductoren**, s. Abductoren des Daumens.

**Daumenabductor'schleimsack**, (*Bursa mucosa abductoris*

pollicis<sup>1</sup>.) Schleimsack des abziehenden Muskels am Daumen<sup>2</sup>, der zwischen der Sehne dieses Muskels und dem Radius findende Schleimsack. S. Schleimsäcke.

1) 2) nach Fischer (Anweis. zur Zergliederungskf. 1. Th. S. 163.)

**Daumenadductor**, s. Abductor des Daumens. — **arterie** s. Pollicararterien. — **ballen**, s. unter Faust. — **beuger**, Flexoren des Daumens. — **blutadern**, s. Pollicarvenen. — **extensoren**, s. Extensoren des Daumens.

**Daumenextensorschleimsäcke**, (Bursae mucosae extensor pollicis longi,) Schleimsäcke des langen Streckmuskels des Daumens.) Als solche werden a) ein oberer<sup>1</sup>, (superior<sup>2</sup>, und b) ein unterer<sup>3</sup>, (inferior<sup>4</sup>,) unterschieden, wovon der erste neben der Sehne des gedachten Muskels liegt, und mit dem äußeren gemeinschaftlichen untern Schleimsack der Speiche Gemeinschaft hat, der andere aber zwischen der Sehne und dem Mittelhandknochen sich befindet. S. Schleimsäcke.

1) — 4) nach Fischer (Anweis. zur Zergliederungskf. 1. Th. S. 164.)

**Daumenflexoren**, s. Flexoren des Daumens.

**Daumenflexorschleimsäcke**, (Bursae mucosae flexoriae pollicis.) Als solche sind zwei unterscheidbar: a) ein äußerer Schleimsack des langen Beugemuskels des Daumens<sup>1</sup>, (Bursa mucosa flexoria pollicis externa<sup>2</sup>,) der fast die ganze Sehne dieses Muskels bei seiner Insertion am trapezischen Knochen scheidentig umgibt, b) ein mittlerer Schleimsack<sup>3</sup>, (B. m. flexoria media<sup>4</sup>,) der hinter der Sehne des langen Flexors des Daumens liegt und zugleich alle Sehnen des Flexors der Finger umgibt. S. Schleimsäcke.

1) — 4) nach Fischer (Anweis. zur Zergliederungskf. 1. Th. S. 162.)

**Daumenklopfer**, s. Thenar. — **nerven**, s. Pollicarnerv. — **pulsz** oder **schlagadern**, s. Pollicararterien. — **strecker**, Extensoren des Daumens. — **venen**, s. Pollicarvenen.

**Daunung**, s. Verdauung.

**Daunungsorgane**, s. Digestionsorgane. — **system**, s. Verdauungssystem.

**Dearticulatio**, s. Diarthrose.

**Decidua**, (*Decidua Hunteri*, *Decidua membranacea reflexa*, *Decidua membrana uteri*,) s. Hunterische Membran.

**Decidui dentes**, s. Milchzähne.

**Decke der Augenhöhle**, s. Gewölbe der Augenhöhle.

**Decken des Körpers**, s. Integumente des Körpers.

**Declamatio**, s. Laute Rede.

**Declinatio**, s. Neigung. — **pelvis**, s. Beckendeclination.

**Declination der Ure des Beckens**, s. Beckendeclination.

**Decoloratio**, s. Erblässen.

**Decompositio**, s. Zersetzung.

**Decor**, s. Anständigkeit.

**Decrementum virium et corporis**, s. Abnahme der Kräfte und des Körpers.

**Decrepita aetas**, **Decrepitudo senum**, s. Hinfälliges Alter.



*Decrepitus homo*, s. *senex*, s. Hinfälliger Greis.

*Decretorii anni*, s. Stufenjahre.

**Decussation**, (*Decussatio*<sup>1</sup>.) Kreuzen<sup>2</sup>, Kreuzigung<sup>3</sup>, Kreuzung, Kreuzigung, Kreuzung, Durchkreuzung, Chiasma<sup>4</sup>, (*Chiasma*<sup>5</sup>, *Chiasmus*<sup>6</sup>.) einander entgegengesetzte Richtung von Fibern, oder fibrösen Theile, indem die einen in Art von Kreuzlinien über die andern weglaufen. Vgl. Fibern.

1) nach Vitruv das Durchschneiden zweier Platen in Form einer Römischen Sehne (de architectura, l. 1. c. 6)

2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2964, Note f.

3) Heuermann's Physiol. 2. Th. S. 236.

4) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2964.

5) 6) S.

diese Worte.

**Decussation der Sehnerven**, (*Decussatio nervorum optitorum*<sup>1</sup>.) Kreuzung oder Durchkreuzung<sup>2</sup>, oder Durchkreuzung<sup>3</sup>, oder Zusammenstoßung<sup>4</sup>, oder Union<sup>5</sup>, oder Vereinigung<sup>6</sup>, oder Intricatur<sup>7</sup>, oder Antage<sup>8</sup>, oder Anlein- oder Unterlage<sup>9</sup> der Sehnerven, (*Incruciatio*, s. *Intersectio*<sup>10</sup>, *Unio*<sup>11</sup>, s. *Cópula*, s. *Coitus*<sup>12</sup>, s. *Nexus*<sup>13</sup>, s. *Conplexio*<sup>14</sup>, s. *Congressus*<sup>15</sup>, s. *Coalitus*<sup>16</sup>, s. *Contactus*<sup>17</sup>, s. *Conjunctio*<sup>18</sup>, s. *Confusio substantiae*<sup>19</sup>, s. *Chiasma*<sup>20</sup>, *Chiasmus*<sup>21</sup>, s. *Intricatura*, s. *Appositio*<sup>22</sup>, s. *Juxtapositio*<sup>23</sup> *nervorum optitorum*.) die innige Verbindung der beiden Sehnerven, nachdem sie völlig ausgebildet aus dem Gehirn hervorgetreten sind, in der Mitte der Basis des Gehirns, unmittelbar vor dem Infundibulum, von wo aus sie dann wieder in divergirender Richtung, also jeder besonders nach dem optischen Loch in jeder der beiden Augenhöhlen zu, ihren Fortgang nehmen, und daselbst in die Organisation eines jeden Augapfels selbst eingehen. Obiger Name wird schon durch das äußere Ansehen gerechtfertigt, welches die Form eines Kreuzes zeigt, noch mehr aber durch neuere Beobachtungen, nach denen bei mehreren Thieren unbestritten eine wirkliche Kreuzung der Nerven sich zeigt, so daß der links aus dem Gehirn tretende Nerv in das rechte, der rechts daraus hervorgehende aber in das linke Auge gelangt, im menschlichen Auge aber eine solche wirkliche Kreuzung wenigstens theilweise Statt hat. Daraus, daß der Gegenstand lange als ein controverser behandelt worden ist, sind obige zum Theil sehr

1) Tr. N. Noething (pr. S. Th. Soemmerring) diss. de decussatione nervorum optitorum, Mogunt. 1786, 8.

2) Willmann über die Durchkreuzung der Sehnerven in Blumenbach's med. Bibl. 2. B. 2. St. S. 391.

3) 4) Winslow's anat. Abb. Uebers. Berl. 1733, 4. B. S. 150.

5) Blumenbach's med. Bibl. a. a. D. S. 586.

6) S. Th. Soemmerring über die Vereinigung der Sehnerven in dem Hestich. Vorträge zur Gelehrsamk. u. Kunst, 2 u. 4. St.

7) nach Mayer zu schärferer Zeichnung der nur partiellen Durchkreuzung (Besch. d. menschl. K. 7. B. S. 31.)

8) 9) nach gegenseitiger Ansicht der nicht wirklichen Durchkreuzung, s. ebendas. u. S. 27.

10) — 12) Riolani anthropogr. l. 4. c. 2.

13) 14) F. Ackermann comm. de nervor. optitor. inter se nexio. S. Blumenbach's med. Bibl. 3. B. 2. St. S. 337 ingl. 3. St. S. 711.

15) Vesalii de hum. c. fabr. l. 4. c. 4.

16) 17) Th. Bartholini anat. libell. 3 c. 2.

18) Riolani anthr. l. c.

19) Halleriel. physiol. T. V. l. 16. c. 2.

20) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2963.

21) Laurentii hist. anat. l. 11. c. 11. quaest. 8.

22) 23) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. S. 27.

abweichende Benennungen entstanden. S. unter Gehirnnerv, optischer Nerv.

*Defatigatio*, f. Ermüdung.

*Deferens canalis*, s. *ductus*, s. *vas spermaticum*, f. 2. deferirender Gang des Hoden.

*Deferentia vasa ovarii*, f. Excretionsgänge des Ovariums.

Deferirender Gang des Hodens, (*Deferens canalis*, s. *ductus*<sup>1</sup>, s. *vas spermaticum*<sup>2</sup>.) Abführendes Samengefäß Samengang<sup>3</sup>, Ableitender<sup>4</sup>, oder Ausführender<sup>5</sup> Samengang, Hinleitender Samengang<sup>7</sup>, Samenleitender Ausführungsgang<sup>8</sup>, oder Zuführungsgefäß<sup>9</sup>, oder *canalis*<sup>10</sup> des Samens, Zurückführendes Gefäß<sup>11</sup>, oder Zuführendes<sup>12</sup>, oder Auswerfendes Gefäß<sup>13</sup> des Hoden (*Meatus*, s. *Ductus seminalis*<sup>14</sup>, *Porus spermaticus*<sup>15</sup>, *Canalis seminarius*<sup>16</sup>, *Vena genitalis*<sup>17</sup>, *Jactator*<sup>18</sup>, *Vibrator*<sup>19</sup>, *Parastata*<sup>20</sup>, *Vas ejaculatorium*<sup>21</sup>, s. *ejaculans*<sup>22</sup> seminis) der vom Ende der Epididymis anhebende, in gewundenem Laufe fortsetzende, und indem er einen Theil des Samenstranges bildet, diesem durch den Abdominalring hindurchgehende und zugleich mit dem Excretionsgang des Samenbläschens in der Harnröhre sich endigende häutige Gang, dazu bestimmt, den Samen von der Epididymis aufzunehmen und ihn außer der Zeit der wirklichen Ejaculation bei der Ausübung der Geschlechtsfunction in das Samenbläschen seiner Samenleiter zu leiten und darin abzusetzen. S. unter Genitalien des männlichen Geschlechts.

1) Halleri el. physiol. T. VII. l. 27. s. 1. §. 22.

2) C. Bauhini

theatr. an. l. 1. c. 28.

3) Meibaud's Berglederungsf. Uebers. Tel.

1782, 2. B. S. 624.

4) Burdach's Encycl. d. Heilwiss. 2. B.

1552.

5) Mayer's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 118.

6) Pöder's anat. Tafeln, Taf. 75. Fig. 1. Nr. 10.

7) Hildebrandt

Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 236.

8) Haller's Grundr. d. Physiologie

umgearb. von v. Geubling, 2. Th. S. 871.

9) 10) Winslow's an

Abb. Uebers. Berl. 1733, 3. B. S. 623.

11) Pennermann's Physiologie

4. B. S. 313.

12) 13) Palsyn's chr. Ant. Uebers. v. Huth, 2. B.

S. 163.

14) Anonymi isag. anat. ex vers. Lauremberg c. 2

15) nach dem Griechischen *poros spermaticus* in dems. Werke a. a. O. 1

C. Bauhini th. an. l. c. nota a.

17) nach Rufus. S. Stephan

dict. med. 1564, p. 543

18) 19) C. Bauhini th. an. l. c. 2

nach Pollux (onomast. Amst. 1706, p. 239. Vgl. Riolani anthropo

l. 2. c. 31.

21) C. Bauhini th. an. l. c.

22) Riolani a

thropogr. l. c.

*Defectuscentia*, f. Müdigkeit.

*Defloratio*, (*Defloratio virginis*, *Devirginatio*<sup>2</sup>)

Beraubung der Jungferschaft, oder die mit der ersten Vergattung nothwendig verbundene physische Veränderung in den äußeren weiblichen Geschlechtsorganen, wozu insbesondere die in der Regel blutige Zerreißung des Hymens gerechnet wird. Vgl. Jungferschaft.

1) im eigentlichen Sinne das Pflücken einer Blume. S. Schurig gynaeco

s. 2. c. 2. §. 22.

2) Sribon. Largi comp. med. Nr. 18.

*Defunctus*, f. Tod, auch Verstorbener.

*Degeneration*, (*Degeneratio*<sup>1</sup>.) Ausartung, (bei dem Wortsinne nach das Verlustigwerden des Geschlechtscharakters, wozu also vorausgesetzt wird, daß dieser an sich einen Werth habe,) bezeich

1) Helmont tr. de febr. c. 11. n. 6.



t, allgemein den Uebergang organischer Wesen aus dem Zustand der relativen Vollkommenheit in einen unvollkommenen oder auch wirklich schlechten Zustand, und dieß nicht sowohl durch eine direct wirkende äußere Gewalt, als vermöge ihrer innern Natur, wie- immer unter Einwirkung äußerer Einflüsse, indem alle Lebens- thätigkeit, sie mag progressiv oder regressiv seyn, eine Wechselwirkung zwischen Aeußerem und Innerem voraussetzt.

Im individuellen Leben führt jede retrogrative Tendenz, wenn sie mit dem natürlichen Verlauf des Lebens parallel geht, zu Krankheit. Es findet der Begriff von Degeneration daher auch vorzüglich in der Pathologie seine Anwendung. So sagen die Humeralpathologen, daß das Blut, daß die Galle degenerirt, wenn diese, oder auch andere Stoffe des Körpers eine fehlerhafte Beschaffenheit annehmen; der Sprachgebrauch rechtfertigt auch diese Bezeichnung, wenn man eine pathologische Erscheinung mit einer andern dem gesunden Zustand näher stehenden vergleicht, aus welcher sie selbst ihren Ursprung nimmt. So sagt man, daß ein Eitergeschwür in ein Krebsgeschwür degenerirt u. s. w.

In physiologischer Beziehung aber findet dieß Wort besonders seine Anwendung in Andeutung des allgemeinen Zustandes eines ganzen Geschlechts, oder auch einer Reihe von Generationen, ja selbst auch in zweier Individuen, deren eines von dem andern abstammt. Der vollkommene Zustand eines ganzen Geschlechts oder auch eines Individuums im Geschlechtsleben nicht nur von seiner innern Organisation, sondern auch von den äußern Bedingungen, unter denen es besteht, und sich bildet, abhängig ist, so sagt man auch: eine Pflanzenart, oder auch eine einzelne Pflanze, eine Thierart, oder auch ein einzelnes Thier degenerirt, wenn es z. E. dem Klima, das seine volle Entwicklung nothwendiges Bedürfnis ist, entzogen wird; degenerirt auch ein Menschenstamm, nicht nur durch Verpflanzung in einen andern, dem humanistischen Leben weniger günstigen Hemisphärenstrich, sondern auch durch Entrathung der Culturmittel, durch die er erst zu seiner vollen Kräftigkeit gelangt war, aber auch durch einseitige und übertriebene, daher theilweise ermangelnde Cultur, durch Verweichlichung, durch Sittenverderbniß u. s. w.

Das Gegentheil von Degeneration ist Veredlung, welche in der vollen und gleichmäßigen Entwicklung aller Lebenskräfte eines Organismus besteht, die aber auch gewöhnlich nicht in der nächsten, sondern unter Voraussetzung der ungestörten Dauer jener günstigen Einwirkungen, erst in den folgenden Geschlechtern zu erwarten, und bei dem Wechsel aller irdischen Dinge, gewöhnlich auch nur ein transitonischer Zustand ist. (H.)

Degenförmiger Knorpel des Sternumis, s. Xiphoidischer Knorpel des Sternumis.

*Deglutitio*, s. Schlucken.

*Dejecta alvina*, s. Darmloth.

*Dejectio alvi*, s. Darmausleerung.

*Deire*, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wortes, i. q. *Cervix*, s. *Collum*. S. Hals.

1) *deire*. (Hippocr. de morb. mul. l. 2. c. 54.)

*Deitas*, s. Göttliche Natur.

*Delectatio*, s. Vergnügen.

*Delphys*, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wortes <sup>1</sup>, s. Uterus.

1) *Δελφς*. (Hippocr. de sterilib' l. 12. c. 8.)

*Delta*, (*Delta*), die bekannte Bezeichnung des Griechischen Buchstaben Δ (Δ), nach dessen triangulärer Form in den anatomischen Schulen auch einzelne Körpertheile benannt worden sind.

*Delta mulierum*. i. q. Vulva.

*Deltaförmiger Muskel*, s. Deltoideus.

*Deltaförmiges Band*, s. Deltoideisches Ligament des Fußgelenks. — *Mäuslein*, s. Deltoideus.

*Deltamuskel*, s. Deltoideus.

*Deltiformis musculus*, i. q. Deltoideus.

*Deltoideisches Ligament des Fußgelenks*, (*Deltoides* <sup>1</sup> *ligamentum*, *Deltoideum ligamentum* <sup>2</sup> *articulationis pedis*.) *Deltaförmiges Band* <sup>3</sup>, oder *Band des innern oder des Schienbeinknöchels* <sup>4</sup>, *Innere Seitenband* <sup>5</sup>, oder *Dreieckiges* <sup>6</sup>, oder *Viereckiges Band* <sup>7</sup> des Fußgelenks, (*Ligamentum articulare interale internum* <sup>8</sup>, s. *trapezium* <sup>9</sup>, *articulationis pedis*), das starke dreieckige Ligament, welches von dem innern Knöchel aus divergirend vorwärts an die innere Seite des scaphoideischen Knochens des Fußes, gerade einwärts an die innere Seite des Calcaneus, hinterwärts aber an die innere Fläche des Körpers des Talus geht, den innern Knöchel mit diesem letztern Knochen zusammenhält, und so die Verrenkung des Fußes nach innen verhindert. Winslow <sup>10</sup> unterscheidet drei besondere Ligamente des innern Knöchels. S. Fußgelenke.

1) *Sömmerling's Bänderl.* S. 99.

2) *Poder's anat. Handb.* 1. B.

3) *Aust.* S. 417.

4) *Weitbrecht's Synthesm. Uebers. Straßb.* 1779, S. 2.

5) nach *Sömmerling* (a. a. O.)

6) — 9) *Meckel's Handb. d. menschl. Anat.* 2. B. S. 379.

10) *Exp. anat. Vol. 1. tit. des os frais.* S. 2.

*Deltoides arteria*, s. unter *Circumflexe Arterien* des Oberarms, hintere Arterie. — *ligamentum*, s. Deltoideisches Ligament u. s. — *musculus*, s. Deltoideus.

*Deltoideum ligamentum*, s. Deltoideisches Ligament u. s.

*Deltoideus*, (*Deltoideus* <sup>1</sup>, s. *Deltoides* <sup>2</sup>, sc. *musculus*)

*Deltamuskel*, *Deltaförmiger Muskel* <sup>4</sup>, *Deltaförmiges Mäuslein* <sup>5</sup>, *Dreieckiger Armmuskel* <sup>6</sup>, *Dreieckiger Muskel*, oder *Dreieckiges Mäuslein des Arms* <sup>8</sup>, *Dreieckiger Armstrecker* <sup>9</sup>, *Armheber* <sup>10</sup>, *Musculus deltiformis* <sup>11</sup>, *acromio-cleido-brachialis* <sup>12</sup>, s. *triangularis humeralis* <sup>13</sup>, s. *brachii*, s. *sub-acromio-humeralis* <sup>14</sup>, s. *sub-acromio-clavicularis* <sup>15</sup>.

1) *Walter's myol. Handb.* 2. Aufl. S. 36.

2) nach *Riolan* (anatom. pogr. l. 6. c. 24.)

3) *Sömmerling's Muskel.* S. 237.

4) *Debrandt's Lehrb. d. Anat. d. M.* 2. B. S. 1175.

5) *Brown's verteutschte Besch. d. Musc. v. Spener*, Berl. 1794, S. 54.

6) *Pott's anatom. Begründungsk. Uebers. Leipz.* 1782, 1. B. S. 377.

7) *Schmidt's myol. Tabellen*, Tab. 15.

8) *Brown's verteutschte Besch. d. Musc. v. Spener*, Berl. 1794, S. 54.

9) *W. a. a. O.*

10) *Meckel's Handb. d. menschl. Anat.* 2. B. S. 1175.

11) *Spigellii de h. c. fabr.* l. 4. c. 14.

12) nach *Schreger* (anatom. pogr. l. 6. c. 24.)

13) *Th. Bartholini anat.* l. 4. c. 14.

14) (*Sous acromio-huméral*) nach *Chaussier* (expos. sommaire des musc. p. 8.)



alis<sup>15</sup>, Levator<sup>16</sup>, s. Elevator humeri<sup>17</sup>, Musculus attollens humeri<sup>18</sup>,) der unmittelbar unter der Haut des Schultergelenkes liegende, dasselbe bedeckende dicke Muskel, welcher seinen Ursprung von der proximalen Extremität des Schlüsselknochens, und an dem Acromium und Spina des Schulterblatts nimmt, mit convergirenden Fasern nie- wärts gehend, sich an den vordern und mittlern Theil des Oberarm- chens befestigt, und letztern in die Höhe hebt, seinen Rahmen- r von seiner dreieckigen Gestalt erhalten hat. S. unter Arm mus- celn, Oberarm muskeln.

15) Sous-acromio-clavi-huméral) nach Dumas (système méthod. de no- menclat. des musc. p. 156.) 16) Neffel's Handb. u. f. w. a. a. D. 17) 18) Spigellii de hum. c. fabr. l. c.

Demas, in Uebersetzung des Griechischen Wortes<sup>1</sup>, i. q. Cor- ps, f. Körper, vgl. auch Penis.

1) Demas. Vgl. hierüber v. d. Linden sel. med. ex. 16. S. 107.

Demissi capilli, langgewachsene Haare. S. unter Haupt- are.

Demiurg, f. folgendes Wort.

Demiurgia, Demiurgos, nach den gleichen Griechischen Wor- ten<sup>1</sup>, i. q. Creatio, Creator. S. Schöpfung und Schöpfer.

1) δημιουργία, δημιουργος, häufig in Galenischen Schriften, f. z. E. de for- mat. foet. l. wo er die Seele zum Demiurgen des Körpers macht. Vgl. Sprengel's Gesch. d. Arzneik. 5. B. S. 4.

Demonstrationes anatomicae, f. Anatomische Demonstrationen.

Demonstrativus digitus, Demonstrator, Demonstratorius digitus, f. Zeigefinger.

Demos, in Uebersetzung des gleichlautenden Griechischen Wor- tes<sup>1</sup>, i. q. Pinguedo. S. Fett.

1) Demos, f. Foessii occ. Hipp. h. v.

Demüthiger Muskel, f. Deprimirender Augenmuskel.

Demurianische Membran, (Demuriana membrana<sup>1</sup>, mica propria, s. Vagina humoris aquei<sup>2</sup>,) eine von P. Des- urs<sup>3</sup>, Königl. Oculisten in Paris, so wie auch von Desce- t<sup>4</sup>,) beschriebene eigene, die wässerige Feuchtigkeit des Auges um- gebende, äußerst dünne Haut, welche aber nichts als die hinterste Lappe der Cornea ist. S. Auge.

1) v. Haller's Grundr. d. Physiol. Berl. 1788, S. 388, Note k. 2) Man- ger's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 402. 3) S. dessen lettre a M.

Petit 20. Mars 1767. 4) de oculo l. Par. 1758. Vgl. Portal hist. de l'anat. T. V. p. 227.

Demuth ist freiwillige Erniedrigung unserer selbst. Sie ist kein Gefühl, sondern eine Eigenschaft der Gesinnung und des Betragens, entsteht theils aus einem Gefühl, theils aus einem Wahrnehmen großen Abstandes, in welchem wir uns im Vergleich zu einem vernünftigen Wesen befinden, sei es ein Mensch oder ein hö- res Wesen. Demuth besteht mithin in einer freiwilligen Herab- setzung unsers Werthes, und einem dem gemäßen Betragen, inson- derheit in Hinsicht auf Abhängigkeit, Rang, innere und äußere Voll- kommenheiten und Vorzüge.

Demuth ist dem Hochmuth entgegen gesetzt, welcher in einer Ueber- setzung unsers Werthes besteht, und unterscheidet sich von Beschei-

denheit dem Grade nach. Der Bescheidene begnügt sich mit dem, was ihm beschieden ist, der Demüthige aber erniedrigt sich noch weiter, und hält sich nicht einmal des, ihm von andern freiwillig beschiedenen für würdig, oder benimmt sich doch äußerlich so. Ein zu hoher Grad der Demuth gegen Menschen, artet in Kriechen aus.

Die Demuth spricht sich auch im Aeußern aus. Sie schlägt Augen furchtsam nieder, neigt den Körper nach vorwärts, läßt Haupt etwas sinken, die Arme und Hände herabhängen, steht an einander gestellten Füßen und etwas gebogenen Knieen, ohne Glied zu bewegen, oder eine Miene zu verziehen, in welchen Gefühl der Ehrfurcht und Bescheidenheit sich ausspricht. In höherem Grade sinkt die Demuth selbst auf die Knie, oder wirft sich mit Antlitz auf die Erde.

Demüthigung drückt die Handlung des Demüthigen aus, mögen uns selbst oder andere demüthigen. (Diond)

**Demuthsmuskel**, s. Deprimirender Augenmuskel.

*Denervatio*, i. q. Aponeurosis.

**Denkart**, s. Charakter.

**Denken**<sup>1</sup>, (*Cogitatio*<sup>2</sup>, *Cogitatus*<sup>3</sup>, *Cogitamen*<sup>4</sup>, *Cogitamentum*<sup>5</sup>.) Denken im weitesten Sinne des Wortes heißt Vorstellungen haben. In diesem Sinne denkt der Mensch vom Augenblicke an, wo er Vorstellungen zu haben anfängt, bis zum Augenblicke, wo die Psyche dem Körper entflieht; in diesem Sinne denkt er in der bewußtlosen Periode der Kindheit, im Schlafe, im Traume, im Frankhaften Irredenen und im Wahnsinne. In diesem Sinne denkt selbst das Thier; denn es hat Vorstellungen, welche nach gewissen Gesetzen in ihm wach werden, und unter einander sich erweitern. Zu diesem Denken ist weder Verstand, noch Bewußtseyn, noch Willkür oder Freiheit erforderlich, sondern bloß Gedächtniß und Phantasie. Man kann es daher mit Recht das bewußtlose unwillkürliche Denken nennen; denn die im Gedächtnisse aufbewahrten, durch die nie rastende Phantasie in ununterbrochener Bewegung erhaltenen Vorstellungen reihen sich gleichsam nach ihren Wahlverwandtschaften unaufhörlich auf die mannigfaltigste Weise an einander, treten hervor oder verschwinden, ohne daß der Verstand sich ihrer bewußt sei, oder willkürlich sie hervorrufe. So finden wir uns z. B., plötzlich aus tiefem Schlafe erwacht, in einem Strome von wechselnden Vorstellungen, von welchen wir nur die nächsten zur Klarheit des Bewußtseyns bringen können. Auf diese Art arbeitet die Seele selbst im Schlafe bewußtlos an den ihr im Zustande des Wachens gegebenen Aufgaben fort, bringt Materialien herbei, sichtet und ordnet sie, löst Räthsel und beseitigt Schwierigkeiten, so daß am folgenden Morgen dem Verstande alles licht, klar und geordnet erscheint, was vorher ein Chaos zu seyn schien. Jeder Denker weiß von dieser nicht würdigen bewußtlosen Geschäftigkeit der Seele den vortheilhaftesten Gebrauch zu machen.

1) Wagners Anthropol. 1. Th. S. 55. 2) Cicero. de offic. 1. 2. 1.

3) Senec. ep. 11.

4) Tertullian. de trin. c. 6.

5) Gluck.

tab. gr. h. v.



In der engern, gewöhnlichern Bedeutung heißt Denken: Vorstellungen mit Bewußtseyn und Willkür bilden und mannigfaltigen Zwecken gemäß mit ihnen schalten. Die Materie des Denkens sind die im Gedächtniß aufbewahrten und aufzubewahrenden Vorstellungen, und die Function — das Geschäft — des Denkens kommt durch Zusammenwirken mehrerer Geistesvermögen zu Stande, namentlich des Gedächtnisses, der Phantasie, des Verstandes, des Bewußtseyns und des Willens.

Die Denkkraft, oder das Denkvermögen, ist also kein abgeleitetes Geistesvermögen, sondern das Resultat des Zusammenwirkens mehrerer, welches aus der Analyse der Function des Denkens hervorgeht. Zum Denken nämlich sind Vorstellungen erforderlich, welche nicht anders als im Gedächtnisse aufbewahrt seyn können. (S. Gedächtniß.) Diese Vorstellungen müssen vermittelt der Phantasie erzeugt, belebt, und in mannigfaltigen Verhältnissen dem Verstande vorgestellt werden. (S. Phantasie.) Dieses Erwecken und Vorstellen geschieht aber durch den Willen nach gewissen vorschwebenden Ideen und Zwecken. Der Verstand endlich übt nun an diesen ihm vorgehaltenen Vorstellungen seine Kraft auf verschiedene Weise aus, indem er entweder das Mannigfaltige der Vorstellungen zur Einheit vereint, und durch Abstraction Begriffe bildet, oder ihre Verhältnisse ausspricht, und urtheilt, oder durch Vergleichung und Combination Folgerungen daraus ableitet, schließt. (S. Verstand.) Dieß gesammte Denkgeschäft aber kann nicht vollendet werden, wenn nicht die Seele im Zustande des vollkommenen Bewußtseyns sich befindet. (S. Bewußtseyn.) Hieraus geht hervor, daß das Denken in diesem Sinne, eine sehr zusammengesetzte Function der Seele ist, und daß der Ausdruck Denkvermögen nicht ein einzelnes Vermögen des Geistes bezeichnen könne. Das Denken in diesem Sinne, heißt auch Nachdenken, Meditiren genannt, kann mit Recht willkürliches Denken genannt, und dem unwillkürlichen Denken, — sonst auch Phantasiren genannt, — entgegengesetzt werden. Das unwillkürliche Denken nämlich ist ein unthätiges Geben und gemächliches Beschauen der, nach den Gesetzen der Ideenassociation sich an einander reihenden und vor dem Verstand vorübergehenden Vorstellungen. Man nennt dieß Denken auch: seinen Gesetzen Audienz geben. Der Verstand läßt sie gleichsam ganz ruhig vorbeiziehen, ohne sie durch eigne Thätigkeit oder Kraft des Willens irgend einem Zwecke zu erwecken. Es unterscheidet sich dieses Denken von dem in der weitesten Bedeutung, daß es mit Bewußtseyn, es aber ohne Bewußtseyn geschieht. Zu diesem Denken ist der Geist nicht aufgelegt, nicht aber zu dem willkürlichen; denn bei diesem sucht er sich sammeln, und seine Aufmerksamkeit auf Einen Zweck fortwährend richten. Die Hindernisse des willkürlichen Denkens liegen theils außer dem denkenden Subjecte. Zu jenen gehören sinnliche und geistige lebhaftes Gefühle, Affecten und Krankheiten, die Ruhe und Klarheit des Verstandes störende Genüsse; zu diesen alle heftige äußere Reize, und die Sinne lebhaft beschäftigende Wirkungen. Die vorzüglichsten günstigen Einflüsse sind Uebung, Thätigkeit und stille Einsamkeit.

Das Denken wird in Hinsicht auf Materie und Form noch scheidentlich eingetheilt. Man unterscheidet

1) ein synthetisches und analytisches Denken; dieses beschäftigt sich mit Zergliederung, jenes mit Zusammensetzung der Begriffe und Vorstellungen;

2) ein Denken in abstracto und in concreto; dieses beschäftigt sich mit Vorstellungen von bestimmten individuellen Gegenständen, jenes mit höhern Begriffen und Ideen;

3) ein mögliches, wirkliches und nothwendiges Denken; das erste hat die Vorstellung möglicher Dinge, z. B. eines Vorherwissens künftiger Dinge; das zweite die Vorstellung wirklicher Dinge, z. B. des heutigen Tages, das dritte endlich die Vorstellung nothwendiger Dinge, z. B. der nothwendigen Denkgesetze, zum Gegenstande.

4) Ein reflectirendes und transcendentes Denken, wovon letztere sich über die, durch sinnliche Wahrnehmungen erhaltenen Vorstellungen erhebt, und bloß mit dem a priori vor aller Erfahrung gegebenen sich beschäftigt, das erste aber bloß über durch die Erfahrung gegebene Vorstellungen reflectirt.

Das Denken im eigentlichen Sinne des Wortes, in wie fern sich mit Bildung und Abstrahiren von Vorstellungen und Begriffen beschäftigt, geschieht nach gewissen Gesetzen, welche Denkgesetze heißen, von denen die höchsten folgende sind:

1) das Gesetz der Identität oder des Widerspruches; zwei einander widersprechende Merkmale können nicht in einem Begriff eintreten, denn es kann nicht etwas zugleich gedacht und nicht gedacht werden;

2) das Gesetz der Entgegensetzung, oder des ausschließenden; von zwei einander widersprechenden Merkmalen muß einem Gegenstand eins zukommen, denn sie umfassen die Sphäre alles Möglichen;

3) das Gesetz vom zureichenden Grunde, oder der Dependenz; alles, was gedacht ist, hat einen zureichenden Grund, warum es gedacht wird, denn sonst würde es nicht gedacht werden.

Die Vollkommenheiten des Denkens sind Einheit, Bestimmtheit und Zusammenhang. (Diond)

**Denkkraft**, **Denkungs-kraft**, **Denkvermögen**, (*Facultas cogitandi*, *Dianoëa*<sup>1)</sup>) das Denken selbst, nach den Gesetzen der Identität auf ein in dem Bewußtseyn selbst gegebenes Substrat bezogen, oder auch das Denken selbst, bloß virtuell genommen. Vgl. **Denken**, ingl. **Verstand**.

<sup>1)</sup> S. dieß Wort.

**Denkorgan**, (*Organum cogitationis*, *Cogitatorium*<sup>1)</sup>) die unmittelbare materielle Bedingung des Denkens, welche im thierischen Organismus das Gehirn in seiner normalen Beschaffenheit in Thätigkeit ist. Vgl. **Gehirn**.

<sup>1)</sup> *Tertulliani de anima* c. 14.

**Denkungsart**, s. **Charakter**. — **Denkkraft**, **Denkvermögen**, **Denkkraft**.

**Dens**, Zahn, s. **Zähne**, sonst auch Atlas, Epistropheus, Dens toideischer Proceß.

**Dens actatam complens**, s. **genuinus**, s. **intellectus**, s. **intellectus**.



*us*, s. *moderatus*, s. *morum*, s. *sapientiae*, s. *sensus*,  
*serotinus*, s. *tardipus*, s. Weisheitszähne.

*Densitas*, s. Dichtigkeit.

*Dentales nervi maxillae superioris*, s. Alveolarnerven des  
 Oberkiefers.

*Dentalis arteria inferior*, s. unter Maxillararterien, untere  
 Arterie. — — *superior*, s. Alveolararterie des Oberkiefers. —

*ergo maxillae inferioris*, s. Alveolarrand des Unterkiefers. —

*ua inferior*, s. unter Maxillarvenen, die untere. — — *supe-*  
*r*, s. Alveolarvene des Oberkiefers.

*Dentata sutura*, s. Gezähnte Sutura. — *vertebra*, i. q.

*siropheus*.

*Dentatae productiones musculorum*, s. Dentationen.

*Dentati muscoli dorsi et pectoris*, s. Serratus des Rückens  
 der Brust.

*Dentationen*, (*Dentationes* <sup>1</sup>.) Zacken <sup>2</sup>, Fleischige <sup>3</sup>,  
 Fleischige <sup>4</sup> Zacken, oder Spitzen <sup>5</sup>, Fingerförmige  
 Verlängerungen <sup>6</sup>, Zackigte <sup>7</sup>, oder Zahnförmige <sup>8</sup> Fas-  
 sern, Fortsätze <sup>9</sup>, Kerben <sup>10</sup>, Einkerbungen <sup>11</sup>, (*Digitatio-*  
<sup>12</sup>, *Pinnae* <sup>13</sup>, *Dentes* <sup>14</sup>, *Productiones dentatae* <sup>15</sup>, *Inser-*  
<sup>16</sup>, s. *digitatae* <sup>17</sup>.) Diesen Namen füh-  
 ren die Endigungen mehrerer Muskeln, die besonders an den Rippen  
 Zacken einer Säge auslaufen, und dann eine entfernte Ähnlich-  
 keit von Fingern zeigen, zumal wenn sie, von unterschiedlichen Mus-  
 keln einander entgegen kommend, wie die zusammengesetzten Finger  
 Hände, gegenseitig einander aufnehmen. S. Muskeln.

1) Schaarschmidt's inhol. Tabell. Tab. 13. 2) Palfyn's chr. Anat. übers.  
 v. Huth, 2. Th. S. 19. 3) 4) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M.  
 2. B. S. 1145 u. 1159. 5) Sömmerring's Muscell. S. 171. 6)  
 Fleuraud's Zertheilbederungsk. Übers. Leipzig. 1732, 2. B. S. 365. 7) 8)  
 Mayer's Besch. d. menschl. K. 3. B. S. 260. 9) Casselohm's An-  
 weisung zur anat. Betr. u. Zertheilbederungsk. d. menschl. K. 2. Cap. S. 5. 10)  
 Burdach's Encycl. d. Heilkunst. 2. B. S. 474. 11) Winslow's anat.  
 Abh. Übers. Berl. 1733, 2. B. S. 75. 12) Palfyn's chr. Anat. u. f.  
 v. a. a. D. 13) Th. Bartholini anat. libell. 1. c. 6. 14) Ver-  
 heyen c. hum. anat. 1. 1. tr. 2. c. 6. 15) Veslingii syntagma  
 anat. c. 2. 16) 17) Winslow exp. anat. lat. vers. T. II. S. 45.

*Dentatum corpus cerebelli*, s. Medullarkörper des Cerebellums.  
*ligamentum*, s. Denticulirtes Ligament.

*Dentatus musculus anticus major et minor*, s. Serratus der  
 Brust. — — *posticus inferior et superior*, s. Serratus des  
 Rückens. — *processus maxillae superioris*, s. Alveolarproceß  
 Oberkiefers.

*Dentes*, s. Zähne, ingl. Dentationen. — *acuti*, s. Schnei-  
 zähne. — *angulares*, s. Eckzähne. — *anteriores*, s. Schnei-  
 zähne. — *bicuspidati*, s. *bicuspides*, s. unter Backenzähne,  
 vordern. — *blenni*, s. Stumpfe Zähne. — *canini*, s. Eck-  
 zähne. — *clavales*, s. Backenzähne. — *collaterales*, s. colu-  
 llares, s. Eckzähne. — *constantes*, s. Bleibende Zähne. —  
*pidati*, s. Eckzähne. — *decidui*, s. Milchzähne. — *dnales*,  
 unter Schneidezähne. — *fixi*, s. Bleibende Zähne. — *fracto-*  
 , s. Eckzähne. — *gelasini*, s. Schneidezähne. — *genuini*, s.  
 Inat. physiol. Realew. II. B.

Backenzähne. — *incisores*, s. *incisarii*, s. Schneidezähne. — *infantiles*, s. *lactarii*, s. *lactei*, s. Milchzähne. — *lania*, s. Eckzähne. — *lati*, s. *malares*, s. *mandibulares*, s. *maxillares*, s. Backenzähne. — *medii*, s. Schneidezähne. — *mensarii*, s. *militares*, s. *molae*, s. *molares*, s. *molitores*, s. Backenzähne. — *mordentes*, s. Eckzähne. — *oculares*, s. Augenzähne. — *paxillares*, s. Backenzähne. — *perennes*, s. *permanentes*, s. Bleibende Zähne. — *plani*, s. Backenzähne. — *posthumi*, s. Bleibende Zähne. — *primi*, s. *primores*, s. Schneidezähne. — *quaterni*, s. Schneidezähne. — *quadrangulares*, s. Backenzähne. — *quadrupli*, s. *risorii*, s. *serres*, s. Schneidezähne. — *secundarii*, s. Bleibende Zähne. — *temporarii*, s. Milchzähne. — *tomici*, s. Schneidezähne.

*Denticulata corona oculi*, s. Mucöser Ring des Auges.

*Denticulatae insertiones*, s. Dentationen.

**Denticulirtes Ligament**, (*Denticulatum ligamentum*<sup>1)</sup>) Zahnförmiges<sup>2)</sup>, oder Gezähntes<sup>3)</sup>, oder Sägeförmiges<sup>4)</sup>, oder Eingekerbtes<sup>5)</sup>, oder Gezacktes<sup>6)</sup> Backenzähntes Ligament<sup>7)</sup>, (*Ligamentum dentatum*<sup>8)</sup>) die jeder Seite des Rückenmarks, längs des Rückenwirbelcanals herablaufende, als eine Duplicatur der Arachnoidea erscheinende, aber an Festigkeit übertreffende membranöse Verlängerung, wodurch das Rückenmark seitwärts an die harte Hirnhaut befestigt wird, und nur von den sägeförmigen, aber unregelmäßigen Zacken, mit denen sie zwischen die aus dem Rückenmark entspringenden Nerven einzeln ihren Rahmen erhalten hat. S. Rückenmark.

1) Halleri elem. physiol. T. IV. l. 10. s. 2. §. 5.

2) Mar

Beschr. d. menschl. K. 6. B. S. 56.

3) 4) Sommering's Pien

Nervent. §. 72.

5) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1753,

S. 146.

6) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. §.

7) Meutaud's Zergliederungsk. Uebers. Leipz. 1782, 2. B. S. 75.

8) Winslow exp. anat. lat. vers. T. IV. p. 2. §. 129.

*Dentiformis processus*, s. Odontoideischer Proceß.

*Dentitio*, s. Zähnen.

*Dephlogisticatus aer*, s. Drygengas.

**Dephlogistifiren**<sup>1)</sup>, **Dephlogistifirung**, **Entbrennbarmachen** sind erst in den neuern Zeiten von den Chemikern gebildete Ausdrücke und beziehen sich auf die Annahme eines Phlogistons, als hypothetischen Bestandtheils der Körperwelt, wovon die Fähigkeit zu brennen abhängen sollte. Einen Körper dephlogistifiren, heißt also nach dieser Naturansicht, einen Körper seines Phlogistons oder Brennstoffes berauben. Durch das sogenannte antiphlogistische System wurde auch schon die Benennung angedeutet, das Phlogiston als vermeintlicher Körperstoff aus den chemischen Schulen verwiesen. Mithin ist auch der Begriff einer Dephlogistifirung weg und man bezeichnete gegen den allgemeinen chemischen Proceß, auf den man jenen Begriff Anwendung gab, als Drydation. (S.

1) nach dem Französischen Worte déphlogistiquer.

**Dephlogistifirte Luft**, s. Drygengas.

*Depressor alae nasi*, s. Deprimirender Muskel des Nasenflügels. — *anguli oris*, s. Deprimirender Muskel des Mundwinkels.



Depressor labii infer. Deprimirender Augenmusk. 339

*labii inferioris*, s. *labii*, s. *labri inferioris proprius*, s. Deprimirender Muskel der Unterlippe. — — *superioris proprius*, Deprimirender Muskel des Nasenflügels. — *labiorum*, s. *labio-*  
*communis*, s. Deprimirender Muskel des Mundwinkels. —  
*oculi*, s. Deprimirender Augenmuskel.

*Depressor palpebrae inferioris*<sup>1</sup>, *Musculus zygomatico-*  
*palpebrae inferioris*<sup>2</sup>, kleine Muskelfasern, welche von  
Bäckenknochen einwärts laufend, sich in den untern Theil des  
Orbicularmuskels verlieren und das untere Augenlid etwas abwärts  
ziehen. Diese Muskelfasern fehlen oft, und werden überhaupt von  
den Anatomen gewöhnlich nicht als ein eigener Muskel, sondern  
als ein abgehendes Bündel zum kleinen zygomatischen Muskel  
gerechnet. S. Orbicularmuskel des Auges. Vgl. auch Ge-  
sichtsmuskeln.

nach Genga (anat. chir. Rom. 1687, p. 189,) s. auch nach Meister  
comp. anat. ed. 2. p. 142.) 2) nach Schreger (Vers. einer neuen  
Nomenclatur d. Musk. S. 12.)

*Depressor proprius nasi*, s. Deprimirender Muskel des Nasen-  
flügels. — *septi mobilis narium*, s. Deprimirender Muskel der  
Nasenscheidewand.

*Depressor vesicae*<sup>1</sup>. Unter diesem Namen ist ein besonderer  
Muskel unterschieden worden, welcher von der Spina des Sitzstücks  
des Kreuzknochens, und zugleich am Ende der Coccyxknochen angeheftet,  
hinunterziehend und sich oberhalb des Afteres am Halse der Urethra ansetzt.  
Seine Wirkung würde seyn, die Urethra und die Blase etwas  
nach hinten und hinterwärts zu bewegen. Wahrscheinlich waren es aber ein-  
zelne Theile des Levators des Afteres, oder der Quermuskel des Perine-  
ums, der dafür genommen wurde. S. Harnblase.

nach Blanchi (Maugeti theatr. p. 423.). Vgl. Halleri clem. physiol.  
VII. 1. 26. §. 24.

*Depressores epiglottidis*, s. Thyreoepiglottische Muskeln. —  
*superioris*, s. unter Incisivmuskeln der Lippen, die obern  
Muskeln.

*Deprimens musculus alae nasi*, s. Deprimirender Muskel des  
Nasenflügels. — — *labii inferioris*, s. Deprimirender Muskel  
der Unterlippe. — — *maxillae inferioris biventer*, s. *digastricus*  
s. *Digastricus* der untern Kinnlade. — — *oculi*, s. Depri-  
mirender Augenmuskel. — — *oris*, s. Deprimirender Muskel des  
Mundwinkels. — — *ossis hyoidei*, i. q. *Sterno hyoideus*.  
— *septi narium*, s. Deprimirender Muskel der Nasenscheide-

**Deprimirende Muskeln, (*Deprimentes*<sup>1</sup> *musculi*),**  
herabziehende, oder Niederdrückende<sup>2</sup> Muskeln, Nie-  
derdrücker<sup>3</sup>, Erniedriger<sup>4</sup>, (*Depressores musculi*<sup>5</sup>.) Mus-  
keln, deren Wirkung ist, Theile abwärts zu bewegen, und daher die  
Hauptantagonisten der aufstößenden Muskeln. S. Muskeln.

*Epiglottidis* de h. c. fabr. 1. 4. c. 29. 2) Wäner's Besch. d. menschl.  
3. B. S. 107. 3) Palsyn's chr. Anat. übers. v. Puth, 1. Th.  
S. 244. 4) Winslow's anat. Abb. übers. Vers. 1733, 2. Th. S. 17.  
Winslow exp. anat. lat. ver. T. II. §. 56.

**Deprimirender Augenmuskel, (*Deprimens musculus***

oculi <sup>1</sup>.) Niederwärtszieher des Augapfels <sup>2</sup>, Unterer gerader Muskel des Augapfels <sup>3</sup>, Gerader Niederziehmuskel des Augapfels, Niederdrückender Augenmuskel <sup>4</sup>, Niederzieher <sup>5</sup>, oder Niederdrücker des Ges. <sup>6</sup>, Demüthiger Muskel <sup>7</sup>, Demuthsmuskel <sup>8</sup>, depressor oculi <sup>9</sup>, Musculus rectus oculi inferior <sup>10</sup>, s. humilis. s. sub-optico-spheno-scleroticus <sup>12</sup>.) der unterste der vier Augenmuskeln, welcher mit dem abducirenden und adducirenden Augenmuskel von einem ihnen gemeinschaftlichen Baude in der Orbita, in der Gegend des optischen Loches entspringt, sich wärts gehend, unterwärts an die Sclerotica des Augapfels ansetzt, indem er wirkt, das Auge nach unten zieht. S. Augenmuskeln.

- 1) nach Nisolan (anthropogr. l. 5. c. 11.) 2) 3) Sömmerring's Musckell. §. 120. 4) Mayer's Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 485. 5) Binslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1753, 4. B. S. 262. 6) Binslow's deutsche Besch. d. Musc. v. Spener, Berl. 1704, S. 20. 7) W. Uebers. v. musculus humilis. S. Kilmus anat. Tabell. Tab. 9. 8) Mayer's Besch. u. f. w. a. g. D. 9) nach Spigel (de hum. c. l. 4. c. 5.) 10) nach Fabricius v. Aquapendente (oper. 1687, p. 194) 11) nach Casserius (pneum. l. 5. c. 18.) (Sous-optico-spheno-scleroticien) nach Dumas (système method. de nomenclat. des musc. p. 96.)

Deprimirender Muskel der Nasenscheidewand, (Depressor septi mobilis narium, s. Depressor septi mobilis narium,) Niederzieher der Nasenspitze <sup>2</sup>, oder der Nasenscheidewand <sup>3</sup>, Niederdrückender Muskel der Nasenscheidewand <sup>4</sup>, Nasenmuskel der Oberlippe <sup>5</sup> (Musculus nasalis labii superioris. s. septo-labialis <sup>7</sup>, s. naso-labialis <sup>8</sup>.) diejenige Muskelpart, welche zwischen dem Mundwinkel und der Mitte der Oberlippe, der Orbicularmuskel der Lippen ausgeht, sich von beiden Seiten her an die knorpliche Scheidewand der Nase ansetzt, und je nachdem, ob der Orbicularmuskel der feste Punkt ist, die Oberlippe in die Höhe ziehen hilft, oder die Scheidewand der Nase, abwärts bewegt. S. Gesichtsmuskeln.

- 1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 2. B. S. 1037. 2) nach Sömmerring (Musckell. §. 133.) 3) nach Hildebrandt (a. a. D.) 4) Mayer's Besch. d. menschl. K. 3. B. S. 202. 5) nach Sömmerring (a. a. D.) 6) nach Albin (hist. musc. hom. 4. ed. p. 154.) 7) Schreger (Nomenclat. d. Musc. S. 12.) 8) (Naso-labial) nach Dumas (système method. de nomenclat. des musc. p. 102.)

Deprimirender Muskel der Unterlippe, (Depressor labii, s. Depressor labii, s. labii inferioris proprius, Niederzieher <sup>4</sup>, oder Niederziehmuskel, oder Niederdrückender Muskel <sup>5</sup> der Unterlippe, Niederdrücker der untern Lefze <sup>6</sup>, Viereckiger Kinnmuskel <sup>7</sup>, Kinnmuskel <sup>8</sup>, oder Muskel des Kinns <sup>9</sup>, (Musculus quadratus labii inferioris.)

- 1) nach Spigel (de linm. c. fabr. l. 4. c. 5.) 2) nach Douglas (compar. c. 8.) 3) nach Santorini (obs. anat. c. 1. §. 54.) 4) nach Sömmerring (Musckell. §. 131.) 5) Mayer's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 197. 6) Brown's deutsche Besch. d. Musc. v. Spener, Berl. 1704, S. 13. 7) nach Schaarschmidt (myol. Tabell. Tab. 7.) 8) Mayer's Besch. u. f. w. a. g. D. 9) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 2. B. S. 1035.



o, s. mentalis <sup>11</sup>, s. mento-mesolabialis <sup>12</sup>, mento-labialis <sup>13</sup>) derjenige Muskel, welcher von dem äußern Labium des Unterkiefers auf jeder Seite neben der äußern Spina desselben aus, aufwärts und etwas einwärts gerichtet zur Unterlippe geht und in seiner Zung diese schief-abwärts zieht. S. Gesichtsmuskeln.

1) Heisteri compend. anat. ed. 2. p. 144. 11) Schaaarschmidt's myol. Tabell. a. a. D. 12) nach Schreger (Nomencl. d. Musf. S. 12.) 13) (Mentoncer labial) nach Dumas (système method. de nomenclat. des musc. p. 104)

Deprimirender Muskel des Mundwinkels, (Deprimens <sup>1</sup> anguli oris,) Niederzieher <sup>2</sup>, oder Niederzieh-  
muskel des Mundwinkels, Dreieckiger Lippenmuskel <sup>3</sup>,  
Niederdrückendes Mäuslein der Lippen <sup>4</sup>, Pyramiden-  
muskel des Kinns <sup>5</sup>, Pyramiden-<sup>6</sup>, oder Dreieckiger <sup>7</sup>  
Kinnmuskel, Niederdrückender Muskel vom Winkel  
des Mundes <sup>8</sup>, (Depressor anguli oris <sup>9</sup>, s. labiorum <sup>10</sup>, s.  
labiorum communis <sup>11</sup>, Musculus triangularis <sup>12</sup>, s. pyrami-  
dis <sup>13</sup> menti, s. mento-, s. genio-cantho-labialis <sup>14</sup>, s. sub-  
maxillo-labialis <sup>15</sup>), der von dem äußern Labium des Unterkiefers  
am Mundwinkel entspringende, und schmaler werdend, gerade  
aufwärts zu demselben hingehende und ihn abwärts ziehende Muskel.  
S. Gesichtsmuskeln.

1) Kulmus anat. Tabell. Tab. 38. 9) nach Sömmerring (Musf. S. 130.)  
2) Pientaud's Zergliederungsk. Uebers. Leipz. 1782, 1. B. S. 332. 4) nach  
3) Kulmus (anat. Tabell. Tab. 23.) 5) — 8) Mayer's Beschr. d. menschl.  
N. 3. B. S. 196. 9) nach Albin (hist. musc. hom. 4. ed. p. 152)  
10) nach Cowper (myotom. ref. ed. 1694, c. 10.) 11) nach Dou-  
glas (myogr. compar. c. 8.) 12) nach Santorini (obs. anat. c. 2.  
p. 28 36.) 13) Walter's myol. Handb. 2. Aufl. S. 142. 14) nach  
15) Schreger (Nomenclat. d. Musf. S. 12.) 15) (Sous maxillo-labial)  
nach Dumas (système method. de nomenclat. des musc. S. 104.)

Deprimirender Muskel des Nasenflügels, (Deprimens  
oculus. s. Depressor <sup>1</sup> alae nasi,) Niederzieher <sup>2</sup>, oder Hin-  
terzieher <sup>3</sup>, oder Niederdrückender Muskel <sup>4</sup> des Na-  
senflügels, Niederziehmuskel des Nasenflügels, Zu-  
sammenziehender Muskel der Nasenlöcher <sup>5</sup>, Zusammen-  
zieher der Nasenflügel <sup>6</sup>, Myrthenförmiger Muskel der  
Nase <sup>7</sup>, (Depressor proprius nasi <sup>8</sup>, Constrictor alae nasi ac-  
cessor labii superioris <sup>9</sup>, Constrictor Cowperi <sup>10</sup>, s. ala-  
e nasi <sup>11</sup>, s. alae nasi <sup>12</sup>, Depressor labii superioris pro-  
prius <sup>13</sup>, Musculus myrtiformis <sup>14</sup>, s. pinnarum dilatator  
proprius <sup>15</sup>, s. labri superioris arctandis naribus communis <sup>16</sup>,

1) nach Albin (hist. musc. hom. 4. ed. p. 154.) 2) nach Sömmerring  
(Musf. S. 155) 3) Leber's Vorles. über d. Zergliederungsk. Wien 1776,  
S. 186. 4) Mayer's Beschr. d. menschl. N. 3. B. S. 180. 5) nach  
6) Schaaarschmidt (myol. Tabell. Tab. 4.) 6) Browne's vertauschte Beschr.  
d. Musc. v. Spener, Veri. 1792, S. 12. 7) Pientaud's Zerglie-  
derungsk. Uebers. Leipz. 1782, 2. B. S. 321. 8) nach Cheselden (anat.  
of. hum. body.) 9) nach Cowper (myotom. ref. ed. 1694, c. 9) 10)  
11) Schaaarschmidt's myol. Tabell. a. a. D. 11) Browne's vertauschte  
Beschr. u. f. w. a. a. D. 12) nach Cowper (i. c. c. 10) 13) nach  
14) Douglas (myogr. compar. c. 8.) 14) — 16) nach Santorini (obs.  
anat. c. 1. v. 14, 17 u. 18.)

s. incisivo - pinnalis <sup>17</sup>, s. maxillo - alveoli - nasalis <sup>18</sup>.) über den Schneidezähnen am Oberkiefer entspringende, sich an Nasenflügel seiner Seite ansetzende, und denselben zugleich et mit der Oberlippe abwärts ziehende Muskel. S. Gesichtsmuskeln.

17) nach Schreger (Nomenclat. d. Musc. S. 12) 18) (Maxillo - alveolar) nach Dumas (système méthod. de nomenclat. des musc. p. 10)

**Derbe Augenhaut**, oder Haut des Auges, s. Cornea, s. Sclerotica — Gehirn, -- oder Hirnhaut, s. Harte Hirnhaut.

**Derivation**, (*Derivatio* <sup>1</sup>.) Ableitung <sup>2</sup>, diejenige Führung, welche die Bewegung von Feuchtigkeiten in Behältnissen, namentlich das Blut in den Adern, relativ dadurch erhält, daß der Widerstand der Bewegung in einem Gefäß, selbst durch Entziehung Uebermaßes der Feuchtigkeit, verringert wird, worauf dann der Widerstand desselben von andern Orten her; auch ohne Vermehrung der treibenden Kraft, oder des Drucks, oder der Zufluß dahin, nothwendig vermehrt wird. S. unter Blutcirculation.

1) Halleri elem. physiol. T. II. l. 6. s. 4. §. 7. 2) Haller's G. d. Physiol. umgearb. von v. Feveling, 1. Th. §. 155.

**Derma**, in Uebertragung des gleichen Griechischen Wortes *Corium*.

1) *δερμα*.

**Dermatodes tunica cerebri**, beßgl. <sup>1</sup>, s. Harte Hirnhaut.

1) *δερματόδης*.

**Dermatologie** <sup>1</sup>, (*Dermatologia*.) Lehre von Hår u. Bgl. Membranen.

1) Burdach's Elter. d. Heilkunst. 1. B. S. 456.

**Descendens**, s. Absteigend. — *aorta*, s. Absteigende Aorta. — *arteria palatina*, s. unter Palatinische Arterien, die niedersteigende. — *colon*, s. Niedersteigendes Colon. — *cornu ventriculi cerebri lateralis*, s. unter Hörner der großen Hirnhöhlen, das rechte Horn. — *crus incudis*, s. unter Schenkel des Incus, das rechte Schenkel. — *musculus abdominis*, s. Absteigender Abdominalmuskel. — — *cervicalis*, s. Absteigender Cervicalmuskel. — *mus ossis ischii*, s. unter Aeste des Sitzstücks des Hüftknochens, absteigender Ast. — — — *pubis*, s. unter Aeste des Schooßknochens, absteigender Ast. — *truncus aortae*, s. Absteigende Aorta. — *vena palatina*, s. unter Palatinische Venen, die niedersteigende.

**Descendentes musculi**, s. Absteigende Muskeln. — *spinales*, s. unter Spinalnerven, absteigende Nerven. — *processus vertebrarum*, s. unter Articularproceß der Wirbel, die unterste. — *venae spinales*, s. unter Spinalvenen, absteigende Venen.

**Descensio**, **Descensus**, s. Niedersteigen.

**Descriptiva anatomia**, s. Anatomia descriptiva.

**Desiderium**, s. Verlangen.

**Desidia**, **Desidies**, s. Trägheit.

**Desmologie**, (*Desmologia*.) s. Syndesmologie.

**Desmos**, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wortes, s. Ligament.

1) *δεσμος*, in eigentlicher Bedeutung ein Strick.



**Desorganisation**, (*Desorganisatio*), ein zunächst in pathologischen Schulen der spätern Zeit gebildeter Ausdruck, zur Bezeichnung des Ueberganges aus dem organischen Zustand in den unorganischen. Was in Krankheitszuständen theilweise durch Entmischung der thierischen Materie geschieht, deren organische Verbindung allein ihrer Form, sondern auch ihrem Zusammenhang nach Bestimmung des Lebens ist, erfolgt durch den natürlichen Tod, in Hinsicht des ganzen thierischen Körpers. Auch die einzelnen thierischen Theile, die vom Körper im Leben sich absondern, treten aus ihrem organischen Verhältniß und werden in dieser Hinsicht desorganisirt, z. B. nur die ausgeschiedenen Flüssigkeiten, sondern auch feste Theile, z. B. die unaufhörlich im Leben sich abnützende Epidermis der menschlichen Haut, abgeschnittene Haare oder Nagelränder u. s. w. Das Ende aller Desorganisation ist Destruction, oder Aufhebung der durch die Organisation dem Körper oder Körpertheile verliehenen Form oder Structur, welche aber, wo nicht ganz abgewehrt, doch lange hinaus verzögert werden kann, wenn der desorganische Stoff in solche Verhältnisse kommt, wo er, gleich andern unorganischen Stoffen, sich in seinen durch einfache Cohäsion bedingten Verbindungen behauptet.

Es hat eine uneigentliche Weise haben insbesondere Französische Schriftsteller über den animalischen Magnetismus den Zustand des Somnambulismus, besonders seine höhern Grade, als Desorganisation bezeichnet. Vgl. Somnambulismus. (H.)

**Desoxydation**<sup>1</sup>, (*Desoxydatio*), Entsäuerung, Entzuckerung<sup>2</sup>, Entkeltung<sup>3</sup>, der der Drydation entgegengesetzte chemische Proceß, oder die Trennung des Drygens, oder Sauerstoffs von einem andern Stoffe. Vgl. Drydation.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Chemie, § 96. 2) nach Berzélius (vgl. Berzélius' Anfangsgr. d. mediz. Chemie, §. 398.)

**despectio**, f. Verachtung.

**desperatio**, f. Verzweiflung.

**despicientia**, f. Verachtung.

**destruction**, (*Destructio*), vgl. Desorganisation.

**Detractor auris**<sup>1</sup>, **Detrahens auris musculus**<sup>2</sup>, Niederzieher des Ohrs<sup>3</sup>, unter dieser Benennung wird von ältern Anatomen der untere, (oder die untern,) der retrahirenden Ohrmuskeln, von dem Mammillarproceß selbst entspringt, unterschieden, und, der dann als Abducens, oder Abductor bezeichnet. S. Retrahirende Ohrmuskeln.

1) Browne's verdeutschte Besch. d. Musc. v. Spener, Berl. 1704, S. 17.

2) Spigelii de hum. c. fabr. l. 4. c. 6. 3) Browne's verdeutschte Besch. u. s. w. a. a. D.

**Detrahens musculus quadratus**, i. q. Platysmamyoides.

**Detrusor des Urins**, (*Detrusor urinae*<sup>1</sup>), Auspresser des Harns<sup>2</sup>, Forttreibender Harnmuskel<sup>3</sup>, (*Musculi protrusor urinae*<sup>4</sup>). So wird von einigen Anatomen diejenige Theile von Fasern der Muskelhaut der Harnblase genannt, welche an Schaaßschmidt's myolog. Tabellen, Tab. 14 und dessen anatomologische Tabellen, Tab. 9, wo jedoch unter dieser Benennung die ganze Muskelhaut der Harnblase verstanden wird. 1) nach Hildebrandt (Lebib. d. Anat. d. M. 3. B. §. 2195.) 2) 4) Mayer's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 47.

der vordern und hintern Fläche über dieselbe der Länge nach hinläuft, und vorzüglich zum Austreiben des Urins geschickt ist. Harnblase.

*Deus*, f. Gott.

*Deventerische*, oder *Deventer's Durchmesser*, (*Deventeri diametri* <sup>1</sup>.) f. unter Diameter des Beckens, schiefe Durchmesser.

<sup>1</sup>) nach Heine v. Deventer, einem Holländischen Geburtshelfer, bekannt seine observationes chirurgicae, nov. lumen exh. obstetricibus, Lugd. 1701 und alterius examen partuum difficil. ib. 1724, 4. so benannt.

*Devergentia*, i. q. *Divergentia*.

*Devirginatio*, f. Defloration.

*Devoratio*, f. Verschlingen.

*Dextera*, *Dexterion*, nach den gleichlautenden Griechischen Worten <sup>1</sup>, f. Nachgeburt.

<sup>1</sup>) δευρεπα, δευρεπιον, wornach das lateinische Wort secundinae gebildet worden.

*Dexter*, *Dextera*, (*Dextra*), *Dexterum*, (*Dextrum*) Rechter, Rechte, Rechtes.

*Dextera*, f. Rechte Hand.

*Dexteritas*, f. Geschicklichkeit.

*Dextra et sinistra pars corporis*, f. Rechte und linke Theile des Körpers. — *extremitas pancreatis*, f. Kopf des Pankreas.

*Dextrum mesocolon*, f. unter Mesocolon. — *orificium tricoli*, i. q. Pylorus.

*Diaboli morsus*, f. Zimbrien der Fallopischen Trompeten.

*Diabolus*, f. Teufel.

*Diachorema*, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wortes <sup>1</sup>, i. q. Excrementa. S. Excremente, ingl. Darmtheile.

<sup>1</sup>) διαχωρημα. (Galenus de sanit. tuenda l. 1. c. 3.)

*Diacritica* <sup>1</sup> *facultas* <sup>2</sup>. *Facultas secretrix* <sup>3</sup>, s. discretiva s. seperatrix <sup>5</sup>, eine nach der Galenischen Lehre außer den im Galenischen System aufgenommenen vier ministeriellen Facultäten unterscheidbare eigne, der die Bestimmung untergelegt wird, das Lösliche und Untaugliche in dem Körper zu scheiden. Vgl. *Facultas*.

<sup>1</sup>) η διακριτική. Vgl. über diesen Artikel insbesondere Hoffmanni ap. Galenol. 2. s. 7. c. 548. <sup>2</sup>) — <sup>5</sup>) C. Hoffmanni ap. p. G.

*Diadosis*, nach dem Griechischen <sup>1</sup>, ein Galenischer Ausdruck zur Bezeichnung eines der sogenannten anadosis, oder der Theilung des Nahrungsstoffes durch der allgemeinen Blutgefäßtheilung der Verdauung folgenden Actes, nämlich der Vertheilung des Nahrungsstoffes durch die kleinsten Gefäße der einzelnen Theile und die feinste Substanz überhaupt <sup>2</sup>. S. Galenisches System der Physiologie.

<sup>1</sup>) διαδοσις. <sup>2</sup>) Galeni de fac. nat. l. 2. c. 6.

*Diagonalconjugata des Beckens*, die von der Mittellinie des Schambogens bis zu der Mitte des Promontoriums des Kreuzknochens durch die Beckenhöhle durchgezogene ideelle Linie. Vgl. *Diameter* des Beckens.

<sup>1</sup>) nach v. Siebold (Lehrb. d. Entbindungsk. 3. Aufl. 1. B. S. 89.)

*Diagonales diametri pelvis*, f. unter Diameter des Beckens, schiefe Durchmesser.



**Diameter<sup>1</sup>**, (*Diameter<sup>2</sup>*, *Diametrus<sup>3</sup>*.) Durchmesser. Dieser aus der Geometrie bekannte Ausdruck wird auch in Bestimmung von Größenverhältnissen von Theilen des menschlichen Körpers, besonders von Körperhöhlen, zur Bezeichnung der Abstände einander räumlich entgegengesetzten äußersten Begrenzungen, oder äußersten Entfernungen gebraucht. Der Charakter einer solchen idealen Linie ist, daß sie in gerader Richtung von einem äußern Punkt zu dem entgegengesetzten durch das Centrum der Theile oder Höhlung hindurchgeht. Vgl. Körper, ingl. Höhlen des Körpers.

1) — 3) nach dem Griechischen Worte *διαμετρος* gebildet, (Columell. de re rust. 1. 5. c. 2.)

**Diameter des Beckens**, (*Diametri pelvis<sup>1</sup>*.) Durchmesser<sup>2</sup> des Beckens. Als solche werden besonders im weiblichen Becken, die Capacität desselben in Hinsicht auf das Geburtsgeschäft zu bestimmen, unterschieden: a) ein Querdurchmesser<sup>3</sup>, (*Diameter transversa<sup>4</sup>*.) von der rechten nach der linken Seite, welcher in der obern Apertur zugleich als der große Durchmesser<sup>5</sup>, *Diameter<sup>6</sup>*, s. *Diameter major<sup>7</sup>*.) bezeichnet wird, b) ein gerader Durchmesser<sup>8</sup>, von vorn nach hinten, der in der obern Apertur durch kleiner Durchmesser<sup>9</sup>, (*Diameter minor<sup>10</sup>*.) oder auch *Conjugata<sup>11</sup>*, (*Conjugata<sup>12</sup>*, *Distantia conjugata<sup>13</sup>*.) benannt wird, in der Mitte der Beckenhöhle aber zum größern<sup>14</sup> wird, c) drei schiefe<sup>15</sup>, auch *Deventerische<sup>16</sup>* Durchmesser genannt, (*Diametri obliquae<sup>17</sup>*, s. *diagonales<sup>18</sup>*, s. *intermediae<sup>19</sup>*, s. *Deventerische<sup>20</sup>*.) in diagonalen Richtung von der einen Seite zur andern, wozu auch noch die *Diagonalconjugata* kommt. (Vgl. das Wort.) S. unter Becken.

1) 2) Stein's Anleit. zur Geburtsh. 7. Aufl. 1. Th. S. 36. 3) v. Siebold's Lehrb. d. Entbindungsk. 3. Aufl. 1. B. S. 88. 4) s. transversus, indem das Wort diameter von beiderlei Geschlecht ist. 5) v. Siebold's Lehrb. d. Entbindungsk. u. f. w. a. a. D. 6) Roederer's el. art. obstetr. S. 3. 7) Stein's Anleit. u. f. w. a. a. D. S. 38. 8) — 10) v. Siebold's Lehrb. u. f. w. a. a. D. 11) Stein's Anl. u. f. w. a. a. D. 12) Dieser Ausdruck bezeichnet in der Geometrie die kleine Ax: einer Ellipse (*Axis conjugatus*.) Roederer's el. art. obst. 1. c. 13) Stein's Anl. u. f. w. a. a. D. 14) v. Siebold's Lehrb. u. f. w. a. a. D. S. 89. 15) 16) S. ebendaf. S. 88. Vgl. auch das letztere Wort. 17) — 20) Stein's Anleit. u. f. w. a. a. D.

**Diameter des Kindkopfs**, (*Diametri capitis infantilis*.) Vergleichbar können<sup>1</sup> in Hinsicht auf das Geburtsgeschäft vier unterschieden werden: a) der größte vom Kinn bis zur hintern Spitze des Kopfs (5 Fr. Zoll;) b) der größere, oder der Abstand des Vorderkopfs zum Hinterhaupte (4½ Z.) c) der kleinere, von einem Officiationspunkt eines Scheitelsknochens zum andern in die Querlaufend, (3½ Z.) d) der mittlere, schief von einem Scheitelsknochen zum andern laufend, dem gegenseitigen aber nicht immer entsprechend, (3½ Z.) Vgl. Aren des Kindkopfs.

1) nach Stein (Anleit. zur Geburtsh. 7. Aufl. 1. B. S. 454.)

**Diameter pelvis major, minor, transversa**, s. *Diameter des Beckens*.

*Diametri capitis infantilis*, s. Diameter des Kindkopfs.  
*pelvis*, s. Diameter des Beckens. — *Doventeri*, s. di-  
 gonales, s. intermediae, s. obliquae, s. unter Diameter d.  
 Beckens, schiefe Diameter.

*Diametrus*, s. Diameter.

*Dianoea*, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte  $\delta\iota\alpha\nu\omicron\iota\alpha$ , Denken, oder auch die Denkkraft.

1) *διανοία*. Vgl. Foessii oecon. Hipp. h. 7.

*Dianoema*, beßgl.  $\delta\iota\alpha\nu\omicron\iota\alpha$ , s. Gedanke.

2) *διανοήμα*. (Foessii oec. Hipp. l. c.)

*Diaphanitas*, s. Durchsichtigkeit.

*Diaphoresis*, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte  $\delta\iota\alpha\phi\omicron\rho\epsilon\sigma\iota\varsigma$ , Transpiration.

1) *διαφωρησις*. (Galenii meth. med. l. 13. c. 16.)

*Diaphragma*  $\delta\iota\alpha\phi\rho\alpha\gamma\mu\alpha$ , (*Diaphragma*  $\delta\iota\alpha\phi\rho\alpha\gamma\mu\alpha$  <sup>2</sup>), Zwerchfell <sup>3</sup>, Zwer-  
 fell <sup>4</sup>, Zwerchmuskel <sup>5</sup>, Scheidemuskel <sup>6</sup>, Brustfell  
 (Septum transversum <sup>8</sup>, Septum <sup>9</sup>, Interseptum <sup>10</sup>, Disse-  
 tum <sup>11</sup>, Dissipium <sup>12</sup>, Discretorium <sup>13</sup>, Discrimen <sup>14</sup>, Ci-  
 gulum <sup>15</sup>, Cinctus <sup>16</sup>, Praecinctus <sup>17</sup>, Succinctus <sup>18</sup>, Succin-  
 tura <sup>19</sup>, Phrenes <sup>20</sup>, Praecordia <sup>21</sup>, Cor <sup>22</sup>, Coostrum <sup>23</sup>, D-  
 zoma <sup>24</sup>, Perizoma <sup>25</sup>, Hypozoma <sup>26</sup>, Diaphraxis <sup>27</sup>, Res-  
 ratorium ventris <sup>28</sup>, Musculus throcacico-abdominalis <sup>29</sup>),  
 ein Muskel von ganz eigenthümlicher Form, welchem kein ande-  
 r Muskel des menschlichen Körpers ähnlich ist. Es breitet sich dassel-  
 gleich einer muskulösen und sehnichten Haut, die eine nach oben zu  
 wölbte, nach unten zu ausgehöhlte horizontal liegende Fläche bildet  
 zwischen der Brust und Unterleibshöhle als Zwischenwand aus, u-  
 wird durch dicht an einander liegende Muskelfasern im Umfange,  
 der Mitte durch eine sehnichte Ausbreitung gebildet, in welcher  
 Sehnenfasern vielfach unter einander verwebt sind. Es endigen  
 in dieser alle Muskelbündel, welche von der hintern Fläche des schwam-  
 förmigen Knorpels, den sieben untern Rippen kurzfleischicht von der v-

- 1) 2). nach dem Griechischen gleichlautenden Worte  $\delta\iota\alpha\phi\rho\alpha\gamma\mu\alpha$ , nach Plin.  
 (S. Galeni de loc. aff. l. 5. c. 3.)  $\alpha\pi\omicron\tau\omicron\upsilon\delta\iota\alpha\phi\rho\alpha\gamma\mu\alpha\tau\omicron\upsilon$ , (abtheilen)  
 Vgl. Spigeli de h. c. fabr. l. 4. c. 8. 3) Mayer's Beschr. d. mens-  
 K. 3. B. S. 288. 4) nach nicht zu billiger Schreibart. Henerman  
 Physiol. 1. B. S. 312. 5) nach Schmerring (Muskellehre S. 176.)  
 S. ebendas. Uebersicht, S. XV. 7) unschlüssige Bezeichnung, da sie  
 Verwechselungen Veranlassung gibt. 8) nach Celsus (de med. l. 5. c.  
 n. 3.) 9) Galeni de loc. aff. G. Copo Bas. interpr. l. 6. c. 10  
 10) Mayer's Beschr. u. f. w. a. a. D. 11) nach Macrobius (com-  
 in somn. Scipion. l. c. 6) 12) v. d. Linden sel. med. p. 4.  
 13) Th. Bartholinianat. l. 2. c. 3. 14) nach Edlius Aureliar.  
 (tard. pass. l. 3. c. 8.) 15) 16) Laurentii anat. l. 9. c. 4.  
 in Uebersetzung des Griechischen Wortes  $\pi\epsilon\pi\epsilon\tau\omicron\mu\alpha$ . Spigelii de c. h. f.  
 l. c. 18) 19) in Uebersetzung des Griechischen Wortes  $\pi\omicron\sigma\tau\omicron\mu\alpha$  C. B.  
 hini theatr. anat. l. 2. c. 11, not. i. auch Galeni de loc. aff. l. 1.  
 l. c. 20) in Uebersetzung der ältesten Hippokratishen Bezeichnung ( $\phi\rho\epsilon\sigma\iota\varsigma$ )  
 Vgl. Riolani anthropogr. l. 3. c. 4. 21) nach Plinius „quia  
 membranae cordi praelenduntur,“ (hist. mund. l. 11. c. 37.) 22)  
 unbestimmter Bezeichnung. Vgl. ebendaselbst. 23) eigentlich der mittlere  
 des Diaphragma's. Rulandillex. 24) — 26) nach Aristoteles.  
 diese Worte. 27) nach Hippokratishen Bezeichnung. S. dieß Wort  
 ebenfalls nach Hippocrates. S. Laurentii anat. l. c. 29)  
 Dumas (système method. de nomenclat. des muscles, p. 198.)



ren Fläche der Lendenwirbel mit längern Flecken in bogenförmiger Richtung entspringen, und gleich Radien eines Kreises, von dem elliptischen Umfange des Zwerchfells gegen die Mitte hingehen.

Man unterscheidet den muskulösen und den sehnichten Theil des Zwerchfells, (*Pars muscularis* und *Pars tendinea*;) jener wird nach der Befestigung der einzelnen Bündel an die benachbarten Knochen und Knorpel in den Rippentheil, (*Pars costalis*;) und den Lendentheil, (*Pars lumbalis*;) eingetheilt.

Die Fascikel, welche von den Rippen entspringen, bilden den größten Theil des elliptischen Umfanges des Zwerchfells, von dem Querfortsatz des ersten Lendenwirbels und der untersten Rippe der einen Seite an, unter der hintern Fläche der sieben untern Rippen und dem schwertförmigen Fortsatz weg, bis zu dem Querfortsatz desselben Lendenwirbels der andern Seite hin; der kleine Raum, welchen der Rippentheil zwischen diesen beiden Fortsätzen frei läßt, wird durch den Lendentheil ausgefüllt. Es entspringt dieser Rippentheil mit einzelnen Zacken, die an ihrem Anfange einen schmalen, nach außen convergen, sehnichten Streifen haben, von der hintern, inneren Fläche des schwertförmigen Knorpels, des Körpers oder Knorpels der sieben untern Rippen, und der Sehnenhaut, (*Arcus tendineus*;) zwischen dem untern Rande der letzten Rippe und dem obern Rande des Querfortsatzes des ersten Lendenwirbels. Bei ihrem Ursprunge sind sie durch schmale Streifen von lockerem Zellgewebe deutlich voneinander getrennt; nach der Mitte zu verlieren sich diese Streifen, und man kann die einzelnen Bündel nicht mehr unterscheiden. Nach der Spitze des schwertförmigen Knorpels und der Rippen, von denen die einzelnen Zacken entspringen, gehen die Muskelfasern strahlenförmig nach der Mitte zu, theils fast gerade von vorn nach hinten, und vorwärts, theils von außen nach innen, oder von hinten schräg nach vorwärts und vorwärts, und endigen sich alle in dem convergen Rand der Sehnenhaut, welche in der Mitte liegt. Auf diese Weise wird der vordere und Seitentheil des Zwerchfells gebildet, welcher beträchtlich größer, aber dünner ist als der hintere Theil, der von den Lendenwirbeln ausgeht. Der Rand des Rippentheils, welcher nach den Rippen zu gekehrt ist, ist convex, der hintere Rand, welcher sich mit der Sehnenhaut verbindet, ist concav, und hinter dem schwertförmigen Fortsatz findet sich ein kleiner, von Muskelfasern freier, dreieckiger Einschnitt. Die untere Zacke grenzt an den viereckigen Abdominalmuskel und den Psoasmuskel. Die Zacken, mit denen der quere Abdominalmuskel anfängt, und die untern Zacken des Rippentheils greifen in einander ein, und sind bisweilen genau mit einander verbunden; die Zacken der achten und zehnten Rippe hängen mit denen des äußern schiefen Abdominalmuskels zusammen, die des schwertförmigen Fortsatzes liegen an den Fascikeln des geraden Abdominalmuskels und die übrigen Zacken berühren die Fasern der Intercostal-

muskeln. Der Lendentheil kommt von den zwei bis drei obern Lendenwirbeln mit drei Schenkeln, (*Crura*, s. *Appendices*;) und geht so zwischen den Rippentheil aufwärts und vorwärts, indeß er sich an die Fasern der Zacken anlegt, welche von der zwölften Rippe kommen.

men und an den hintern concaven Rand der Fleischshaut, die in d. Mitte ausgebreitet ist, sich endiget.

Der Ursprung der Schenkel ist sehr verschieden, auf der linken Seite fangen sie gemeinlich um einen Wirbelknochen höher an, als auf der rechten; gewöhnlich entspringen sie auf folgende Weise.

Der erste oder äußere Schenkel, (*Crus externum*), entspringt mit einem schmalen sehnichten Streifen von der vordern Fläche des Querfortsatzes des ersten oder zweiten Lendenwirbels von dem Banne zwischen dem Querfortsatz des letzten Rückenwirbels und des ersten Lendenwirbels und dem Seitentheile der vordern Fläche des zweiten Lendenwirbels, nicht selten hängt er mit der Zacke, welche von dem letzten Rippe kommt, und mit dem mittlern Schenkel so genau zusammen, daß er nur schwer getrennt werden kann. Es ist dieses der schwächste der drei Schenkel <sup>30</sup>.

Der zweite oder mittlere Schenkel, (*Crus medium*) entspringt auch kurzsehnicht von dem Seitentheile der vordern Fläche des vierten, dritten, zweiten oder ersten Lendenwirbels und den Bänken zwischen einigen Körpern dieser Wirbel. Er verbindet sich nach außen genau mit dem äußern Schenkel, und geht mit ihm vereinigt bis zu dem untersten Brustwirbel aufwärts, dann auswärts und von dortwärts gegen die Mitte zu; nach innen ist er mit dem innern Schenkel verbunden.

Der dritte oder innere Schenkel, (*Crus internum*), ist der stärkste und längste Schenkel; in ihm liegen die Muskelfasern zahlreich über einander, und mit einer langen und starken Sehne, von dem mittlern Schenkel deutlich getrennt ist, entspringt er, mit dem vordern länglichen Bande der Wirbel, (*Ligamentum longitudinale anterius*), und der Sehne des linken innern Schenkels verbunden, von der vordern Fläche des dritten und zweiten Lendenwirbels, oder des Bandes zwischen den Körpern dieser Wirbelknochen. Er geht zuerst fast gerade aufwärts, dann etwas nach auswärts, indem er sich von dem linken Schenkel etwas entfernt. Die Fleischfasern zeigen sich auf der vordern Fläche früher, als auf der hintern, an dieser erhält er oben vom dritten bis zum ersten Lendenwirbel hin noch einige kleine Muskelbündel zur Verstärkung.

Zwischen den beiden innern Schenkeln, vor der geraden Fläche des untersten Brust- und ersten Lendenwirbels, bildet sich eine Spalte zum Durchgang der Aorta, welche nach vorn und aufwärts geschloffen wird, indem sich die Muskelfasern beider innern Schenkel kreuzen, so daß die Fasern der rechten Seite, links und die der linken Seite rechts zu liegen kommen. Nicht weit von dieser Kreuzung entfernt etwas nach vorwärts und links, trennen sich die Muskelfasern wieder einmal, um eine Oeffnung zum Durchgang der Speiseröhre zu lassen. Diese Spalte wird durch eine zweite Kreuzung der Fasern nach hinten und vorn zu geschlossen, so daß nach derselben die Fasern wieder auf derselben Seite liegen, wo sie vor der ersten Kreuzung gelegen hatten und in dem mittlern Theile des hintern concaven Randes der Fleischshaut nahe an der Spalte für die Speiseröhre sich endigen.

<sup>30</sup>) So immerling (*Muskell.* S. 176) unterscheidet den Theil, der von dem Querfortsatz des zweiten, bisweilen auch des ersten Lendenwirbels kommt, noch einen besondern vierten Schenkel.



Die Fleckenhaut des Zwerchfells, (*Centrum tendineum*, s. *Spansio tendinea*, s. *Speculum Helmontii*), welche höher liegt, als der muskulöse Theil, steht mit diesem nach allen Richtungen hin in Verbindung. Sie liegt nicht ganz in der Mitte, sondern etwas weiter nach vorn gegen die hintere Fläche der Rippen und des schwertförmigen Knorpels zu; hinter diesem Knorpel ragt der vordere convexe Rand in einer stumpfen, abgerundeten Spitze (*Mucro*), hervor; von hier gehen die Seitentheile, welche auch einen convergenzen haben, nach auswärts und rückwärts, man nennt sie Flügel (*Alae*). Der hintere nach den Lendenwirbeln zu gerichtete Rand ist concav, und in diesen schieben sich die divergirenden Fasern des Lendentheils gleichsam ein, um sich mit den sehnichten Fasern zu verbinden. Diese gehen größtentheils von hinten vorwärts und auswärts divergirend; allein zwischen diesen strahlenförmigen Fasern sind viele andere in mannigfachen Richtungen eingewebt, so daß dadurch ein dichtes aber verworrenes Gewebe von Sehnenfasern entsteht. — Am Ausgange des rechten Flügels, neben dem rechten Seitentheil der vorderen Fläche des untersten Brustwirbels, ist zwischen den Sehnenfasern eine Oefnung zum Durchgang der untern Hohlvene.

Von dem Lendentheile, der am tiefsten anfängt, breitet sich das Zwerchfell fächerförmig nach aufwärts und zu beiden Seiten hin aus, und wendet sich nach der Brusthöhle zu, so daß die Fleckenhaut am höchsten liegt, und zu dieser der muskulöse Theil mehr oder weniger schräg, von hinten und von der linken Seite schräger, als von der rechten in die Höhe steigt. Die rechte Hälfte des Zwerchfells liegt etwas höher als die linke, weil jene durch die Leber in die Höhe gedrängt wird.

Der convexe Rand des Rippentheils steht in der Mitte da, wo die drei Backen von der hintern Fläche des schwertförmigen Knorpels abgehen, mit den innern Backen des geraden Abdominalmuskels, der obere Theil mit den Zwischenrippenmuskeln in Berührung; außerdem verbindet er sich auch noch bei der achten und zehnten Rippe mit dem äußern schiefen Abdominalmuskel, bei den untersten Backen mit dem queren Abdominalmuskel, dem viereckigen Lendenmuskel und dem Psoas.

Auf den Seitentheilen der convexen Fläche ruhen die untern breiten Flächen der untern Lappen der Lungen, in der Mitte, auf der Fleckenhaut und schräg nach der linken Seite zu, und abwärts das Herz. Den größten Theil der rechten Hälfte der concaven nach der Brusthöhle zu gekehrten Fläche füllt der hintere stumpfe Rand und die obere convexe Fläche der Leber aus, die sich bis in die Mitte hin erstreckt; unter der Leber kommt der Magen hervor, liegt neben ihr, der dem mittlern und dem größten Theil der linken Hälfte des Zwerchfells, neben diesem berührt dasselbe die Milz mit ihrem obern runden Rand; außerhalb des Sackes des Bauchfells oder Peritoneums, neben dem ersten Lendenwirbel, vor dem viereckigen Lendenmuskel sind die Nebennieren und der oberste Theil der hintern Fläche der Nieren durch Zellgewebe an das Zwerchfell befestigt.

Die obere convexe Fläche ist größtentheils mit der Brusthaut, oder Pleura, überzogen, nur der Theil, auf welchem der Herzbeutel

ruht, ist davon frei, und mit diesem unmittelbar durch Zellgewebe verbunden.

Die untere concave Fläche bedeckt die Bauchhaut allenthalben, und nicht, wo die Nebennieren und die Nieren anliegen. Die Brusthaut geht durch keine der Oeffnungen des Zwerchfells in die Bauchhaut über; aber an einigen kleinen Stellen liegt die untere Fläche jener an der obern dieser, und das Zellgewebe der Brusthöhle hängt mit dem der Unterleibshöhle zusammen; man findet dieses in dem dreieckigen Zwischenraum zwischen den Rippen, welche von dem schwefelförmigen Fortsatz entspringen, zwischen dem mittlern und äußern Schenkel des Lendentheils, im Umfang der Aorta, der untern Hohlvene und der Speiseröhre.

Drei große Oeffnungen und einige kleine dienen den Theilen zum Durchgang, welche aus der Brusthöhle in die Unterleibshöhle und aus dieser in jene gehen. Die drei größern Oeffnungen sind:

1) Die Spalte für die Aorta, (Hiatus aorticus, s. Foramen sinistrum posterius,) zwischen den innern Rändern der innern Schenkel des Lendentheils, nach vorn und oben geschlossen durch die Durchkreuzung der Fasern dieser Schenkel, welche den vordern concaven Rand derselben bildet. Sie liegt vor der Mitte der vordern Fläche des ersten Lenden- und untersten Brustwirbels, und erstreckt sich als länglichte Oeffnung von unten nach auf- und vorwärts. Sie geht durch dieselbe die Aorta und zuweilen auch die Azyga und Hemiazyga.

Die Spalte für die Speiseröhre, oder das länglichte Loch, (Foramen oesophageum, s. ellipticum, s. carneum, s. sinistrum anterius;) es liegt dasselbe weiter nach vorwärts und links als die Spalte für die Aorta, zwischen den innern Rändern der innern Schenkel des Lendentheils und wird durch die zweite Kreuzung der Muskelfasern nach vorn zu geschlossen. Sie ist länglicht und geht von hinten nach vorwärts mit ihrem größern Durchmesser. Die Speiseröhre und mit ihr die nervi vagi gehen durch diese Oeffnung.

3) Die Spalte für die untere Hohlvene, oder das vierseitige Loch, (Foramen pro vena cava, s. quadrilaterum, s. tendineum, s. dextrum. Diese Oeffnung liegt ganz in dem hintern Theil des Zwerchfells, weiter, rechts und vorwärts, als die Oeffnung für die Aorta neben dem rechten Seitentheil der vordern Fläche des untersten Brustwirbels. Sie hat die Form eines in vier flach gekrümmte Linien eingeschlossenen Vierecks, daher der Name. Es geht durch dasselbe die untere Hohlvene wenig schräg aufwärts und der linken Seite in die Brusthöhle, um sich in dem vordern Vorhof des Herzens zu endigen, der über dieser Oeffnung liegt.

Die kleinen nicht so bestimmten Oeffnungen sind, folgende: zwischen dem äußern und mittlern Schenkel des Lendentheils, oder zwischen den Muskelfasern dieses Schenkels, für den großen sympathischen Nerven, auf der rechten Seite auch noch für die Azyga; zwischen dem mittlern und innern Schenkel oder den Muskelfasern des innern Schenkels, für den splanchnischen Nerven, auf der linken Seite auch noch für die Hemiazyga; die Azyga und die Hemiazyga



: auch, zuweilen durch die Spalte für die Aorta in die Brusthöhle. Hier sind noch mehrere ganz unbestimmte kleine Oeffnungen vorhanden, durch welche Gefäße und Nerven gehen.

Das Zwerchfell erhält nach seiner weiten Ausbreitung durch Nester in mehreren benachbarten, und durch eigene Arterien Blut; die concave Fläche aus der innern Mammaria, der Pericardiophrenica, der Phrenopericardiaca und der Musculophrenica; der Rippentheil erhält Nester aus den Intercostalarterien, der Lendentheil aus den Lumbal- und den obern phrenischen Arterien; auf der concaven Fläche breiten sich vorzüglich die untern phrenischen Arterien. — Die phrenischen Venen, die an der untern Fläche des Zwerchfells gemeinhin gehen, ergießen sich in die untere Hohlader, die Venen der oberen Fläche haben mit den oben genannten Arterien gleiche Nachbarn, und ergießen sich in die innere mammarische Vene.

Der phrenische Nerv ist ein für das Zwerchfell allein bestimmter, er kommt von den Halsnerven und breitet sich auf der concaven Fläche aus, von welcher Nester auf die concave Fläche gehen; diese Nervenäste verbreiten sich aber noch auf dieser Fläche aus benachbarten Nerven, dem splanchnischen und vagen Nerven, dem Lumbal- und Intercostalnerven, dem coliacischen Geflecht.

Die fort dauernde Bewegung des Zwerchfells bezieht sich vorzüglich auf das Athemholen. Ziehen sich die Muskelfasern des Rippentheils zusammen; so wird dadurch die concave Fläche platter, der Lendentheil zieht das Zwerchfell abwärts, dadurch wird die Brusthöhle erweitert, so daß sich die Lungen mehr ausdehnen können; die Eingeweide des Unterleibes werden gegen die Beckenhöhle zu und vorwärts gepreßt; dieser Druck kann aber nur dann kräftig wirken, wenn die Abdominalmuskeln, (vgl. diesen Artikel,) zugleich zusammenziehen, dann kann durch denselben die Geburt, die Ausleerung des Darms und der Harnblase befördert werden. Geschieht jenes nicht, so erheben die Abdominalmuskeln nach, die Eingeweide werden gegen die Brust gedrückt. Es erheben sich die Abdominalmuskeln abwechselnd, ziehen sich wieder zusammen, wie das Zwerchfell sinkt und steigt, auf diese Weise ist das Zwerchfell bei dem Athemholen ununterbrochen thätig; es zieht sich zusammen, wird flacher, verlängert die Brusthöhle, verkürzt die Unterleibshöhle beim Einathmen; es erschlafft, die concave Fläche wird wieder mehr gewölbt, die Brusthöhle verkürzt, beim Ausathmen, dieses wird noch dadurch befördert, daß die Abdominalmuskeln die Eingeweide der Unterleibshöhle gegen das Zwerchfell zu pressen. — Durch den abwechselnden Druck auf die Theile, die in der Unterleibshöhle liegen, werden auch diese zu vermehrter Thätigkeit angereizt, die Bewegung der Gefäße, des Magens und der Därme befördert.

Abbildungen des Zwerchfells findet man in:

1. *Novae icones septi transversi*, Goett. 1741, denselben Kupferstich in *Icon. anat. fasc. 1.* (S. auch Loderi tab. an. tab. 35. fig. 1.) *Tab. an. tab. scelet. et musc. 14. fig. 5 — 8.* (S. auch Loderi tab. an. 1 — 4.)

2. *Antoni tab. posth. fig. 1.*

Beachtet wir diese schönen Abbildungen des Zwerchfells schon besitzen; so würde doch eine, ganz getreue in, der Größe der oben aus Haller's Werken angeführ-

ten ein verdienstliches Unternehmen seyn; denn so trefflich auch jene ist, so ist doch Zeichnung des Lendenheils nicht ganz tren und deutlich; die in Albin's und Sutorini's Werken sind zu klein, bei jenen ist die Flehsenhaut nicht vollkommen richtig gezeichnet, diese ohne die Knochen, von welchen die einzelnen Theile entspringen dargestellt, was nicht genügend ist. (Seiler.)

Noch hierher gehörige Schriften:

J. Th. Schenk de diaphragmatis natura et morb. diss. Jen. 1671, 4.

Casp. Bartholini de diaphragmatis structura nova l. Par. 1676, 8.

Alb. v. Haller de diaphragmatis musculis diss. Bern. 1733, 4. (L. 1738, 4. rec. in Halleri oper. min. T. I. p. 249, mit Befügung eines wohl unbestätigenden, Copie der eben gedachten Kupfertafel.)

*Diaphragma auris*, s. Membran des Tympanums. — *cerebri*, s. Scheidewand der Ventrikel des Gehirns. — *nasarium*, s. Scheidewand der Nase. — *palati*, s. Gaumenvorhang.

*Diaphragmatica arteria*, s. *arteria superior* — *vena*, s. Pericardio-phrenische Arterie — Vene.

*Diaphragmaticae arteriae*, s. Phrenische Arterien. — *venae*, s. Phrenische Nerven.

*Diaphragmatici nervi*, s. Phrenische Nerven.

*Diaphragmaticus annulus*, s. Hohladerloch des Diaphragmas. — *nervus*, s. Phrenischer Nerv. — *plexus nervosus*, s. Phrenischer Nervenplexus.

*Diaphratton hymen*, *Diaphrattontes hymenes*, s. *membranae*, s. Mediastinum.

*Diaphraxis*, in Uebersetzung des gleichlautenden Griechischen Wortes  $\delta\iota\alpha\phi\rho\alpha\kappa\sigma\iota\varsigma$ , i. q. *Diaphragma*.

1)  $\delta\iota\alpha\phi\rho\alpha\kappa\sigma\iota\varsigma$ . (Hippocr. de virgin. morb. l.)

*Diaphyse*, (*Diaphysis*  $\delta\iota\alpha\phi\upsilon\sigma\iota\varsigma$ ), Körper  $\kappa\epsilon\iota\mu\epsilon\iota\sigma$ , oder Hauptstück oder Mittelstück eines Knochens, Knochenstamm, Hauptknochen  $\kappa\epsilon\iota\mu\epsilon\iota\sigma$ , (*Corpus ossis*), eine relative Bezeichnung des Theils der Entstehung eines Knochens sich zuerst ausbildenden mittleren und größern Stückes desselben, in Bezug auf seine, Anfangs knorpelartig mit demselben verbundenen, späterhin aber völlig mit ihm verwachsenden Ansätze, oder seine Epiphysen und Apophysen. Knochen.

- 1) in Uebersetzung des gleichlautenden Griechischen Wortes  $\delta\iota\alpha\phi\rho\alpha\kappa\sigma\iota\varsigma$ , das absonderlich wohl einen Auswuchs, wie z. B. an Rohrstengeln und andern Pflanzen, oder einen Spalt und Zwischenraum, oder etwas zwischen zwei gewachsenen Theilen, So kommt dieß Wort in Hippokratischen Schriften in sehr unterschiedlichen Bedeutungen vor. (Vgl. Foesii oecon. Hipp. h. v.) Nach Hippocrate gebrauchen es ältere anatomische Schriftsteller gleichbedeutend mit Apophyse und Knochen. Vgl. Fallopii observ. anat. T. I. oper. p. 362. Erst in neuerer Zeit hat sich die Bedeutung des Wortes nach obiger Bestimmung fixirt. S. Sterni comp. an. ed. 2. p. 11. 2) 3) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 62. 4) Pöder's anat. Handb. 1. B. S. 10. Winslow exp. anat. lat. vers. T. I. tr. de oss. sicc. S. 40.

*Diarthrose*, (*Diarthrosis*  $\delta\iota\alpha\rho\theta\rho\sigma\iota\varsigma$ , *Diarthrosis laxa*  $\delta\iota\alpha\rho\theta\rho\sigma\iota\varsigma\ \lambda\alpha\chi\alpha$ , s. *lita* s. *manifesta*  $\mu\alpha\kappa\iota\sigma\tau\epsilon$ , s. *vaga*), Gelenk  $\gamma\epsilon\lambda\epsilon\kappa$ ; Eingelenkung,

- 1) in Uebersetzung des gleichlautenden Griechischen Wortes  $\delta\iota\alpha\rho\theta\rho\sigma\iota\varsigma$ . G. comm. 2 in l. de articulis. Vgl. auch Laurentii anat. l. 2. 2) Wöbmer's Anweis. zur Knochenl. S. 665. 3) Winslow exp. anat. lat. vers. T. I. tr. de oss. sicc. S. 126. 4) Hildebrandt's Anat. 1. B. S. 93.



gleiches Gelenk<sup>5</sup>, Merkllich deutliche Bewegung der Knochen<sup>6</sup>, Bewegliche Articulation, oder Einlenkung<sup>8</sup>, Verbindung<sup>9</sup> der Knochen durch Gelenke<sup>10</sup>, Verästelte Verbindung der Knochen mit der Bewegung<sup>11</sup>, ligamentöse Gelenkfügung<sup>12</sup>, Merkllich bewegliche Einfügung<sup>13</sup>, (Articulatio laxa<sup>14</sup>, s. mobilis<sup>15</sup>, s. sensibilis, stricte sic dicta, Nexns ossium mobilis<sup>16</sup>, Junciura<sup>17</sup>, articulatio<sup>18</sup>, Dearticulatio<sup>19</sup>, Perarticulatio<sup>20</sup>, Adarticulatio<sup>21</sup>, Aparthrosis<sup>22</sup>, Proarthrosis<sup>23</sup>), diejenige Art von Gelenkverbindung, welche eine freie Beweglichkeit der durch Ligamente verbundenen Knochen zuläßt, und in dieser Beziehung der Synarthrose gegenübersteht. S. Articulation.

1) Monro's Knochenl. Übers. v. Krause, S. 61. 6) Aufmuss anat. Tabell. Tab. 4. 7) Binslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1735, 1. B. S. 38. 8) Plenzand's Zergliederungsk. Uebers. Leipzig. 1782, 1. B. S. 33. 9) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. 10) Edmerring's Knochenl. S. 57. 11) Walter's Abh. v. trochn. Knoch. 2. Aufl. S. 34. 12) Plenzand's Zergliederungsk. u. f. w. a. a. D. S. 39. 13) Leber's Wortf. über d. Zergliederungsk. beigefügte Tafel. 14) Verheyen corp. hum. anat. 1. 8. tr. 5. c. 2. 15) Pöder's anat. Handb. 1. B. S. 18. 16) 17) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. 18) Vesalii de hum. c. fabr. 1. 1. c. 4. 19) Columbi de re anat. 1. 1. c. 3. 20) T. Bartholini anat. libell. 4. c. 1. 21) nach Ingrassias. (S. diesen Artikel.) 22) 23) Vgl. diese Worte.

*Diarthrosis alternata*, s. *Ginglymus*. — *laxa*, s. *libera*, *manifesta*, s. *Diarthrose*. — *orbicularis*, s. *Orbiculardiarthrose*. — *reciproca*, s. *Ginglymus*. — *planiformis*, s. *Flache Diarthrose*. — *spuria*, s. *stricta*, s. *synarthrodica*, s. *Amphiarthrose*. — *trochoides*, s. *Rotation*. — *vaga*, s. *Diarthrose*.

*Diastrophix*, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte<sup>1</sup>, s. *Puls*. *diastrophis*. (Hippocr. de alimento 1.)

*Diastases*, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte<sup>1</sup>, s. *Divisionen*.

*diastases*. (Galen de puls. 1. ad 1yr. c. 2.)

*Diastasis*, i. q. *Diastole*.

*Diastema*, nach dem Griechischen gleichlautenden Worte<sup>1</sup>, s. *Zellwüchiger Bau*.

*Diastema*, eigentlich wie *diastasis*, ein Abstand oder Zwischenraum, in obiger Bedeutung von Galen gebraucht (exeg. dict. Hipp.)

*Diastole*<sup>1</sup>, (*Diastole*<sup>2</sup>), Ausdehnung<sup>3</sup>, oder Erweiterung<sup>4</sup>, oder Erschlaffung<sup>5</sup> des Herzens und der Arterien, (*Diastasis*<sup>6</sup>, *Dilatatio*<sup>7</sup>, s. *Distensio*, s. *Extensio*, s. *Relaxatio*<sup>8</sup>, s. *Remissio*<sup>9</sup>, s. *Relaxatio*<sup>10</sup> cordis et arteriarum), der eine in der als Pulsiren bekannten alternirenden Bewegung des Herzens und der Arterien unterschiedene Zeitmoment, während dessen das Blut für sein Einströmen die nöthige Erweiterung des

2) nach dem gleichlautenden Griechischen Worte *διαστολή*, überhaupt Erweiterung oder Ausdehnung, von Galen (in delin.) insbesondere nicht nur auf das Herz und die Arterien, sondern auch auf das Gehirn und die Membranen angewendet. Vgl. Halleri elem. physiol. T. 1. l. 4. r. 4. §. 1. 5) 4) Henrici Hermann's Physiol. 1. B. S. 218. 5) besonders in Hinsicht des Herzens. 6) Edmerring's Gefühl. S. 59. 6) Vgl. Foesii occ. Hipp. v. *diastasis*. 7) Halleri elem. physiol. 1. c. 8) Ludwig inst. physiol. S. 198. 9) 10) Halleri elem. physiol. 1. c. §. 1 et 2.

nat. physiol. Realw. 11. B. 23

innern Raums erhält, und so der Gegensatz von Systole. V. Puls.

*Diathesis*, entsprechend dem gleichlautenden Griechischen Worte s. *Disposition*.

1) *διαθεσις*. Vgl. Foessii oec. Hipp. h. v.

*Diazoma*, beßgl.<sup>1</sup>, eigentlich die Gegend über den Hüften, man sich gürtet, insbesondere aber das Diaphragma.

1) *διαζωμα* (Aristotel. de part. animal. l. 3. c. 10.)

*Diazoster*, beßgl.<sup>1</sup>, s. letzter Thoraxwirbel.

1) *διαζωστρυς*. (Görr. defin. p. 108.)

*Dicacitas*, s. Geschwängigkeit.

*Dichasteres dentes*, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte<sup>1</sup>, s. Schneidezähne.

1) *διχαστρίγες*.

*Dichotomie*, (*Dichotomia*,) beßgl.<sup>2</sup>, Zertheilung in 2, vorzüglich in zwei gleiche Hälften, oder auch Zerlegung in zwei Gegensätze. Vgl. Theilung.

1) *διχοτομία*, *διχοτομος*, in zwei Hälften theilend, oder getheilt.

*Dichte Masse*, oder *Substanz der Knochen*, s. Feste Substanz der Knochen.

*Dichtigkeit*<sup>1</sup>, (*Densitas*<sup>2</sup>.) So wie jedem Körper in der Natur eine räumliche Begrenzung oder ein Volumen zukommt, was seine Größe nach außen abhängt; so erfüllt auch jeder materiell bestehende Körper den von ihm eingenommenen Raum, dieß aber in eben so unterschiedenem Grade, als die Naturkörper, mit einander verglichen, an sich von einander abweichen. Diese bestimmte Raumerfüllung bezeichnet die Physiker als *Dichtigkeit* eines Körpers. Mit ihr steht die spezifische Schwere des Körpers in der nächsten Verbindung, oder ist proportionirt.

Die sinnliche Beobachtung erkennt eine zweifache Art der Raumerfüllung oder der Dichtigkeit, nämlich eine stete, wobei jeder kleinste noch wahrnehmbare Raum innerhalb des Körpers mit seiner eigentlichen Masse erfüllt ist, und eine unterbrochene, wo sich unerfüllte Zwischenräume in dem Körper zeigen. Diese Art von Körper bezeichnet man hiernach auch als poröse Körper und fast alle organische Körper bilden dahin. Von ersterer Art sind insbesondere alle Körper im Zustande der Flüssigkeit und die aus diesem durch einfache Erzeugung hervorgegangenen festen Körper.

Man hat die verschiedenen Arten der Dichtigkeit der nicht porösen Körper durch die Annahme unmerkbarer Zwischenräume sich erklären wollen, die in den minder dichtern in entsprechenden Verhältnisse bedeutender seyn müßten. Man hat hiernach sich den Begriff eines vollkommen dichten Körpers gebildet, der dann alle Zwischenräume seyn würde. Wenn z. B. das Gold etwa 19 Mal spezifisch schwerer oder dichter als das Wasser ist; so würde in einem gleich großen Volumen des letztern auf 1 erfüllten kleinen Raum, wenn man diesen als Einheit nimmt, noch 18½ eben so große aber unerfüllte oder leere Räume zukommen. Alle dergleichen Annahmen sind aber metaphysische Subtilitäten. Da die Natur nur ein

1) Kant's Anfangsgründe d. Naturwissensch. S. 86.

2) Plinii

mund. l. 9. c. 45.



Verbindung hat, oder nur in ihrer Synthese besteht, und ein leerer Raum nur in der Vorstellung des Verstandes existirt, eine gewisse Raumerfüllung also mit in die Grundbedingung des Seyns geht, der Raum aber in seiner Größe und in seiner Kleinheit unendlich gedacht werden muß; so erscheint in einer Natursicht, die erkennt, daß überhaupt das Endliche nur der Reflex des Unendlichen, unser beschränktes Fassungsvermögen ist, auch die Raumerfüllung der unendlichen Vermehrung und Verminderung fähig und in der Natur überhaupt nur als eine Relativität. Der relativ dichteste Körper würde hiernach der seyn, in dem eine Masse, die bei ihrer höchsten Ausdehnung oder Rarefaction noch den relativ größten Raum einnehmen würde, in dem relativ kleinsten Körper zusammenbesaßt wäre. Absolut aber kann so wenig von einem allerdichtesten, oder auch einem allverdünntesten Körper die Rede seyn, als von einem allerkleinsten, oder auch allergroßten Raume; und Raum und Raumerfüllung zeichnen überhaupt nur die zwei Seiten des Seyns, die der Extensität und der Intensität, beide jedoch nur in der materiellen Sphäre. Vgl. Materie. (H.)

**Dickdarm**, **Dicker Darm**<sup>1</sup>, **Dicke Därme**<sup>2</sup>, oder **Gedärme**<sup>3</sup>, **Weiter Darm**<sup>4</sup>, **Weite Därme**<sup>5</sup>, **Grimmdarm**<sup>6</sup>, **Dicker Theil der Gedärme**<sup>7</sup>, **Dicker Darmcanal**<sup>8</sup>, (*Intestinum crassum*<sup>9</sup>, s. *amplum*<sup>10</sup>, s. *plenius*<sup>11</sup>, *Intestina crassa*<sup>12</sup>, s. *ampla*), die zweite Hälfte des Darmcanals im engern Sinn, oder der Därme, welche sich vorzüglich durch bedeutendere Geästigkeit vor der erstern auszeichnet, vornehmlich zur Aufnahme und zur Zusammenhaltung der Rückstände der verdauten Nahrungsmittel bestimmt ist und gewöhnlich, als **Blinddarm**, **Colon** und **Ausdarm**, als eben so viele einzelne Därme unterschieden wird. **Darmcanal**.

1) **Sömmerring's Eingeweidel.** §. 222 u. 220. 2) **Haller's Grundr.** d. **Physiol.** umgearb. von v. **Leveling**, 2. Th. S. 665. 3) **Maner's** Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 415. 4) **Sömmerring's Eingeweidel.** §. 220. 5) **Haller's Grundr.** u. s. w. a. a. D. 6) **Sömmerring's Eingeweidel.** a. a. D. 7) **Schaarschmidt's** **splanchnol. Tabellen**, Tab. 4. 8) **Willbrand's** **Physiol.** d. M. §. 87. 9) 10) **Hildebrandt's** **Lehrb.** d. **Anat.** d. M. 3. B. §. 2049. 11) **Celsi de med.** 1. 4. c. 14. 12) **Vesalii de h. corp. fabr.** 1. 5. c. 5.

**Dickdarmarterien**, s. **Colonarterien**. — **venen**, s. **Colonvenen**.

**Dicke Augapfelhaut**, s. **Sclerotica**. — **Därme**, s. **Dickdarm**. — **des Körpers**, s. **Corpulenz**. — **Gedärme**, s. **Dickdarm**. — **Hirnhaut**, s. **Harte Hirnhaut**.

**Dicke Knochen**<sup>1</sup>, (*Ossa crassa*<sup>2</sup>), werden zum Unterschied von röhren- und colindrischen Knochen solche Knochen genannt, welche weniger auffallend nach einer oder der andern der Dimensionen jener gebildet sind, sondern an denen auch die dritte Dimension, nämlich die der Dicke, gleich hervorstechend sich zeigt, die ihrer Form nach übrigens sich entweder mehr rund, (*Ossa rotunda*), oder mehr würflich (*Ossa cuboidea*), oder sonst eckig zeigen. S. **Knochen**.

1) 2) **Eder's anat. Handb.** 1. B. S. 8.

**Dicker Darm** oder Darmcanal, oder Theil der Gedärme  
f. Dickdarm.

**Dickeres Ende des Herzens**, f. Basis des Herzens.

**Dictyoides**, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte<sup>1</sup>, i.  
Rele mirabile. Vgl. auch Malpighisches Schleimhäutchen.

1) *dictyoides*, netzförmig.

**Didymi**, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte<sup>1</sup>, f. Zwillinge, ingl. Hoden, ingl. Bierhügel des Gehirns.

1) *didymi*.

**Didymia**, beßgl.<sup>1</sup>, f. Bierhügel des Gehirns.

1) *didymia*.

**Diemerbroekianus nervus**, f. Difactorischer Nerv.

**Diemerbroek's Nackenmuskel**<sup>1</sup>, (*Diemerbroekianus musculus cervicalis descendens*), f. Absteigender Cervicalmuskel.

1) nach Diemerbroek, Prof. in Utrecht, so benannt. Cassenohm's Anatomie anat. Betracht. d. menschl. K. übers. v. Baldinger, S. 513.

**Diffidentia**, f. Mißtrauen.

**Digastrici muscoli**, f. Zweibäuchige Muskeln.

**Digastricus**<sup>1</sup>, **Digastricus** der untern Kinnlade, (*Digastricus*<sup>2</sup>, *Digastricus maxillae inferioris* sc. musculus,) Zweibäuchiger Muskel<sup>3</sup>, oder Kiefermuskel<sup>4</sup>, oder Unterkiefermuskel<sup>5</sup>, Zweibäuchiger Muskel<sup>6</sup>, oder Zweibäuchiges Mäuslein<sup>7</sup> der untern Kinnlade, Niederzieher des Unterkiefers<sup>8</sup>, (Biventer<sup>10</sup>, Biventer maxillae inferioris<sup>11</sup>, Musculus deprimens biventer s. digastricus<sup>12</sup>, Musculus graphioides<sup>13</sup>, s. symphyso-hyo-mastoideus<sup>14</sup>, s. mandibulo-hyo-mastoideus<sup>15</sup>, s. mastoideo-genieus<sup>16</sup>, s. mastoideo-hygieniens<sup>17</sup>), der vorzüglich dadurch, daß seine zwei Bäuche durch eine mittlere Sehne verbunden sind, sich auszeichnende Muskel, welcher mit seinem hinteren<sup>18</sup> oder längern Theile, oder sogenannten Bauche, (Venter posterior<sup>19</sup>, s. temporalis<sup>20</sup>), aus der mastoideischen Incisur des Schläfenknochens kommt, dann in einem Bogen ab-, vor- und einwärts seine Richtung nehmend, in gedachte, den stylohyoideischen Muskel durchbohrende Sehne übergeht, mit selbiger sich an den Zungenbeinchen setzt, dann mit seinem vordern Bauche<sup>21</sup>, (Venter anterior<sup>22</sup>, s. maxillaris<sup>23</sup>), aufwärts an die Mitte des innern Forams des Unterkiefers sich befestigt; und sowohl den Unterkiefer

1) 2) nach dem Griechischen Worte *διγαστριος*, i. e. biventer Riolan Anatomie anat. 1. 5. c. 15. 3) Leber's prael. anat. ed. nov. Vind. 1717 p. 149.

4) Haller's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v. Leber 2. Th. S. 646. 5) nach Sömmerring (Muscul. S. 138) 6) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 1103.

7) Schaarschmidt Anat. Tabell. Tab. 5. 8) nach Rulmus (anat. Tabell. Tab. 29) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. a. a. O.

10) nach Spigel (d. c. fabr. l. 4. c. 5.) 11) Albini hist. mu. c. 4. ed p. 193. nach Spigel (l. c.)

13) Vgl. dieß Wort. Th. Bartholinus 1. 3. c. 11. 14) 15) nach Schröter (Nomenclat. d. Musc. S. 13.) (Mastoideo-genien) nach Chaussier (expos. sommaire des musc. p. 17)

17) Mastoideo-hygienien) nach Dumas (systeme method. de nomenclat. des musc. p. 106.) 18) 19) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. B. S. 1743.

20) nach Albin (l. c.) 21) 22) Hildebrandt's Lehrb. a. a. O.

23) nach Albin (l. c.)



vorwärts nach dem Zungenknochen, als diesen oberwärts nach dem Unterarm hinanziehen bestimmt ist. S. Kaumuskeln.

Digestion, (*Digestio*.) s. Verdauung.

Digestionsorgane, s. Verdauungsorgane. — proceß, s. Verdauung.

Digestivum prelum, s. Verdauungsproceße.

Digitalarterien der Hand, (*Digitales arteriae manus*.) Fingerarterien<sup>2</sup>, Fingerschlag<sup>2</sup> oder pulsader<sup>2</sup>nen<sup>4</sup>. Deren werden doppelte unterschieden: Dorsal- und Volarfingerarterien<sup>5</sup>, (*Arteriae digitales dorsales<sup>6</sup> et volares<sup>7</sup>*.) Von jeder Art gehen zehn auf beiden Seiten der Hand, nämlich der Dorsal- und Volarfläche derselben, zu den Fingern herab. Die ersten verlieren sich im Fell der Finger, die letztern gehen bis zu den Nägeln herab. Sie nehmen größtentheils aus dem Arcus der Handrücken- und Handflächenarterien ihren Ursprung. Man unter- scheidet sie wieder, je nachdem sie auf der Radial- oder Ulnarseite der Hand laufen in Radial- und Ulnararterien, (*A. radiales<sup>8</sup> et ulnares<sup>9</sup>*.) S. unter Axillararterie.

Maner's Besch. d. Blutgef. S. 111. 2) Pöder's anat. Taf. Taf. 91. Nr. 392 u. s. w. 3) Meutaud's Zergliederungsk. Uebers. Selpz. 1782, 1. B. S. 696, Note. 4) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1753, 33. B. S. 70. 5) Pöder's anat. Taf. Taf. 92, Nr. 240, 241 u. s. w. 77) — 9) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2534 u. 2530.

Digitalarterien des Fußes<sup>1</sup>, (*Digitales arteriae pedis*.) Fußzehen- oder Zehenarterien<sup>2</sup>, Zehensschlag<sup>4</sup> oder Pulsader<sup>2</sup>nen. Auch deren werden doppelte unterschieden: Dorsal- und Plantarzehenarterien, (*Arteriae digitales dorsales et plantares*.) Es sind meist Zweige der Zwischenknochenarterien des Fußes, die zum Theil aus dem Bogen der Fußsohlenarterien ihren Ursprung nehmen, und wovon zehn auf der obern Seite und eben so viele auf der untern Seite des Fußes zu den Zehen fortlaufen, und hier als innere<sup>5</sup> und äußere<sup>6</sup>, (*internae et externae*.) unterschieden werden. S. unter Cruralarterie.

Pöder's anat. Taf. Taf. 108. Flg. 3. Nr. 76. u. s. w. 2) Maner's Besch. d. Blutgef. S. 280. 3) Pöder's anat. Tafeln, Taf. 91, Nr. 663. u. s. w. 4) Meutaud's Zergliederungsk. Uebers. Selpz. 1782, 1. B. S. 732, Note. 5) 6) Pöder's anat. Tafeln, Taf. 91, Nr. 671, 69, 70 u. s. w.

Digitales nervi manus et pedis, s. Digitalnerven der Hand und des Fußes. — venae manus et pedis, s. Digitalvenen der Hand und des Fußes.

Digitalextremität des Fußes, (*Digitalis extremitas pedis*.) Vorderes Ende des Fußes<sup>1</sup>, (*Extremitas anterior pedis*.) Vorwärts in die Zehen auslaufende Ende des Fußes. S. Fuß. — 3) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 920.

Digitalfläche der Knochen des Carpus, (*Digitalis superficies ossium carpi*.) Untere Gegend der Handwurzelknochen<sup>2</sup>, die beim Herabhängen des Arms und der Hand unterwärts also nach dem Metacarpus und den Fingern zu gekehrte Fläche der Knochen des Carpus. S. Handknochen.

Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 752. 2) Maner's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 255.

*Digitalis cavitas cerebri*, f. unter Hörner der großen Hirnhöhle, unteres Horn. — *extremities pedis*, f. Digitalextremität des Fußes. — *processus scapulae*, f. Acromion, auch Coracoideischer Proceß. — *substantia caeci*, f. Vermiculärer Proceß des Blinddarms. — *superficies ossium carpi*, f. Digitalfläche des Knochens des Carpus.

**Digitalnerven der Hand,** (*Digitales nervi manus*), Fingernerven<sup>2</sup>, die zu den Fingern gelangenden letzten Enden des Median-, des Radial- und Ulnarnerven, deren jeder Finger a) zu Volarernerven, (*Nervi volares*<sup>3</sup>), auf der innern, und b) zu Dorsalnerven, (*Nervi dorsales*<sup>4</sup>), auf der äußern Seite hat, von denen dann wieder, a) ein Radialnerv, (*Nervus radialis* an der dem Radius zu gekehrten Seite, b) und ein Ulnarnerv (*Nervus ulnaris*<sup>6</sup>) an der der Ulna zu gekehrten Seite unterschieden wird. Es kommen aber insbesondere 1) von den Volar-Fingernerven, a) aus dem Mediannerven α) der Radialnerv des Daumens, (*N. radialis pollicis*<sup>7</sup>), besonders, β) der Ulnarnerv des Daumens, und der Radialnerv des Zeigefingers (*N. ulnaris pollicis*<sup>8</sup> et *radialis indicis*<sup>9</sup>), aus einem gemeinschaftlichen Stamm, γ) der Ulnarnerv des Zeigefingers, und Radialnerv des Mittelfingers, (*N. ulnaris indicis*<sup>10</sup> et *radialis digiti medii*<sup>11</sup>), gemeinschaftlich, δ) der Ulnarnerv des Mittelfingers, und Radialnerv des Ringfingers, (*ulnaris digiti medii*<sup>12</sup> et *radialis digiti quarta*<sup>13</sup>), gemeinschaftlich; b) aus dem Ulnarnerven, α) der Ulnarnerv des Ringfingers, und Radialnerv des kleinen Fingers, (*N. ulnaris digiti quarti*<sup>14</sup> et *radialis digiti minimi*<sup>15</sup>), gemeinschaftlich, β) der Ulnarnerv des kleinen Fingers, (*N. ulnaris digiti minimi*<sup>16</sup>), allein; 2) von den Dorsalfingernerven, a) dem Radialnerven α) der Radialnerv des Daumens, (*N. radialis poll.*<sup>17</sup>) allein, β) der Ulnarnerv des Daumens und Radialnerv des Zeigefingers, (*N. uln. poll.*<sup>18</sup> et *rad. ind.*), gemeinschaftlich, γ) der Ulnarnerv des Zeigefingers und Radialnerv des Mittelfingers, (*N. uln. ind.*<sup>20</sup> et *rad. min.*<sup>21</sup>), gemeinschaftlich, b) aus dem Ulnarnerven, α) der Ulnarnerv des Mittelfingers und Radialnerv des Ringfingers, (*N. uln. dig. min.*<sup>22</sup> et *rad. dig. qu.*<sup>23</sup>), gemeinschaftlich, β) der Ulnarnerv des Ringfingers, und Radialnerv des kleinen Fingers, (*N. uln. dig. qu.*<sup>24</sup> et *rad. dig. min.*), gemeinschaftlich, γ) der Ulnarnerv des kleinen Fingers, (*ulnaris dig. min.*) allein. S. unter Brachialnerven.

- 1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 3204. 2) Man vgl. Beschr. d. menschl. K. 8. B. S. 284. 3) — 25) Hildebrandt's u. f. w. a. a. D. Vgl. auch die einzelnen Artikel: Pollicornerven, Zeigefinger-, Mittelfinger-, Ringfinger-Ohrfinger-nerven.

**Digitalnerven des Fußes,** (*Digitales nervi pedis*), Behnerven<sup>1</sup>, Fußzehennerven<sup>3</sup>. Deren werden in Uebereinstimmung des Verlaufs derselben mit denen der Fingernerven an Behe unterschieden: 1) zwei Plantarnerven, (*Nervi plantares*

- 1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 3227. 2) 3) W. er's Beschr. d. menschl. K. 8. B. S. 376. 4) Hildebrandt's u. f. w. a. a. D.



der untern Seite, b) zwei Dorsalnerven, (Nervi dorsales<sup>5</sup>), der obern Seite, von denen wieder jeder als äußerer oder als innerer, (N. externi<sup>6</sup> et interni<sup>7</sup>), mit Bemerkung der einzelnen seine Bezeichnung erhält. Die Plantarnerven kommen alle aus Tibialnerven, so auch der äußere Dorsalnerv der kleinen Zehe, übrigen Dorsalnerven kommen vom peroneischen Nerven. S. unter Ischiadischer Nerv.

— 7) S. Note 4.

**Digitalvenen der Hand<sup>1</sup>**, (Digitales venae manus<sup>2</sup>.) Fingervenen, oder Blutadern<sup>3</sup>, Zurückführende Fingervenen<sup>4</sup>, die die Digitalarterien begleitenden und auch eben so in Dorsal- und Volarvenen<sup>5</sup>, (Venae digitales dorsales<sup>6</sup> et volares<sup>7</sup>), und dann wieder in Radial- und Ulnarvenen, (venae radiales<sup>8</sup> et ulnares<sup>9</sup>), unterschiedenen Venen, wovon sich die erstere, oder die Dorsalvenen, besonders dadurch unterscheiden, daß sie sich im Fortgang von den gleichnamigen Arterien trennen und den Anfang der Hautvenen der Hand und des Arms bilden. S. unter Axillarevene.

1) Eoder's anat. Tafeln, Taf. 130, Fig. 1. Nr. 44. u. f. w. 2) Majer's Besch. d. Blutgef. S. 122. 3) Plenck's erst. Umriss d. Zergliederungsk. aus d. lat. Wien 1780, S. 293. 4) Leber's Vorles. über d. Zergliederungsk. S. 310. 5) — 9) Eoder's anat. Tafeln, u. lat. Text, Taf. 124, Fig. 2, Nr. 26, 27 u. Taf. 130, Fig. 1. Nr. 40 u. f. w.

**Digitalvenen des Fußes<sup>1</sup>**, (Digitales venae pedis<sup>2</sup>.) Fußvenen- oder Zehenvenen, oder Blutadern<sup>3</sup>, Zurückführende Zehenadern<sup>4</sup>. Die die Digitalarterien des Fußes begleiten und ebenfalls so in Dorsal- und Plantarvenen, (V. digitales dorsales<sup>5</sup>, et plantares<sup>6</sup>), und ferner wieder in äußere<sup>7</sup> und innere<sup>8</sup>, (externae<sup>9</sup> et internae<sup>10</sup>), unterschiedenen Venen, wovon die erstere, oder die Dorsalvenen, eben so wie die ihnen entsprechenden am Arm, den Anfang der Hautvenen des Fußes bilden. S. unter Cruralvene.

1) Eoder's anat. Tafeln, Taf. 127, Fig. 1. Nr. 8 u. f. w. 2) Leber's prael. anat. ed. nov. Vind. 1778, p. 247. 3) Plenck's Umr. d. Zergliederungsk. aus d. lat. S. 295. 4) Leber's Vorles. über d. Zergliederungsk. S. 313. 5) — 10) Eoder's anat. Tafeln, u. lat. Text, Taf. 127, Fig. 1. Nr. 7. Taf. 128, Fig. 3. Nr. 53, 54 u. f. w.

**Digitatae impressiones cerebri**, f. Fingerimpressionen der Gehirnhöhle. — **insertiones**, f. Dentationen.

**Digitationen**, (*Digitationes*), finger- oder zehenartige Bildungen. Vgl. auch Dentationen.

**Digitationen der Hippocampusfüße**, (*Digitationes pedis hippocampi majoris et minoris<sup>1</sup>*), Zehen des großen und kleinen Seepferdesfußes<sup>2</sup>, die streifenartigen Hügel an den Enden der gedachten Bildungen. S. Hippocampusfüße.

1) 2) Majer's Besch. d. menschl. K. 6. B. S. 138 u. 139.

**Digitationes aponeurosis palmaris**, f. unter Palmaraponeurose. — **pedis hippocampi**, f. Digitationen der Hippocampusfüße. — **tubarum Fallopii**, f. Fimbrien der Fallopiischen Trommelfellen.

**Digitum**, f. Finger. — **pedis**, f. Zehen.

**Digitulus**, f. Fingerchen.

*Digitus annularis*, s. Ringsfinger. — *auricularis*, s. D. finger. — *cordis*, s. unter Ringsfinger. — *demonstrativus*, *demonstratorius*, s. Zeigefinger. — *famosus*, s. *impudicus*, i. q. D. medius. — *index*, s. Zeigefinger. — *infamis*, i. q. D. medius. — *magnus*, s. Daumen. — *medicinalis*, s. *medicus*, i. q. D. annularis. — *medius*, s. Mittelfinger. — *minimum*, i. q. D. auricularis. — *obscoenus*, i. q. D. medius. — *primus*, i. q. D. auricularis. — *primus*, s. Daumen. — *quartus*, i. q. D. annularis. — *quintus*, i. q. D. auricularis. — *salutaris*, s. *salutarius*, s. *secundus*, s. Zeigefinger. — *tertius*, s. *verpus*, i. q. D. medius.

*Dignitas*, s. Würde.

*Dilatans nasi musculus*, s. Pyramidalmuskel der Nase.

*Dilatation*, (*Dilatatio*<sup>1)</sup>) Erweiterung, die Vermehrung der innern Geräumigkeit einer Höhle, in so fern die Function ein in sich hohlen organischen Theils, wie z. E. die der Brusthöhle bei Einathmen, einen mehrern Raum fordert. Vgl. Höhlen, oder Höhlungen des Körpers.

<sup>1)</sup> Halleri elem. physiol. T. II. 1. 6. s. 3. §. 9.

*Dilatatio cordis et arteriarum*, s. Diastole.

*Dilatator alae nasi et elevator labii superioris*, i. q. *Levator labii superioris alaeque nasi*. — *alarum nasi*, der Nase gehörige Theil des Levators der Oberlippe und des Nasenflügels. — *glottidis anterior*, i. q. *Cricothyreoideus*. — — — *posterior*, s. unter *Cricocarytanoideische Muskeln*, den hintern. — *nasalis*, s. *pinnae nasi minor*, i. q. *Levator labii superioris alaeque nasi*. — *urethrae*, i. q. *Accelerator urinae*.

*Dilatoren der Glottis*, (*Dilatores glottidis*<sup>1)</sup>) Erweiterer der Kehle<sup>2)</sup>, die überhaupt in ihrer Wirkung eine Erschlaffung oder Erweiterung der Stimmrinne zur Folge habenden Muskeln, wohin insbesondere der *Cricothyreoideus* und die *cricocarytanoideischen Muskeln* zu rechnen, und also die Antagonisten der *Contractoren der Glottis*<sup>3)</sup>, oder der Verengerer der Kehle<sup>4)</sup>. S. *Cricothyreoideus* und *Cricocarytanoideische Muskeln*.

<sup>1)</sup> — <sup>4)</sup> Mayer's Besch. d. menschl. K. 4 B. S. 155.

*Dilatrix facultas*<sup>1)</sup>, *Facultas amplificatrix*<sup>2)</sup>, eine noch gesteigerte Subtilität der alten Galenischen Schulen, indem der vermehrenden Facultät, welche Galen aufstellt, noch eine erweiterte beigelegt wurde. Vgl. Facultäten.

<sup>1)</sup> <sup>2)</sup> C. Hoffmanni apol. pro Galeno, 1. 2. s. 7. c. 348.

*Dilectio*, s. Liebe.

*Diligentia*, s. Fleiß.

*Dimensionen*, (*Dimensiones*<sup>1)</sup>) Größen, Weiten (Mensurae, *Diastases*<sup>2)</sup>) Bestimmungen körperlicher Theile, oder auch körperlicher Höhlen, ihrem Raum oder ihrer Capacität nach, also nach Länge, Breite und Tiefe oder Höhe. Vgl. Raum, oder Körper.

<sup>1)</sup> Cicéron. Tusc. qu. 1. v. c. 24. <sup>2)</sup> Vgl. dies Wort.

*Dimensionen des Beckens*<sup>1)</sup>, (*Dimensiones*<sup>2)</sup> *pelvis*

<sup>1)</sup> v. Siebold's Lehrb. d. Entbindungsk. 1. B. §. 91.

<sup>2)</sup> Smellie's

anat. tab. 1.



ken ausmessungen<sup>3</sup>, Maße<sup>4</sup>, oder Weiten<sup>5</sup> des Beckens, mensurae pelvis<sup>6</sup>), die Normaldistanzen der einzelnen Theile des Beckens, insbesondere beim weiblichen Geschlecht, wornach die besonders den Durchgang des Kindes bei der Geburt wichtige normale Ge-  
müßigkeit der Beckenhöhle selbst bestimmt wird. S. Becken.

1) Altken's Grundr. d. Entbindungsst. übers. v. Spöhr, S. 16. 4) Steln's  
Anleit. zur Geburtsh. 7. Aufl. 1. Th. S. 49. 5) Plenk's Anfangsgr. d.  
Geburtsh. 1. Th. S. 10. 6) Smellie tab. anat. 1. c. 5.

Dimensionen des Kopfs des Kindes, (*Dimensiones  
capitis infantilis*), Ausmessungen des Kindskopfs,  
zum technischen Behuf bei Entbindungen ebenfalls unterschieden  
werden, und werden besonders nach dreifachen Arten und den Dia-  
metern desselben bestimmt. Vgl. Arten und Diameter des Kindes-  
kopfs.

*Diogenianus cyphus*, s. *Diogenis patera*, s. *poculum*,  
*cuppellectile*, s. Becher des Diogenes.

*Dionysisei*, nach dem gleichen Griechischen Worte<sup>1</sup>, s. Zygō-  
tischer Proceß des Stirnknochens.

*διονυσισκοί*, nach Galen's (defin. med.) Erklärung: „osseae eminentiae  
propter tempora exortae; eadem cornua appellantur, nomine ab ani-  
manibus cornigeris ducto.“ Die Benennung ist von Bacchus (*Διονυσος*),  
hergenommen, der mit Hörnern von alten Dichtern dargestellt wurde.

*Diorchiten*, (*Diorchides*), s. unter Orchiten.

*Diphthongen*<sup>1</sup>, (*Diphthongi*<sup>2</sup>), Doppellauter<sup>3</sup>, in  
menschlichen Sprache die zwischen den reinen Selbstlautern in der  
Sprache liegenden Töne, in so fern sie selbst wieder einen eigenthüm-  
lichen, als Element der Sprache dienenden, Laut bilden, und nicht  
als das Gehör bloß eine schnelle Aufeinanderfolge von Selbstlautern  
S. Sprache.

1) nach dem gleichlautenden Griechischen Worte *διφθογγος*. Vgl. Isidori  
etymol. 1. 1. c. 15. 3) Schimmerring's Eingeweidel. S. 119

*Diplasiasmos*, nach dem gleichen Griechischen Worte<sup>1</sup>, i. q.  
publicatura.

*διπλασιασμος*. (Galen de musc. diss. c. 18.)

*Diploe*<sup>1</sup>, (*Diploe*<sup>2</sup>), nach dem Griechischen gleichlautenden  
Worte<sup>3</sup>, ist nach Hippokratisher Bezeichnung<sup>4</sup> die doppelte Knochen-  
platte, aus der die Hirnschale oberwärts besteht, zugleich mit dem feil-  
en knochigen, mit Mark erfüllten Gewebe, durch welche beide Ta-  
feln geschieden sind. An andern Orten<sup>5</sup> wird aber dieß Wort aus-  
drückend auf die gedachte Mittelsubstanz oder Markzellen,  
Hirnschâdelbeinmark, Hirnschâdelmark, (*Meditullium*<sup>6</sup>,  
*meninges secunda*<sup>7</sup>, *Substantia*, s. *Medulla*<sup>8</sup> *intermedia*, *Me-  
dulla calvariae discrimin*<sup>9</sup>, *Commissura*<sup>10</sup>, *Diploma*<sup>11</sup>), be-  
zogen. Diese Bedeutung ist die einzige in den ärztlichen Schulen  
angenommene; doch hat man in neuerer Zeit, mit Verläugnung des

2) Maner's Besch. d. menschl. K. 1. B. S. 233. 3) *διπλον*, eigentl.  
Nach ein doppelt gelegter, oder zusammengelegter Körper. 4) Hippocr. 1.  
de cap. vulnerib. c. 1. Vgl. Foessii oec. Hipp. h. v. 5) eod. libr.  
Vgl. Foessii oec. H. 1. c. auch Rufi de appell. part. c. h. S. Ste.  
phani dict. med. 1564, p. 558. 6) 7) Foessii oec. Hipp. 1. c.  
8) Paaw de ossib. 1. Lugd. B. 1616, p. 28. 9) C. Bauhini theatr.  
an. 1. 3. c. 5. not. 9. 10) Mourou's Knochenl. übers. v. Krause, S.  
99, Note c. 11) ungewöhnlich. Vgl. dieß Wort.

Wortsinns, dieß Wort auch auf schwammige und markige Knochen substanz überhaupt bezogen. Vgl. Spongiöse Substanz d. Knochen, auch Hirnschädel.

*Diploetica substantia*, s. Spongiöse Substanz der Knochen.

*Diploma*, nach dem Griechischen gleichlautenden Worte <sup>1</sup>, i. Diploe.

<sup>1</sup>) διπλωμα, etwas doppelt Zusammengelegtes.

*Diplosis*, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte <sup>1</sup>, i. Duplicatura.

<sup>1</sup>) διπλωσις.

*Dipsa*, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Worte s. Durst.

<sup>1</sup>) διψα

*Diradiation*, (*Diradiatio* <sup>1</sup>, Irradiatio <sup>2</sup>), Ausstrahlung, Verbreitung von Licht von einem leuchtenden Körper aus wird insbesondere von Helmont <sup>3</sup> zur Andeutung der Willensäuerungen der Seele, (die hier als Lumen vitale aufgestellt wird,) braucht. Vgl. Seele.

<sup>1</sup>) <sup>2</sup>) Vgl. Charleton oecon. anim. ex. 12. §. 3.

<sup>3</sup>) de lithia

c. 9. Nr. 75.

*Directe Augentäuschungen*, s. unter Augentäuschungen.

*Direction*, (*Directio* <sup>1</sup>), Richtung <sup>2</sup>, in jeder Bewegung so wie auch in denen von Theilen des thierischen Körpers, die id. Linie zwischen dem bewegten Körper und dem Punct, dem sich ner während der Bewegung nähert, welcher entsprechend auch Bewegung eine geradlinige ist, wenn der Zielpunct selbst der ein ist und unverrückt bleibt. S. Bewegung.

<sup>1</sup>) Winkleri instit. philos. univ. ed. 3. §. 1136.

<sup>2</sup>) Succow's

ein. Naturf. §. 71.

*Directio convergens*, s. Convergirende Richtung. — *divergens*, s. Divergirende Richtung.

*Director penis*, i. q. Erector penis.

*Diribitorium*, i. q. Mediastinum.

*Discantton* <sup>1</sup>, Hoher <sup>2</sup> oder Feiner Ton <sup>3</sup>, (Vox acuta s. summa,) die höchste Modulation der menschlichen Stimme Sprechen, vorzüglich aber im Singen, welche zunächst von der S engerung der Stimmriße und stärkerer Spannung der Ligamente gleichzeitig aufwärts gezogenen Larynx abhängig ist, welcher Ton beim männlichen Geschlecht unter ungehemmt sich entwickelnder schlechtreife, in den Falsetton ausartet. Vgl. diesen Artikel. Singen.

<sup>1</sup>) — <sup>3</sup>) Sommering's Eingeweidel. §. 109.

<sup>4</sup>) Halleri el. phy

T. III. l. 9. s. 2. §. 5.

*Disciforme os genu*, s. Kniescheibe.

*Disciformis*, s. *Discoides* <sup>1</sup> *membrana*, s. Capsel der staltlinse.

<sup>1</sup>) nach dem Griechischen gleichlautenden Worte δισκοειδής, einer Wurf scheibe lch. Vgl. Aetii ietrabibl. l. 7. c. 1.

*Discret*, (*Discretum* <sup>1</sup>), der Gegensatz der Continuität Nebeneinanderseyn, oder die Absonderung im Körperlichen, wo

<sup>1</sup>) Winkleri instit. philos. univ. ed. 3. §. 65.



h Zwischenräume, doch durch aufgehobene Cohäsion. Vgl. Con-  
suetud. 1.

**Discretion**, wörtlich Unterscheidungsvermögen, wird nach ver-  
breitetem Sprachgebrauch auf die moralische Gesinnung eines Men-  
schen, überhaupt in Hinsicht auf dessen gesellige Verhältnisse bezo-  
gen, nicht aber als eine für sich bestehende Tugend, sondern als das  
Mittel eines ernstlichen Strebens, die Ansprüche der Menschen im  
bürgerlichen Leben richtig zu würdigen, und sie auch da zu achten, wo  
nicht durch ein ausgesprochenes Gesetz, oder das Vermögen, sie  
zu machen, unterstützt sind.

**Discretion**, oder *discrete* Denkungsart, ist also eine der hö-  
chsten Blüthen der Humanität, und eine der wesentlichsten Bande, die  
Menschen unter sich vereinen und zusammenhalten. Sie kann  
nur harmonisch entwickeltem moralischen Sinn vorausgesetzt werden,  
wie geht wesentlich in diese harmonische Entwicklung mit ein,  
denn sie auch Ruhe des Geistes voraussetzt, und gewöhnlich aufge-  
regt wird, wenn der Geist in Verfolgung eines besondern Ziels,  
das sich ein hohes und edles seyn kann, die übrigen Rücksichten  
des Lebens vergißt. Ein edles Gemüth wird aber, weil jene Den-  
kungsart immer der Boden aller höhern moralischen Cultur ist, im-  
mer wieder zur Discretion zurückkehren, sobald es sich dazu aufge-  
regt fühlt. Sie wird daher auch von jedem Menschen, dem man  
Verstand und rechtlichen Sinn zugestehet, vorausgesetzt und gefordert.  
Man erwartet der Hohe von der Discretion seiner Untergebenen, ihm  
unverhüllten Verschwiegenheit bemerkter Fehler und Schwächen, der  
Verwundne von der Discretion des Besiegers Schonung der Ehre  
des Lebens. So vertraut der Freund dem Freunde ein Geheim-  
niß im Vertrauen auf seine Discretion an, oder in der Voraussetzung,  
daß er es als sein eignes bewahren; so werden des Reichen Spen-  
den nur dann dem Armen wirkliche Wohlthaten, wenn durch die *dis-  
crete* Art, mit welcher dieser sie erhält, das Gefühl seiner Erniedri-  
gung nicht aufgeregt wird.

Das gegengesetzte Benehmen ist *Indiscretion*, und die dieser  
Grunde liegende Gesinnung *indiscrete* Denkungsart. Sie  
beachtet sowohl Fehler des Willens, da sie sich nicht auf die Absicht  
richtet, andern Uebels, oder ein Unrecht zuzufügen, oder eine be-  
stehende gesetzliche Ordnung zu verletzen, als vielmehr Leichtsinns und  
gleichgültigen Andeutung von Euphorie, oder die Folge einseitiger lei-  
bhaftlicher Gefühle, wodurch der Sinn für andere Lebensforde-  
rungen verschlossen wird. Menschen, die im Umgange mit andern nur  
Pflichtgebot streng vor Augen haben, lassen sich häufige *Indis-  
cretions* gegen andere zu Schulden kommen, weil sie, fest den Blick  
auf das Gebot oder Verbot heftend, die Nebenverbindungen nicht  
sehen, die in ihrer innigsten Verschlingung, wenn auch nicht die  
Stützen und Grundsäulen, aber doch die Zierden und der Lebens-  
genuss der moralischen Weltordnung sind, und ohne welche diese  
nie ihrer Vollendung nach außen enttrathet. (5.)

**Discretorium**, s. *Diaphragma*, auch *Mediasinum*.

**Discretrix facultas**, i. q. *Diacritica facultas*.

*Discrimen*, s. *Mediastinum*, ingl. *Diaphragma*. — *calvaria*

s. *Diploe*. — *capillorum*, i. q. *Aequamentum capillorum*

*Disertitudo*, s. Beredsamkeit.

*Displacentia*, s. Mißfallen.

*Dispositio*, (*Dispositio*<sup>1</sup>.) Anlage<sup>2</sup>, (*Diathesis*) die höhere Empfänglichkeit eines Körpers oder körperlichen Theils einzelne Eindrücke, so daß diese schon mit minderer Energie, als wöhnlich zu ihrer Wirkung erfordert wird, die Lebensthätigkeit festig anregen und in ihrer gewöhnlichen Stärke den Gesundheitszustand mehr oder minder gefährden. Vgl. *Constitution*, auch *Gesundheit*.

1) eigentlich das Zusammenstellen einzelner Theile unter sich. v. d. Linden med. ex. 10 §. 20. 2) 3) *Gaubii inst. pathol. und Uebersetzung* Bruner, §. 121.

*Dissecatio cadaveris*, s. Anatomische Technik.

*Dissecator*, s. Anatomiker.

*Dissectio cadaveris*, s. Anatomische Technik.

*Dissector*, s. Anatomiker.

*Dissepimentum narium*, s. Scheidewand der Nase.

*Dissepta ossea alveolorum*, s. Alveolenzwischenwände.

*Disseptum*, i. q. *Diaphragma*.

*Dissimuläre Theile*, (*Dissimulares partes*<sup>1</sup>, *Pan-anomoeomeres*<sup>2</sup>, s. *heterogenae*<sup>3</sup>.) nach Galenischer Lehre, so Theile des Körpers, welche selbst wieder aus verschiedenartigen Bestandtheilen bestehen, fälschlich auch organische benennt. Vgl. Galenisches System der Physiologie.

1) *Riverii inst. med. l. 1. c. 6. c. 3.* 2) nach dem Erleichterten *αναμεικτες*. (*Galen meth. med. l. 7. c. 6.* 3) *Gorraei de med. h. v.*

*Dissipium*, i. q. *Diaphragma*.

*Dissolutio*, s. *Solution*.

*Distanz*, (*Distantia*<sup>1</sup>.) Abstand, Entfernung zweier körperlichen Theile nach Längenbestimmung der ideellen geraden Linie zwischen sich nächsten Punkten des einen und des andern Theils. Raum.

1) *Plinii hist. mundi l. 2. c. 15.*

*Distantia conjugata*, s. unter *Diameter* des Beckens, den geraden Durchmesser.

*Distensio*, *Distentio*, i. q. *Extensio*. — *cordis et ariarum*, s. *Diastole*.

*Distortor oris*, s. unter *Zygomatische Muskeln*.

*Distractae costae*, i. q. *Costa septima et octava*, s. unter *Rippen*.

*Distributio*, wörtlich Vertheilung. Vgl. *Anadosis*.

*Distributoria lactea thoracica*, s. *Thoracischer Gang*.

*Distributrix facultas*<sup>1</sup>, eine Subtilität älterer Schulen, in man nach dem Galenischen System, in der von Galen aufgestellten anziehenden Facultät noch eine eigene, den Nahrungsstoff in Körper vertheilende, unterschied. Vgl. *Facultäten*.

1) nach *Costae* (*disquis. physiol. l. 6.* Vgl. *C. Hoffmanni apol. Galeno l. 2. s. 7. c. 345.*)



**Diuresis**, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wortes, f. Harnausleerung.

*διουρησις*. (Vgl. Foessii occ. Hipp. v. διουρησις.)

**Divergenz**, **Divergente Richtung**<sup>1</sup>, (*Divergentia*, *divergens directio*, *Devergentia*<sup>2</sup>), der Gegensatz von con-  
vergirender Richtung, oder Convergenz.

1) Elamm's mathem. Lehrb. 5. Aufl. 1. Th. S. 192. 2) eigentlich Abstre-  
ichung. (Gellii noct. Att. 1. 14. c. 1.)

**Divertallum**, ein Paracelsischer Ausdruck<sup>1</sup> zu Bezeichnung dessen,  
aus den Elementen erzeugt wird. S. unter Theosophisti-  
sche Systeme der Natur, Paracelsisches System.

philos. ad Athen. 1. 2. text. 5.

**Diverticula intestinorum**, f. Divertikel am Darmcanal. —

Meckelii, f. Meckel's Divertikel.

**Diverticulum**<sup>1</sup> *cochleae et vestibuli*, f. Meckel's Diverti-

— *Vateri*, f. Vater's Divertikel. — *ventriculi late-*

*ris cerebri*, f. unter Hörner der großen Hirnhöhlen, hinteres

an.

1) eigentlich ein Abweg oder Seitenweg. (Terent. Eun. act. 4. sc. 2. v. 7.)

**Divertikel am Darmcanal**<sup>1</sup>, (*Diverticula intestinorum*<sup>2</sup>),

anhangende<sup>3</sup>, Darmfortsätze<sup>4</sup>, (*Appendices intestino-*

*rum*<sup>5</sup>). So werden im allgemeinen alle die blind sich endigenden

Erhabenheiten benannt, die über den Umfang des Darmca-

nales hervorspringen, und deren Höhle mit den Darmcanal selbst zu-

sammenhängt. Es sind überhaupt Mißbildungen, und als solche ei-

gentlich nicht hierher gehörig. Jedoch denken diejenigen, welche sich

selten in Leichen, ohne daß der Gesundheitszustand im Leben

beeinträchtigt worden zu seyn scheint, am Ileum finden, von

drüsenförmiger oder kegelförmiger Form sind, etwa einen Zoll, zu-

weilen aber auch mehrere Zoll Länge haben, und in Hinsicht ihrer

Größe und ihrer Structur überhaupt mit dem Theil des Darmcanals,

an dem sie sich befinden, völlig übereinkommen, auf die wahrschein-

liche Entstehung des Darmcanals im Embryo hin, und haben daher

keine Seite der physiologischen Würdigung. Vgl. Embryo.

1) Meckel's u. Vater's Arch. für d. Physiol. 9. B. 3. H. S. 421.

2) Ludwig diss. de diverticulis intestinorum, Lips. 1779, 4.

3) 4) Meckel's und Vater's Arch. u. s. w. a. d. S. 423. 5)

Halleri elem. physiol. T. VII 1. 22. s. 2. §. 20.

**Divination**<sup>1</sup>, (*Divinatio*<sup>2</sup>), Wahrsagung, Weissag-

ung, Prophezeiung, (*Praedivination*<sup>3</sup>, *Mantice*<sup>4</sup>, *Prophe-*

*cia*<sup>5</sup>). „Es ist eine alte Meinung, deren erste Spur sich in den

ältesten Zeiten verliert, und die durch die allgemeine Zustimmung,

nicht nur des Römischen Volks, sondern aller Nationen, bestätigt

ist, daß den Menschen einige Divination, (*μαντιχη* der Grie-

chen) d. i. ein Vorgefühl oder eine Erkenntniß zukünftiger Ereignisse,

innewohnen sei. Kann irgend etwas als herrlich und ersprießlich ange-

sehen werden, so ist es diese Erhebung der sterblichen Natur zu der

überkräftigem Seyn, daher auch die ersten Bildner unserer Sprache,

in so manchen andern Fällen, angemessener als die Griechen, den

Menschen dieses trefflichen Vermögens von den Göttern, (*a divis.*)

1) Sprengel's Gesch. d. Arzneik. 1. Th. S. 284. 2) Ciceronis de divina-

zione 1. 11. 3) Plinii hist. mund. 1. 8. c. 23. 4) 5) Vgl. diese Worte.

nicht wie die Griechen, nach Plato's Erklärung, von Geistesrichtung, (a furore,) herleiteten."

Mit diesen Worten beginnt die bekannte Schrift des Cicero, unter seinen übrigen der Nachwelt erhaltenen Werken diesem Gegenstande insbesondere gewidmet ist <sup>6</sup>. Wenn wir von dem Gesichtspunkte ausgehen, daß das Argument von Uebereinstimmung der Ueberzeugungen aller Völker älterer und neuerer Zeit noch jetzt als keine der ringern Stützen wichtiger religiöser und moralischer Wahrheiten angesehen wird; so dürfte obiger Ausspruch, so wenig auch der Verfasser jenes Werks im Verfolg seines Gegenstandes auf die von ihm so bezeichneten Divinationen großen Werth legt, für die Realität des dem Menschen unter Umständen zu Theil gewordenen Vermögens, gewöhnlich dem menschlichen Blick verschleierte Zukunft zu erschauen, keine ungünstige Vormeinung erwecken.

Der Gegenstand selbst ist einer der wichtigsten der Psychologie. Die Frage ist die: ist es der geistigen Natur des Menschen verliehen in gewissen Fällen den geheimnißvollen Schleier zu lüften, hinter die Zukunft sich verbirgt, und das, was in späterer Zeit sich zugetragen wird, mit Bestimmtheit oder nur mit Wahrscheinlichkeit vorzuerspähnen, und also auch vorher zu verkündigen? Die Antwort darauf ist klar, und keinem Zweifel unterworfen, so lange nur von dem künftigen Ereignissen die Rede ist, die, auf erkannte, sich gleichbleibende Naturgesetze sich gründend, durch Anwendung des Verstandes und der Vernunft, von den Menschen ihrem Causalverhältniß erforscht worden sind, oder wo auch nur nach frühern sinnlichen Beobachtungen gewisse Ereignisse immer in einer gleichmäßigen Folge sich zutragen, und nun auch aus der Wahrnehmung der vergangenen und gegenwärtigen, auf das Eintreffen der noch nicht in die Erfahrung gelangten eine natürliche Folgerung gemacht werden kann. Wir wissen auch der roheste Mensch den Auf- und Untergang der Sonne, des Mondes, den Wechsel der Jahreszeiten, die gewöhnlichen Veränderungen des menschlichen Lebens, das Altern und den Ausbruch aus dem Leben durch den Tod von sich und andern mit Gewißheit in voraus. Ja selbst die Thiere haben, dem Gesetze der Affectionen der Vorstellungen folgend, Vorgefühle der Zukunft, und besonders durch dieß Vermögen der Herrschaft der Menschen unterworfen und hierdurch erst zum Theil bezähmbar.

Von dem Begriff der Divination aber wird die Kenntniß aller der künftigen Ereignisse ausgeschlossen, die durch eine bloße Veranschaulichung, oder auch nur einen analogen Vorgang im inneren Bewußtseyn erlangt wird; oder es wird höchstens und nur uneigentlich diejenige Erkenntniß des Künftigen noch darunter begriffen, die durch Steigerung der Intellectuellität, oder durch ein vorzüglich gebildetes Combinationsvermögen, mit Bestimmtheit, oder auch nach dem Gesetze der Probabilität in voraus eingesehen werden kann. So sieht der Kenner des Schachspiels aus dem Stand des Spiels schon lange vorher, und ohne der einzelnen folgenden Züge sich deutlich bewußt zu seyn, gleichsam divinatorisch, daß es nicht zu gewinnen oder zu verlieren sei, wenn dem gewöhnlichen Spieler es noch schwankend

6) Vgl. Note 2.



Zufälligkeiten abhängig erscheint; so ist der geniale Feldherr auf die Weise des Ausgangs einer Schlacht oder eines Feldzugs schon vorher versichert, während der große Haufe der Streitenden den Schicksal noch völlig unentwickelt erachtet.

Divination im eigentlichen und bestimmten Sinne ist aber Erkenntniß des Künftigen, ohne Vermittlung des Verstandes und der Vernunft, d. i. ohne Verbindung der aus dem Material der sinnlichen Beobachtung gebildeten Begriffe zu Schlüssen und Folgerungen. Die Frage: hat überhaupt Divination Realität, kann daher auch so gestellt werden: gibt es überhaupt in der geistigen Natur des Menschen außer dem Verstand noch ein Erkenntnißvermögen in Hinsicht zukünftiger Ereignisse, und zwar aus eigener Kraft, wobei zwar höhere Offenbarung nicht gerade zu ausgeschlossen bleibt, aber doch auch ohne ein eigenthümliches subjectives geistiges Vermögen diese als höhere Offenbarung zu erfassen voraussetzt.

Der allgemeine Glaube der alten Welt hat sich, wie schon vorläufig aus der angeführten Stelle erhellt, für ein solches Divinationsvermögen entschieden, und an ihn schließt sich auch der gleichmäßige Glaube der Mehrzahl der Nationen der spätern Zeit an, mit alleiniger Ausnahme derjenigen Völker, oder eigentlich doch nur derjenigen Völker der neuern Völker, die durch höhere Verstandescultur eine Superiorität über andere sich errangen, und dadurch auch sich allein im Recht erachten, über alles, was ist und nicht ist, im Himmel wie auf Erden, einen gültigen Ausspruch zu thun. Indem nun aber der Zustand der unter den cultivirten Nationen, besonders in der neuern Zeit, sich auszeichnenden Weisen den Ausspruch that: es gibt keine Divination, als in dem durch die Sinne Gegebenen und durch den Verstand Verbundenen, und alles dieser Grenze Entrückte ist Wahn, Täuschung, Gaukelspiel der Phantasie erzeugt, Selbsttäuschung oder fremder Täuschung, ist zuvörderst nicht zu übersehen, daß der Verstand hier in seiner eignen Sache Partei und zugleich Richter ist, und daß der Verstand in der geistigen Natur des Menschen, als eine bloße Function derselben, für bestimmte Kreise des geistigen Seyns, sein absolutes Gebiet hat in dem geistigen Leben auch außerhalb jenen Kreisen keineswegs nachzuweisen vermag.

Tragen wir nun zuerst die Geschichte, so stellt diese in den uns bekannten gewordenen Schicksalen älterer und neuerer Nationen, so wie einzelner ausgezeichneten Individuen, unzählige Fälle dar, wo Menschen äußere und innere Wahrnehmungen künftige Ereignisse, (eben so wie auch gleichzeitige, nur entfernte und durch Sinnesvermögen wahrnehmbare,) anzudeuten sich erkühnten, und wo diese Ausprüche verbreiteten Glauben fanden, den sie schwerlich erlangen konnten, wenn die Erfahrung mit jenen Aussprüchen durchaus in offenem Widerspruch gewesen wäre. Alle Nationen hatten oder haben noch jetzt Orakel, ihre Propheten, ihre Wahrsager und Zeichendeuter, und man findet noch jetzt, aller Abmahnung der Verständigen zum Trotz, Gehör und Glauben.

In den Schriften des alten Testaments werden nicht weniger als neun verschiedener Arten von Divination gedacht, in de-

ren Wirklichkeit die Verfasser jener Schriften nicht den geringsten Zweifel setzten?

Die Juden waren überhaupt mit dem größten Theil dieser Gegenstände in Aegypten bekannt geworden, von wo aus der Glaube daran sich auch nach Griechenland und von hier aus unter Römern verbreitet hatte.

Nach den Unterscheidungen von Aristoteles und Cicero fällt zuvörderst die Divination in zwei Arten: in die künstliche und die natürliche, (*Divinatio artificiosa et naturalis*.) Er besteht nach deren Erklärungen in Vorhersagungen, welche sich auf äußere Zeichen gründen, die, (wirklich oder vermeintlich,) mit den eintretenden Begebenheiten in einer nothwendigen Verbindung stehen. Letztere beruht einzig auf einem innern Erschauungsvermögen, einem Geistesimpuls, der von allen äußern Zeichen unabhängig ist.

Die natürliche Divination wurde wieder in zwei Unterarten unterschieden: in die angeborene und in die verliehene, (*Divinatio innata et infusa*.) Jene gründete sich auf die Voraussetzung, daß die Seele der Menschen, als für sich bestehendes Wesen, über die verschiedenen Organe des Körpers eine Oberherrschaft ausübe, ohne durch Ausdehnung in ihnen selbst räumlich gegenwärtig seyn, von der Zukunft dunkle Vorstellungen habe, wie man die Träumen, in Erstasen und in den Vorgefühlen und Andeutungen vieler Kranken kurz vor Eintritt des Todes, so wie von Personen sehe, welche von einer großen Gefahr bedroht werden. — Es stützte sich auf die Annahme, daß die Seele, gleich einem Spiegel, durch ein von der Gottheit, oder ein höheres geistiges Wesen reflectirtes Licht erleuchtet, und über die Begebenheiten, welche sie betreffen, aufgeklärt werde.

Die künstliche Divination zerfiel auf gleiche Weise in zwei Unterarten: die erfahrungsmäßige und die vermeintliche, (*Divinatio experimentalis et chimerica*.) Jene war

- 7) Die erste beruhte auf Beobachtung der Gestirne, der Planeten und der Sterne. Dies ist die Sterndeuterel, welche Moses (*menon ne nt*). Die zweite wird im Hebräischen (*menachesch*) genannt, und gewöhnlich als Zeitdeuterel, (*auguratio*), übersetzt. Die dritte führt den Namen *mecasech*, welches die gewöhnlichen Bibelübersetzungen als bössliche, geheime und verbliche Künste andeuten. Die vierte ist die der Hohen, oder der Hohen. Die fünfte bestand darin, böse Geister zu befragen. Die sechste, welche Moses *judeoni* nennt, war das eigentliche Wahrsagen. Die siebente wurde durch Hervorrufen und Befragen von Toten gelebt, und war also Necromantie. Die achte war die Rhomantie, oder das Wahrsagen durch Stäbe, dessen Heseas (4. Cap. 1) gedenkt, wohn auch die Velomantie, welche Ezechiel (21. Cap. 21) kannte, zu zählen ist. Die neunte und letzte war die Hepatoscopie, die Vorhersagung aus der Untersuchung der Leber geschlachteter Opfertiere. Häufigen in den Schriften des alten Testaments sich findenden gale, entlichen Vorhersagungen von Traumdeutungen, Vorherverkündigungen aus Wasser, aus Feuer, der Luft, aus dem Vögelzug, aus dem Gesang der Vögel, aus Donner, Blitz und andern meteorologischen Vorgängen, aus der Erde, aus Puncten, Platen, aus Schlägen u. s. w. nicht zu gedenken. 8) Hiernit in Uebereinstimmung ist auch Plato's Unterscheidung (im Phaedro,) von *μαντι*, (er das Wort *μαντιχη* ableitet.) Wahrsagung aus dämonischem Antriebe, äußerer Andeutung von Wahnsinn, und *διωριστική*, Wahrsagung mit ruhigen Geist, aus äußern Zeichen, wie besonders aus Beobachtungen von Vögeln.



annten natürlichen Ursachen abgeleitet, wie die astronomischen Vorhersagungen von Eclipsen, oder die semiotischen Urtheile der Aerzte über den Ausgang einer Krankheit, oder auch die Conjecturen der Politiker über Staatsveränderungen. Diese aber beruhte auf willkürlichen Annahmen, und hatte daher auch einen so weiten Spielraum, wie Phantasie selbst, die als ihre einzige Quelle anzusehen war. Folgendes ist ein immer noch nicht völlig erschöpfendes alphabetisches Verzeichniß einiger, von den Römern und Griechen unterschiedener, hierher gehöriger Divinationen:

1) Aeromantie, (Aeromantia,) Andeutungen aus dem Luft-;

2) Alectryomantie, (Alectryomantia<sup>9</sup>.) Andeutungen durch Stäben, die, in den Staub gezeichnet, jeder mit einem Gersten- oder Weizenkorn belegt wurden, und die man dann in der Ordnung zusammensetzte, als ein Hahn jene Körner nach einander zu seinem Futter nahm;

3) Aleuromantie oder Alphetomantie, (Aleuromantia<sup>10</sup>, Alphetomantia<sup>11</sup>.) Andeutungen aus Weizen- oder Gerstenmehl;

4) Anthropomantie, (Anthropomantia,) Andeutungen aus Eingeweiden von Menschen;

5) Arithmantie, (Arithmantia,) Vergleichen aus Zahlen;

6) Austromantie, (Austromantia,) Vorbedeutungen aus heftig wehenden Winden;

7) Axinomantie, (Axinomantia<sup>12</sup>.) zur Entdeckung von Verborgenen, mittelst einer Art, die man in einen Pfahl leicht einhieb, deren Senkung beim Nennen des Verdächtigen, oder bei Berührung von demselben dann das geheime Verbrechen enthüllen sollte;

8) Belomantie, (Belomantia<sup>13</sup>.) Andeutungen durch Pfeile, in der Gegenstand des Zweifels auf zwei gleiche Pfeile geschrie- wurde, und dann derjenige Pfeil, der, abgeschossen, am weitesten den Ausschlag gab;

9) Botanomantie, (Botanomantia<sup>14</sup>.) Anzeigen, die man an Blättern, besonders Salbeiblättern, hernahm, die, bezeichnet, an freien Orte dem Wind zum Verwehen überlassen wurden, theils davon abblieben, theils zurückblieben;

10) Capnomantie, (Capnomantia<sup>15</sup>.) Anzeigen aus dem Aufsteigen, sein wirbelndes oder gerades Aufsteigen, seine Richtung u. s. w.;

11) Catoptromantie, (Catoptromantia,) Darstellung des Zukünftigen in Spiegeln;

12) Cephalaeonomantie, (Cephalaeonomantia.) eine nicht bekannte Art der Erforschung des Unbekannten, mittelst eines gebratenen Eselskopfs;

13) Ceromantie, (Ceromantia<sup>16</sup>.) Erforschung der Zukunft aus den Figuren, welche geschmolzenes und in Wasser geträufeltes Wachs auf dessen Oberfläche bildet;

9) von αλεκτωρ, ein Hahn.

10) von αλευρον, Weizenmehl.

11) von

αλφειον, Gerstenmehl.

12) von αζηνη, Art.

13) von βελος, Pfeil.

14) von βοτανη, Pflanzen.

15) von καπνος, Rauch.

16) von κη-

ρος, Wachs.

- 14) Chiromantie, (Chiromantia,) Erforschung des Schicksals eines Menschen aus seinen Handliniamenten;
- 15) Cleidomantie, (Cleidomantia <sup>17</sup>), Erforschung der Kunst durch Schlüssel;
- 16) Cleromantie, (Cleromantia <sup>18</sup>), die Erforschung des sprießlichen in der Zukunft durch das Loos;
- 17) Coscinomantie, (Coscinomantia <sup>19</sup>), Ausmittelung eines Schuldigen mittelst eines auf einer Zange leicht horizontal gehaltenen Siebes, durch Zuwendung desselben zu dem Verdächtigen;
- 18) Crithomantie, (Crithomantia <sup>20</sup>), Andeutungen dem aus Gerste bereiteten Opfermehl, womit die Schlachtopfer streut wurden, (auch als Alphitomantie bezeichnet);
- 19) Crystallomantie, (Crystallomantia,) Andeutungen künstlich polirten Crystallen und darauf sich bildenden Figuren;
- 20) Dactyliomantie, (Dactyliomantia <sup>21</sup>), Vorhersagung mittelst zauberischer Dinge;
- 21) Dämonomantie, (Daemonomantia <sup>22</sup>), Wahrsagung möge eines inwohnenden Geistes;
- 22) Gastromantie, (Gastromantia <sup>23</sup>), Andeutungen der Kunst in Wilbern, die sich auf dem Boden eines gläsernen, mit nem Wasser angefüllten Gefäßes zeigen sollten;
- 23) Geomantie, (Geomantia,) Deutungen von auf die Erde oder sonst zufällig gemachten Puncten oder Strichen;
- 24) Hydromantie, (Hydromantia,) Vorhersagung aus Wasser auf mehrfache Art;
- 25) Ichthyomantie, (Ichthyomantia <sup>24</sup>), Wahrsagung den Eingeweiden von Fischen;
- 26) Lampadomantie, (Lampadomantia <sup>25</sup>), welche mit Necromantie wesentlich übereinkommt;
- 27) Lecanomantie, (Lecanomantia <sup>26</sup>), das Wahrsagen einer Schlüssel;
- 28) Libanomantie, (Libanomantia <sup>27</sup>), Andeutungen dem Rauch von auf Kohlen geworfenem Weihrauch und dessen Rauch;
- 29) Lithomantie, (Lithomantia,) Vorhersagungen, wozu sich allerhand Steine bediente;
- 30) Logarithmantie, (Logarithmantia,) eine neuere Art der Arithmantie durch Nebeneinanderstellung der triangulären Zeichen und Bezeichnungen derselben durch die Buchstaben des Alphabets;
- 31) Lychnomantie, (Lychnomantia <sup>28</sup>), die Vorhersagung mittelst Lampen;
- 32) Necromantie, Necromantie, (Necromantia, Necromantia,) Erforschung der Zukunft durch Hervorrufen der Belebten aus dem Drcuß;

17) von κλεις, ein Schlüssel.

18) von κληρος, das Loos.

19

κοσκινον, ein Sieb. 20) von κριθη, Gerste.

21) von δακτυλιον.

22) Vgl. den Artikel Dämonen.

23) von γαστρα,

eines Gefäßes.

24) von ιχθυς, ein Fisch.

25) von λαμπα

Lampe.

26) von λεκανη, eine Schüssel.

27) von λιβανος, Weih

28) von λυχνος, eine Lampe.



- 33) Oenomanantie, (Oinomantia <sup>29</sup>.) Andeutungen von dem Libationen bei Opfern gebrauchten Weine hergenommen;
- 34) Oionomanantie, (Oionomantia <sup>30</sup>.) in Uebereinstimmung mit Ornithomanantie;
- 35) Oneiromantie, (Oneiromantia <sup>31</sup>.) Deutung von Träumen;
- 36) Onomantie, (Onomantia <sup>32</sup>.) eine Anwendung der Arithmantie auf Namen, indem die Buchstaben eines Namens mit gewissen Zahlen in Verbindung gebracht, und durch Berechnungen die Antwortung einer Frage versucht wurde;
- 37) Onychomanantie, (Onychomantia <sup>33</sup>.) Andeutungen, die von den Gestalten hernahm, die sich auf dem Nagel eines noch gemißbrauchten Knaben bildeten, den man mit Oehl und Aufhängen und der Sonne ausgesetzt hatte;
- 38) Ornithomanantie, (Ornithomantia <sup>34</sup>.) Vorherverkündigungen aus dem Flug und Gesang der Vögel;
- 39) Palomanantie, (Palomantia <sup>35</sup>.) mit Cleromanantie übereinstimmend;
- 40) Pegomanantie, (Pegomantia <sup>36</sup>.) Andeutungen, die man auf unterschiedliche Weise an Wasserquellen erhielt;
- 41) Pyromantie, (Pyromantia <sup>37</sup>.) Andeutungen, die man auf mancherlei Art sich durch Beobachtungen von Flammen und vom Brennen der Körper zu verschaffen suchte;
- 42) Rhabdomantie, (Rhabdomantia,) Vorhersagungen und Deutungen durch Stäbe;
- 43) Stichomanantie, (Stichomantia <sup>38</sup>.) Andeutungen, welche durch zufälliges Aneinanderreihen von einzelnen Zeilen oder Versen bekannter Werke, vorzüglich von Dichtern erhält;
- 44) Sycomantie, (Sycomantia <sup>39</sup>.) eine Art der Botanomanantie, wobei Feigenblätter angewendet wurden;
- 45) Tephramantie, (Tephramantia <sup>40</sup>.) die Erforschung des Unheilhaften durch Buchstaben, die, an einem freien Ort mit einem Stabe oder dem Finger auf den mit Asche bestreuten Boden geschrieben, vom Wind unverlöschet bleiben;
- 46) Theomanantie, (Theomantia,) Wahrsagung aus höherer göttlicher Eingebung und Begeisterung <sup>41</sup>.

Vorzüglich sind aber die mannigfaltigen Augurien hierher zu zählen, die Wahrnehmungen das besondere Geschäft einer eignen Priesterschaft der Römer waren, und welche besonders in Beobachtung des Fluges, wie auch des Fressens der Vögel, desgleichen in Untersuchung der Eingeweide der Opfethiere bestanden, und die bekanntlich für die

1) von οἶνος, Wein. 30) von οἰωνός, ein Raubvogel. 31) von οὐναι-  
 2) von οἶνος, Wein. 32) von ονομα, Name. 33) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 34) von ορνις, ein Vogel. 35) von παλός, das Loos. 36) von  
 37) von ορνις, ein Vogel. 38) von πυρ, Feuer. 39) von στίχος, eine Zeile in  
 40) von ορνις, ein Vogel. 41) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 42) von οἶνος, Wein. 43) von οἰωνός, ein Raubvogel. 44) von οὐναι-  
 45) von οἶνος, Wein. 46) von ονομα, Name. 47) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 48) von ορνις, ein Vogel. 49) von παλός, das Loos. 50) von  
 51) von ορνις, ein Vogel. 52) von πυρ, Feuer. 53) von στίχος, eine Zeile in  
 54) von ορνις, ein Vogel. 55) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 56) von  
 57) von οἶνος, Wein. 58) von οἰωνός, ein Raubvogel. 59) von οὐναι-  
 60) von οἶνος, Wein. 61) von ονομα, Name. 62) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 63) von ορνις, ein Vogel. 64) von παλός, das Loos. 65) von  
 66) von ορνις, ein Vogel. 67) von πυρ, Feuer. 68) von στίχος, eine Zeile in  
 69) von ορνις, ein Vogel. 70) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 71) von οὐναι-  
 72) von οἶνος, Wein. 73) von οἰωνός, ein Raubvogel. 74) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 75) von ορνις, ein Vogel. 76) von παλός, das Loos. 77) von  
 78) von ορνις, ein Vogel. 79) von πυρ, Feuer. 80) von στίχος, eine Zeile in  
 81) von ορνις, ein Vogel. 82) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 83) von οὐναι-  
 84) von οἶνος, Wein. 85) von οἰωνός, ein Raubvogel. 86) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 87) von ορνις, ein Vogel. 88) von παλός, das Loos. 89) von  
 90) von ορνις, ein Vogel. 91) von πυρ, Feuer. 92) von στίχος, eine Zeile in  
 93) von ορνις, ein Vogel. 94) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 95) von οὐναι-  
 96) von οἶνος, Wein. 97) von οἰωνός, ein Raubvogel. 98) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 99) von ορνις, ein Vogel. 100) von παλός, das Loos. 101) von  
 102) von ορνις, ein Vogel. 103) von πυρ, Feuer. 104) von στίχος, eine Zeile in  
 105) von ορνις, ein Vogel. 106) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 107) von οὐναι-  
 108) von οἶνος, Wein. 109) von οἰωνός, ein Raubvogel. 110) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 111) von ορνις, ein Vogel. 112) von παλός, das Loos. 113) von  
 114) von ορνις, ein Vogel. 115) von πυρ, Feuer. 116) von στίχος, eine Zeile in  
 117) von ορνις, ein Vogel. 118) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 119) von οὐναι-  
 120) von οἶνος, Wein. 121) von οἰωνός, ein Raubvogel. 122) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 123) von ορνις, ein Vogel. 124) von παλός, das Loos. 125) von  
 126) von ορνις, ein Vogel. 127) von πυρ, Feuer. 128) von στίχος, eine Zeile in  
 129) von ορνις, ein Vogel. 130) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 131) von οὐναι-  
 132) von οἶνος, Wein. 133) von οἰωνός, ein Raubvogel. 134) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 135) von ορνις, ein Vogel. 136) von παλός, das Loos. 137) von  
 138) von ορνις, ein Vogel. 139) von πυρ, Feuer. 140) von στίχος, eine Zeile in  
 141) von ορνις, ein Vogel. 142) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 143) von οὐναι-  
 144) von οἶνος, Wein. 145) von οἰωνός, ein Raubvogel. 146) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 147) von ορνις, ein Vogel. 148) von παλός, das Loos. 149) von  
 150) von ορνις, ein Vogel. 151) von πυρ, Feuer. 152) von στίχος, eine Zeile in  
 153) von ορνις, ein Vogel. 154) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 155) von οὐναι-  
 156) von οἶνος, Wein. 157) von οἰωνός, ein Raubvogel. 158) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 159) von ορνις, ein Vogel. 160) von παλός, das Loos. 161) von  
 162) von ορνις, ein Vogel. 163) von πυρ, Feuer. 164) von στίχος, eine Zeile in  
 165) von ορνις, ein Vogel. 166) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 167) von οὐναι-  
 168) von οἶνος, Wein. 169) von οἰωνός, ein Raubvogel. 170) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 171) von ορνις, ein Vogel. 172) von παλός, das Loos. 173) von  
 174) von ορνις, ein Vogel. 175) von πυρ, Feuer. 176) von στίχος, eine Zeile in  
 177) von ορνις, ein Vogel. 178) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 179) von οὐναι-  
 180) von οἶνος, Wein. 181) von οἰωνός, ein Raubvogel. 182) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 183) von ορνις, ein Vogel. 184) von παλός, das Loos. 185) von  
 186) von ορνις, ein Vogel. 187) von πυρ, Feuer. 188) von στίχος, eine Zeile in  
 189) von ορνις, ein Vogel. 190) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 191) von οὐναι-  
 192) von οἶνος, Wein. 193) von οἰωνός, ein Raubvogel. 194) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 195) von ορνις, ein Vogel. 196) von παλός, das Loos. 197) von  
 198) von ορνις, ein Vogel. 199) von πυρ, Feuer. 200) von στίχος, eine Zeile in  
 201) von ορνις, ein Vogel. 202) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 203) von οὐναι-  
 204) von οἶνος, Wein. 205) von οἰωνός, ein Raubvogel. 206) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 207) von ορνις, ein Vogel. 208) von παλός, das Loos. 209) von  
 210) von ορνις, ein Vogel. 211) von πυρ, Feuer. 212) von στίχος, eine Zeile in  
 213) von ορνις, ein Vogel. 214) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 215) von οὐναι-  
 216) von οἶνος, Wein. 217) von οἰωνός, ein Raubvogel. 218) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 219) von ορνις, ein Vogel. 220) von παλός, das Loos. 221) von  
 222) von ορνις, ein Vogel. 223) von πυρ, Feuer. 224) von στίχος, eine Zeile in  
 225) von ορνις, ein Vogel. 226) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 227) von οὐναι-  
 228) von οἶνος, Wein. 229) von οἰωνός, ein Raubvogel. 230) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 231) von ορνις, ein Vogel. 232) von παλός, das Loos. 233) von  
 234) von ορνις, ein Vogel. 235) von πυρ, Feuer. 236) von στίχος, eine Zeile in  
 237) von ορνις, ein Vogel. 238) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 239) von οὐναι-  
 240) von οἶνος, Wein. 241) von οἰωνός, ein Raubvogel. 242) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 243) von ορνις, ein Vogel. 244) von παλός, das Loos. 245) von  
 246) von ορνις, ein Vogel. 247) von πυρ, Feuer. 248) von στίχος, eine Zeile in  
 249) von ορνις, ein Vogel. 250) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 251) von οὐναι-  
 252) von οἶνος, Wein. 253) von οἰωνός, ein Raubvogel. 254) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 255) von ορνις, ein Vogel. 256) von παλός, das Loos. 257) von  
 258) von ορνις, ein Vogel. 259) von πυρ, Feuer. 260) von στίχος, eine Zeile in  
 261) von ορνις, ein Vogel. 262) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 263) von οὐναι-  
 264) von οἶνος, Wein. 265) von οἰωνός, ein Raubvogel. 266) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 267) von ορνις, ein Vogel. 268) von παλός, das Loos. 269) von  
 270) von ορνις, ein Vogel. 271) von πυρ, Feuer. 272) von στίχος, eine Zeile in  
 273) von ορνις, ein Vogel. 274) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 275) von οὐναι-  
 276) von οἶνος, Wein. 277) von οἰωνός, ein Raubvogel. 278) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 279) von ορνις, ein Vogel. 280) von παλός, das Loos. 281) von  
 282) von ορνις, ein Vogel. 283) von πυρ, Feuer. 284) von στίχος, eine Zeile in  
 285) von ορνις, ein Vogel. 286) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 287) von οὐναι-  
 288) von οἶνος, Wein. 289) von οἰωνός, ein Raubvogel. 290) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 291) von ορνις, ein Vogel. 292) von παλός, das Loos. 293) von  
 294) von ορνις, ein Vogel. 295) von πυρ, Feuer. 296) von στίχος, eine Zeile in  
 297) von ορνις, ein Vogel. 298) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 299) von οὐναι-  
 300) von οἶνος, Wein. 301) von οἰωνός, ein Raubvogel. 302) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 303) von ορνις, ein Vogel. 304) von παλός, das Loos. 305) von  
 306) von ορνις, ein Vogel. 307) von πυρ, Feuer. 308) von στίχος, eine Zeile in  
 309) von ορνις, ein Vogel. 310) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 311) von οὐναι-  
 312) von οἶνος, Wein. 313) von οἰωνός, ein Raubvogel. 314) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 315) von ορνις, ein Vogel. 316) von παλός, das Loos. 317) von  
 318) von ορνις, ein Vogel. 319) von πυρ, Feuer. 320) von στίχος, eine Zeile in  
 321) von ορνις, ein Vogel. 322) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 323) von οὐναι-  
 324) von οἶνος, Wein. 325) von οἰωνός, ein Raubvogel. 326) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 327) von ορνις, ein Vogel. 328) von παλός, das Loos. 329) von  
 330) von ορνις, ein Vogel. 331) von πυρ, Feuer. 332) von στίχος, eine Zeile in  
 333) von ορνις, ein Vogel. 334) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 335) von οὐναι-  
 336) von οἶνος, Wein. 337) von οἰωνός, ein Raubvogel. 338) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 339) von ορνις, ein Vogel. 340) von παλός, das Loos. 341) von  
 342) von ορνις, ein Vogel. 343) von πυρ, Feuer. 344) von στίχος, eine Zeile in  
 345) von ορνις, ein Vogel. 346) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 347) von οὐναι-  
 348) von οἶνος, Wein. 349) von οἰωνός, ein Raubvogel. 350) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 351) von ορνις, ein Vogel. 352) von παλός, das Loos. 353) von  
 354) von ορνις, ein Vogel. 355) von πυρ, Feuer. 356) von στίχος, eine Zeile in  
 357) von ορνις, ein Vogel. 358) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 359) von οὐναι-  
 360) von οἶνος, Wein. 361) von οἰωνός, ein Raubvogel. 362) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 363) von ορνις, ein Vogel. 364) von παλός, das Loos. 365) von  
 366) von ορνις, ein Vogel. 367) von πυρ, Feuer. 368) von στίχος, eine Zeile in  
 369) von ορνις, ein Vogel. 370) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 371) von οὐναι-  
 372) von οἶνος, Wein. 373) von οἰωνός, ein Raubvogel. 374) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 375) von ορνις, ein Vogel. 376) von παλός, das Loos. 377) von  
 378) von ορνις, ein Vogel. 379) von πυρ, Feuer. 380) von στίχος, eine Zeile in  
 381) von ορνις, ein Vogel. 382) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 383) von οὐναι-  
 384) von οἶνος, Wein. 385) von οἰωνός, ein Raubvogel. 386) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 387) von ορνις, ein Vogel. 388) von παλός, das Loos. 389) von  
 390) von ορνις, ein Vogel. 391) von πυρ, Feuer. 392) von στίχος, eine Zeile in  
 393) von ορνις, ein Vogel. 394) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 395) von οὐναι-  
 396) von οἶνος, Wein. 397) von οἰωνός, ein Raubvogel. 398) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 399) von ορνις, ein Vogel. 400) von παλός, das Loos. 401) von  
 402) von ορνις, ein Vogel. 403) von πυρ, Feuer. 404) von στίχος, eine Zeile in  
 405) von ορνις, ein Vogel. 406) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 407) von οὐναι-  
 408) von οἶνος, Wein. 409) von οἰωνός, ein Raubvogel. 410) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 411) von ορνις, ein Vogel. 412) von παλός, das Loos. 413) von  
 414) von ορνις, ein Vogel. 415) von πυρ, Feuer. 416) von στίχος, eine Zeile in  
 417) von ορνις, ein Vogel. 418) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 419) von οὐναι-  
 420) von οἶνος, Wein. 421) von οἰωνός, ein Raubvogel. 422) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 423) von ορνις, ein Vogel. 424) von παλός, das Loos. 425) von  
 426) von ορνις, ein Vogel. 427) von πυρ, Feuer. 428) von στίχος, eine Zeile in  
 429) von ορνις, ein Vogel. 430) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 431) von οὐναι-  
 432) von οἶνος, Wein. 433) von οἰωνός, ein Raubvogel. 434) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 435) von ορνις, ein Vogel. 436) von παλός, das Loos. 437) von  
 438) von ορνις, ein Vogel. 439) von πυρ, Feuer. 440) von στίχος, eine Zeile in  
 441) von ορνις, ein Vogel. 442) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 443) von οὐναι-  
 444) von οἶνος, Wein. 445) von οἰωνός, ein Raubvogel. 446) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 447) von ορνις, ein Vogel. 448) von παλός, das Loos. 449) von  
 450) von ορνις, ein Vogel. 451) von πυρ, Feuer. 452) von στίχος, eine Zeile in  
 453) von ορνις, ein Vogel. 454) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 455) von οὐναι-  
 456) von οἶνος, Wein. 457) von οἰωνός, ein Raubvogel. 458) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 459) von ορνις, ein Vogel. 460) von παλός, das Loos. 461) von  
 462) von ορνις, ein Vogel. 463) von πυρ, Feuer. 464) von στίχος, eine Zeile in  
 465) von ορνις, ein Vogel. 466) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 467) von οὐναι-  
 468) von οἶνος, Wein. 469) von οἰωνός, ein Raubvogel. 470) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 471) von ορνις, ein Vogel. 472) von παλός, das Loos. 473) von  
 474) von ορνις, ein Vogel. 475) von πυρ, Feuer. 476) von στίχος, eine Zeile in  
 477) von ορνις, ein Vogel. 478) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 479) von οὐναι-  
 480) von οἶνος, Wein. 481) von οἰωνός, ein Raubvogel. 482) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 483) von ορνις, ein Vogel. 484) von παλός, das Loos. 485) von  
 486) von ορνις, ein Vogel. 487) von πυρ, Feuer. 488) von στίχος, eine Zeile in  
 489) von ορνις, ein Vogel. 490) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 491) von οὐναι-  
 492) von οἶνος, Wein. 493) von οἰωνός, ein Raubvogel. 494) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 495) von ορνις, ein Vogel. 496) von παλός, das Loos. 497) von  
 498) von ορνις, ein Vogel. 499) von πυρ, Feuer. 500) von στίχος, eine Zeile in  
 501) von ορνις, ein Vogel. 502) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 503) von οὐναι-  
 504) von οἶνος, Wein. 505) von οἰωνός, ein Raubvogel. 506) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 507) von ορνις, ein Vogel. 508) von παλός, das Loos. 509) von  
 510) von ορνις, ein Vogel. 511) von πυρ, Feuer. 512) von στίχος, eine Zeile in  
 513) von ορνις, ein Vogel. 514) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 515) von οὐναι-  
 516) von οἶνος, Wein. 517) von οἰωνός, ein Raubvogel. 518) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 519) von ορνις, ein Vogel. 520) von παλός, das Loos. 521) von  
 522) von ορνις, ein Vogel. 523) von πυρ, Feuer. 524) von στίχος, eine Zeile in  
 525) von ορνις, ein Vogel. 526) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 527) von οὐναι-  
 528) von οἶνος, Wein. 529) von οἰωνός, ein Raubvogel. 530) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 531) von ορνις, ein Vogel. 532) von παλός, das Loos. 533) von  
 534) von ορνις, ein Vogel. 535) von πυρ, Feuer. 536) von στίχος, eine Zeile in  
 537) von ορνις, ein Vogel. 538) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 539) von οὐναι-  
 540) von οἶνος, Wein. 541) von οἰωνός, ein Raubvogel. 542) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 543) von ορνις, ein Vogel. 544) von παλός, das Loos. 545) von  
 546) von ορνις, ein Vogel. 547) von πυρ, Feuer. 548) von στίχος, eine Zeile in  
 549) von ορνις, ein Vogel. 550) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 551) von οὐναι-  
 552) von οἶνος, Wein. 553) von οἰωνός, ein Raubvogel. 554) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 555) von ορνις, ein Vogel. 556) von παλός, das Loos. 557) von  
 558) von ορνις, ein Vogel. 559) von πυρ, Feuer. 560) von στίχος, eine Zeile in  
 561) von ορνις, ein Vogel. 562) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 563) von οὐναι-  
 564) von οἶνος, Wein. 565) von οἰωνός, ein Raubvogel. 566) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 567) von ορνις, ein Vogel. 568) von παλός, das Loos. 569) von  
 570) von ορνις, ein Vogel. 571) von πυρ, Feuer. 572) von στίχος, eine Zeile in  
 573) von ορνις, ein Vogel. 574) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 575) von οὐναι-  
 576) von οἶνος, Wein. 577) von οἰωνός, ein Raubvogel. 578) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 579) von ορνις, ein Vogel. 580) von παλός, das Loos. 581) von  
 582) von ορνις, ein Vogel. 583) von πυρ, Feuer. 584) von στίχος, eine Zeile in  
 585) von ορνις, ein Vogel. 586) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 587) von οὐναι-  
 588) von οἶνος, Wein. 589) von οἰωνός, ein Raubvogel. 590) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 591) von ορνις, ein Vogel. 592) von παλός, das Loos. 593) von  
 594) von ορνις, ein Vogel. 595) von πυρ, Feuer. 596) von στίχος, eine Zeile in  
 597) von ορνις, ein Vogel. 598) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 599) von οὐναι-  
 600) von οἶνος, Wein. 601) von οἰωνός, ein Raubvogel. 602) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 603) von ορνις, ein Vogel. 604) von παλός, das Loos. 605) von  
 606) von ορνις, ein Vogel. 607) von πυρ, Feuer. 608) von στίχος, eine Zeile in  
 609) von ορνις, ein Vogel. 610) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 611) von οὐναι-  
 612) von οἶνος, Wein. 613) von οἰωνός, ein Raubvogel. 614) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 615) von ορνις, ein Vogel. 616) von παλός, das Loos. 617) von  
 618) von ορνις, ein Vogel. 619) von πυρ, Feuer. 620) von στίχος, eine Zeile in  
 621) von ορνις, ein Vogel. 622) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 623) von οὐναι-  
 624) von οἶνος, Wein. 625) von οἰωνός, ein Raubvogel. 626) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 627) von ορνις, ein Vogel. 628) von παλός, das Loos. 629) von  
 630) von ορνις, ein Vogel. 631) von πυρ, Feuer. 632) von στίχος, eine Zeile in  
 633) von ορνις, ein Vogel. 634) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 635) von οὐναι-  
 636) von οἶνος, Wein. 637) von οἰωνός, ein Raubvogel. 638) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 639) von ορνις, ein Vogel. 640) von παλός, das Loos. 641) von  
 642) von ορνις, ein Vogel. 643) von πυρ, Feuer. 644) von στίχος, eine Zeile in  
 645) von ορνις, ein Vogel. 646) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 647) von οὐναι-  
 648) von οἶνος, Wein. 649) von οἰωνός, ein Raubvogel. 650) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 651) von ορνις, ein Vogel. 652) von παλός, das Loos. 653) von  
 654) von ορνις, ein Vogel. 655) von πυρ, Feuer. 656) von στίχος, eine Zeile in  
 657) von ορνις, ein Vogel. 658) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 659) von οὐναι-  
 660) von οἶνος, Wein. 661) von οἰωνός, ein Raubvogel. 662) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 663) von ορνις, ein Vogel. 664) von παλός, das Loos. 665) von  
 666) von ορνις, ein Vogel. 667) von πυρ, Feuer. 668) von στίχος, eine Zeile in  
 669) von ορνις, ein Vogel. 670) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 671) von οὐναι-  
 672) von οἶνος, Wein. 673) von οἰωνός, ein Raubvogel. 674) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 675) von ορνις, ein Vogel. 676) von παλός, das Loos. 677) von  
 678) von ορνις, ein Vogel. 679) von πυρ, Feuer. 680) von στίχος, eine Zeile in  
 681) von ορνις, ein Vogel. 682) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 683) von οὐναι-  
 684) von οἶνος, Wein. 685) von οἰωνός, ein Raubvogel. 686) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 687) von ορνις, ein Vogel. 688) von παλός, das Loos. 689) von  
 690) von ορνις, ein Vogel. 691) von πυρ, Feuer. 692) von στίχος, eine Zeile in  
 693) von ορνις, ein Vogel. 694) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 695) von οὐναι-  
 696) von οἶνος, Wein. 697) von οἰωνός, ein Raubvogel. 698) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 699) von ορνις, ein Vogel. 700) von παλός, das Loos. 701) von  
 702) von ορνις, ein Vogel. 703) von πυρ, Feuer. 704) von στίχος, eine Zeile in  
 705) von ορνις, ein Vogel. 706) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 707) von οὐναι-  
 708) von οἶνος, Wein. 709) von οἰωνός, ein Raubvogel. 710) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 711) von ορνις, ein Vogel. 712) von παλός, das Loos. 713) von  
 714) von ορνις, ein Vogel. 715) von πυρ, Feuer. 716) von στίχος, eine Zeile in  
 717) von ορνις, ein Vogel. 718) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 719) von οὐναι-  
 720) von οἶνος, Wein. 721) von οἰωνός, ein Raubvogel. 722) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 723) von ορνις, ein Vogel. 724) von παλός, das Loos. 725) von  
 726) von ορνις, ein Vogel. 727) von πυρ, Feuer. 728) von στίχος, eine Zeile in  
 729) von ορνις, ein Vogel. 730) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 731) von οὐναι-  
 732) von οἶνος, Wein. 733) von οἰωνός, ein Raubvogel. 734) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 735) von ορνις, ein Vogel. 736) von παλός, das Loos. 737) von  
 738) von ορνις, ein Vogel. 739) von πυρ, Feuer. 740) von στίχος, eine Zeile in  
 741) von ορνις, ein Vogel. 742) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 743) von οὐναι-  
 744) von οἶνος, Wein. 745) von οἰωνός, ein Raubvogel. 746) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 747) von ορνις, ein Vogel. 748) von παλός, das Loos. 749) von  
 750) von ορνις, ein Vogel. 751) von πυρ, Feuer. 752) von στίχος, eine Zeile in  
 753) von ορνις, ein Vogel. 754) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 755) von οὐναι-  
 756) von οἶνος, Wein. 757) von οἰωνός, ein Raubvogel. 758) von οὐνξ, ein Flügelnagel.  
 759) von ορνις, ein Vogel. 760) von παλός, das Loos. 761) von  
 762) von ορνις, ein Vogel. 763) von πυρ, Feuer. 764) von στίχος, eine Zeile in  
 765) von ορνις, ein Vogel. 766) von οὐνξ, ein Flügelnagel. 767) von οὐναι-  
 768) von ο

frühere Römische Geschichte von so großer Wichtigkeit waren. Vgl. die Artikel Augurien und Auspicien.

Die Verbreitung der christlichen Religion in der spätern Zeit war im geringsten nicht geeignet, den Glauben der Völker an Divinationen zu untergraben, da vielmehr die neue Lehre in den durch die Glaubenslehren bestätigt gefundenen Weissagungen früherer Zeit selbst die festen Stützen fand, und die Gabe der Weissagung, nach der Lehre der frühesten christlichen Kirche, als eine der vorzüglichsten angesehen wurde, mit der die Stifter und ersten Pfleger der christlichen Religion ihren göttlichen Beruf den Neubekehrten beglaubigten. Die Unterschiede der Divinationen gingen daher der Hauptsache nach vor dem Paganismus auch in das Christenthum über. Nach den Ueberzeugungen und Aussprüchen aller Kirchenväter war das Vermögen der Menschen, in die Zukunft zu blicken, entweder ein übernatürliches oder ein natürliches. Ersteres war, in so fern es auf Offenbarung des göttlichen Willens und der göttlichen Gnade gerichtet war, als Prophetie (*Prophetia*), nach dem Glauben der Väter, eine unmittelbare Wirkung des heiligen Geistes und eine hohe Vergünstigung derer, denen diese Gabe verliehen wurde. Hierher wurden insbesondere alle in den ältern und neuern biblischen Schriften aufgezeichneten Weissagungen gerechnet. Doch heftete sich der jugendliche Glaube der emporsprossenden Kirche wohl auch an Vorausverkündigungen einzelner, denen das Heil des Evangeliums noch fremd geblieben war, wenn solche der Verbreitung des göttlichen Reichs ersprießlich erschienen <sup>42</sup>. Alle übrige Divinationen des Paganismus aber, welche unter die natürlichen gestellt waren, galten den heiligen Vätern für Werke des Teufels, welche die göttliche Vorsicht zuließ, damit der Triumph des Christenthums um so mehr verherrlicht würde. Denn es war keines der geringsten Argumente für den Eintritt des neuen Heils durch den göttlichen Erlöser, daß mit seiner Erscheinung alle Dämonen der alten Welt verstummten. Was die natürlichen Divinationen betraf; so war die Naturkunde, als das Christenthum in das öffentliche Leben trat, noch nicht weit genug vorgerückt, daß die Kirchenlehrer die wirklich durch Erfahrung bewährten von den auf blinde Vertrauen sich gründenden hätten unterscheiden können. Doch waren die Zeichendeutungen, deren Naturzusammenhang durchaus im Dunkeln lag, gewöhnlich verdächtig, weil der fromme Christ überall im Leben die übergreifende Teufelsklaue scheute.

Diese verbreitete Ueberzeugung eines geheimen Zusammenhanges der übersinnlichen Welt mit dem irdischen Leben hat sich nun auch unter allen christlichen Religionsparteien bis über die Zeit der Reformation hinaus erhalten. Peucer <sup>43</sup> im 16ten Jahrhundert stellt

42) Man weiß aus der Kirchengeschichte, daß die vermeintliche Vorherverkündigung der Geburt Christi von Virgill nach der Deutung, welche man sehr vierten Esloge gab, so wie das Acrostichon, welches der Erzythralischen Sibyl zugeschrieben wurde, und dessen Anfangsbuchstaben in jeder Zeile, nach der vermeintlichen Uebersetzung des Cicero, die Worte: *Jesus Christus, Dei filius, servator crucis* zusammensetzen, unter die Hauptaraumente gehören, welche dem ersten christlichen Kaiser Constantin den Großen von der Wahrheit der christlichen Religion überzeugten. Vgl. *Constantini orat. ad sanctos*. c. 18 et 19. 43) S. dessen unten angeführtes Werk.



Uebereinstimmung mit den Kirchenvätern, folgende vier Hauptklassen der Divination auf: 1) die pneumatische oder spirituelle, (D. pneumatica, s. spiritualis,) welche auf Eingebung des heiligen Geistes beruht, 2) die teuflische, (D. diabolica,) wozu besonders die Orakel der Alten gehören, 3) die physische, (D. physica,) zu welcher er die meteorologischen, wie auch die Vorhersagungen der Aerzte rechnet, und 4) die populäre oder abergläubische, (D. popularis, s. superstitiosa,) welche er zum Theil als Ueberrest aus dem Heidenthum, auch als Eingebung des Teufels, der ja ein Lügner von Anfang war, verdammt.

Es konnte nicht fehlen, daß, als in den lezttern Jahrhunderten der Sinn für kritisch-historische Untersuchung immer mehr und mehr erwachte, als der menschliche Geist es unternahm, jeden Zweig des menschlichen Wissens in sich selbst zu begründen, als die Vorurtheile des Alterthums und der Schulen, selbst auch der kirchlichen Lehren nicht mehr dem philosophischen Geist in der Freiheit eigener Nachforschung fesseln anlegten, als man erkannte, daß der Zweck der Religion ganz anderer und weit höherer sei, als der, die Menschen über den Zusammenhang in der Natur, auf den ihnen beschiedenen Wohnort, zu belehren, daß dann auch alles, was frühere und spätere Schriften über Divinationen überliefert hatten, alles, was in den vielen Kreisen des Lebens dafür ausgegeben, und von dem großen Haufen in gläubiger Einfalt dafür angenommen wurde, allseitig beleuchtet, und nun bei weitem zum größten Theil in seiner Wichtigkeit und Leere erkannt wurde. Das Studium der Psychologie, für welches die Werke der Alten nur einzelne Bruchstücke überlieferten, und welches besonders in neuerer Zeit erst zu einiger Höhe gedieh, führte auch nothwendig zu den Quellen der menschlichen Leichtgläubigkeit, und machte es größtentheils begreiflich, wie Sagen und Behauptungen, welche aller historischen Glaubwürdigkeit entbehrend, wenn sie nur den Leidenschaften und den Leidenschaften der Menschen zusprechen, verbreitetes Gehör und Beifall finden können, und welchen Reiz es für Ehrgeiz, ruhmstüchtige und verschmigte Menschen hat, die Gutmüthigkeit und den kindlichen Sinn ihrer Umgebungen für sich und für ihre selbstsüchtigen Zwecke zu benutzen.

Die vielleicht zehn Mal gemachte Erfahrung verständiger Personen, in einem gewissen Fall getäuscht worden zu seyn, und bei genauerer Untersuchung den Grund der Täuschung aufgefunden zu haben, veranlaßt sehr natürlich zu der Voraussetzung, daß in einem eilften vorkommenden Falle die gleiche Täuschung obwalte, und auch ohne weitere Untersuchung zu dem Ausspruch, daß dem also sei. Mit dieser Art zu argumentiren sind denn auch in den lezttern Jahrzehenden, nachdem die frühern Vertheidiger und Anhänger der Weissagungen, Vorbedeutungen, Anzeigen, Ahnungen, so wie überhaupt der directen Bedeutungen eines von der materiellen Natur unabhängigen und in sie wenigstens nur locker gebundenen Geisterreichs unter der sich aufgeklärt dünkenden Welt immer sparsamer geworden waren, die Lehren der Beobachtung sich anbietenden Erscheinungen, wo benutzte physische Erklärungen von Erscheinungen dieser Art nicht recht ausreichen wollten, gleichsam, nach einem juristischen Ausdrucke, an-

gebrachtermaßen abgewiesen worden, und was ein bekannter Dichter unserer Zeit sehr sinnig sagt:

„Das Geisterreich ist nicht verschlossen,

„Der Sinn ist zu, das Herz ist todt.“

sprach die Weisen der neuesten Zeit ziemlich allgemein nur als eine poetische Idee an.

Es war aber eben dieser neuesten Zeit vorbehalten, in den Erscheinungen des animalischen Magnetismus ein in dem menschlichen Geiste schlummerndes, und unter Umständen zur Thätigkeit gelangendes Divinationsvermögen erfahrungsmäßig nachzuweisen. So vielefache Andeutung uns sämmtliche, den animalischen Magnetismus begleitende, und ihn eigentlich in ihrer Verbindung wesentlich ausmachende Phänomene geben, daß wir den Kreis unserer Naturkenntnis mit dem, was wir wissenschaftlich bisher darüber uns eigen gemacht zu haben rühmen, bei weitem noch nicht als geschlossen erachten dürfen; so ist doch keine Erfahrung für die Gewißheit, daß wir, als Naturkundige und als Naturphilosophen, durchaus noch mit allen unserer bisherigen Weisheit auf der ersten Stufe stehen, sprechend als diese. Sie läßt darüber kaum noch den geringsten Zweifel, daß es in dem universellen Seyn unsers Geistes zarte Fäden gebe, die nicht, wie die tastbare Körperwelt, uns nur mit den uns zunächst liegenden Umgebungen reell verbinden, sondern, analog, dem durch die unermesslichen Himmelsräume leuchtenden Sternenlicht, auch Vermittelnde werden, uns auf das innigste an einen allgemeinen Weltenorganismus zu knüpfen, daß es also auch Zustände gebe, wo relativ es der Geist verliehen ist, die Scheiden zu überspringen, die uns körperlich aus jener universellen Gemeinschaft versetzen.

Es ist hier nicht der Ort, näher zu erörtern, wie weit das Anschauungsvermögen magnetischer Somnambulen in der höchsten Thätigkeit reicht, und welches die Bedingungen desselben sind, (vgl. die Artikel Animalischer Magnetismus, Somnambulismus, und andere;) hier dürfte es genügen, jene Phänomene, wo Somnambulen nicht nur die auf ihren eignen Körperzustand Bezug habenden gegenwärtigen oder auch künftigen, der sinnlichen Erkenntnis verborgenen Vorgänge, sondern auch, sowohl entfernte als auch noch künftige wirkliche Ereignisse, welche auf ihre Individualität keinen nächsten Bezug hatten, mit mehrerer oder minderer Klarheit und Bestimmtheit andeuteten, als factisch aufzustellen, um einen Startpunkt zu gewinnen, von dem aus so manches, was die Weisheit der Schulen früherer und gegenwärtiger Zeit, als dem Aberglauben anfällig, stolz abwies, doch auch der nähern Aufmerksamkeit unbefangener Wahrheitsfreunde nicht unwürdig zu erachten ist.

Welche wichtige Aufschlüsse über die höhere Natur unsers geistigen Seyns die spätere Zeit liefern wird, kann jetzt vielleicht auch nur entfernt noch nicht vorausbestimmt werden. Was sich indessen vielleicht darüber aussprechen läßt, dürfte sich auf folgendes beschränken.

Der Mensch erhielt für die Zwecke seines irdischen Daseyns das Licht seines innern Bewußtseyns, in sinnlicher Erkenntnis, in der production derselben mittelst des Gedächtnisses, in freier Gestalt derselben durch die Phantasie, unter Leitung des Verstandes und in



berherrschafft der Vernunft. Dieses Bewußtseyn ist selbst eine Allegorisation eines höhern Lichts, ein entzündeter Funke, und als solcher der ewigen Lebensflamme entsprühlet, einen Moment, (den wir Menschenalter nennen,) in sich glühend, aber ihr im höhern Seyn nie entzogen, sondern ewig von ihr gehalten und eben so zu rückkehrend, um neu hervorzutreten, als er ihr ursprünglich entzogen. Dieß Bewußtseyn ist, so lange es klar und kräftig erhalten wird, bloß auf die sinnliche Welt beschränkt, und für alles, was über das weitem Kreisen in dasselbe gelangen könnte, verschlossen.

Aber eine Menge Andeutungen in diesem Bewußtseyn selbst bezeichnen einen innern, aus der Tiefe desselben, wohin selbst sein eignes Licht nicht reicht, hervorsprossenden Trieb, aus dem engen Kreise des Sinnenlebens in eine freie Sphäre zu dringen, ohne daß es jedoch diesem Triebe, ohne mit sich selbst in Disharmonie zu gerathen, und der Phantasie, mit Widerspruch der Vernunft, zu viel Spielraum zu gewähren, zu folgen vermag. Derselbe Trieb ist die Stammwurzel des religiösen Sinns des menschlichen Geistes, der aber in eben dem Maße in Aberglauben ausartet, als die Phantasie, der Vernunft vorzuziehend, sich ihre ideelle Welt in freier Gestaltung ausbaut. Hier tritt nun der religiöse Glaube als Vermittler zwischen der Vernunft und der Phantasie ein, wenn erstere erkennt, daß die Gestaltungen der letztern ihren eignen höhern Forderungen in Hinsicht der Bestimmung des Menschen Genüge leisten. Ein mehreres aber vermag die Vernunft jenen ideellen Gebilden, als Erzeugnissen einer ihr untergeordneten Geisteskraft, nicht zuzugestehen.

Aber jene Gebilde selbst haben, eben dadurch, daß jener Trieb in ihnen sich verlebendigt, ein Element, das nicht von außen stammt, das mit dem geistigen Vermögen, welches ihnen in der Vorstellung und im Bewußtseyn selbst erst ihre Form gibt, gleichen Ursprung hat. Dieses Elementarische äußert sich vielfach in dem Bewußtseyn als niederer oder höherer Instinct, der in den Thierseelen wie im menschlichen Geist so häufig, und für die Zwecke des irdischen Lebens so nothwendig, die Individualität selbst in weitere Räume entzückt, oder der Gegenwart voraus eilt. Dieser innere Impuls ist es, der den Zugvogel zur Winterszeit in wärmere Gegenden zieht, der überhaupt ein Vogel sein Nest zu bauen, der das Insect seine Eier dahin zu legen antreibt, wo das junge Thier sogleich beim Erwachen zu selbstständigem Leben seine Nahrung findet. Derselbe Impuls verbindet und hält die Geschlechter in der ganzen Thierwelt durch Liebe zusammen, und erlangt in dem menschlichen Geiste die höchste Staffel seiner Veredlung, indem er den Menschen durch tausend Fäden in das ideelle Leben, jenseits der Kreise seiner Individualität, verslicht.

Vermitteltst dieser Anknüpfungspuncte steht also der Mensch auch geistig in einem steten Bezug mit dem großen Weltenorganismus. So lange aber sein Bewußtseyn offen und klar ist, schwinden sie vor dem Licht derselben, und er gewahrt nur der Gestaltungen, welche die Phantasie aus jenen fernen Regionen her ihm reflectirt.

Wird aber dieß volle Licht des Bewußtseyns so gemäßigt, daß das ärmere Auge des Geistes für die höhere Welt nicht mehr wie vorher leblendet wird; so gelangen auch jene geheimen Fäden theilweise

eben so ins Bewußtseyn, als die Sterne des Himmels ersichtlich werden, wenn mit der untergehenden Sonne auch die Bläue des Himmels aus der Erscheinung verschwindet, die jene ewige Strahlen anfang, und nun ist es dem menschlichen Geiste vergönnt, wenn auch nur auf Momente und in trübem Lichte, auch jenseits der Kreise des Sinnenlebens zu erschauen, was für sein eignes Heil im gewöhnlichen Lebenskreise ihm dunkel bleiben mußte.

Dahin gehört denn zuvörderst das Erschauen der Zukunft ohne Vermittlung des Verstandes und der Vernunft. Die ewige Wahrheit: daß „gütig Gott die Zukunft in Finsternissen einhülle,“ bleibt übrigens unerschüttert, wenn es auch als psychologischer Satz anerkannt werden muß, daß unter gegebenen Verhältnissen eins und anderes aus künftiger Zeit dem Geist, wie ein Blitz vom Horizont des nächtlichen Himmels herauf, entgegenstrahle.

Wir dürfen nach der Analogie schließen, daß die Bedingungen, unter denen solches geschieht, immer nur solche sind, wo der Geist seinen gewöhnlichen Lebenskreisen entrückt ist, und seiner eignen Freiheit und Selbstständigkeit in dem Maße entrathet, als jenes Divinationsvermögen hervortritt, und dann unter Ueberlegenheit der Phantasie der Geist nothwendig auch der innern Haltung verlustig werden ist, die ihn in den Stand setzt, durch vergleichende Beobachtung Wahres und Falsches zu unterscheiden. Man kann die Uebereinstimmung nicht verkennen, welche der durch den animalischen Magnetismus erregte Somnambulismus mit solchen Arten des Irreseyns hat, die sich mehr im Vorstellungsvermögen als im Willen äußern. Alle divinatorische Aussprüche, deren die Geschichte gedenkt, haben den Anstrich von wahnsinnigen Ausbrüchen, und schon Plato leitete, (wie oben erwähnt wurde,) um deswillen die Divination vom Wahnsinn ab. Der Geisteszustand während des divinatorischen Traums ist also sich nur ein niedriger und unschädlicher Grad von Irreseyn, wie sich solches in Krankheiten ausbildet. So scheiden auch die mehrsten Menschen, nach vorherigen Krankheiten, in einem Geisteszustande aus der Welt, der minder oder mehr dem Zustande eines Geistesirren nahe kommt, oder wirklicher Wahnsinn ist, und unter dem erst das Sterbenden nicht selten dafür angesprochne Divinationsvermögen erwacht. Welcher menschliche Verstand vermöchte in diesem Gemisch von Geisteslicht und Geistesstrübbheit, in diesem Gaukelspiel der Ideen, Wahrheit und Täuschung so zu sondern, daß keine Zweideutigkeit zurückbliebe?

Für Belehrung und überhaupt für Zuwachs an Kenntniß im Leben darf also das durch erwachtes Divinationsvermögen etwa Erkante schwerlich, und in jedem Fall nur unter großer Beschränkung betrachtet werden, und immer wird das in solchem Zustande von einzelnen Individuen Ausgesprochene weit mehr Mißtrauen als Vertrauen verdienen, da der Geisteszustand solcher Personen wohl immer ein gemischter seyn, und das rege Spiel der Phantasie in der inneren Werkstätte des Geistes nie ohne Einmischung auf die sich ausprägenden Bilder der Zukunft bleiben dürfte.

Aber weit wichtiger vielleicht ist der hieraus zu entnehmende erfahrungsmäßige Beweis einer Verkettung unsers geistigen Seyns mit



nem über die Schranken der Sinnlichkeit weit hinausreichenden Leben, und die dadurch auch in dem Sinnesleben uns gewordene Verwirrung und Beglaubigung unserer Erhaltung in jenem, bei dem Zusammensturz jener Schranken im Tode.

Vgl. über diesen Gegenstand:

Casp. Peucerii commentarius de praecipuis divinationum generibus, in quo a prophetiis, autoritate divina traditis et a physicis conjecturis discernuntur artes et imposturae Diabolicae, atque observationes natae ex superstitione, et cum hac conjunctae, etc. Viteb. 1576, (Recogn. ultimo et auctus ab autore ipso, Servestae 1591,) gr. 8. (H.)

**Divinationsvermögen**, (*Vis divinationis*), das geistige Vermögen der Vorhersagung, als dessen Sitz schon die Alten die Leber sahen. S. *Divination*.

1) Sprengel's Gesch. d. Arzneik. 1. Th. S. 284.

**Divinator, Divinatrix, Diviniloquus, a**, vgl. *Divination*, auch Wahrsagen.

**Divisio chemica**, s. Chemische Theilung. — **mechanica**, s. Mechanische Theilung.

**Divisus nervus**, s. Fünfter Gehirnnerv.

**Doctrina Galliana**, s. *Cranioscopie*.

**Dolor**, s. Schmerz.

**Dolores**, s. Wehen. — **ad partum, s. concutientes, s. concussantes**, s. unter Wehen. — **post partum**, s. Nachwehen. — **caeparantes, praesagientes**, s. unter Wehen.

**Domestica canna cruris**, i. q. *Tibia*.

**Domesticae cavillae**, s. Knöchel.

**Domus cordis, Domus cordis**, i. q. *Pericardium*.

**Doppelbändige Mittelhandmuskeln**, s. unter *Zwischenknochenmuskeln* der Hand, die äußern Muskeln. — **Mittelfußmuskeln**, s. unter *Zwischenknochenmuskeln* des Fußes, die äußern oder vtern *Zwischenknochenmuskeln*.

**Doppeltinn**, (*Buccula*), die bei fetten Personen unter dem Kinn zuweilen mehr oder minder bemerkbare Hauterhabenheit, die ein Analogon eines zweiten Kinns bildet, und der Physiognomie einen eignen Charakter verleiht. Vgl. *Kinn*.

**Doppellaute**, s. *Diphthongen*.

**Dormitatio**, s. *Schläfrigkeit*.

**Dormitator**, s. *Schläfer*.

**Dormitio**, s. *Schlaf*.

**Dormitor**, s. *Schläfer*.

**Dorn**, s. *Spina*.

**Dornen des Keilfortsatzes**, s. *Jugularproceß*.

**Dornfortsätze der Wirbel**, s. *Spinöse Proceße der Wirbel*. — **fortsatz**, s. *Spina*. — des *Sphenoidalknochens*, s. *Spinöses Tuberculum des Sphenoidalknochens*.

**Dornichte Löcher des Keilbeins**, s. *Spinöse Löcher des Sphenoidalknochens*.

**Dornichter Fortsatz des Hammers**, s. *Spinöser Proceß des Malleus*.

**Dornmuskel des Nackens**, s. *Semispinalis des Nackens*. — **- Rückens**, s. *Spinalis des Rückens*.

**Dorsalarterie der großen Zehe**, (Dorsalis arteria<sup>1</sup>, s. dorsalis tibialis<sup>2</sup> hallucis,) Äußere Rückenarterie der großen Zehe<sup>3</sup>, Innere Dorsalarterie, oder Obere Schläder<sup>4</sup> der großen Zehe, ein Zweig der vordern Tibialarterie, der auf dem Rücken der großen Zehe nach außen sich verbreitet. Vgl. Digitalarterien des Fußes. S. auch unter Cruralarterie vordere Tibialarterie.

1) Sömmerring's Gefäßl. S. 337. 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2621. 3) Sömmerring's Gefäßl. a. a. D.

4) Meientaud's Zergliederungskf. Uebers. Leipz. 1782, 1. B. S. 731, Note. 2.

**Dorsalarterie der Handwurzel**, s. Dorsalarterie des Carpus.

**Dorsalarterie der Zunge**, (Dorsalis arteria linguae<sup>1</sup>, Zungenrückenarterie<sup>2</sup>, ein Zweig der Lingualarterie, der größtentheils auf dem Rücken der Zunge verbreitet. S. unter Crotiden, äußere Carotis, Lingualarterie.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2435. 2) Sömmerring's Gefäßl. S. 109.

**Dorsalarterie des Carpus oder der Handwurzel**<sup>1</sup>, (Dorsalis arteria carpea<sup>2</sup>, s. dorsalis carpi<sup>3</sup>), eine Abtheilung der Radialarterie, die zum Handrücken geht. S. unter Axillararterie, Radialarterie.

1) — 3) Sömmerring's Gefäßl. S. 220.

**Dorsalarterie des Penis**, s. unter Penisarterien.

**Dorsalarterie des Schulterblatts**, (Dorsalis arteria scapulae<sup>1</sup>), gewöhnlich ein Zweig der transversellen Schulterblattsarterie, der sich auf den äußern Theilen des Schulterblatts verbreitet. S. unter Subclaviculararterie.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2502.

**Dorsalarterien**, (Dorsales arteriae ex a. intercostalii superiore<sup>1</sup>), Rückenarterien<sup>2</sup>. So werden die hintern Äste der oberen Intercostalarterie, die vorzüglich zu den Rückenmuskeln, wie auch dem Rückenmark gehen, bezeichnet, dergleichen aber auch die übrigen Intercostalarterien abgeben. S. unter Subclaviculararterie erste Intercostalarterie, auch Intercostalarterien.

1) 2) Sömmerring's Gefäßl. S. 132 u. 134.

**Dorsalarterien der Finger**, (Dorsales arteriae digitalium manus<sup>1</sup>), Dorsalfingerarterien, Handrückenarterien der Finger. Deren werden an jeder obern oder der Außenseite sämtlicher Finger zwei unterschieden, und wieder a) als innere, oder Dorsalradialarterie, Dorsalspeichenarterie<sup>2</sup>, eines jeden Fingers, (A. dorsalis interna, s. radialis<sup>3</sup> pollicis, indicis, digiti auricularis, medii et minimi,) und b) als äußere, oder Dorsalulnararterie<sup>4</sup>, Handrückenelbogenarterie eines jeden Fingers, (A. dorsalis externa, s. ulnaris<sup>5</sup> pollicis, indicis etc.) bezeichnet. Die Dorsalarterien des Daumens, und Dorsalradialarterie des Zeigefingers entspringen besonders aus der Radialarterie, die übrigen aus dem arteriösen Netz der Dorsalflexion des Carpus. Vgl. Digitalarterien der Hand.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2534. 2) Sömmerring's Gefäßl. S. 224.

3) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. 4) Sömmerring's Gefäßl. S. 241. 5) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D.



**Dorsalarterien der Zehen**, (Dorsales arteriae digitales pedis<sup>1</sup>), Dorsalzehenarterien, Fußrückenarterien der Zehen<sup>2</sup>, Rückenzehearterien<sup>3</sup>. Deren werden an jeder obern Seite sämtlicher Zehen zwei unterschieden, und wieder a) als innere, oder Tibialarterie, (A. dorsalis interna, s. tibialis<sup>4</sup> digiti pedis primi, secundi, tertii, quarti, quinti,) und b) als äußere, oder Fibulararterie, (A. dorsalis externa, s. fibularis<sup>5</sup> dig. pedis primi, sec. etc.) bezeichnet. Die innere der großen Zehe, oder die erste, ist ein Zweig der vordern Tibialarterie, die entgegengesetzte äußere der kleinen Zehe, oder die letzte, ein Zweig der tarsischen Arterie, die zwischenliegenden Endigungen der Dorsalzwischenknochenarterien. Vgl. Digitalarterien des Fußes.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2621 u. 2623. 2) 3) Sömmerring's Gefäßl. S. 338 u. 353. 4) 5) Hildebrandt's Lehrb. u. s. w. a. a. D.

**Dorsalarterien des Daumens**<sup>1</sup>, (Dorsales arteriae pollicis<sup>2</sup>), Rückendaumartern, die beiden obern Arterien des Daumens, die nach ihrer Richtung, wie die übrigen Dorsalarterien der Finger, auch also a) als Radialarterie, (A. dorsalis radialis pollicis<sup>3</sup>), Rückenarterie des Daumens<sup>4</sup>, und b) als Ulnararterie, (A. dorsalis ulnaris pollicis<sup>5</sup>), Rückeneckbogenarterie des Daumens<sup>6</sup> unterschieden werden. Vgl. Pollicararterien.

1) Sömmerring's Gefäßl. S. 220. 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2554. 3) — 6) Sömmerring's Gefäßl. S. 220 u. 223.

**Dorsalarterienbogen des Fußes**, (Dorsalis arcus pedis<sup>1</sup> arteriosus.) So wird auch der sich an der Dorsalfläche der Mittelfußknochen der zweiten bis dritten Zehe herumbiegende Theil der äußern metatarsischen Arterie genannt. S. unter Cruralarterie, vordere Tibialarterie.

1) Mayer's Beschr. d. Blutgef. d. menschl. K. S. 173.

**Dorsale ganglion magnum**, s. primum, s. superius, f. oberer Thoracische Ganglien. — **ligamentum calcaneo-naviculare**, f. Dorsalligament des Calcaneus und scaphoideischen Knochens.

— **carpi communis**, f. Dorsalligament des Carpus. — — — **inter calcaneum et os naviculare**, f. Dorsalligament des Calcaneus und scaphoideischen Knochens. — — — — — **cuboideum**, f. unter Dorsalligamente des Calcaneus und des cuboideischen Knochens. — — — — — **os capitatum et hamatum**, f. Dorsalligament des Kops- und Hackenknochens. — — — — — **cuboideum et cuneiforme tertium**, f. unter Dorsalligamente der sphenoideischen Knochen und des cuboideischen Knochens des Tarsus, das dritte Ligament. — — — — — **cuneiforme secundum et primum**, f. unter Dorsalligamente der sphenoideischen Knochen und des cuboideischen Knochens des Tarsus, das erste Ligament. — — — — — **tertium et secundum**, f. unter Dorsalligamente der scaphoideischen Knochen und des cuboideischen Knochens des Tarsus, das zweite Ligament. — — — — — **multangulum majus et minus**, f. Dorsalligament des großen und kleinen multangulären Knochens des Carpus. — — — — — **minus et capitatum**, f. Dorsalligament

des kleinen multangulären und des Kopfknochens des Carpus.  
 — — — *naviculare et cuboideum*, s. Dorsalligament des scaphoideischen und cuboideischen Knochens des Tarsus. — — —  
 — — — *cuneiforme primum*, s. unter Dorsalligamente des scaphoideischen und des ersten sphenoideischen Knochens des Tarsus, das oberste.  
 — — — — — *secundum*, s. Dorsalligament des scaphoideischen und des zweiten sphenoideischen Knochens des Tarsus.  
 — — — — — *tertium*, s. Dorsalligament des scaphoideischen und des dritten sphenoideischen Knochens des Tarsus. — — *naviculari-cuboideum*, s. Dorsalligament des scaphoideischen und cuboideischen Knochens des Tarsus. — — *ossis capitati et hamati*, s. Dorsalligament des Kopf- und Hackenknochens. — —  
 — — *ossis metacarpi digiti annularis*, s. Dorsalligament des Kopfknochens und des Metacarpus des Ringfingers. — — —  
 — — — *medii*, s. Dorsalligament des Kopfknochens und des Metacarpus des Mittelfingers. — — — *hamati et ossis metacarpi digiti annularis*, s. Dorsalligament des Hackenknochens und Metacarpus des Ringfingers. — — — *multanguli majoris metacarpi indicis*, s. Dorsalligament des großen multangulären Knochens des Carpus und des Metacarpus des Zeigefingers. — — —  
 — — — — — *minoris*, s. Dorsalligament des großen und kleinen multangulären Knochens des Carpus. — — — — — *minoris et capitati*, s. Dorsalligament des kleinen multangulären und des Kopfknochens des Carpus. — — — — — *metacarpi indicis*, s. Dorsalligament des kleinen multangulären Knochens des Carpus und des Metacarpus des Zeigefingers. — — — — — *medii*, s. Dorsalligament des kleinen multangulären Knochens und des Metacarpus des Mittelfingers. — — — *navicularis et cuneiformis secundi*, s. Dorsalligament des scaphoideischen und zweiten sphenoideischen Knochens des Tarsus. — — — — —  
 — — — — — *tertii*, s. Dorsalligament des scaphoideischen und dritten sphenoideischen Knochens. — — *talo-naviculare internum, latum, superum*, s. Dorsalligamente des Talus und des scaphoideischen Knochens. — — *mediastinum*, s. unter Mediastinum, hinteres Mediastinum. — — *rete carpeum arteriosum*, s. Arterielles Netz der Dorsalfläche des Carpus. — — *manus venosum*, s. Venöses Geflecht der Dorsalfläche der Hand. — — *pedis venosum*, s. Venöses Geflecht der Dorsalfläche des Fußes. — *tuberculum ossium metacarpi*, s. unter Tuberkeln der Knochen des Metacarpus.

*Dorsales arteriae*, s. Dorsalarterien. — — *digitales manus externae, internae, radiales, ulnares*, s. Dorsalarterien der Finger. — — — *pedis externae, internae, fibulares, tibiales*, s. Dorsalarterien der Zehen. — — *interosseae manus*, s. unter Zwischenknochen-Handarterien. — — — *pedis*, s. unter Zwischenknochen-Fußarterien. — — *pollicis*, s. Dorsalarterien des Daumens. — *circuli venosi medullae spinalis*, s. unter Venenring des Rückenmarks. — *musculi*, s. Rückenmuskeln. — — *obliqui adscendentes, descendentes*, s. Schiefe Rückenmuskeln. — — *recti*, s. Gerade Rückenmuskeln. — *nervi*, s. Dorsalnerven. — — *digitorum manus*, s. Dorsalnerven der Finger. — — —



*alis*, f. Dorsalnerven der Zehen. — *plexus venosi*, f. Dorsalvenen. — *venae*, f. Dorsalvenen. — — *digitales manus exte-*  
*riae, internae, radiales, ulnares*, f. Dorsalvenen der Hand. — — *pedis externae, internae, fibulares, tibiales*, f.  
 Dorsalvenen der Zehen. — — *interossea antibrachii*, f. unter  
 Zwischenknochen = Dorsal- und Volarvenen des Vorderarms. — — —  
*pedis*, f. unter Zwischenknochen = Handvenen. — — — *pedis*, f.  
 unter Zwischenknochen = Fußvenen. — — *nasi*, f. unter Nasalvenen.  
 Dorsalfingerarterien, f. Dorsalarterien der Finger. — —  
 Dorsalfingervenen, f. Dorsalnerven der Finger. — — *venen*, f. Dorsalve-  
 nen der Finger.

**Dorsalfläche der Finger und Zehen**, (*Dorsalis superficies*  
*digitorum* <sup>1</sup>.) Dorsal- oder Rücken- oder Rückenfläche  
 der Finger und Zehen, die die Dorsalfläche der Hand und des  
 Fußes fortsetzende Außenfläche sämtlicher Finger und Zehen in Ver-  
 bindung. S. Handknochen und Fußknochen.

Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 785 u. 993.

**Dorsalfläche der Hand**, f. Dorsalfläche der Hand.

**Dorsalfläche der Knochen des Carpus**, (*Dorsalis super-*  
*ficies ossium carpi* <sup>1</sup>.) Dorsalfläche, oder Rückenfläche, oder  
 Rückenfläche des Carpus oder der Handwurzel, die nach  
 oben oder nach dem Rücken der Hand hin gerichtete Fläche der Kno-  
 chen des Carpus. S. Handknochen.

Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 747.

**Dorsalfläche der Knochen des Metacarpus und Meta-**  
**tarsus**, (*Dorsalis superficies ossium metacarpi et metatarsi* <sup>1</sup>.)  
 Dorsal- oder Rückenfläche, oder Rückenfläche der Mittel-  
 hand- und Mittelfußknochen, die der Dorsalfläche der Kno-  
 chen des Carpus und Tarsus entsprechende, und jene fortsetzende Flä-  
 che der gedachten Knochen in ihrer Verbindung mit einander. S.  
 Handknochen und Fußknochen.

Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 770.

**Dorsalfläche der Knochen des Tarsus**, (*Dorsalis super-*  
*ficies ossium tarsi* <sup>1</sup>.) Dorsalfläche, oder Rückenfläche, oder  
 Rückenfläche oder Obere Fläche des Tarsus oder der Fuß-  
 wurzel, die nach oben gerichtete Seite der den Tarsus constituiren-  
 den Knochen, in so fern sie besonders zur Bildung des Fußrückens  
 beitragen. S. Fußknochen.

Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 948.

**Dorsalfläche der Zehen**, f. Dorsalfläche der Finger und Zehen.

**Dorsalfläche des Fußes**, (*Dorsalis superficies pedis* <sup>1</sup>.) Rück-  
 enfläche <sup>2</sup>, oder Obere Fläche des Fußes <sup>3</sup>, Rücken des  
 Fußes <sup>4</sup>, Fußrücken, (*Dorsum pedis* <sup>5</sup>.) die convexe obere, der  
 Plantarfläche entgegengesetzte Fläche des Fußes. S. Fuß.

— 3) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 920 4) Wal-  
 ter's Abh. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 372. 5) Schaarschmidt's  
 Osteol. Tabell. Tab. 23.

**Dorsalia ganglia**, f. Thoracische Ganglien. — *ligamenta ba-*  
*nda ossium metatarsi*, f. Dorsalligamente der Knochen des Me-  
 tatarsus. — — *calcaneo-cuboidea*, f. Dorsalligamente des Cal-  
 caneus und des cuboideischen Knochens. — — *carpi*, f. Dorsalli-

gamente des Carpus. — — *inter os metatarsi secundum ossa cuneiformia*, i. q. Dorsalia ligamenta tarsea ossis metacarpi secundi. — — — *naviculare et cuneiforme primi*, i. q. Dorsalia ligamenta ossis navicularis et cuneiformis primi. — — — *os naviculare*, i. q. Dorsalia ligamenta talo-navicularia. — — *ossis navicularis et cuneiformis primi*, Dorsalligamente des scaphoideischen und des ersten sphenoideischen Knochens des Tarsus. — — *ossium cuneiformium et cuboidum*, s. Dorsalligamente der sphenoideischen Knochen und des cuboidischen Knochens des Tarsus. — — *pedis*, s. Dorsalligamente des Fußes. — — *propria metacarpi*, s. Dorsalligamente des Metacarpi des Metacarpus. — — *metatarsi*, s. Eigene Dorsalligamente des Metatarsus. — — *talo-navicularia*, s. Dorsalligamente des Talus und des scaphoideischen Knochens. — — *tarsea ossis metatarsi secundi*, s. unter Tarsische Dorsalligamente der Knochen des Metatarsus. — — *tarsi*, s. Dorsalligamente des Fußes.

*Dorsalis arcus carpi arteriosus*, s. Arterielles Netz der Dorsalfäche des Carpus. — — — *venosus*, s. Venöses Geflecht der Dorsalfäche der Hand. — — *humeri posterior*, s. Hinterer Armrückenbogen. — — *nervus*, s. *nervosus manus et pedis*, s. Dorsalnervenbogen der Hand und des Fußes. — — *pedis arteriosus*, s. Dorsalarterienbogen des Fußes. — — *arteria carpi s. carpi*, s. Dorsalarterie des Carpus. — — *ulnaris*, s. Ulnararterie. — — *digitalis externa, interna, radialis, ulnaris, pollicis, indicis, digiti medii, auricularis et minimi*, s. Dorsalarterien der Finger. — — — — — *fibularis, tibialis*, s. Dorsalarterien der Beine. — — *hallucis*, s. Dorsalarterie der großen Zehe. — — *humeri*, s. Tiefe Brachialarterie. — — *interossea*, s. unter Zwischenknochen = Dorsal- und Volararterie des Vorderarms. — — *linguae*, s. Dorsalarterie der Zunge. — — *penis*, s. unter Penisarterien. — — *pollicis manus radialis et ulnaris*, s. Dorsalarterien des Daumens. — — — *pedis*, s. unter Zwischenknochenfußarterien. — — *scapulae*, s. Dorsalarterie des Schulterblatts, ingleichen Transverselle Schulterblattsarterie. — — *suprema*, s. unter Cervicalarterien, oberflächliche Arterie der Hand. — — *tibialis hallucis*, s. Dorsalarterie der großen Zehe. — — *lunula*, s. Rückgrath. — — *membrana communis tarsi*, s. Dorsalmembran des Tarsus. — — *musculus magnus, s. maximus*, s. Breitester Rückenmuskel. — — *nervus digiti auricularis, indicis, medii, minimi, pollicaris, s. pollicis, radialis et ulnaris*, s. Dorsalnerven der Finger. — — — *pedis primi, secundi, tertii, quarti, quinti, externus, internus*, s. Dorsalnerven der Beine. — — *pedis exterior*, s. Dorsalnerve des Fußes nach außen. — — *penis*, s. unter Penisnerven. — — *pollicis externus et internus*, s. unter Pollicarnerven. — — *pars membranae carpi communis*, s. unter Ligamentöse Membran des Carpus, Dorsaltheil derselben. — — *plexus venosus manus et pedis*, s. Venöses Geflecht der Dorsalfäche der Hand und des Fußes. — — *sulcus ossis scaphoidei*, s. Dorsalsulcus des scaphoideischen Knochens. — — *sap*



*ies digitorum*, s. Dorsalseite der Finger und Zehen. — — *os-  
m carpi et tarsi*, s. Dorsalfläche der Knochen des Carpus und  
Tarsus. — — — *metacarpi et metatarsi*, s. Dorsalfläche  
Knochen des Metacarpus und Metatarsus. — — *pedis*, s.  
Dorsalfläche des Fußes. — *vena clitoridis*, s. Clitorisvene. —  
*digitalis externa, interna, radialis, ulnaris, pollicis,*  
*alicis, digitii medii auricularis et minimi*, s. Dorsalvenen  
Finger. — — — *fibularis, tibialis, digiti pedis primi,*  
*secundi, tertii, quarti, quinti*, s. Dorsalvenen der Zehen. —  
*linguae*, s. Dorsalvene der Zunge. — — *nasi inferior et*  
*superior*, s. unter Nasalvenen. — — *penis*, s. unter Penisve-  
ne. — — *scapulae*, s. Transverselle Schulterblattsvene.

**Dorsalligament des Calcaneus und des scaphoideischen  
Knochens**, (Dorsale ligamentum calcaneo-naviculare<sup>1</sup>.) Preis-  
tisches Band<sup>2</sup> des Calcaneus und des scaphoidei-  
schen Knochens, Oberes Fersen-Kahnband<sup>3</sup>, Rückenband  
zwischen dem kahnförmigen und dem Fersenbein<sup>4</sup>, (Li-  
gamentum dorsale inter calcaneum et os naviculare<sup>5</sup>.) das  
obliche Ligament, welches auf der Dorsalfläche des Fußes vorwärts  
einwärts vom vordern Proesse des Calcaneus kommt, und sich  
abwärts an den scaphoideischen Knochen ansetzt. S. Fußliga-  
mente.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 1017. 2) Weit-  
brecht's Synthesm. Uebers. Straßb. 1779, S. 178. 3) Meckel's Handb.  
d. menschl. Anat. 1. B. S. 980. 4) Eoder's anat. Tafeln, Taf. 25, Fig. 1.  
Nr. 23. 5) Eoder's anat. Handb. 1. B. S. 425.

**Dorsalligament des Carpus**, (Dorsale ligamentum carpi  
communis<sup>1</sup>.) Gemeines äußeres Handwurzelband<sup>2</sup>, Ge-  
meinschaftliche Binde der Handwurzel an der Rücken-  
seite<sup>3</sup>, Gemeinschaftliches Band des Rückens der Hand-  
wurzel<sup>4</sup>, (Ligamentum transversale externum carpi<sup>5</sup>, s. mag-  
num obliquum<sup>6</sup>, Membrana carpi communis dorsalis<sup>7</sup>.) das  
dicke, dünne auf der äußern Seite des Unterarms über dem Carpus  
liegende Ligament, welches den untern festern und stärkern Theil der  
Gelenkskapsel des Vorderarms ausmacht, vom Radius aus etwas  
abwärts zur Ulna geht, die Sehnen der Extensoren des Car-  
pus und der Finger bedeckt, und indem es wahre Scheiden, als Fort-  
setzungen von dessen innerer Fläche, für dieselben bildet, die Bewegung  
der Sehnen erleichtert. Vgl. auch Dorsalligamente des Car-  
pi. S. Handligamente, ingl. Handmuskeln.

1) Edmerring's Wunderr. S. 66. 2) nach Hildebrandt (Lehrb. d.  
Anat. d. M. 2. B. S. 1189.) 3) nach Edmerring (a. a. O.) 4)  
Weitbrecht's Synthesm. Uebers. Straßb. 1779, S. Cap. S. 1. 5) 6)  
Hildebrandt's Lehrb. u. s. w. a. a. O. 7) nach Eoder (anat. Handb.  
1. B. S. 418.)

**Dorsalligament des großen multangulären Knochens  
des Carpus und dem Metacarpus des Zeigefingers**, (Dor-  
sale ligamentum ossis multanguli majoris et ossis metacarpi  
secundis<sup>1</sup>, Ligamentum inter os multangulum majus et meta-  
carpi secundum<sup>2</sup>.) das weiße, strahlenförmige Ligament, welches  
Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 897. 2) Eoder's  
anat. Handb. 1. B. S. 367.

auf der Dorsalseite vom untern Theile des großen multangulären Knochens aus zur angrenzenden Basis des Knochens des Metacarpus des Zeigefingers hingeht. S. Handligamente.

**Dorsalligament des großen und kleinen multangulären Knochens des Carpus,** (Dorsale ligamentum ossis multanguli majoris et minoris<sup>1</sup>, s. inter os multangulum majus minus<sup>2</sup>.) Rückenband zwischen dem großen und kleinen vielwinklichten Bein<sup>3</sup>, dasjenige Ligament, welches auf der Dorsalseite aus dem Sinus des großen multangulären Knochens kommt und sich querüberlaufend an den kleinen multangulären Knochen ansetzt. S. Handligamente.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 804.

2) Pöder's anat.

Handb. 1. B. S. 360.

3) Pöder's anat. Taf. Taf. 20 Fig. 6. Nr.

**Dorsalligament des Hackenknochens und des Metacarpus des Ringfingers,** (Dorsale ligamentum ossis hamati ossis metacarpi digiti annularis<sup>1</sup>, Ligamentum inter os hamatum et metacarpi quartum<sup>2</sup>.) dasjenige Ligament, welches auf der Dorsalseite vom untern und vordern Theil des Hackenknochens des Carpus aus zur Basis des Knochens des Metacarpus des Ringfingers geht. S. Handligamente.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 807.

2) Pöder's anat.

Handb. 1. B. S. 372.

**Dorsalligament des kleinen multangulären Knochens des Carpus und des Metacarpus des Mittelfingers,** (Dorsale ligamentum ossis multanguli minoris et ossis metacarpi medii<sup>1</sup>, Ligamentum inter os multangulum minus et metacarpi tertium<sup>2</sup>.) dasjenige Ligament, welches auf der Dorsalseite der Hand vom untern Theile des kleinen multangulären Knochens des Carpus aus zum stiftförmigen Proceß des Knochens des Metacarpus des Mittelfingers geht. S. Handligamente.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 807.

2) Pöder's anat.

Handb. 1. B. S. 369.

**Dorsalligament des kleinen multangulären Knochens des Carpus und des Metacarpus des Zeigefingers,** (Dorsale ligamentum ossis multanguli minoris et metacarpi indicis<sup>1</sup>, Ligamentum inter os multangulum minus et metacarpum secundum<sup>2</sup>.) dasjenige Ligament, welches auf der Dorsalseite der Hand von dem untern Theil des kleinen multangulären Knochens aus zur Mitte der Basis des Knochens des Metacarpus des Zeigefingers hingeht. S. Handligamente.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 807.

2) Pöder's anat.

Handb. 1. B. S. 368.

**Dorsalligament des kleinen multangulären und des Knochens des Carpus,** (Dorsale ligamentum ossis multanguli minoris et capitali<sup>1</sup>, s. inter os multangulum minus et capitatum<sup>2</sup>.) Rückenband zwischen dem kleinen vielwinklichten und dem großen Bein<sup>3</sup>, das kurze Ligament, welches auf der Dorsalseite der Hand vom hintern Rande des kleinen multangulären Knochens zum vordern Rande des Halses des Kopfknochens des Carpus geht. S. Handligamente.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 804.

2) Pöder's anat.

Handb. 1. B. 2. 361.

3) Pöder's anat. Tafeln; Taf. 20, Fig. 6. Nr.



**Dorsalligament des Kopffknochens und des Metacarpus des Mittelfingers,** (Dorsale ligamentum ossis capitati et ossis metacarpi medii<sup>1</sup>, Ligamentum inter os capitatum et metacarpi medium<sup>2</sup>.) dasjenige Ligament, welches auf der Dorsalfläche der Hand an der Basis des Kopffknochens des Carpus aus zum stiftförmigen Proceß des Knochens des Metacarpus des Mittelfingers geht. S. Handligamente.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 307. 2) Loder's anat. Handb. 1. B. S. 307.

**Dorsalligament des Kopffknochens und des Metacarpus des Ringfingers,** (Dorsale ligamentum ossis capitati et ossis metacarpi digiti annularis<sup>1</sup>, Ligamentum inter os capitatum et metacarpi quartum<sup>2</sup>.) dasjenige Ligament, welches auf der Dorsalfläche der Hand von der Basis des Kopffknochens des Carpus aus zum Proceß des Knochens des Metacarpus des Ringfingers hin geht. S. Handligamente.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 307. 2) Loder's anat. Handb. 1. B. S. 317.

**Dorsalligament des Kopf- und Hackenknochens des Carpus,** (Dorsale ligamentum ossis capitati et hamati<sup>1</sup>, s. inter os capitatum et hamatum<sup>2</sup>.) Rückenband zwischen dem großen und dem Hackenbein<sup>3</sup>, dasjenige kurze Ligament, welches auf der Dorsalfläche der Hand vom hintern Rande der Basis des Kopffknochens gegen über zum vordern Rande des Hackenknochens des Carpus geht. S. Handligamente.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 304. 2) Loder's anat. Handb. 1. B. S. 362. 3) Loder's anat. Taf. Taf. 20, Fig. 6. Nr. 25.

**Dorsalligament des scaphoideischen und cuboideischen Knochens des Tarsus,** (Dorsale ligamentum navicularicuboidaleum<sup>1</sup>.) Rückenband zwischen dem kahnförmigen und dem Würfelbein<sup>2</sup>, Rückenbahn- und Würfelbeinband<sup>3</sup>, (Ligamentum dorsale inter os naviculare et cuboideum<sup>4</sup>.) dasjenige Ligament, welches auf der Dorsalfläche des Tarsus auswärts vom scaphoideischen Knochen zum innern und hintern Theile des cuboideischen Knochens geht. S. Fußligamente.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 1017. 2) Loder's anat. Taf. Taf. 25, Fig. 1. Nr. 25. 3) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 984. 4) Loder's anat. Handb. 1. B. S. 425.

**Dorsalligament des scaphoideischen und des dritten sphenoideischen Knochens des Tarsus,** (Dorsale ligamentum os navicularis et cuneiformis tertii<sup>1</sup>.) Rückenband zwischen dem kahnförmigen und dem dritten Keilbein<sup>2</sup>, Äußeres Rückenbahn- und Keilbeinband<sup>3</sup>, (Ligamentum inter os naviculare et cuneiforme tertium<sup>4</sup>.) dasjenige Ligament, welches auf der Dorsalfläche des Tarsus auswärts vom scaphoideischen Knochen aus zum hintern Theile des dritten sphenoideischen Knochens gehende Ligament. S. Fußligamente.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 1017. 2) Loder's anat. Taf. Taf. 25, Fig. 1. Nr. 26. 3) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 987. 4) Loder's anat. Handb. 1. B. S. 426.

**Dorsalligament des scaphoideischen und des zweiten cuboideischen Knochens des Tarsus,** (Dorsale ligamentum navicularis et cuneiformis secundum<sup>1</sup>.) Rückenband zwischen dem kahnförmigen und dem zweiten Keilbein<sup>2</sup>, Mittleres Rückenbahn- und Keilbeinband<sup>3</sup>, (Ligamentum inter os naviculare et cuneiforme secundum<sup>4</sup>.) dasjenige Ligament, welches auf der Dorsalfläche des Tarsus auswärts vom scaphoideischen Knochen aus zum vordern Theile des zweiten cuboideischen Knochens gehende Ligament. S. Fußligamente.

tum ossis navicularis et cuneiformis secundi <sup>1)</sup>, Rückenband zwischen dem kahnförmigen und dem zweiten Keilbein <sup>2)</sup>, Inneres Rücken = Kahn = und Keilbeinband <sup>3)</sup>, (Ligamentum dorsale inter os naviculare et cuneiforme secundum <sup>4)</sup>,) dasjenige Ligament, welches auf der Dorsalfläche des Tarsus vom scaphoideischen Knochen aus, schmaler werdend, zum zweiten sphenoideischen Knochen geht. **S. Fußligamente.**

- 1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 1017. 2) Eoder anat. Tafeln, Taf. 25, Fig. 1. Nr. 27. 3) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 987. 4) Eoder's anat. Handb. 1. B. S. 427.

**Dorsalligamente der Knochen des Metacarpus,** (Dorsalia ligamenta propria metacarpi <sup>1)</sup>, s. baseos ossium metacarpi) Handrückenbänder der Mittelhandbeine <sup>2)</sup>, Bänder auf dem Rücken der Mittelhandbeine <sup>3)</sup>, Rückenbänder der Basis des zweiten bis fünften Mittelhandknochen <sup>4)</sup>, diejenigen drei Ligamente, von denen das erste auf der Rückenseite der Hand von der Ulnarseite der Basis des Metacarpus des Zeigefingers zur Radialseite der Basis des Metacarpus des Mittelfingers schräger Richtung läuft, die übrigen beiden aber eben so zwischen dem Metacarpus des dritten und vierten und des vierten und fünften Fingers liegen. **S. Handligamente.**

- 1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 810. 2) Eoder anat. Handb. 1. B. S. 874. 3) Edmerring's Wörterb. S. 56. 4) Weitbrecht's Synonym. Uebers. Straßb. 1779, S. 76. 5) Eoder anat. Tafeln, Taf. 20, Fig. 6. Nr. 35 — 37.

**Dorsalligamente der sphenoideischen Knochen und des cuboideischen Knochens des Tarsus,** (Dorsalia ligamenta ossium cuneiformium et ossis cuboidei <sup>1)</sup>,) diejenigen Ligamente, welche auf der Dorsalfläche des Tarsus theils von den sphenoideischen Knochen zu dem cuboideischen, theils aber auch von einem sphenoideischen Knochen zum andern gehen, und von denen man a) das erste (primum <sup>2)</sup>,) Rückenkeilbeinband <sup>3)</sup>, Rückenband zwischen dem zweiten und ersten Keilbein <sup>4)</sup>, (Ligamentum dorsale inter os cuneiforme secundum et primum <sup>5)</sup>,) welches hienach von der Spitze des ersten zum innern Rande des zweiten sphenoideischen Knochens geht, b) das zweite, (secundum <sup>6)</sup>,) Rückenkeilbeinband <sup>7)</sup>, Rückenband zwischen dem zweiten und dritten Keilbein <sup>8)</sup>, (Ligamentum dorsale inter os cuneiforme tertium et secundum <sup>9)</sup>,) vom äußern Rande des zweiten zum innern des dritten sphenoideischen Knochens gehende, und endlich c) das dritte, (tertium <sup>10)</sup>,) Rücken-, Würfel- und Keilbeinband <sup>11)</sup>, Rückenband zwischen dem Würfel- und dem vierten Keilbeinband <sup>12)</sup>, Superficielles plattes Band zwischen Würfel- und dritten keilförmigen Beins <sup>13)</sup>, (Ligamentum dorsale inter os cuboideum et cuneiforme tertium <sup>14)</sup>, Pl

- 1) 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 1017. 3) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 989. 4) Eoder's anat. Tafeln, Taf. 25, Fig. 1. Nr. 31. 5) Eoder's anat. Handb. 1. B. S. 432. 6) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. O. 7) Meckel's Handb. u. f. w. a. a. O. 8) Eoder's anat. Taf. a. a. O. Nr. 30. 9) Eoder's anat. Handb. 1. B. S. 431. 10) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. c. c. O. 11) Meckel's Handb. u. f. w. 2. B. S. 988. 12) Eoder's anat. a. a. O. Nr. 29. 13) Weitbrecht's Synonym. Uebers. Straßb. 1779, S. 76. 14) Eoder's anat. Handb. 1. B. S. 430.



es ligamentosa superficialis,) welches vom äußern Rande des dritten sphenoidischen Knochens aus sich am innern Rande des cuboideischen Knochens des Tarsus ansetzt, unterscheidet. *S. Fußligamente.*

**Dorsalligamente des Calcaneus und des cuboideischen Knochens,** (*Dorsalia ligamenta calcaneo-cuboidea* <sup>1</sup>.) Fläche, breite Fußrückenbänder des Calcaneus und des cuboideischen Knochens, Obere Fersen = Würfelbeinbänder <sup>2</sup>, (*ligamenta calcaneo-cuboidea superficialia, s. superiora* <sup>1</sup>.) drei Bänder, welche auf der Dorsalfläche des Fußes auswärts und vorwärts vom vordern Prozesse des Calcaneus kommen, und sich 3 = und hintwärts an den cuboideischen Knochen des Tarsus ansetzen, zuweilen aber mit einander zusammenhängen und ein zollbreites Ligament, Rückenband zwischen dem Fersen- und Würfelbein <sup>4</sup>, (*Ligamentum dorsale inter calcaneum et os cuboideum* <sup>5</sup>.) ausmachen. *S. Fußligamente.*

<sup>1</sup>) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 1017. 2) 3) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 982. 4) Eoder's anat. Tafeln, Taf. 25, Fig. 1. Nr. 24. 5) Eoder's anat. Handb. 1. B. S. 424.

**Dorsalligamente des Carpus,** (*Dorsalia ligamenta carpi* <sup>1</sup>.) Handrückenligamente. Als solche werden besonders auch diejenigen kurzen Ligamente unterschieden, welche auf der Dorsalfläche der Hand die Knochen des Carpus theils unter sich, theils auch mit den Knochen des Metacarpus verbinden, und nach diesen verschiedenen Knochen benannt werden. *S. Handligamente.*

<sup>1</sup>) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 804.

**Dorsalligamente des Fußes,** (*Dorsalia ligamenta pedis, s. ossis*.) Fußrückenbänder, diejenigen kurzen Ligamente, welche auf der Dorsalfläche des Fußes die Knochen des Tarsus unter sich, und auch mit den Knochen des Metatarsus verbinden, und welche die Benennungen von den einzelnen Knochen erhalten, deren Verbindung sie bewirken. *S. Fußligamente.*

**Dorsalligamente des scaphoideischen und des ersten sphenoidischen Knochens des Tarsus,** (*Dorsalia ligamenta ossis navicularis et cuneiformis primi* <sup>1</sup>, *Ligamenta dorsalia inter os naviculare et cuneiforme primum*.) die beiden gegen die Linien breiten Bänder, welche auf der Dorsalfläche des Tarsus zwischen dem scaphoideischen Knochen zum ersten sphenoidischen Knochen ansetzen, und von denen man, a) ein inneres, Kahn- und Keilbeinband <sup>2</sup>, Seitenband zwischen dem kahnförmigen und ersten Keilbein <sup>3</sup>, (*Lig. internum* <sup>4</sup>, *s. ossis navicularis internum primum* <sup>5</sup>, *Lig. laterale inter os naviculare et cuneiforme primum* <sup>6</sup>, *s. scaphoideo-cuboideum internum* <sup>7</sup>.) weiß, b) ein äußeres, hintern Theil der innern Fläche des ersten sphenoidischen Knochens ansetzt, c) ein oberes, Rückenband zwischen dem kahnförmigen und ersten Keilbein <sup>8</sup>, (*Lig. supernum* <sup>9</sup>, *s. ossis navicularis supernum* <sup>10</sup>.)

<sup>1</sup>) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 1017. 2) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 987. 3) Eoder's anat. Tafeln, Taf. 25, Fig. 2. Nr. 17. 4) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. 5) Walther de articulationis et musc. homin. incesu ect. dir. obs. p. 50. 6) Eoder's anat. Handb. 1. B. S. 429. 7) Meckel's Handb. u. f. w. a. a. D. 8) Eoder's anat. Taf. Taf. 25, Fig. 1. Nr. 28. 9) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D.

navicularis internum secundum<sup>10</sup>, Lig. dorsale inter os naviculare et cuneiforme primum<sup>11</sup>.) unterscheidet, welches von jentheils bedeckt wird, und einwärts vom scaphoideischen Knochen aus sich die Spitze des ersten sphenoideischen Knochens anlegt. S. Fußligamente.

10) Walther de art. etc. l. c. 11) Roder's anat. Handb. 1. B. S. 423.

**Dorsalligamente des Talus und des scaphoideischen Knochens**, (Dorsalia ligamenta talo-navicularia.) Sprung- u. Kuhnbeinbänder<sup>1</sup>, (Ligamenta dorsalia inter talum et naviculare,) diejenigen Ligamente, welche auf der Dorsalfläche des Fußes von dem Halse des Talus aus zum scaphoideischen Knochen gehen, und von denen man, a) ein oberes breites<sup>2</sup>, (Ligamentum dorsale talo-naviculare latum, s. supernum<sup>3</sup>, Ligamentum superius inter talum et os naviculare<sup>4</sup>, s. astragulo-scaphoideum<sup>5</sup>.) welches auswärts von der obern Fläche des Halses des Talus kommt, und sich mitten auf der obern Fläche des scaphoideischen Knochens ansetzt, und b) ein inneres, (Ligamentum dorsale talo-naviculare internum<sup>6</sup>.) unterscheidet, welches denselben Ursprung und dieselbe Anlage hat, nur etwas mehr nach innen liegt, und vorwärts an Breite zunimmt. S. Fußligamente.

1) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 232. 2) Weltbrecht's Synonym. Uebers. Straßb. 1779, S. 176. 3) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 1027. 4) Roder's anat. Handb. 1. B. S. 423. 5) Meckel's Handb. u. s. w. a. a. D. 6) Hildebrandt's Lehrb. u. s. w. a. a. D.

**Dorsalmembran des Tarsus**, (Dorsalis membrana communis tarsi<sup>1</sup>.) die die Rückenfläche des Tarsus überziehende sehnichtige Membran, welche sich bis zur Verbindung des Metatarsus mit demselben erstreckt, und hier die gemeinsame Capselmembran dieser Verbindung, wie der meisten Knochen des Tarsus ausmacht. S. Fußligamente.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 1016.

**Dorsalnerv des Fußes nach außen**, (Dorsalis nervus pedis exterior<sup>1</sup>.) Äußerer Nerv des Fußrückens<sup>2</sup>, das Ende des langen hintern Hautnerven des Unterschenkels auf dem Fußrücken. Vgl. Cutannerven des Unterschenkels.

1) 2) Mayer's Besch. d. menschl. K. 8. B. S. 263.

**Dorsalnerven**, (Dorsales nervi<sup>1</sup>.) Rückennerven<sup>2</sup>, Nippennerven<sup>3</sup>, Intercostalnerven<sup>4</sup>, (Nervi costales<sup>5</sup>, s. intercostales<sup>6</sup>.) die auf beiden Seiten des Rückgraths aus den Seitenlöchern, welche sich zwischen jedem der zwölf Rückenwirbel und dem folgenden darunter befinden, hervorbringenden, also ebenfalls zwölf Nerven, indem nämlich das untere Nervenpaar zwischen dem letzten Rückenwirbel und dem ersten Lendenwirbel hervortritt, (daher auch von einigen zu den Lendennerven gerechnet wird,) die sich sämmtlich mit einem hintern kleinern Ast in den Muskeln am Rückgrath verzweigen, mit einem vordern größern aber in dem Zwischenraum zwischen den Rippen (und unter der letzten Rippe) vorwärts ihren Fortgang nehmen, auch zu dem großen Intercostalnerven, (der oberste zu dem Brachialnervenplexus,) Verbindungszweige geben. S. Rückennerven.

1) Winslow exp. anat. lat. v. T. III. tr. de nerv. S. 255. 2)

Winslow's anat. Bibl. Uebers. Berl. 1755, 3. B. S. 296. 4) Mayer's Besch. d. menschl. K. 8. B. S. 62. 5) Winslow exp. an. etc. l. c.

6) nach Winslow's und Haller's Vorschlag, welcher letzterer auch nur Paare zählt. S. deff. el. physiol. T. IV. l. 10. s. 6. S. 37.



**Dorsalnerven der Finger,** (Dorsales nervi digitorum manus<sup>1</sup>.)  
**Dorsalfingernerven,** Handrückenerven der Finger.  
 Deren werden an jedem Finger, auf der obern oder Außenseite der-  
 selben, zwei unterschieden, und a) als äußere<sup>2</sup>, oder Dorsalra-  
 dialnerven, (Nervus dorsalis externus<sup>3</sup>, s. radialis pollica-  
 ris<sup>4</sup>, s. pollicis indicis<sup>5</sup> digiti medii<sup>6</sup>, auricularis<sup>7</sup> et mini-  
 mae<sup>8</sup>.) und b) als innere<sup>9</sup>, oder Dorsalulnarnerven, (Nervus  
 dorsalis internus<sup>10</sup>, s. ulnaris pollicaris<sup>11</sup> indicis<sup>12</sup> etc.)  
 bezeichnet. Vgl. Digitalnerven der Hand.

Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 3204. 2) — 12)  
 Meier's Besch. d. menschl. K. 8. B. S. 274 u. 292.

**Dorsalnerven der Zehen,** (Dorsales nervi digitorum pedis<sup>1</sup>.)  
**Dorsalzehennerven,** Fußrückenerven der Zehen<sup>2</sup>, Rück-  
 anzegehennerven, Zehennerven des Fußrückens. Deren  
 werden an jeder obern Seite sämtlicher Zehen zwei unterschieden,  
 a) als äußere<sup>3</sup> Nerven, (N. dorsalis externus<sup>4</sup> digiti pe-  
 duli primi, secundi, tertii, quarti, quinti<sup>5</sup>.) und b) als in-  
 nere<sup>6</sup> Nerven, (N. dorsalis internus<sup>7</sup> digiti pedis primi<sup>8</sup>.)  
 bezeichnet. Vgl. Digitalnerven des Fußes.

Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 3327. 2) — 9) Meier's  
 Besch. d. menschl. K. 8. B. S. 386 u. 388.

**Dorsalnerven des Daumens,** s. unter Pollicarnerven, ingl.  
 Dorsalnerven der Finger.

**Dorsalnervenbogen der Hand,** (Dorsalis arcus nervosus<sup>1</sup>,  
 nervus manus,) Nervenbogen des Handrückens<sup>2</sup>, Ver-  
 einigungsbogen der Nerven des Handrückens<sup>3</sup>, die durch  
 den Zusammentritt des Rückenastes des Ulnarnerven mit dem ober-  
 flächlichen Aste des Radialnerven auf dem Handrücken entstehende bo-  
 genförmige Bildung, aus dem insbesondere fünf Dorsalnerven der  
 letzten Finger ihren Ursprung nehmen. S. unter Brachial-  
 nervenplexus, den Ulnarnerven.

— 5) Meier's Besch. d. menschl. K. 8. B. S. 292 und 313

**Dorsalnervenbogen des Fußes,** (Dorsalis arcus nervosus,  
 nervus superficialis<sup>1</sup>.) Nervenbogen des Fußrückens,  
 oberflächlicher Nervenbogen des Fußrückens<sup>2</sup>, die, wie-  
 derum nicht immer, durch Zusammentritt der Hautnerven auf dem  
 Fußrücken, in der Gegend der Köpfe der Mittelfußknochen, sich bil-  
 den. S. unter Ischiadischer Nerv.

2) Meier's Besch. d. menschl. K. 8. B. S. 387.

**Dorsalradialarterien der Finger,** s. unter Dorsalarterien der  
 Finger. — — nerven der Finger, s. unter Dorsalnerven. —  
 venen der Finger, s. unter Dorsalvenen der Finger. — seite  
 der Finger, s. Dorsalfläche der Finger.

**Dorsalseite der Hand,** (Dorsalis superficies manus<sup>1</sup>.) Hand-  
 rücken, Rücken<sup>2</sup>, oder Rückenfläche<sup>3</sup>, oder äußere Fläche  
 der Hand, (Dorsum manus<sup>4</sup>, Superficies externa<sup>5</sup> manus,) die  
 in ruhiger herabhängender Lage des Unterarms auswärts, oder von  
 dem Körper abwärts gefehrte concave Fläche der Hand. S. Hand.

Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. 1. B. S. 747. 2) Monro's anat.  
 Tab. 1. Abf. v. Krause, S. 398. 3) Eoder's anat. Handb. 1. B. S.  
 253. 4) 5) Schaarschmidt's anat. Tabell. Tab. XXI.

**Dorsalseite der Mittelhand- und Mittelfußknochen,** Dorsalfläche der Knochen des Metacarpus und Metatarsus. — — **Zehen,** s. Dorsalfläche der Finger und Zehen. — — **des Carpus,** s. Dorsalfläche der Knochen des Carpus. — **Speichenartrie der Finger,** s. unter Dorsalarterien der Finger.

**Dorsalsulcus des scaphoideischen Knochens,** (Dorsal sulcus<sup>1</sup>, s. superficies<sup>2</sup> ossis scaphoidei, s. navicularis minus,) Rauher Graben<sup>3</sup>, Rückenfläche und Rinne<sup>4</sup> d. fahnförmigen Beins, die auf der Dorsalfläche des scaphoideischen Knochens der Handwurzel befindliche, oder vielmehr diese Fläche ausmachende längliche Furche, welche zur Anlage von Ligamenten dient. S. unter Handknochen, scaphoideischer Knochen.

1) 2) Loder's anat. Handb. 1. B. S. 254. 3) Monro's Knochenl. üb. v. Krause, S. 401. 4) Loder's anat. Tafeln, Taf. 12, Fig. 6. Nr.

**Dorsaltibialarterien der Zehen,** s. unter Dorsalarterien Zehen. — — **venen der Zehen,** s. unter Dorsalvenen Zehen. — **ulnararterien der Finger,** s. unter Dorsalarterien der Finger. — — **nerven der Finger,** s. unter Dorsalnerven Finger. — — **venen der Finger,** s. unter Dorsalvenen der Finger.

**Dorsalvene der Zunge,** (Dorsalis vena linguae<sup>1</sup>), Zungenrückenvene, die die gleichnamige Arterie begleitende und die Lingualvene sich einmündende Vene. S. unter Jugularvenen innere Jugularvene.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2265.

**Dorsalvenen,** (Dorsales venae<sup>1</sup>), Rückenvenen, oder Blutadern, (Plexus venosi dorsales<sup>2</sup>), die die Dorsalarterien begleitenden Venen, die sich in die Intercostalvenen ergießen. Vgl. Intercoastalvenen.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2682. 2) Mayer Besch. d. Blutgef. S. 229.

**Dorsalvenen der Finger,** (Dorsales venae digitales manus), Dorsalfingervenen, Handrückenvenen der Finger. Deren gehen an jedem Finger zwei, und zwar, a) eine innere als Dorsalradialvene, (Vena dorsalis interna, s. radialis<sup>2</sup>), Speichenrückenvene<sup>3</sup>, und b) eine äußere, als Dorsalulnarvene (Vena dorsalis externa, s. ulnaris<sup>4</sup>), Elbogenrückenvene auf der Außenseite unter der Haut herauf, und ergießen ihr Blut in das Dorsalvenennetz der Hand. Vgl. Digitalvenen der Hand.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2669. 2) — Loderi tab. anat. und Deutscher Text, Taf. 129, Fig. 2. Nr. 26, u. f. w.

**Dorsalvenen der Zehen,** (Dorsales venae digitorum pedis), Dorsalzehenvenen, Fußrückenvenen, oder Rückenvenen der Zehen. Deren gehen an jeder Zehe zwei, und zwar a) eine innere<sup>3</sup>, als Dorsaltibialvene, (Vena dorsalis interna<sup>4</sup>, tibialis,) und b) eine äußere<sup>5</sup>, als Dorsalfibularvene, (Vena dorsalis externa<sup>6</sup>, s. fibularis,) auf der Außenseite unter der Haut herauf und zuletzt in das Dorsalvenennetz des Fußes über. Vgl. Digitalvenen des Fußes.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2697. 2) — 6) Loderi tab. anat. und Deutscher Text, Taf. 127, Fig. 1 u. 2 Taf. 128, 3 u. f. w.



Dorsalvenen des d. Hand, f. Venöses Geflecht der Dorsalfläche der Hand. — — — des Fußes, f. Venöses Geflecht der Dorsalfläche des Fußes. — Zehenarterien, f. Dorsalarterien der Zehen. — — — nerven, f. Dorsalnerven der Zehen. — — — Venen, f. Dorsalvenen der Zehen.

Dorso - basio - scapularis musculus, i. q. Rhomboideus musculus inferior. — costalis musculus, i. q. Serratus musculus posticus superior. — lumbo - costalis musculus, i. q. Serratus musculus posticus inferior. — — sacro - humeralis musculus, f. Breitester Rückenmuskel. — scapularis musculus, i. q. Rhomboideus musculus inferior. — subacromialis musculus, f. Cucullaris. — tracheus musculus, i. q. Splenius colli. — trachelus musculus, i. q. Biventer cervicis. — trachelo - occipitalis musculus, i. q. Complexus musculus, f. Biventer cervicis.

Dorsum, f. Rücken, auch Thorax, ingl. Rückgrath. — coxalis, f. Darmstück des Hüftknochens. — epiglottidis, f. Rücken (Epiglottis). — glandis, f. Rücken der Eichel. — manus, f. Dorsalfläche der Hand. — nasi, f. Rücken der Nase. — pedis, f. Dorsalfläche des Fußes. — scapulae, f. Rücken des Schultergürtels. — testis, f. Rücken des Hoden.

Douglas'sche Falten<sup>1</sup>, (Plicae semilunares Douglasii<sup>2</sup>) Falten des Bauchfells, (Ligamenta lateralia peritonaei<sup>3</sup>) zwei aufsteigende gerichtete Falten des Peritoneums zwischen dem Mastdarm und der Harnblase im männlichen, und zwischen jenem und dem Uterus im weiblichen Körper. S. Peritoneum.

<sup>1</sup> nach Douglas so benannt, f. dessen Schrift (of the peritonaeum, p. 38.) <sup>2</sup> Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1967. <sup>3</sup> Weitbrecht's Syndesm. p. 226.

Drängen, Drang, vgl. Trieb.

Drehher, f. Rotatoren, ingl. Epistropheus, — Muskel, f. Epistropheus des Atlas.

Drehgelenk, f. Rotation.

Dreieckiger Nerv, f. Fünfter Gehirnnerv.

Dreibändiger oder bändiger Armmuskel, f. unter Anconäen, erster Muskel. — — Schenkelmuskel, f. Adductoren des Schenkels.

Deck, f. Martishöhle. — zwischen den hintern Schenkeln des Beckens, f. Psalterium. — eckige Naht, f. Lambdasutur. — —

Verdoppelung des Gefäßes, f. Trianguläre Duplicatur des Mesenteriums. — eckiger Armausstrecker oder Armmuskel, f. Deltoideus.

3. — — Brustbeinmuskel, f. Triangulärer Muskel des Sternums.

— Kinnmuskel, f. Deprimirender Kinnmuskel. — — Knochen,

f. Triangulärer Knochen des Carpus. — — Knorpel am unteren Ende des Vorderarms, f. Interarticularknorpel des Carpus.

Dreieckiger Körper der Harnblase<sup>1</sup>, (Corpus trigonum vesicae urinariae<sup>2</sup>) der von dem Zwischenraume beider Mündungen der Urethren in die Harnblase, als dessen Basis<sup>3</sup>, nach der Öffnung der Urethra in eine Spitze<sup>4</sup> auslaufende, untere und obere immer deutlich unterscheidbare Theile der Harnblase.

<sup>1</sup> nach Kleinaud (f. dess. Zergliederungsk. Uebers. Leipz. 1782, 2. B. S. 609.)

<sup>2</sup> — <sup>3</sup> — <sup>4</sup> Ender's anat.-Tafeln, Taf. 73, Flg. 3. Nr. 5. 6.

**Dreieckiger Lippenmuskel**, s. Deprimirender Muskel des Mundwinkels. — **Muskel des Arms**, s. Deltoideus. — — — **Brustbein**, s. Triangulärer Muskel des Sternum. — — — **Kopfsplenius** des Kopfs. — — **Zwischenthorpel** des Handwurzelgelenks, s. Interarticularthorpel des Carpus. — **eckiges Band** des Fußgelenks, s. Deltoideisches Ligament des Fußgelenks. — — — **Schenkelknochens**, s. Trianguläres Ligament des Schenkelknochens. — — — **zwischen dem großen vielwinklichten und dem großen Beine**, s. Trianguläres Bolartligament des großen metacarpalären und des Kopfknochens des Carpus. — — **Bein des Carpus**, s. Triangulärer Knochen des Carpus. — — **eigener Schulterband**, s. Coraco-Acrömialligament. — — **Fenster des Tympanums**, s. Rundes Fenster des Tympanums. — — **Mäuslein des Arms**, s. Deltoideus. — **fach gekrümmte Hirnhöhlen**, s. unter Ventrikel des Gehirns, große Hirnhöhlen. — **fach Muskel des Kopfs**, s. Complexus des Nackens. — **hornichte Hirnhöhlen**, s. unter Ventrikel des Gehirns, große Hirnhöhle. — **hornichte Muskeln**, s. Dreischwänzige Muskeln. — **köpfiger Armmuskel**, s. unter Anconden, den ersten Muskel. — — **Schenkelmuskel**, oder — **köpfiges Mäuslein**, oder **Muskel des Schenkels**, s. Abductoren des Schenkels.

**Dreischwänzige Muskeln**, **Dreihornichte Muskel** (Musculi tricornes,) ungewöhnliche Bezeichnung von Muskeln mit drei Flecken, in Analogie von Zweischwänzigen Muskeln.

**Dreiseitige Anorpel** des Kehlkopfs, s. Arytanoideische Anorpel. — **spitzige, oder dreizipfelige Venenklappe** der Lungenarterienkammer, s. Tricuspidalvalvel des rechten Herzventrikels.

**Dreistigkeit**, eine Eigenschaft des Benehmens in Verhältniß gegen andere, welche aus einem nicht gewöhnlichen Grade von Selbstvertrauen und einem Gefühle von Kraft entspringt, und sich durch ein zuversichtliches, kleine Gefahren und Rücksichten nicht achtend Benehmen ausdrückt. Sie wird auch in beschränktem Sinne den Thieren beigelegt, und ist an sich nie tadelnswerth, sondern mehr eine Vollkommenheit, da sie immer ein Beweis von Muth und innerem Kraftgefühl ist; doch ist sie mehr eine männliche als eine weibliche Tugend. Bisweilen ist sie auch durch frühere Erziehung und Bildung bedingt, so wie das Gegentheil von ihr, die Blödigkeit.

**Dreistigkeit** zeigt sich auch im Menschen durch gerade Haltung des Körpers und Hauptes, einen offenen, zuversichtlichen Blick, feste Miene, laute und ausdrucksvolle Stimme, und unbefangene Aeußerung seiner Ueberzeugung. Sie befördert den Umlauf der Säfte, die Verdauung und Aussonderungen und das gesammte körperliche Wohlbefinden.

**Dreistigkeit**, welche nicht sowohl aus einem innern Kraftgefühl als vielmehr aus einer gewissen unruhigen Lebhaftigkeit, mit Leichtfertigkeit verbunden, entsteht, nennen wir **Reckheit**; verlegt sie die Regeln der Klugheit und verständiger Rücksichten, so heißt sie **Dummheit**; setzt sie sich aber selbst über die Gesetze des Anstandes und der Sittlichkeit hinweg, so artet sie in **Frechheit** aus. (Dzondi.)



**Drillinge**<sup>1</sup>, (Trigemini<sup>2</sup>), drei zu gleicher Zeit von Einer Mutter geborne Kinder. Vgl. Zwillinge.

<sup>1</sup>) Oslander's Leheb. d. Hebammenk. S. 245.      <sup>2</sup>) Haller's el. physiol. T. VII. l. 29. s. 5. S. 16.

**Dritte Lihaut**, oder **Gaut des Lics**, s. unter Chorion. — **Girnhöhle**, s. unter Ventrikel des Gehirns

**Dritter choroideischer Plexus**, s. unter Choroideische Plexus des Gehirns mittlerer Plexus. — **Finger**, s. Mittelfinger. — **Gesirginerv**, s. Bewegungsnerv des Auges.

**Dritter Halswirbel**<sup>1</sup>, (Vertebra colli tertia<sup>2</sup>, Axis<sup>3</sup>, Axon<sup>4</sup>), der erste Halswirbel von oben herab, der in Hinsicht der Form mit den übrigen übereinkommt, da hingegen die über ihn liegenden, (der Atlas und Epistropheus,) sich durch eigne Formation auszeichnen. S. Halswirbel.

<sup>1</sup>) Schmerring's Knochenl. S. 293.      <sup>2</sup>) Vesalii de h. c. fabr. l. 1. c. 15.      <sup>3</sup>) Kalmus anat. Tabellen, Tab. 5.      <sup>4</sup>) αξων. Veslingii synt. anat. c. 11.      <sup>5</sup>) Monro's Knochenl. übers. v. Krause, S. 277.

**Dritter Hirnnerv**, s. Bewegungsnerv des Auges.

**Drittes Augenlid**, s. Blinzhaut.

**Dromos**, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wortes<sup>1</sup>, i. q. **Cursus**. S. **Laufen**.

<sup>1</sup>) δρομος.

**Drosseladerfortsätze**, s. Jugularproceße. — **adern**, s. Jugularvenen. — **bein**, s. Schlüsselknochen. — **blutadern**, s. Jugularvenen. — **drüsen**, s. Jugulardrüsen.

**Druck**<sup>1</sup>, (Pressus<sup>2</sup>), ist eine Aeufferung der Schwere, welche dann hervortritt, sobald die schwere Masse an dem Bestreben, sich der Erde zu nähern, durch irgend eine Unterlage gehindert wird. Dieser Druck steht im Verhältnisse mit der Quantität der Materie des drückenden Körpers, sobald man bei demselben eine gleichförmige Dichtigkeit voraussetzt. Aus dieser Ursache läßt sich der Druck durch Gewicht ausdrücken.

Bei der physiologischen Betrachtung des thierischen Organismus kommt der Druck auf mancherlei Art in Betracht. So ist derjenige, welchen die umgebende Atmosphäre auf die Oberfläche des menschlichen Körpers ausübt, sehr bedeutend. Er verhält sich, wie das Gewicht einer Masse Quecksilber von der Höhe des jedesmaligen Barometerstandes, als welcher durch sein Gleichgewicht mit der Luft in dem Gewicht einer Säule den in Gewichten gemessenen Druck einer gleich dicken Luftsäule ausdrückt, und von einem Durchmesser, dessen Grundfläche der Oberfläche des menschlichen Körpers gleich ist. Hätte demnach die ganze Oberfläche des Körpers 14 Quadratfuß, wäre der Barometerstand = 27" Paris., das Gewicht eines Cubikfußes Quecksilber, (Bohnenberger's neue Messungen des Wassers zum Grunde gelegt,) = 982,644 Pf. mediz. Gewicht; so beträgt der Druck auf einen Quadratfuß Oberfläche 2,210,949 Pf., und auf die ganze Oberfläche 30,953,286 Pf. Jede Linie Unterschied am Barometer bewirkt im Drucke einen Unterschied von beinahe 95 Pf. Die Elasticität der im Körper eingeschlossenen Luft, welche der äußern allezeit gleich ist, und

<sup>1</sup>) Succow's Entw. d. Naturl. S. 122.      <sup>2</sup>) Winkler's instit. philos. univ. ed. 3. Pars III. S. 1295.

die stärkere Cohärenz der übrigen Theile machen diesen Druck unmerklich.

Auch die Theile des Organismus drücken gegenseitig auf einander. So findet offenbar ein hydraulischer Druck des Bluts gegen die einen Gefäßwandungen und gegen die der secernirenden und excernirenden Organe Statt. Letzterer vergrößert sich augenblicklich durch eine große Menge von schnell genossenem Getränk, indem dann (schneller als es möglich ist, das Aufgenommene aus dem Darmcanal der gesammten Blutmasse zuzuführen,) die Excretionen der Haut und des uropoëtischen Systems vermehrt werden, um die Blutmasse wieder zu derjenigen Menge zurückzuführen, welche sie rücksichtlich des Lumens ihrer Gefäße nicht überschreiten darf. Vgl. Drücken. (Ficinus.)

**Drücken**, (Pressio<sup>1</sup>, Pressura<sup>2</sup>,) die Ausübung eines Druckes oder auch der Druck selbst, nur in Thätigkeit, nicht im leidenden Zustand gedacht, ist zuvörderst als eine physische Eigenschaft eines Gegenstandes der allgemeinen Naturlehre. Jeder Naturkörper drückt vermöge seiner Schwere in der Richtung dieser, oder in perpendicularer Richtung; flüssige Körper aber, (tropfbare und gasförmige,) üben, nachdem Gesez der Flüssigkeit, auch noch einen Druck nach allen Richtungen aus, der dem durch das Schwerprincip bestimmten Druck von oben nach unten, oder auch überhaupt einem jeden nach einer bestimmten Richtung erhaltenen Druck völlig gleich ist. Jeder Naturkörper drückt ferner in dem seiner Elasticität entsprechenden Grade, wenn er diese Elasticität frei zu äußern verhindert ist, oder in dem Grade, als seine Elasticität, wie z. E. bei und unter Zutritt von Wärme, erhöht wird. (Vgl. Elasticität.) Hierher ist auch der Druck zu rechnen, den Naturkörper ausüben, wenn sie in einen andern Aggregatzustand gelangen, zu dem sie ihrer Natur nach ein größeres Volumen bedürfen, und dann ein anderer Körper sie an der Annahme dieses Volumens verhindert. So zersprengt z. E. Wasser, wenn es gefriert, durch seinen Druck eiserne oder steinerne hohle Röhren, in welche es eingeschlossen ist; so wird auch der Druck begreiflich, den im organischen Reiche zarte Wurzelsprossen bei ihrer Bildung und bei ihrem Wachsthum auf das umgebende Erdreich wirken. Feste Körper üben endlich auch, indem sie durch Schwere oder überhaupt durch eine äußere Gewalt, zwischen andere Körper eingezwängt werden, bei keilförmiger Form oder sonst nach mechanischen Gesezen, unter Mitwirkung von Hebelkräften, Seitendruck aus.

Die nächste Wirkung des Drückens ist Bewegung des dem Druck ausgesetzten Körpers, wenn dieser beweglich ist, außerdem aber dem Druck entsprechender Widerstand, der daher auch durch Zerbrechen, Zersprengen, oder überhaupt durch Aufhebung der Cohäsion des gedrückten Körpers überwunden wird, wenn der Druck, der an sich in dem Grade der Intensität fähig ist, nicht selbst eine Aufhebung der Cohäsion des drückenden Körpers bewirkt, in so fern diese geringer ist als des gedrückten Körpers ist. Von Stoß aber unterscheidet sich der Druck dadurch, daß durch letztern eine Bewegung erst angehoben wird und zwar mit einer Kraft, die dem Gewicht des drückenden Körpers

1) Winkleri inst. philos. univ. ed. 3 Pars III. §. 1137.  
hist. nat. l. 18. c. 51.

2) Plinius



spricht, durch erstern aber eine Bewegung mit einer Kraft, die das gemeinschaftliche Resultat des Gewichts des drückenden Körpers, oder einer Masse, und der eignen Bewegung desselben ist, fortgepflanzt wird. Kann aber ein gedrückter Körper dem Druck nicht ausweichen, und widersteht zugleich derselbe wegen seiner Consistenz einer Aufhebung der Cohäsion, oder auch einer Veränderung seiner Form, ganz oder doch über einen gewissen Grad, bis zu welchem er sich zusammenzudrücken läßt, hinaus; so wird der drückende Körper ein Mittel einer Fixirung, so daß er nun auch, so lange der Druck währt, einem Druck von anderswo her, oder in einer andern Richtung, in dem Maß des Drucks, stärkern Widerstand zu leisten vermag.

Nach denselben Naturgesetzen, die dem Drücken oder dem Druck (Gründe liegen, ist auch das Ziehen oder der Zug zu würdigen. (vgl. diese Artikel.)

Der Druck eines lebenden thierischen Körpers ist nun theils ein solcher, den er wegen seiner Masse und der mechanischen Verbindung seiner Theile nach übt, so z. E. der Druck des stehenden oder liegenden Körpers gegen den Boden, auf dem er steht oder liegt; oder er wird geflüßentlich zu willkürlichen Handlungen, durch die Kraft der Muskeln bewirkt, die dann das natürliche Gewicht der Körper und Körpertheile zu diesem Zweck mit benutzen. Hiernach bekommt das Drücken, als eine von den Lebenskräften ausgehende Verrichtung, nächst der physischen auch eine physiologische Würdigung.

Ein solches Drücken ist nun ein dreifaches:

1) ein Drücken mit Benutzung der ganzen Körpermasse, oder der Masse einzelner Theile zur Bewegung, zur Aufhebung der Cohäsion, Zerbrechen, Zerquetschen u. s. w.) oder zur Befestigung, oder Festhaltung anderer Körper. Für einen solchen Druck läßt sich, so lange einfach ist, mehr nicht als das Gewicht des einzelnen Körpers, dessen Schwerpunkt so viel als möglich dann auf den dem Druck ausgeübten Körper gerichtet wird, anwenden; doch erhält die Kraft einen Zuwachs, indem der Druck durch angemessene Körperbewegung theilweise zur Stosskraft wird. So zerbricht z. E. eine leichte Eisdecke, die uns noch trägt, so lange wir ruhig darauf stehen, wenn wir versuchen, uns auf selbiger zum Sprung zu heben. Bedeutend erhöht wird aber ein solcher Druck, wenn wir uns zwischen dem Körper, auf den der Druck abgesehen ist, und einem entgegenstehenden, Widerstand leistenden, mit gekrümmtem Körper einfügen, und nun zwischen beiden die Streckmuskeln des Körpers wirken lassen, oder durch An- und Einstimmen, (vgl. diese Artikel,) wie bei allen Körperbewegungen, mittelst welcher wir große Lasten, auch ohne Benutzung der mechanischen Hülfsmittel, welche der menschliche Verstand zur Erhöhung seiner natürlichen Bewegungskräfte erfunden hat, zu bewegen, oder gleich großen Widerstand durch Druck zu überwinden im Stande sind.

2) Ein Drücken mit einzelnen Theilen des Körpers durch Annäherung dieser an einander, mittelst einfacher Muskelcontraction. Hierbei können wir alle Theile benutzen, deren Bau eine Annäherung zu einander durch Muskelthätigkeit zuläßt. Das Beißen ist hiernach ebenfalls nur ein Drücken, mittelst des an die obere Kinnlücke an-

gezognen Unterkiefers, wo dann die Zähne, als diejenigen Körperteile, die am wenigsten einem beim Druck erfahren Widerstand nachgeben, das fassende Organ sind. Unter den übrigen Theilen sind aber besonders die obern Extremitäten, und namentlich die Hände mit den Fingern, vorzüglich zum Druck, absonderlich bei Greifen zum Festhalten eines Gegenstandes geeignet.

3) Ein Drücken auf die innerhalb des Körpers eingeschlossenen Theile, für unterschiedliche Lebenszwecke. Hierzu wirken insbesondere die constrictorischen Muskeln. Genau genommen, ist jede Muskelzusammenziehung eine constrictorische, in Hinsicht der innerhalb der Muskelsubstanz selbst und in seiner Nähe liegenden Theile, da jeder Muskel, wenn er sich verkürzt und aufschwillt, auf die Theile, mit denen er in unmittelbarem Contact steht, nach innen und nach außen drücken muß. Besonders kommen hier aber diejenigen muskulösen Apparate in Betracht, wodurch eine innere Höhle mit den darin befindlichen Theilen umschlossen wird. So ist also das Forttreiben des Bluts aus den sich zusammenziehenden Herzhöhlen, ingleichen aus den Arterienstämmen und Nerven eine Folge des Drucks unter Constriction des Herzens und der Arterien. So erfolgt das Ausathmen, indem dabei thätigen Muskeln auf den Thorax und dadurch zugleich auf die Lunge drücken. (S. Respiration.) Die Austreibung des Stuhls aus dem unter den Geburtswehen sich zusammenziehenden Uterus ist ebenfalls einzig die Folge des unter der Constriction desselben folgenden Drucks. (S. Geburt.) Besonders der Willkür unterworfen ist aber das Drücken mittelst Anwendung des constrictorischen Apparats des Unterleibs bei der Darm- und Urinansammlung. (S. diese Artikel.)

Drücker der Vorsteherdrüse, Drückmuskel der Samen-  
drüse, s. Compressor der Prostata.

Drüsen<sup>1)</sup>, Glandeln<sup>2)</sup>, Drüsklein<sup>3)</sup>, (Glandulae<sup>4)</sup>, Emunctoria, Glandes<sup>5)</sup>, Carnes glandulosae, s. in se convolutae<sup>6)</sup>, Tonsillae, Adenes<sup>7)</sup>.) Die Anatomen bezeichnen von den ältern Zeiten her mit diesen Namen Gebilde, die rücksichtlich ihrer Structur und ihrer Bestimmung so verschieden sind, daß es unmöglich ist, Theile, die man nur entfernter oder näherer Aehnlichkeit wegen unter einem Namen zusammengefaßt hat, eine Definition aufzustellen, die weder zu eng noch zu weit genannt werden kann. Daher trägt der Vorwurf eines dieser Fehler alle sogenannten Definitionen der Bedeutung Drüse von Hippokrates an bis auf die neuesten Zeiten an sich und muß sie treffen, so lange die Anatomen nicht da übereingekommen sind, welchen Gebilden, die in Hinsicht ihrer Structur und ihrer Function einander sehr ähnlich sind, der Name Drüse bleiben soll, welche man unter andern Benennungen

1) 2) Schaaerschmidt's atlas Tabell. Tab. 1. 3) obsolet. Umbro  
Parat Mundarznel liberl. v. Uffenbach, Frankf. a. M. 1691, S. 1.  
4) Celsi de med. l. 4. c. 1. 5) Vesalii de h. c. fabr. l. 6. c. 1.  
6) Laurentii hist. an. l. 5. c. 3. 7) Galen def. med. v. 2.  
Vol. Stephani dict. med. 1564, p. 195. 8) S. Haase de glandularum definitione diss. Lip. 1811, 4 und Leonhardi hist. anatomiae glandulosa specimen primum, Viteberg 1813, 4. (Vgl. auch Literatur zum Schluß des Artikels.)



man men fassen will. Bis dahin müssen wir uns damit begnügen, einige allgemeine Eigenschaften, welche allen Gebilden, die man Drüsen nennt, zukommen, herauszuheben, und diejenigen in einige Unterabtheilungen zusammenzustellen, welche die meiste Aehnlichkeit mit einander haben.

Drüsen sind kleine Körper von verschiedener Form, rundlich, länglich, platt, wie zusammengeedrückt; viele kleine Nester von Capillaren aller Art schlingen sich in ihnen in mannigfachen Windungen unter einander herum; dichteres Zellgewebe verbindet diesen Haufen der Gefäße und auch Nervenästchen mit einander; es umgibt sie in Form eines häutigen Ueberzugs, und gestaltet sie entweder kugelförmig, cylindrisch oder conisch. Die Farbe der meisten ist weißlich oder weißröthlich. Sie liegen zerstreut in verschiedenen Theilen des Körpers, nicht nur in Höhlen eingeschlossen, wie die Leber, Milz, die Nieren, mit denen sie in Hinsicht ihres Baues und ihrer Bestimmung die meiste Aehnlichkeit haben.

Die mannigfachen Gebilde, welche man Drüsen nennt, und welche eben angegebenen allgemeinen Eigenschaften übereinkommen, kann man in folgende Abtheilungen bringen:

1) Drüsen mit vorherrschender Blutgefäßbildung. Die kleinen Blutgefäßästchen sind auf die beschriebene Art unter einander gewunden, wenige Saugadern im Verhältnisse zu den Blutgefäßen und kleine Nervenästchen zeigen sich in den Geweben. Einige sind Absonderungsorgane und haben deutliche Ausführungsgänge; von andern ist die Bestimmung und ein Aussonderungsapparat noch nicht deutlich bewiesen. Ihre Form ist sehr verschieden, man findet sie in verschiedenen Gebilden von einfachem und auch von zusammengesetztem, verwickeltem Gewebe; daher theilt man sie wieder in folgende Arten ein:

a) Einfache Drüsen, (*Glandulae simplices*.) Die Nester (Capillargefäße sind durch Zellgewebe so vereinigt, daß sie kleine, kugelförmige oder längliche Körper darstellen, aus denen die abgesonderten Stoffe durch Venen oder feine Gefäßmündungen hervortreten und sogleich ergießen, oder zum Theil in der Höhle oder in dem Sack, welches das Zellgewebe gebildet hat, anhäufen; die kleinen Ausführungsgänge vereinigen sich nicht baumförmig in Nester und Stämme, sondern so daß dadurch die einzelnen kleinen Körper zu einem größern Ganzen vereinigt werden, wie dieses bei der andern Art der Drüsen (zusammengehäuften,) der Fall ist, sondern ein jeder ergießt die abgesonderte Flüssigkeit sogleich selbst.

Nach der Form und Bestimmung erhalten sie verschiedene Namen: Körner, (*Acini*), kleine, rundliche Klümpchen, den Hirnkernen ähnlich; Höhlen, Gruben, (*Cryptae*), wenn die abgesonderten Gefäße so vereinigt sind, daß zwischen ihnen eine kleine Grube entsteht, in welche sich der abgesonderte Stoff ergießt; Säcke, (*Folliculi*), die Gefäßchen liegen um eine sackförmige Vertiefung herum, welche die abgesonderte Flüssigkeit aufnimmt; Schmierhöhlen, (*Cryptae sebaceae*), wenn ein fettiger Stoff durch sie abgesondert wird, (wie auf der Oberfläche der Haut;) Schleimhöhlen, (*Folliculi mucipari*), wenn die Drüsen Schleim absondern, wie Absonderungen in den Schleimhäuten.

**Zusammengesetzte Drüsen**, (*Glandulae e simplicibus compositae, conglutinatae, s. congregatae Lössii*,) sind dann nicht anders, als mehrere einfache Drüsen durch Zellgewebe mit einander strang- oder kegelförmig vereinigt, doch so, daß sie den oben gegebenen Charakter rücksichtlich der einzelnen Ausführungsgänge halten; als Beispiele können die Mandeln, die Stränge der Meismischen Drüsen dienen.

b) **Zusammengehäufte Drüsen**, (*Glandulae conglomeratae*;) mehrere einzelne körnerartige Drüsengebilde, (*Acini*,) durch dichteres Zellgewebe zu größern, ovalen oder rundlichen, plattdrückten Körnern, oder Lappchen (*Lobuli*,) verbunden, die dichter Zellgewebe wie eine Haut umgibt, und lockeres Zellgewebe mit den benachbarten vereinigt; die kleinen Ausführungsgänge (*Ductus excretorii*,) die aus jedem Körnchen hervorgehen, vereinigen sich zu Nestschen zu einem oder einigen Stämmen, wodurch die einzelnen Theile zu einem Ganzen verbunden werden, so daß nur aus den Ausführungstämmen, nicht aus jedem einzelnen Körnchen der ausgesonderte Stoff sich zu seiner Bestimmung ergießt.

In den Lappchen winden sich, eben so wie in den einfachen Drüsen, die Capillargefäße, Ausführungscanäle, Saugadern und Nervenäste auf die mannigfachste Weise unter einander, ohne daß man eine Höhle oder eine besondere Substanz zwischen innenliegend entdecken kann. Die Speicheldrüsen, das Pancreas gehören hierher.

Zu dieser Art der Drüsen wird man auch die Organe, welche man Drüsen genannt hat; die Schilddrüse, (*Glandulae thyreoidea*,) Thymus und die Nebennieren, (*Gl. suprarenales*,) so lange als sie selbstständig rechnen müssen, bis man ihre Bestimmung und ihre Function mit Zuverlässigkeit kennen gelernt hat.

2) **Saugaderdrüsen, oder Lymphdrüsen**, (*Gl. lymphaticae conglobatae*, in dem Gefroße, s. *Gl. mesentericae*,) Drüsen mit vorherrschender Saugaderbildung. Viele Saugadern, und im Verhältnisse zu diesen nur wenige Blutgefäße und Nerven sind durch dichtes Zellgewebe mit einander verbunden, von ihm als mit einer eignen Haut umgeben, über welche sich lockere Zellgewebe ausbreitet, wodurch die Drüsen mit den benachbarten Theilen vereinigt werden. Es machen diese Gebilde mit den Arterien der Saugadern ein Ganzes aus; kleiner sind die Nestschen, welche hineingehen, und größer die, welche herausgehen.

Der Nutzen der Drüsen ist verschieden, nach den verschiedenen derselben; im allgemeinen bezieht er sich auf eine Mischungsänderung des Blutes durch Ausscheidung eines Stoffes, oder vielleicht auch nur bei einigen durch einen innern thierisch-chemischen Proceß. Die einfachen Drüsen sind meistens dazu bestimmt, einen schleimigen oder fettigen, talgartigen Stoff abzusondern, die zusammengesetzten, um speichelartige Flüssigkeiten auszuscheiden; die Saugaderdrüsen befördern die Verähhlichung der Säfte, welche die Saugadern der Blutmasse zuführen.

Bei der Verschiedenartigkeit der innern Natur der als Drüsen bezeichneten Organe kann auch die umfassende wissenschaftliche Darstellung derselben nicht als ein eigner in sich begründeter Theil



anatomie oder der Physiologie Gültigkeit behaupten, wie dergleichen  
 mal in ältern anatomischen Lehrbüchern als Adenologie versucht  
 worden ist. (Vgl. dieß Wort.) Auch kann von einem eigentlichen  
 Drüsen-system, in dem Sinne, wie ein Blutgefäßsystem, ein Ner-  
 ven-system, ein Muskelsystem u. s. w. unterschieden wird, nur in so  
 fern die Rede seyn, als man nur eine der oben angedeuteten einzel-  
 nen Arten von Drüsen in's Auge faßt

Folgendes ist eine kurze Uebersicht der vorzüglichsten als Drüsen  
 bezeichneten einzelnen Körpertheile, ihrer Lage nach.

1) Drüsen des Kopfs: a) innerhalb der Schädelhöhle: als Pacchionische Drüsen unterschiedenen drüsenartigen Ge-  
 webe der harten Hirnhaut; die Zirbeldrüse und die Schleim-  
 drüse, (Gl. pituitaria,) auf dem Türkensattel, (welche beide aber  
 nach dem äußern Ansehen als ihrem innern Bau nach mit den an  
 andern Stellen des Körpers als Drüsen unterschiedenen Theilen über-  
 kommen;) b) außerhalb der Schädelhöhle: die Meibo-  
 mianischen Drüsen, welche den zur Schlüpfriemachung der Augen-  
 netz dienenden schleimig-öhligen Stoff absondern; die ebenfalls hier-  
 zu rechnende Lacrymalcarunkel, im innern Augenwinkel;  
 die zur Classe der conglomerirten gehörige große und kleine Thrä-  
 nendrüse im äußern Augenwinkel; die zur Absonderung des Ohren-  
 schmalzes dienenden einfachen Drüsen des äußern Gehörgan-  
 ges, (Gl. ceruminosae auris externae;) die Schleimhöhlen  
 der Nasenhaut, der Nase, (Gl. mucosae membranae pituita-  
 riae;) die Speicheldrüsen der Mundhöhle aus der Classe der  
 conglomerirten Drüsen, namentlich die Parotis, die Submaxil-  
 lardrüse und Sublingualdrüse auf jeder Seite, an welche  
 die unterschiedlich bezeichneten kleinern Drüsen der Mund-  
 höhle, (Gl. buccales, labiales, molares, linguales, palatinae,  
 sublinguales,) wie auch die Tonsillen anschließen.

2) Drüsen des Halses: die thyreoideische Drüse, aus  
 der Classe der conglomerirten Drüsen, aber ohne einen deutlichen und  
 gemeinschaftlichen Ausführungsgang; die Lymphdrüsen an den  
 Halsgefäßen, (Gl. jugulares profundae et superficiales;) am  
 Hals und am Hinterhaupt, (Gl. cervicales et occipitales;) die  
 Schleim absondernden Drüsen oder vielmehr Höhlen des Luft-  
 röhrenkopfs und des Schlundes, (Gl. laryngeae et pha-  
 ryngeae.)

3) Drüsen des Oberleibs: a) in der Brusthöhle, die  
 Drüsen der Luftröhre und der Speiseröhre, (Gl. bron-  
/>
 chiales et oesophageae,) theils Schleimdrüsen, theils lymphatische;  
 die Thymus, eine conglomerirte Drüse ohne Ausführungsgang;  
 b) nach außen: die Brustdrüsen, (Gl. mammarum,) an  
 beiden Geschlechtern, ebenfalls aus der Classe der conglomerirten.

4) Drüsen des Unterleibs, und zwar in der Abdominal-  
 höhle: das Pankreas, von der Natur der Speicheldrüsen, die so-  
 genannten Brunnerischen und Peyerischen Drüsen ober  
 der Schleimhöhlen des Darmcanals, (Gl. intestinales;) die zu dem System  
 des Chylus führenden Gefäße gehörigen Gekrösdrüsen, (Gl. mesen-  
 tericae;) die Schleimdrüsen der Gallenblase, (Gl. cysticae;)

die als Nebennieren, (Gl. subrenales,) bekannten drüsigen Körper, aus der Classe der conglomerirten Drüsen, aber ohne Ausfüh-  
rungsgang.

5) Drüsen der Zeugungstheile: a) des männlichen Geschlechts: die Prostata, in deren innerem Bau sich doch nicht wie in den conglomerirten Drüsen, mit denen sie sonst vieles übereinstimmende hat, Körner unterscheiden lassen; die Cowperische Drüsen der Harnröhre aus der Classe der conglomerirten, und übrigen Schleimdrüsen der Harnröhre, (Gl. mucosae urethrae) die Talgdrüsen an dem Rand der Eichel, (Gl. odorifer glandis penis;) b) der weiblichen Geschlechtstheile: Schleimhöhlen der weiblichen Urethra, des Uterus und der Vagina, (Gl. mucosae urethrae, cervicis uteri et vaginae;) die Talgdrüsen der Schamlippen, (Gl. odorifer labiorum, nympharum, clitoridis.)

6) Drüsen der Extremitäten: die Achseldrüsen, (Gl. axillares,) an den obern, und die Weichen-Drüsen, (Gl. inguinales,) an den untern Extremitäten, beide aus der Classe der lymphatischen Drüsen.

7) Drüsen der Gelenke: die in dem mit Capselligament umzogenen Gelenkhöhlen befindlichen, zur Absonderung der Synovialflüssigkeit wesentlich beitragenden Gelenkdrüsen, meist aus der Classe der conglomerirten, (Gl. articulares, s. Haversianae.)

8) Drüsen der Haut: die über die ganze Hautoberfläche verbreiteten Talgdrüsen, oder einfachen zur Absonderung einer fettigen Materie bestimmten Höhlen, (Gl. sebaceae glandis.) (Zusatz d. H.)

#### Noch hierher gehörige Schriften:

Hippocratis de glandulis (*περὶ αδενων*) I. (In Hippocr. operib.)

Th. Wharton adenographia, s. glandularum totius corp. descriptio, Lond. 1656, 8. (Vesal. 1675, 12, rec. in Clerici et Mangeti bibl. anat.)

Nic. Stenonis de musculis et glandulis observationum specimen, H. 1664, 4. (Amstel. 1664, 12, Lugd. B. 1683, 12.)

Jer. Lossii de glandulis in genere diss. Viteb. 1683, 4. (rec. in Halleri diss. an. T. II. N. 29.)

Guil. Mylii de glandulis diss. Lugd. B. 1683, 4. (rec. in Halleri anat. T. II. N. 30.)

Ant. Nuck adenographia curiosa et uteri foemin. anatome nova, L. Bat. 1691, 8. (1696, 1727, 8., rec. in Clerici et Mangeti bibl. an.)

J. Phil. Eyselii de glandularum natura et usu, Erf. 1694, 4.

Jo. Chr. Wolfii epistola altera de glandulis, Hafn. (Lips.) 1699, 4.

Laur. Terranei de glandulis in universum et in specie de novis urethram virilem, Taurin. 1709, 8. (Lugd. B. 1721, 8.)

Jo. Paul. Pauli de abstrusissima glandular. structura et differentia Lips. 1709, 4.

Laur. Heisteri diss. de vera glandulae appellatione, Altd. 1718, 4.

Jo. Jac. Grambesii diss. de glandulis, quae praeter necessitatem in h. statuuntur, Altd. 1719, 4.

Herm. Boerhave et. Fra Ruyschii epistolae II de fabrica glandularum in corpore hum., Lugd. B. 1722, 4.

Chr. Gottl. Ludwig de glandularum differentia, Lips. 1740, 4.

Aug. Lud. de Hugo de glandulis in genere et speciatim de thymo, Ling. 1746, 4.

Recherches anatomiques sur la position des glandes et leur action, Théod. de Borden, à Par. 1751, 8. (an 8. 8.)



Schaaersmidt's adenol. Tabellen, Berl. 1751, 8. (und in den neuern. gegen der anat. Tabellen.)

A. Riese diss. inaug. de glandulis, Giessae 1787, 4.  
und Gerh. E. Pflug diss. inaug. de glandulis corp. h. Duisb. 1787, 4.

Drüsen des choroideischen Plexus, (Glandulae plexus choroidei<sup>1)</sup>) wurden von ältern Anatomen<sup>2</sup> als den Blutgefäßen, welche gedachten Gehirnthelle in den Seitenhöhlen des Gehirns constituirten, zugeordnete, rundliche, den Drüsenkörnern ähnliche Körperchen unterzogen, sind aber, wo sie vorkommen, krankhafte Erzeugnisse und derselben Natur, wie die ebenfalls in denselben Theilen unterschiednen Hydatiten oder Wasserbläschen<sup>3</sup>. Vgl. Gehirn.

Schaaersmidt's adenol. Tab. II. Tab. 2. 2) Insbesondere von Barol (de nerv. opt. ep.) Meussens (nevrog. l. 1. c. 6.) Santorin (obs. anat. c. 3. §. 9.) Winslow (exp. anat. T. IV. §. 89) Vgl. auch Haase cerebri nervorumque an. §. 34. 3) Vgl. Halleri el. physiol. T. IV. Pl. 10. s. 1. §. 21.

Drüsenchen<sup>1</sup>, Drüstein, Diminutiv von Drüsen.

Haller's Grundr. d. Physiol. d. M. umgearb. von v. Leveiling, 2. B. §. 253.

Drüsenarterie der Achselhöhle, s. Arterterie. — artige Substanz, s. Drüsensubstanz. — behälter, s. Hohldrüsen. — Bläschen, oder bläslein, s. Hohldrüse. — Blutader der Achselhöhlen, s. Arterve. — capsel, s. unter Drüsenhaut. — fleisch, s. Drüsensubstanz.

Drüsengeschlechter<sup>1</sup>, (Genera glandularum<sup>2</sup>.) Deren werden von Maner<sup>3</sup> folgende vier unterschieden: einfache, conglutinirte, oder zusammengehäufte, conglomerirte, oder zusammengesetzte, und ohne Ausführungsgang, conglobirte, oder abgerundete. s. einzelnen Artikel, auch Drüsen.

Maner's Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 77. 2) Halleri el. physiol. T. II. l. 7. s. 2. §. 2. 3) a. a. O. S. 75.

Drüsenhafte Substanz, s. Drüsensubstanz. — — der Nieren, s. Corticalsubstanz der Nieren. — harter Körper, s. Drüsensubstanz. — — der Brust, s. Brustdrüse. — hartes Weiches, s. Drüsensubstanz. — — des Gehirns, s. Corticalsubstanz des Gehirns.

Drüsenhaut<sup>1</sup>, (Tunica, s. Membrana<sup>2</sup>. s. Velamentum<sup>3</sup> glandulae,) wird auch wohl das eine Drüse umgebende Zellgewebe genannt, und wieder als eine allgemeine und als eine eigene, (Tunica communis et propria,) unterschieden. Erstere wird auch wohl als Drüsen capsell, (Capsula glandulae<sup>4</sup>.) unterschieden. S. Drüsen.

Maner's Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 78. 2) 3) Halleri el. physiol. T. II. l. 7. s. 2. §. 6 et 7. 4) Halleri el. etc. l. c. §. 2.

Drüsenhörner an der Schilddrüse, s. Loben der thyreoidischen Drüse.

Drüsenkörner<sup>1</sup>, oder Körnchen<sup>2</sup>, oder Lappen<sup>3</sup>, Rundtheilchen<sup>4</sup>, oder Fächer<sup>5</sup> der Drüsen, (Acini<sup>6</sup>, Lobuli subrotundi<sup>8</sup> glandularum,) die scheinbar körnigen, nicht einfachen, sondern aus noch kleinern ähnlichen Theilen zusammengesetzten, in den conglomerirten Drüsen und den Organen ähnlichem Bau unterscheidbaren organischen Gebilde. S. Drüsen.

4) Haller's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v. Leveiling, 1. Th. S. 44, 245, 246. 5) Maner's Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 78.

6) Vgl. dieß Wort. 7) 8) Halleri pr. lineae physiol. §. 193, 199.

anat. physiol. Realiv. II. B.

**Drüsenlehre**, s. Adenologie. — **puls- oder schlagader** s. Ahselhöhle, s. Arterterie.

**Drüsensubstanz**, Drüsenartige Substanz, Drüsich oder Drüsenhafte Substanz, Drüsenfleisch, Drüsenherd, oder Drüsichter<sup>2</sup> Körper, Drüsenhaftes Wesen. (S. *stantia glandosa*, s. *glandulosa*, s. *adenoides*<sup>3</sup>, *Corpus glandosum*<sup>4</sup>, s. *glandulosum*<sup>5</sup>, s. *adenoides*, *Caro glandulosa* eine innere Textur weicher Gebilde des Körpers, die, wenn auch nur im äußern Ansehen, eine Ähnlichkeit mit Drüsen hat, oder wohl größtentheils aus kleinen Drüsen gebildet wird. S. Drüsen.

1) Meyer's Beschr. d. menschl. K. 4. B. S. 155.

Anat. überf. v. Huth, 2. Th. S. 118.

2) Palfyn's

fabr. l. 5. c. 13 et l. v. expl. fig. 10 et c. 5.

3) — 5) Vesalii de

**Drüsensubstanz der Nieren**, s. Corticalsubstanz der Nieren.

**Drüsenystem**, (*Systema glandularum*,) die Drüsen in ihrer organischen Verbindung als ein Ganzes betrachtet, welche Betrachtungsweise aber nur in Hinsicht auf einzelne Classen der Drüsen hat. S. Drüsen.

**Drüsichte Grübchen oder Säckchen**, s. Hohldrüsen. — **Stanz**, s. Drüsensubstanz.

**Drüsichter Körper**, s. Drüsensubstanz.

**Drüslein**, s. Drüschchen.

**Duales dentes**, die beiden mittelsten Schneidezähne. S. Schneidezähne.

**Dualismus**<sup>1</sup>, (*Dualismus*<sup>2</sup>,) ein in den neuern philosophischen Schulen gebildetes Wort, um diejenige Natur- und Weltansicht zu bezeichnen, nach der man alle Erscheinungen, und überhaupt alles Seyn und Wirken, auf zwei sich einander entgegenstehende Principe zurückzubringen sich bemüht.

Von jeher ist es dem menschlichen Geiste nicht entgangen, daß die Welt dem Menschen in seiner Vorstellung, und im innern Bessers seyn, in allem, worin sich nur ein Etwas, mit Einschluß des menschlichen Geistes selbst, verkündigt, von einer Doppelseite sich veroffenbart. Nichts in der Welt und in unserm Vorstellungsvermögen ist ohne seinen Gegensatz. In Auffuchung und Unterscheidung desselben besteht das Hauptgeschäft des Verstandes, wenn er in einem ihm selbst gegebenen Mannigfaltigen die Verworrenheit, die das Viel dem Verhältniß seiner Menge darbietet, zur Klarheit bringen, durch Abscheidung und Ordnung in Haufen und fortgesetzte Zusammenstellung dieser in immer kleinere, nach Principen der Entstehung der Bestimmung sich deutliche Einsicht verschaffen will. In diesem Geschäft leitet den Verstand zunächst das Zahlenverhältniß, das, als inneres Gegebenes, zugleich die Versicherung absoluter Nothwendigkeit mit sich führt. In diesem aber ist die Zwei (die *Dyas*,) das Erste und Oberste, aus dem einzig alle numerischen Verhältnisse fließen. Denn die Eins, oder die *Monas*, ist das ewig Unveränderliche, das durch Potenzirung oder Depotenzirung weder wächst noch vermindert wird, und wenn es zur Zwei werden soll, noch eine Eins über sich postulirt und nun erst zu einer Zahl wird, oder bei der

1) Reill's Entw. e. allgem. Pathol. 1. Th. S. 13.

2) Ulrich ins

et metaph. p. 345.



g oder Zerfällung auch eine Zweiheit in den Hälften als erstes Verhältniß gibt, in welches selbst es erst nach Constituirung des einen als Copula zur Triplität u. s. w. eingeht.

Der philosophische Sinn aber strebt, seinem Wesen nach, nach Aufhebung der Gegensätze, oder nach Einem Urprincip alles Seyns und Sprechens, geräth aber hier mit sich selbst in Widerspruch, wenn er findet, daß durch Aufhebung der Gegensätze das Object, auf welches er jenes Princip anzuwenden sucht, in der Vorstellung selbst schwindet; und ob es gleich eine Hauptaufgabe der philosophischen Schulen aller Zeit gewesen ist, diesen Widerstreit zu besiegen, so ist es zur Zeit noch nicht gelungen, eine allgemeine Naturansicht aufzustellen, die in der Dauer die Forscher befriedigt hätte. Es muß daher auch der Zukunft überlassen bleiben, ob das sogenannte Identitätssystem, das selbst als Gegensatz des Dualismus von den Naturphilosophen der neuesten Zeit aufgestellt worden ist, den Widerstreit völlig aufheben werde.

Die höchsten Gegensätze in dem Erscheinungsleben sind: 1) für Einsicht oder die Intellectuellität, unter den Formen des Raums, der Zeit, Materie und Kraft; Körper und Geist; 2) für die Lebenserregung oder den moralischen Sinn, Gut und Böse; Tugend und Laster; 3) für die sinnliche Affection, Schön und Häßlich, Lust und Schmerz. Die erstern Gegensätze haben für uns ein gleiches gelegtes Interesse; es ist Bedingung unsers Seyns in der uns zutheilenden Organisation, daß wir auch entfernt nicht daran denken, von ihnen in der Erscheinung selbst vernichten zu wollen, wenn wir solches auch vermöchten. Hingegen bei den zwei übrigen Gegensätzen schlagen wir uns, unserer eignen Natur zu Folge, auf die Seite der erstern von beiden, so daß wir alles, was in unsern Kräften steht, daran setzen, den Gegensatz desselben aufzuheben, und dieser erhält nur in dem Kampfe, den wir in dem Leben unaufhörlich mit der Außenwelt führen, wo sich das Böse und der Schmerz uns in steter erneuerter Gestalt mit Gewalt aufdringt und nicht selten überwältigt.

Dieser in der menschlichen Vorstellung und der menschlichen Natur überhaupt durchaus nicht zu vernichtende Dualismus in den angegebenen dreifachen Richtungen hat von jeher in allen Religionslehren ein großes Problem zu lösen dargeboten, und sich auf zweifache Weise mit ihnen in Opposition gestellt: 1) in der Unbegreiflichkeit des Gottes, der entweder eine Ewigkeit müßig und ohne Kraftausübung blieb, ehe er in der Zeiten Erfüllung aus eihem selbstständigen Vermögen die Welt schuf, oder wenn seine Schöpfungskraft in der Ewigkeit her nothwendig an Welten sich thätig erwies, in der Welt dann eine äußere Bedingung seines eignen Seyns hatte, also auch selbst mit der Welt einen Dualismus bildete; 2) in der nothwendigen mindern Unvereinbarkeit des Bösen und des Häßlichen, oder des Uebels überhaupt, mit dem göttlichen Wesen, das jene doch nothwendig ausschließt. Indem also in mehreren Religionen des Alterthums, namentlich in denen der Perser, ein doppeltes Princip der Weltentstehung und Weltbeherrschung aufgestellt wurde, wie solches die Aegyptier als Osiris und Typhon, die Perser als Ormuzd und Ahriman u. s. w. verehrten und scheuten, überschreitet der

menschliche Geist die ihm gezogenen Schranken, innerhalb welcher Gesetze seines Denkens Universalität haben, um auch in übersinnlichen Regionen mit seinem, nur für das Endliche ihm verliehenen Maßstab das Unendliche zu ermessen. Eben diese Unbegreiflichkeit des Wesens der göttlichen Natur sichert dem Monothismus im Gegensatz des Dtheismus, oder der Dualität des göttlichen Wesens, in dem religiösen Glauben, der tiefere Wurzeln in dem menschlichen Geiste schlägt, als sein intellectuelles Vermögen reicht, sein unverrückbaren Ankergrund, und entzieht sich selbst dadurch der philosophischen Würdigung.

Für diese ist also erst die Welt, als ein Anseß oder ein Antheil der Gottheit, nur im Dualismus erkennbar gegeben.

Da die Aufgabe der Naturwissenschaft darin gestellt erachtet werden muß, zu bestimmen, was ist, nicht, was geschehen soll, oder was wohl und weh thut, erfreut oder schmerzt; so ist es auch zunahe der Gegensatz von Materie und Kraft, Körper und Geist, Reales und Idealem, was aller Naturforschung zum Anknüpfungspunct dienen muß.

Vergebens haben die Weltweisen früherer und späterer Zeit ihre Scharfsinn erschöpft, um das wahre Seyn oder das Wesen der Dinge auf eines von beiden jener Principe, auf Materialismus oder auf Idealismus, zurückzuführen, und so den Geist und alles, was sich als Kraft oder dynamisch äußert, als eine Eigenschaft der sich nur allein vorhandenen Materie, oder gegenseitig alles Körperlichen einen Raum Erfüllende als die Manifestation einer an sich nur als Daseyn getretenen Kraft darzustellen. Die Eigenheiten, aber auch die Beschränktheiten beider Ansichten zu zeigen, wenn jede für sich allein aufgestellt wird, muß eignen Artikeln vorbehalten bleiben. Man kann nur so viel davon berührt werden, daß die Widersprüche, welche sich dem Forscher aufdrängen, wenn er eine oder die andere jener Ansichten einzeln verfolgt, zwar verschwinden, wenn wir annehmen, beide Principe, ein urkörperlicher Stoff zur Raumerfüllung und ein urthätiges Bewegungsprincip unter Bedingungen der Zeit und in der Zeit, durch inneres und äußeres Leben sich nach den Gesetzen der Causalität und Finalität, oder nach Ursachen und Zwecken, offenbarend, zufolge der göttlichen Schöpfungskraft wirklich vorhanden sind, aber gleichwohl das Bindemittel beider durch Verschiedenheit der Formen in sich geschlossener Welten uns nicht offen gelegt ist, und wir mit allem unsern Forschen weiter nicht zu kommen vermögen, als Einsicht der nothwendigen Synthesis des Seyns von Körper und Geist, der materiellen und ideellen Welt, mit andern Worten anzuerkennen, daß Körperliches und Geistiges überall einander gegenseitig ursächlich bedingen, indem jedes dem andern von einer Seite untergeordnet, von der andern überlegen ist. Die Identität beider kann zwar in transscendentellen Sinne ausgesprochen werden, aber unsere Vorstellung vermag nicht, dadurch die Zwiefachheit des Seyns zu lösen, die sie selbst nur unter Bedingung dieser Zwiefachheit die Möglichkeit ihres Seyns begründet sieht, indem zur Erkenntniß von irgend etwas der menschliche Geist ihm als Object sich selbst als Subject gegenüberstellen muß, ja sich selbst nicht einmal zu denken vermag, ohne gleichsam zu zerpalten und sich selbst zum Object zu machen, um



noch seine Subjectivität zu verläugnen, und also auch dann noch dem Dualismus sich befangen sieht, den er im Erscheinungsleben nur als die einzige Manifestation des menschlichen Organismus und diesen des ganzen Weltenorganismus durchaus nicht überspringen kann. (H.)

**Dualisten** <sup>1</sup>, (*Dualistae*,) eine Terminologie der ältern philosophischen Schulen, womit sie im Gegensatz der Monisten, (*Monistae*,) diejenigen bezeichneten, die in der Seele ein von dem Körper verschiedenes Wesen anerkennen. Sie unterschieden weiter in ihnen Occasionalisten, Harmonisten und Influxionisten. Vgl. die Artikel. S. auch Seele.

<sup>1</sup>) Heusermann's Physiol. 3. Th. S. 63.      <sup>2</sup>) Winkleri inst. phil. univ. ed. 3. §. 258.

**Dubia articulatio**, i. q. Amphiarthrosis. — *barba*, f. Adhaare.

**Ductores urinae**, f. Uretheren.

**Ductus**, f. Canal, auch Gänge. — *adiposi*, f. Fettgänge.

— *Malpighii*, f. Malpighische Fettgänge. — *aquosi*, f.

Amphgefäße. — *Nuckii*, f. Nuckische Aquäducte. — *Aran-*

*ii*, f. Venöser Ductus. — *arterioso-lymphatici*, f. Seröse

Arterien. — *arteriosus Botalli*, f. Botallischer Gang. —

*Bartholinianus*, f. Bartholinischer Gang. — *Bellini*, s. Bel-

*liniani*, f. Bellini's Gänge. — *Blasianus*, i. q. D. Stenonia-

*ii*. — *biliarii*, f. Biliargänge. — *Botalli*, f. Botallischer

Gang. — *carotitalis*, f. Carotischer Canal. — *choledochus*,

*choledochus communis*, f. Choledochischer Gang. — *choleferi*,

Biliargänge. — *cholidochus*, s. *chologogus*, i. q. D. cho-

*leochus*. — *chyli*, s. *chylifer*, f. Thoracischer Gang. — *chy-*

*feri*, f. Chylusführende Gefäße. — *chyliferus*, f. Thoracischer

Gang. — *chylodochus*, i. q. D. *choledochus*. — *chylosi*,

i. q. D. *chyliferi*. — *communis biliaris*, i. q. D. *choledo-*

*chus*. — *Coschwitzi salivalis*, f. Coschwitzen's Gang.

*cysthepatici*, s. *cystico-hepatici*, f. Cystico-hepatische Gän-

ge. — *cysticus*, f. Cystischer Gang. — *deferens*, f. Deferiren-

Gang des Hoden. — *Duvernayanus*, f. Bartholinischer Gang.

*effereutes testis*, f. Graafische Samenröhrchen. — *ejaculans*

*urarii*, f. unter Excretionsgänge des Ovariums. — *ejaculatorius*

*urmaris*, f. Ausführungsgänge des Samens. — *epididymidis*,

Canal der Epididymis. — *Eustachii*, f. Eustachische Röhr-

*excretorii*, f. Ausführende Gänge. — *glandulae lacry-*

*malis*, f. unter Thränendrüse. — *excretorius seminis*, s. *sper-*

*matis*, f. Ausführungsgänge des Samens. — *galactoferi*, f.

Milchgänge. — *glandulae lacrymalis*, f. Lacrymalcanäle. —

*glandularum Meibomii*, f. unter Meibomische Drüsen,

Drüsen derselben. — *Glissonii*, f. Cystico-hepatische Gän-

ge. — *hepatico-cystici*, s. *hepati-cystici*, f. Cystico-hepati-

che Gänge. — *hepaticus*, f. Hepatischer Gang. — *hygroble-*

*pharici*, s. *hygrophthalmici*, i. q. D. *glandularum Meibomii*.

*hepato-vesiculares*, f. Cystico-hepatische Gänge. — *incisivi*,

Naso-palatinsche Canäle. — *instrumenti olfactorii*, f. Canal

des Geruchnerven. — *lacrymales*, s. *lacrymales laterales*, s. *crymalcanäle*. — *lacrymalis*, s. Membranöser Lacrymalcanal. — *lactiferi*, s. Milchgänge. — *longitudinalis nasalis*, i. q. *lacrymalis*. — *Meibomii*, i. q. D. glandularum Meibomii. — *membranacei rennm*, s. Bellini's Gänge. — *nasalis*, s. Membranöser Lacrymalcanal. — *nervus instrumenti factus*, s. Canal des Geruchnerven. — *nervosus testiculi* Hühnerscher Körper. — *pancreaticus*, s. Wirsungischer Gang. — *accessorius*, s. ebendaselbst. — *Pecqueti*, s. *Pecquetianus*, s. Thoracischer Gang. — *petrosus*, s. Carotischer Gang. — *renales*, s. Bellini's Gänge. — *Rivini*, s. *Rivinianus*, Rivinische Gänge. — *roriferus*, i. q. D. *thoracicus*. — *sapiales*, s. Speichalgänge. — *salivaris Coschwitzianus*, s. *Coschwitzii*, s. Coschwitzens Gang. — *excretorius*, Stenonischer Gang. — *inferior*, s. Whartonscher Gang. — *superior*, s. Stenonischer Gang. — *salivares*, s. *salivarii*, s. Speichalgänge. — *secretorii*, s. Secretionsgänge. — *semicirculares membranacei Scarpa e*, s. Scarpeische semicirculäre Gänge. — *semen deferens*, s. *seminalis*, s. Deferirender Gang des Hodens. — *seminiferi testis*, s. Samenröhrchen. — *spirales cochleae* Scalen der Schnecke. — *Stenonianus*, s. Stenonischer Gang. — *thoracicus*, s. Thoracischer Gang. — *minor*, *posterior*, *sternalis*, *vertebralis*, s. ebendas. — *umbilicalis*, s. Nabelstrang. — *urinarii*, i. q. D. *uriniferi*. S. auch Uretheren. — *urinarius*, s. Urethra. — *uriniferi*, s. Bellini's Gänge. — *ricosi uteri*, s. Fallopische Trompeten. — *venosus*, s. Venen-Ductus. — *Vidianus*, s. Pterigoideische Canäle. — *Virgicianus*, s. Wirsungischer Gang. — *Walttheriani*, i. q. D. *Whartoni*. — *Whartonianus*, s. Whartonscher Gang. — *Wirsungianus*, s. Wirsungischer Gang.

**Dünnel**, Eigendünnel, Einbildung, eine fehlerhafte Eigenschaft der Gefinnung und des Betragens, welche in einer Unterschätzung seiner selbst und der erworbenen Vorzüge besteht, und immer ein Zeichen eines beschränkten Verstandes ist. Denn je mehr der Verstand den großen Umfang der menschlichen Kenntnisse sieht; desto lebhafter fühlt er die Beschränktheit seines Antheils. Dünnel brüstet sich nämlich hauptsächlich mit erworbenen, von Natur erhaltenen Vorzügen und Vollkommenheiten, Kenntnissen, Fertigkeiten, Geschicklichkeiten, und wirkt mehr nach außen.

Eigendünnel scheint nicht sowohl dadurch von Dünnel unterschieden zu seyn, daß er sich gewisse Vorzüge ausschließlich eigene, als vielmehr dadurch, daß er in gewissen Fällen das eigene Ich besonders hervorzuheben und geltend zu machen sucht. Ein Mensch, der im allgemeinen viel Dünnel hat, wird z. B. in Verhandlungen mit andern durch Geltendmachen seiner Meinungen Eigendünnel zeigen. Es ist ein Mensch voll Dünnel, der in dem Falle viel Eigendünnel zeigt.

Einbildung ist von Dünnel nicht bloß und allein dadurch unterschieden, daß sie mehr auf Naturgaben, als erworbenen



Volkommenheiten sich bezieht, sondern auch und hauptsächlich dadurch, daß sie wähnt, Vorzüge und Vollkommenheiten zu besitzen, welche sie nicht besitzt. Der Dünkel hingegen legt auf Vorzüge, die wirklich besitzt, einen zu hohen Werth. Dünkel setzt immer den Sitz gewisser Vollkommenheiten voraus, Einbildung aber nicht immer. Man sagt z. B., sie bildet sich ein, schön, wichtig, geistreich zu seyn, obgleich sie von allen das Gegentheil ist.

Beide sind zwar gewöhnlich Zeichen eines beschränkten Verstandes; können aber auch zum Theil in der frühern Erziehung und Bildung ihren Grund haben, der Dünkel kann selbst Nationalfehler seyn.

Beide sprechen sich auch im Aeußern kenntlich aus. Diese, die sich bilden, durch eine selbstgefällige, jener, der Dünkel, durch eine überblasene Miene; diese durch einen zurück-, jener durch einen etwas herabgezogenen Mundwinkel; diese durch ein zufriedenes Lächeln und Zurückblicken auf sich selbst, jene durch beifallsuchendes Umhertreten, hinaufgezogene Augenbraunen und Achtung gebietende Miene; diese ist mehr in sich gekehrt, jener nach außen strebend; diese mehr passiv, jene mehr activ, daher auch der Gesundheit mehr zuträglich als schädlich. (Diondi.)

**Dünnbärtiger Mensch**, (*Homo malebarbis*, s. *malibarbis* <sup>1)</sup>), Mensch mit schwachem Bartwuchs. S. Bart.

<sup>1)</sup> vet gloss. σπικροπικρυν.

**Dünndarm**, **Dünne Därme** <sup>1)</sup>, oder **Gedärme** <sup>2)</sup>, **Dünner Darm** <sup>3)</sup>, **Enger Darm**, **Enge Därme** <sup>4)</sup>, **Gewundener** <sup>5)</sup>, **Krummer Darm**, **Hüftdarm** <sup>6)</sup>. (*Intestinum tenue* <sup>7)</sup>, *gracile* <sup>10)</sup>, *Intestina tenuia* <sup>11)</sup>, *Lactes* <sup>12)</sup>), der Theil des Darmcanals vom Pylorus des Magens an, bis zu der Valvula des Blinddarms, von seinem auffallendsten Unterscheidungscharakter, dem minderen Volumen, im Gegensatz des Dickdarms so bezeichnet, und wieder in drei Abtheilungen, als *Duodenum*, als *Jejunum* und als *Ileon*, unterschieden. Vgl. diese Artikel. S. Darmcanal.

<sup>1)</sup> Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 2018. <sup>2)</sup> Mayer's Vösch. d. menschl. St. 4. B. S. 593. <sup>3)</sup> 4) Sommering's Eingeweidel. S. 186. <sup>5)</sup> Haller's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v. Pöschl, 2. Th. S. 770. <sup>6)</sup> — 8) Sommering's Eingeweidel. a a D. <sup>9)</sup> Riolani anthropogr. l. 2. c. 15. <sup>10)</sup> Vesalii de h. c. fabr. l. 5. c. 5. <sup>11)</sup> Riolani anthropogr. l. c. <sup>12)</sup> Plinii hist. mundi l. 11. c. 37.

**Dünne Haut**, s. Amnion. — **Gedärme**, s. Dünndarm. **Haare**, s. unter Haupthaare.

**Dünner Darm**, s. Dünndarm. — **Elbogenmuskel**, s. unter Armarmuskeln, den langen Muskel. — **Muskel des Schienbeins** oder **Schenkelmuskel**, s. *Gracilis*.

**Dünnung**, s. Hypochondrische, ingl. Iliacische Regionen.

**Düsterheit**, s. Ernst.

**Dulcedo**, s. Süßigkeit. — *amoris*, i. q. Clitoris.

**Dulcitas**, **Dulcitus**, **Dulcor**, s. Süßigkeit.

**Duldsamkeit**, vgl. Geduld.

**Dummdreistigkeit**, vgl. Dreistigkeit.

**Dummheit, Beschränktheit, Einfalt, Einfältigkeit, Albernheit, Blödsinn,** (*Stupiditas*<sup>1</sup>, *Imbecillitas*<sup>2</sup>, s. *Imbetudo*<sup>3</sup> *animi*, *Stoliditas*<sup>4</sup>.) Dummheit — von dem alten Deutschen *thumb*, *stumpf* — ist Stumpfheit, Schwäche des Verstandes. Ihre Natur besteht theils in einem hohen Grade von Schwäche der Fassungskraft, theils in einem Mangel an Beurtheilungsvermögen. Ein Dummer begreift nicht allein schwer, d. h. er ist nicht fähig, ohne viele Anstrengung klare Vorstellungen und Begriffe zu bilden, sondern er ist auch nicht im Stande, die Verhältnisse derselben richtig zu beurtheilen. Er kann daher bei den besten Grundsätzen und dem besten Willen die größten Ungerechtigkeiten und Uebelthaten sich zu Schulden kommen lassen, ob sie ihm gleich nicht zugerechnet werden können. Dummheit ist nicht etwas positives, sondern etwas negatives, Mangel, Abwesenheit des Verstandes im allgemeinen, und kann verschiedene Grade und Abstufungen haben. Wenn sie in einem hohen Grade und großer Allgemeinheit da ist, so erhält sie den Namen Blödsinn und hat alsdann selbst auf den Sinn oder das Wahrnehmungsvermögen den nachtheiligsten Einfluß. Der Blödsinnige scheint daher auch zugleich an Schwäche, Stumpfheit der Sinneswerkzeuge zu leiden, ich sage, er scheint, denn wenn er auch an sich die schärfste Sinne hat; so wird doch die Stumpfheit seines Verstandes die Sache seyn, daß er durch die Sinne lauter schiefe und unrichtige Vorstellungen erhält, und aus ihnen falsche Begriffe bildet. Denn es ist bekannt, daß der Sinn nur das Werkzeug des Wahrnehmungsvermögens ist, welcher ohne Selbstthätigkeit des Vorstellungsvermögens und des Verstandes überhaupt gar keine Vorstellungen geben kann. Indes kann bisweilen selbst ein Blödsinniger einzelne Anlagen einem vorzüglichen Grade haben, z. B. manche Arten des Gedächtnisses, z. B. für Personen, Töne, Zahlen. Bisweilen findet auch mit Einer, in einem hohen Grade ausgebildeten Anlage Geistes ein gewisser Blödsinn in allen übrigen. Man kann also Blödsinn in den allgemeinen und partiellen unterscheiden.

Beschränktheit ist ein niederer Grad von Verstandesschwäche und drückt insonderheit eine gewisse Einseitigkeit des Verstandes aus. Ein beschränkter Verstand urtheilt vielleicht in einer einzelnen Hinsicht nicht unrichtig, allein er übersieht die übrigen Seiten des Gegenstandes, und dadurch wird sein Urtheil schief.

Einfalt und Einfältigkeit ist ein höherer Grad von Beschränktheit, und wird einem Menschen beigelegt, dessen Verstand immer Eins zu fassen vermag, und für alle Mannigfaltigkeit keinen Sinn hat. Er nimmt daher die Sache auf Treu und Glauben an, wie man sie ihm darstellt, und läßt es sich gar nicht einfallen, sich sie auch anders verhalten könne. Einfalt schließt zugleich einen Mangel an Gewandtheit, eine gewisse Unbehülfslichkeit und Schurfälligkeit des Verstandes ein.

Albernheit endlich ist mehr eine Eigenschaft des Betragens, als des Verstandes, und bezeichnet ein Benehmen, das der Klugheit und den allgemeinen Umgangsgesetzen widerspricht. Albernheit ist h

1) Cicero phil. 1. 2. c. 32.

2) Plinii panecad. c. 79.

3) Macrobius somn. Scip. 1. 1. c. 14.

4) Gellii noct. att. 1. 17. c. 4.



nde Einfalt, oder eine Handlungsart, wie sie von einem Einfältigen erwartet wird. Denn oft ist der, welcher etwas albernes sagt oder thut, nichts weniger als einfältig und albern, ja er kann sehr klug seyn und viel Verstand haben; allein Verlegenheit, Ueberdrehung, Affect u. dgl. waren Ursache, daß er jetzt etwas albernes sich oder Schulden kommen ließ.

Alle diese Schattirungen der Geisteschwäche sprechen sich auch im äußern aus. Der niedrigste Grad, die Beschränktheit, zeigt sich schon in dem nichts sagenden, bedeutungslosen Blicke — denn das Auge ist der Spiegel des Geistes, — in einer Schwerfälligkeit des gesamten Mienspiels. Die Einfalt charakterisirt ein höherer Grad dieser Bedeutungslosigkeit und eine gewisse starre Ruhe des Ausdrucks. Die Dummheit blickt aus jedem Zuge des Gesichts hervor; die Augen blicken stier und lange vor sich hin in die Luft, bewegen sich langsam von einer Seite zur andern, der Mund ist gewöhnlich etwas geöffnet, um den Sinn des Gehörs zu unterstützen, der Kopf etwas nach vorn oder auf die Seite, mit dem einem Ohr empor gewendet, um besser mit demselben zu vernehmen. Die Haltung des Körpers und der Arme ist steif, der Gang schwerfällig und unbehülflich, jede Bewegung linksch und tölpisch. Die Miene ist gewöhnlich starr und nichts sagend. Die Albernheit im Gegentheil hat mehr Beweglichkeit in ihren Zügen; nicht Ernst, sondern ein fades Lächeln schwebt um ihren Mund, welcher sich zwar auch öffnet, aber nicht nach oben gezogenen Mundwinkeln. Die Augen sind stier, weit geöffnet und bedeutungslos freundlich. Der Blödsinn endlich vertritt mehr oder weniger alle hier aufgezählten Kennzeichen, verbunden mit einem hohen Grad von Schlassheit und träger Ruhe. (Dzondi.)

**Duncansche Höhle**, (*Duncani cavea*<sup>1</sup>.) Mittlere unbenannte Höhle<sup>2</sup>, oder Höhle der Scheidewand der Hirnhöhlen<sup>3</sup>, Höhle der durchsichtigen Scheidewand<sup>4</sup>, Fünfhirnhöhle<sup>5</sup>, (*Hiatus corporis callosi*<sup>6</sup>, *Cavea anonyma*<sup>7</sup>, *Medium imaginabile intervallum*<sup>8</sup>, s. *Ventriculus septi pelliculi*.) ein im natürlichen Zustande kaum bemerkbarer, aber doch nicht bloß eingebildeter, sondern mit lymphatischer Feuchtigkeit erfüllter Zwischenraum zwischen beiden, die Scheidewand der großen Ventrikel des Gehirns bildenden markigen Platten, die mit den übrigen Hirnhöhlen aber ganz außer Gemeinschaft ist. S. Gehirn.

<sup>1</sup>) nach Dan. Duncan (expl. nouv. des actions animales, Paris. 1678. Vgl. Deidier anat. p. 250. <sup>2</sup>) <sup>3</sup>) Haller's Grundr. d. Physiol. umg.-arb. von v. Leveiling, 2. Th. S. 595 und Note <sup>4</sup>) Moher's Besch. d. menschl. K. 6. B. S. 134. <sup>5</sup>) nach Sömmerring (Hirn- und Nervenl. S. 59.) <sup>6</sup>) nach Fr. Sylvius. S. Th. Bartholini anat. l. 3. c. 6. <sup>7</sup>) Halleri prim. lin. physiol. S. 346. <sup>8</sup>) Halleri elem. physiol. T. IV. l. 10. s. 1. S. 17. <sup>9</sup>) nach Wrisberg (Halleri prim. lin. phys. auct., a Wrisberg. Not. 97)

**Dunkelblaue Farbe**, s. unter Blaue Farbe. — **braune Augen**, s. unter Farben der Iris. — **braune Haare**, s. unter Haupthaare. — **farbige Haare**, s. ebendas. — **gelbe Augen**, s. unter Farben der Iris.

**Dunkelheit**, (*Obscuritas*<sup>1</sup>.) der Uebergang des Lichts in die

<sup>1</sup>) Ciceron. de divinat. l. 2. c. 64.

Finsterniß, oder die letztere im Beginnen oder noch unausgebildetem Zustand, auch im bildlichen Sinne. Vgl. Finsterniß.

Dunkelrothe Augen, s. unter Farben der Iris.

Dunst, s. Dampf. Vgl. auch Animalischer Dunst. — Freie s. Atmosphäre.

*Duodena arteria*, vgl. Gastroduodenalarterie. — *vena*, Gastroduodenalvene.

*Duodenalarterien*, (*Duodenales arteriae*<sup>1</sup>.) Zwölfffingerdarmarterien<sup>2</sup>, puls- oder schlagadern, die als besondere Arterien unterschiedenen Aeste, a) der Gastroduodenalarterie als obere (*superiores*<sup>3</sup>, s. *posteriores*<sup>4</sup>), b) der Pancreatico-Duodenalarterie als mittlere und untere, (*mediae*<sup>5</sup> et *inferiores*<sup>6</sup>), bezeichnet, die sich auch mit Zweigen der obern mesenterischen Arterie verbinden. S. Cöliacische Arterie.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 2036. 2) Edm. Ring's Gefäß. S. 167. 3) Hildebrandt's Lehrb. u. s. w. 4. B. 2560. 4) — 6) Maner's Beschr. d. Blutgef. S. 127 u. 128.

*Duodenale ostium ventriculi*, s. Pylorus.

*Duodenales arteriae*, s. Duodenalarterien. — *nervi*, s. Duodenalnerven. — *venae*, s. Duodenalvenen.

*Duodenalis arteria*, s. Gastroduodenalarterie. — *Winkelovii*, s. Pancreatico-Duodenalarterie. — *extremitas pancreatis*, s. Kopf des Pancreas. — *vena*, s. Gastroduodenalvene.

*Duodenalnerven*, (*Duodenales nervi*<sup>1</sup>.) Zwölfffingerdarnerven, die Nerven des Duodenum, welche meist aus dem Pancreatico-Duodenalgeflecht ihren Ursprung nehmen. S. unter Darmcanal, den Zwölfffingerdarm.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 2036.

*Duodenalvenen*, (*Duodenales venae*<sup>1</sup>.) Zwölfffingerdarmvenen oder = blutadern<sup>2</sup>, die vom Duodenum aus theils die Gastroduodenalvene, theils in die obere mesenterische Vene sich gießenden Venen. S. Pfortader.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 2036. 2) Pientanus Zergliederungsk. Uebers. Leipz. 1782, 2. B. S. 780, Note.

*Duodenum*<sup>1</sup>, (*Duodenum*<sup>2</sup>.) Zwölfffingerdarm, Zwölfffingerstück des Darmcanals, Anfangstück des dünnen Darms<sup>3</sup>, Gallendarm<sup>4</sup>, (*Appendix*, s. *Ecphysis*<sup>5</sup>, s. *Processus*<sup>7</sup> *ventriculi*. *Exortus*<sup>8</sup> *intestinatorum*, *Pylorus*<sup>9</sup>, *Hostiarius*, *Ostiarius*, *Janitor*<sup>11</sup>, *Portanarius*<sup>12</sup>, *Dodekadactylon*<sup>13</sup>, *Intestinum biliarium*<sup>14</sup>.) der eigentlich den Uebergang von dem Magen zu den dünnen Gedärmen oder dem Dünndarm bildende Theil des Darmcanals, gewöhnlich als der erste der dünnen Därme bezeichnet.

1) 2) Den Namen erhielt es in Uebereinstimmung mit dem Griechischen *δωδεκαδάκτυλον*, von seiner Länge, die man der Breite von zwölf Fingern gleichschätzte. S. Vesalii de h. c. fabr. l. c. 5. 3) scilicet anat. Tab. 20. 4) Edm. Ring's Eingeweidk. S. 191. 5) nach Hildebrandt (Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 2032.) 6) — 8) Vesalii de h. c. fabr. l. 1. 2. 9) — 12) in Uebertreibung der Venennamen des fern Magenmundes auf diesen Theil. S. Columbi de re anat. l. 1. c. nach Vorgang von Rufus (de appell. part. corp. h.) S. Stephani de med. 1564, p. 512. 13) Vgl. dieß Wort, s. auch Note 1. 14) Hildebrandt's Lehrb. u. s. w. c. c. D.



trachtet, aber mit dem Magen zugleich noch über dem Mesenterium & Quercolon, das in der Abdominalhöhle eine Art von Scheide derselben bildet, gelegen, indem er mit seinem Ende dasselbe durchdringt, um in das Jejunum überzugehen. Seine nächste Bestimmung ist, daß dem von dem Magen aus in ihn gelangten Speisebreie in ihn sich ergießende Galle nebst dem pancreatischen Saft beigemischt werde. S. Darmcanal.

*Duplata choroidea*, i. q. Uvea.

**Duplicatur**, (*Duplicatura*, *Duplicatio*<sup>1</sup>.) Verdoppelung, (*Diplasiasmus*<sup>2</sup>, *Diplosis*<sup>3</sup>.) wird besonders von Häuten oder Membranen gebraucht, die aus zwei zusammenhängenden Platten bestehen, deren eine sich über die andere wagschlägt, oder diese verdoppelt. Vgl. Membranen.

1) Senecae quaest. nat. 8. 2) 3) S. diese Worte.

*Duplicatura mesenterii triangularis*, s. Trianguläre Duplicatur des Mesenteriums. — *peritoneae*, s. unter Peritonäum.

*Duplicaturae cutis*, s. Duplicaturen der Haut. — *pulmonum*, s. Pulmonalligamente.

**Duplicaturen der Haut**, (*Duplicaturae cutis*<sup>1</sup>.) Falten<sup>2</sup>, oder Verdoppelungen<sup>3</sup> der Haut, (*Plicae cutis*<sup>4</sup>.) die Ueberhang, welche die äußere Haut an denjenigen Stellen bildet, wo Öffnungen am äußern Körper in das Innere sich finden, und wo sie dann in ihrer Fortsetzung zu einer innern Haut wird. S. Integumente des Körpers.

1) — 4) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 2. B. S. 1389.

**Duplicität**, (*Duplicitas*<sup>1</sup>.) Zwiefältigkeit, in eigentlichem Sinne das Doppelseyn gleicher Dinge, oder das Zerfallen einer Einheit, in zwei sich einander gleiche, oder doch in den wesentlichen Charakteren, und ihrer Form wie ihrer Bestimmung nach, in einander übereinstimmende Theile, die aber doch wieder in ihrer Verbindung erst ein organisches Ganzes ausmachen.

Es ist Eigenheit der thierischen Natur, diejenigen Organe, in denen sich vornehmlich und zunächst der thierische Charakter ausdrückt, doppelt zu besitzen, und wenn auch im vegetabilischen Reiche sich nicht selten in symmetrischen Gebilden einzeln Duplicität findet; so ist es doch nur mehr eine äußere Aehnlichkeit, oder es deutet sich dadurch, wie in den Generationsorganen der Pflanzen, zum Theil der Uebertragung der vegetabilischen Natur zur animalischen auch hierdurch an.

Schon die äußere Körperform ist bei den Thieren, und zwar in dem Maße, in welchem sie auf einer höhern Stufe der Animalität stehen, als die rechte und linke symmetrisch und übereinstimmend gebildete Körperhälfte unterscheidbar. Zunächst sind es aber alle Sinnesorgane, die Organe der willkürlichen Bewegung und die Generationstheile, welche zweifach in dem Körper ausgebildet sind, und zwar so, daß eine mittlere, vom obersten Theil des Kopfs an durch den Rumpf hindurch abwärts gehende, ideelle Linie, die man als Medianlinie, (*Linea mediana*.) bezeichnet, sie rechts und links von einander absondert, wo dann die Verschiedenheit sämmtlicher wirklich getrennter, und also offenbar doppelter Organe, oder wenn solche nur

1) Lactantii de opif. Dei l. c. 8:

„Aurium duplicitas.“

einfach vorhanden sind, der dann rechts und links jener Linie liegenden Hälften hauptsächlich von der respectiven Lage der Theile gegen die gedachte Medianlinie abhängt, so daß man z. E. auch an einem abgelösten Fuße, an der Stellung der Zehen und überhaupt an der ganzen Bildung des Fußes, so wie aber auch an jedem andern von dem Körper getrennten Theile gar leicht erkennt, welche Seite er zugehörte. Die übrigen bemerkbaren Eigenheiten einer oder des andern dieser Doppeltheile sind dann entweder eine notwendige Folge der organischen Verbindung derselben mit Organen aus der vegetabilischen Sphäre des thierischen Organismus, die einem Gesetze der Duplicität und auch zugleich der Symmetrie nicht unterworfen sind, oder bestehen in kleinen Abweichungen, die theils von dem mindern oder mehreren Gebrauch der Organe herrühren, oder wirkliche Abnormitäten der Bildung sind, oder im Zusammenhang mit dem auch in sie eingehenden vegetativen Bildungsproceß stehen, z. E. in der Vertheilung der kleinern Blutgefäße, und für die Asymmetrie indifferent sind.

In dem Kopf ist es also zuvörderst das Gehirn, als das Centralorgan der Sinnesthätigkeit, was in allen seinen Theilen die strenge Duplicität zeigt, so daß alle Gehirnthteile entweder eben so wie aus dem Gehirn tretenden Nerven, zweifach vorhanden sind, oder genau in der Mitte der Schädelhöhle gelegen, aus einer rechten und einer linken einander völlig gleichen Hälften bestehen. Diese Duplicität setzt sich auch in dem in den Rückenwirbelcanal tretenden Gehirnthteil, oder dem Rückenmark fort, das, obgleich ein unpaarter Theil, doch auf beiden Seiten symmetrisch gebildet ist, und seine Nerven auf eine und dieselbe Weise rechts und links abgibt. Die wenigen Abweichungen, welche in der Gehirnformation nicht dem Gesetze der Symmetrie streng entsprechen, haben meist auf das Blutsystem und besonders auf den Rückfluß des Bluts aus dem Gehirn Bezug.

Entsprechend dem Gehirn ist auch der Hirnschädel, theils die gepaarte einander der Hauptbildung nach völlig entsprechende Knochen, theils durch in der Mitte gelegene ungepaarte, rechts und links völlig symmetrisch gebildet, woran sich dann die übrigen Gesichtsknochen auf gleiche Weise anreihen. Insbesondere entspricht die Organisation beider Augen und beider Ohren, mit Einschluß aller ihnen gehörigen organischen Theile, einander vollkommen. Eben so ist die linke Nasenhöhle und der ganze Apparat der sie constituirenden Theile der rechten, der Hauptanlage nach, gleich gebildet, gleich, da die Nase, als Excretionsorgan, der vegetativen Lebenssphäre näher gestellt ist, im Innern sich schon bedeutendere Abweichungen von symmetrischer Bildung zeigen. Auch die Mundhöhle mit den sie bildenden Organen steht unter dem gleichem Gesetze der Symmetrie, so wie auch die Zäähne und der ganze Kauapparat und Schlucken nöthige organische Apparat, da das Leben selbst, obgleich Vorbereitung zu dem vegetabilischen Proceß der Verdauung, noch der Willkür unterworfen ist.

In dem Halse deutet sich die Duplicität in allen ihr vereinigten Organen, namentlich dem Rachen und seinen Bewegun-



Muskeln, dem Schlund und besonders auch der Luftröhre mit dem Luftröhrenkopf, dem Organe der Stimme an, dessen letztere genau symmetrisch gebildete Theile vorzüglich auch auf die Reinheit des Tons, namentlich beim Gesang Bezug haben.

In dem Thorax und dem Abdomen setzt sich die Duplicität insbesondere in den äußern, die Form beider Körperhöhlen bestimmenden Theilen fort, zunächst in den Rückenwirbeln, den Rückenmuskeln, in dem Rippenbau, in dem die Wölbung der Brust nach vorn vollendenden Sternum, und den hier aufsitzen, besonders den weiblichen Körper auszeichnenden Brustdrüsen, in den Abdominalmuskeln u. s. w. und wird namentlich in dem Becken noch ganz rein, indem auch die äußern und innern Geschlechtsteile, zu denen schon die Nieren mit den übrigen zur Urinabsonderung und Aussonderung gehörigen Organen den Uebergang bilden, sich der symmetrischen Bildung der Beckenknochen anfügen.

Endlich zeigen die obern wie die untern Extremitäten, ganz animalischen Naturbedürfnissen dienend; in allen ihren Theilen die vollkommenste Uebereinstimmung der einen und der andern Seite, daß es völlig ausreicht, eine kennen zu lernen, um auch von dem Bau und der Einrichtung der andern sich zu unterrichten; kleine Veränderungen in der Vertheilung der Gefäße und dergleichen abgemessen, welche jenes Gesetz nicht stören, wie bereits oben angedeutet wurde.

Aber die innern Organe des Körpers, welche insbesondere der Kampf in sich verschließt, die der Boden und der Träger des animalischen Lebens sind, weichen von diesem Gesetz ihrer respectiven Anordnung nach mehr oder weniger ab. Zuerst der Darmcanal, dem der thierische Körper, gleichsam mit nach innen gerichteten Wurzeln, seine Hauptnahrung zieht. Die noch in der Mitte in die Brusthöhle eintretende Speiseröhre biegt sich in derselben nach der linken Seite zu, um, von der Mittellinie bedeutend abweichend, das Diaphragma links zu durchbohren und in den Magen überzugehen. Eben so nimmt erst das Endstück des Darmcanals, der Mastdarm, bei seinem Austritt aus der Abdominalhöhle die Körpermitte in dem After. Die Leber mit der Gallenblase nimmt zum größern Theil die rechte Seite der Abdominalhöhle nach oben ein. Ihr als linker Theil unterschiedener Theil weicht bedeutend in seiner Form von dem rechten ab. Die Milz bildet auf der linken Seite zwar einen Gefäßsack der Leber, aber in höchst abweichender Form, und in so ganz verschiedener Structur. Eben so wenig liegt das Pankreas, noch sonst eines der innerhalb des Peritonäums liegenden Verdauungsorgane in der Mitte, oder zeigt eine symmetrische Bildung. Die großen Blutstämme bilden in der Abdominalhöhle die antagonistische oder polarische als symmetrische Gegensätze, indem die Abdominalaorta, nachdem sie das Diaphragma ebenfalls links durchdrungen hat, auch den Lendenwirbeln zur linken Seite herab-, die untere Hohlader aber, ihnen rechts gelegen, zur rechten Halbhälfte des Diaphragma's heraufsteigt. Die empor sich drängende Leber bewirkt nicht nur in der Wölbung des Diaphragma's selbst eine Ungleichheit, sondern es hat das bedeutende Volumen, das sie

ihrer Bestimmung zu Folge in der Abdominalhöhle in Anspruch nimmt, auch eine etwas tiefere Lage der rechten Niere zur Folge, obgleich beide Nieren, wenn nicht immer in Hinsicht ihrer Größe, doch ihrer Form nach dem Gesetz der Duplicität wieder unterworfen sind. Die Colicae die obere und untere mesenterische Arterie, welche bestimmt sind, den Verdauungsorganen Blut zuzuführen, entspringen zwar, unpaarige Theile, gewöhnlich aus der vordern Seite der Aorta in Mitte; ihre Ramificationen sind aber eben so wenig dem Gesetz der Duplicität unterworfen, als jene Organe selbst. Die übrigen Verzweigungen der Abdominalaorta werden in ihrem fortgehenden Verlauf erst dann symmetrisch, wenn sie die symmetrisch sich einander entgegengesetzten Organe erreicht haben. Noch weniger sind die Abdominalvenen, die das System der Pfortader bilden, dem Gesetz der Duplicität unterworfen, oder können solches bei der genauen organischen Verbindung seyn, die dieses System mit der Leber hat. Nerven des Unterleibs, ihrem Ursprung nach symmetrisch, verlieren ebenfalls den Charakter der Duplicität, indem sie zu den Ganglien und Nervengeflechten zusammentreten, die das Centralgebilde für das Abdominalnervenleben darstellen, und noch mehr, wenn sie sich in die Verdauungsorgane selbst verzweigen. Auch der Saugaderstamm nähert sich bloß etwas, so wie die Abdominalaorta, die er begleitet, der Körpermitte, und nimmt links an der Rückenwirbelsäule seinen Verlauf. Von einer Duplicität der Zwölfgewand und Kiste, aus denen er sich bildet, kann gar keine Rede seyn.

In der Thoraxhöhle ist auch selbst das Herz, als das Centralorgan, wodurch zunächst die Verbindung des vegetabilischen und animalischen Lebens bewirkt wird, zumal bei Menschen, nicht in der Mitte gelegen, und auch bei Thieren, wo es nach der mittlern Region zu liegt, hat es keinen nächsten Bezug auf den symmetrischen Körperbau, wie er sich in den übrigen angeedeuteten Organen ausdrückt. Seine rechte und linke Hälfte in Bezug auf seine Scheidewand entsprechen nicht der Bildung gepaarter Theile. Sie sind sich nicht nothwendig, und rein rechts und links gegen einander geordnet, sondern haben eine schräge Richtung; auch ist die Bestimmung einer jeden Herzhälfte eine verschiedene, selbst ihrem inneren Bau nach ist die eine der andern nur analog. Die Gefäße treten in ungleicher Zahl und Form aus dem Herzen hervor und in dasselbe zurück. Diese Gefäße selbst, (die Aorta und die Pulmonalarterie, die Hohladern und die Pulmonalvenen,) stehen nicht in polarischem Verhältniß mit einander. Auch weicht der Lauf der Richtung einer jeden dieser vier Gefäßarten von den übrigen bedeutend ab. Die Lunge hat den nächsten Bezug zu dem Herzen und steht mit ihm in so nahem organischen Verhältniß, als die Leber mit dem Darmcanal. Sie bildet sich, der symmetrisch gebauten Thoraxhöhle entsprechend, zwar auch in eine rechte und linke Abtheilung, die mit einander wohl ihrer Structur und Bestimmung nach, übereinstimmt, Form nach aber bloß oberwärts übereinkommen, wo die Luftröhre in sie eintritt, und ihr selbst zum Theil ihren symmetrischen Charakter verleiht. Die großen Blutgefäße, die das Blut aus dem Herzen zum übrigen Körper aus der linken Herzhälfte zuführen und



ihr Blut in die rechte Herzhälfte zurückleiten, nehmen nur dann den Charakter der Symmetrie an, wenn sie in ihren Verzweigungen aus der Thoraröhle zu den übrigen Theilen treten.

So nahe gelegt auch die Frage ist, warum die das thierische Leben zunächst bedingenden Organe doppelt vorhanden sind; so ist sie nur zum Theil völlig befriedigend zu beantworten. Organe, die ihrer Function einander nothwendig unterstützen, müssen, wenn ihr Zweck nicht höchst gestört und beschränkt seyn soll, freilich doppelt vorhanden seyn, wie namentlich die Arme und Hände bei Menschen zum Greifen und allen Hantierungen, so wie die Beine zum Gehen. Wenn aber in Hinsicht der Sinnes- oder der Lebensorgane als Grund ihres Doppelseyns der angegeben wird, für den Fall, wenn das eine leidet, oder auch wohl ganz verloren ist, das andere dann doch noch zur Function übrig ist; so ist die Frage sehr nahe gelegt, warum, wenn dieses Naturgesetz als solche allgemeine Gültigkeit behaupten soll, nicht alle wichtige Organe, wie z. B. das Herz, der Magen u. s. w., ebenfalls doppelt, gleichsam in Reserve vorhanden sind. Wenn wir auch mit zwei Ohren ein größeres Schelfeld bestreichen, als mit einem einzigen, oder zwei Ohren besser als mit einem hören; so ist doch wohl auch Körpereinrichtung denkbar, wo bei einfachem Gesicht- oder Gehörman derselbe Zweck erreicht worden wäre, und der Verlust eines solchen Sinnesorgans ist doch immer mit der Zerrüttung eines Lebensorgans, wie das Herz, der Magen u. s. w., nicht in Parallele zu setzen. Hier kommt, daß die Erblindung auf Einem Auge, wenn sie nicht zuerst eine Folge äußerer Gewaltthätigkeit ist, oder auch die Taubheit auf Einem Ohr, häufig auch den Verlust der Sinnesthätigkeit auf dem andern zur Folge hat.

Die Ursache aber, warum wir bei doppelten Sinnesorganen, selbst bei doppelten Gehirnthellen, nur einfach die Gegenstände wahrnehmen, denken u. s. w., ist in der Einheit des Bewußtseyns gegründet, welche freilich nur empirisch von uns selbst erkannt wird, da der philosophische Beweis der Einfachheit der Seele auf seichten Gründen ruht, aber doch einestheils aus der innigen Verbindung der Gehirnthellen in der wirklichen Vereinigung des Marks der beiden Hirnhälften, andernteils aber daher einen Erklärungsgrund zieht, daß wir mehrere Gegenstände, von denen wir durch das Auge oder das Ohr auf zweifachem Wege Vorstellungen erlangen, auf Einen und denselben Raum auswärts beziehen, wodurch also die beiden Gesichtsbilder, oder die beiden Vorstellungen von Schallen außer dem Körper häufig in Eins zusammentreten.

Duplicität des Bewußtseyns ist ein Zerfallen der Geistesthätigkeit selbst, und ein von Störungen der innern Gehirnorganisation abhängiger abnormer Zustand, dessen Betrachtung nicht hierher gehört. (5.)

Dura mater, s. *membrana cerebri*, s. Harte Hirnhaut. — *membrana oculi*, s. Sclerotica. — *meninx*, s. Harte Hirnhaut. — *ossa*, s. Schläfenothen. — *tunica cerebri*, s. harte Hirnhaut. Durchbohrende Arterien, — Nerven, — Venen, s. Perforirende Arterien. — Nerven, — Venen.

Durchbohrender Beuger der Finger, s. unter Flexoren der

Finger, den tief liegenden Muskel. — — — Zehen, s. unter Flexoren der Zehen, den langen Flexor. — Muskel des Fußes, s. ebendas. — Nervo des Casserius, s. äußerer Hautnerv des Arms.

Durchbohrer der Finger des dritten Gliedes, s. unter Flexoren der Finger, den tief liegenden Muskel. — des Fußes, s. unter Flexoren der Zehen, den langen Flexor.

Durchbohrte Knochenlamellen, s. unter Gagliardi's Knochenlamellen.

Durchbohrter Beuger oder Muskel der Finger, s. unter Flexoren der Finger, den oberflächlich liegenden Muskel. — Muskel des Casserius, s. Coracobrachialis. — — — Fußes, s. unter Flexoren der Zehen, den kurzen Flexor. — — — Oberrarm, s. Coracobrachialis.

Durchkreuzung, s. Decussation. — der Sehnerven, s. Decussation der Sehnerven.

Durchflochtener Muskel, s. Complexus des Nackens.

Durchgängige Knochenlamellen, Gagliardi's Knochenlamellen.

Durchgebohrter Achselmuskel, s. Coracobrachialis.

Durchkreuzung, — der Sehnerven, s. Decussation, — Sehnerven.

Durchmesser, s. Diameter. — des Beckens, s. Diameter des Beckens. — — — Kindskopfs, s. Diameter des Kindkopfs.

Durchsichtige Hornhaut, s. Cornea. — Scheidewand der Seitenhöhlen des großen Gehirns, s. Scheidewand der Ventrikel des Gehirns. — Stelle, oder Durchsichtiger Punkt der Netzhaut, s. unter Gelber Fleck in der Retina.

Durchsichtiges Chorion, s. unter Chorion. — Hornhäutlein, s. Cornea.

Duricordia, s. Härtheizigkeit.

Durchsichtigkeit, (Pelluciditas, Pelluciditas<sup>1</sup>, Diaphanitas) kommt denjenigen Körpern zu, welche das auf sie fallende Licht nicht zurückspiegeln oder einsaugend binden, sondern es dioptrisch durch hindurch lassen, so daß wenn sie zwischen die Augen und helle Gegenstände gestellt werden, die Abbildung dieser im Sehorgan nicht hindern. Da die Mineralogie in der Unterscheidung der verschiedenen Grade der Durchsichtigkeit am belehrendsten ist; so folgen wir ihr und führen an.

a) Durchsichtige Körper, (Diaphana,) durch welche Gegenstände vollkommen zu erkennen sind. Sie geben entweder einfache oder doppelte Bilder.

b) Halbdurchsichtige, (Semidiaphana,) welche in dünnen Stücken die Gegenstände nur trübe zeigen.

c) Durchscheinende, (Transparentia,) lassen keine Bilder wohl aber noch Lichtstrahlen hindurch.

d) An den Ranten durchscheinende, (Marginibus transparentia,) verhalten sich nur noch in dünnen Splittern oder Abschnitten.

<sup>1</sup>) Vitruvii de architect. l. 2. c. 8.  
de morb. col.

<sup>2</sup>) Theophr. Paracelsus



, wie vorige, und machen den Uebergang zu den völlig undurchsichtigen Körpern.

In so fern die Durchsichtigkeit mehrerer Körper, vorzüglich die der Atmosphäre, das Sehen bedingt, ist sie ein Gegenstand von Wichtigkeit für die Physiologie. Die Ursache der Durchsichtigkeit scheint mehreren festen und tropfbaren Körpern in einer gewissen Anordnung ihres Gefüges zu liegen, wovon das gemeine Kieselglas im Vergleich mit der Kiesel Erde, oder der Diamant, als crystallisirte Kohle betrachtet, Beispiele geben. Dünste dagegen und Luftarten haben Durchsichtigkeit vielmehr ihrer verminderten Dichtigkeit zu verdanken, wie denn jeder starre Körper, sobald er in Dampf verwandelt wird, mehr oder weniger Durchsichtigkeit erlangt. (Ficinus.)

*Duritia, Durities, Duritudo*, s. Härte.

**Durst**, (*Sitis*<sup>1</sup>, *Dipsa*<sup>2</sup>.) So wie der unaufhörliche Verlust von fester Masse, unter dem fortgehenden Lebensprocesse, auch einen steten Ersatz derselben nöthig macht; so bedarf der Körper zu seinem Bestehen nicht minder einer steten Wiederaufnahme flüssiger Stoffe an die Stelle derer, welche ebenfalls durch die mannigfaltigen Ausleerungen, insbesondere durch die allgemeine Ausdunstung und den Urinabgang unauflöslich verloren gehen. Beide körperlichen Bedürfnisse deuten durch einen Naturinstinct an, der in seinen zwiefachen Aeußerungen als Hunger und als Durst bezeichnet wird.

Man kann wohl behaupten, daß das Bedürfniß steter neuer Nahrung des Körper in dem Thierreich eben so allgemein sei, als das der immer erneuerten Aufnahme festen Nahrungsstoffes, da selbst das Pflanzenleben nur erst unter Zutritt von Feuchtigkeit mittelst wird. Doch ist das Bedürfniß des Hungers und des Durstes nicht bei allen Thierclassen und Arten ein von einander getrenntes.

Mehrere Thiere befriedigen eines und das andere zu gleicher Zeit. Dem Aristoteles<sup>3</sup> bemerkt, daß, so wie Vögel überhaupt wenig trinken, mehrere Raubvögel ganz ohne Getränke leben; auch Insecten, die von Fleisch sich nähren, haben dieß Bedürfniß nicht; auch Amphibien, als Lurche und Tiger, stillen ihren Durst bloß mit dem Saft der erlegten Thiere, oder trinken doch nur wenig und selten<sup>4</sup>. Die Wüste und Dromedare können auch in brennenden Sandwüsten mehrere Tage, halbe Monate, ja ganze Sommer lang ohne Getränke leben, aber nicht, weil sie dessen nicht bedürfen, sondern weil sie in ihren Höhlen ihres Magens immer einen Vorrath von dem in geringer Menge auf einmal zu sich genommenen Wasser aufbewahren, von diesem in der Zwischenzeit ihren Bedarf ziehen<sup>5</sup>. Die den Menschen zugethanen Hausthiere dagegen haben sämmtlich das Bedürfniß des Trinkens, und befriedigen es in reichlichem Maße. So war aber auch dem Menschen das gleiche Bedürfniß ist; so hat man doch den Zweifel erhoben, ob das Trinken wirkliche Naturfor-

1) Gelsi de med. 1. 3. c. 6. 2) Vgl. dieß Wort. 3) de gener. anim. 1. 3. c. 1 und hist. anim. 1. 3. c. 3. 4) Vgl. Halleri cl. physiol. T. I. 1. 19. s. 2. §. 8. 5) S. ebendas. 6) S. ebendas.

vor's von Sicilien Zeugnisse <sup>7</sup>, ganze Völkerschaften ohne eiglich zu trinken leben. Als krankhafte Affection ist, eben so wie lange Enthalttsamkeit von Speisen, so auch eine gleiche von Getränken nicht bloß Wochen, sondern selbst Monate und Jahre lang beobachtet worden <sup>8</sup>.

Der Durst selbst ist eine Modification des Gemeingefühls, die das Naturbedürfnis nach solchen Feuchtigkeiten aufregt, welche eignet sind, in dem Magen und dem Darmcanal absorbiert zu werden. Das ihm zum Grund liegende Gefühl ist, wie bei allen Modificationen des Gemeingefühls, specifisch, und nur in der Wahrnehmung selbst unmittelbar darstellbar. Sein Hauptsitz ist im obern Theil des Schlundes, von wo aus er sich in die Mundhöhle, wie abwärts zum Magen verbreitet. Er ist mit Trockenheit dieser Theile verbunden, doch die Empfindung dieser Trockenheit allein nicht, daher durch bloße Befenchung des Schlundes nur auf kurze Zeit und unvollkommen zu heben; die eignen Feuchtigkeiten des Körpers, wie z. E. der im Mund zusammenfließende Speichel, vermögen Stillung des Durstes gar nichts. Wird der Durst nicht befriedigt, so steigert sich das damit verbundene unangenehme Gefühl bis Unerträglichkeit; und auch das Eksthafteste nur Trinkbare wird verschmäht. In Verbindung mit Hunger beeilt sich jedes Geschöpf, eher den Durst als jenen zu befriedigen. Im höchsten Grad ist Entzündung des Schlundes und des Magens, die zur Eitrigränescirung sich hinneigt, mit allgemeinem Fieber, die äußerste Schöpfung und unter Steigerung dieser Affection der Tod die notwendige Folge des unbefriedigten Durstes. Man hat mehrere von freiwilligem Hungertode, aber keine, wo bei vorhandenen Theilen zur Löschung des Durstes sich ein Mensch zu Tode gegeben hätte.

Verlust von Feuchtigkeiten aller Art, besonders starke Hautausstufung unter erhöhter äußerer Temperatur, befördern den Durst, daher Trinken auch das erste und nächste Bedürfnis von Verwundten ist, die einen starken Blutverlust erlitten. Krankheiten, die mit einem starken Säfteverlust, oder auch mit Abscheidung von Wasser aus der allgemeinen Säftemasse verbunden, wie namentlich Wassersuchten, daher auch mit vielem Durst verbunden, so auch Fieber und Entzündung aller Art, besonders des Magens. Auch der häufige Gebrauch salziger oder auch anderer scharfen Substanzen, die zu ihrer Assimilation eine reichliche Menge wässeriger Feuchtigkeiten zu fordern pflegen, vermehren laut Erfahrung den Durst. Gegenseitig wird das Bedürfnis des Trinkens und also auch der Durst verringert, nicht auf andern Wegen, z. E. durch die Haut, mittelst Bädungen oder Bäder, durch Einathmen feuchter Luft, oder durch Eystiere Feuchtigkeiten in den Körper gelangen.

Die nächste und unmittelbare Forderung der Natur in dem Durst ist das einfache Wasser, das schon während des Niederschluckens im Munde die lästige Empfindung stillt, und sie, nachdem es in den Magen aufgenommen worden, auch schon in mäßiger Quantität

7) bibl. 1. 3. c. 18 de ichtyophagis.

8) S. Halleri cl. etc. 1.

selbst Beispiele von 6 — 15 Jahr völliger Abstinenz von Getränken aufgetreten sind.



ntau hebt. Doch lehrt die Erfahrung, daß das einfache Wasser Menschen, die in der Wahl ihrer Getränke sich einmal an gewisse Reizmittel gewöhnt haben, zu denen die menschliche Natur, so- d sie damit bekannt wird, sich immer vorwaltend hinneigt, den Durst nicht auf eine völlig befriedigende Weise löscht, ja daß auch, Verwöhnung, die Anfüllung des Magens mit einfachem Wasser Gesundheit nicht entspreche.

An sich ist schon das Wasser, das nicht einen Antheil von Luft- are bei sich hat, zur Stillung des Durstes weniger angemessen. f diesem Vorzug beruht besonders die Lieblichkeit des Quellwassers an Trinken im Gegensatz des atmosphärischen oder Flußwassers. ch durstlöschender sind um deswillen die sogenannten Sauerlinge, anal, wie auch Quellwasser überhaupt, kühl und frisch genossen, be- eders bei höherer Temperatur des Körpers und nach erschöpfender xperanstrengung. Außerdem leitet die Natur durch Instinct selbst Wahl säuerlicher Getränke hin, um den Durst schnell und ohne ermäßigte Anfüllung des Körpers zu stillen, daher auch säuerliche mmerfrüchte in warmer Jahreszeit so vorzüglich durststillend sind.

Mit diesen einfachen Naturgeschenken aber nicht zufrieden, hat der harffinnu der Menschen, der sich von jeher auf die mannigfaltigste erschöpfte, um mit der Befriedigung einfacher Naturbedürfnisse löhte sinnliche Lust zu verbinden, schon in den ältesten Zeiten sich künst- ee Getränke zu erschaffen gewußt, durch deren Benugung das Trin- , auch bei nur mäßigem Durst, zu einem der höchsten Genußmittel Menschen erhoben worden ist. Hierhin kann man den Gebrauch Thiermilch zum Trinken noch nicht rechnen, die, während sie schon Urstämmen der Völkerschaften Asiens zur Stillung ihres Durstes ente, auch ihnen zugleich, unverändert oder in ungekünstelter Schei- gg ihrer Bestandtheile, ein höchst gedeihliches Nahrungsmittel war. e: einfache Beobachtung der Naturforderung und Naturgewöhnung eignen Geschlecht an Säuglingen, und an den in ihre nähern renskreise gezogenen Thieren bei Säugung ihrer Jungen mußte sie auf leiten.

Wie wenig andere künstliche Getränke aber den Menschen wirklich Naturbedürniß sind, ersieht man daraus, daß wenigstens  $\frac{2}{10}$  Men- nn unter allen Himmelsstrichen, besonders den Nichteuropäern und er diesen auch die Bewohner des südlichen Europa's, vor allen weibliche Theil derselben, bloß Wasser trinken<sup>9</sup>. Indessen reicht Bekanntschaft der Menschen mit dem Wein in die graueste Vor- , oder vielmehr über alle geschichtliche Denkmäler hinaus, und nur nige Menschen von kräftiger Constitution, zumal in nicht heißen maten, die mit diesem Getränk bekannt worden sind, werden t durch ihre Natur selbst zu Benugung desselben zum Getränke, an auch nicht zu alleiniger Stillung des Durstes, doch untermischt r mit anderem Getränk abwechselnd, Aufforderung erhalten. Die Ein- kung, welche der Wein, wie alle durch die weinige Gährung ers- etene Getränke, auf das gemüthliche Leben macht, und deren hö- er Grad als Trunkenheit bekannt ist, ist ein zu mächtiger Reiz r kräftige Naturen, deren Empfänglichkeit dafür nicht durch Eigen-

) Halleri el. phys. etc. l. c. §. 20.

heiten ihrer Constitution abgestumpft ist, als daß sie demselben widerstehen sollten. Alle Nationen, zumal nördlicher Gegenden, deren Clima dem Weinbau nicht günstig ist, haben daher wenigstens Surrogat, worunter das Bier das bekannteste ist, eingeführt. Alle wilde Nationen ja selbst gewöhnlich schon Kinder<sup>10</sup> lieben Wein und weinige Getränke, und besonders den erst in spätern Zeiten erfundenen Brauntwein, oder Getränke, in denen dieser doch die Grundlage ist. Es gehört nicht hieher, sondern in die Diätetik, die Nachtheile zu bemerken, welche diese Getränke, bei Mißbrauch, durch Ueberreizung und Abstumpfung der Gesundheit bringen, und wie bei dem nur relativen Gesundheitszustande, der dem Menschen gewöhnlich verbleibt, wenn er einmal aus dem rohen Naturzustande getreten ist, mehrere Menschen sich bei der Enthaltksamkeit von spirituösen Dingen, oder wenigstens doch bei nur sparsamem Genuß derselben besser befinden, wenn sie bloß den Anregungen ihrer Natur folgen, die sie zu den selben anlockt, und ihnen im Fortgang der Gewöhnung an sie immer größere Portionen davon zum Bedürfniß macht. Menschen aber, einmal mehr oder minder sich dieser Gewohnheit hingegeben habend, finden, daß andere Getränke als diese ihnen ihren Durst nur Noth, keinesweges aber befriedigend stillen.

Weniger reizend und auch einfacher in den Ernährungsproceß eingehend sind diejenigen künstlichen Getränke, welche, indem sie weiche Lieblichkeit der Ingredienzien dem Geschmackssinn zusagen, zur Stillung des Durstes gewählt werden. Hierher gehören die mannigfachen Zusätze von Zucker oder süßen Säften mit leicht würzhaften Essenzen, nebst vegetabilischen Säuren in den mannigfaltigen Erfrischungsgetränken, worin der feinere Luxus ein so weites Feld gewonnen hat, der auch die Eisform so glücklich zu benutzen weiß, indem ein Theil der wässerigen Feuchtigkeit in einem solchen Getränk in diese versetzt wird, auch noch den Reiz der Kühlung dem des Geschmacks beizufügen. Man weiß, welchen Werth die Bewohner südlichen Länder Europa's, auch selbst die niederen Volksklassen, diese künstlichen Eisgetränke setzen.

Von entgegengesetzter Art ist die Erhöhung des Genusses bei Stillung des Durstes durch die mannigfaltigen Kunstzubereitungen neuer Getränke. Man kann wohl sagen, daß immer ein Bedürfniß von Aufregung der innern Lebenswärme, im Kampf mit einem feindlichen Clima oder mit rauher, feuchter Witterung, sich mit dem Bedürfniß des Durstes verbinden mußte, um die Menschen zur Wahl dieser Getränke zu leiten. Ein reines Gefühl des Durstes wird nur bei solchen Personen dadurch Befriedigung erhalten, die sich bereits verwöhnt haben, und deren Natur, wie namentlich im vorgerückten Lebensalter, neuen äußern Zusatz zur innern Lebenswärme erheischt. Sie werden im Durchschnitt am besten vertragen, wenn ihnen zugleich ein reizendes Princip beigelegt ist, das dann als Erregungsmittel gesunkener Lebenskraft wirkt, wie beim Kaffee, beim Thee, bei der Chocolate u. w. Einfaches warmes Wasser als Getränk zur Durstlöschung wird allgemein verschmäht. Zusätze von Nahrungstoffen, wie in den mannigfaltigen Suppenbereitungen, verleihen dem Kunstgetränk mehr den Ge-

<sup>10</sup>) auch Vögel und vierfüßige Hausthiere gewöhnen sich wenigstens daran.



ter von Speise, ohgleich reichlicher Genuß derselben dann die Stille  
g des Durstes auf andere Art mehr oder minder entbehrlich  
ist. (H.)

*Durum palatum*, f. Knöcherner Gaumen.

*Durus nervus*, f. Facialnerv.

*Duumvirat*<sup>1</sup>, (*Duumviratus*<sup>2</sup>.) Mit diesem Ausdruck bezeich-  
net van Helmont das von ihm dem Magen und der Milz ge-  
meinschaftlich zugeschriebene geistige Lebensprincip, oder die nach sei-  
ner Ansicht von den gedachten Organen gemeinschaftlich ausgehende  
Herrschaft aller übrigen Organe des menschlichen Körpers. Van  
Helmont hatte die Idee eines Archeus, (vgl. dieß Wort,) von  
Boerhaave angenommen, und indem er diesem insbesondere in  
der obern Abdominalregion seine Stelle anwies, bildete sich die Hel-  
mont'sche Lehre des Duumvirats aus, die eine Zeit lang in den al-  
tern medicinischen Schulen Eingang fand, um physiologische und pa-  
thologische Vorgänge im Körper, ihrem Entstehen und ihrer ursprüngli-  
chen Natur nach, nicht sowohl zu erklären, als mit einem hochtönen-  
den Worte zu bezeichnen. Als Mystiker gewöhnt, die Causalverhält-  
nisse von Naturerscheinungen überhaupt nur bildlich auszudrücken,  
hat aber mit derjenigen Klarheit darzulegen, die der Logiker und  
mathematischer für Naturerklärungen postuliren, gibt van Helmont  
durchgängig nur oberflächliche und überhaupt mehr gelegentliche  
unbestimmte Andeutungen von dem, was er unter Duumvirat im  
eigentlichen versteht. Wesentlich dürfte es in folgendem begriffen seyn<sup>3</sup>.

Es gibt nach van Helmont sechs Arten der Digestion, deren erste  
nämlich das Duumvirat vom Magen und der Milz aus bewirkt.  
Insbesondere verleiht die Milz dem Magen das dazu nöthige Fer-  
ment, (*Fermentum digestivum*.) und ist so die Urquelle der Ve-  
getation. Die vegetirende Kraft im thierischen Körper geht aber eben-  
falls von der sensitiven Seele aus, an welche bei dem Menschen der  
Geist geknüpft ist. Die Begriffe aber, wenn sie auch im Gehirn  
entstehen, verläugnen doch ihren ersten Ursprung nicht, und  
das Gehirn steht unter dem Duumvirat. Wenn in der heiligen  
Schrift steht, daß die Seele und das Leben im Blute sei, so findet  
sich auf die Milz seine Anwendung, deren Parenchyma einzig aus  
rothem Blute besteht, wogegen das Gehirn ein blutleeres Or-  
gan ist. Die ersten Wirkungen lebhafter Ideen werden in den Prä-  
toren wahrgenommen. Wenn ein noch so hungeriger Mensch eine  
kurze Botschaft erhält, verliert er augenblicklich den Appetit. Die-  
ses ist auch der Sitz der Träume, daher auch das Ausdrücken von  
Erfüllung des Magens mit harten Speisen seinen Ursprung nimmt,  
denn auch von der Milz aus der Schlaf bedingt wird. Der  
Magen aber übt sein Duumvirat insbesondere so aus, daß der obere  
Mund, oder die Cardia, den obern Theilen des Körpers, der untere  
Mund, oder der Pylorus, den untern vorsteht. Daß der Sitz der Seele  
in dieser Gegend ist, deutet auch schon das gemeine Gefühl der Men-  
schen an.

Sprengel's Verf. einer Geschichte d. Arzneik. 4. B. S. 364.

2) wörtl:

Wie ein zwei Männern gemeinschaftlich vom Staate übertragenes Amt, aus der  
Römischen Geschichte entlehnt. S. Plinii epist. l. 4. ep. 23.

3) S. vor-

züglich in den Schriften von van Helmont dessen *jus duumviratus* betitelte  
Abhandlung.

schen an, die bei Beängstigung des Geistes unwillkürlich die Hand an die Herzgrube legen. Auch wird die materielle Krankheitsursache von Wahnsinn, Ohnmachten und andern Affectionen des Bewußtseyn gewöhnlich unter dem Diaphragma angetroffen. Hieraus ist auch greiflich wienach Wahnsinnige mit Leichtigkeit Hunger und Durst tragen. Wäre die Herrschaft, die der Magen über den Kopf nicht größer als die des Lehtern über den Magen; so würden Krankheiten des Kopfs nicht durch Magenmittel und Ausleerungen der ersten Wege gehoben werden. Mit Unrecht weisen die ältern Schulen Begierde die Leber, dem Zorn das Herz zum Sitz an. Alle Leidschaften und auch die Geschlechtsliebe, (deren Sitz ebenfalls nach Schulen der Alten die Nieren sind,) gehen nach van Helmont von Duumvirat der Milz und des Magens aus, dessen Beherrschung Geschlechtsorgane er insbesondere auch aus der schnellen Wirkung der Algalie in schweren Geburten zu beweisen sucht, die er, (mit Bedeutung der Aehnlichkeit des Hals mit der Schlange, die ja, in der Bibel, nebst der Sünde, auch das schmerzhaftes Gebären der Ueber verschuldet hat,) in mehr als zwei hundert Fällen erprobt hat will. Auf gleiche Weise sucht er auch die Uebergewalt des Einflusses der Milz und des Magens auf die andern Körperorgane und alle Lebensäußerungen mehr mit aufgestellten Thatsachen zu belegen, als Grundgesetzen des Lebens zu erweisen.

So phantastisch übrigens diese Aussprüche auch größtentheils sind, so sind sie doch den neuern physiologischen Ansichten, (nach denen Abdominalleben ein weit wichtigeres und höher gestelltes ist, als dem Körper seine Nahrung zu verleihen, ihn von überflüssigen Stoffen zu befreien, und nebenher in den Geschlechtsfunctionen das bedingte Daseyn auf ein neues Individuum überzupflanzen,) verworfen, als, so lange die mechanisch-physisch-chemischen Erklärungen Lebens in den Schulen die beliebtesten waren, es in Hinsicht der Fall war. Hätte van Helmont bereits die bekannten Erklärungen des thierischen Magnetismus gekannt; so würde er nicht gefehlt haben, diese zu stärkern Stützen seiner Ansicht von dem Wesen des Abdominalnervenlebens zu benutzen, als er mit allem seinen gebotenen Scharffinne aufzufinden vermochte.

**Duverneyscher Gang, (*Duverneyanus ductus* Bartholinischer Gang.**

**Dyas<sup>1</sup>, (*Dyas*<sup>2</sup>.)** Zweiheit<sup>3</sup>, die Zahl Zwei in ihrem natürlichen Hervorgehen durch einfaches Zerfallen der Monas oder Einheit in Gegensatz. Vgl. Dualismus.

1) Sprengel's Vers. ein. Gesch. d. Arzneik. 1. B. S. 155. 2) entspricht dem Griechischen gleichlautenden Worte *Dyas*. 3) Sprengel's Vers. w. a. a. D.

***Dynamica expositio naturae*, f. Dynamische Naturerklärung — *formatio*, f. Dynamische Bildung. — *natura*, f. Dynamische Natur. — *phaenomena*, f. Dynamische Erscheinungen. — *physiologia*, f. Dynamische Naturlehre. — *relatio*, f. Dynamisches Verhältniß. — *vita*, f. Dynamisches Leben.**

***Dynamice*, f. Dynamik.**

***Dynamicus processus*, f. Dynamischer Proceß.**



**Dynamik<sup>1</sup>, (Dynamice<sup>2</sup>), Kräftelehre**, ist in neuerer Zeit zuerst Leibniz als ein Theil der Mechanik unterschieden worden, der die Bewegung der Körper, ihren mathematischen Bestimmungen oder ihren quantitativen Verhältnissen nach, zum Gegenstand hat. Seitdem man aber diesem Worte eine erweiterte Bedeutung gegeben, indem man solchem auf Kraft überhaupt, in wie fern sie den Gegensatz Masse bildet, Anwendung gab.

Insbesondere ist es Kant, der die schärfere Berücksichtigung des dynamischen in der Natur in den neuern philosophischen Schulen veranlaßte, und auch in der später, besonders nach Schelling's Vorgang, sich ausbildenden Naturphilosophie wird die Dynamik als die vorzüglichste Stütze einer wissenschaftlich begründeten Psychik und Physiologie angesehen.

Es ist unter dem Artikel Atomistik bemerkt worden, wie bis auf die neuesten Zeiten herab die Ansicht einer primitiv vorhandenen Materie, welcher die Kräfte, durch welche sie wirkt, als eine Eigenschaft, theilhaftig als eine Zugabe verliehen sind, die vorherrschende war, und die gegenseitige, welche die Atomistik endlich völlig umstürzte, schon Newton vorbereitet, und endlich durch Kant zur Klarheit gebracht wurde. Hier ist es der Ort, der dynamischen Naturerklärung, welche Kant zuerst unternahm, und welche auch in dem Westphälischen von den spätern Naturphilosophen anerkannt worden ist, gedenken zu.

Kant<sup>1</sup> betrachtet die Materie von den vier Seiten, die sich nach den Gesetzen des menschlichen Verstandes als die einzigen, aber zugleich nothwendigen, für alle Gegenstände der Erkenntniß darbieten, der Tafel der reinen Verstandesbegriffe oder Kategorien, nämlich der Quantität, der Qualität, der Relation und der Modalität. Wenn nun der Begriff der Materie so durch die vier Functionen der Verstandesbegriffe durchgeführt wird, erhält er durch jede eine neue Bestimmung. Die Grundbestimmung eines Etwas, das ein Gegenstand unserer Sinne seyn soll, ist Bewegung, indem dadurch allein der Sinne afficirt werden. Auf diese führt nun der Verstand auch die übrigen Prädicate der Materie, die zu ihrer Natur gehören, zurück, so ist die Naturwissenschaft durchgängig eine entweder reine, oder angewandte Bewegungslehre.

Hiernach ergeben sich folgende vier Hauptstücke der metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft:

1) Chronologie, worin die Bewegung als ein reines Quantum nach seiner Zusammensetzung, ohne alle Qualität des Bewegtseyns betrachtet wird;

2) Dynamik, welche sie, als zur Qualität der Materie gehörig, unter dem Rahmen einer ursprünglich bewegenden Kraft in Bewegung zieht;

3) Mechanik, welche die Materie mit dieser Qualität durch ihre Bewegung gegen einander in Relation berücksichtigt;

4) Phänomenologie, welche ihre Bewegung oder Ruhe bloß nach dem gebräuchlichen Stammworte *δυναμις*, Kraft oder Vermögen, gebildet.

5) Kant's metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft. 2. Hauptstück.  
2) A. J. Testa de vitalib. periodis aegrotantium et sanor. elementa dynamices animalis, Lond. 1787, 8. 3) In der angezogenen Schrift.

in Beziehung auf die Vorstellungsart, oder Modalität, mithin Erscheinung äußerer Sinne, bestimmt.

Hiernach wird die Materie in der Phoronomie als das Bewegliche im Raume, in der Dynamik als das Bewegliche, so fern es einen Raum erfüllt, in der Mechanik als das Bewegliche, so fern es, ein solches, bewegendes Kraft hat, und in der Phänomenologie das Bewegliche, so fern es, als ein solches, ein Gegenstand der Erfahrung seyn kann, betrachtet.

Nachdem nun Kant der Dynamik auf solche Weise ihre Stelle der reinen Naturwissenschaft angewiesen und gesichert hat, stellt insbesondere folgende Lehrsätze derselben auf.

1. Lehrsatz. Die Materie erfüllt einen Raum, nicht durch ihre bloße Existenz, sondern durch eine besondere bewegendes Kraft.

**Beweis** Einen Raum erfüllen, heißt allem Beweglichen widerstehen, das durch seine Bewegung in einen gewissen Raum einzudringen bestrebt ist. Das Eindringen in einen Raum, (dessen Anfang Augenblick die Bestrebung dazu ist,) ist eine Bewegung. Der Widerstand gegen Bewegung ist die Ursache der Verminderung, oder Veränderung derselben in Ruhe. Nun kann mit keiner Bewegung etwas verbunden werden, was sie vermindert oder aufhebt, als eine andere Bewegung eben desselben Beweglichen in entgegengesetzter Richtung, (welches ein Lehrsatz der Phoronomie ist.) Also ist der Widerstand, den eine Materie in dem von ihr erfüllten Raume gegen das Eindringen anderer leistet, eine Ursache der Bewegung der letzteren in entgegengesetzter Richtung. Die Ursache einer Bewegung aber ist eine bewegendes Kraft, wodurch folglich die Materie ihren Raum, nicht durch ihre bloße Existenz erfüllt.

2. Lehrsatz. Die Materie erfüllt ihre Räume durch repulsive Kräfte aller ihrer Theile, d. i. durch eine ihr eigne Ausdehnbarkeit, die einen bestimmten Grad hat, über den kleinere oder größere Unendliche gedacht werden können.

**Beweis.** Die Materie erfüllt einen Raum nur durch bewegendes Kraft, und zwar eine solche, die dem Eindringen anderer, oder der Annäherung widersteht. Nun ist diese eine zurückstoßende Kraft. Also erfüllt die Materie ihren Raum nur durch zurückstoßende Kräfte aller ihrer Theile, weil sonst ein Theil ihres Raumes nicht erfüllt, sondern nur eingeschlossen seyn würde. Die Kraft eines Ausgedehnten vermöge der Zurückstoßung aller seiner Theile ist eine Ausdehnungskraft. Also erfüllt die Materie ihren Raum durch eine ihr eigne Ausdehnungskraft, welches das erste war. Ueber eine jede gegebene Kraft muß eine größere gedacht werden können; denn die, über welche keine größere möglich ist, würde eine solche seyn, wodurch in einer endlichen Zeit ein unendlicher Raum zurückgelegt werden würde, welches unmöglich ist. Eben so muß unter jeder gegebenen bewegendes Kraft eine kleinere gedacht werden können; denn die kleinste würde die seyn, durch deren unendliche Hinzuthuung zu sich selbst jede gegebene Zeit hindurch keine endliche Geschwindigkeit erzeugt werden könnte, welches aber den Mangel einer bewegendes Kraft bedeutet. Also muß unter einem jeden ge-



Grade einer bewegenden Kraft immer noch ein kleinerer gegeben werden können, welches das zweite ist.

3. **Lehrsatz.** Die Materie kann ins Unendliche zusammengedrückt, er niemals von einer Materie, so groß auch die drückende Kraft selber sei, durchdrungen werden.

**Beweis.** Eine ursprüngliche Kraft, womit eine Materie sich über den gegebenen, von ihr eingenommenen Raum allwärts auszudehnet, (Elasticität,) muß in einen kleineren Raum eingeschlossen, größer, und in einen unendlich kleinen Raum zusammengedrückt, unendlich seyn. Nun kann für gegebene ausdehnende Kraft Materie eine größere zusammendrückende gefunden werden, die sie in einen engeren Raum zwingt und so ins Unendliche; welches Erste war. — Zum Durchdringen der Materie, (völlige Aufhebung des Raums ihrer Ausdehnung,) würde eine Zusammentreibung selber in einen unendlich kleinen Raum, mithin eine unendlich zusammendrückende Kraft erfordert, welches unmöglich ist. Also kann Materie durch Zusammendrückung von keiner andern durchdrungen werden; welches das Zweite ist.

4. **Lehrsatz.** Die Materie ist ins Unendliche theilbar, und zerfällt in Theile, deren jeder wieder Materie ist.

**Beweis.** Die Materie ist undurchdringlich, und zwar durch ihre ursprüngliche Ausdehnungskraft; diese ist aber nur die Folge der repulsiven Kräfte eines jeden Puncts in einem von Materie erfüllten Raume. Nun ist der Raum, den die Materie erfüllt, ins Unendliche mathematisch theilbar, d. i. seine Theile können ins Unendliche unendlich getheilt werden, obgleich nicht bewegt, folglich auch nicht getrennt werden. In einem mit Materie erfüllten Raume aber enthält jeder Theil denselben repulsiven Kraft, allen übrigen nach allen Seiten entgegenzuwirken, mithin sie zurückzutreiben und von ihnen ebenfalls zurückgebehalten, d. i. zur Entfernung von denselben bewegt zu werden. Mithin ist jeder Theil eines durch Materie erfüllten Raumes für sich selbst beweglich, folglich trennbar von den übrigen, als materielle Substanz, durch physische Theilung. So weit sich also die mathematische Theilbarkeit des Raums, den eine Materie erfüllt, erstreckt, so weit erstreckt sich auch die möglich physische Theilung der Substanz, die ihn erfüllt. Die mathematische Theilung aber geht ins Unendliche, folglich auch die physische.

5. **Lehrsatz.** Die Möglichkeit der Materie erfordert eine Ausdehnungskraft, als die zweite wesentliche Grundkraft derselben.

**Beweis.** Die Undurchdringlichkeit, als die Grundeigenschaft der Materie, wodurch sie sich als etwas Reales im Raume unsern äußern Sinnen zuerst offenbart, ist nichts als das Ausdehnungsvermögen der Materie. Nun kann eine wesentlich bewegende Kraft, dadurch Theile der Materie einander fliehen, erstlich nicht durch sich selbst beschränkt werden, weil die Materie dadurch vielmehr bestrebt ist, von ihr erfüllten Raum continuirlich zu erweitern, zweitens auch nicht durch den Raum allein auf eine gewisse Grenze der Ausdehnung beschränkt werden, weil von einer jeden bewegenden Kraft ins Unendliche

kleinere Grade möglich sind, nie den Grund enthalten kann, daß irgendwo aufhöre. Also würde die Materie durch ihre repulsive Kraft allein innerhalb keiner Grenzen der Ausdehnung gehalten seyn. Folglich würden, bei bloß repellirenden Kräften der Materie, alle Räume leer, also gar keine Materie da seyn. Es erfordert also alle Materie zu ihrer Existenz Kräfte, die der ausdehnenden entgegengesetzt sind, d. i. zusammendrückende, die aber ursprünglich nicht wieder in der Entgegensehung einer andern Materie gesucht werden können; denn diese bedingt, damit sie Materie sei, selbst einer zusammendrückenden Kraft. Also muß irgendwo eine ursprüngliche Kraft der Materie, deren Directe eine entgegengesetzte ist, d. i. eine Anziehungskraft, angenommen werden, die aber ursprünglich ist, indem sie zur Möglichkeit einer Materie, als solcher, überhaupt gehört.

6. Lehrsatz. Durch bloße Anziehungskraft, ohne Zurückstoßkraft, ist keine Materie möglich.

Beweis. Anziehungskraft ist die bewegende Kraft der Materie, wodurch sie eine andere treibt, sich ihr zu nähern; folglich wenn sie zwischen allen Theilen der Materie angetroffen wird, ist die Materie vermittelst ihrer bestrebt, die Entfernung ihrer Theile von einander, mithin auch den Raum, den sie zusammen einnehmen, zu verringern. Nun kann nichts die Wirkung einer bewegenden Kraft hindern, als eine andere entgegengesetzte, also eine repulsive Kraft. Wenn diese würden sich also alle Theile der Materie ohne Hinderniß einander nähern, und den Raum, den diese einnimmt, verringern. Da nun in dem angenommenen Falle keine Entfernung der Theile ist, in welcher eine größere Annäherung durch Anziehung vermittelst einer zurückstoßenden Kraft unmöglich gemacht wurde; so würden sie sich lange zu einander bewegen, bis gar keine Entfernung zwischen ihnen angetroffen würde, sie würden in einen mathematischen Punkt zusammenfließen, der Raum würde leer, mithin ohne alle Materie seyn.

7. Lehrsatz. Die aller Materie wesentliche Anziehung ist unmittelbare Wirkung derselben auf andere, durch den leeren Raum.

Beweis. Die ursprüngliche Anziehungskraft enthält selbst Grund der Möglichkeit der Materie, als desjenigen Dinges, einen Raum in bestimmtem Grade erfüllt, mithin selbst sogar der Möglichkeit einer physischen Berührung derselben. Sie muß dieser vorhergehen, und ihre Wirkung muß folglich von der Berührung der Berührung unabhängig seyn. Eine von aller Berührung unabhängige Wirkung einer bewegenden Kraft ist aber auch von der Erfüllung des Raums zwischen den Bewegenden und dem Bewegten unabhängig, d. i. sie findet auch ohne Erfüllung des Raums zwischen beiden Statt, und mithin als Wirkung durch den leeren Raum.

8. Lehrsatz. Die ursprüngliche Anziehungskraft, worauf die Möglichkeit der Materie, als einer solchen, beruht, erstreckt sich im Weltraume von jedem Theile derselben auf jeden andern unmittelbar ins Unendliche.

Beweis. Die ursprüngliche Anziehungskraft, als zum Wesen



terie gehörig; kommt auch jedem Theile derselben zu, nämlich unmittelbar auch in die Ferne zu wirken. Gäß es nun eine Entzerrung, über welche hinaus sie sich nicht erstreckte; so würde diese Begrenzung der Sphäre ihrer Wirksamkeit entweder auf der innerhalb der Sphäre liegenden Materie, oder bloß auf der Größe des Raumes, auf welchen sie diesen Einfluß verbreitet, beruhen. Ersteres findet nicht Statt, indem diese Anziehung eine durchdringende Kraft ist, und unmittelbar in der Entfernung, ungeachtet aller dazwischen liegenden Materien, durch jeden Raum, als einen leeren Raum, wirkt; das Zweite aber eben so wenig, da, weil jede Anziehung eine bewegende Kraft ist, die einen Grad hat, unter dem ins Unendliche noch immer kleinere gedacht werden können, in der größten Entfernung zwar ein Grund liegen würde, den Grad der Attraction, nach dem Maße der Ausbreitung der Kraft, in umgekehrtem Verhältniß zu vermindern, nie aber sie völlig aufzuheben. Da also nichts ist, was die Sphäre der Wirksamkeit der ursprünglichen Anziehung jedes Theils der Materie irgendwo begrenzte; so muß sie über alle Grenzen hinaus in den unendlichen Weltraum erstrecken. Aus dieser ursprünglichen Anziehungskraft müßte nun, in Verbindung mit der ihr entgegenwirkenden, zurücktreibenden Kraft, die Einschränkung der letztern, mithin die Möglichkeit eines in einem bestimmten Grade erfüllten Raumes abgeleitet werden können. Aber dazu bedarf man eines Gesetzes des Verhältnisses der ursprünglichen Anziehung und Zurückstößung in verschiedenen Entfernungen der Materie und ihrer Theile von einander, welches aber eine reine mathematische Aufgabe ist.

Die Wirkung von der allgemeinen Anziehung heißt die Gravitation; die Bestrebung in der Richtung der größern Gravitation sich zu bewegen, ist die Schwere. Die Wirkung der durchgängigen reziproken Kraft der Theile jeder gegebenen Materie ist ihre ursprüngliche Elasticität. Schwere und Elasticität machen also die einzigen a priori einzusehenden allgemeinen Charaktere der Materie. Zusammenhang, wenn er als die wechselseitige Anziehung der Massen, die lediglich auf die Bedingung der Berührung eingeschränkt erklärt wird, gehört nicht zur Möglichkeit der Materie überhaupt, kann daher a priori als damit verbunden nicht erkannt werden, es ist also diese Eigenschaft eine physische.

Beim Rückblick auf die vorgetragenen Sätze zeigt sich, daß zuerst das Reelle im Raume, in der Erfüllung desselben durch Zurückstößungskraft, sodann das, in Hinsicht des erstern als negativ zu betrachtende, die Anziehungskraft, endlich die Einschränkung der ersten Kraft durch die zweite, und die daher rührende Bestimmung des Grades einer Erfüllung des Raumes in Betrachtung gezogen, mithin die Qualität der Materie unter den Titeln der Realität, Negation und Limitation bemerkt werden.

Als Momente, worauf die spezifische Verschiedenheit der Materie sich a priori bringen läßt, stellt Kant folgende auf:

1) Ein Körper, in physischer Bedeutung, ist eine Materie zwischen bestimmten Grenzen. Der Raum zwischen diesen Grenzen, seiner Größe nach betrachtet, ist der Rauminhalt, oder sein Volumen, der

Grad der Erfüllung eines Raums von bestimmtem Inhalte die Dichtigkeit.

2) Anziehung, in so fern sie bloß als in der Berührung wirksam gedacht wird, heißt Zusammenhang. Eine Materie, deren Theile, ungeachtet ihres noch so starken Zusammenhanges an einander, dennoch von jeder noch so kleinen bewegenden Kraft an einander verschoben werden, ist flüssig. Theile einer Materie werden aber an einander verschoben, wenn sie, ohne das Quantum der Berührung zu vermindern, nur genöthigt werden, diese unter einander zu verwechseln. Theile, mithin auch Materien, werden getrennt, wenn die Berührung nicht nur mit andern verwechselt, sondern aufgehoben, oder ihr Quantum vermindert wird. Ein fester oder starrer Körper ist der, dessen Theile nicht durch jede Kraft an einander verschoben werden können. Das Hinderniß des Verschobens der Materien an einander ist Reibung. Der Widerstand gegen die Trennung sich berührender Materien ist der Zusammenhang. Flüssige Materien erleiden also keine Reibung in ihrer Theilung, sondern wo diese angetroffen wird, werden die Materien als starr, größerem oder minderem Grade, deren letzter Klebrigkeit ist, genommen. Der starre Körper ist spröde, wenn seine Theile nicht an einander verschoben werden, ohne zu zerreißen. Mit großer Ansicht hängt auch die Eigenschaft flüssiger Materien zusammen, daß jeder Punct derselben sich nach allen Directionen, mit eben derselben Kraft sich zu bewegen trachtet, mit welcher er nach irgend einer gedrückt wird.

3) Elasticität ist das Vermögen einer Materie, ihre durch eine andere bewegende Kraft veränderte Größe oder Gestalt bei Auflassung derselben wieder anzunehmen. Sie ist entweder expansiv oder attractiv.

4) Die Wirkung bewegter Körper auf einander durch Mittheilung ihrer Bewegung heißt mechanisch; die der Materie aber, fern sie auch in Ruhe durch eigne Kräfte wechselseitig die Verbindung ihrer Theile verändern, heißt chemisch. Dieser chemische Eingriff heißt Auflösung, so fern er die Trennung der Theile einer Materie zur Wirkung hat; derjenige aber, der die Absonderung zweier durch einander aufgelösten Materien zur Wirkung hat, ist die Scheidung.

Die Auflösung specifisch verbundener Materien durch einander, in kein Theil der einen angetroffen wird, der nicht mit einem Theile der andern von ihr specifisch unterschiedenen in derselben Proportion wie die Ganzen vereinigt wären, ist die absolute Auflösung oder chemische Durchdringung.

In dieser ganzen Exposition des Dynamischen in der Natur kann einzig nur das Räumliche, oder die Körperwelt, vor Augen ja auch in dieser sind die chemischen Wirkungen der Körper auf einander außer Berücksichtigung gelassen. Es kam ihm nämlich daran, den reinern Theil der Naturwissenschaft, der dem empirischen Grunde liegt, zu gewinnen; dieser reine Theil beruht auf Erkenntniß der Naturdinge a priori, oder ihrer Möglichkeit nach. Die Möglichkeit bestimmter Naturdinge kann aber nicht aus ihren bloßen Begriffen erkannt werden, aus denen bloß die Möglichkeit des



seus, nicht des Object's erhellt. Um die Möglichkeit bestimmter Naturdinge, oder um diese a priori zu erkennen, ist aber erforderlich, daß die dem Begriffe correspondirende Anschauung a priori gegeben, daß der Begriff construiert werde. Vernunftkenntniß durch Construction der Begriffe aber ist mathematisch. Also ist wohl eine Philosophie der Natur überhaupt auch ohne Mathematik möglich, aber eine reine Naturlehre über bestimmte Naturdinge ist nur mittelst der Mathematik möglich, und da in jeder Naturlehre nur eine eigentliche Wissenschaft angetroffen wird, als sich darin Erkenntniß a priori befindet; so enthält Naturlehre nur so viel eigentliche Wissenschaft, als Mathematik in ihr angewendet werden kann. Kann daher nach diesen Principien Chemie, so lange noch für chemischen Wirkungen der Materien auf einander kein Begriff erfunden wird, der sich construiert läßt, nicht als eine eigentliche Wissenschaft, sondern sie muß nur für eine systematische Kunst, oder Experimentallehre gelten, indem die Grundsätze chemischer Erscheinungen ihrer Möglichkeit nach nicht im mindesten begreiflich gemacht werden können und der Anwendung der Mathematik unfähig sind. Noch weiter aber bleibt die empirische Seelenlehre von dem Range einer eigentlichen Naturwissenschaft, weil Mathematik auf die Phänomene des innern Sinnes und ihre Gesetze nicht anwendbar ist; man will denn allein das Gesetz der Stetigkeit in dem Abflusse der inneren Veränderungen desselben in Anschlag bringen wollen, welche Erkenntniß aber zu der, welche die Mathematik der Körperlehre verleiht, ungefähr sich so verhalten würde, wie die Lehre von den Eigenschaften der geraden Linie zur ganzen Geometrie. Denn die reine Anschauung, in welcher die Seelenerscheinungen construiert werden sollen, ist die Zeit, die nur Eine Dimension hat. Aber auch einmal als systematische Zergliederungskunst, oder Experimentellehre, kann die Seelenlehre der Chemie nahe kommen, weil sich in der Mannigfaltigkeit der innern Beobachtung nur durch bloße Gemeintheilung von einander sondern, nicht aber abgesondert aufbauen und beliebig wieder verknüpfen, noch weniger aber ein anderes Subject sich unsern Versuchen, der Absicht angemessen, vorwerfen läßt, und selbst die Beobachtung an sich schon den Zustand des beobachteten Gegenstandes alterirt und verstellt.

weit die Kantische Lehre der Dynamik der Natur. Die von Kant angeregte und größtentheils begründete Naturphilosophie scheidet sich zwar wesentlich von dem Kantianismus, der in der unmittelbar vorhergehenden Zeitperiode die herrschende Ansicht in philosophischen Schulen und Lehrschriften war, dadurch, daß sie im Gegentheile des Uebersinnlichen, was jene, die Vernunftkritik, dem Denker als eine unendliche Leere darstellt, statt des kritischen Skepticismus, Dogmatismus wieder in die von ihm geforderten Rechte einsetzt, daß sie, mit Anerkennung der Schranken, die dem Verstande in der Natur gesetzt sind, ein unmittelbares Vernunftanschauungs-Object für das Allleben, als die Urquelle aller philosophischen Wahrheit, postuliert. Aber auch nach dieser Grundlage erscheint in und durch den menschlichen Geist nichts als in sich nothwendig begründet, was auf mathematische Grundsätze zurückzubringen ist, und

zwar beschränkt sich dieß in dem räumlich Gegebenen einzig auf alles Quantitative bedingenden drei Dimensionen, in dem nicht Räumlichen aber, was dann insbesondere als Dynamisches in der Natur dessen Gegensatz bildet, (wiewohl in einem höhern Sinne es selbe mit befaßt,) auf das einfache Zahlenverhältniß, und da die seiner obersten Grundlage nach, die Verbindung der Zwei durch Eins zur Drei oder zur Triplicität ist, auf das, was wir in einfacher Anschauung a priori von der Dyas und Trias an sich, und in der Verbindung in der weiteren Combination als nothwendig erkennen.

Da, von diesen höhern Naturansichten geleitet, die Erkenntniß Lebendigen, als eines solchen, oder in seiner Nothwendigkeit und Entstehung und Erhaltung nach, im Werden und im Seyn, erlangt wird; so wird auch die Anwendung der Dynamik auf Erscheinungen des Lebens, oder auf die Welt überhaupt, als ein Leben, als die Lehre des Dynamischen Processes bezeichnet, unter welchem Artikel die weitere Ausführung des hierher Gehörigen gegeben werden wird.

**Dynamiker**, s. Dynamische Physiologen.

**Dynamis**, (*Dynamis*,) nach dem gleichlautenden Griechischen Worte <sup>1</sup>, s. Kraft.

<sup>1</sup>) *δυναμις*.

**Dynamische Bewegung** <sup>1</sup>, Dynamische Phoronomie (*Phoronomia dynamica*.) Ursprüngliche Bewegung <sup>2</sup>, Bewegung, wo das Bewegende nicht selbst schon ein bewegter Körper sondern eine bewegende Kraft ist. Vgl. Bewegung.

<sup>1</sup>) — <sup>2</sup>) Burdach's Encycl. d. Heilwiss. 1. B. S. 188 u. Inhalt. S. 1.

**Dynamische Bildung**, (*Dynamica formatio*.) wird als jene Bildungsweise organischer Körper unterschieden, aus der ausgezeichneten Qualitäten der Gebilde hervorgehen. Der Gegensatz ist mechanische Bildung. Ueberhaupt ist aber dieser Ausdruck uneigentlich. Vgl. Bildung.

**Dynamische Erscheinungen** <sup>1</sup>, (*Dynamica phaenomena*.) Naturvorgänge, in denen Kräfte freiwaltend hervortreten. Vgl. Dynamik.

<sup>1</sup>) Burdach's Encycl. d. Heilwiss. 1. B. S. 179.

**Dynamische Kraft**, (*Dynamica vis*.) wird, namentlich nach Weber <sup>1</sup>, mit Beschränkung des Begriffs Dynamis, auf die in der Natur wirkende Naturkraft oder Bewegungskraft, im Gegensatz der physikalischen mechanischen Kraft, zur Bezeichnung der physisch-immanenten Kraft gebraucht.

<sup>1</sup>) In seiner Abh. v. dynam. Leben.

**Dynamische Natur** <sup>1</sup>, (*Dynamica natura*.) diejenige Natur eines Naturwesens, nach welcher sich die Natur freithätig zeigt. Vgl. Dynamik.

<sup>1</sup>) Burdach's Encycl. d. Heilwiss. Inh. S. XIX.

**Dynamische Naturerklärung**, (*Dynamica expositio* <sup>1</sup> *rae*.) Erklärung und Darstellung von Phänomenen der Natur nach ihren Kräften. Vgl. Dynamik.

<sup>1</sup>) Sprengel inst. med. T. I. p. 84.

**Dynamische Phoronomie**, s. Dynamische Bewegung.



**Dynamische Physik**, oder **Physiologie**<sup>1</sup>, (*Dynamica physiologia*.) Bearbeitung der Naturlehre überhaupt, oder auch der Physiologie des Menschen insbesondere, nach den Grundsätzen der **Dynamik**.

(Winkelmann's Einl. in d. **Dynamische Physiologie**, Göt. 1803, 8. **Dynamische Physiologen**, **Dynamiker**<sup>1</sup>, (*Dynamici*.) Physiologen, welche in Erklärung und Ansichten von Erscheinungen menschlichen Körpers zunächst die Thätigkeiten desselben im Auge berücksichtigen. Vgl. **Dynamik**.

(Burdach's Literat. d. Heilk. 1. B. S. 105.

**Dynamische Schulen**<sup>1</sup>, Lehrmeinungen, bei denen die Kräfte der Natur und des Körpers zunächst berücksichtigt wurden. Vgl. **Dynamik**.

(Sprengel's Vers. einer pragm. Gesch. d. Heilk. 5. Th. S. 8.

**Dynamische Thätigkeit**, s. **Kräfte**.

**Dynamischer Proceß**<sup>1</sup>, **Dynamismus**<sup>2</sup>, (*Dynamicus processus*, *Dynamismus*.) Wenn wir von irgend einem Erzeugniß menschlicher Kunst seinem Entstehen nach Kenntniß erlangen wollen; erkundigen wir uns nach dem Verfahren des Künstlers bei seiner Fertigung. So setzt ein Chemiker durch Mittheilung des Proceß bei Vereitung eines chemischen Products andere in Stand, es selbst zu produciren, da hingegen für den, der diesen Proceß nicht kennt, dasselbe auch seiner Natur nach unbekannt bleiben muß.

Wenn wir aber irgend ein Naturproduct seiner Entstehung nach erkunden wollen, so steht unserer Anfrage nicht, wie dort, ein productiver Künstler Rede. Nur in unserer Vorstellung sondern wir die Natur, als Thätigkeit, oder als schaffendes und bildendes Princip, von der geschaffenen und gebildeten Natur selbst, und unterscheiden, wie die Scholastikern zu reden, eine *Natura naturans* und eine *Natura naturata*. An sich ist die Natur aber ein großes ungetheiltes und untheilbares Ganzes, und wir, mit allen unsern Vorstellungen und unserer geistigen Thätigkeit überhaupt, sind ja selbst ein Theil in und von ihr. Aber schon darin, daß wir fragen können, ja daß wir uns sogar nach Gesetzen unsers geistigen Wesens zu fragen genöthigt fühlen, liegt auch die Andeutung, daß keine Antwort werden werde, und zwar eine solche, wie sie uns nach unsern Bedürfnissen, nach den Bedingungen unsers Seyns, genügt. In der Verkennung und Mißverstehen dieser Bedingungen lassen uns zur Unzufriedenheit verleiten, wenn die uns werdende Antwort unserer verkehrt gestellten Frage nicht entspricht.

Es gibt entweder gar keine Kenntniß der Natur, und also auch kein Bewußtseyn, (welches aber der nach Wahrheit forschende Geist, wenn er auch alles übrige verläugnet und verkennt, doch durch sich nicht abzuläugnen vermag,) oder jede Naturkenntniß, zu der wir gelangen, ist eine Selbstoffenbarung der Natur. Ja, wenn der Mensch, wie innere tiefe Anregung seines Gemüths genöthigt, noch jenseit aller Natur ein göttliches Urwesen anerkennt, so würde er dieß, wenn es auch unmittelbar mit ihm spre-

(Schelling's allg. Deduction des Dynamischen Processes in dessen Zeitschr. für speculative Physik. 1. u. 2. B. 2) Russische Sammlung f. Naturwissensch. und Arzneik. 2. B. 1. St. S. 27.

chen wollte, nicht anders als in Naturoffenbarungen vernehmen, wenn der Gottgesandte Bote auch ein Engel des Himmels wüßte, er doch mindestens in Licht sich kleiden, oder dem menschlichen Ohr in harmonischen Tönen sich verkünden, ja auch die innere Fulguration unmittelbarer göttlicher Inspiration könnte nicht anders als in einem menschlichen Gedanken ausgeprägt, den innern Sinnen erleuchten. Auch coincidirt das göttliche Wesen als bloßer Gegenstand einer Verstandeserkenntniß mit dem obersten Naturprincip selbst.

Auf solche Weise ist es immer die Natur, die, uns offenbar redend, auch selbst zu uns redet, und es kommt bloß darauf an, sie zu verstehen, nicht mehr und nicht weniger in ihre Antworten legen, als sie wirklich enthalten.

Zwei Wege sind es aber, die uns zur Naturkenntniß hinführen, indem schon hier, bei der ersten aller Fragen, sich, wie überall, uns das Erforschen, wie unserm Verlangen ein Doppelweg eröffnet: Wahrnehmung und Speculation. Erstere berührt zunächst unsern Sinn, und ist, wenn wir auf nichts weiter als unsere Sinnesempfindungen achten, als solche, immer rein, indem nur der Verstand seinen Folgerungen auf Irrthümer geräth. So ist der unsrer Ansicht darstellende siebenfarbige Regenbogen, auf dem Standpunct unserer Anschauung, eine unlängbare Wirklichkeit; nur in den Lüften hat er nirgends, wohin ihn das Kind, oder der rohe Naturmensch, voreiligem Verstandesgebrauch setzt.

Letztere ist, nach der Urbedeutung des Worts, ein inneres Anschauen, ein unmittelbares Erfassen des Wahren, und ebenfalls in ihren Verbindungen mit den Wahrnehmungen des äußern und innern Sinnes und mit den Phantasiebildern, deren Elemente aber immer frühere in dem Gedächtniß aufbewahrte Sinnesindrücke sind, dem Irrwahn bloß gestellt, auf daß der Mensch in steter Uebung seiner Kräfte zur Bekämpfung und Entwirrung von Täuschung und Trug erhalten werde.

Von außen, in der Wahrnehmung, oder der Erfahrung, tritt sich die Natur dem Menschen in ihrer Mannigfaltigkeit, in der Fülle ihres Reichthums, von innen aber, oder in der Speculation in ihrer Einheit, in ihrer Geschlossenheit dar. Beide Urquell der menschlichen Erkenntniß vereint so zu benutzen, daß eine die andere nicht trübt oder beeinträchtigt, daß dann zugleich die eine das, was die andere versagt, in voller Strömung darbietet: dieß ist die große Aufgabe, auf welche die Bemühungen der Weisen aller Zeiten gerichtet waren, die, befriedigend zu lösen, aber der menschliche Geist im großen Völkerleben selbst erst einer gewissen Reife bedurfte, deren auch unser Zeitalter sich wohl nur erst theilweise zu erfreuen beginnt.

Fragen wir nun die Natur nach ihrem Verfahren bei den Naturvorgängen, so zeigt uns die Wahrnehmung wohl, wie in der Natur eines nach dem andern wird; sie belehrt uns, daß, wenn das Samenkorn in fruchtbare Erde eingesenkt wird, eine Pflanze daraus herangereift, wieder fruchtbaren Samen trägt u. s. w.: aber das Verborgene, die innere Nothwendigkeit der Entstehung und Erhaltung, bleibt auf diesem Wege verschlossen, und wir müssen, um sie zu erkennen,



entgegengesetzten Weg einschlagen, von der Einheit, die zunächst dem Gefühl unserer eigenen Individualität in unserem Bewußtseyn bezeugt, anheben, und von da aus, von dem in sich Bestimmten und gleich dem Centrum einer Kugel Unverrückbaren, uns der Mannigfaltigkeit und Unbestimmtheit sich darstellenden Außen-zukehren.

Indem dann in diesem Fortschreiten des Geistes, von der Tiefe, der Centricität des eignen Seyns aus, ihm von dem allumfassenden Naturleben so viel in klarer Anschauung, und unabhängig von der Erfahrung, (wiewohl mit ihr in Uebereinstimmung und ihr bestätigt,) sich darbietet, als wir überhaupt, nach den menschlichen Bedingungen unserer Organisation, zu erfassen vermögen, das, was bei allen Vorgängen in der Natur grundgesetzmäßig ist, als solches auch einleuchtet, veroffenbart sich die Natur selbst in einem geistigen Proceß, den wir, weil er in jedem Vernunftseyn derselbe ist, weil er uns mit der ganzen Natur in Harmonie weil die Natur, bei der Annahme, daß sie eine andere sei, wie sich auf diesem Wege uns offenbart, mit uns außer allem Zusammenhang, oder für uns gar nicht vorhanden, ein relatives Nichts seyn läßt, als einen durch das ganze Weltall gleichen und übereinstimmenden Vorgang anerkennen müssen, und der in der Schulsprache der neueren Naturphilosophie als *Dynamischer Proceß* bezeichnet wird. Unter dem Artikel *Dynamik*, ist gezeigt worden, wie nach einer höhern und allumfassenden Naturansicht das Seyn, (im Sinne die Materie) überall und nothwendig ein Werden oder Bilden, oder eine Thätigkeit voraussetzt, und wie Kraft auf keine Weise als ein Attribut der Materie angesehen werden könne. Betrachten wir aber Kraft als Primäre oder Ursprüngliche; so können wir nicht anders uns mit der Natur verständigen, als in Unterscheidung einander entgegengesetzter, (attractiver und repulsiver,) Kräfte. Jedoch auch durch Vergleichung beider Gegensätze von Kraft kann nichts als Beschränkung der einen durch die andere, oder auch völlige Indifferenz beider hergeleitet werden. Noch ist für die Vorstellung nichts in der Natur vorhanden, so lange wir nicht ein Etwas als ebenfalls primär erkennen, worin jene Kräfte sich äußern. Mit einem Wort, so wenig wir eine Materie uns denken können, der die Kraft, oder mehrere Kräfte secundär beigelegt werden; so wenig können wir es als in einem reinen Verstandesbegriff mittelst der Abstraktion uns eine Kraft oder Kräfte denken, die durchaus im Thätigen walten. Wir unterscheiden also in unserm Bewußtseyn, so wie wir solches auf das Äußere lehren, zwei Gegensätze: *Materie* und *Kraft*, aber nicht in zufälliger, sondern in nothwendiger Verbindung. Dieses hinzukommende Dritte, (die *Copula* oder das *Bindeglied*) ist weder das Eine noch das Andere, es ist weder der Zusammenschluß beider allein, noch aus beiden erst als Erzeugniß hervorgegangen, sondern mit jenen von durchaus gleicher Dignität. In unseren Vorstellungen liegen jenen Gegensätzen zwei Formen der Anschauung der nothwendigen Erkenntniß, der *Materie* der *Raum*, der *Kraft* die *Zeit* zum Grunde. Das Bewußtseyn selbst ist aber die *Copula*, durch welche jene Anschauungen vermittelt werden.

ut. physiol. Realw. II. B.

In der äußern Natur aber ist es die Bewegung nach ihren unendlichen Richtungen, welche Materie und Kraft in Verbindung bringt.

Sonach ist es Einheit des Seyns, oder nothwendige Synthese zweier Gegensätze, durch ein Bindemittel, also Triplieität, der aus die Natur erst für unser Erkenntnißvermögen anhebt, oder mit andern Worten, das Radical, bis auf welches wir alle Naturgänge, um von ihnen eine wissenschaftliche Kenntniß zu erlangen, rückführen müssen. Mit dem Versuche einer Auflösung dieser Triplieität aber verschwindet der Gegenstand selbst, und der Verstand kennt die einzelnen Elemente, aus der sie hervorgingen, als so nur durch die Fähigkeit, die ihm verliehen ist, sie eben so leicht, er sie durch sein Abstractionsvermögen sonderte, auch wieder zur Vorstellung eines realen Gegenstandes zu verbinden. So hat jede drei Linien, die einen Triangel bilden, für sich auch nicht die mindeste Andeutung von einem Winkel, die erst in der Zusammensetzung jener, als nothwendige Bedingungen der triangulären Fläche, mit der selbst in die Erscheinung treten.

Diese Triplieität, als Urbedingung aller Erkenntniß, tritt am ersten in der äußern Natur in den drei Dimensionen des Raumes Länge, Breite und Tiefe, hervor, in dem innern Sinne aber, in der Anschauungsform die Zeit ist, als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So wenig dort für das Seyn eines Körpers eine Dimension fehlen kann, (obgleich der Geist, da das Vorstellungsvermögen den Bedingungen der Körperwelt nicht unterworfen ist, der letzten, oder auch von beiden letztern, ja selbst von allen drei in der reinen Vorstellung von Fläche, von Linie und von Punkt abstrahiren vermag;) so wenig ist ein Verrücken der drei Elemente der Zeit ohne Aufhebung des Bewußtseyns selbst möglich und in der Nothwendigkeit der Succession des in der Zeit Befasteten, gegen die Willkürlichkeit der Zusammenstellung des Körperlichen, (da die Länge eben so gut die Breite, oder die Tiefe, und so auch gegenseitig jede Dimension die andere werden kann, wie bei der willkürlichen Stellung eines Würfels auf eine Horizontalfläche,) stellt sich die Prävalenz des Gegenstandes des Räumlichen und des in dem Raum Enthaltenden, nämlich die Prävalenz der Zeit und des die Zeit Erfüllenden, Dieses Zeit Erfüllende ist nun aber eben Kraft im allgemeinen. Die unmittelbare Manifestation ist das Werden, das Vorrücken der Vergangenheit durch die Gegenwart in die Zukunft, der Gegenstand dieser aber das Seyn, das Verharren in der Zeit, welches bloß auf Materie, (relativ,) anwendbar ist. Dem Seyn muß immer das Werden als nothwendig beigelegt, und diesem immer vorausgehend gedacht werden, also erscheint auch die Materie als Kraft immer nachstehend, obgleich die nothwendige Synthese des Seyns nicht erlaubt, auf eine uns verständliche Weise die Kraft in der Vergangenheit von der Materie getrennt zu erachten. In dieser Prävalenz wird die Kraft auch als absolute Thätigkeit, Freiheit, Thätigkeit bezeichnet. Aus der Einsicht einer freithätigen Kraft in der Natur, jedoch nicht zum eigenen Bestehen, sondern ihrer Manifestation in der Materie, in nothwendiger Verbindung dieser, durch eine Copula beider zur Trias, entsteht nun die An-



des absoluten Lebens, das nichts anders ist, als die Natur selbst, aber zunächst von ihrer dynamischen Seite aufgefaßt. Dieß ist also die erste Idee, welche das Selbstbewußtseyn durch Speculation auf dem Wege seines eigenen geistigen Processes gewinnt, die erste Offenbarung der Natur in dem Bewußtseyn des menschlichen Geistes, nämlich: die Natur ist ein Alles nach außen und nach innen und in nothwendiger Verbindung einer äußern, (physischen,) und einer innern, (geistigen,) Welt sich ändernd. Dieses Leben geht von Thätigkeit, vom Werden aus, und indem es das Seyn umfaßt, wird der Urcharakter des Seyns, das Verharren, (die Idee als Gegensatz der Bewegung,) immer theilweise aufgehoben; das Seyn hat überhaupt nur relativ ein Bestehen, in so fern es der Vergangenheit zur Zukunft in der Gegenwart einen Uebergang gestattet, und wird selbst zum Werden in Bezug auf ein späteres Seyn, so daß der gegenwärtige Augenblick für den zukünftigen ein vergangenes wird.

Da die Natur überhaupt uns nur in so weit verständlich ist, als unser Bewußtseyn nur als einen Refler derselben anerkennen; so sehen wir auch die Vorstellung eines dynamischen Processes, eines Vorganges, bei dem das Freithätige überall das Supremat hat, wo aber aus der nothwendigen Synthesis tritt, welche nirgends Löslichkeit zuläßt, auf das Alles der Natur über. Dasselbe Grundgesetz, was also in unserer Vorstellung herrscht, ist auch das der Natur, die wir außer uns, als unsern eignen Gegensatz, der absoluten Einheit und Centricität, als All, als Unendliches denken können.

Wenn wir nun in den einzelnen Seiten, welche die Natur uns zur Beobachtung oder zur Erforschung darbietet, sie ihrem Princip oder ihrer innern Nothwendigkeit nach erkennen wollen, haben wir eben keinen andern Maßstab, als diesen, aus unserem Bewußtseyn genommen, auf die Natur in ihrer Unendlichkeit übergetragenen dynamischen Proceß, nämlich die Annahme eines Freithätigen, eines Schaffenden, sich in der Zeit für die schärfere Wahrnehmung nur auf ein Moment als ein Seyn Darstellenden, dieses Seyn zu Begründung eines spätern Seyns unanshörlich in sein Schaffen für spätere Aufnehmenden. Ohne diese durchgängige Anwendbarkeit auf die Erscheinungen in der Natur würde es nicht als Grundgesetz Gültigkeit behaupten.

In jedem einzelnen Gegenstand der Naturforschung ist also Productivität, oder ein Werden, aus innerem Vermögen, und ein Product, oder ein Gewordnes, aber nicht in Geschiedenheit, sondern in ihrem Zusammenhang unterscheidbar. Die Productivität ist, eben so ursprünglich als sie selbst ist, eben so ursprünglich auch wieder gehemmt, eben dadurch kommt es zum Product, aber nie vollkommen. Das vollkommene Product ist gleich der absoluten Ruhe, dem Gegensatz der Bewegung, und da das Leben mit freithätiger Bewegung ist; so ist ein vollkommenes Product in der Idee auch gleich dem absoluten Tode.

Diese Ruhe, als Charakter des Todten, ist die Grundeigenthümlichkeit der Materie; eine bewegte Materie tritt als solche auch schon

in das Leben ein, und da es keine absolute Ruhe gibt, ist auch die Materie belebt und nur relativ eine todte. Ueber ihre Construction oder Bildung können wir durchaus keine Begriffe bilden, als die Anwendung der Grundsätze des dynamischen Processes.

Je mehr ein einzelnes Naturwesen in sich ein abgeschlossenes oder je geringer die Bande sind, welche es an die übrige Natur knüpfen; desto mehr ist die Triplität seines Seyns als Grundcharakter des dynamischen Processes in ihm vorwaltend. Die allgemeine Naturthätigkeit objectivirt sich zunächst in Massenproduction, wie in den großen Weltkörpern, in denen die Schwere als Hineinziehung zur Centralität, zur Ruhe das vorwaltende Princip ist, die jedoch auch sich in den Kreisbewegungen der Himmelskörper als Centralkraft (Centripetal- und Centrifugalkraft in Verbindung,) in der Triplität selbst ins Leben tritt. Aber auch in den Welträumen selbst stellt sich das Licht, als rein Unkörperliches, und Gegensatz der Schwere in Freithätigkeit dar, dessen innere Triplität unter andrer Wiederholung wieder in den drei Grundfarben des Farbencirkels sich andeutet. Das Licht ist aber zugleich auch das Erweckende aller vorwaltenden Thätigkeit in der Natur. Ueberall, wo ein Freithätiges in der Natur hervortritt, ist es dem Gesez der Schwere entgegengetreten, und hat, wie das Licht, peripherische Tendenz; so der Schall, die Wärme, welche wieder mit dem sichtbaren Lichte, nach der Verschiedenheit der davon afficirten drei Sinne, eine Triplität der Lichtprincips bilden; durch die Verschiedenheiten der Hemmungen der Productivität in den einzelnen Gebilden treten diese selbst in ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit hervor. Immer ist bald das Schwerkraftprincip, nach den verschiedenen Cohäsionsverhältnissen der Körper in fester, in tropfbar flüssiger und in Gasform bildend, bald das Lichtprincip, und jedes wieder in verschiedenen Richtungen, die alle unter dem Gesez der Triplität stehen, unterscheidbar. Durch das Vorwalten des Lichtprincips entstehen die unendlichen Formationen der Natur nach Typen, wofür die reinen Anschauungen sich auch in der höchsten Freithätigkeit des Lichtprincips, in dem menschlichen Vorstellungsbildern mögen finden. So waltet ebenfalls das Lichtprincip freithätig als Bildungstrieb, von seiner peripherischen Richtung wieder in sich zurückkehrend, und zur Vollendung der Triplität im Durchbruch der Idee sich selbst erkennend, in den Crystallisationen des sogenannten anorganischen Reichs, (eigentlich des organischen Reichs auf seiner niedrigeren Stufe,) noch mehr aber in den Formationen der Pflanzen- und Thierwelt. Wegen der Einverleibung des Körperlichen in der Idee, tritt diese, auch wo sie noch so freithätig auftritt, doch nicht abstrahirt auf und darf, treten auch die Dimensionen des Raums in der Natur auch als Erscheinung sich als solches manifestirenden Thätigen vor; so präcellirt die erste Dimension der Länge in der Magnetismus, die zweite, der Breite, in den einfachen Phänomenen der Electricität, die zunächst auf den körperlichen Flächen hervortritt, die dritte, der Tiefe, oder des Cubischen überwiegt in den Vorgängen des Chemismus, wo die Urkräfte der Attraction und Repulsion sich als chemische Affinität und Scheidung wiederholen und steigern.



Es kann hier nicht gefordert werden, den dynamischen Proceß in allen Entfaltungen des Naturlbens nachzuweisen, (wozu in Hinsicht der thierischen Organismen mehrere einzelne Artikel dieses Werks näher Gelegenheit geben,) und es können hier überhaupt nur, nach Feststellung der Principien, allgemeine Andeutungen der Anwendung gegeben werden. In dem höhern Thier- und dem menschlichen Leben besonders ist die, auf somatischer sowohl als psychischer Seite, allen Erscheinungen zunächst zu Grunde liegende Triplicität in der Sensibilität, Irritabilität und Reproduction, (Vegetabilität, Plastik,) unverkennbar, so daß alle Mannigfaltigkeit der Lebenskräfte und lebendigen Erzeugnisse bloß durch ein abweichendes Verhältniß dieser drei Bedingungen entsteht; wie denn auch dieselbe Trias im rein geistigen Leben als Receptivität, (Fähigkeit der Auffassung der Außenwelt und Aufnahme derselben in das eigene Bewußtsein,) in Sinn und Erkenntniß, als Spontaneität, (Fähigkeit der Beherrschung der Außenwelt durch Eingehen des eignen Wesens auf dieselbe,) in Wille und Handeln überhaupt, und in der Identifizirung des eignen Wesens mit der Außenwelt in Gemüthlichkeit, mündet durch Aufhebung einer Spannung, hervorgetretener Gegenstand, welches Grundcharakter aller sinnlichen Lust ist, bei der die höchste geistesthätigkeit zurückgedrängt wird,) wieder findet, ja von der Zukunft, als der höchsten Entfaltung der Psyche und also auch der geistesthätigkeit, außerhalb aller Schranken der sinnlichen Natur in ein ideelles Leben versetzt, uns von da her in den drei Idealen Wahrheit, der Güte und der Schönheit wieder herabführt.

(5)

**Dynamisches**, s. Kraft.

**Dynamisches Leben**, (*Dynamica vita*), das Leben von seiner dynamischen Seite. Vgl. Dynamik.

Weber vom Dynamischen Leben der Natur, Landsh. 1816, 8.

**Dynamisches Verhältniß**, (*Dynamica relatio*), das gegenwärtige Verhältniß von Kräften überhaupt. Vgl. Dynamik.

Bürdach's Enchel. d. Heilkunst. 1. B. S. 178.

**Dynamismus**, (*Dynamismus*), s. Dynamischer Proceß.

**Dynamisten**, (*Dynamistae*), Naturlehrer, welche, im Gegensatz der Atomisten, die Naturerscheinungen einzig aus Naturkräften ableiten. Vgl. Dynamik.

**Dynamologie**, (*Dynamologia*), Lehre von den Kräften. Physiologie.

**Dynamometer**, (*Dynamometrum*), Kräftemesser. In diesem erst in neuerer Zeit gebildeten Worte bezeichnet man ein Instrument, das dazu dient, die Muskelkräfte eines Menschen oder Thieres, (so wie aber auch anderer, auf einfache Bewegung eines Gewichtes gerichteter Kräfte,) in Vergleichung mit andern, nach Graden zu bestimmen.

Morelli war der erste, der es unternahm, die Muskelkräfte in den

willkürlichen Bewegungen der Thiere zu schätzen<sup>1</sup>, De la Hire und Desaguliers<sup>2</sup> haben sich mit demselben Gegenstand beschäftigt. Coulomb<sup>3</sup> unternahm es insbesondere, nach Beobachtung und Rechnungen zu bestimmen, welche Summe von Kraft den Menschen für eine tägliche Handarbeit zu Gebote steht; je nachdem Art, wie sie diese betreiben, verschieden ist.

Es kommt hier nicht darauf an, den wirklichen Betrag von Kraftwand bei Contractionen von Muskeln zu bestimmen, der nach mechanischen Gesetzen der Hebelwirkung bedeutend beträchtlicher als er sich in der Wirkung auf eine dadurch wirklich bewegte darthut, sondern bloß auszumitteln, welche Lasten ein Mensch auch ein Thier durch einfachen Gebrauch seiner, der willkürlichen Bewegung fähigen Körpertheile, ohne Beihülfe von Maschinen, zu wegen vermag, und dieß zwar in Vergleich mit andern Menschen Thieren, oder auch mechanischen Bewegungskräften.

Dieser Betrag deutet sich auf einfache Weise durch das Gewicht der bewegten Körper, wenn es überhaupt zur Bewegung geeignet und keine Vortheile der Bewegung mit der einfachen darauf gerichteten Kraftäußerung in Verbindung gebracht werden, in Ziehen, Ben oder Drücken, oder auch durch die Geschwindigkeit und W mit der, und bis zu welcher, ebenfalls auf einfache Weise, ein ruhender Körper bewegt wird, im Stoß oder Wurf, an. So ist die Muskelkraft eines Menschen, der zwei Centner hebt, noch einmal so stark als die eines Menschen, der einen Centner hebt, und das Gewicht gehobenen Körpers gibt hier den Kräftermesser ab, oder die Weize, zu der auf einer glatten horizontalen Fläche eine Kugel durch einen Wurf oder Schlag getrieben wird, deutet eben so in Hinsicht der ihr sich prüfenden Kräfte das Größenverhältniß dieser selbst an, kann nach einer Scale bestimmt werden.

Insbefondere hat man aber den Namen Dynamometer nach solchen Instrumenten gegeben, die eine Vorkehrung haben, wodurch der Grad der Kraft, der auf die Ausdehnung ihrer Theile gerichtet ist, mittelst eines Zeigers auf einer dafür eingerichteten Scale ben wird. In dieser Art wurde von Regnier, (Conservateur du pôt central d'artillerie,) im Jahr 1807 ein von ihm erfundenes Instrument dieser Art der medizinischen Facultät zu Paris vorgelegt. Nach mehreren Versuchen hiermit fand er, daß ein Mann von 23 bis 30 Jahren in dem Besitz seiner vollen Muskelkraft ist, und mit seiner durch einfachen Druck mit beiden Händen eine Kraft übt, 50 Kilogrammen, (100 Pf.) gleich ist, und daß derselbe 13 Kilogrammen, (265 Pf.) zu heben vermag; daß er ferner diese Kraft etwa zum 50sten Lebensjahre behält, von wo an sie sich allmäh-

1) In seinem bekannten Werke de motu animalium. 2) in einer Abhandlung Examen de la force de l'homme etc., in den Mém. de l'acad. des sciences, 1699. 3) Courte of experim. philos. T. I. 4) Mém. de l'acad. des sciences, 1701. 5) S. die Beschreibung des Mechanismus dieses Instruments, mit Beifügung zweier Kupfertafeln, auf welchen die Construction derselben, wie auch seine Anwendung anschaulich gemacht ist, im 10. Band des Dictionn. méd. unter dem von Berardren bearbeiteten Artikel Dynam.



hundert. Die Stärke einer Frau schätzt er der eines jungen Mannes von 15 — 16 Jahren gleich, oder auf  $\frac{2}{3}$  von der gewöhnlichen Stärke eines Mannes.

Kérón benutzte den Dynamometer von Regnier, um auf seiner Entdeckungstreife in den Australländern die natürliche Körpergröße der Eingebornen von Neuhoiland und der Insel Timor mit der der Schiffsmannschaft in Vergleich zu bringen <sup>6</sup>. Er unterscheidet die Stärke der Hände, (im Heben,) und Kräfte der Lenden, (im Ziehen.) und fand, daß die physische Kraft der Eingebornen von Neuhoiland auf 80 Kil. 8, und 14 Myr. 1, die der Malaien auf Timor zu 58 Kil. und 16 Myr. 2 anzuschlagen sei, wegen die mittlere Stärke der Hände von 17 Franzosen von der Expedition das Resultat von 114 Kil. 2, und die der Lenden das von 22 Myr. 1 gab. Der Capitän Ransonnet stellte auf der Rhebe von Havre die dynamometrische Experimente an, und fand, daß von 345 Individuen von der Mannschaft mehrerer Fregatten die mittlere Stärke der Menschen von 25 — 45 Jahren nur 46 Kil. 3 für die Hände und 114 Myr. 2 für die Lenden betrug <sup>7</sup>.

Indessen ist nicht zu verkennen, daß die hierzu benutzbaren Instrumente in ihrer Construction nicht diejenige Genauigkeit haben, die eine scharfe Berechnung in der Vergleichung zuzulassen, daß selbst der verschiedene Bau der Hände, so wie insbesondere die verschiedene Länge der Finger, Einfluß auf das Resultat beim Gebrauch haben.

Nach darf nicht übersehen werden, daß die Muskelkraft in den verschiedenen Körpertheilen bei verschiedenen Menschen nicht eben in demselben Grade größer oder geringer sei, und von einer auf die andere geschlossen werden könne. Die Unterschiede hängen theils von der Verschiedenheit des Baues, theils von der mehrern oder mindern Übung ab. Manche Personen heben mit mehrerer Leichtigkeit große Lasten, andere mit größerer Schnelligkeit laufen, oder einen größern Sprung und in größerer Höhe überspringen. Auch sind die bekannten Theile für Bewegung von Lasten in Betrachtung zu ziehen, die der Träger, Equilibristen, Kunsttänzer u. s. w. in Anwendung bringen, um das Resultat ihrer Kraftäußerung noch zu erhöhen und die auf Rechnung der körperlichen Gewandtheit als der eigentlichen menschlichen Kraft kommen.

Hierdurch wird die Anwendung mechanischer Werkzeuge zur Abminderung von Muskelkraft noch beschränkter; für ganz einfache Bewegungen aber scheint das Gewicht eines gehobenen oder geschobenen, gezogenen Körpers, oder die Weite seiner Fortrückung auf einer ebenen Ebene, nachdem der Widerstand der Reibung, wie wenn der Körper Kugelform hat, auf das geringste gebracht ist, einen eben so genauen Maßstab abzugeben, als jene kunstreichen Erfindungen. (h)

<sup>6</sup> Desf. Relation du voyage de découvertes aux terres Australes, Vol. I., u. Bulletin des sciences méd. Act. 1803, Vol. 2. p. 387. <sup>7</sup> Essai de Reflexions sur les expériences dynamométriques de M. Ransonnet, par Keraudren, Im Jour. de med. Mar. 1812, p. 41.

*Dyspathia*, nach dem Griechischen gleichlautenden Worte <sup>1</sup>, i  
 Impatientia. S. Ungeduld.

<sup>1</sup>) δυσπαθεια, im Gegensatz von ευπαθεια. (Galenus de usu part.  
 c. 15.)

*Dysthesia*, *Dysthymia*, nach den gleichlautenden Griechis  
 Worten <sup>1</sup>, vgl. Unmuth.

<sup>1</sup>) δυσθesia, δυσθυμια. Erotiani onom. et Fossii oecan. H  
 h. v.



## E. E.

**E**, der zweite Selbstlauter im Sprechen, der vom **U** zum **I** natürlichen Uebergang macht, indem die Zunge dabei etwas mehr anheben und den Zähnen genähert, ober der Zungencanal, d. i. der Raum, den die Zunge der Stimme für den Durchgang läßt, etwas enger als beim **U**, nicht aber so viel als beim **I** verengt wird, auch die Lippen sich mehr als beim **U**, weniger aber als beim **I** schließen. Man unterscheidet in allen Sprachen mehrere Nuancen des **E** und meist ein helles, ein geschärftes und ein dumpfes; ohne Diphthongen **Ae**, **Ei** und **De** als Uebergänge zu **A**, **I** und **O**. **E** nach **e**.

**Ascites**, ein corruptes Wort, s. **Asci**.

**Papierne Knochen des Siebbeins**, s. **Papierne Knochen**.

**Ebriecator**, s. folgendes Wort.

**Ebriecatum**, ein Paracelsischer Ausdruck, wird der menschlichen Weisheit, (*humana sapientia*), als fremde Weisheit (*aliēna sapientia*), entgegengesetzt, wie der Wein in der Trunkenheit (*ebrietas*) bewirkt. Paracelsus unterscheidet fünf Arten der Weisheit, die er in der von ihm entworfenen *Figura scientiarum astrologicae* als das dritte Glied aufstellt. Sie sind *Ebriecata* oder *Intusmania*, *phrenesis*, *phantasmata*, *imaginatio* und *imitatio*. An einem andern Orte<sup>2</sup> handelt er auch von einem *Ebriecatio coelesti*. Ein mit solcher Weisheit versehener wird *Ebriecator*, *ebriecatus* genannt. S. unter **Theosophistische Systeme** **Natur**, **Paracelsisches System**.

**Philos. sagac.** 1. 1. c. 5. 2) 1. c. 1. 2. c. 5.

**Ebrietas**, s. **Trunkenheit**.

**Ebriositas**, s. **Saußucht**.

**Ebriosus**, s. **Trunkenbold**.

**Ebullition**, (*Ebullitio*.) s. unter **Effervescenz**.

**Cornea substantia dentium**, s. **Schmelz der Zähne**.

**Eccrisis**, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte<sup>1</sup>, s. **Excrisio**.

**Eccrisis**.

**Eckel**, s. **Eckel**.

**Eckzähne**<sup>1</sup>, **Spitzzähne**<sup>2</sup>, **Hundszähne**<sup>3</sup>, **Winkelzähne**<sup>4</sup>, (*Dentes canini*<sup>5</sup>, s. *angulares*<sup>6</sup>, s. *cuspidati*<sup>7</sup>, s. *laevissimi*<sup>8</sup>, s. *mordentes*, s. *columnellares*<sup>9</sup>, s. *fractorii*<sup>10</sup>, s. *colleae*<sup>11</sup>, *Cynodontes*<sup>12</sup>), die in jeder Zahnreihe zwischen den Vorder- und Backzähnen befindlichen einzelnen Zähne, die sich von Linné's Gesch. u. Besch. d. Th. 5. 131. 2) Meibom's 3) Meibom's 4) Meibom's 5) 4) Meibom's 6) 4) Meibom's 7) 4) Meibom's 8) 4) Meibom's 9) 4) Meibom's 10) 4) Meibom's 11) 4) Meibom's 12) 4) Meibom's

den erstern durch ihre conisch zugespitzte Krone, von den letztern aber gleich durch ihre einfache Wurzel auszeichnen, und vorzüglich Kränzen zum Festhalten und kräftigen Abbeißen und Zerreißen der Nahrungsmittel bestimmt sind. Die in der obern Kinnlade führen den Nahmen Augenzähne<sup>1)</sup>, (Dentes oculares.) S. Zäh

15) Vgl. dies Wort.

*Ecphyas*, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte<sup>1)</sup>, i. *Ecphysis*, im allgemeinen ein Anhang.

1) *εκφυας*. Vgl. C. Hoffmanni comm. in Galeni de usu part. l. n.

*Ecphysexis*, beßgl.<sup>1)</sup> ein heftiges Ausathmen oder vielmehr sen. Vgl. *Erspiration*.

1) *εκφυσεξις*. Galen (de usu respir. l. c. 2 et de loc. affect. l. 4.) unterscheidet wieder zwei Arten *ψωφωδης* und *αψωφωδης*, mit und ohne Geräusch.

*Ecphysis*, beßgl.<sup>1)</sup> irgend etwas auf eine natürliche Weise einem andern hervorgewachsenen, und gleichsam Anhang desselben oder ein daran Erzeugtes, insbesondere gleichbedeutend mit *Apophysis*.

1) *εκφυσις*. (Galenii admin. anat. l. 2. c. 5.)

*Ecphysis ventriculi*, i. q. Duodenum.

1) *νυατρος εκφυσις* (Galenii de temperam. l. 2. c. 6 et de adm. anat. l. 6.)

*Ecphnoë*, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte<sup>1)</sup>, *Exspiratio*.

1) *εκπνοη*, im Gegensatz von *εισπνοη*. S. C. Hoffmanni comm. in Galeni l. de usu part. n. 474.

*Ecstase*<sup>1)</sup>, (*Ecstasis*<sup>2)</sup>) Entzückung. Ecstase ist der höchste Grad des Affects der Begeisterung, und bezeichnet den Moment, in welchem sie im Begriff ist, in Entzückung überzugehen. Gemüth ist in der Ecstase durch den höchsten Grad der lebhaften Theilnahme an dem begeisternden Gegenstande, diesem so ganz einzig hingegeben, daß es die Sphäre seines innern Seyns mit der äußern Wirklichkeit verwechselt, und wegen des Ueberströmens der innern Gefühle für äußere Empfindungen fast ganz unempfindlich wird. Im Zustande der Ecstase ist daher die Klarheit des Verstandes dunkelt, und die freie Willkür des Begehrungsvermögens beschrankt. Nach den im Artikel Affect aufgestellten Gesetzen der Einwirkung verschiedener Grade derselben auf Geist und Gemüth. Ecstase steht durch Steigerung der Begeisterung theils vermittelst der Geschäftigkeit der Phantasie, theils vermittelst hinzugekommener neuer Reize und Vollkommenheiten des Gegenstandes.

Dieser Zustand des Gemüths kann nie von langer Dauer seyn, denn jede heftige Anstrengung geistiger Kräfte und Vermögen durch Ueberreizung eine baldige Abspannung herbei, und nicht folgt auf eine schnell vorübergehende Ecstase eine lange dauernde Trägheit und Gleichgültigkeit.

Gegenstände, welche das Gemüth in den Zustand der Ecstase setzen, sind jederzeit solche, welche einen hohen Grad von Interesse haben, entweder für den Verstand, oder das Gefühl, oder das Begehrungsvermögen: Liebe, Hochachtung, Andacht, Religiosität, Wissenschaftsforschungen u. s. w. Als Archimedes sein *επιπικρα* auf dem Wasser und unangekleidet aus dem Bade nach Hause lief, da war

1) 2) entsprechend dem gleichlautenden Griechischen Worte *εκστασις*.



de, in welche ihn die Freude über das glücklich gelöste Problem  
 te. Es würde also gegen die Erfahrung seyn, wenn man nur  
 stände des Gefühls, z. B. des Wohlwollens oder des Begeh-  
 vermögens, als Quellen und Veranlassungen der Ecstase und der  
 zückung annehmen wollte. Da aber nur solche Dinge, die dem  
 eche angenehm sind, den Affect der Begeisterung erwecken kön-  
 so folgt, daß auch Ecstase und Entzückung nur durch angenehme  
 stände erregt werden können. Unangenehme Dinge können wohl  
 en, daß das Gemüth außer sich ist, z. B. vor Schmerz,  
 z Staunen, Schreck, Entsetzen empfindet, daß es in Wuth ge-  
 allein in Ecstase und Entzückung können sie es nicht versetzen.  
 tückung ist von Ecstase bloß dem Grade nach verschieden;  
 die Begeisterung des Gemüths noch auf einen höhern Grad ge-  
 at wird, so geht die Ecstase in Entzückung über, indem der  
 iß der Psyche auf den Körper, wie bei den Affecten im dritten  
 der Stärke, unterbrochen und ein Zustand herbeigeführt wird,  
 ehen die Seele im stäten, stillen, seligen Anschauen und Be-  
 en des begeisternden Gegenstandes verloren, seiner selbst, des  
 es und aller Außendinge völlig vergißt. In diesem Zustande  
 Seele ist nicht der Verstand mehr thätig, sondern entweder bloß  
 hantasia durch stäte innige Beschäftigung mit dem interessanten  
 stand, oder es kann, im höchsten Grade der Entzückung, selbst  
 Bewußtlosigkeit und ein völlig unthätiges Hinstarren auf den  
 stand Statt finden. In Hinsicht auf Veranlassung und Dauer  
 Zustandes gilt übrigens dasselbe, was von der Ecstase gilt.

z verschieden sprechen sich aber diese beiden Zustände durch die  
 Symptome aus. Denn wenn die Begeisterung als Ecstase die  
 Lebhaftigkeit und Hefigkeit des Gefühls durch die größte Le-  
 ekeit der Mienen, Gieberden und Bewegungen, durch die feur-  
 Blicke und einen strömenden Redefluß ausdrückt; so schweigt  
 m Eintritt der Entzückung plötzlich der innere und äußere Sturm,  
 Bewegung hört auf, jeder Laut schweigt, kaum der Athemzug  
 eckbar, nur der Mund ist sehnsuchtsvoll leis geöffnet, der Kör-  
 raft vorwärts geneigt, und das begeisterte Auge blickt stät und  
 eglisch in das Unendliche hinein, und spricht durch seinen verklär-  
 blick das durch Worte Unaussprechliche des Gefühls im In-  
 aus. (Diondi.)

*Ectelynsis*, in Uebersetzung des gleichlautenden Griechischen Wortes  
 i. q. Effeminatio. S. Weichlichkeit.

*ἵπποκρ.* Hippocr. aph. 1. 5 aph. 16.

*domius*, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte, i. q.  
 casus. S. Casirat.

*ερεμια*, Excisus

*vacitas*, s. Gefräßigkeit.

*Edelmuth*, *Edelsinn*, sind Eigenschaften des Gemüths, na-  
 ch des Charakters. Edel ist dem Gemeinen entgegengesetzt,  
 zeichnet im allgemeinen etwas, was über das Gemeine erha-  
 . In diesem Sinne braucht man es auch von leblosen und  
 nünftigen Gegenständen; so sagt man: eine edle Race, ein  
 Stpl, Edelstein u. s. w. In der Zusammensetzung mit Sinn

drückt es im allgemeinen eine über das Gemeine erhabene Denkart und Gesinnung aus, ohne gerade das Moralische derselben zu zeichnen. Es ist z. B. eine gemeine, d. h. gewöhnliche, Handlung sich zu rächen, das Vergnügen und den Vortheil anderer dem Gen nachzusetzen, seinem Feinde zu schaden. Wer nun in einem gegebenen Falle dieß nicht thut, handelt nicht gemein, er zeigt Edelmuth; wer es nie thut, Edel sinn.

Edel sinn ist daher diejenige Eigenschaft des Charakters, welcher ein Mensch in seinen Handlungen und Betragen gegenüber über das Gemeine sich erhebt, nicht sowohl aus Wohlwollen als vielmehr aus Grundsatz. Ein Mann von Edel sinn wird also immer edelmüthig handeln. Ein Mann, der in irgend einem Falle handelt, zeigt Edelmuth, ist im gegenwärtigen Falle edel gesinnt. Edelmuth und edelmüthig drückt daher mehr die jetzige Stimmung des Handelnden aus, Edel sinn die bleibende Denkkung. Bisweilen kann selbst der Schlechte Edelmuth in einer Handlung zeigen, allein er hat deshalb noch keinen Edel sinn.

Obgleich nun edelmüthig zu handeln moralisch ist; so sind Edel sinn und Edelmuth deshalb weder bloß moralische Eigenschaften noch müssen sie immer aus moralischen Antrieben entspringen. Sie entwickeln sich oft aus einer angeborenen Anlage, durch früheres Spiel, durch Erziehung, Gewöhnen, und aus andern Antrieben und bleiben in Hinsicht ihrer Natur sich immer gleich, ob sie nicht immer denselben moralischen Werth haben. (Diond)

*Efféminatio*, f. Weichlichkeit.

*Effeminatus*, f. Weichling.

*Efferentes ductus testis*, f. Graafische Samenröhrchen.

*Efferentia vasa*, f. Ausführende Gänge. — — *testis*, f. Graafische Samenröhrchen.

*Effervescenz*, (*Efférescentia*<sup>1</sup>.) Aufbrausen<sup>2</sup>, Schaümen, das bekannte Phänomen, wenn von einem tropfbarflüssigen Körper sich unter einer von außen gegebenen Bedingung Gas entbindet, das, indem es einen Theil der Flüssigkeit in sich aufnimmt, mit einmal einen häufigen Schaum auf der Oberfläche der Flüssigkeit bildet, aus dem das Gas selbst mit einem Geräusch hervortritt und in die Atmosphäre übergeht. Von ihr unterscheidet sich *Ebullition*, (*Ebullitio*<sup>3</sup>.) Aufwallen, nur durch, daß ein luftförmig gewordener Stoff aus dem tropfbarflüssigen in größern Blasen, die sogleich bei ihrer Entstehung zerplatzen werden oder sich wegen geringerer Cohäsion nicht völlig auflösen, sich löstrennt, wie z. E. bei dem Kochen des gemeinen Wassers.

Von dieser Erscheinung haben ältere Physiologen, besonders des sebzehnten Jahrhunderts<sup>4</sup>, als man, ohne daß die Chemie schon wissenschaftliche Principien gegründet war, gleichwohl es versuchte, die physiologischen, wie auch pathologischen Vorgänge im Körper nach der Auffassung genommen, auch die thierischen Säfte im Körper, na-

1) 2) Gren's Handb. d. Chemie, 1. Th. S. 66. 3) Boerhaave's mae, P. I. p. 170.

4) vorhält Willk. Bal dessen tr. de bus, o. 2 de sanguinis motu et effervescentiis.



as Blut und die Galle, wie auch die vermeintlichen Lebensge-  
 hypothetischer Annahme, daß auch sie von andern Flüssigkeiten  
 nur durch ihre Feinheit unterscheiden, einer Effervescenz, oder  
 Neigung, sich in Art eines gährenden Mostes aufzublähen, die  
 zu erweitern, zum Theil hervorzubrechen u. s. w., für fähig  
 achten, und hiervon nicht allein Krankheiten abzuleiten, sondern  
 die bekannten Erscheinungen bei leidenschaftlichen Ausbrüchen  
 oft heftigen Bewegungen des Körpers und des Gemüths damit  
 Verbindung zu bringen. Aus den Lehrbüchern der Physiologie sind  
 diese Ansichten und Worte längst verschwunden, obgleich in der  
 allichen Sprache sich noch die Ausdrücke: Aufbrausen des Sem-  
 ensts, in Wallung gerathen u. s. w., erhalten haben. Vgl.  
 rausen, Aufwallung, auch Orgasmus. (H.)

atio, Efflatus, vgl. Expiration.

corescentia cutis, i. q. Epidermis.

Fluvien, (*Effluvia*<sup>1</sup> corporis.) Ausdünstungs-  
 (Aporrhoeae<sup>2</sup>.) die durch Verdunstung überhaupt, in dem  
 Körper aber unter Mitwirkung der Lebensthätigkeit, in die  
 übergehenden, der Verflüchtigung fähigen Stoffe. S. Ex-  
 sion. Vgl. auch Perspirable Materie.

essentlich ausströmende Thätigkeiten überhaupt. Plinii hist. mund. 1. 7. c.  
 2) Vgl. das Wort.

oeminatio, s. Weichlichkeit.

oeminatus, s. Weichling.

usio seminis, s. Ejaculation des Samens.

esta alvi, s. Darmkoth.

estion, (*Egestio*.) vorzüglich im Gegensatz der Ingestion,  
 örderung des Fremdartigen aus dem Körper. S. Excretion.  
 1, s. Ich.

oismus, (*Egoismus*<sup>1</sup>.) Selbstliebe, Selbstsucht,  
 aliebe. Der menschlichen, so wie der thierischen Natur im-  
 inen ist der Trieb der Selbsterhaltung eingepflanzt, ohne wel-  
 e nicht würde bestehen können. Dieser Trieb, welcher auf al-  
 et, was unser Seyn — die Summe unserer Realität — be-  
 et und vervollkommnet, und daher in den Erhaltungs- und  
 kkomnungs- oder Erweiterungstrieb unterschieden werden kann,  
 wenn er von der Vernunft gehörig geregelt ist, den Namen  
 elbstliebe, oder der vernünftigen Selbstliebe. Als  
 darf er sein eignes Individuum und dessen Seyn und Wohl-  
 dem andern mit Recht vorziehen, alles, was zur Erhaltung,  
 kkomnung, zum Nutzen und Vergnügen desselben gereicht, sich  
 an, und es gegen jeden äußern Angriff schützen und vertheidi-  
 Je höher die Stufe der verständigen und sittlichen Bildung ist,  
 cher ein Individuum sich befindet; desto mehr wird diese Selbst-  
 edelt, desto mannigfaltiger von allen Seiten beschränkt wer-  
 desto williger sich der Ausübung geselliger Pflichten aufopfern.  
 er und ungebildeter aber im Gegentheil, und je näher der  
 der Thierheit ein Individuum ist; desto roher, rücksichtsloser  
 beschränkter wird sie sich aussprechen. Eine ähnliche Erschei-  
 den neuern philosophischen Schulen von ego; 14, gebildetes Wort.

nung bringt auch das Bedürfnis hervor, selbst dann, wenn das Individuum noch auf einer niedern Stufe der Bildung steht, wegen der Heftigkeit des Urtriebes der persönlichen Selbsterhaltung. Je schärfer daher die Mittel der Subsistenz sind; desto greller und ungezügelter wird er hervortreten; desto mehr werden alle geselligen Verhältnisse schwinden, und wenn der Mensch auf der äußersten Grenze des Daseyns steht, und durch das Seyn eines andern in dem eigenen bedroht wird: so fordert die Selbstliebe, die Fortdauer der eignen Persönlichkeit selbst durch Vernichtung der fremden und sogar mit Anwendung des Körpers derselben zu schützen und zu sichern. (Vergl. die Artikel Trieb, Instinct.)

Diese Selbstliebe, als Trieb der Selbsterhaltung, ist mithin nothwendige Bestimmung der menschlichen Natur und sowohl niedern als höhern Begehrungsvermögen eigen, und so lange sie Gebote der Vernunft gehorcht, nichts weniger als fehlerhaft. Sobald sie aber diese Grenzen überschreitet, so geht sie in Leidenschaft über und wird Egoismus, Selbstsucht oder Eigenliebe genannt, und ist fehlerhaft. Denn alles Fehlerhafte der Triebe des menschlichen Gemüths beruht auf einem Mißverhältniß der Stärke und Thätigkeit, und steht entweder in einem Zuviel oder Zuwenig.

Die Natur des Egoismus oder der Selbstsucht besteht in einer übertriebenen Selbstliebe; in einem leidenschaftlichen gehen alles Guten für sich selbst und allein. Der Egoismus charakterisirt sich mithin auf eine doppelte Weise: erstlich schon dadurch, daß er alles ausschließlich für sich begehrt, und dann dadurch, daß er es leidenschaftlich begehrt, und diese Begierde nicht mäßigen kann. Er unterscheidet sich von Eigennutz als Gattung von Art. Der Eigennutz ist immer egoistisch, allein der Egoistische ist nicht immer eigennützig, doch ist beides gewöhnlich verbunden. S. Eigennutz.

Selbstsucht kann man auch die Leidenschaft nennen, sich selbst Object des Wohlgefallens zu begehren, weil der Selbstsüchtige sich selbst als das Ziel und Object alles Begehrens vor Augen stellt und bloß das Vergnügen seines Selbsts sucht.

Der Egoismus oder die Selbstsucht ist äußerst mannigfaltig verschieden, und man könnte ihn nicht ohne Grund in den feinen und groben, in den unmoralischen und indifferenteren theilen; denn er ist in so unendlicher Abstufung von einander verschieden, daß er bald bloß gegen den Wohlstand und das Barmhertzigkeit bald gegen Sittlichkeit und Moralität verstößt. Wer sich über das immer das Beste zulant, in Gesellschaft nur immer von seinen eigenen lieben Ich spricht, ist nicht weniger Egoist, als wer der Güter hat, seinen Bruder darben sieht, und sein Herz vor ihm schließt.

Der Egoismus ist so allgemein, daß man ihn mit Recht die gemeine Triebfeder der menschlichen Handlungen nennen kann. Er ist nicht bloß einen logischen, ästhetischen und moralischen Egoismus (nach Kant,) sondern alle Geistesvermögen, Gefühle, Triebe, Leidenschaften und Begierden sind egoistisch, und er liegt oft als der heimliche Triebfeder den scheinbar uneigennützigsten und großmüthigsten Handlungen zum Grunde.



ismus und Selbstsucht entstehen wie alle Leidenschaften aus einem von Natur regen, durch Individualität begünstigten Triebe, welcher durch frühzeitiges und öfteres Befriedigen; durch äußere günstige Verhältnisse, verzärtelnde Liebe der Aeltern, unabhängige Lage, Ueberfluss und Schmeichelei gepflegt, genährt und auf einen hohen Grad der Stärke gebracht wird, und dieß um desto eher, da selbst die Phantasie, Gefühl und Begehrungsvermögen diese Leidenschaften begünstigen.

Eigene Liebe unterscheidet sich von Egoismus und Selbstsucht, welche kritisch betrachtet werden müssen, dadurch, daß sie mehr in dem, was schon hat, sich gefällt, dieß allem andern vorzieht, dieß allein lobt und preist. Ein Schriftsteller, welcher uns sich als Muster vorhält, verräth einen hohen Grad von Eigenliebe. Auch streift die Eigenliebe leicht in das Gebiet des Lächerlichen, wenn sie wirkliche Unvollkommenheiten und Mängel an sich als Vollkommenheiten und Tugenden ansieht und sie gegen andere als solche geltend zu machen sucht.

Selbstsucht spricht sich auch im ganzen Aeußern des Menschen aus. Nur auf sein eigenes Selbst gerichtet, ist der Selbstsüchtige gegen andern unfreundlich und übelwollend; seine Stimme und seine Handlungen drücken das in sich gekehrte, abstoßende, selbstsüchtige Wesen deutlich aus. Offne Freundlichkeit und herzliches Zuvorkommen sind ihm fremd. Selbstsucht macht daher gefühllos und kalt, und ist eine Quelle von tausend Mängeln, des Eigennuzes, der Schmach, des Neides, der Mißgunst, und hindert die Ausübung aller Tugenden.

(Diondi.)

**Egoismus in der Natur.** So bezeichnet insbesondere Balg das Einheitsprincip, die Selbstkräftigkeit und Selbstständigkeit der Natur überhaupt, wie sie besonders in der Genialität hervortritt.

Vergl. den Egoismus in der Natur, Nürnberg 1807, 8.

**Egoist** <sup>1</sup>, (*Egoista* <sup>2</sup>), im allgemeinen ein Mensch, der in seinen Handlungen sich, mit Hintansetzung aller höhern Lebensrück-sichten einzig vom Egoismus leiten läßt, in den philosophischen Wissenschaften aber ein Idealist, oder vielmehr Phantast, der die Oppositi-onen den Realismus so hoch steigert, daß er außer sich selbst gar kein Daseyn anerkennt. Vgl. Egoismus, auch Egoist.

Wundermann's Physiol. 3. Th. S. 51.

<sup>2</sup>) Winkleri inst. phil.

7. ed. 3. T. I. S. 258.

**Intas**, f. Ich, Ichheit.

**Geogorsis**, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wortes, f. Wachen.

**Pyrogors**. (Galenii def. med.)

**Pyrogorsus ventriculi**, i. q. Pylorus.

**Ehebündniß**, **Eheliche Verbindung**, (*Conjugium* <sup>1</sup>, *Matrimonium* <sup>2</sup>, *Matrimonium* <sup>3</sup>, *Foedus conjugale*), ist die feste Verbindung zweier Personen verschiedenen Geschlechts, um den Zweck der Natur des Menschen, welche im Erdenleben desselben besteht, zu erreichen. Ciceron. off. 1. 1. c. 17. „Prima societas in ipso est conjugio.“ Ciceron. de orat. 1. 1. c. 9. <sup>2</sup>) Ciceron. or. p. Cl. c. 62.

ben nur durch die Geschlechtsvereinigung erlangt werden können, nütze zu leisten. Unter der Natur des Menschen verstehen wir die völlige Eigenthümlichkeit, die nur ihm, und außer ihm in der vollendeten Ganzen keinem Wesen der Erde zukommt, und die zugleich die Zwecke seines Erdenlebens bestimmt. Die Natur des Menschen ist aber somatisch und psychisch. Die somatische, körperliche Natur des Menschen verlangt die innige Vereinigung der zwei Geschlechter, in welchen die getrennte Menschheit sich individualisirt. In dieser innigen Vereinigung beider Geschlechter wird erst die Menschheit wieder ein vollendetes Ganzes; beide Naturen schmelzen in einander, die Gegensätze der Geschlechtsverschiedenheiten werden ausgeglichen, und beide Individuen haben das Gefühl dieser vollkommenen Harmonie in der Wollust, die diesen wichtigen Act begleitet, weil das Sehnen der getrennten Natur nach ihrem ursprünglichen Gegenstande gestillt, die Menschheit in ihrer Totalität hergestellt ist, und schöpferische Macht derselben nur in dieser Vereinigung die Erzeugung vollenden kann.

Diese Sehnsucht der Menschennatur nach ihrer Vollendung in der innigsten Geschlechtsvereinigung nennen wir physische Liebe. Sie ist in dem Individuum an bestimmte Organe gebunden, deren Entwicklung und Functionserregung von ihr abhängt, von welchen auch wieder das Verlangen nach dem mit diesem Acte verbundenen Wohlgefühl als Trieb ausgeht, welcher endlich als Begierde, sich zu stillen, in Thätigkeit übergeht. Dieser Trieb erwacht also nach der Natureinrichtung zu bestimmten Perioden des menschlichen Lebens, welchen die dazu gehörigen Organe ein intensiv stärkeres Leben beilegen, welches, wie das aller andern Organe im lebenden Körper, wiederum in dem ganzen großen Cyclus seiner Lebensperiode noch kleinere Kreise bildet, die in dem Wechsel von Thätigkeit und Ruhe der Function, Anstrengung und Erschlaffung des Organs bestehen, so wie in dem Individuum die Sehnsucht nach der Vereinigung mit dem getrennten Geschlechte erwacht, oder der Trieb dazu gestillt wird. Der Trieb nach Befriedigung der physischen Liebe ist daher vorübergehend und in der Befriedigung selbst stirbt er ab; das Wohlgefühl von der Befriedigung selbst ist nur momentan, und findet in der Stillung der Begierde selbst sein Ziel. Die Geschlechtsorgane fallen sodann in Unthätigkeit und Ruhe zurück, und der kleinere Umlaufbogen in dem ganzen Lebenskreise derselben ist vollendet. Sobald die Lebensenergie der Geschlechtsorgane sich wieder gesammelt hat, erwacht auch ihre Function von neuem, und erregt wieder den Trieb zur Befriedigung der physischen Liebe. Diesem Triebe genügt zu bedarf es aber bloß zweier Individuen verschiedenen Geschlechts, männlichen und des weiblichen, ohne daß auf jedesmalige Individuen der beiden Individuen etwas ankommt, wenn nur jedes Individuum die seinem Geschlechte zukommende Eigenthümlichkeit besitzt. Je stärker aber dieser Geschlechtscharakter in einem Subject sich zeigt; desto mehr Gewicht der Anziehung hat dasselbe für seinen Gegenstand, desto stärker regt es die Sehnsucht nach der Vereinigung mit ihm auf. Weibliche und männliche Schönheit findet aber in desto höherem Grade Statt, je reiner sich der Geschlechtscharakter aus-



kommenener in dem Individuum ausspricht, sie erregt daher auch um so mehr die physische Liebe. Ist diese aber befriedigt, so ist der Gegenstand derselben der physischen Natur des Menschen gleichgültig, weil den erloschenen Trieb auch kein Gegenstand existirt, und bei je einmaligem Erwachen dieses Triebes die physische Natur nur den Geschlechtsgegensatz verlangt, ohne der Identität desselben Subjects zu dürfen; daher zu jeder Befriedigung des Triebes ein anderes Subject ihm Genüge leisten kann.

Anderes aber ist es mit der psychischen Natur des Menschen. Sie ist ursprünglich keine Geschlechtsverschiedenheit; ihr ist dagegen die unersättliche Sehnsucht nach der Vereinigung mit dem höchsten Gute eigen. Alle geistige Ausbildung, alles Fortschreiten der Seele zur Vervollkommenung beruht auf dieser, ihrem Wesen eingeborenen Sehnsucht zur steten Annäherung des höchsten Gutes, auf der Verwandtschaft derselben zu dem ewigen Lichte. Daher das Streben derselben nach der Vereinigung mit dem, was sie als wahr, als gut, als vollkommen erkennt, was mit ihrem Wesen in Einklang steht. Ist sich dieses Sehnen nach der Vereinigung in dem Menschen während seines Erdenlebens offenbart, nennen wir es psychische Liebe, deren Genußthum ist mit einer Empfindung der innern Klarheit und des Entzückens der Seele verbunden, welche wir Seligkeit nennen. Die psychische Liebe ist aber in der Befriedigung nicht erschöpfend, sondern weil ihr Ursprung die Sehnsucht nach dem unendlichen Gute ist, so ist sie selbst auch ewig fortdauernd. Sie sucht daher den Gegenstand, welchen sich die Seele als gut, ihrem Wesen entsprechend, und daher dem höchsten Gute analog vorstellt, fest zu halten, sich auf immer mit ihm zu vereinigen, ja die Bande dieser Vereinigung so fest als möglich zu machen. Ihr ist daher alles an der Identität des Gegenstandes gelegen, und nichts in der Welt kann diesen in seiner Individualität ersetzen. Daher auch die Neigung des Menschen, das, was er am höchsten schätzt, durch die innigste Verbindung sich zum bleibendsten Eigenthum zu machen. Bei dem Menschen, in so fern er der Menschenwürde getreu bleibt, kann daher nie physische Liebe allein und getrennt Statt finden, sondern sie ist jederzeit mit der psychischen Liebe in höherem oder noch niedrigerem Grade verbunden seyn, und dieser Grad wird um so höher steigen, je mehr psychische Liebe wird um so mehr vorherrschen, je mehr die Seele ihrer Ausbildung Fortschritte gemacht hat, je mehr sie zum klaren Bewußtseyn ihres höchsten Zweckes gelangt ist. Die Schönheit einer Person kann zwar zunächst die physische Liebe entzünden; allein sie weckt zugleich die Vorstellung der Vollkommenheit der Person, die Empfindung von der Anschauung menschlicher körperlicher Schönheit nicht ohne Vorstellung der Zweckmäßigkeit, dem Geschlechtscharakter gemäß, also auch nicht ohne die Idee der Vollkommenheit der ganzen Person aufgefaßt werden kann.

Physische und psychische Liebe entstehen also in dem Menschen zugleich, oder die erstere erzeugt doch sogleich auch die andere, und beide bilden in der Seele des Menschen die ächte menschliche Liebe, welche die Sehnsucht nach dem dauerhaften Besitze des geliebten Gegenstandes mit sich führt. Die psychische Liebe wird noch erhöht, wenn sie

durch vorgestellte Geistesähnlichkeit des geliebten Gegenstandes, durch höhern Grad der Ausbildung der Seele desselben, durch Annäherung zur Wahrheit und Güte, welche sich als Seelenschönheit darstellt, so daß in gleichem Maße die psychische Liebe über die bloß physische die Oberhand behält, je mehr der Mensch für Seelenschönheit Empfindung hat. Der Mensch ist das höchste, was der Mensch auf der Erde kennt, seine geistige Vervollkommenung besteht in der Annäherung an die Gottheit; er ist demnach auch das theuerste auf der Erde, was der Mensch besitzen kann. Die physische Liebe, als Wirkung der körperlichen Schönheit der Person, ist daher der mächtigste unter allen Trieben, das dadurch zu erlangende Eigenthum ihm das theuerste, das nichts anders ihm zu ersetzende. Sie trägt die dunkle, aber für Menschen ganz beherrschende Vorstellung der Geschlechtsvollkommenheit, oder der körperlichen Schönheit auf das ganze Wesen der Person über, als Menschenvollkommenheit überhaupt, also auch Seelenschönheit, und stellt sich dieselbe als reines, vollkommenes himmlisches Wesen vor. Die menschliche Liebe ist daher nicht anders als die höchste Sehnsucht nach der innigsten, physischen und psychischen Vereinigung des geliebten Gegenstandes, und nach dessen ausschließlichem ewig dauernden Besitze; denn dem wahrhaft Liebenden geht es nicht bloß der körperliche Besitz der Geliebten, ihm ist an der Person derselben, an der psychischen und bleibenden Vereinigung alles gelegen, daher auch das Streben nach der Gewißheit der Gegenliebe, die heftigere Eifersucht, als Furcht, dieses kostbarste Eigenthum des Herzens mit andern zu theilen. Um uns dieses heilige Eigenthum zu sichern, suchen wir die Bande, womit wir dasselbe an uns knüpfen, mit uns zu verpflichten, Pflichten der Religion, die wir als die stärksten Bande für den Menschen anerkennen, da sie zu dem höchsten Ziel des Strebens der Menschheit, der Vereinigung mit der Gottheit, führen, in Verbindung zu setzen. Hieraus entsteht also die gegenseitige Geschlechtsverbindung, welche wir die Ehe nennen, und welche in der Natur des Menschen, als eines physischen und psychischen Wesens gegründet ist, folglich in den innern Principien nothwendig erscheint. Allein auch der Zweck des Erdenlebens des Menschen selbst macht sie nothwendig, da sie in der irdischen Realität diesen Zweck am besten befördert, ihre Folgen also für das Gesamtleben der Menschheit von so großer Wichtigkeit sind, daß es dem Staate, als organischer Einheit der Menschheit, eine Angelegenheit seyn muß, die reale Darstellung der Ehe ihrer Natur so nahe als möglich zu bringen, und die Heiligkeit der ehelichen Bande im Wesentlichen so sehr als möglich aufrecht zu erhalten, und zugleich die äußere Form derselben nach den physischen Einflüssen des planetarischen Standpunctes der Menschheit, nach der Nation, dem Grade der geistigen Cultur verschieden seyn kann und muß.

Da der Zweck des ganzen Umlaufs des Menschenlebens in der Wirklichkeit als Erziehungsanstalt für die menschliche Seele zu immer höhern Bildung und Vervollkommenung erscheint, und die Gesamtheit der Menschheit, als Nachbild der Unendlichkeit, in ununterbrochen wiederholenden Umlaufsperioden von werdenden, blühenden und vergehenden Geschlechtern immerdar sich erneuert; so drängt sich auf den einzelnen Menschen, als integrierendes Glied der großen Welt, aus seinem innersten Wesen eine doppelte Pflicht auf: sowohl



selbst auf die, dem Standpunct seiner Existenz nach, mögliche Aufzucht der Cultur seiner geistigen Vermögen zu versehen, als auch die seine Stelle einst einnehmenden Individuen, als Glieder des blickenden Menschengeschlechts in Stand zu setzen, sich auf dieser Aufzucht zu erhalten, ja noch höhere zu ersteigen, d. h. also die Pflicht zu erfüllen, die Cultur und der zweckmäßigen Erziehung seiner Kinder. Ein der Mensch soll nicht als vereinzelttes Wesen in der Natur dastehen, seine Zwecke kann er nur im Wechselverkehr und in Verbindung mit andern Menschen erreichen; nur in diesem üben sich die Tugenden, bilden sich die Tugenden der Seele. Daher die Nothwendigkeit der geselligen Verbindung für die Cultur des Menschen. Dieser ist aber nur in dem Verhältnisse zu erwarten, je inniger diese Verbindung ist, je mehr sie in der Menschennatur gegründet, je dauerhafter sie ist, je wichtiger und edler die Zwecke derselben sind. Welche Verbindung könnte aber inniger seyn, als die von der menschlichen Liebe geschlossene, welche könnte tiefer in der Natur des Menschen gegründet, welche könnte dauerhafter ihrem Wesen nach seyn, welche könnte auf wichtigeren und edleren Zwecken beruhen, als die, nach der oben gegebenen Idee geschlossen?

Die Ehe ist daher der Urtypus aller geselligen Verbindungen, und aus ihr entspringt der nächstfolgende: das Familienleben in dem Verhältnisse der Aeltern und Kinder, der Geschwister und fernerhin der Verwandten. Die schönsten Tugenden und Uebungen der Kräfte der Menschheit sind daher nur Früchte des Familienlebens: Verläugnung des Eigennutzes, Fügung unter Gesetze, Hingabe seiner selbst zum Besten der Wohlfahrt anderer, Anstrengung seiner Kräfte u. s. w. Und nicht allein die Pflicht des Menschen, der Erziehung seiner Kinder, nur im Familienleben, in der ehelichen Verbindung, vollständig geleistet werden. Das Thier pflegt das Junge, bis es selbst ein Thier geworden, d. h. im Stande ist, sich selbst zu erhalten, und die Idee seines Lebens durchzuführen, folglich nur kurze Zeit zu einem beschränkten Ziele. Der Mensch ist nicht bloß ein physisches Naturwesen, sondern zugleich ein psychisches, geistiges Wesen, dessen Ziel ins Unendliche und Ewige führt. Er muß folglich von der frühesten Kindheit an erzogen werden. Und wie lange dauert nicht die physische Erziehung desselben? Mit wie vielen Mühseligkeiten und Aufopferungen von Seiten der Aeltern ist sie verbunden? Wie wichtig und wichtig ist die physische Erziehung derselben? Nur in einer innigen, in dem innersten Wesen der Menschennatur gegründeten, dauerhaftesten Verbindung, als die eheliche ist, nur durch so starke Liebe, als diese Natur um das Familienleben der Aeltern und Kinder gelegt hat, ist ein so mühsames und doch so wichtiges Geschäft ausdauernd durchzuführen und glücklich zu vollenden möglich.

Also die Ehe in ihrer reinen Idee als naturgemäß für den Menschen, folglich als nothwendig, in ihren Folgen als höchst zweckmäßig und für das Menschengeschlecht wohlthätig erscheint; so muß auch die realen Darstellung derselben in dem Menschenleben die Entscheidung entscheiden, ob überhaupt in dem individuellen Falle die Zwecke dieser Natureinrichtung zum Grunde liegen, erreicht werden können, und alsdann erst kann der Verstand die zweckmäßigste Art

und Weise ausmitteln, wie sie in Realität gesetzt werden soll. Hieraus fließt dann auch für den Staat, als Repräsentanten des Nationalwillens nach dem bestehenden Grade der Ausbildung der Vernunft und des Verstandes, in der Idee des Staates, was er seyn soll gegründet, das Recht und die Pflicht, durch Gesetze die Fähigkeit zum Ehebündnisse, das Formelle derselben und die Art und Grade des Schutzes derselben zu bestimmen. Aus der oben aufgestellten Idee der ehelichen Verbindung, und der Zweckmäßigkeit in der realen Darstellung derselben fließen die Urtheile über die Unzulässigkeit derselben Ehen, welche den Zwecken der Natureinrichtung nicht entsprechen oder ihnen ganz zuwider sind; über die der Ehe analogen Verbindungen, welche das Ansehen der Ehe herabsetzen, über Störungen des Bruch des Ehebündnisses, sie kommen nun von außen, geschehen von einem der Ehegatten oder von beiden, und endlich über die Auflösbarkeit der ehelichen Bande.

Daher ist Polygamie, oder von Seiten des Mannes die Annahme mehrerer Weiber durch eheliches Bündniß, an sich mit der Idee der Ehe nicht harmonirend; denn da diese eine unbedingte Hingebung beider Personen gegen einander, als Personen, nicht Sache mit sich führt, so kann auch diese Hingebung durch eine Sache, (Vermögen, Geld, Ehre u. dergl.) sondern nur durch die Hingebung des Gleichen, gegenseitige Hingebung der Person zu theiltem Eigenthum, (Liebe um Liebe,) ausgeglichen werden. Theilung dieses Gutes, als des Eigenthums des andern Gatten mehrere zugleich ist daher an sich ein Unrecht, und es ist eigen nach der Idee der menschlichen Liebe nicht möglich, da doch immer nur Eine Person der Gegenstand der wahren Liebe der andern seyn kann. Nur der Form nach kann demnach Polygamie durch die Sitte und religiöse Meinung geseglicht werden da, wo ein klimatische Einflüsse begründetes erhöhtes Bedürfniß der physischen Liebe auf Seiten des Manns Statt findet; allein die wahre Liebe kann nach der obigen Bestimmung doch nur mit Einem Weibe verbunden seyn, außerdem sie bloß eine der Menschenwürde zuwiderlaufende Befriedigung der Animalität im Menschen ohne Rücksicht auf die Zwecke der Seele ist.

Dasselbe findet nicht nur in Anwendung auf Polyandrie auf Seiten des Weibes, Befignahme mehrerer Männer durch ein dergleichen analoges Bündniß, Statt, sondern sie erscheint auch dadurch als naturwidrig, daß nach der Einrichtung der physischen Natur des Weibes die Fähigkeit desselben zur Befriedigung der physischen Liebe wohl in Rücksicht der Dauer überhaupt als auch der Periode weitern mehr beschränkt ist, als bei dem Manne; danna als zweckwidrig, da wegen der Kinder Ungewißheit und Verwirrung in einem solchen Verhältnisse entstehen müssen.

Das natürliche Gefühl empörend ist die blutschändliche Eheverbindung, zwischen Verwandten in gerader Linie zur Befriedigung der physischen Liebe, da die Natur diese Personen in einem heiligen Bande umschlungen hat, das durch jene zerrissen werden soll.

Das Concubinats, in so fern es bloß die Befriedigung der physischen Liebe zum Zwecke hat, ist außer der ehelichen Verbindung



schlichen Würde entgegen, und in einer der Ehe analogen Verbindung nur durch Zusammentreffen seltener Umstände zu entschuldigen, da es der höhern psychischen Liebe nicht angemessen ist, demnach der Ehe hintansetzt, die Erziehung der Kinder vernachlässigt, Nutzen der Ehe für die moralische Cultur des Menschen vernichtet.

Außer diesen nämlichen Gründen hat auch die Befriedigung der physischen Liebe außer der ehelichen Verbindung noch in physiologischer Hinsicht das gegen sich, daß nicht nur durch den in diesen Verhältnissen erleichterten Wechsel in dem Gegenstand der Befriedigung eine Ersättlichkeit der Begierde, Liederlichkeit und Leidenschaft begründet wird, welche die Seele von allem Höhern herabzieht, und ganz in den Gewalt der Sinnlichkeit stürzt, sondern auch durch übermäßige Befriedigung dieser Triebe heillose Schwächung der Geschlechtsorgane und zerstörende Wirkung für den ganzen Organismus erfolgen muß.

Da die Ehe nach der Idee derselben dem Menschen sein theuerstes Eigenthum sichert, zur Erreichung der höhern Zwecke der Menschheit sichersten führt, das Fundament des Familienlebens, und daher Uraufgang eines organischen Staatengebildes ist; so ist auch der Mensch, als Individuum, in so fern er auf die Menschenwürde Anspruch machen will, nicht nur durchaus gehalten, sondern es gehört zu den Pflichten des Staates, die höchste Achtung für die Heiligkeit der ehelichen Bande, sowohl seiner eigenen als der fremden, zu heissen, und dieselben in ihrer Würde zu beschützen. Ob nun gleich die eheliche Verbindung in der Realität oft aus ganz verschiedenen Motiven und zum Behuf anderer Zwecke, als die ursprüngliche Idee sich führt, geschlossen wird; so dürfen doch diese Apterzwecke und natürlichen Motiven der Heiligkeit dieser Bande keinen Abbruch thun.

Verletzung derselben durch Befriedigung der physischen Liebe mit einer andern Person außer der Ehe heißt der Ehebruch. Wenn bei so vielen von der reinen Idee abweichenden Ehen der Fall tritt, daß entweder die ohne Veredlung durch psychische Liebe nicht erlöschende bloß physische Liebe des einen, oder beider Ehegatten in Befriedigung erloschen ist, und sich gegen eine andere Person richtet, oder der eine Ehegatte zur Befriedigung der physischen Liebe untauglich ist, folglich die physischen und moralischen Zwecke der Ehe nicht erreicht werden können; oder wenn der Nimbus von Geschönheit, mit dem die physische Liebe den geliebten Gegenstand umgab, nach Erlöschung der letztern verschwindet, und die psychische Liebe sich um ihren Gegenstand betrogen fühlt, oder endlich von dem einen Ehegatten die Ehe einseitig gebrochen wird: so ist zwar in allen diesen Fällen die Ehe, dem Wesen nach, als aufgehoben zu betrachten; allein die Achtung für die Heiligkeit der ehelichen Bande, die Pflicht ihnen diese Achtung zu erhalten, erfordert dessen ungeachtet, daß die Verpflichtungen derselben so lange fort dauern und gehalten werden, bis sie auf dem nämlichen Wege, wie sie durch die Nationalität durch die Macht des Religionsgebrauchs oder Gesetzgebung geschlossen wurden, auch der Form nach aufgelöst werden.

Diese gesetzliche Auflösung der ehelichen Verbindung heißt die Eheauflösung. Sie könnte nur selten vorkommen, wenn die Ehen

bloß nach der oben aufgestellten Idee Statt finden. Da aber in Weltverhältnissen so viele Ehehindernisse auf leichtsinnige und frii Weise geschlossen werden, bei denen nur physische Liebe oder an Nebenabsichten zum Grunde liegen, die ihre Vergänglichkeit schon sich selbst tragen; so kann es nicht fehlen, daß dem einen oder be Ehegatten der Zweck ihrer Verbindung bald verschwindet, da alsd ein Band sie mehr zusammenhält, als das formelle, das ihnen so lästiger wird, je mehr es sie an der Erlangung anderer Br verhindert. Eine solche Ehe ist vor dem Tribunal der Natur schon sich als Nichtehe anzusehen, und da sie bloß von der Macht des gions- oder bürgerlichen Staatsgesetzes in der Form gebildet wurde kann sie eben dieselbe auch wieder auflösen. Es erheischt aber die tung für die Heiligkeit der ehelichen Bande und des ihnen gebühre Schutzes wegen Verpflichtung des Staates, daß auf reinere M bei der Schließung der Ehehindernisse nach der Idee der Ehe ge und dann die Ehescheidung nicht auf frivole Gründe, nicht auf eins ungegründete Motive und nicht zu leicht bewilligt werde. (Greine

Val. Th. G. Hippel über die Ehe, Berl. 1774, (4. Aufl. 1793.) 8.

(W. Tr. Krug's) Philosophie der Ehe, Leipz. 1800, 8.

E. a. d. Winkell über Ehe, Liebe und Eifersucht, Zerst 1806, 8.

**Ehestandslinien**<sup>1</sup>, **Heirathslinien**<sup>2</sup>, (*Lineae matrimoniales*<sup>3</sup>.) von den Chiromanten in der Hohlhand unterschieden. benlinien, die unter dem kleinen Finger mit der Tischlinie pa laufen. Vgl. Chiromantie.

1) — 3) Penschel's Abb. v. d. Phsygnomie u. s. w. S. 302.

**Ehrbarkeit, Ehrbarlichkeit, Ehrsamkeit**, (*Honestas*) sind Eigenschaften des Betragens und Charakters.

**Ehrbarkeit** ist diejenige Eigenschaft des Betragens, welche Verhältniß des Standes, Alters, Geschlechts und anderer indivi len Verhältnisse unsere Ehre in der bürgerlichen Gesellschaft und erhält. Sie ist mithin oft relativ. Anders muß sich ein chen, anders ein Mann, anders ein Erwachsener, anders ein betragen, um ehrbar zu heißen. Ehrbarkeit faßt Anständigkeit Sittsamkeit in sich, und wenn es vom weiblichen Geschlecht gebr wird, auch Keuschheit, so weit sie durch das Betragen erkannt **Ehrbarlichkeit** scheint mit Ehrbarkeit gleichbedeutend zu seyn, daß es vielleicht mehr auf das einzelne des Betragens geht.

**Ehrsamkeit** unterscheidet sich von Ehrbarkeit dadurch, d nicht sowohl Eigenschaft des Betragens, als des Charakters un Gefinnung ist, ganz nach der Analogie von furchtbar und f sam. Ein furchtbares Benehmen erweckt Furcht, ein Furchtsame rath Furcht. So verrath auch Ehrsamkeit innere Ehrliche un zeichnet eine Gefinnung, welche nicht anders als ehrbar im Bet sich zeigen kann. Die Ehrsamkeit ist die fortdauernde Stimmu nes ehrliebenden Gemüths, in wie fern sie sich durch äußere chen, Geberden, Worte und Handlungen ausspricht. Die eh Jungfrau kann nie anders als ehrbar sich benehmen, allein ein bares, bloß äußerliches ehrbares Betragen gibt noch keinen An auf Ehrsamkeit.

(Dzond

1) Ciceron. de offic. l. 1. c. 2.

**Ehrbegierde, Ehrdurst**, vgl. Ehre.



Ehre, Ehrbegierde, Ehrdurst, Ehrgefühl, Ehrgeiz, Ehrgier, Ehrliche, Ehrsucht, Ehrtrieb, (Honor, Honos<sup>1</sup>, honestas<sup>2</sup>.) Der Begriff der Ehre ist mit dem des Ruhms und Achtung so nahe verwandt, daß er gewöhnlich mit ihnen verwechselt wird, ob er gleich wesentlich sich von ihnen unterscheidet. Ehre nicht überhaupt das günstige Urtheil über unsern Werth, besonders moralischen; dieß ist Achtung. Auch besteht die Natur des Ruhms in einer ausgebreiteten Ehre, (denn mancher Mensch, z. B. ein Künstler, hat eine ausgebreitete Ehre, ohne vielleicht berühmt zu seyn.) Ehre ist vielmehr die öffentliche Anerkennung unsers Werthes und Ranges als Bürger eines Staats, und bezieht sich theils auf die innere zu einem guten Staatsbürger erforderlichen Eigenschaften, theils auf die äußern mit den bürgerlichen Verhältnissen, in welchen wir uns befinden, verbundenen Ansprüche, Rechte und Pflichten. Ehre ist das Gelten unserer Persönlichkeit in der bürgerlichen Gesellschaft; wer daher von dem Staat für ehrlos erklärt wird, verliert durch seine bürgerliche Persönlichkeit, er ist bürgerlich todt. Dessen ungeachtet kann er ein achtungswerther und berühmter Mann seyn. Ehre, Ruhm und Achtung sind drei verschiedene Prädicate, welche auf einen Menschen und für sich bestehen können. (S. Hochachtung, Ruhm.) Wenn Ehre das Gelten unserer Persönlichkeit im Staat, und mithin das bürgerliche Leben selbst, Ehrlosigkeit aber bürgerlicher Tod ist; so muß man annehmen, daß jedem Menschen, als einem geselligen Geschöpfe, der Trieb nach Ehre eingepflanzt seyn muß, denn er ist eine bloße Motivation, ein Zweig des Erweiterungs- oder Vervollkommnungstriebes. Jeder Mensch muß streben, sich so viel als möglich unter seinen Mitbürgern geltend zu machen; denn dadurch vergrößert er die Sphäre seines Wirkungsvermögens und die Möglichkeit zur Vervollkommnung seiner Existenz beizutragen.

Der Ehrtrieb also, oder der Trieb nach öffentlicher Anerkennung unsers Werthes und Ranges als Staatsbürger, ist eine eben so nothwendige Bestimmung der menschlichen Natur, als jeder andere natürliche Trieb, und entwickelt sich daher sehr frühzeitig in dem jungen Menschen, mit dem Erwachen seines Bewußtseyns und dem Wahrnehmen seiner geselligen Verhältnisse. Nach Verschiedenheit der Stufe der individuellen Bildung, und der äußern gesellschaftlichen Verhältnisse pflügt sich dieser Trieb verschiedentlich auszuspochen, und erregt auf das Edlere, Wahre, Gehalt- und Werthvolle, Bessere und Gerechtere, oder auf das Gemeinere, Oberflächliche und Außerliche getrieben zu seyn, und äußert sich theils subjectiv, theils objectiv. In subjectiver Hinsicht legt der Ehrtrieb entweder auf innere oder äußere Vorzüge einen besondern Werth. Zu jenen gehören körperliche Stärke, Schönheit, z. B. bei rohen Völkern Einfluß, Verbindungen u. s. w.; zu diesen Vorzüge des Geistes und Herzens, Kenntnisse, Charakter u. s. w. In objectiver Hinsicht kann er theils auf Vorrang, (eher kommt als andere,) theils auf Anerkennung seines Werthes gehen, entweder im allgemeinen oder von den Bessern, oder von seinem eignen

<sup>1</sup> Ciceron. Tusc. quaest. l. I. c. 2. „Honos alit artes, omnesque incenduntur ad studia gloria.“  
<sup>2</sup> Ciceron. Topic. c. 21. „Laudationis finis honestus.“

Innern. Im letztern Falle geht der Ehrtrieb in Selbstgefühl und Achtung über. Dieser allein ist er mächtig; jede andere Ehre ohne sein Verschulden verloren gehen. Ein unschuldig Verfolgter mit öffentlicher Schande Gebrandmarkter muß sich bloß auf die Vor seinem innern Richter zurückziehen. Er ist ehrenwerth, obgleich nicht geehrt ist.

Der Trieb nach Ehre setzt ein Gefühl derselben voraus, aus welchem er sich entwickelt und bildet; denn wofür, das Gefühl vermögen nicht empfänglich ist, dazu hat das Begehrungsvermögen auch keinen Trieb. Das Ehrgefühl also ist die Stimmung Gemüths, vermöge welcher es von der Anerkennung des bürgerlichen Werthes seines Individuums, und dessen günstigen oder ungünstigen Verhältnissen lebhaft erregt wird. Das Ehrgefühl geht mit dem Ehrtriebe Hand in Hand, und steht mit ihm in gleichem Verhältnisse. Wo viel Ehrtrieb ist, da ist auch viel Ehrgefühl, und umgekehrt. Man unterscheidet am Ehrgefühl verschiedene Grade, deren äußerste Endpunkte auf der einen Seite Feinheit und Schärfe, auf der andern Stumpfheit und Schläffheit sind.

Der Trieb nach Ehre spricht sich, wenn er in seinen Schranken bleibt, zunächst als Ehrliche aus; denn alles, was Object des Ehrtriebes des menschlichen Gemüths ist, wird auch von diesem Ehrgefühl umfaßt. Die Ehrliche nun ist die aus dem angenehmen Gefühl, welches die Anerkennung unsers bürgerlichen Werthes gewährt, entspringende Neigung, sich derselben lebhaft bewußt zu werden und sich immer mehr zu versichern. Denn Liebe ist aus Gefühl und Neigung gemischt. Sie ist eine Vollkommenheit des Charakters, spricht sich frühzeitig im Kinde aus, und ist selbst rohen Völkern nicht fremd. So lange die Ehrliche innerhalb der Grenzen bleibt, welche die Natur ihr vorzeichnet, hat sie den vortheilhaftesten Einfluß auf Verstand und Gemüth; sobald sie aber diese Grenzen überschreitet und sich in die Stärke des Affects erhebt, welches entweder schnell oder auch allmählig und nach geschehen kann; dann gilt von ihr alles das, was von den höhern Graden des Affects gesagt worden ist. (S. Affect). Sie wirkt dann betäubend auf den Verstand, kann den Menschen schnell zu den heftigsten Handlungen und selbst zur Vernichtung seines Selbsts hinreißen. Diese Steigerung wird insonderheit durch den Verlust der Ehre, öffentliche Kränkung und Schande veranlaßt.

Da Ehre, als ein Gut, von dem Gemüth vermöge des ihm einwohnenden Ehrtriebes lebhaft begehrt wird, so kann dieses Begehren sehr zu stark werden, und in Leidenschaft übergehen; dann heißt es Ehrbegierde, bildlich Ehrdurst, und im hohen Grade, wenn sich sehr ungestüm äußert, Ehrgier. Ehrbegierde also ist die Neigung des Menschen, immer mehr Ehre zu genießen und die Summe seiner Ehre auf jede Weise zu vergrößern. Nicht zufrieden mit der wahren Ehre, strebt der Ehrbegierige hauptsächlich nach äußern Ehrenzeichen, nach Titel, Rang, Ordensbändern, Bezeichnungen und dergleichen, und überhaupt mehr nach Ehrenbezeugungen, als nach wahrer Ehre. Die Ehrbegierde hat alle die verschiedenen Grade mit den andern Leidenschaften gemein. (S. Leidenschaft.)



Der höchste Grad der Ehrbegierde, die blinde, unbezähmbare, ersättliche Ehrbegierde, heißt Ehrsucht; als solche ist sie zur Geisteskrankheit geworden und hat auf Verstand und Willen den nachtheiligsten Einfluß, da sie den erstern ganz verblendet und den letztern zwingt, blindlings ihr zu willfahren. Der Ehrsuchtige opfert also seiner Leidenschaft auf.

Von Ehrbegierde und Ehrsucht unterscheidet sich der Ehrgeiz nicht sowohl durch ein unermüdetes Hervordrängen nach Macht und Freiheit, nicht durch Streben nach Erwerbung von Ehre, sondern nach Streben nach Erhaltung, Sicherung, Behauptung der Ehre, deren Besitz er schon ist, durch eifersüchtiges Wachen über jeden Angriff derselben, und ängstliche Vermeidung und Entfernung alles, was Schmälerung derselben droht. Auch der Ehrgeiz gehört zu den Leidenschaften, und beschränkt die Freiheit der Vernunft.

Ehrgeiz und Ehrsucht sprechen sich auch im Außern des Menschen durch Mienen, Haltung und Geberden aus. Sie drängen sich überall hin, werfen ihre eifersüchtigen Blicke ringsherum, nach Beifall suchend, indem sie sich eine wichtige Miene geben und mit vornehmern Händeln die Ehrenbezeugungen sich gefallen lassen. Sie sporren zur Anstrengung aller Kräfte an, und sind oft die unedlern Erregern edler und großer Thaten. Bei kleinherzigen Menschen und Frauen arten sie leicht in andere verwandte Schwächen aus, als Eizucht, Pug- und Modesucht, Gefall- und Prahlucht, Pedanterie, Schmeichelei und dergl. (Diondi)

**Ehrenlinie**, s. Sonnenlinie. — **haftigkeit**, — **festigkeit**, s. **Stärke**.

**Ehrerbietigkeit**, **Ehrfurcht**, s. **Hochachtung**. — **gefühl**, s. **Ehre**.

**Ehrgeiz**, **Ehrgier**, **Ambition**, (*Ambitio* <sup>1</sup>;) zur Leidenschaftlichkeit gesteigertes Ehrgefühl. S. unter **Ehre**.

<sup>1</sup>) Ciceron. de offic. 1. 1. c. 25.

**Ehrlichkeit**, **Ehrenhaftigkeit**, **Ehrenfestigkeit**. **Ehrenhaft** erhält seine bestimmte Bedeutung durch die Sylbe *haft*, die ist nach der Analogie von tadelhaft, sündhaft, ein *Potentiale*, d. h. ein Wort, welches eine Möglichkeit ausdrückt. In dieser Hinsicht wird derjenige ehrenhaft genannt, an welchem noch Ehre haften kann, der nichts gethan hat, das ihn der Ehre verlustig machte, ein Mann, der geehrt werden kann und darf, mithin im allgemeinen Ehre Anspruch hat. Da nun ein jeder, der durch Handlungen seiner Ehre nicht verlustig gemacht hat, auf Anerkennung seines bürgerlichen Werthes Ansprüche machen kann; so kann auch jeder, der nicht das Gegentheil, (ehelos,) ist, ein ehrenhafter Mann genannt werden.

Einem bestimmtem Anspruch auf Ehre, besonders in gewissen Fällen, drückt das Wort *ehrenwerth* aus. Dieß zeigt nicht bloß die Möglichkeit wie ehrenhaft an, sondern leicht das wirkliche Verdienen in gewissen Fällen. Ein ehreloser Mensch kann wohl bisweilen eine ehrenwerthe Handlung thun, ein ehrenhafter Mann aber beträgt sich nicht so und zeigt daher Ehrsamkeit.

**Ehrlich** und **Ehrlichkeit** haben einen engeren Umfang und bezeichnen im allgemeinen das Uebereinstimmen gewisser angegebenen oder

erforderten Eigenschaften und Aeußerungen mit der Wirklichkeit. Das, was er zu seyn behauptet, z. B. *tren*, *keusch*, *wahrhaft* u. s. w., nicht durch entgegengesetzte Handlungen verdächtig gemacht heißt *ehrl*ich. Man sagt: eine *ehrl*iche Jungfrau, ein *ehrl*icher Mann; der meint's *ehrl*ich; es geht *ehrl*ich zu, d. h. so wie man behauptet, daß es zugehe. Das Gegentheil davon ist *unehrl*ich. *Ehrl*ich und *unehrl*ich drücken daher verschiedene andere Eigenschaften aus, deren Bejahung oder Verneinung sie sind. *Ehrl*ich bedeutet daher so viel als *keusch*, *tren*, *wahr*, *aufrichtig* u. s. w.

*Ehrenvoll* wird von den Gegenständen außer dem handelnden Subject gebraucht, welche ihm *Ehre* machen, z. B. öffentliche Auszeichnungen, das Lob des Lehrers u. s. w.

*Ehrenfest* und *ehrenreich* sprechen ihre Bedeutung deutlich aus, und werden gewöhnlich als Titel gebraucht. (Diond.)

**Ehrliche**, s. *Ehre*.

**Ehrlosigkeit**, *Ehrvergessenheit*, *Entehrung*, *Infamia*. *Ehrlos* ist das Gegentheil von *ehrenhaft* und *ehrenwerth*, bezeichnet Handlungen und Personen, welchen nach dem allgemeinen Urtheil keine *Ehre* zukommt. *Ehrvergessen* bezeichnet nicht Handlungen, sondern die Handlungsart oder Personen, die sich öffentlich benehmen, als ob sie *Ehre* nicht achteten. *Ehrvergessen* unterscheidet sich von *ehrlos*, wie *Subjectives* von *Objectivem*. *Ehrlosigkeit* drückt das Urtheil des Menschen und *Ehrvergessenheit* die Stimme des Handelnden aus. Der *Ehrvergessene* wird sogleich *ehrlos* wenn seine Sinnes- und Handlungsart bekannt wird. Der vor der Welt *Ehrlose* kann dessen ungeachtet nichts weniger als *ehrvergessen* seyn.

*Ehrwidrig*, *ehrenrührig* und *entehrend* bezeichnen Dinge die der *Ehre* nachtheilig sind, und zwar *ehrenwidrig* bloß subjective Bestimmungen, als unsere eigenen Handlungen, Gesinnungen u. s. w., *ehrenrührig* aber bloß objective, von andern herkommende unserer *Ehre* nachtheilige Dinge, als Reden, Behandlungen, insofern sie Angriffe auf unsere *Ehre* enthalten, ohne an sich deshalb wirklich unsere *Ehre* entziehen zu können. *Entehrend* endlich drückt beides, das objective und subjective, aus, und bezeichnet solche Dinge die unserer *Ehre* wirklich schaden und sie aufheben, die uns *Ehre* machen. (S. *Schande*.) Ein scheinbar *ehrenwidriges* Benehmen kann leicht *ehrenrührige* Urtheile hervorbringen; doch werden sie nicht schon *entehrend* für uns seyn, wenn unser Betragen selbst es nicht war.

Es ist übrigens merkwürdig, daß keine Nation so mannigfaltige Zusammensetzungen, Schattirungen und feine Nuancirungen des Begriffs der *Ehre* hat, als die Deutsche; dieß und die herrschende Neigung zur Entstellung beweist das sehr lebhafteste Ehrgefühl dieser Nation (Diond.)

1) Plaut. Pers. Act. 3. sc. 1. v. 19, „si ad paupertatem admigrant familiae, gravior paupertas sit.“

**Ehrsamkeit**, s. *Ehrbarkeit*.

**Ehrsucht**, *Ehrtrieb*, s. *Ehre*.

**Ehrvergessenheit**, s. *Ehrlosigkeit*.

**Ehrwürdigkeit**, s. *Würde*.



**Ei**,  $E\eta^1$ , (Orum<sup>2</sup>, Oon<sup>3</sup>, Conceptum<sup>4</sup>, Conceptus<sup>5</sup>, Oema<sup>6</sup>), ein aus Häuten und Flüssigkeiten gebildeter runder oder kugelförmiger Körper, welcher in dem Eierstocke erzeugt, in den übrigen inneren Geschlechtstheilen des weiblichen Thieres aber entwickelt worden, und die Grundstoffe zur Bildung eines neuen Individuums enthält, die durch die Einwirkung des männlichen Samens erregt wird. — Wir haben daher 1) das Ei im allgemeinen, das unbefruchtete und das befruchtete, 2) das in seiner Entwicklung zur Bildung eines neuen Individuums begriffene Ei zu unterscheiden.

1) Betrachtung des Eies im allgemeinen. Sobald wir eine Spur von Fortpflanzung der Individuen durch sich selbst wahrnehmen; so bemerken wir auch die Bildung des Eies. Dunkel war uns zwar noch die Lehre über die Fortpflanzung der Quallen oder Medusen, der Crustaceen Blumenbach's, der Seeigel, Scapalarien, der Holothurien; indessen will man in dem Innern dieser Geßäpfe an einander gereichte Bläschen gefunden haben, die man für Eier hält? — Nicht weniger verborgen ist uns die Zeugung der meisten Fußwürmer Dillen's, oder Branchiodalen, der Nereiden, Amphipoden, Dentalen, Serpeln. — Bei den Eingeweidewürmern fangen Jümmtere Beobachtungen in dieser Hinsicht an, und die Eier erscheinen deutlich und ohne allen Zweifel zur Fortpflanzung in dem Thiere tauglich.

Ein jedes Ei besteht aus einer häutigen oder kalkartigen Hülle und aus Flüssigkeiten. Die Eier der Würmer, der Fische, der Frösche, der Krebse bestehen aus einer mehr oder minder festen häutigen Schale, die eine weiße oder gelbe dünne Flüssigkeit einschließt. Beim Legen werden sie mit einem gelatinösen Schleim überzogen, der ohne Beziehung auf die Ernährung des Embryo zu seyn scheint. In jener Flüssigkeit nur Dotter oder ob in ihr Eiweiß und Dotter enthalten ist, müssen noch wiederholte Untersuchungen entscheiden. Volini versichert, Dotter in einer weißlichen Flüssigkeit bemerkt zu haben; mir schien das Ganze nur aus Dotter zu bestehen, allein ich wagte nicht zu entscheiden, da ich die Untersuchung nicht oft genug wiederholen konnte. Die Eier einiger Anorpelfische, welche so groß sind wie Tauben- und Hühnereier, enthalten deutlich einen gelben Dotter und die Bildung des Embryo's jener Thiere überhaupt scheint auch das Daseyn des Dotters nothwendig zu machen; vielleicht vertritt der Schleim, der über die Eier ergossen wird, die Stelle des Eiweißes. Ueber die Eier der Mollusken, zu denen man nun auch die Muscheln rechnet, fehlen uns noch die genaueren Untersuchungen. Meistentheils sind sie sehr klein, manche, (wie der Tintenfisch,) sind aber doch erbsengroße Eier.

1) Haller's Grundr. d. Physiol. umgearbeitet von v. Leveiling, 2. Th. S. 940. 2) Harvei exerc. de generatione animal. l. „Nos autem asserimus, omnia omnino animalia, etiam vivipara, atque hominem adeo ipsum ex ovo progigni, primosque eorum conceptus, e quibus foetus fiunt, ova quaedam esse.“ 3) Vgl. dies Wort. 4) sc. quod conceptum est, doch als Substantiv minder gebräuchlich als das folgende. 5) Harvei exerc. etc. l. c. 6) Vgl. dies Wort. 7) S. Dumeril analytische Zoologie a. d. Franz. übers. v. Forstlep, S. 305.

Die Befruchtung der Eier geschieht auf verschiedene Art, theils gleich den Fischen, (wie beim Tintenfisch,) theils durch Begattung und zwar als Zwitter mit gegenseitiger Begattung, (wie bei den meisten Gastropoden, Gartenschnecken, Bergschnecken,) oder als Zwitter ohne gegenseitige Begattung, (wie bei der Miesmuschel, den Austern und ähnlichen.) Beim Durchgang durch den Eiergang werden wahrscheinlich bei den meisten Conchylien die Eier mit einer schleimigen Feuchtigkeit überzogen, welche in der sogenannten Purpurblase abgesondert wird. Bei einigen Muscheln wandern die Eier in die Kiemen, ohne daß man den Weg, wie sie dahin gelangen, mit Bestimmtheit angeben kann. Dken<sup>8</sup> versichert gesehen zu haben, daß Muscheln die Eier aus einer kleinen Oeffnung unter dem Schultermantel zwischen Mantel und Bauch stromweise hervorkommen. Zeller<sup>9</sup> erklärt dagegen zufolge anatomischer Untersuchung der Flußmalermuschel das, was man bisher für Kiemen gehalten hat, für Geschlechtstheile; die Kiemen hat nach ihm das Thier vorn rechts und links; es ist Zwitter, das Ovarium liegt unmittelbar unter dem Mantel, die Eier liegen in dem Eierstocke gleichsam in vielen Ecken eingeschachtelt, die nach innen liegenden Lappen, die man bisher für die innern Kiemen gehalten hat, sind wahrscheinlich die Hoden. Diese Theile haben alle eine gemeinschaftliche Oeffnung in der Kieme und durch die Gänge der Ovarien kommen denn auch die jungen Muscheln hervor<sup>9</sup>. Diese Deutungen der Organe scheinen aber mit der Natur ganz und gar nicht übereinzustimmen; aber Dken's Beobachtung bedarf noch Bestätigung, da er sie nur Einmal anstellen konnte, und der Canal doch noch nicht nachgewiesen ist, welcher aus den Eierstöcken zu jener Oeffnung hinführt.

Die Eier der Fische nennt man Leich oder Rogen; meistens sind sie sehr klein; ihre Zahl ist aber ungeheuer, schon bei kleinen Fischen beläuft sie sich auf Hunderttausende, bei größeren auf Millionen. Die Befruchtung der Eier geschieht auf verschiedene Weise. Bei den meisten spritzt das Männchen den Samen, der in zwei oder drei ähnlichen Säcken abgesondert wird, (die Milch,) entweder gleich, nachdem das Weibchen geleicht hat, oder doch bald nachher auf die Eier; bei einigen lebendig gebärenden, wie beim Menis und dem Aale, wird der Same von der Ruthe aufgesogen, um die Eier schon in der Gebärmutter zu befruchten; einige Knorpelfische, wie Rochen, Hais, legen theils die Eier, theils lebendig gebären, begatten sich wie Säugethiere.

Die Eier der meisten Amphibien sind groß, aber ihre Zahl ist gering; sie sind mit einer Pergamenthaut überzogen, werden ins Trockne, gewöhnlich in heißen Sand, gelegt; Eiweiß und Dotter unterscheidet man in ihnen deutlich. — Die Eier der Frösche, Kröten, Molche sind dem Fischrogen gleich; die Frösche leichten wie die Fische, das Ei ist eine Schleimkugel, in der ein schwacher Saft sich zeigt, und bei dem Legen werden sie noch mit Schleim überzogen; das Männchen spritzt den Samen auf den Leich; bei Fröschen und Kröten entwickeln sich die Jungen im Leibe des Thieres, der Samen muß daher aufgesogen werden.

8) Lehrbuch der Naturgeschichte, 3. Th. 1. Abth. S. 204 u. 237.

9) Jörg's Grundrissen der Physiol. d. M. Berl. 1815, S. 62.



Schlangen, Eidechsen, Krokodille und Schildkröten haben Kugeln; die Befruchtung der Eier geschieht daher durch eine Begattung bei Säugethieren, und die großen Eier werden entweder ins Trockne gelegt, oder sie entwickeln sich, wie bei den Vipern, in der Wärme.

Die Riesenschildkröte legt 100 Eier auf einmal, 300 im Ganzen, macht dazu zwei Zoll tiefe und ein Zoll weite Löcher im heißen Sand. — Die Schlangen legen 12 bis 36 Stück Eier unter Erde, Laub und in hohle Bäume.

Die Eier der Insecten sind kleine Körner; eine dünne Haut zieht die Feuchtigkeiten ein; durch Schleim werden sie unter einander zu Häufchen verbunden, und die meisten mit einem eigenen, verschiedenartigen Gespinnst umgeben. Die Befruchtung geschieht durch Begattung. — Merkwürdig ist die den Blattläusen vorzüglich eigene Eigenschaft, sich ohne Begattung mehrmal fortzupflanzen. Die Weibchen werden im Herbst befruchtet, legen Eier auf Knospen, aus denen im Frühjahr lauter Weibchen hervorgehen; diese legen lebende Junge und diese wieder Junge alle zehn Tage, bis zur zehnten Lebenszeit, im Sommer lauter Weibchen, im Herbst auch Männchen.

In den Eiern der Vögel erscheinen uns die einzelnen Theile deutlichsten gesondert und entwickelt. Untersuchen wir dieselben von außen nach innen; so zeigt sich zuerst die größtentheils aus kohlenstoff- und wenig phosphorsaurem Kalk gebildete Schale, die porös ist und eine Ausdünstung des Eies sowohl, als ein Eindringen der Luft gestattet. Die Form des Eies ist mehr oder weniger länglichrund, hat ein stumpfes und ein spitzes Ende, die Farbe der Schale ist sehr verschieden, weiß, aber auch gefärbt, einfarbig und marmorirt. Unter der Kalkschale liegt eine aus zwei Blättern bestehende feste Haut; beim stumpfen Ende findet sich zwischen den beiden Blättern der freien Luft, die von außen eindringt, so wie die Flüssigkeiten durch die Ausdünstung sich vermindern. Die innere Fläche dieser Haut ist mit einer dünnen Haut überzogen, welche das Eiweiß nach außen umgibt. — Das Eiweiß besteht aus zwei Abtheilungen; die äußere Abtheilung wird nach innen zu durch eine ähnliche dünne Haut, wie die so eben genannte äußere Haut, von der zweiten Abtheilung geschieden und auch diese scheint ihre eigne sehr dünne äußere und innere Haut zu haben. Beide Abtheilungen des Eiweißes werden durch eine Membran an die feste Haut des spitzen Endes des Eies befestigt. Nicht weit in der Mitte des Eies liegt der in seiner eignen Haut eingeschlossene Dotter; er ist leichter als das Eiweiß, und steigt daher, je nachdem man das Ei dreht, in die Höhe. Der Dotter ist mit dem Eiweiß durch zwei weißliche, schnurähnliche Körper verbunden, die als Hagel (Chalazae, Grandines,) nennt; sie sitzen mit dem einen Ende an der Haut fest, welche den Dotter umgibt, mit dem andern in dem Eiweiß, nach dem spitzen und stumpfen Ende des Eies.

Sie bestehen wahrscheinlich aus Röhren, die in dem Eiweiß sich befinden, um dem Dotter das Eiweiß beim Brüten zuzuführen, vielleicht auch schon vor dem Brüten.

Der Hahnentritt liegt in der Mitte der Dotterhaut; er besteht aus einem weißlichen Fleck von verschiedner Größe, bei den Hühnern

hat er die Größe einer Linse; um jenen Kreis laufen mehrere weißliche Streifen (Halones, Circuli,) herum. Hühner, Gänse, Enten, einspernte Stubenvögel legen bisweilen auch nicht befruchtete Eier; Hahnentritt ist in ihnen vorhanden, allein sie scheinen nicht so lebt zu seyn, wie die befruchteten Eier; denn sie faulen leicht, und die Menge der Flüssigkeiten ist bisweilen auch von der eines befruchteten Eies abweichend, besonders findet man gewöhnlich weniger weiß.

Die Eier der Säugethiere, so wie die des Menschen, sehen wir in den Eierstöcken als rundliche Bläschen. Sie bestehen aus sehr dünnen, durchsichtigen Häuten, welche eine lymphatische Feuchtigkeit enthalten. Bei dem Menschen nennt man sie Graafische Bläschen, (Ovula Graafiana.) Sie werden höchst wahrscheinlich in dem Eierstocke befruchtet und gelangen in der Gebärmutter zu ihrer weitem Entwicklung.

2) Betrachtung des Eies in seiner Entwicklung zur Bildung eines neuen Individuums begriffen.

Von den Quallen, den Würmern, den Schnecken, Muscheln und allen Molusken wissen wir über diesen Gegenstand noch nichts. Dasselbe gilt von den Insecten. Doch dürfen wir hier die Metamorphosen nicht ganz unberührt lassen, welche man Insecten durchlaufen, ehe sie in ihrer vollkommenen Gestalt erscheinen. — Das zur Entwicklung der Eier eierlegender Thiere überhaupt nothwendig erforderliche Princip ist der Wärmestoff, und dieser theils durch die Wärme des Thieres, theils durch die Temperatur der Luft, oder durch diese und den Körper mitgetheilt, in welchem das Thier die Eier legt. Die Eier der Insecten sind den beiden letzten Einflüssen allein überlassen; kein Insect brütet. Die Eier mehrerer dieser Thiere liegen den Winter hindurch, bis sie die Frühlingsform entwickelt. Nachdem das Ei einige Zeit der günstigen Einwirkung ausgesetzt gewesen ist, kommt ein Wurm oder eine Raupe hervor, die sogleich in das ausgebildete Insect verwandelt; oder es geht die Raupe zuerst in eine Puppe über, aus welcher ein Insect hervorkommt, welches sich nicht weiter vervollkommnet, bei vielen Thieren selbst noch einmal größer wird.

Wahrscheinlich hat die Entwicklung der Eier dieser Thiere die meiste Ähnlichkeit mit dem gleichen Vorgang bei den Reptilien.

Bei dem Regenwurm, (*Lumbricus terrestris*<sup>10</sup>), und dem *Lumbricus echinurus*<sup>11</sup> hat man bemerkt, daß die Eier aus den Eierstöcken in den hintern Theil des Unterleibes treten, dann zwischen dem Darmcanal und den äußern Muskeln bis zu einem, in der Endstanz des Schwanzes enthaltenen Behälter schlüpfen, wo man sie vollkommen lebendig findet; dieser Beobachtung zu Folge sind die Regenwürmer lebendig gebärend.

Ueber die Entwicklung der Eier von Fischen und Reptilien.

<sup>10</sup>) S. Cuvier's Vorlesungen über vergleichende Anatomie, übers. v. Meckel 4. Th. S. 580. Montegre's Abb. in Mille Magazin encycloped. Pl. P. 96, 97. <sup>11</sup>) Pallas's Naturgeschichte merkwürdiger Thiere, 2te Samml. Leipz. 1778, S. 8.



ver danken wir besonders Cavolini und ~~Sp~~me wichtige Be-  
 zungen; vieles ist aber noch verborgen und neue Untersuchungen  
 sehr wünschenswerth. Cavolini fand bei Betrachtung der  
 eines Aehrenfisches mit einer Linse, die siebenzehnmahl vergrößerte,  
 dieselben die Figur einer Biene angenommen hatten; in dem  
 Theil lag der Kopf des Embryo's, in dem größten der Leib  
 zusammengebogenem Schwanz. Das Dotter war durch die Nabel-  
 des Unterleibes unmittelbar an diesem, nicht erst mittelst der  
 Nabelschnur befestigt, vermittelst der Blutcanäle und seiner äußeren  
 Membran, wahrscheinlich eben so, wie bei der Frucht des Huhns;  
 vermiste er die Haut, welche die Frucht mit dem Gelben und  
 Eien in das Amnion einschließt; auch konnte er außer einer  
 geln Kugel von einförmiger Substanz, (dem Dotter,) eine andere  
 thigkeit nicht wahrnehmen. Bei einem größeren Tungen, das  
 Auskriechen nahe war, fand er den Dotter eben so in den Un-  
 terleib des Fisches hineingetreten, als dieses mit dem Dottersacke bei  
 Hühne der Fall ist, und bei zwei Fischen fand er deutlich den  
 Zusammenhang der Dotterhaut mit dem Anfange des großen Dar-

— Bei den Krebsen treten die Eier, in eine Art von Schleim  
 entwickelt, durch die äußern Geburtsglieder heraus und hängen sich  
 an die Bartfasern des Schwanzes; sie sind nun noch weich, nach-  
 mach verhärtet aber nicht allein der Schleim, der sie umgibt, son-  
 auch die Schale. Die Entwicklung der Eier beginnt nun mit  
 Abnahme ihres Umfanges und Veränderung ihrer Farbe; es zeigen  
 auch dem bloßen Auge zwei schwarze Punkte, welches die Augen  
 auf dem Dotter sind viele schwarze Flecken zerstreut. Das Ei  
 zeigt nun schon den Körper des Fötus, der über dem Dotter liegt,  
 aber auch hier, wie bei den Fischen, in die Unterleibshöhle hinein-  
 — Die blinden Anhänge, welche man am Magen der Fische  
 sieht, sind wahrscheinlich die Merkmale der Stellen, wo der Dot-  
 tersack oder das Darmbläschen mit den Eingeweiden in Verbindung  
 worden hat <sup>12</sup>.

auf eine ähnliche Weise entwickeln sich wahrscheinlich auch die Eier  
 Amphibien. — Nur bei einigen derselben findet eine der In-  
 brutähnliche Metamorphose Statt. Die aus den Froscheiern  
 entwickelten Jungen gleichen einem kleinen Fisch, man nennt sie  
 Laichquappen; sie haben einen dicken Kopf, hinter den Ohren  
 einen und einen Schwanz; nach neunzehn Tagen zeigen sich die  
 Extremitäten und die Kiemenzweige schrumpfen ein; sie athmen nun  
 Lungen. Nach zwei Monaten häuten sie sich; aber der Schwanz  
 und schrumpft allmählig ein.

Die Entwicklung der Hühnereier ist bereits von mehrern  
 Forschern beobachtet worden, die Kleinheit der Gegenstände ist  
 Ursache, daß dessen ungeachtet noch so manches erst durch wieder-  
 und genaue Beobachtungen mehr aufgeheilt werden wird.

Schon die Werke von Aristoteles <sup>13</sup>, Volcher Coiter <sup>14</sup>, Fa-  
 c. Ph. Cavolini's Abb. über die Erzeugung der Fische und der Krebse, a. d.  
 ital. v. Zimmermann, Berl. 1792. E. Home's Abb. über d. Entwickl.  
 des Fötus der eierlegenden-lebendiggebärenden Fische im Deutschen Archiv, f.  
 physiol. 2. B. 3. H. S. 531. 13) de gener. animal. und hist. animal.  
 14) tab. et observ. anat. Norimb. 1572 fol.

bricius ab Aquar<sup>15</sup> indente<sup>15</sup>, Harvey<sup>16</sup>, Malpighi<sup>17</sup> erhalten sehr schätzbare Beobachtungen; aus dem letzt verfloßenen Jahrhundert werden die Schriften von Haller<sup>8</sup> und Wolff<sup>19</sup> hinzu den classischen über diesen Gegenstand zu rechnen seyn; aber ohne Verwirrung und Dunkelheiten ist ihre Beschreibung der Entwicklung des Eies. — Ziedemann hat<sup>20</sup> alles Wichtige gesammelt und durch eigene Beobachtungen berichtigt; am bündigsten, und weit es nur die jetzigen Forschungen zulassen, am deutlichsten aber nach meiner Meinung Dken<sup>21</sup> die Vorgänge im Ei während des Brütens beschrieben, und ich werde daher das, was er darin sagt, hier aufnehmen.

Eine Henne brütet in der Regel 21 Tage. Während dieser dunstet das Ei gegen  $\frac{1}{6}$  aus. Es wiegt Anfangs fast 16 Drachmen (4 Loth,) am Ende  $2\frac{1}{2}$  Drachmen weniger. Die Brutwärme ist größer der Wärme der Vögel, etwa  $103^{\circ}$  F. Man kann die Eier auch künstlich ausbrüten lassen. Auch können sich Eier im Leibe der Henne weil die Luft aus den Lungen in die Bauchhöhle tritt.

Der Hahntritt oder die Narbe ist ein linsengroßer, runder, weißer Fleck auf dem Dotter, wahrscheinlich eine Einsackung der Dotterhaut und der Anfang des Pippels. Dieses entwickelt sich nämlich in der Narbe selbst, und diese Narbe vergrößert sich, daß sie allmählich als Hülle des Jungen erscheint. Die Anlage zum Jungen wird Pflanzung und Thieren von der Mutter gemacht, ohne daß eben Keime eingeschachtelt wären.

Schon gegen Ende des ersten Tages ändert der Hahntritt die Gestalt, wird etwas größer und länglich, in welcher Gestalt sich näher der Keim und zwar als Rückgrath zeigt. In Entfernung von einem bis zwei Messstrichen sind drei bis vier weißliche, concentrische Ringe (Haloen,) um den Hahntritt unter der Dotterhaut, wie wie geronnenes Eiweiß und daher wolkig oder schuppig, wie gefaltete Bänder, aussehen. Sie sind nicht von einander getrennt, man aus der Beschreibung schließen wird, sondern stellenweis durch Querriegel verbunden, münden so zusammen wie Conserven. Die Querriegel der verschiedenen Ringe fallen nicht in einen Halbmonde, sondern stehen abwechselnd.

Um die Mitte des zweiten Tages enthält der Hahntritt durchsichtiges Wasser, und in diesem schon den sichtbaren, gallertartigen gleich einem Faden mit kolbigem Ende, den Kopf. Jetzt heißt Hahntrittsblase, (Colliquamentum, Sacculus colliquamentum, Nidus pulli, Areola pellucida Wolfii,) auch Amnion, Chorion. Es ist, nach Dken's Dafürhaltens eine Einsackung unter der Dotterhaut; der Keim ist auch wirklich in den Dotter eingesenkt. Nach andern wird diese Hülle von einem äußern sehr dünnen durchsichtigen Blatt, der Dotterhaut, und einem inneren, die Amnion, Blatt gebildet, welches gleichzeitig mit dem Embryo entsteht.

15) de format. foetus, Pat. 1604 fol. 16) exerc. de generatione Lond. 1651. 17) de formatione pulli in ovo diss. ep. Lond. 1758. 18) sur la formation du coeur du poulet. Laus. 1758. 19) de theoria generationis, Comment. Petropol. T. XIII. P. III. p. 478 — 20) in seinem Handb. d. Zoologie, Heidelb. 1814, 3. B. 21) Lehrbuch der Naturgeschichte, 3. Th. 2. Abh.



in beiden Blättern ist eine helle Flüssigkeit, in welcher der Embryo nackt liegt. Gegen Ende dieses Tages sieht man schon die Zeichnungen der Gefäße weit um den Keim herum zwischen den Ringen. Sie sind aber noch nicht roth, doch schon eben so gestaltet, und in derselben Zahl sichtbar, als sie sogleich beschrieben werden. Man nennt die Fläche den Gefäßraum, das Aderfeld, (*Figura venosa, area vasculosa*.)

Am dritten Tag ist alles noch eben so, aber deutlicher und größer. Das untere Blatt des Gefäßraums, auf welchem der Embryo mit der Bauchfläche liegt, zieht sich, nach Wolf's Beschreibung, nun auf beiden Seiten bis an die Rückenfläche des Embryo hinauf und legt sich wieder zu beiden Seiten in einem spitzen Winkel um; man nennt diese Haut falsches Amnion, (*Amnium spurium, membrana in areae pellucidae superficie inferiori apparens*;) es bildet sich aus demselben der Darmcanal. Die Gefäße sind roth, das rothe Blut schlägt, (*Punctum saliens*;) das Hauptgefäß bildet einen Kreis um den ganzen Gefäßraum, und steht ringsum über  $\frac{1}{3}$  Zoll vom Keim ab. Dieses Gefäß heißt Grenzgefäß, (*Vena terminalis, Circulus venosus*.) Es ist fadensdick, enthält zuerst rothes Blut, das nur allmählig gegen den Keim durch besondere Zweige, die das Grenzgefäß abgibt, vorrückt. Von diesem Gefäß aus ist die Bildung des Keimes als anfangend betrachtet werden. Man darf aber nicht denken, als wären beide Anfangs von einander getrennt, und beide Gefäße wüchsen gegen einander, sondern das Grenzgefäß war Anfangs ganz dicht um den Hahnentritt, aber unsichtbar, es ungefärbt ist; so rückt es immer ferner, bis es durch ein satzgelbes am zweiten Tage, und endlich durch die rothe Farbe am dritten Tage, sich zu erkennen gibt, während die Gefäße, durch die Verbindung mit dem Keim in Verbindung steht, entweder noch gelb oder gar unsichtbar sind; daher manche gemeint haben, der Keim sei abgetrennt von dem Grenzgefäß.

Man glaubt, diese Gefäße seien nicht die gewöhnlichen Nabelgefäße der Säugethiere, indem das Chorion sich erst später entwickle. Als das sogenannte Chorion der Vögel ist offenbar ganz von dem der Säugethiere verschieden, obschon es einerlei Einrichtung hat, nämlich Keimlunge ist. Bei Säugethiern ist das Junge in das Chorion eingebettet, beim Vogel aber wächst es als kleines Bläschen erst nach einigen Tagen aus dem Nabel hervor. Die Dottergefäße entsprechen, wenigstens zum Theil, den Krösnabelgefäßen, welche mit den Darm durch die Nabelschnur herauslaufen, und sich auf dem Darmbläschen verzweigen, das bei Säugethiern eben so am Blinddarm hängt, wie der Dotter bei Vögeln. Es ist über diese Gefäße noch Dunkelheit verbreitet. Falsch ist es sicher, daß es lauter Venen seyn sollen, (Haller, Wolf und Tiedemann wollen,) und irrig, oder wenigstens unverständlich das, was man gemeiniglich über die Verbreitung der Gefäße lehrt. Nach Deken haben sie folgende Bedeutung. Es sind zwei von einander ganz verschiedene Gefäßsysteme da. Die Nabelgefäße sind Krösnabelgefäße, die aufsteigenden und absteigenden aber den Eierkeimen eigenthümlich, wenigstens bei Säugethiern noch nachgewiesen. Es ist unrichtig zu sagen, es sei eine aufsteigende. anat. physiol. Realw. II. 23.

gende Vene da; Dken hat bei einem Ei von drei und einem halben Tag gesehen, daß eine Menge Zweige aus der Kopfgegend, jeder wohl ein Dugend nach oben und seitlich gegen die Grenzadern gehen, und sich mit diesen verbinden. Vor und hinter dem Kopfe sind sie in einem Stamm, also in zwei, und der vordere scheint in der Gegend des Herzens, der hintere oben tiefer gegen den Keim in den Keim zu begeben. Die Seitengefäße reichen mit ihren Enden nicht bis an die Grenzader. Das absteigende Gefäß ist sehr schlingig, und gibt wenige Zweiglein, welche sich unten auch in zwei Theile wie oben theilen, an die Grenzader; daher diese keinen ganzen Kreis bilden, sondern nur zwei Halbkreise, die mit ihren Durchschnitten sich zwar parallel liegen, aber nicht berühren. Durch die genannten aufsteigenden Adern, die wahrer die oberen zu nennen sind, wird das arteriöse Blut aus der Grenzader in den Keim gebracht, und ihre zwei Stämme werden sich daher in die Hohlader wie es Dken scheint, in beide Hohladern öffnen. Durch die absteigenden Zweige aber, oder durch die untern Adern, wird dieses Blut als venöses wieder in die Grenzader gebracht, und müssen mithin Fortsetzungen der Aorta seyn. Die Seitengefäße, welche ihr Blut ohne Zweifel in die Krösadern, und aus diesen die Pfortader führen, scheinen außer aller Verbindung mit der Grenzader, selbst noch am siebenten Tage zu seyn, wo doch alle Gefäße schon sehr deutlich sind, und das Chorion schon groß ist. Diese bilden also ihr Wesen für sich.

Die obern Dottergefäße wären also gleich der Nabelvene, in so fern diese einen Zweig in die untere Hohlader gibt, die untern Dottergefäße aber wären gleich den Nabelarterien, welche das venöse Blut aus der Aorta zu dem Mutterkuchen führen. Die Grenzader ist gleich dem Mutterkuchen. Die Seitengefäße haben als Krösgefäße nichts damit zu thun; doch können sie auch die Nabelvene vorstellen, in so fern diese einen Zweig an die Pfortader gibt. Bei den Vögeln ist also das Gefäßsystem mehr zerfallen, jedes individuell ausgebildet, für ein anderes Organ bestimmt ist. In der Nabelvene der Säugethiere sind zwei Gefäße verschmolzen, das für die Pfortader und das für die Hohlader.

Die Schuppenringe (Hyalones,) verschwinden. Was sie bedeuten ist noch unbekannt; sie scheinen aber nicht ohne Bezug auf das Gefäßsystem zu seyn.

Der Keim liegt in einer Einsackung der Dotterhaut, und ist in die Dottermasse hinein, wie ein kleiner Kreis in einen großen, den er von innen berührt. Diese kleinere Blase hält Dken für die echte Amnion. Nach Wolf bildet sich das wahre Amnion am vierten Tag, es liegt innerhalb des falschen Amnions, in Form einer feinen ausgedehnten und mit einer durchsichtigen Flüssigkeit angefüllten Blase. Es entspringt von dem Wulst oder Rand des Uterus, der in der Schamgegend anfängt, in die Lenden- und die Beckengegend fortläuft, und dann sich dicht über der Herzgrubengegend vorwärts krümmt und sich mit der entgegengesetzten Seite verbindet. Das Herz und der sich aus dem falschen Amnion bildende Darmtraktus liegt in dem wahren Amnion, es schlägt sich an dem Rand



ist um und überzieht den ganzen Embryo. Am Keim selbst zeigen schon deutlich die Wirbelblasen, und die Hirnlappen auch als Blasen. Brust hängt mit dem Kopf vor, der Bauch ist schmal, wie leer, Leber kaum bemerklich, die Därme sind nicht zu unterscheiden wegen Undurchsichtigkeit. Daß der Darm nur eine der Länge nach offene Röhre sei, wie auch Anfangs die Gefäße, ist nicht wahrscheinlich, viel weniger erwiesen.

Am vierten Tag kommt die sogenannte Chorionblase zum Vorschein. Sie wächst aus der Nabelgegend hervor, zeigt sich kleiner als die Erbsen, nimmt aber täglich schnell zu, daß sie bald keinen Platz mehr im Ei hat, sondern sich zusammenlegen muß, daß sich die Hülle berühren. Als solche doppelte Haut überzieht sie fast die ganze innere Wand der Eierschale. Sie kommt leicht dahin, weil sich das Ei sehr vermindert, und sich an das untere Ende des Dottersackes hat, wo es nur noch wie eine kleine Münze aufliegt. Diese Blase enthält Anfangs eine klare Flüssigkeit, und ist von einem reichlichen Netzwerk überzogen, das von wahren Nabelarterien, (*Arteriae umbilicales*), und einer Nabelvene, die sich aber in die untere Hohlvene allein entleert, gebildet ist.

Die Flüssigkeit in diesem Bläschen und seine Haut, welche sich nur Cloake hohl fortsetzt, deutet an, daß diese Blase die Allantois wirklich ist, (nicht das Chorion der Säugethiere,) und jener Hohl der Urachus, und die Cloake die Harnblase. Ob der urachische Beutel, den man bei allen erwachsenen Vögeln findet, Ueberbleibsel des Urachus ist, wagt Oken nicht zu bestimmen. Nabelgefäße sind demnach Allantoisgefäße, die bei dem Vogel Hülfsathemgefäße werden, beim Säugethiere aber die Hauptgefäße sind, da die Dotterhaut oder die Darmblase sehr schnell verfault. Alle Eingeweide, Organe und Glieder fangen an, sich zu bilden, besonders Leber, Nieren, Magen, Kiefer, die aber sehr kurz und Gliedersprossen.

Am fünften Tag zeigen sich die Lungen, am sechsten der Dottersack, nach Oken in seiner Verbindung mit dem Blinddarm. Die Allantois ist gegen  $\frac{1}{2}$ " lang, der Keim länger. Ueber den Dottersack (Ductus vitellarius, Ductus vitelli intestinalis, Apophysis) sind auch die Schriftsteller verschiedener Meinung. Die meisten, z. B. Coiter, Needham, Schrader, Malpighi, Müller, Wolf, Vicq d'Azyr, Blumenbach, Oken, Tieemann, nehmen an, es sei ein wahrer Canal, durch welchen der Dottersack mit dem mittlern Stück des Darmcanals in Verbindung steht, und der zwischen den Stämmen der Dottergefäße liegt. In den letzten Tagen der Bebrütung kann man den Darmcanal durch den Canal aufblasen. Indessen halten ihn doch einige Schriftsteller, als Leveille und Jörg, bis zu den letzten Perioden der Entwicklung für undurchbohrt und nur für ein Band, welches jene beiden Theile an einander befestigt <sup>22</sup>.

Von nun an wird fast alles nur größer. Am siebenten Tag mißt der Keim schon 1", und die Allantois noch mehr. Speiseröhre, Kropf, etc. *E. Leveille diss. physiolog. sur la nutrition des fœtus, à Paris an VII.* auch Jörg's Schrift a. a. O. S. 250.

Magen, Gallenblase, Rücklein, Eierstock, Nebennieren zeigen und auch Milz, die spät erscheint. Am achten Tag fängt die Knorpelung an.

Am neunten Tag sind viel kleine Flocken im Dotter, welche der Dotterhaut hineinhängen, und die man für einsaugende hält, nach Den wahrscheinlich Lymphgefäße. Das Pippel besteht, ist  $1\frac{1}{2}$ " lang, wovon der Kopf, und an diesem das Hirn den großen Theil wegnimmt. Das Herz, welches vorher nur Canälen bestand, ist jetzt muskulös und ausgebildet, schlägt Mal in der Minute.

Am eilften Tag fangen die Federstoppeln an sich zu zeigen. Lustraum nimmt  $\frac{1}{4}$  des Eies ein, die Allantois überzieht fast ganze innere Eiwand, die Dottergefäße nehmen ab, weil ihr Atmungsproceß aufhört. Das Eiweiß ist sehr vermindert, und gegen die Eihaut gedrängt, dichter. Das Junge ist zwei Zoll lang. Die Glieder ganz ausgebildet, schon mit Behen.

Nun geht es immer vorwärts. Am den achtzehnten Tag ist Eiweiß ganz verzehrt, das Band und die Dotterschnüre bleiben. Dottersack wird durch den weiten Nabelring in die Bauchhöhle gezogen, der Kopf liegt gewöhnlich unter den rechten Flügel geschoben, weil das Junge auf der linken Seite zu liegen pflegt. Es bewegt sich stark, öffnet schon den Schnabel, hat gebildete Federn.

Am zwanzigsten Tag ist der Dotter, wovon noch gegen die Eihaut übrig ist, in der Bauchhöhle, die Athemgefäße auf der Allantois schrumpfen auch ein, weil das Junge schon Luft durch die Eihaut zieht; denn es pikt schon im Ei.

Indem das Junge nach Luft schnappt und sich bewegt, zerbricht es die Schale und schlüpft am 21sten Tag aus. In dem ersten Bauch zehrt das Junge noch gegen acht Tage; daher es die ersten Tage auch gar nicht oder wenig frisst. Man kann den Darm durch die Dotterhaut aufblasen. Endlich verschrumpft sie, und bleibt der kleinere Blinddarm fest an der Mitte des Darmes.

Ueber die Entwicklung der Eier der Eidechsen haben Emmert und Hochstetter wichtige Beobachtungen angestellt<sup>23</sup> und Untersuchungen, welche Jörg über die Eier der Nattern angestellt hat, kommen größtentheils damit überein<sup>24</sup>. — Die Eier der Eidechsen und auch der übrigen Reptilien, so weit man sie kennt, sind den Vögeleiern sehr ähnlich. Die der Natterschlangen sollen nach Emmert und Hochstetter und nach Dutrochet, wie die aller Reptilien<sup>25</sup>, kein Eiweiß besitzen; indessen bedarf dieses noch Bestätigung. Auch die Entwicklung der Eier der Reptilien nach diesen Beobachtungen zu Folge mit der der Vögeleiern große Ähnlichkeit, doch finden sich folgende bedeutende Verschiedenheiten<sup>26</sup>. Die Eier der Eidechsen und Schlangen enthalten keine Luft; der Dotter ist in ihnen im Verhältniß zum Eiweiß größer, (sie machen so eine Übergangsstufe der Vögeleiern zu den meisten Fischeiern, in denen

23) S. Archiv für Physiologie v. Reil und Rudenrieth, 10. B. 1. H.

24) a. a. O. S. 262.

25) Analyse des travaux de la classe des sciences mathématiques et physiq. de l'institut, pendant l'an 1814.

phys. p. 24. 26) nach Emmert und Hochstetter a. a. O. S. 11



lich nur Dotter sich findet;) der Dotter der Eidechsen erfährt während der Entwicklung keine bemerkliche Veränderung; bei den Schlangen und den Rattern ist nie ein Dottergang bemerkt worden; bei den beiden Blättern des Chorions ist eine beträchtliche Menge fast wasserhellen, etwas klebrigen Flüssigkeit enthalten; die Eier nehmen beim Auskriechen aus dem Ei nicht nur den Nest des Eiersacks, sondern auch das Chorion oder wenigstens einen Theil davon in die Bauchhöhle auf, aber es ist dieses zur Fortsetzung des Lebens nicht so nöthig, als die Aufnahme des Dottersacks bei Vögeln; der cylindrische Fortsatz, vermittelt dessen sich das Chorion der Eidechsen wie das der Vögel in die Cloake der Thiere einsetzt, erhält sich bei den erstern auch noch in dem erwachsenen Thiere; auch die Umstände, unter denen sich der Fötus in den Eiern der Eidechsen entwickelt, unterscheiden sich in mehreren Rücksichten von denen, welche die Ausbildung des Hühnchens bedingen; es ist wahrscheinlich, daß auch bei den Eidechsen, wie bei den Blindschleichen und Vipern der Fall ist, der Embryo schon zum Theil vor dem Legen entwickelt wird, die Entwicklung der Eidechsen im Ei erfordert aber doch noch viel längere Zeit, als die des Hühnchens, nach einigen Beobachtern zwei bis drei Monate; sie bedürfen zum Ausbrüten weniger Wärme als die Vögel, aber mehr Feuchtigkeit; die Eidechsen zehren den Dotter noch vor dem Auskriechen fast ganz auf, und da sie auch den kleinsten Theil nach dem Auskriechen entbehren können, so ist es wahrscheinlich, daß der Embryo einen höhern Grad von Selbstständigkeit

Die Entwicklung der Säugethiere ist ganz verschieden von der der Vögel, wie sich die eierlegenden Thiere entwickeln, wenn gleich einzelne Theile der in der Bildung eines neuen Individuums begriffenen Vorgänge mit einander verglichen werden können. Ganz getrennt von der Mutter, durch den Einfluß der Wärme kann der Embryo der Mutter gebildet werden; das Ei enthält alles, was zu seiner Ernährung nothwendig ist, Dotter und Eiweiß, auch noch einige Zeit, nach dem das Küchlein dem Ei entschlüpft ist, wird es noch zum Theil von dem Dotter ernährt, den es in seinem Unterleib aufgenommen hat. Das in dem Ei enthaltene Fötus erhält seinen Oxydationsprozess durch die äußere Luft, welche in das Ei dringt, der Embryo der Säugethiere durch das Blut der Mutter. Die erste Entwicklung des Fötus in dem Uterus ist noch sehr räthselhaft, verschiedene Beobachtungen lehren indessen folgendes darüber. Die Eier gelangen durch Fallopischen Röhren, oder Muttertrompeten, in den Uterus, wo sie als kleine, durchsichtige, in Schleim gehüllte Blasen erscheinen, die eine geringe Quantität wasserheller Flüssigkeit enthalten. Nach einigen Tagen zeigen sich feine Blutstreifen, die in der Folge sich zu einem dem Vogeleie ähnlichen Aderkreis bilden, und vielleicht entwickeln sich aus diesen Gefäßen, wie bei dem Vögelembryo, die ersten Geßäße der Säugethierjungen nebst dem Herzen. Nach einiger Zeit sieht man auf der bis dahin glatten Oberfläche des Fötus Flocken hervorkommen, welche sich an die innere Fläche der Gebärmutter anlegen und dieses mit dieser in nähere Verbindung bringen; nach innen zu

haben sich nun auch schon die einzelnen Theile des Eies entwi und der Embryo schwimmt in dem Schafwasser, welches die Schaut umgibt, wie der Embryo eierlegender Thiere; Dottersack Einweiß fehlen, statt jenes findet sich aber eine ähnliche Bildung, Nabelbläschen.

Das Ei aller Säugthiere besteht nun aus der Aderhaut, (Chorion,) der Schafhaut, (Amnion,) der Nabel- oder Darblase, (Vesicula umbilicalis. s. Tunica erythroides,) aus einer deutlichen Harnhaut, (Allantois,) oder doch einem Theil, ein ähnliches Gebilde vermuthen läßt, und der Nabelschn (Funiculus umbilicalis.) — Diese Theile wollen wir nun einz mit fortlaufender Vergleichung ihrer Beschaffenheit bei dem Mensch und den Thieren, näher untersuchen.

1) Das Chorion, oder die Aderhaut, ist die äußere des Eies, die dem Embryo zum Respirationsorgan, vielleicht auch Theil zum nahrungszuführenden Organe dient, mit dem Gefäßstern, das aus ihm gebildet wird, zunächst zusammenhängt, und Verbindung des Eies mit der innern Fläche der Gebärmutter bestit ist. Es ist aus dichtem Zellgewebe gebildet und sehr gefäßreich, äußere Fläche ist entweder ganz oder an einzelnen Stellen mit fe in Zotten hervorragenden Gefäßendigungen bedeckt, die innere mit der Schafhaut vereinigt. — Bei den Einhäusern und dem Sch ist die ganze Oberfläche des Chorions mit feinen und kurzen Ge endigungen bedeckt und hat daher ein sammtartiges Ansehen; Fläche liegt an der innern auch sammtartigen Fläche der Bärmi an, und zwischen diesen beiden Flächen zeigt sich eine chylöse Flüssigkeit. Bei den Wiederkäuern sammeln sich die Gefäßzotten in einz Häufchen an und bilden kleine, rundliche Erhabenheiten, einzelne Mutterkuchen, die in ähnliche Hervorragungen der Gefäße auf der in Fläche der Gebärmutter eingreifen, man nennt sie Cotyledonen. Bei der Kuh und dem Schaf findet man 70 bis 100, bei Hirsch 20 bis 40 Cotyledonen. Bei dem Menschen und den ren, welche einen menschenähnlichen Mutterkuchen haben, bildet derselbe nach und nach.

Im Anfange liegt das Ei frei im Uterus, ohne irgend eine bindung mit demselben; allmählig kommen auf der ganzen Fläche feine Gefäßendigungen als Flocken hervor, wie es bei dem Chor der Ferde dauernd ist; nicht gleichmäßig mit dem Wachsthum der Haut kommen aber neue Flocken hervor, ein Theil versch der auch, die übrigen Gefäßästchen werden stärker und vereinigen zu dem Mutterkuchen, (Placenta,) einem kuchenförmigen, vielen kleinen Gefäßen und Zellgewebe gebildeten Theil von versch ner Form, rund, eirund, nierenförmig. Die feinen Gefäßästchen r bald in dünnen oder dicken Zotten hervor, wie bei den Wiederkä bald ziehen sie sich in größere oder kleinere Warzen zusammen, bei den Hunden und Katzen. Bei dem Menschen zeigen sich ein lappenartige Hervorragungen und dazwischen Vertiefungen. Die tien Gefäße sind Aeste einer Nabelvene und zweier Nabelarte Besteht die Placenta aus vielen einzelnen Stücken, so laufen großen Gefäßstämmchen, in welche sich die kleinen Gefäßäste ver



in dem Chorion noch weit hin, bis sie sich in jenen Hauptstamm-  
endenigen. Besteht der Mutterkuchen aus einem Stück, so wer-  
die Hauptstämme bald gebildet. Saugadern hat man in dem  
Mutterkuchen noch nicht aufgefunden. Man findet bei den Schrift-  
m auch noch eine besondere Haut unter dem Nahmen: *Tunica re-*  
aufgeführt; diese existirt nicht; wahrscheinlich hat man die  
samtartigen Hervorragungen, welche da zurückbleiben, wo  
ärkern Gefäßästchen auf der Oberfläche des Chorions verschwun-  
d, wenn sich der Mutterkuchen zu bilden anfängt.

den nun beschriebenen Mutterkuchen nennt man den kindli-  
Theil desselben, (*Placenta foetalis*), um dieses Gebilde von  
ähnlichen zu unterscheiden, welches auf der innern Fläche der  
matern Gebärmutter sich erzeugt. Bald nach der Empfängniß  
en sich auf der innern Fläche der Gebärmutter feine Blutgefäße,  
vereinigen sich unter einander, der Form der *Placenta foetalis*  
analog. Man nennt dieses gefäßige und flockige Gewebe (*Mem-*  
*brana decidua*, *Placenta uterina*, *Pl. succenturiata*, *Subpla-*  
,) hinfällige Haut, Gebärmuttertheil oder müt-  
schen Theil des Mutterkuchens. — In den Wiederkäu-  
rügt sich dieses Gebilde am deutlichsten und auch schon in dem  
schwängern Zustand sieht man kleine rundliche Erhabenheiten da;  
ch die *Placenta uterina* bildet; die stark hervorragenden Ge-  
wignungen der *Placenta uterina* und *foetalis* greifen hier wie  
nt in einander ein. — Beim Pferde und Schweine ragen die zar-  
gefäßspitzen nicht stark hervor und vereinigen sich in kleine Wärz-  
es erscheint daher nur wie eine flockige Haut. Auch bei dem  
schen ist die *Placenta uterina* dünne, am stärksten wohl im  
en und sechsten Monat der Schwangerschaft. Häufig hängen  
Stücke an der Nachgeburt reifer Kinder, und größere an abge-  
legenen menschlichen Eiern vom zweiten bis zum vierten und fünf-  
Monat hin.

ie Gefäße dieser beiden Mutterkuchen sind nicht mit einander ver-  
zen, anastomosiren nirgends, sondern die feinen Gefäßenden der  
*Placenta foetalis* liegen nur neben und zwischen den feinen Gefäß-  
der *Placenta uterina*, sind durch Zellgewebe mit einander verbun-  
Injectionen bringen nie aus den Gefäßen der einen in  
er andern, man mag die Nabelgefäße, oder die der Gebärmut-  
msprizen. Am innigsten ist die Vereinigung beider Placenten  
en Wiederkäuern, weniger innig da, wo die Gefäßenden nur  
und in kleine Wärzchen vereinigt hervorrage.

ie Bestimmung des Mutterkuchens und des Chorions ist, als  
atationsorgan zu dienen und wahrscheinlich auch dem Embryo  
ungsstoff zuzuführen. Die Gefäßendigungen der Placentaarte-  
ndern Chylus aus dem Blute der Gebärmutter ab, und die fei-  
Neste der Nabelvene in der *Placenta foetalis* saugen ihn wahr-  
lich auf. So lange uns ganz bestimmte Beobachtungen über  
Daseyn der Saugadern in dem Mutterkuchen abgehen, müssen  
iese Art der Einsaugung annehmen. Es wollen zwar Mas-  
i, Cruikshank und Wrisberg einige lymphatische Gefäße  
Placenta gefunden haben, die Beschreibungen anderer Schrift-  
kann man so deuten als hätten sie solche Gefäße vor sich ge-

habt, aus einigen krankhaften Zuständen, (den Hydatiten,) die bisweilen an dem Nabelstrang und in dem Mutterkuchen bemerkt werden könnte man auch auf das Daseyn von Saugadern schließen; allein jetzt ist ihr Daseyn durch neuere Untersuchungen noch nicht bestätigt worden<sup>27</sup>. Könnten nicht vielleicht sehr kurze Saugaderästchen vorhanden seyn, die zwischen den feinen Blutgefäßen der Placenta talis liegen, und sich bald in die Venen endigen? — Als Respirationsorgan wirkt die Placenta wahrscheinlich dadurch, daß die Gefäße der Placenta foetalis mit den Gefäßen der Placenta uterina in Berührung kommen, und so der Sauerstoff des mütterlichen Blutes an das Blut des Embryo übergeht<sup>28</sup>.

Das Chorion der eierlegenden Thiere ist als Respirationsorgan dem der Säugthiere analog; als Blase aber und in Hinsicht auf Flüssigkeit, welche dasselbe enthält, der Allantois.

2) Das Amnion, oder die Schafhaut, ist eine dünne, weiche durchscheinende, aber doch dichte Haut, welche eine Feuchtigkeit, Schafwasser, (Liquor amnii,) und in diesem den Embryo einschließt. In den ersten Monaten der Bildung des Fötus sieht man deutlich, wie das Amnion in die Haut des Fötus übergeht, und die Fortsetzung dieser in dem Ei angesehen werden muß. Beim reifen Fötus bemerkt man eine Grenze zwischen dieser Haut und den äußeren Bedeckungen, es löst sich dieselbe eben so von diesen, wie die andern Organe von den Organen des Fötus, wenn sie einen gewissen Grad der Ausbildung erreicht haben. — Bei dem Pferde und mehreren andern Thieren zeigen sich in der Schafhaut dicke, gestülpte Blutgefäße mit sehr engen Mündungen und sulzenartigen Enden. Man kann diese Gefäße von denen des Chorions aus nicht ausfüllen, sie scheinen doch von diesen auszugehen, ehe sie sich in größeren Stämme vereinigen. Bei vielen andern Thieren und bei dem Menschen kann man keine Blutgefäße in dem Amnion finden, die aber unstreitig vorhanden seyn müssen.

Bei den Thieren, welche eine Allantois besitzen, oder wo sich die Flüssigkeit derselben zwischen das Chorion und Amnion ergießt, (Pferde,) ist das Chorion nur an einzelnen Stellen genauer mit dem Amnion vereinigt. Bei dem Menschen sind diese beiden Häute durch eine Flüssigkeit, die man falsche Wasser (Liquor spurius,) oder die Flüssigkeit der Allantois nennt, von einander getrennt, gegen Ende der Schwangerschaft aber an den meisten Stellen genau miteinander verbunden, doch nicht oft ganz verwachsen; und von doppeltem Wassern, die zuweilen bei den Entbindungen abgehen, ist das erste diese Flüssigkeit, die sich noch erhalten hat. Der Embryo, welchen diese Haut bildet, ist immer eiförmig, wenn sich auch das Chorion, wie bei den Wiederkäuern, sehr in die Länge zieht.

Das Amnion sondert das Schafwasser ab, in welchem der Embryo schwimmt. Durch chemische Untersuchung hat man folgende Bestandtheile gefunden: Wasser, Eiweißstoff, Gallerte, vegetabilisches Kali, Salznatrium, Kalkerde, und Phosphorsäure.

Das wahre Amnion der Vögel und Reptilien ist dem der Säugthiere analog.

27) O. Schreger diss. de functione placenta uterinae, Erlang. 1797.

28) nach Owen in Stehoid's Lucina, 3. B. 3. St. S. 2. 1806.



Das Amnion schützt den Fötus, und sondert die Flüssigkeit ab, welche dessen Höhle enthält. Sie ist in der Haut des Embryo gesetzt und trägt zur Bildung derselben bei, sie entspricht dieser, wie den Organen des Eies. Das Schafwasser dient dem Fötus vornehmlich vorzüglich dann zur Nahrung, wenn die Function des Nabelbläschens aufhört. Es wird durch die Haut aufgenommen, vielleicht auch durch den Mund, da bei einem jeden der Geburt nahen Thiere der Magen und Darmcanal seine Function schon begonnen hat, und man kaum annehmen kann, daß die Masse, welche man in demselben findet, durch Einsaugung allein dahin sollte gebracht worden seyn. (Vgl. Amnische Feuchtigkeit.)

33) Das Nabelbläschen, Darmbläschen, (nach Oken) *vesicula umbilicalis*, bei Thieren *Tunica erythroides*,) eine Hülle, aus einer zarten durchsichtigen Haut gebildetes, mit einer wasserartigen Flüssigkeit angefülltes Bläschen, welches neben oder zwischen Nabelschnurgefäßen, am Chorion oder der Placenta liegt und bei verschiedenen Thieren eine sehr verschiedene Form hat. Länglich oder birnförmig ist es bei dem Pferde, dreieckig bei den Wiederkäuern, bei mehreren fleischfressenden Thieren, oval oder ganz rund bei dem Menschen, in mehreren Nagethieren, mehreren Fleischfressern; bei Kaninchen besteht es nach Emmert aus einem breiten Streifen (Chorions), der wie ein Gürtel um die Mitte des Embryo sich umlegt; beim Pferde, dem Schweine, dem Hunde und mehreren andern Thieren sieht man deutlich von dem Chorion oder der Placenta foetalis aus Gefäße zu dem Nabelbläschen hingehen. Vorzüglich reichlich ist es bei dem Pferde. Jörg hat dasselbe in dem Pferde mit dem Chorion zusammenhängen und eine Mündung aus jenem in das Bläschen gefunden. — Mit den Unterleibstheilen hängt dieses Bläschen zusammen 1) durch die *Vasa omphalo-mesenterica*, eine kleine Arterie und Vene, welche das Gefäß mit dem Nabelbläschen verbindet, und dann findet 2) auch höchst wahrscheinlich ein Zusammenstoß der Höhle des Nabelbläschens und des Darmcanals Statt; nach Meckel und Kieser<sup>29</sup> ist dieser Vereinigungspunct der Anfang des Dickdarms, nach Meckel<sup>30</sup> das Endstück des Krümmendarms.

Bei manchen Thieren findet man die *Tunica erythroides* bis zur Geburt, z. B. bei Hunden und Katzen, überhaupt bei Fleischfressern, andern verweilt sie schon vor Ablauf des dritten Theiles der ersten Lebensperiode, und verschwindet nach der Hälfte derselben ganz; am spätesten geschieht dieses bei den Wiederkäuern, am spätesten bei den Schweinen. Bei den Menschen ist es nur in den ersten Monaten der Bildung des Embryo zu sehen. Da es sobald verschwindet, so glaubt man geglaubt, es sei in dem menschlichen Ei nicht beständig vorhanden, sondern entweder nur zufällige oder selbst krankhafte Bildung; mehrere Beobachter älterer Zeit hielten dasselbe für analog der Allantois der Thiere, glaubten, es hänge mit der Harnblase durch den Uterus zusammen, welche Meinung doch schon Danz<sup>31</sup> gründlich widerlegt.

34) Oken's und Kieser's Beiträge zur vergleichenden Anatomie, 1. B. 1. u. 2. H. 50) Ueber die Omenten in Reil's u. Blumenbach's Archiv f. d. Physiol. 9. B. 1. H. Handb. d. pathol. Anat. 1. B. S. 578. Deutsch. Archiv f. Physiol. 1. B. 2. H. S. 293. 51) Grundr. d. Vergleichungsanatomie des ungeborenen Kindes, 1. B. S. 50.

derlegt hat; dessen ungeachtet hat ein neuerer Schriftsteller Lobst dieselbe Meinung wieder aufgestellt und aus seiner Schrift<sup>32</sup> ist dieser Irrthum in manches Handbuch der Physiologie übergegangen. Dken hat das Verdienst, dieses problematische Gebilde zuerst wie genau untersucht, zu einer richtigern Ansicht desselben hingeleitet und eine wohl zu beachtende Bestimmung desselben aufgestellt zu haben. Dken hat in Schweinsembryonen gefunden, daß die Tunica erythraea des mit dem Anfange des Dickdarms zusammenhängt, und schließt aus mehreren Gründen, daß die Gedärme aus derselben entspringen; aber die Vesicula umbilicalis diesem Darmbläschen der Thiere gleichähnlich ist, so hat dasselbe bei dem Menschen gleiche Bestimmung. Kiefer<sup>34</sup> will in einem menschlichen Embryo die Stelle der Vereinigung dieses Bläschens mit dem Darmcanale gesehen haben; Emmert fragt es sich aber, ob die Schnur, welche Kiefer merkt hat, nicht die geschlossenen Gefäßgefäße oder der Theil Bauchfells gewesen ist, welcher diese begleitet. Emmert und Hofstetter, Meckel, Jörg und andere haben Gründe gegen diese Hauptung aufgestellt, und es werden nur fortgesetzte Beobachtungen und diese entgegengesetzte Meinungen entscheiden können; so mancher wichtige Grund aus der Analogie und pathologischen Anatomie spricht doch in so weit wenigstens für Dken's Ansicht: daß dieses Bläschen von wichtiger Bedeutung für die Bildung eines Theils des Darmcanals und die Ernährung des Fötus in der ersten Periode der Entwicklung ist. Es ist, nämlich sehr wahrscheinlich, daß das Nabelbläschen der Dotterhaut der Vögel analog ist, und in einer gewissen Periode der Entwicklung des Embryo zur Ernährung desselben trägt, indem es durch seine Verbindung mit dem Chorion Nahrungstoff aufnimmt, die Sanguificationen vorbereitet und die nährende Flüssigkeit dem Fötus zuführt. Durch seinen Zusammenhang mit einem Theil des Darmcanals hat es aber sicher auch Einfluß auf die Bildung des Stücks, mit dem es vereinigt ist.

Döllinger<sup>35</sup> hält das Nabelbläschen für das Graafische Bläschen, auf dem die ersten Gefäßzweige entstehen; aus dem männlichen Samen bildet sich auch ein Bläschen und aus diesem ein Rückenmark, und indem sich Gefäß und Nerv wechselseitig bestimmen, entsteht der bewegliche Punct, das Herz. Mit dem Selbstständigwerden des Embryo stirbt das weibliche Bläschen allmählig ab.

Was ich von der Bildung der ersten Gefäßzweige aus dem Nabelbläschen halte, ist aus der eben angegebenen Analogie desselben in der Dotterhaut klar, und in so fern das Nabelbläschen aus dem Graafischen Bläschen sich bildet, ergibt sich auch, in wie weit man beide für ein und dasselbe halten kann; das Nabelbläschen ist das durch die Befruchtung zur Entwicklung aufgeregte Graafische Bläschen. Der Bildung eines zweiten Bläschens aus dem männlichen Samen scheint aber doch manches aus der vergleichenden Anatomie

32) Essai sur la nutrition du foetus, Strass. 1802. 33) Vgl. Burdach's Physiologie, Leipz. 1810, S. 810. 34) Der Ursprung des Darmcanals

der Vesicula umbilicalis, dargestellt im menschlichen Embryo, Götting. 18

35) Deutsches Archiv für Physiol. 2. B. 5. St. S. 490.



gegenzustehen und das Daseyn, die Art der Vereinigung mehrerer Bläschen ist erst darzuthun.

4) Die Allantois, Harnhaut, findet sich vollkommen ausgebildet nicht bei allen Thieren. Bei den Wiederkäuern und dem Schweine ist sie vorhanden; in diesen endigt sich die Harnblase in den Urachus und dieser geht zwischen den Nabelgefäßen fort in die Allantois über.

Der Urachus ist eine unmittelbare Fortsetzung der Häute der Harnblase, von dem Grund derselben an, die einen Canal von verschiedener Länge bilden, welcher zwischen den beiden Nabelarterien fortgeht und sich da, wo eine Allantois ist, in diese erweitert, wo sie gefunden wird, offen oder geschlossen sich endigt. Doch ist es wahrscheinlich, daß er in einer gewissen Periode der Schwangerschaft immer offen ist. Er kommt den Thieren und dem Menschen zu.

Die Allantois ist eine Blase von länglicher, darmähnlicher Gestalt, aus einer sehr dünnen, weißen, durchsichtigen ganz gefäßlosen Haut gebildet. Sie liegt zwischen dem Chorion und dem Amnion und ist eine Fortsetzung der Harnblase anzusehen, mit der sie auch, durch den Urachus verbunden, eine Höhle bildet. Nicht unwahrscheinlich ist es, daß sie aus der Harnblase heraus gebildet wird; denn wie könnte eine so große Blase, ohne durch Gefäße mit den benachbarten Theilen in Verbindung zu stehen, sich bilden? Die Allantois geht aus wie eine Erweiterung des Urachus zwischen den Gefäßen des Nabelstranges hervor und bildet eine längliche Blase; dann dehnt sie sich von da an nach beiden Hörnern der Gebärmutter zu aus, und endigt sich mit einer stumpfen Spitze, wie das stumpfe Ende eines Eies. So erlangt sie die Gestalt einer langen, gekrümmt liegenden Wurst, daher auch ihr Name rührt. An den beiden Enden der Allantois und des Chorions zeigen sich zwei länglich runde Anhänge, die Divertikel der Allantois, (Diverticula, s. Appendices allantoidis;) mit ihren stumpfen Spitzen sind sie in die Allantois eingestülpt, so daß sie in der Flüssigkeit derselben hängen; sie können aber auch nach außen umgestülpt werden und verlängern dann das Ei, ihre Farbe ist weiß oder weißgelb. In ihrem vollkommenen Zustand findet man sie nur in den ersten Perioden der Schwangerschaft; in diesen sind sie ausgedehnt, hohl, mehrere Zolle lang, enthalten eine Flüssigkeit; in den spätern Perioden der Schwangerschaft schrumpfen sie zusammen, lösen sich leicht vom Chorion und Amnion und man findet sie öfters gar nicht mehr. Wahrscheinlich sind die Divertikeln Fortsätze des Chorions; Dizoni<sup>36</sup> hält sie für ein ganz eigener Art und nennt sie Membranae excretoriae, weil sie nach seiner Meinung eine Materie absondern, die von allen andern, die das Ei enthält, abweicht.

Das Ei enthält die Allantois bei den größern Thieren eine große Quantität Flüssigkeit, welche man ehemals für Harn gehalten hat, der aus der Harnblase in dieselbe fließt und somit die Bestimmung derselben genügend erklärt zu haben glaubte. Oken hat das Verdienst, dieses Organ des Eies genauer untersucht und richtigere Ansichten über dasselbe verbreitet zu haben. Ein in den Nieren abgesonder-

) Supplementa ad anatomiam et physiol. porrig. comparatam, Lips. 1806.

ter Harn kann in den frühern Perioden in der Allantois nicht enthalten seyn; denn ehe die Nieren gebildet sind, ist dieses Organ schon vorhanden, und auch die Mischung der Flüssigkeit, welche die Allantois enthält, ist der des Urins nicht gleich. Dem Geruch und Geschmack nach gleicht sie dem Blutserum; sie enthält Gallerte, nicht so viel als das Schafwasser; sie hat keinen salzigen Geschmack und es setzen sich aus ihr auch keine Crystalle ab. Bei Wiederkäuern und bei Pferden vorzüglich findet man in der Flüssigkeit, welche die Allantois enthält die bei den letztern dieser gleich ist, kleine glatte, rundliche Massen, die aus geronnener Gallerte bestehen. In ältern Schriftstellern werden sie Hippomanes, (Pferdemistüllennahrung,) genannt und man soll sie ehemals zur Behandlung der Liebestranke gebraucht haben. Bei der Kuh finden sich die kleinen gallertartigen Massen seltner.

Die meisten Naturforscher stimmen darin überein, daß man die Allantois bei mehreren andern Thieren und auch bei dem Menschen nicht ausgebildet finde. Jörg<sup>37</sup> will sie aber auch bei dem Pferd und dem Menschen bemerkt haben; doch kann er ihre Gestalt nicht beschreiben. Was man der Allantois ähnliches bei dem Pferde findet besteht nur in dem Urachus, der einige Zoll weit in die Nabelschnur hinein verfolgt werden kann, und in einer Flüssigkeit zwischen dem Amnion und dem Chorion. Bei dem Menschen findet man auch den Urachus, der von dem obern Ende der Harnblase aus in die Nabelschnur hinein erstreckt, und bisweilen zwischen dem Chorion und Amnion eine Flüssigkeit; auch kann man diese beiden Häute öfters von einander trennen, und der Raum, der zwischen beiden mit einer Flüssigkeit ausgefüllt wird, ist der Allantois analog.

Bei den eierlegenden Thieren ist die Blase, welche man Chorion nennt, als Allantois anzusehen. In der Flüssigkeit, die sie enthält findet man öfters kleine kalkartige Concremente.

Schwer ist es, die Bestimmung der Allantois und des Urachus zugeben. Vielleicht ist sie bestimmt, die Nierenfunction im Fötus übernehmen; vielleicht hat sie auch ihre Beziehung auf die Bildung des Harn- und Geschlechtssystems. Sie kann ja wohl die Stoffe aufnehmen, die bei Erzeugung derselben aus dem Nahrungsstoff zu abgeschieden werden, und die, nachdem sie einige Veränderung erlitten haben, doch zum Theil wieder zur Ernährung anderer Thiere tauglich sind. In der letzten Periode der Schwangerschaft muß da, wo der Urachus offen bleibt und die Nierenfunction schon begonnen hat, doch Harn der Flüssigkeit in der Allantois sich beimengen.

5) Der Nabelstrang, (Funiculus umbilicalis,) ist ein strangförmiges Convolut von Theilen, welches die Organe des Fötus mit denen des Fötus verbindet; nur bei den Säugethieren sind diese Verbindungsanäle in einem Strang vereinigt, bei den eierlegenden Thieren liegen sie getrennt. Die einzelnen Theile des Nabelstranges sind durch eine sulzenartige Masse, (Whartonsche Sulze,) mit einander verbunden; ist sie reichlich vorhanden, so nennt man den Nabelstrang fett, im entgegengesetzten Fall mager. Seine Länge ist bei verschiedenen Thieren nicht allein, sondern auch nach den Individuen



verschieden. Vorzüglich bemerkt man bei dem Menschen viele Veränderungen rücksichtlich seiner Länge, Dicke, Insertion in den Mutterkuchen u. s. w. Seine gewöhnliche Länge beträgt bei völliger Aus-  
 reifung 18 — 20 Zoll<sup>39</sup>, seine Dicke  $\frac{1}{2}$  Zoll. Die Theile, welche  
 zusammensetzen, so wie seine ganze Form, erleiden vom Anfange  
 der Schwangerschaft an bis zu dem Ende derselben stufenweise Ver-  
 änderungen; so wie die Organe des Embryo's, für welche die Organe  
 des Fötus bestimmt sind, nach und nach mehr ausgebildet werden.  
 Am Anfange der Schwangerschaft, sobald man ihn erkennen kann,  
 besteht er aus einigen dünnen, kurzen, von Häuten eingeschlossenen  
 Theilen zu bestehen, die mit dem Nabelbläschen durch die Vasa om-  
 phalo-mesenterica, und dem Anfangsstück des Darmcanals, mit dem  
 Mesenterion durch einige feine Gefäße zusammenhängen. Nach dem Hin-  
 terabwärtigen des Fötus zu erweitert sich die häutige Falte trichterartig und  
 umschließt einen Theil der Eingeweide der Bauchhöhle in sich auf, so  
 daß der untere Theil des Nabelstranges als verlängerte Bauchhöhle  
 angesehen werden kann. Der Embryo hat dann die Gestalt einer  
 kleinen Made, von deren hinterem Ende der Nabelstrang wie der  
 Schwanz ausläuft. Nach und nach entfernt sich der Fötus von der  
 hinteren Wand der Eihäute immer mehr; die untern Extremitäten er-  
 scheinen als kleine Stümpfe, und der Befestigungspunct der Nabel-  
 schnur am Leibe des Embryo erscheint mehr in der Mitte der Bauch-  
 wand. Allmählig wird sie immer länger, erscheint mehr oder weni-  
 ger gewunden und nur in Hinsicht ihrer Länge, ihrer Dicke und der  
 Flüssigkeit, die sie enthält, ist sie in den verschiedenen Stadien der Schwan-  
 gerschaft verschieden.

Sobald sich die Gefäße alle gebildet haben, welche die Nabelschnur  
 zusammensetzen, besteht sie in den ersten Perioden der Schwanger-  
 schaft aus den Nabelarterien, (Arteriae umbilicales,) der Nabel-  
 vene, bei den Wiederkäuern aus zwei Nabelvenen, (Venae umbili-  
 cales,) dem Urachus, den vasis omphalo-mesentericis, welche  
 vom Nabelbläschen zu dem Gefröse gehen, einem Theil des  
 Darmcanals und des Gefröses. Bei den Thieren, welche eine Allantoides  
 besitzen, oder bei denen der Urachus bis zum Ende der Schwan-  
 gerschaft offen bleibt, besteht der Nabelstrang in der zweiten Hälfte  
 der Schwangerschaft aus den Nabelarterien, einer oder zwei Nabel-  
 venen und dem Urachus, bei dem Menschen aus zwei Arterien und  
 einer Vene.

Die Nabelvene fängt mit feinen Gefäßästchen in dem Mutterkuchen  
 (Placenta foetalis,) an, die sich in diesem und in dem Cho-  
 rion zu größern Gefäßen vereinigen, bis sie einen, oder bei Wieder-  
 käuern zwei Stämme zusammensetzen, welche in die Unterleibshöhle  
 eintreten, wo sich der Nabel bildet und zur untern Hohlader fortge-  
 ht. Die Nabelarterien kommen in zwei Stämmen aus der  
 Aorta, breiten sich im Chorion und Mutterkuchen zu mehreren  
 Ästen aus, und endigen sich mit sehr feinen Gefäßchen im kindli-

chen. Differenzen von 7 — zu 40 Zoll sind nicht ungewöhnlich. Doch finden sich auch  
 Beobachtungen von Nabelschnuren von nur einer Handbreit, so wie gegenständig  
 wieder von 50 — 60 Zoll Länge. Vgl. v. Siebold's Lehrb. d. Entbindungs-  
 k. Th. S. 268. (N. d. 2.)

chen Mutterkuchen. So breiten sich diese Gefäße in einer Haut, Überhaut aus, welche das Kind wie eine Blase umgibt. Der Uterus ist die oben beschriebene Fortsetzung der Häute des Grundes der Harnblase; die Vasa omphalo-mesenterica bestehen aus einer Arterie und Vene, die zu dem Nabelbläschen gehen. Die Gefäßstämme der Nabelschnur sind nach der Höhle des Eies zu mit dem Amnion überzogen und liegen also zwischen dem Embryo und den Organen des Eies, von denen er sich immer mehr sondert, die selbst Theil absterben, so wie er sich seiner Entwicklung nähert. Häufig bemerkt man an der Nabelschnur von varicöser Ausdehnung der Arterien beladene Aufschwellungen, welche man falsche Knoten nennen zum Unterschied von wirklichen Umschlingungen derselben, oder wahren Knoten. Vgl. Geburt.

Das Nabelbläschen ist das erste Organ, welches verschwindet, um die achte Woche schon trennen sich gewöhnlich die Därme demselben und ziehen sich aus der Nabelschnur in die eigentliche Bauchhöhle zurück. Wenn der Urachus bei dem Menschen offen ist, man nicht ohne Wahrscheinlichkeit vermuthen kann, so muß sich dieser auch frühzeitig schließen; bei vielen Thieren geschieht es in der ersten Hälfte der Schwangerschaft, bei andern gegen das Ende derselben. Darauf sondert sich aber erst später in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft die Schafhaut nahe am Nabel von der Haut des Embryo durch eine ringförmige Abgrenzung. Ist der Fötus so weit ausgebildet, daß er zum Athmungsproceß geschickt ist, so trennt sich auch das Chorion und die Placenta foetalis von ihm, und das Kind wird geboren und diese Theile, die bis zur Geburt vollkommen mit ihm vereinigt sind, werden, wie bei den Thieren, durch Abreißen des Nabelstranges, oder, wie bei dem Menschen, durch Abschneiden von dem neugebornen Geschöpf getrennt. (Seiler)

*Ejaculans ductus ovarii*, s. unter Excretionsgänge des Ovarium. — *vas seminis*, s. Defecirender Gang des Hoden.

*Ejaculation des Samens*, (*Ejaculatio seminis*) Ausspritzung<sup>1</sup>, oder Erguß, oder Ergießung<sup>2</sup>, oder Ausfluß<sup>3</sup>, oder Austreibung<sup>4</sup>, oder Ausleerung<sup>5</sup> des Samens, (Profusio<sup>6</sup>, s. Effusio<sup>7</sup>, s. Ejectio, s. Expulsio, s. Emissio<sup>8</sup>, s. Excretio<sup>10</sup> seminis,) die auf dem Punct der höchsten Steigerung der Geschlechtslust bei Männern durch Entleeren der Samenbläschen in die Harnröhre und durch convulsivisches, paroxysmisch sich wiederholendes Zusammenziehen des accelerirenden Muskels derselben, in Absätzen und gleichsam stoßweise bewirkte Aussonderung des Samens, als wesentliche Bedingung der Zeugung. Vgl. Zeugungsgattung.

1) Schurig *spermatol.* c. 5. §. 17. 2) 3) Fabelot's Lehre v. d. Zeugung d. ges. Korp. übers. v. Panzerbleter, 23. Cap. 5. Abschnitt.

4) Feuermann's *Physiol.* 1. B. §. 80. 5) Waller's *Grundr. d. Physiol.* umgearb. von v. Lebeling, 2. Th. §. 893. 6) Mayer's *Beschr. d. menschl. St.* 5. B. S. 144. 7) — 10) Schurig *op. l. c.* et c. 1. §. 26, 27.

*Ejaculator seminis*, s. unter Quermuskeln des Perinaums, tiefer liegenden Muskel.

*Ejaculatoria vasa*, s. Ausführungswege des Samens. — *ovariorum*, s. Excretionsgänge des Ovarium.



*Ejaculatorii ductus spermatis*, s. Ausführungsgänge des Sa-

*Ejaculatorium vas seminis*, s. Defecirender Gang des Hodens. Eichel<sup>1</sup>, Glandel<sup>2</sup>, Kopf des männlichen Glieds<sup>3</sup>, Penis<sup>4</sup>, s. colis<sup>5</sup>, Balanus<sup>6</sup>, Cerasum<sup>7</sup>, Caput penis<sup>8</sup>, der Endtheil der schwammigen Körper des Penis, von dem durch einen deutlichen Rand, (Krone,) abgegrenzt, besonders auch dadurch ausgezeichnet, daß die äußern Hautdecken in der Vorhaut bekannten Duplicatur sich als eine bewegliche Scheide über wegziehen, ohne damit verwachsen zu seyn, und daher auch Entblößung dieses Theils gestatten. Nur uneigentlich wird wohl dem Endstück der Clitoris dieser Name gegeben. Vgl. Ge-  
lien des männlichen und weiblichen Geschlechts.

2) Wagners Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 127. 3) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1755, 4. Th. S. 635. 4) Celsi de med. l. 1. c. 25. 6) Riolani anthropogr. l. 2. c. 31. Vgl. auch dies Wort. 7) Spigelii de h. c. fabr. l. 1. c. 4. 8) Bartholini an. lib. 1. c. 24.

Eichelbändchen, s. Frenulum. — hals, s. Hals der Eichel. Krone, — rand, s. Krone der Eichel.

*Eidesis*, in Uebersetzung des gleichlautenden Griechischen Wortes s. Einsicht.

*Eidesis*, η ψαγι δειω ειδωσις. (Hippocr. de dec. orn. 1. das Gewissen. Vgl. v. der Linden sel. med. ex. 3. §. 3.)

*Ejectio*, s. Excretion. — *saecum*, s. Darmanseerung. — *Ejaculatio*, s. Ejaculation des Samens.

Eier oder Eierchen des Eierstocks, s. Graafische Bläschen. Einge, s. Fallopische Trompeten. — stockarterien, — venen, — nerven, s. unter Spermatische Arterien, — Nerven, — Adern. — stöcke, s. Ovarien.

Eifer, ist eine Gemüthsbewegung und drückt im allgemeinen jede thätige, thätige Aeußerung der innern Theilnahme für einen Gegenstand aus, sei es durch Worte oder Handlungen. Eifer ist ein hoher Grad von Enthusiasmus. Er umfaßt objectiv alles, was Interesse hat, und subjectiv alle Arten der Aeußerung einer lebhaften Theilnahme; er zeigt sich in Geberden, Worten und Handlungen, in Aeußerung von Gefühlen, Gesinnungen, Meinungen und Absätzen, in Ausführung der Vorsätze, Erfüllung der Pflichten, überhaupt in Vollendung von Geschäften und Arbeiten; er zeigt sich im Guten und Bösen.

Der Eifer als Gemüthsbewegung entspringt theils aus der Lebhaftigkeit und Stärke des Gefühls oder Triebes, welches uns in einem gegebenen Falle aufregt, theils aus dem Interesse, das ein Gegenstand für uns hat, theils endlich aus dem Temperamente, von dem das cholerische am meisten, das phlegmatische am wenigsten disponirt. Man würde daher unrichtig von der innern Theilnahme verschiedenen Menschen für einen Gegenstand urtheilen, wenn sie nach dem Grade des Eifers bestimmen wollte, welchen sie äußerlich dafür zeigen. Man unterscheidet sowohl verschiedene Grade der Stärke als Dauer; ein bald verrauchender Eifer war das Resultat des Temperaments, oder des schwindenden Interesses.

Dauernder Eifer auf Vollendung einer Arbeit gerichtet, heißt Uebsigkeit. S. Fleiß.

Eifer und eifern in engerer Bedeutung wird von der lebhaften Aeußerung unserer Mißbilligung von Gesinnungen, Worten und Handlungen gebraucht, welche unserer bessern Ueberzeugung und unsern Grundsätzen, so wie überhaupt dem, was recht und sittlich ist, gegen zu seyn scheinen, und ist dann ein höherer Grad von Unlen und ein niederer von Zorn.

Der Eifer drückt sich auch in Geberden, Haltung und Bewegungen des Körpers aus; wirkt erregend und reizend auf das Geistige Körperliche des Organismus, und kann sich selbst bis zum zweyten Grade des Affects erheben, wo er dann mit Recht ein blinder Eifer genannt wird. S. Affect.

**Eifersucht** ist das unangenehme Gefühl, welches aus der Vermuthung entsteht, daß wir im Besiz der Gunst und Achtung werther Menschen beeinträchtigt werden. Dieß ist der wahre Begriff der Eifersucht. Sie ist nicht eine Art Neid, denn Neid ist ein Verlangen, nicht aber die Eifersucht an sich; noch ist sie Haß wegen der Vorzüge eines andern, noch das Bestreben, die Wirksamkeit eines andern zu schwächen oder zu übertreffen, beide sind bloß Wirkungen der Eifersucht; auch ist sie nicht der Verdruß, daß andere Vorzüge mittheilen, die wir gern selbst ausschließend besitzen möchten, dieß ist die Eifersucht. Es können allerdings andere Gefühle und Bestrebungen, als Neid, Mißgunst, Mißtrauen, aus der Eifersucht entstehen, und ihr verbunden seyn, allein an sich ist Eifersucht allemal ein Gefühl und zwar ein unangenehmes, welches oft urplötzlich entsteht, immer aus der Vermuthung — die mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit haben kann, — daß wir im Besiz der Gunst einer uns werthen Person, sie sei nun eine moralische, als das Publicum, Ehre, Ruhm, Ansehen, Macht,) oder eines Individuums, (an Freundschaft, Liebe, Gewogenheit, Fürstengunst,) von einem andern beeinträchtigt werden. Diese vier Bestimmungen gehören wesentlich zum Begriff der Eifersucht: 1) eine vermuthete Beeinträchtigung; 2) des Besizes; 3) der Gunst; 4) einer uns werthen Person. Legen wir keinen Werth auf die Gunst einer Person; so wird auch das eigentliche Gefühl der Eifersucht nicht entstehen können, wohl aber ein anderes, z. B. Neid, Unwille u. s. w. Indes wird der Ehemann sein Weib nicht liebt, doch mit Recht und wirklich eifersüchtig werden können; denn es wird durch Untreue seines Eheweibes auch seine Ehre gefährdet. Eben so nothwendig gehört die Beeinträchtigung des Besizes, oder doch gewisser Ansprüche, welche wir auf die Gunst einer Person haben, zum Wesen der Eifersucht; denn nur verdient das unangenehme Gefühl, welches die Beeinträchtigung derselben uns erregt, den Namen Eifersucht, im entgegengesetzten Falle aber ist es Neid, Mißgunst u. s. w. Jeder freie Mann hat auf das freie Mädchen Ansprüche, und umgekehrt; Mitbewerber um die Gunst eines Mädchens können daher auch auf einander eifersüchtig seyn. Dies gilt auch von andern Verhältnissen, Kindern, Bögen, Hofleuten u. s. w.

In engerer und gewöhnlicher Bedeutung wird Eifersucht von



gebraucht, und ist ein so nothwendiger Begleiter derselben, daß sie mit Recht als unzertrennlich von ihr, und die völlige Abwesenheit derselben, da, wo sie mit Recht entstehen sollte, als einen Beweis des Mangels von Liebe ansehen kann. Dieß ist nun aber so zu verstehen, als ob der Grad der Eifersucht den Grad der Bestimmtheit. Dieser bestimmt nur den Grad des Mißtrauens und Reizbarkeit. Auch ist es durchaus nicht richtig, wenn man glaubt, Eifersucht immer und vermöge ihrer Natur mit Mißtrauen verbunden seyn müsse, ob sie gleich, besonders als Leidenschaft, sehr häufig mit Mißtrauen und selbst mit Argwohn vergesellschaftet ist. Eifersucht ist nur in so fern eine natürliche Begleiterin der Liebe, in sofern gegründete Vermuthung der drohenden Beeinträchtigung da. So lange der Unbefangene der Treue der Geliebten gewiß ist, findet er keine Eifersucht; sie wird aber im Gemüthe des Allerbängsten und Vertrauensvollsten entstehen, wenn er gegründete Vermuthungen der verletzten Treue zu haben glaubt.

Eifersucht in jedem Verhältnisse, als Gefühl betrachtet, ist an sich indifferent, kein Fehler, sondern eine natürliche, nothwendige Bestimmung der menschlichen Natur und wurzelt im Erweiterungs- oder Vollkommenungstrieb, wie andere natürliche Gefühle und Triebe, Furcht, Vergnügen, Schmerz u. s. w. Ja es ist auch der thierischen Natur gemein, wenn sie auf einer höhern Stufe der Ausbildung steht, z. B. den meisten zahmen und wilden Thieren, den Vögeln und dem Affen, sogar in Beziehung auf das menschliche Weib.

Eifersucht als Gefühl erhebt sich leicht und oft urplötzlich zur Höhe des Affectes, und kann alle Grade desselben durchlaufen. Sie hat einen Einfluß auf den Verstand und das Gemüth alle die günstigen und ungünstigen Einflüsse, welche in dem Artikel Affect aufgezählt worden sind. Im niedrigsten Grade schärft sie die Sinne, das Wahrnehmungsvermögen, Verstand und Combinationsvermögen, belebt die Fantasie, entwickelt eine bewundernswürdige Sagacität, und erregt Begehrungsvermögen. Im zweiten Grade der Heftigkeit hat sie einen Einfluß auf den Verstand und Combinationsvermögen den entgegengesetzten Einfluß und den unwiderstehlichsten auf das Begehrungsvermögen; sie verzerrt Wahrnehmungsvermögen und Verstand, und reißt zu den unvernünftigen Handlungen hin; mit Recht heißt sie dann blind. Steigt sie zu den höchsten Graden, so kann der damit verbundene, plötzlich das Gemüth stürzende Schmerz lebensgefährlich werden.

Ob dieß Gefühl der Eifersucht oft erregt, so entsteht dadurch ein Hang dazu und es geht in Leidenschaft über. Diese Leidenschaft macht das Gemüth krankhaft um und wird nach und nach zur Sucht, mit der unumschränktesten Tyrannei das Gemüth unterjocht, ganz unheilbar ist, wenn sie längere Zeit hindurch in einem Geheiß Wurzel gefaßt hat; wenigstens bleibt immer ein Hang zum Mißtrauen zurück, welches mit der Eifersucht als Leidenschaft unzertrennlich verbunden ist. Als Leidenschaft hat die Eifersucht in ihren Ausprägungen zwei Extreme: sie geht entweder in Wuth über, oder in Thränen und verzehrt ihr eigenes Individuum durch Selbsterlöbnis. Es ist nicht nöthig zu erinnern, daß Eifersucht als Leidenschaft fehlerhaft sei, da es jede Leidenschaft ist.

Ob sie gleich als Leidenschaft unausgesetzt im Gemüth fortbau so bricht sie doch nur bei Veranlassungen in Paroxysmen als Aus und zeigt dann ganz den Charakter desselben. Nur in der äußert sich die Eifersucht mit Hestigkeit, bei andern Arten der G ist sie ruhiger, aber oft desto heimtückischer.

In Mienen und Geberden spricht sie sich als ein Gemisch von Trauen, Schmerz, Haß, Neid, Wuth, Gram u. s. w. aus, je nach sie modificirt ist. Sie ist sowohl für den, der sie empfindet, als den, gegen welchen sie gerichtet ist, eine wahre Höllenqual, verstü das Gemüth auf immer und vergällt jeden Lebensgenuß. Verstä geß, ruhiges Ueberlegen auf der einen Seite und strenge Wah auf der andern sind die besten Gegen- und Heilmittel dieser Leidenschaft. (Dgoudi

Eiförmige Löcher des Sphenoidalknochens, s. Ovale cher des Sphenoidalknochens. — — Lücke des Hüftknochens Ouales Loch im Becken. — förmiger Mittelpunkt, s. Bie sen's halbeisförmiger Mittelpunkt. — förmiges Fenster, s. les Fenster des Tympanums. — — Loch des Herzens, s. les Loch des Herzens. — — — — Hüftknochens, s. D Loch im Becken.

Eigendünkel, s. Dünkel.

Eigene Bänder<sup>1</sup>, oder Ligamente, Eigenthümliche B der<sup>2</sup> oder Ligamente, (Ligamenta propria<sup>3</sup>) werden im gensatz von gemeinschaftlichen Bändern, (Ligamenta commun solche Ligamente genannt, welche Knochen gleicher Art, oder Reihe, auf einfache Weise mit einander verbinden, oder die nur an einem Knochen allein ihre Befestigung haben. Vgl. L mente. Namentlich werden hier folgende angedeutet.

- 1) Schaarschmidt's syndesm. Tabell. Tab. 1. 2) Pöder's anat. 1. B. S. 352. 3) Weitbrecht syndesm. sect. 1. C. 2.

Eigene Dorsalligamente des Metatarsus, (Ligamenta pria dorsalia metatarsi<sup>1</sup>) Fußrückenbänder der Mittel knochen, Obere Bänder des Mittelfußes<sup>2</sup>, Rückenb der der Mittelfußbeine<sup>3</sup>, oder der Basis der Mittel knochen<sup>4</sup>, (Ligamenta dorsalia ossium metatarsi<sup>5</sup>, s. bas ossium metatarsi,) die drei kurzen Ligamente, von denen das auf der Rückenfläche des Fußes von dem äußern Rande der Basis zweiten Knochens des Metatarsus zum innern Rande der Basis dritten Knochens des Metatarsus, und so das zweite vom dritten vierten, das dritte vom vierten zum fünften Knochen des Metar sus geht. S. Fußligamente.

- 1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 1017. 2) Winsl anat. Abh. Uebers. Berl. 1733, 1. B. S. 405. 3) Weitbrecht's desm. Ausg. Straßb. 1779, S. 193. 4) Pöder's anat. Taf. Taf. Fig. 1. Nr. 40 u. f. 5) Weitbrecht syndesm. p. 185. 6) der's anat. Handb. 1. B. S. 464

Eigene Lateralligamente der Knochen des Metatars (Ligamenta propria lateralia metatarsi<sup>1</sup>) Seitenligam oder Bänder<sup>2</sup> der Mittelfußbeine, oder der Basis

- 1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 1020. 2) Weitbrecht's Syndesm. Ausg. Straßb. 1779, S. 193.



Mittelfußknochen<sup>3</sup>, Mittlere<sup>4</sup>, oder Zwischenbänder<sup>5</sup> der Mittelfußknochen, (Ligamenta lateralia baseos ossium metatarsi<sup>6</sup>, Ligamenta media<sup>7</sup>, s. interossea<sup>8</sup> ossium metatarsi die drei Ligamente, welche vorwärts so zwischen den Basen des zweiten und fünften Knochens des Metatarsus liegen, daß das erste zwischen der innern Fläche des zweiten zu der äußern des dritten, das zweite vom dritten zum vierten, und das dritte vom vierten zum fünften Knochen des Metatarsus geht, und welche mit den eignen Mittelfuß- und Plantarligamenten dieser Knochen zusammenhängen. S. Ligamente.

1) Pöder's anat. Taf. Taf. 25, Fig. 1. Nr. 43 u. f. 4) 5) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 992. 6) Pöder's anat. Handb. 1. B. S. 463. 7) 8) Meckel's Handb. u. f. w. a. a. D.

Eigene Nervenhaut, s. Nevritem.

Eigene Plantarligamente des Metatarsus, (Ligamenta plantaria metatarsi<sup>1</sup>.) Fußsohlenbänder der Mittelfußknochen, Untere Bänder des Mittelfußes<sup>2</sup>, Sohlenbänder der Basis der Mittelfußknochen<sup>3</sup>, (Ligamenta plantaria baseos<sup>4</sup>, s. plantaria<sup>5</sup>, s. inferiora<sup>6</sup> ossium metatarsi.) diejenigen drei Ligamente, welche an der Plantarfläche von der Mitte der Basis des zweiten zu der des fünften Knochen des Metatarsus gehen, und zwar so, daß das erste derselben vom zweiten Knochen des Metatarsus zum dritten u. f. w. geht. S. Fußligamente. 1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 1018. 2) Winslow's Anat. Abh. Uebers. Berl. 1735, 1. B. S. 403. 3) Pöder's anat. Taf. Taf. 25, Fig. 4. Nr. 34 u. f. 4) Pöder's anat. Handb. 1. B. S. 473. 5) 6) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 992.

Eigene Scheidenhaut des Hoden, s. unter Vaginalhäute des Testis.

— Streckter der großen Zehe, s. Extensoren der großen Zehe.

Eigener Aufheber der Oberlippe, s. Levator der Oberlippe.

— Ausstreckemuskel des kleinen Fingers, s. Extensor des kleinen Fingers. — Ausstreckter der großen Zehe, s. unter Extensoren der großen Zehe, den langen Extensor. — — des

Zeigefingers, s. Extensor des Zeigefingers. — Beuger der großen

Zehe, s. unter Flexoren der großen Zehe, den langen Flexor.

— Streckter des kleinen Fingers, s. Extensor des kleinen Fingers.

Eigenes Handwurzelband, s. Annularligament des Carpus. —

— Vordres Band des Schulterblatts, s. Coracoideisches Ligament.

— Vordres dreieckiges Band des Schulterblatts, s. Acromio-

claviculäres Ligament.

Eigenheit, s. Eigenschaft, auch Idiosyncrasie.

Eigenliebe, s. Egoismus.

Eigenlob, s. Ruhmredigkeit.

Eigennuß, Eigennützigkeit, ein Fehler des Charakters und Handlungsart, welcher in dem Hange besteht, den eignen Vortheil zur Haupttriebfeder unserer Handlungen zu machen. Das Wesentliche dieses Fehlers liegt in einer zu großen Hefigkeit des Erweitertriebs, welcher auf alles gerichtet ist, was die Summe unserer Realität vermehrt, und auf mancherlei Art ausarten kann. Eigennuß ist daher allem Sinnlichen und Leidenschaftlichen eigen, und hat die Sphäre alles Sinnlichen und Geistigen zum Objecte. Er geht eben

so gut auf Objecte des Verstandes, als des Gefühls- und Begehrenvermögens, und selbst das sittlich Gute, wenn es bloß künftige Belohnungen wegen geschähe, würde Eigennutz zur Quelle heissen. Geht der Eigennutz selbst bis ins Kleinliche, so heisst er Eigenzigkeit; doch werden beide Ausdrücke gewöhnlich gleichbedeutend braucht. S. Habsucht.

(Diond)

**Eigenruhm**, s. Rühmredigkeit.

**Eigenschaft**, **Eigenheit**, **Eigenthümlichkeit**, (Präsumptio<sup>1</sup>, Proprietas<sup>2</sup>.) Als beschränkte, endliche Wesen sind nicht vermögend, die Dinge durch ihr Wesen zu erkennen, zu unterscheiden, sondern nur durch die von dem Sinn dem Wahrnehmungsvermögen uns zugeführten und die Abstraktion unterschiedenen Merkmale und Bestimmungen. Diese Merkmale, durch ein Ding von einem andern sich unterscheidet, und wodurch es, als ein für sich bestehendes, von andern verschiedenes Etwa kennen, heißen die Eigenschaften eines Dinges. Eigenschaft eines Dinges ist also jede Bestimmung seines Seyns und Wirkens in wie fern sie Objecte unsers Wahrnehmungsvermögens sind. Die Eigenschaften eines Dinges an sich und abgesehen von der Vorstellung unsers Vorstellungsvermögens sind für uns unerkennbar. Eigenschaften können einem Dinge in größerer oder geringerer Anzahl zukommen. Die Vorstellung der rothen Farbe im allgemeinen nur ein Merkmal — roth; die eines rothen Kleides aber mehrere.

Man theilt die Eigenschaften ein in eigenthümliche und gemeinschaftliche. Die ersten sind solche, welche einem Dinge schließend zukommen, z. B. die Eigenschaft der Magnetnadel, nach Norden zu richten; die letztern solche, welche ein Ding mehreren gemein hat, ob sie gleich in Verbindung mit andern Wesen desselben gehören können, z. B. daß eine Magnetnadel Eisen, beweglich u. s. w. sei. Diejenigen Eigenschaften eines Gegenstandes, welche zu seinem Wesen gehören, heißen wesentliche, (Essentialia,) und sind entweder ursprüngliche oder Grundeigenschaften, (Essentialia constitutiva,) oder abgeleitete (Ess. consecutiva.) Z. B. das Bestehen des Menschen aus einem geistigen und körperlichen Princip sind wesentliche Grundeigenschaften, die Zerstorbarkeit, Sterblichkeit u. s. w. desselben aber consecutiv wesentliche Eigenschaften. Diejenigen Eigenschaften, welche fehlen können, ohne daß das Wesen eines Dinges dadurch verändert wird, heißen außerwesentliche, zufällige, (Non essentialia, accidentalia.) Z. B. die Farbe, Größe, das Geschlecht u. s. w. eines Menschen sind zufällige Eigenschaften desselben.

(Diond)

1) 2) Cicero n. Tusc. qu. 1. 3. c. 30 et acad. quaest. 1. 4. c. 18.

**Eigensinn**, **Eigenwille**. Eigensinn ist eine durch Ueberzeugung fehlerhafte Selbstständigkeit. Der Mann von Charakter muß sich auf Gründen beruhenden Ueberzeugung treu bleiben. So lange er thut, zeigt er Selbstständigkeit und Festigkeit; so bald aber die Gründe nicht mehr vorhanden sind, und er beharrt dennoch auf seiner Meinung, so zeigt er Eigensinn. Eigensinn ist mithin diejenige fehlerhafte Eigenschaft des Charakters und der Sinnesart, welche



unbegründetes Beharren auf unserer Meinung ausspricht. Diese Eigenschaft der Kurzsichtigen, Beschränkten, Kinder u. s. w. vom Eigensinn ist Eigenwille bloß dadurch unterschieden, daß fehlerhafte, unbegründete Beharren sich nicht auf Meinungen stützt, sondern in Willensäußerungen und Handlungen übergeht. Beharren auf seinen Willen ohne hinreichende Gründe ist Eigensinn. Man trifft ihn besonders bei Kindern, kränklichen, hypochondrischen Personen und launischen Menschen. Beide sind oft auch Folge früher Erziehung, einer unabhängigen Lage und körperlicher Stimmung.

Eigensinn spricht sich auch in Mienen und Geberden aus. Der Eigensinnige faltet die Stirn zwischen den Augenbraunen, zieht diese, die Nasenflügel und Mundwinkel etwas in die Höhe, hat eisernen Blick und knurrende Sprache. Der nachtheilige Einfluß dieser Stimmung auf den Körper besteht in krampfhafter Befestigung der Ab- und Aussonderungen, und Begründung einer erhöhten Reizbarkeit des ganzen Nervensystems. (Dzondi.)

Eigenthümliche Bänder oder Ligamente, s. Eigene Bänder Ligamente. — Bekleidung der Arterien, s. unter Arterien-eigentliche Haut. — Haut des Hodens, s. Albuginea des Hodens. Eigenthümlicher ausstreckender Muskel des kleinen Fingers und des Zeigefingers, s. Extensor des kleinen Fingers und des Zeigefingers. — Lendenmuskel, s. Cruralis.

Eigenthümlichkeit, s. Eigenschaft.

Eigentliche Haut der Arterien, s. unter Arterienhäute. — Eigentliche Harnblase, s. unter Harnblasenhäute. — — Des Magens und der Därme, s. unter Häute des Magens und der Därme. Kranzarterie des Magens, s. unter Coronarische Magenarterie, die größere. — — Vene des Magens, s. unter Coronarische Magenvenen, die größere Vene.

Eigentliche Physiologie. Diesen Unterschied macht Hildebrandt<sup>1</sup>, indem er die anatomische und chemische Physiologie als zwei Zweige der Physiologie bezeichnet, und diesen die Kenntniß des Lebens selbst und der Erscheinung desselben als den dritten Theil der Physiologie unter obiger Benennung entgegenstellt. Vgl. Physiologie. Vgl. des. Lehrb. d. Physiologie, §. 4.

Eigentlicher Hode, s. unter Hode.

Membrides, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wortes beide Gehirnhäute. S. Meningen.

Membrides, Polluc. onom. S. Stephani dict. med. 1564, p. 586.

Blase des Eierstocks, s. Graafische Bläschen.

Blase, s. Pleum.

Effertigkeit, s. Haß.

Veräschung<sup>1</sup>, (Incineratio<sup>2</sup>, Aestphara<sup>3</sup>), das Verbrennen organischer oder auch vegetabilischer Substanzen in Bezug darauf, was man bloß auf den als Asche sich zeigenden erdigen Rückstand Vgl. Asche.

Gren's Handb. d. Chemie, 1. Th. §. 139.

3) Vgl. dieß Wort.

Einathmen, Einathmung, s. Inspiration.

Einbalsamirung der Leichen, s. Balsamirung der Leichen.

**Einbildung**, f. Phantasie, auch Dünkel.

**Einbildungskraft** oder — **vermögen**, f. Imagination, Phantasie.

**Einblasen**, f. unter Blasen.

**Eindampfung**, f. Resorption.

**Eindruck**, f. Impression.

**Einfache Drüsen** <sup>1)</sup>, (*Glandulae simplices* <sup>2)</sup>) werden diejenigen absondernden Organe benannt, in denen die abgesonderten Tätigkeiten unmittelbar, wie sie aus den kleinsten Gefäßen hervortreten, sich auch ergießen, oder in eine eigene kleine Höhlung mit einem einfachen Excretionscanal zusammenfließen. S. **Hohldrüsen**, auch **Drüsen**.

<sup>1)</sup> <sup>2)</sup> **Maier's** Besch. d. menschl. K. 4. B. S. 76.

**Einfache Knochenhöhle** <sup>1)</sup>, (*Cavitas ossis simplex*), eine in einem einzigen Knochen sich bildende Höhle, im Gegensatz der zusammengesetzten. S. **Knochenaushöhlung**.

<sup>1)</sup> **Walter's** Abh. v. roth. Knoch. 2. Aufl. S. 30.

**Einfache Nervenknoten**, f. **Spinalganglien**. — **Stoff** Chemische Bestandtheile der Körper, auch Elemente.

**Einfachheit**, **Einfalt**, **Einförmigkeit**, **Simplicitas** <sup>1)</sup>. Einfachheit ist eine Eigenschaft der S. Denkungs- und Lebensart, und bezeichnet im allgemeinen Abw. heit von Mannigfaltigkeit und Zusammensetzung. Sie ist hauptsächlich dem Kindesalter der Menschen und Völker, den niedern C. den und insonderheit den, vom Umgange mit Fremden abgesont. Bergbewohnern eigen, wird aber auch bei gebildeten Ständen selbst in Verbindung mit der vielseitigsten Bildung angetroffen.

**Einfalt**, welche als Beschränkung des Verstandes eine U. kommenheit anzeigt, ist als Eigenschaft des Gemüths und des racters eine Vollkommenheit, und besteht in der schlichten Ueb. stimmung der Gefinnungen und Handlungen und der Abwesenheit Zweideutigen, Gezierten und Gefünstelten. Einfalt des Herzens f. sich durch Einfachheit, Geradheit und Anspruchslosigkeit im H. aus. Mit Würde und Adel verbunden, nennen wir sie eine edle Einfalt.

**Einförmigkeit** ist eine fehlerhafte Einfachheit, welche sich Mangel an Abwechslung ausdrückt, z. B. eine einförmige Haltung, die nur um dasselbe sich dreht. (Dion)

<sup>1)</sup> **Plin. hist. mund.** 1. 35. c. v.

**Einfachste Theile des Körpers**, f. Elemente des Körper.

**Einfältigkeit**, f. Dummheit.

**Einfall**, f. Gedanke.

**Einfalt**, f. Dummheit, auch **Simplicität**, vgl. auch **Einfalt**.

**Einfassung der Linse**, f. **Capfel der Crystalllase**.

**Einfluß**, f. **Influenz**.

**Einförmigkeit**, vgl. **Einfachheit**.

**Eingang**, vgl. **Apertur**. — **der Beckenhöhle**, f. unter turen des Beckens, die obere. — **zum Trichter**, f. unter turen des dritten Gehirnventrikels, die vordere.

**Eingangsende des Magens**, f. **Cardia**.



eingeborne Wärme, s. Angeborne Wärme.

eingebung, s. Inspiration.

eingekerbter Rand der Milz, s. unter Rändern der Milz, ker Rand.

eingekerbtes Band, s. Denticulirtes Ligament.

eingelagerter markiger Streifen des Sehhügels, s. Commissur der Sehnervenhügel.

eingelenkung, s. Diarthrose.

eingeschachtelte Keime, s. Präformirte Keime.

eingeschachtelung von Keimen, s. Präformation von Keimen.

eingesenktes Mäuslein des Schulterblatts, s. Subscapularis.

Eingeweide<sup>1</sup>, (Viscera<sup>2</sup>, Ext<sup>3</sup>, Interanea<sup>4</sup>, Splanchna<sup>5</sup>, Opelia<sup>6</sup>.) dem Wortsinn nach alle feste Theile des thierischen Körpers, welche in dem Innern desselben befaßt sind. Doch werden gewöhnlich von den Anatomen nur diejenigen größern Organe darunter befaßt, welche von den drei großen Körperhöhlen des Kopfs, der Brust und des Unterleibs eingeschlossen werden. Indessen findet auch dieses Wort in Hinsicht auf das Gehirn und die Sinnesorgane eine Uebertragung seine Anwendung, um einen Collectivausdruck für die Organe sämtlicher großen Körperhöhlen zu haben; in der gemeinen Lebensprache dagegen denkt man sich bei dem Worte Eingeweide doch zunächst nur die in der Brust- und der Unterleibshöhle liegenden Organe.

Die anatomische Lehre von den Eingeweiden wird als Splanchnologie bezeichnet. Doch ist man in anatomischen Lehrbüchern auch dem natürlichen Sinne nicht treu geblieben, sondern befaßt gewöhnlich diejenigen Körpertheile darunter, welche nicht Knochen und Bänder, Muskeln, Gefäße oder Nerven sind, indem alle diese genannten Theile sich auf natürliche Weise als Gegenstände für eben so viele verschiedene Sectionen in dem anatomischen Unterricht darbieten, alle fernern Trennungen von Körpertheilen aber, zum Behuf des Lehrunterrichts, (wie z. E. die Abscheidung von Drüsen für eine eigne Lehre,) der Willkürlichkeit unterliegen. Daher ist es gekommen, daß man in der Eingeweidelehre nicht nur die Sinnesorgane, in so fern sie äußere Theile sind, die Bildung des Halses, in so fern sie durch die Organe bewirkt wird, die mit den Eingeweiden der Brust und des Unterleibs in dem nächsten Bezug stehen, und die äußern Geschlechtsorgane, sondern selbst auch die äußern Hautdecken, (den völligen Gefäßsaß der Eingeweide,) mit den Haaren und Nägeln, so wie auch in der Betrachtung der Fötusbildung die Nabelschnur nebst der Placenta, zu der Eingeweidelehre gezogen hat. Indem nun aber wieder in mehreren anatomischen Schriftstellern Haupteingeweide, die mit andern Organen, welche in dem anatomischen Unterricht eigne Sectionen erhalten, in nächster Verbindung stehen, zugleich mit diesen

1) Mayer's Besch. d. menschl. K. 1. B. S. 107. 2) Plinii hist. mundi l. 11. c. 37. „Omnia quidem principalia viscera membranis propriis, ac velut vaginis inclusit providens natura.“ 3) Plinii hist. m. l. c. „Extra homini ab inferiore viscerum parte separantur membrana, quae praecordia appellant.“ 4) Plinii hist. m. l. 30. c. 7. „Interanea rum morbi.“ 5) 6) Vgl. dieß Wort.

Theilen vorgetragen werden, namentlich das Gehirn mit den Nerven in der Neurologie, das Herz mit den Gefäßen in der Angiologie, ist vollends der Begriff eines Eingeweides als Gegenstand anatomischen Wissens völlig schwankend und unbestimmt worden.

Gleichwohl ist die Unterscheidung von Eingeweiden in der thierischen Oekonomie selbst wesentlich bedingt, und es wurden bereits frühern Anatomen durch die in die Augen fallende Dignität der Theile zu Auszeichnung derselben geleitet.

Nach der dreifachen Seite des thierischen Lebens, der Reproduction der Irritabilität und der Sensibilität, bietet sich nämlich auch Körper ein dreifacher materieller Apparat in eben so vielen gesonderten Räumen dar, die selbst aber nur relativ geschlossen sind, in die Sphäre einer jeden Lebensseite sich auch in die übrigen Höhlen und überhaupt durch den ganzen Körper erstreckt, nur aber von einem bestimmten Centralapparat anhebt.

Der Reproduction dienen insbesondere die Eingeweide des Unterleibs. Da aber die Reproduction in der thierischen Oekonomie, (wie auch in der Pflanzenwelt,) eine doppelte ist, und sowohl auf Erhaltung des Individuums, als auf Erhaltung des Geschlechtes geht; so zerfällt hiernach der Gesamtapparat der Eingeweide des Unterleibs auch in einen doppelten. Nämlich alle diejenigen Organe, welche primär zur Ernährung des Körpers, zur Aufnahme der in den Körper gelangenden Nahrungsmittel und zu ihrer Verarbeitung zu assimilativem Stoffe dienen, sind von dem Peritonäum umschlossen, und sind namentlich der Magen, (in den sich die Speiseröhre vom Mund durch den Hals und die Brusthöhle herab senkt, der daher zwar nicht topisch, aber seiner Bestimmung nach zu der Unterleibshöhle gehört,) das Darmcanal, die Milz, die Leber mit der Gallenblase und das Pankreas, nebst den Umkleidungen dieser Theile und deren Plicaturen, die Mesen und das Mesenterium. Den außerhalb hinter und unter dieser Höhle in dem Unterleib gelegenen Geschlechtsorganen, welche nach Unterschied der Geschlechter ebenfalls verschieden sind, (bei dem männlichen Geschlecht die Samenbläschen, die Prostata und die Hoden — indem man den Hodensack als eine außerhalb der Beckengrenzen sich fortsetzende hintere und fere Unterleibshöhle ansehen kann, welche in widernatürlichen Zuständen, bei Brüchen, selbst andere Eingeweide des Unterleibes theilweise aufnimmt — bei dem weiblichen Geschlecht aber der Uterus mit den Ovarien und seinen Bändern und der den Uebergang zu den äußern Geschlechtstheilen bildenden Vagina,) fügen sich die Harnabführung bestimmten Organe, namentlich die Nieren mit ihren Harnkanälen, die Harngänge und die Harnblase bei, welche durch die Harnröhre den Uebergang zu den äußern Theilen macht. Diese Organe dienen wenigstens negativ der Reproduction, indem sie durch die Ausführung des ihr Ueberflüssigen und bei Zurückhaltung Schädlichen aus der Blutmasse die Assimilation des Geeigneten in den einzelnen Theilen nothwendig bedingen, und haben mit den excernirenden Geschlechtsorganen das gemein, daß durch beide, in einfacher Befrie-



von Naturforderungen, Stoffe aus dem Körper entfernt werden, das individuelle Leben sich zu seinem eignen Wohlfeyn zu entleeren strebt.

Die Irritabilität dienen insbesondere die Eingeweide der Thiere. Hier deutet sich vornehmlich das Herz, (und zwar weit herabreichender als in der Unterleibshöhle die Leber,) als das Centralorgan, mit dem die Lunge, (an die sich vom Hals herab die Luftzweige, wie die Speiseröhre an den Magen anfügt,) in nächster Gemeinschaft steht. Mitteltst des Gefäßsystems wird das Herz zugleich Centralorgan des ganzen Körpers. Durch das von der Leber aus zum Herzen zurückgelangende Blut und in dem aus dem thoracischen Stamm, als dem Stamm der Chylusführenden Gefäße, aufgenommenen Chylus, erhält es den Stoff, dessen es bedarf, um das Resorptionsgeschäft gleichsam in einem zweiten Act übernehmen zu können, oder es vielmehr auf die einzelnen Theile, zu denen durch Thätigkeit Blut gelangt, überzutragen, während es zugleich mittelst der Zuleitung des Bluts zu den Muskeln durch die Arterienverzweigungen, und mittelst des arteriösen Systems überhaupt die Muskelthätigkeit von der materiellen Seite her primär vermittelt.

Die Sensibilität ist dann insbesondere das Gehirn, als Centralorgan in der Schädelhöhle, verliehen, von dem das Rückenmark, in der durch den Rückenwirbelcanal hindurch verlängerten Medullarhöhle, ein ergänzender Theil ist, und nur topisch, nicht physisch der Brust und dem Unterleib angehört. Die Nerven haben eben Bezug auf das Gehirn, den die Gefäße auf das Herz haben. Durch sie wird auch die Irritabilität, und zwar als aufregende Kraft und immer nur secundär, zur Thätigkeit gebracht. Ja auch die Fortpflanzung ist mit dem Nervenleben in nothwendiger Verbindung, obgleich noch weiter als die Irritabilität gegen sie zurückgestellt. Sinnesorgane selbst sind aber eigentlich nur vorgeschobene und außen getretene Gehirntheile, daher auch nur relativ als Eingeweide zu betrachten. (H.)

Eingeweidearterie, s. Coeliacische Arterie. — Fleisch, s. unter Lymphma.

Einhauchen, Einhauchung, s. Inspiration.

Einheit, Eins, s. Monos.

Eintheilung, s. Gomphose.

Einreibungen, s. Dentationen.

Einröthung, s. Orbiculararthrose.

Einlenkung, s. Articulation.

Einmangelung, Einpassung, s. Gomphose.

Einmündende Adern, s. Lymphgefäße. — Darmgefäße, s. Chylusführenden Gefäße. — Gefäße oder Venen, s. Lymphgefäße.

Einmündung, s. Absorption.

Einmündungslehre, s. Evolutionsystem.

Einmündige, s. unter Heteroscii.

Einmündigen, der Uebergang aus dem wachenden Zustand in den Schlaf. Bgl. Schlaf.

**Einschlafen der Glieder.** Taubwerden der Glieder (Obdormitio<sup>1</sup>, s. Stupor artuum<sup>2</sup>.) Jeder äußere Druck auf einen Nerven, der so stark ist, daß seine Wirkung sich durch die fere zellige Scheide des Nerven hindurch auf das Nervenmark erstreckt und in dessen normalen Cohäsionsverhältnissen Veränderungen zur Folge hat, bewirkt Beeinträchtigung der Nerventhätigkeit. Schmerz in dem Nerven und Lähmung der Theile, in welchen Nerv sich verbreitet oder mit denen er in nächster organischer Verbindung steht. In so fern hierdurch ein eigentliches Leiden und wirkliche Störung des Lebens bewirkt wird, gehört die nähere Betrachtung dieses Gegenstandes in die Pathologie. Diesseits dieser Grenze aber liegt noch die eigentliche Modification des Gemeingefühls, durch einen vorübergehenden, mäßigen oder auch dauernden leichten Druck, oder überhaupt eine zufällige äußere Einwirkung auf einen Nerven bewirkt wird, die, wenn auch nicht angenehm, doch auch schmerzhaft ist, und nach Entfernung der äußern Hemmung die Störung auch gewöhnlich in kurzem wieder von selbst sich verliert. Dieß Gefühl ist jedem bekannt, der in einer unbequemen Lage, durch der ischiadische Nerv gedrückt worden ist, eine Zeit lang sitzen genöthigt gewesen, oder sich anhaltend auf den Ellenbogen gestemmt hat, wenn dadurch der Cubitalnerv einen Druck empfindet. Man bezeichnet den Zustand analogisch als einen Zustand von Stumpf- oder Taubseyn, weil das Gefühl sich nicht auf eine stechende Art andeutet, wie andere sinnliche Wahrnehmungen, welche in jeder Sprache sich ihnen eigene Ausdrücke finden.

Es ist mit einer temporären Unbehülfslichkeit des Theils verbunden zu dem der afficirte Nerv zunächst gehört; die thierische Wärme ihm ist vermindert; er ist nach Umständen blaß, trocken, und überhört in einem Zustand von gesunkener Energie des Lebens.

Die wiederhergestellte freie Lebensthätigkeit nach aufgehobenem Druck deutet sich öfters durch eine Affection an, die, als eine Reaction aufgeregte, schon als eine pathologische angesprochen werden könnte, wenn sie nicht zu transitorisch wär; es ist dieß das vage Gefühl von leichten Stichen unter der Haut, was man als Ameisenlaufen, (Formicatio<sup>3</sup>, Stupor formicans<sup>4</sup>.) bezeichnet. Es kommen Personen, die dieß Gefühl sogleich im Gesicht und der Stirne bekommen, wenn sie sich mit dem Kopf tief bücken. Auch wird solches häufig auf den Cubitalnerven in der Gegend des Oberarms, wenn einer äußern Gewalt vorzüglich bloßgestellt ist. Es läßt, wie alle Modificationen des Gemeingefühls, (Zucken, Schmerz, Gefühl Hitze, Kälte u. s. w.) keine Erklärung zu, sondern stellt sich einfach in eignen Wahrnehmung dar.

Die Kälte bewirkt durch Zusammenziehung der Theile die Verbindung von Gliederbetäubung, (Stupor a gelu.<sup>5</sup>) in Verbindung mit dem Frostgefühl.

Hierher gehört endlich auch die eigne Wirkung, die das Verharren des Bitterrothens (Raja torpedo,) des Bitteraals, (Gymnotus

1) 2) Sauvages nosol. method. cl. 7. gen. 7.  
meth. l. c. sp. 2.

3) 4) Sauvages

5) Sauvages nos. meth. l. c. sp. 3.



aus, s. electricus,) und des Bitterwelses, (Silurus electricus,) vorbringt, (Stupor a torpedine<sup>6</sup>;) die sowohl nach dem, was über organischen Bau dieser Thiere bekannt worden ist, als auch nach gleichen Wirkungen, welche man durch electricische Apparate, nämlich den unter dem Rahmen der Leydner Flasche bekannten, hervorzubringen kann, als eine electricische Wirkung betrachtet werden muß. Sind nämlich diese Thiere mit einem eignen Organe versehen, welches auch als electricisches Organ unterschieden wird, dessen dieselben nach Willkür oder vielmehr nach Bedürfnis bedienen, das wesentlich aus Nerven, aus Eiweiß- und Gallertmasse, wo Nerven gehen, als electricischen Leitern, und aus aponeurotischen Netzen, die sich durch die Eiweißgallerte hindurchziehen, als Nichtern, besteht, in jedem der gedachten, bisher unterschiedenen electischen Fischen aber einen andern Bau hat? (v)

65) Sauvages nos. meth. l. c. sp. 4. 7) Vgl. J. Hunter's Bemerkungen in Phil. transact. Vol. LXII. p. 481. tab. 20 u. Vol. LXV. p. 395. tab. 9. M. Girardi's Bemerkungen in Mem. della Soc. italiana, T. III. p. 553. Geoffroy's Bemerkungen im Bulletin de la soc. philom. 66 année, T. III p. 169, auch Blumenbach's Handb. d. vergl. Anat. 2. Aufl. S. 518, vorzüglich aber Link's Gesch. u. Physiol. d. Thiere, 1. Th. S. 209.

Einschnaufen, s. Inspiration, vgl. auch Schnaufen.

Einschnitt u. s. w., s. Incisur u. s. w. — am Siebbein, ethmoidalincisur des Stirnknorpels.

Einschnitte des großen Gehirns, s. Windungen des großen Hirns.

Einschauen, vgl. Verstehen, Verstand.

Einsseitigkeit, eine Art Beschränktheit, findet sowohl in Hinsicht (Geisteskräfte, als auf Bildung und Charakter Statt, und ist Vielseitigkeit entgegengesetzt. Der Beschränkte sieht alles nur einem Gesichtspuncte an, und wird dadurch einseitig. Ein Mensch, welcher nur ein gutes Gedächtnis hat, dem aber Verstand, Witz und Tarsinn mangeln, ist ein einseitiger Kopf. Ein Gelehrter, der nur Studium einer einzigen Sprache seine ganze Lebenszeit widmet, für alles andere keinen Sinn hat, ist einseitig gebildet. Diese Einseitigkeit findet man oft bei den größten Genies und berühmtesten Gelehrten irgend eines Faches, ja der größte Theil der Menschen ist in dieser Hinsicht nur einseitig gebildet, da theils die Beschränktheit der Zeit, welche sie auf ihre Ausbildung werden können, theils die Menge der Kenntnisse und der Umfang derselben eine Vielseitigkeit der Bildung erschweren. Einseitigkeit des Charakters endlich entsteht, wenn unter den verschiedenen Bestimmungen und Hauptzügen, aus welchen er besteht, der eine so hervorsticht und das Uebergewicht hat, daß er die andern größtentheils oder gänzlich verdukkelt, die hervorragende Eigenschaft sei, welche sie wolle, als; Eigennutz, Herrschaft, Wollust u. s. w. (Diondi.)

Einsicht, vgl. Verstehen, Verstand.

Einspritzung von Gefäßen, s. Injectionen von Gefäßen.

Einstimmen, s. Anstimmen.

Einwärtsdrehen der Hand, s. Pronation. — drehende Handmuskeln, s. Pronatoren. — ziehende Schenkelmuskeln,

f. Abductoren des Schenkels. — zieher des Augapfels, f. ducirender Augenmuskel.

**Einziehung,** f. Suture.

**Eirunde Löcher des Keilbeins,** f. Ovale Löcher des Epnoidalknochens. — rundes Fenster des Tympanums, f. D les Fenster des Tympanums. — — Loch des Herzens, f. D les Loch des Herzens.

**Eisen,** (Ferrum, Mars,) ist ein Ganzmetall und schon so la bekannt, als man Waffen hat. Es ist besonders darum merkwür weil es, nebst dem Nickel und Chrom, das einzige Metall ist, dem man mit Gewißheit weiß, daß es regulinisch aus der Luft (rololith,) niederfallen kann<sup>1</sup>. Als das reinste Eisen ist das geschu bige, weiche, Stab- oder Schmiede-Eisen anzunehmen, dessen genschaften kürzlich folgende sind: Es ist grauweiß, im Bruche f rig-halig, 7,7 spec. schwer, nicht hart, sehr zähe, sehr dehn und deshalb zu Blech und Drath auszudehnen, kalt und glühend strecken; es ist höchst strengflüssig, schmilzt, nachdem es zuvor weich geworden ist, und läßt sich in diesem Zustande der Erweich zusammenschweißen; es kann magnetische Eigenschaften annehm wenn es lange Zeit im magnetischen Meridiane aufgehangen, in d selben Richtung gestoßen oder mit einem natürlichen Magneten ge hen wird; es geht chemische Verbindungen ein mit Sauerstoff, E line, Schwefel, Phosphor, Wasserstoff, Kohle, Borium, und, au dem Wismuth und Quecksilber, mit allen Metallen. Der hier sonders zu erwähnenden Verbindungen mit Sauerstoff gibt es zu das Drydul (Aethiops martialis,) ist schwarz, grau, schmelzbar, steht aus 25 Eisen, und 7,5 Sauerstoff, gibt mit Säuren grüne Sa von denen der Eisenvitriol das bekannteste ist; mit Wasser zum Hy drat verbunden, hat es weiße Farbe. Das Dryd (Crocus marti ist rothbraun, als Hydrat aber gelb (Dcher,) es enthält  $1\frac{1}{2}$  Mal Sauerstoffmenge des erstern, verbindet sich ebenfalls mit Säuren Salzen, welche aber schwer, oder gar nicht, crystallisiren und rosth biges Aussehen haben.

Diese Rothfarbe, zugleich mit der Erfahrung, daß unter allen Th len des Bluts nur allein die rothfärbende Materie Eisen in ihrer Af aber keinesweges vor der Einäscherung, hinterläßt<sup>2</sup>, veranlaßten z zunehmen, daß die rothe Blutfarbe vom Eisen abhängig sei. D yeur und Parmentier nahmen, darin eine dreifache Verbindu von Eisenoxyd, Phosphorsäure und Natrum an<sup>3</sup>, Fourcroy h gegen wollte nur eine Auflösung des basischen phosphorsäuren Eis in Eiweißstoff<sup>4</sup> gelten lassen. Allein jene neuen Erfahrungen, u durch nur eine unbedeutende Menge des Eisens im Blute aufgesu

1) S. Ehladnt über den Ursprung der von Pallas gefundenen und anderer ähnllicher Massen, Alga 1794; ferner mehrere Nachträge in Gilbert's nalen der Physik, von ebendenselben, 15. B. S. 367 und v. Hornschuh e das 23. B. S. 93 u. f. 2) Die neueste Zerlegung von Berzelius folgendes: 80 Theile getrocknete, rothfärbende Materie li-fern verbrannt einen E Afche, und dieser enthält die Hälfte Eisenoxyd und ungefähr  $\frac{1}{2}$  phosphorsä Eisenoxyd. S. Berzelius Ueberblick über die Zusammensetzung der thierli Flüssigkeiten. Nürnberg bei Schrag 1814. Mit dieser Zerlegung stimmen u ein die Untersuchungen von Marcet und Brande in den Philosoph. tr actions 1813. 3) Vgl. den Artikel Blut im 1. B. S. 814. 4) S. eben



wurde, welche nicht einmal vor dem Verbrennen zu bemerken ist, nach welchen endlich die Unmöglichkeit dargethan ist, rothe Lösungen von Eiweiß und Eisensalzen zu verfertigen, (das Selen löst nach Wauquelin und Berzelius größere Mengen Salze auf, als man im Blute annehmen darf, allein diese Lösungen sehen nie roth, sondern nur grün, höchstens mit der Zeit trüblich aus, und lassen das Oxyd wieder fallen,) setzen das Unsaure, die rothe Blutfarbe vom Eisen abzuleiten, hinlänglich ins

Die übrigen Verbindungen des Eisens sind kürzlich: 1) mit Chlor, das sublimirte salzsaure Eisen; 2) mit Schwefel, der Magnet, der Eisenkies, das rothbrüchige Eisen; 3) mit Phosphor, kastbrüchige Eisen; 4) mit Kohle, der Stahl, das Roheisen, Graphit; 5) mit Borium, das künstliche Boroneisen; 6) mit Allen mehrere Legirungen, die bis jetzt aber ohne alle Anwendung geblieben sind.

nach Berzelius a. a. O. Vgl. den Artikel Blut im 2. Band S. 815. Eine andere Ansicht siehe unter dem Artikel-Eiweißstoff. (Ficinus.)

**Eisenhaltige Menschenkörper**, (Anthropolithi mineralisati), nach Wallerius eine Unterabtheilung von mineralisirten Copolithen, die in eisenhaltigen Bergwerksgruben gefunden worden. S. Mineralisirte Anthropolithen.

Systema mineralog. T. II. ed. nov. Vienn. 1778, p. 583.

**Εμπνοή**, in Uebersetzung des gleichlautenden Griechischen Wortes. i. q. Inspiratio.

Εσπυρον.

**Eizbein**, s. Coccyrknocken.

**Eitelkeit** ist eine Ansartung des Ehrtriebes, und ihrer Natur nach gemeinen eine allzu große Begierde nach äußern Zeichen der Ehre. Ist der allgemeine Begriff der Eitelkeit. Daher nennt man einen Mann, der sich gern mit Ordensbändern und Ehrenzeichen schmückt, einen Titel einen großen Werth legt, einen eiteln Menschen. Man aber die äußern Zeichen der Ehre an sich leer und nichts bedeuend sind, so bezeichnet die Eitelkeit im engerm Sinne die Werthschätzung solcher äußern Vorzüge, welche an sich keine sind: als Puz, Prunk, Titel u. s. w., keineswegs aber die zu hohe Werthschätzung der Dinge, welche wirklichen Werth haben, als Reichthum, Stärke u. s. w. Die Ueberschätzung dieser und ähnlicher Dinge ist Eitelkeit, sondern Dünkel, Einbildung, Hochmuth, Stolz u. s. w. Eitelkeit unterscheidet sich von Stolz nicht aber allein durch die Größe, worauf sie einen Werth legt, sondern auch durch die Art, wie sie sich äußert. Der Stolz verachtet im Gefühl seines Werthes die äußere Ehrenzeichen; der Eitle im Gegentheil sucht sie und will sie möglichst zur Schau. Eitelkeit wird leicht lächerlich, hochgepriesener Stolz leicht verhaßt. (S. Stolz.)

Eitelkeit ist eine Eigenschaft der Beschränkten, der Kinder, Wilder Frauen; sie leiht der Schmeichelei gern ihr Ohr. In der That drückt sie sich durch selbstgefälliges Lächeln und zufriedenes Umsehen nach Beifall aus.

(Diondi.)

**Ejulatus**, s. Geheul.

**Eiweißstoff**, Eyrweißstoff, (*Materia albuminosa* <sup>2</sup>.) Coagulable oder Gerinnbare Lympe <sup>3</sup>, (*Lympha coagulabilis*) Die Betrachtung dieser eigenthümlichen Zusammensetzung aus Eiweißstoff, Kohle und Wasserstoff ist so genau mit der Lehre vom Blut verbunden, daß eine richtige Uebersicht es erfordert, hier in so weit die Lehre von der chemischen Constitution des Blutes zu berichtigen, als neuere Untersuchungen es möglich gemacht haben. Berzelius in Uebereinstimmung mit den Chemikern Brande, Bostock, Marcet in London <sup>7</sup>, stellt folgendes auf: Das Blut ist zusammengesetzt aus einem Theile, der flüssig und gleichartig ist, und nem andern, der bloß darin schwebt und sich bei der Ruhe selbst trennt. Der flüssige Theil ist eine wässerige, durch Natron vermittelte Auflösung von vielem Eiweißstoff, (Serum,) und wenig Faserstoff, mit einigen, (nicht zufälligen,) salzigen und animalischen Bestandtheilen. Der darin schwebende Theil ist die färbende Materie. Sie unterscheidet sich vom Eiweißstoffe des Serums vorzüglich durch Farbe und Unauflöslichkeit in Blutwasser. Vom Eisen enthält sie ungefähr  $\frac{1}{3}$  Procent, und man leitete sonst fälschlich ihre Farbe von ab. (S. Eisen.) Der Eiweißstoff des Serums, der Faserstoff und die rothfärbende Materie gleichen sich so innig, daß man sie für Abänderungen eines und desselben Eiweißstoffes ansehen muß. So wie die rothfärbende Materie nur erst durch Einäscherung Eisen abgibt, so geben sie alle nur erst durch solche Zerlegung phosphorsaure Salze und Kalk, so daß alle diese Dinge wahrscheinlich nur während der Zerlegungsarbeit zusammengesetzt werden. Diese eiweißartigen Eigenschaften des Blutes können sich mit Säuern vereinen und Verbindungen hervorbringen, die man neutrale nennen kann; sie sind im Wasser auflöslich; allein Ueberschuß von Säure scheidet sie getrennt als Essigsäure und Phosphorsäure ausgenommen. Salpetersäure verändert sie theilweis in Aepfelsäure; Alkohol bildet eine fettwachsartige Substanz daraus. Das Blut enthält keine Gallerte. Was man für Fibrin nahm, ist durch Wärme veränderter Eiweißstoff <sup>8</sup>.

Das Blut ist die eigentliche Cysterne alles Eiweißstoffes; Verdauung und Chylification aber sind die Quellen desselben. (Hierher gehören die Säfte der Vegetabilien und ihre Assimilation gezogen werden.) Dies gibt diesem Stoffe, der nur in der organischen Welt findet, eine hohe physiologische Bedeutung und eigentliche Bestimmung. Alle übrigen Kennzeichen stehen untergeordnet und keine für die ganze Gattung passend. Der Chymus eines Truthahns <sup>9</sup> hielt im Zwölffingerdarne schon Eiweiß in größerer Menge, als in den genossenen Nahrungsmitteln voraussetzen ließ, aber von Salzen, welche das Blut enthält, zeigte er wenig oder keine Spuren. Diese erscheinen zuerst, nebst Fett, im weitem Fortgang der Assimilation im Chylus, und die vollkommenste Ausbildung aller eiweißstoffartigen Bestandtheile wird erst durch die Respiration vollbracht.

1) — 4) Gren's Handb. d. Chemie, 2. Th. S. 1585. 5) S. den Blut im 1. B. S. 812. 6) S. dess. Ueberblick über die Zusammensetzung d. thierischen Flüssigkeiten, a. dem Englischen von Schweigger, Bd. 1814, 8. 7) S. Philosophical transactions 1812, wie auch d. medl. Abh. d. Naturforsch. Gesellsch. zu London, 1. u. 2. Theil. 8) nach Bostock 1. D. 9) nach Marcet a. a. D.



diese Eiweißstoffarten gerinnen in der Hitze, faulen leicht, trocknen der Wärme zusammen und lösen sich dann nur durch reinere wieder auf. Eine Auflösung des Faserstoffes und des Secretin Alkali nimmt eine hellgelbe Farbe an, die der rothfärbenden Materie ist rothgrün; diese Farbe gab Anlaß, Galle im Blut nehmen. Die weiteren Unterschiede dieser drei Eiweißstoffe, die auf verschiedene Gerinnbarkeit und Farbe beziehen, sind unter Artikel Blut<sup>10</sup> schon abgehandelt. Nur noch wenige Worte über Ursache der Farbe. Zu ihrer Erklärung bedürfen wir keines Meines. Vielmehr ergibt sich bei Berücksichtigung der engen Verwandtschaft der Thiere und Pflanzen, die als ein organisches Ganzes der Natur vereint sind, daß so gut in den Vegetabilien sich Menge Farben aus Stickstoff, Wasser oder Wasserstoff und Kohle (die intensivsten sind stickstoffhaltige,) sich eben so gut im Thiere solche mit ähnlicher Zusammensetzung vorfinden werden. Dafür spricht nun die Ähnlichkeit der Blutfarbe mit andern animalischen, z. E. mit dem Indig. Alkalien lösen jene auf, Schwefelwasserstoff, Salpetersäure macht sie gelb und bitter, Weizenkeime endlich, (Eichendecoct und Quecksilbersublimat,) heften die Blutfarbe sehr dauerhaft an wollene und andere Zeuge.

Dem Blute sondern sich eine Menge Secretionen ab, welche dem Blute in so fern ähnlich sind, daß sie Eiweißstoff mit Natrium und dieselben Salze enthalten; aber jede Secretion, die also alkalisch ist, hat nur einen Eiweißstoff, während das Blut aus mehreren besteht, und dieser Eiweißstoff weicht mehr oder weniger von jenen ab. Die Gerinnbarkeit besitzen diese modificirten Eiweißstoffe oder Secretionen alle; jedoch gerinnen einige nur erst durch Säuren oder Säuern, nicht durch bloße Erhitzung. Die Gerinnung durch Erhitzung hat ihren Grund in der durch die Hitze abgeänderten Verwandtschaft; das Natrum, wodurch der Eiweißstoff flüssig erhalten geht aus Wasser und dieser verliert sein Auflösungsmittel; Erhitzung findet Statt bei der Gerinnung durch Alkohol und bei der Einwirkung der Säuren, welche das Alkali wegnehmen, später im Uebermaß zugesetzt, mehr oder weniger Verbindungen mit Eiweißstoffe der Secretion eingehen. So hält Galle die Siedehitze aus, ihr grüner Eiweißstoff, (Gallenstoff,) scheidet sich aber durch verdünnte Salzsäure und mit ihr verbunden als fälschlich sogenanntes Gallenharz ab<sup>11</sup>.

In diesen alkalischen Eiweißstoffen kommen mehrere denen des Menschen nahe. Das Eiweiß der Vögeleier, das Eiweiß der thierischen Samen, (welches die Bildung der Emulsion bewirkt,) stimmen überein mit dem des Blutserums, wahrscheinlich auch der Eiweißstoff im menschlichen Samen, im Speichel, im Pankreas, im Schweißwasser, in den Augenflüssigkeiten; mit dem Faserstoff kommt der Kleber der Pflanzen überein und der gallertartige Stoff der Fruchtsäfte. Endet sich die Ähnlichkeit zwischen der färbenden Materie und dem Eiweißstoff der Pflanzensäfte. Nur der Gallenstoff steht für die Farbe, Geschmack und übrigen Verhalten, indem er mit Alkali nicht gerinnt, auch sich leicht in Ammonium verändert<sup>12</sup>.

<sup>10</sup>) S. 813 u. 814. <sup>11</sup>) nach Berzelius a. a. O. <sup>12</sup>) Berzelius a. a. O. stimmt dem nicht bei; doch sehe ich sehr oft in inspissirter Ochsen- oder Hirschgalle mit Erystallen von kohlensaurem Ammonium entstehen.

Derjenige Stoff, welcher unter dem Nahmen thierisches Extract oder Smazom, wegen seiner Auflösllichkeit im Alkohol, für ein besondern angesehen wird, ist höchst wahrscheinlich nur ein durch Reagentien veränderter Eiweißstoff, verbunden mit milchsauern und andern Salzen. Er bleibt unter andern nach der Abscheidung des citronnenen Eiweißes übrig, wenn dieses durch etwas anders, als saures Quecksilberoryd geschieden wird. Hierher vielleicht Siegwart's extractartiges Pigment des Bluts<sup>1)</sup>.

Die thierischen Excretionen haben ebenfalls, den Secretionen gleichen einen Eiweißstoff, wie der Urin den Harnstoff, (Uricum,) die Milch den Käse; aber sie sind durch vorherrschende Milchsäure oder Phosphorsäure in ihren Eigenschaften von jenen alkalischen sehr verschieden. Der Harnstoff ist leicht löslich im Alkohol, er gibt mit Salpetersäure eine crystallinische Verbindung, er verändert sich in der Wärme, ohne Fäulniß, schon im Ammonium. Der Käse zeichnet sich durch leichte Auflösllichkeit in Säuren auf, übereinstimmend mit seinem Zwecke, als erste Thiernahrung sich durch den sauren Magensaft leicht verdauen zu lassen. Merkwürdig ist die saure Beschaffenheit mehrerer vegetabilischen Excretionen, die, wie der Urin der Rinder und Rindchen, mehrentheils Benzoesäure, auch Essigsäure zeigen.

13) S. den Artikel Blut im 1. Band S. 817.

(Ficinus.)

**Ekel**, **Ekel**<sup>1)</sup>, (Nausea<sup>2)</sup>, Fastidium<sup>3)</sup>) kann im allgemeinen als der Gegensatz des Appetits bezeichnet werden, dessen höhere Steigerung der Hunger ist, welcher nämlich besonders dadurch hervortritt, daß, so wie jenes Gefühl mit Verlangen, dieses mit Widerwillen gleitet ist.

Er hat seine nächste und eigentliche Beziehung auf Gegenstände, die in den Mund aufgenommen, und durch Niederschlucken in den Magen gelangen sollen. Eben-so wie aber auch Appetit eine weitere Bedeutung hat und auch auf andere Objecte des körperlichen Verlangens angewendet wird; so drückt man auch den Widerwillen gegen körperliche Berührung oder auch schon körperliche Nähe von Gegenständen, deren nähere Gemeinschaft man verschmählt, als Ekel an. So was auch nur in der Phantasie durch Ideenassociation die Vorstellung von dergleichen Dingen aufregt, nimmt selbst den Charakter des Ekelhaften an. So spricht man nicht allein von ekelhaften Speisen, Getränken oder Arzneien, sondern auch von ekelhaften Gerüchen und ekelhaftem Anblick; der Gedanke einer Berührung der Hautoberfläche von unreinen Stoffen, unreinen Kleidern oder gar Excretionen oder Krankheitsstoffen anderer Körper, erregt bei reinlichen Personen schon Ekel, so wie dem sittlichen Menschen das bloße Anhören unzüchtiger Worte und Redensarten ekelhaft fällt.

Der Ekel ist, zumal in seiner nächsten Beziehung auf in den Magen gelangende Stoffe, ein wohlthätiger Naturinstinct, wodurch ohne Einmischung der Reflexion der sinnliche Trieb eben so gewaltsam das zur Nahrung ungeeignete verschmählt, als der Appetit das zur Nahrung Geschickte fordert. Daher stellt sich, wenn Hunger und Durst befriedigt sind, und selbst auch angemessene Naturstoffe in über-

1) Sommering's Eingeweidel. S. 151.

2) Cicero, ep. ad fam.

1. 16. ap. 10.

3) Cicero, de invent. l. 1. c. 17.



hem Maß dem Magen ferner aufgenöthigt werden, zuerst Gleichzeit gegen den Genuß, bald aber auch Ekel ein, dieß um so mehr, wenn die genossenen Stoffe nicht qualitativ verschieden sind, diese an sich, wie z. E. thierisches Fett, starke Verdauungskräfte erfordern. Da die Verdauungskraft, (auch über die Sphäre des Magens hinaus,) immer um so zeitiger erschöpft wird, je weniger Vielfältigkeit in den Nahrungsmitteln Statt hat; so ist man sich bekanntlich eine Speise um so leichter zum Ekel, je häufiger und reichlicher man sie nach einander genießt, und dieser Ekel nun ein Gebot der Natur, diese Speise so lange zu vermeiden, bis dadurch gestörte Gleichgewicht des Verdauungsvermögens und am dargebotenen Stoffe wiederhergestellt ist.

Erregter Ekel führt zum Erbrechen, und der Ekel ist schon als Tendenz dazu zu erachten, wie sich dieß auch durch den Zusammenfluß von Speichel im Mund und den Trieb, diesen auszuspucken, erweist. (Vgl. Erbrechen.) So wie die Unangemessenheit der Nahrungsmittel eine absolute und eine relative ist, so erregen auch die genossenen Stoffe Ekel, an die der Magen, wenn er sie mehrmals dargeboten bekommt, sich nicht nur gewöhnt, sondern die später sogar Gegenstand des Verlangens werden. Wenn auf Entdeckungsreisen wilden Völkern, zu denen Europäische Seefahrer gehen, das erste Mal Branntwein dargeboten wurde, spuckten sie nicht selten mit Widerwillen aus, wogegen er ihnen in der Folge einmalich unter allen Producten des raffinirten Luxus der civilisirten Welt für das Höchste und Köstlichste galt.<sup>1</sup>

Sonders erregen ungewöhnliche Naturstoffe im Anfang Ekel, und noch eine widrige Ideenassociation daran hängt, wie z. E. Personen, die das erste Mal Auster essen. Ueberhaupt hat aber die Phantasie auf kein Gefühl eine stärkere Einwirkung, als auf den Geschmack. Man weiß, daß man Menschen mit nur einiger geistigen Bewegung den besten Appetit beim Genuß der schmackhaftesten Speisen verleihen kann, wenn man ihre Phantasie auf Dinge leitet, die man schmackhaft bezeichnet, wenn sie auch selbst in keinem nächsten Verhältniß zu den Gegenständen des momentanen Genusses stehen.

Die Aufregung von Ekel bei Gegenständen, die auch nicht in dem Magen aufgenommen werden, hängt mit dem moralischen Sinn des Menschen zusammen, und ist eines von denjenigen Gefühlen, die die höhere Natur im Menschen an die höhere geistige binden. So wie die Forderung der Reinlichkeit und Gewöhnung an sie auch den moralischen Charakter im Aeußern andeutet, und wo er mangelt, wenigstens auf die Disharmonie im sittlichen Leben hindeutet; so ist auch ein in der Unmäßigkeit und durch Gewöhnung an Reinlichkeit genährter Widerstand gegen alles Unsaubere, das wenn es durch Genuß in den Körper aufgenommen werden sollte, nach physischen Gesetzen Ekel erzeugen müßte, ein gleich wichtiger Charakterzug eines vollendet ausgebildeten sittlichen Menschen. Daß bei der Unvollkommenheit der intellektuellen Entwicklung des Menschen im geselligen Leben häufig Fälle vorkommen müssen, wo selbst ein Sittengesetz erheischt, jenes Gefühl des Ekel zu unterdrücken und sich durch dasselbe für Handlungen der Willkür zu entschuldigen, bestimmt zu lassen, beweist gegen den Grundsatz

so wenig, als die Eksthaftigkeit einer genommenen Medizin an etwas gegen ihre relative Heilsamkeit beweist, indem hier wie der Vortheil für das wahre Heil des menschlichen Lebens von der einen Seite den Nachtheil auf der andern nur überwiegt, nicht hebt.

**Ekstase**, s. Ekstase.

**Elasticität**<sup>1</sup>, (*Elasticitas*<sup>2</sup>), Federkraft<sup>3</sup>, Spr  
kraft<sup>4</sup>, Spannkraft, Contractilität<sup>5</sup>, (*Elater*<sup>6</sup>, *Conti*  
*tilitas*<sup>7</sup>.) ist die Eigenschaft, wodurch die Körper ihre Form, w  
durch irgend eine Ursache verändert wurde, nachdem diese Ursach  
wirken aufhört, wieder annehmen. Es ist kein Körper, dem  
diese Eigenschaft ganz absprechen darf; mehrere, die gewöhnlich  
vorzüglich als elastisch bezeichnet werden, sind es nur in hohem Gr  
auch zeigt derselbe Körper diese Eigenschaft unter Umständen, (Fe  
tigkeit, Trockenheit, Wärme, Kälte, Dichtigkeit, Ausdehnung,)   
verschieden. Sprödes Glas und die sehr spröde Spinnenwebn  
der Spinnen werden durch Zertheilung in feine Fäden außerord  
lich elastisch. Deshalb hat s' Gravesand's Vorstellung etwas  
sich; diese nämlich sieht jeden elastischen Körper aus lauter F  
(als den Atomen der Elasticität,) bestehend an. Sie läßt sich  
ner ebenfalls auf alle elastische, starre Gegenstände der organis  
Welt übertragen, auf Fleichen, Muskeln, Häute u. s. w., selbst  
Knochen, die in dünnen Lagen offenbar elastisch sind. Damit  
wandt ist die Vorstellung, als sei die Ursache dieser Erscheinung  
einem bestimmten Gefüge der Theile enthalten, die eine Versch  
barkeit ohne völlige Cohäsionsänderung und eine Rückkehr in den  
rigen Zustand gestattet. Nach andern bringt der Wärmestoff, als  
absolut elastische Ursache, (*Fluidum deferens*.) durch seinen  
tritt die Elasticität hervor oder steigert sie. Doch ist dieß nur  
Dämpfe und Lustarten anzuwenden, keineswegs durchgängig  
starre oder liquide Dinge, so lange sie in diesen beiden Formen  
harren. Eis ist sehr wenig elastisch; dem Wasser hat man oft  
Elasticität ganz abgesprochen, sobald es sich aber durch Beitreit  
mehrerer Wärme zu einem 1687,5 Mal größern Raume dunstförmig  
dehnt, nimmt seine Elasticität mit den Wärmegraden zu, die im St  
ist, die größten Lasten, (wie bei Dampfmaschinen,) zu überwältigen.

Alle und jede Verrichtungen des organischen Körpers sind nur durch  
sticität gegeben. Noch aufmerksamer wird aber der Physiolog auf  
merkwürdige Eigenschaft sehn, wenn er den Zusammenhang des  
pers mit dem elastischen Luftmeere bedenkt, das nothwendige Leb  
bedingung und pabulum vitae ist, dem Körper keinen Augen  
entzogen werden darf und auf ihn in vielen Beziehungen, d  
Druck, Assimilation u. s. w., nie zu wirken aufhört. (Fleinus

1) Winkler's Anfangsgr. d. Phys. § 85. 2) erst in den neuern  
fischen Schulen aus dem Griechischen Worte *ελαστος*, *agitator*, abh  
Bort. Winkleri inst. phyl. univ. P. III. §. 1124. 3) Eucke  
Anfangsgr. d. Phys. und Chemie, 1. B. §. 39. 4) Fleinus Ausf  
d. mediz. Phys. §. 29. 5) Vgl. d. Wort. 6) Vateri phy  
s. 2. c. 5. 7) Fleinus Anfangsgr. u. s. w. c. a. D.

**Elater**, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen  
tes<sup>1</sup>, s. Elasticität.

1) *ελαστος*, *agitator*.



elastischer Processus mallei, s. Spinöser Proceß des Malleus.  
 elatus musculus oculi, s. Aufsteigender Augenmuskel.  
 Ellenbogen u. s. w., s. Ellenbogen u. s. w.  
 electrica atmosphaera, s. Electriche Atmosphäre. — corpora,  
 electriche Körper. — materia, s. unter Electriche Princip. —  
 Verhältniß.

Electricität, (Electricitas<sup>1</sup>.) Electricismus<sup>2</sup>. Statt aller  
 sogleich zur Erscheinung. Körper, welche sich in einem electric-  
 Zustande befinden, ziehen ihres Gleichen, wenn diese nicht electricirt  
 oder noch besser leichte Dinge, Federn, Haare, Papier, an,  
 stoßen solche bald darauf wieder ab<sup>3</sup>. Sie strömen etwas aus,  
 keinen Phosphorgeruch, im Finstern ein Licht<sup>4</sup> verbreitet, was  
 in der Nähe des Gesichts gebracht, dort die Empfindung angeworfe-  
 Spinnweben hervorbringt; sie geben jene Lichterscheinung noch  
 leichter durch überspringende Funken zu erkennen, sobald ein Hand-  
 werk, ein Stück Metall u. s. w. ihnen bis zu einer gewissen Entfer-  
 nung gebracht wird<sup>5</sup>. Unter Umständen versetzen sie diese ge-  
 regten Körper sogar in denselben eignen Zustand. Electriche Kör-  
 per üben also Anziehung und Abstoßung, sie strömen Feuer,  
 Licht und Wärme, aus.

Die solchen Erscheinungen zum Grunde liegende Ursache hat den  
 Namen Electricität, besser zur Unterscheidung von dem Zustande selbst,  
 denselben Namen führt, electriche Kraft, auch wohl elec-  
 trische Materie, durch EE bezeichnet, erhalten.

Electricität wird erregt: 1) durch Reiben, 2) durch Schmelzen  
 Ausgießen in Formen, 3) durch Erwärmen und Erkalten, 4)  
 chemische Synthesis, 5) durch Berührung zweier heterogenen  
 Körper. Die erregte Electricität ist überall dieselbe; doch hat die  
 in den ersten Fällen erzeugte schlechthin den Namen Electricität be-  
 halten, diese in den letztern, obgleich sie nur in der Art der Erre-  
 gung abweicht, wird als Galvanismus oder Voltaismus an  
 andern Orten betrachtet werden.

Das Reiben ist das sicherste und gewisseste Mittel, Electricität zu  
 erregen; doch zeigen auch geschmolzener Schwefel, Siegellack, Cho-  
 colate, Wachs u. s. w. beim Erkalten und Ausgießen in schicklichen  
 Formen selbige. Edler Schörl und Borazit<sup>6</sup> werden durchs Erwär-  
 men electric, daß sie Asche anziehen und abstoßen.

In der Erregung durch Reiben unterscheidet man das Reibe-  
 von dem geriebenen Körper, beide müssen verschiedener  
 seyn. Es wird sich nachher ergeben, daß jeder in einen beson-  
 dern electricen Zustand geräth. Die verschiedene Natur des Reie-

aus d. Griechischen Worte ηλεκτρον, Bernstein, an den frühesten electriche Erschei-  
 nungen unterschieden wurden. Vgl. d. Literatur am Schluß des Artikels. 2) Owen's  
 Abr. über d. Entst. d. Vögel, 2. St. 2. H. 3) Diese Anziehung war schon Thales  
 am Bernstein bekannt, und wird auch von Plinius (histor. nat. l. 57. c. 3.)  
 beschrieben. 4) zuerst bemerkt durch Otto v. Guericke. 5) Diese

Entfernung richtet sich nach der Stärke des electricen Zustandes, sie heißt:  
 Schlagweite, der Funken aber: einfacher Funken. Dr. Wall be-  
 merkte ihn zuerst. 6) nach Haug in Gren's Journal der Phys. 7. B.

5. auch Waller's Geschichte des Zinnsteins in den Schwedischen Abhandl. 28.  
 und 30. B. und Linne's in der Vorrede zur Flora von Ceylon.

denen gibt verschiedene Resultate. Einige, (Glas, Schwefel, H. Wachs, alle feste, geschmolzene Verbindungen von Sauerstoff und Chlorine mit andern Körpern, trockne organische Stoffe,) zeigen Electricität nur auf dem geriebenen Puncte, behalten sie aber läng Zeit an und um ihre Oberfläche, wie eine electricische Atmosphäre, verbreitet, als andere. Man nennt sie Isolatoren Nichtleiter; besser unvollkommene Leiter. Diese an, aber, wohin alle Metalle nebst der Kohle gehören, und welche un electricischen Leitern begriffen werden, verbreiten die erregte Electricität sogleich über ihre ganze Fläche und durch ihre ganze Atmosphäre strömen sie aber auch, zumal aus Ecken oder Spitzen, schnell wieder aus. Wird ein electricischer, überall wohl abgerundeter Leiter, auf einem Nichtleiter steht, in die Schlagweite des Geriebenen oder in Berührung mit ihm gebracht; so wird er die gleichnamige Electricität durch Mittheilung (Communicatio,) zeigen. Man unterscheidet diese mitgetheilte von jener ursprünglichen, obgleich beide einerlei Erscheinungen zeigen. Die Mittheilung findet nicht Statt wenn der Leiter mit einem andern Leiter oder mit dem Boden verbunden ist <sup>7</sup>.

Da sonach ein electricischer Körper einen andern in seinen eig Zustand durch Berührung versetzt; so macht ein electricischer Leiter einen berührten Nichtleiter nur an dem Puncte der Berührung electricisch, und da mit der Größe der electricisirten Oberfläche auch Energie, Intensität, der Electricität zusammenhängt; so verlieren ersterer wenig oder nichts an letztern verlieren und daher seine besser behalten, als wenn er einen Leiter berührt. Daher der Nutzen und Gebrauch der Isolatoren.

Früher glaubte man, nur Nichtleiter würden durch Reiben electricisch, (also Corpora idioelectricica,) Leiter aber, (daher C. alectrica, s. symperielectrica,) nicht <sup>8</sup>. Aus obigem geht die bei Statt findende Täuschung hervor. Außer den Metallen gehört den Leitern das Wasser; es sei rein oder enthalte Salze und Sauerstoff u. s. w. aufgelöst, obgleich seine Leitungsfähigkeit mit der Annahme fremder Stoffe wächst. Caven dish setzt das Leitungsmögen des Seewassers zu 100,000, des Eisens 400 Millionen, stillirtes Wasser zu 1 genommen. Nach Alex. Volta sind die (trocknen Leiter,) Metalle und Kohle Leiter vom ersten Range; solche als die es erst durch ihren Wassergehalt werden, (feuchte und flüssige Leiter, als da sind nasse organische Körper, Nerven, Pflanzentriebe, Froschschenkel, geschmolzenes Harz und glühendes Glas,) nennt er den zweiten Range. Zwischen beiden stehen die sogenannten Halbleiter: Marmor, Aether, Weingeist u. s. w.

Zwei durch dasselbe Reibzeug geriebene Isolatoren, zwei Stangen Esgellack A und B, die gleich starke Electricität gegen andere Körper zeigen haben gegenseitig keine Anziehung auf einander; aber sie stoßen sich ab. Doch zieht geriebenes A ungeriebenes B an, ebenfalls ein drittes, nicht geriebenes Nichtleiter anderer Art C, etwa Glas. Wenn zwei geriebene Glasröhren C und D ziehen einander so wenig

7) Stephan Gray bemerkte sie 1728 zuerst. 8) nach Desaguliers Jahr 1739.



AA und B, sondern stoßen sich auch ab, während geriebenes C geriebene A gar wohl anzieht. Nach der jedesmaligen Anziehung verschwindet alle EE; dasselbe geschieht durch Berührung mit einem Leiter, d. i. durch Entladung. Es können also im Harze (Glas) zwei verschiedene EE erregt werden; sie befinden sich in polarischen Gegensätze, der nach Vereinigung strebt, können deshalb neutralisiren und ziehen sich darum an. Dufay bezeichnete sie 1733 zuerst, nannte sie Glas- und Harz-Electricitäten; Franklin bezeichnete jene mit positiver oder plus E, diese mit negativer oder minus E, wofür Lichtenberg die bequemen + — Zeichen einführte.

Das Reibzeug bekommt die dem Geriebenen entgegengesetzte E; beide, oder zwei von ihnen durch Mittheilung electrisirte Körper an einander an. Abänderung des Reibzeugs ändert die EE. Rotes Glas gerieben mit mattgeschliffenem, mit Harz, Siegellack, Schwefel, Wolle, Holz, Papier, Federn, Wachs, Seide, Haaren, Metallen wird + electrisch; mattes Glas aber wird durch polirtes Glas, Harz, Siegellack, Wolle, Holz, Papier, Federn, Wachs, Haaren — electrisch. Metalle geben mit Schwefel — E; mit Harz und Seide nehmen sie + E an. Schwarze Seide zeigt EE, wenn sie mit weißer gerieben wird<sup>9</sup>. Um Reibzeug recht theilhaft auf den Geriebenen wirken zu lassen, beschleunigt man Reiben durch Kurbeln oder Räder, (Electrirmaschinen,) gibt dem Geriebenen, (am besten Glas,) eine schickliche Scheib- oder Kugel- oder Cylinderform, dem Reibzeuge eine passende concave oder andere Gestalt<sup>10</sup>, befestigt es auf Glasfüßen und an Federn, es immer gleich stark an jenen andrücken, und läßt eine Kette von Eisen zur Erde herabhängen<sup>11</sup>. Man setzt in die Schlagweite des Geriebenen einen überall abgerundeten guten Leiter auf einem gegen Isolirgestelle, (erster oder Hauptleiter, Conductor,) welcher gegen die Spitze<sup>12</sup> gegen den Geriebenen kehrt und indem er durch Mittheilung gleichnamig electrisch wird, dient, die EE in stärkerer Energie (Spannung, Intensität,) zu zeigen<sup>13</sup>.

9) Ein weißer Unterstrumpf, bei kaltem, trockenem Wetter mit einem schwarzen Überziegen und elstige Strümpfen getragen, wird + electrisch, dieser aber —. Man bemerkt dies, sobald beide zusammen vom Fuße und so aus einander gezogen werden, daß man den äußern unten, den innern oben anfaßt. Sie ziehen einander an und blasen sich auf. Symmer in Phil. trans. Vol. 51. P. 1. n. 36. 10) Huguon in Miscellan. societatis Tauriens, a 1765, p. 51. 11) noch Dr. Wrooth in Phil. trans. Vol. 63. n. 35 und Gren's Journal der Physik, 2. B. S. 67 u. 6. B. 12) Hawke's bee (physico-mechanical experiments, London 1709.) baute die erste Kugelmaschine, sein Reibzeug war noch die Hand; Gordon in Erfurt wählte sulter einen Cylinder; Winkler ist der Erfinder des Reibzeugs an der Maschine. Pictet's Maschine hat eine Holz- Scheibe mit Bernstein überzogen; Lichtenberg wählte Wollzeug, Ingen- haupt gestrichenes Taffet, Göttling Messing, van Marum Gummlack; die Maschine von Cuthbertson für das Leyn'sche Museum in Harlem hat zwei Glascheiben. 6. Beschreibung einer ungemein großen Electrirmaschine und der damit im Leyn'schen Museum zu Harlem angestellten Versuche durch Martin van Marum, 1786, 4. Vgl. Bohnenberger's Beschreibung einiger Electrirmaschinen und electrischer Werkzeuge mit beigefügtem Verfahren, 1. — 6. Fortsetzung, Stuttgart 1783. 12) Werden diese Saugspitzen im Dunkeln, wenn die Maschine in Thätigkeit ist, betrachtet; so bemerkt man ausfahrende Funken gegen den Glaszylinder hlt. 13) zuerst angewendet von Stephen Gray, 1728.

Hier an der Maschine zeigt sich die Polarität beider EE sehr auffallend. Eine Korkkugel am seidenen Faden wird vom Conductor angezogen, gleichnamig electrisch und dann sogleich abgestoßen; diesem Zustande aber wird sie vom Reibezeuge angezogen u. s. Eine Kugel, die mit dem Reibezeuge in leitender Verbindung steht, zieht eine andere an, welche mit dem Conductor leitend verbunden. Zwei Kugeln, die mittelst feinen Drathes am Conductor hängen und nach beide in demselben electrischen Zustand gekommen sind, stoßen sich gegenseitig ab, eben so Goldblattstreifen.

Diese Eigenschaft benutzt man, um Werkzeuge darzustellen, welche die Stärke, Gegenwart, auch wohl Art der EE zu zeigen, im Stande sind, (Electroscope, Electrometer.) Sie bestehen nach Volta aus Strohhalmen, die an ihrem obern Ende aufgehangen sind, und durch Auseinanderfahren ihrer untern Enden einen Winkel bilden, dessen Grade die Stärke, (Intensität,) der EE anzeigen. Cauti und Cavallo nehmen zu dem Ende Korkkugeln, Bennet Goldblattstreifen<sup>14</sup>, Saussure Hollundermarkkugeln, bei welchen Kugeln die Intensität der  $\pm E$  sich wie das Quadrat der Entfernung verhält<sup>15</sup>. Ein Leiter A, der seine abgerundete oder platte Fläche, außer der Schlagweite, aber noch innerhalb der Atmosphäre, einem electrisirten ebenfalls platten oder runden Leiter B zukehrt, wird nicht durch Mittheilung gleichnamig electrisch; es tritt vielmehr zwischen beiden ein Verhältniß ein, wodurch, ohne daß A dem B etwas gibt, je doch in electrischen Zustand geräth, d. i. durch Vertheilung, (Distribution,) EE zeigt. A werde in die electrische Atmosphäre des  $\pm$  electrischen B gebracht, sogleich zeigt er EE; er theilt sich dabei in 2 Hälften, wovon die dem B zugekehrte  $- E$ , die abgewendete  $\pm E$ , d. i. die mit B gleichnamige, zu erkennen gibt. B aber bleibt fortwährend in gleichem Grade electrisch und A zeigt so lange EE, als er in der Atmosphäre von B verweilt. Berührt man die Hälfte mit dem Finger und entfernt B; so behält A nur  $- E$ , sich nun über seine ganze Fläche verbreitet. Zugespitzte Leiter zeigen unter diesen Umständen Mittheilung, keine Vertheilung.

In jedem luftförmigen Medium verschiedener Dichte geht Electricitätserregung vor; doch scheint sich die Quantität derselben nach Dichtigkeit zu richten<sup>16</sup>. Boyle und Nollet<sup>17</sup> sahen dieselbe Guericke'schen leeren Räume. In der Toricellischen Leere soll nichts dergleichen Statt finden; zwar leuchten Barometer, aber nicht weil sie vollkommen ausgeköcht sind. Mittheilung ist jedoch in verdünnter Luft wegen des geringern Widerstandes leichter und der Funke eine größere Schlagweite und röthere Farbe, (künstliches Nordlicht,) weil das optische Mittel sich ändert. Aus derselben Ursache erschließt der Funke in trockner Sauerstoffluft und Kohlensäure bläulich, roth.

14) Gren's Journ. d. Physik, 1. B. S. 580. De Luc's neue Ideen Meteorologie. Van Morum in seiner Beschreibung der Zenterschen Electromachine. Gehler's physikalisches Wörterbuch der Art. Electrometer. Hermann's Theorie der Electricität, Wien 1799.

15) nach Coulomb. 16) Davy's Elemente der chemischen Theile der Naturwissenschaft, überf. v. Wolf, 1. Th. S. 17) Nollet Leçons de physique expérimentale.



in Wasserstoffluft, grünlich im Alkoholdunste, Aetherdunste, Kohlenwasserstoffluft u. s. w.<sup>18</sup>

Man erklärt sich diese Erscheinungen folgendermaßen. Beide Körper, sobald sie ihren polarischen Gegensatz durch Neutralisation ins Gleichgewicht gebracht haben, ein nicht mehr in die Luft fallendes ätherisches Fluidum F oder die electricische Materie annehmen. Jeder Naturkörper besitzt eine eigenthümliche Menge dieses, jeder hält es mit einer gewissen Verwandtschaftskraft gebunden.

Mehrere Mittel, z. B. Reiben, dienen aber, dieses F der Körper seine beiden Theile in  $+$  und  $-$  E zu zerlegen, so daß sich die Theile einzeln und ungebunden mit ihren sinnlichen Eigenschaften frei bewegen können. Während des Reibens tritt die Polarität wieder ein, es häuft sich eine E um das Reibzeug, die andere um den gegnerischen Körper, (als Atmosphäre,) an. Diese Zerlegung dauert so lange, als sich noch F in beiden reibenden Körpern befindet; soll sie aufhören, so muß einer von beiden eine Zuleitung haben, welche die Kette am Reibzeuge gebildet wird. Die EE bleiben so lange atmosphärisch, bis ihre gegenseitige Anziehung die Anziehung zur Erde des Geriebenen (Tenacität,) aufhebt und sie davon trennt, in welchem dann beide EE sich wieder zu F vereinigen. Diese Vereinigung geschieht unter Funken oder Feuererscheinung, wobei man bemerkt, daß ein solcher Funke nie von einem Körper zum andern übergeht, sondern zu gleicher Zeit kegelförmig aus beiden ausfährt und in der Mitte der Schlagweite mit dem andern verbindet. Jeder Körper A der eine beider freien EE hat, sucht jedem ihm genäherten Körper B die entgegengesetzte E zu entziehen, um die Polarität seiner E zu neutralisiren und zum F zurückzuführen; dieß geschieht nur durch Zerlegung des F in B, wodurch dieser die dem A entgegengesetzte E an A abgibt und also die mit A gleichnamige frei übrig bleibt.

Diesen Vorgang nennt man Mittheilung, obgleich er eigentlich Entziehung ist. Da jeder Leiter leicht Mittheilung zeigt, ein Nichtleiter schwer, so folgt, daß der Leiter sein F sehr leicht, und über seinen ganzen Umfang, der Nichtleiter oder Halbleiter aber nur an einem kleinen Theile, zerlegen und sich eine beider EE anheften lasse<sup>19</sup>. Auch setzt die Mittheilung allezeit voraus, es sei die gegenseitige Anziehung der  $+$  und  $-$  E stärker, als die einer E zu der Fläche, die sie atmosphärisch umgibt.

Bei abgerundeten Flächen, wenn sie wieder auf Flächen wirken, ist die Verwandtschaft der freien E zur Fläche stärker, als die der Mittheilung und Neutralität eintreten können; es entsteht Vertheilung, nicht Polarität beider EE; es ist die der freien E in dem electricischen Körper gegen die entgegengesetzte in dem F der genäherten Fläche thätig; es zeigt sich Trennung des F durch Entgegengesetzung der EE in den Hälften, aber ohne förmliche Entziehung der entgegengesetzten durch die freie des electricischen Körpers. Die Nähe der  $+$  in der electricischen Fläche trennt das F im genäherten runden Körper; dieses polarisirt sich, aber nur so lange, als jene  $+$  E nahe ist. Entfernt sie sich, so erfolgt wieder Vereinigung der polarisirten

<sup>18</sup>) Grotthuis in Schweigger's Journal für Chemie und Physik, 12. B.  
<sup>19</sup>) Viele Halbleiter scheinen sich sehr leicht in zwei deutliche Pole zu trennen und in der Mitte Indifferent zu behalten. Mehr davon beim Galvanismus.

+ E zum F. Während dieser Einwirkung beschäftigt sich ein jener freien + E mit der — E des polarisirten F und verschwindet so lange, als die Vertheilung dauert; dadurch aber wird jener + electricisch, noch mehr + E aufzunehmen, d. i. seine Capacität wächst, während seine Intensität abnimmt.

Diese dualistische Theorie ist von Dufay gegründet von Simon<sup>20</sup> vervollkommenet worden; sie erklärt sehr genügend die doppelte Hervorbrechung des Funkens und seine Vereinigung in der Mitte Schlagweite, die Abstoßung zweier negativ electricischen Körper und Anziehung, welche electricische gegen nicht electricische ausüben. In diesen drei Puncten hat sie den Vorzug vor der Theorie der Unitarier an deren Spitze Benj. Franklin<sup>21</sup> steht, obgleich sie in allen übrigen ihr gleich kommt.

Der Unitarier setzt, so wie der Dualist, die Erde und ihre Atmosphäre als allgemeinen Electricitätsbehälter; jeder Körper auf ihr enthält eine gewisse Menge natürlicher Electricität, (= dem F der Dualisten,) welche von seiner Capacität bestimmt wird und in diesem Zustande des Gleichgewichts nicht erkennbar ist. Durch Reiben oder Erwärmung wird das Gleichgewicht gestört; einer der Reibenden verliert seine + E, der andere häuft sie an, jener wird —, dieser + electricisch. In dem sich der electricische Zustand so zu erkennen gibt, zeigt er das Grundgesetz seiner Wirkung: die Abstoßung, nach welcher + überall die natürliche oder angehäuften + E der Körper abstoßt. Um zwei — electricische sich abstoßen zu lassen, muß der Unitarier eine nie zu erweisende Anziehung der Umgebungen gegen die — electricischen Körper zu Hülfe nehmen u. s. w.

Vertheilung findet aller Orten Statt, wo electricische Spannungen Abstände wirken. Jeder Anziehung eines nicht electricischen Körpers durch einen electricischen geht sie voraus; der Anziehende polarisirt sich; dem Anziehenden zugekehrte entgegengesetzte E vermittelt die Anziehung, die hier Statt findet, weil der angezogene immer, als der kleinste, von der größern Spannung des electricischen überwältigt wird.

Die Vertheilung zeigt sich auf merkwürdige Weise thätig beim Electrophor, im Condensator und der Kleistischen Flasche. Willke<sup>22</sup> gab die Veranlassung zum Electrophor, den Volta<sup>23</sup> vervollkommen hat. Derselbe besteht aus einem Kuchenförmigen, spiegelglatten Nichtleiter Glas oder Harz, der in einer metallenen, überall wohl abgerundeten Schüssel oder Form liegt. Ueberdies bedarf man dazu einer leitenden runden Scheibe, (Deckel,) von kleinerem Durchmesser, als der des Kuchens, welche einen isolirenden Handgriff hat. Erregt man durch geschickliches Reiben auf der Fläche der Fläche des Kuchens — Electricität, so polarisirt sich dieser und seine untere Fläche nimmt die entgegengesetzte + E an. Die Vertheilung geht weiter, die obere Fläche der Form wird — electricisch, die untere + E. Setzt man den Deckel auf den Kuchen, so polarisirt sich auch dieser; nimmt man durch Berührung seiner vom Kuchen abgewendeten Fläche die der Kuchensfläche

20) Philos. trans. Vol. 4. p. 51. 21) Benj. Franklin's sämtliche Werke Deutsch durch G. L. Wenzel, Dresden 1780, 8. Cavallo's vollständige Abhandlung der theoretischen und practischen Lehre von der Electricität, aus dem Englischen, Leipzig 1797, 2 B. S. 140 u. f. 22) S. Schwedische Handlungen XXIII. 23) Scelta di opuscoli interessanti IX.



ahnamige — E hinweg, so behält derselbe  $+E$  in seiner ganzen Vorbereitung und kann solche durch Mittheilung an andere Leiter abgeben. Auf solche Art kann durch Vertheilung der Deckel unaufhörlich electrificirt werden, ohne dem Kuchen etwas zu entziehen, weshalb er nicht mit Unrecht den Namen eines bestandigen Electricitätskuchens führt<sup>24</sup>. Hierher gehört ebenfalls der vom Prof. und Director Weber zu Dillingen 1807 gefundene Doppelelectrophor.

Der Condensator, Micro-Electroscop oder Conservator der Electricität, ebenfalls eine Erfindung Volta's<sup>25</sup>, dient, kleine Mengen von EE, die für sich nicht darstellbar sind, anzuzeigen. Jeder Deckel eines Electrophors kann dazu dienen. Man wählt dazu am besten eine wohl abgerundete, glatte Metallscheibe mit einem isolirenden Handgriff, und stellt sie, (ohne durch Reiben, noch Erwärmen Electricität zu erregen<sup>26</sup>), auf eine etwas größere, runde Platte eines Halbleiters, Marmor, besser noch trocknes Erlenholz mit Schellacklack abgesehrieben. Man berührt denjenigen Körper, in welchem Electricität vermuthet wird, z. E. zwei auf einander gelegte Scheiben Gold- und Silberpapier, mit der äußern Fläche der Platte des Condensators, während selbige auf ihrer Unterlage steht, (der man zugleich eine Ableitung geben muß,) hebt sodann die Platte ab und nähert sie dem Electrometer. Durch solches Verfahren zeigt sich die Electricität verstärkt, weil die Platte, die durch Mittheilung electrificirt wird, sogleich Polaritätsvertheilungen hervorruft, welche die Entfernung der mitgetheilten E verhindern und die Capacität und wahrnehmlich auch die E durch Polarisation des F im Condensator vermehren. Andere Vermehrungsmittel sind die Duplicatoren nach Nicholson, Cavallo, Read, Weber<sup>27</sup>.

Dieselbe Vertheilung findet Statt in der electrischen Flasche, die man auch Kleist'sche<sup>28</sup> oder Leydner, oder Versenkungsflasche, oder sobald sie eine Tafelform hat, Frank'sche Tafel nennt. Man wählt dazu einen schlechten Leiter (Stimmer oder Glas,) rundet ihn gehörig ab und belegt seine ebenen Flächen mit leitenden Substanzen, (Stanniol,) so, daß ein unangestrichener Glasrand dazwischen übrig bleibt. Bekommt die eine Belegung (Tegumentum,) durch Mittheilung  $+E$ , so wird das Glas durch F polarisirend vertheilt und, wenn die andere Belegung eine Ableitung erhält, diese die der obern entgegengesetzte  $-E$  zeigen. Diese EE lassen sich in solchen Verrichtungen sehr stark, im Verhältniß der belegten Oberflächen, anhäufen; sie verbinden sich aber leicht unter Erscheinung eines heftig erschütternden Funkens, (des stärksten Funkens, electrischen Schlages,) wenn zwischen den bei-

24) Mitteltst dieses Kuchens lassen sich die Unterschiede beider EE sehr gut zeigen. Man setzt zu dem Ende eine Metallglocke an ihn und electrificirt solche durch Mittheilung, hebt sie ab und bestreut sodann den Kuchen mit Harzpulver.  $+E$  zeigt strahlenförmige,  $-E$  wolkenförmige (Lichtenberg'sche) Figuren. 25)

26) Philos. Transact. LXXII. 1. 237. Ferner Lichtenberg in Erleben's Anfangsgr. der Naturlehre. Mayer in seinen Anfangsgründen d. Naturlehre. 26) D. Dreyhoff's Trüglichkeit der Versuche mit dem Condensator. Vol.

Gilbert's Annalen d. Physik XIX. 335. 27) Journal of natural philosophy I. 395. Philos. Trans. 1782. II. 403. Annal. de Chymie XXIV. 327. Gilbert's Annalen der Physik, XI. 344. 28) Donchir v. Kleist in Camin entdeckte sie am 21. October 1745, bald darauf Cunnus und Muschenbroek zu Leyden.

den Belegungen eine Verbindung durch einen guten Leiter gegeben wird<sup>29</sup>. Diese Entladungen geschehen mit nicht zu messender Geschwindigkeit. Werden mehrere solcher Flaschen mit einander zu einer Batterie, (Suggestus,) vereinigt; so wächst die Verstärkung mit der Zunahme der belegten Oberfläche. Die hervorbrechenden Funken entzünden brennliche Dinge, durchbrechen und zersplittern Glas und Papierlagen, schmelzen Metalle, oxydiren und desoxydiren sie unter Umständen, sie heben durch ihre Erschütterung mit einem Male alle Unregelmäßigkeit im thierischen Körper auf, und bewirken so den Tod oder doch Lähmung, welche letztere indeß durch nachfolgende schwächere und längere Einwirkung derselben, oder der galvanischen E wieder aufgehoben werden kann<sup>30</sup>. Eine lang fortgesetzte Einwirkung schwächerer oder abwechselnd stärkerer Electricität bringt übrigens manchelei Erscheinungen im thierischen Körper und seinen Säften hervor. Blut wird durch — E langsam coagulirt, durch + E zersezt, da es nicht weiter gerinnen kann<sup>31</sup>. Säugthiere sterben früher in atmosphärischer, stark electrificirter Luft, als in gewöhnlicher; doch ertragen Vögel solche leichter. Was man sonst gefunden haben will, verlangt noch weitere Prüfung. Dahin gehören das schnellere Ausbrüten der Vögeleier<sup>32</sup>, der beschleunigte Blutumlauf<sup>33</sup> und die vermehrte Absonderungen<sup>34</sup>; electrificirter Menschen das durch Electricität beförderte Wachsthum der Pflanzen<sup>35</sup>, wo man unter andern beobachtet haben will, daß an Orten, wo Gewitterableiter in die Erde gehen, Pflanzen höher aufschließen.

Ganz anders ist es mit unorganischen Körpern, in welche die Electricität unbezweifelt chemisch eingreift. Das Beispiel vom Blute kann schon hierher gezogen werden, außerdem ist bekannt, wie Berthollet durch Electricität Ammoniumluft in Wasserstoff und Stickstoff zerlegte, wie Deymann und Troostwyk durch den sogenannten Amsterdamer Versuch Wasser in seine beiden Bestandtheile zerlegt und wieder zusammensetzten<sup>36</sup>, wie Cavendish Salpetersäure zu bilden sah<sup>37</sup>. Durch Anwendung des Condensators hat man sich überzeugt, daß bei allen chemischen Zersezungen und Zusammensetzungen Electricität erregt und polarisirt werde. Es sei erlaubt, diesen Chemismus als eine eigne Bewegung der sich verbindenden Körpertheile in ihrem absoluten Raume vorzustellen, d. i. als Formänderung; und auf diese Bewegung, die mit Reibung verbunden ist, die Erklärung der polarisirten Electricitäten zu gründen<sup>38</sup>. Dadurch wird man wenigstens eine für jetzt genügende Ansicht von der Erzeugung der EE haben, wenn dieselben mittelst des Condensators

29) Werden mehrere verschiedenartige Leiter angewendet, z. B. die Hand und Metallrath, so wählt die + E den bessern. Am besten dient der gemeine Alkaloder oder der Gelenkische. Mayer's Anfangsgr. d. Naturlehre, Th. 5. S. 37 u. 38. 30) Schweigger's Journal f. Chemie und Physik, 16. B. 5. S. 31) Schübler dissert. experimente quaedam influxum electricitatis sanguinem et respirationem peccantia. Tab. 1803. 32) nach Alphonse in seinen chemisch. phys. Schriften, S. 241. 33) nach van Marum a. a. o. S. 2. 34) nach Boscovich, Home, Brande. 35) S. Gardi de influxu electricitatis atmosphaericae in vegetantia 1784. Ingenhousz Versuche mit Pflanzen, Wien 1788 — 1790. 36) Rozier Journal Physique, Nov. 1789. 37) ebendasselbst. 38) Savoy's Elemente der chemischen Theiles der Naturwissenschaft, übers. v. Wolf, 1. Th. Berlin.



vescenzen, Verbrennungen, Dampf und Dunstbildungen während des Regens, des Schnees zu bemerken sind<sup>39</sup>, indem die electricität als Resultat der allgemeinen Körperkräfte erscheint. Aber eben deswegen ist das Trennen und die Vereinigung der EE der Atmosphäre für immer bewiesen. Wasser wird stets in ihr zu Dampf und Dunst verwandelt, in andern Orten derselben wieder zu Ecken, Schnee, Hagel, Regen verdichtet. Als trockener Dunst ist ein Nichtleiter und bildet die Schicht zwischen der leitenden Erde und den leitenden Wolken, die sonach polarisch sich entgegenstehen. Nach erfolgter wirklicher Anziehung, oder mittelst hergestellter Leiter durch Wasserströme, sich neutralisiren und im Blitze entladen, durch die dabei herbeigeführte Erschütterung der Luft den Donner erzeugen, dessen Gleichniß im Kleinen das Geräusch der Entladung eines einer Batterie ist<sup>40</sup>.

Welche ist aber die Natur der Electricität, ist sie eine ponderable oder imponderable Substanz, eine Materie oder eine Kraft? Diese Fragen bleiben, trotz der vielen Antworten darauf<sup>41</sup>, unbeantwortet. Wir verlassen diese Speculation und wenden uns zur fruchtbaren Verbindung der electricischen Erscheinungen mit denen der andern Imponderabilien. Nämlich da, wo beide EE in Gestalt von Funken sich vereinigen, entzünden sie, gleich dem Feuer, brennbare Dinge, und zeigen selbst beim Ausschluß der Sauerstoffluft Leiter zum lebhaftesten Verhalten, sie stellen sich also als Feuer, (d. i. Licht und Wärme,) dar. Electricische Polarität kann in vielen Körpern durch Wärmemittheilung erzeugt werden, (es wird die aufgenommene Wärme in dem Körper in EE umgewandelt;), eben so erscheint bei jeder Erzeugung der Wärme Kälte<sup>42</sup> mittelst Formänderung auch polarisirte EE. Was darf uns hindern, diese durch gleiche Ursachen hervorgerufenen Erscheinungen zu trennen? Die unbefangene Antwort muß für die Vereinigung stimmen, und gingen auch darüber durch das Alter von Jahrhunderten verkehrte Ansichten zu Grunde. Weiter sind wir aus denselben Ursachen berechtigt, auch das Licht für eine electricische Erscheinung zu erklären, da Licht häufig, sobald selbiges von schwarzen Körpern, (Kohle,) abgelenkt wird, sich in Wärme verändert, da Substanzen, die nach gewöhnlichem Erhitzen phosphoresciren, (Licht aussenden,) und diese Eigenschaft durch starkes Glühen verloren hatten, solche durch Electriciren nachher wieder bekommen. Sie binden dabei die Electricität vollkommen und verändern sie nachher in Licht. Diese augenscheinlichen

339) Cavallo's vollständige Abhandlung der theoret. und practischen Lehre von der Electricität, Leipz. 1797. 40) Hierher der electricische Drache, wodurch Franklin und de Ramez zuerst bewiesen, daß das Gewitter electricischer Natur sei; ferner die Möglichkeit, jene Electricität mittelst hoch in die Atmosphäre gerichteter Felterstippen, (Gewitterableiter,) einzufangen und unschädlich zu machen zu lassen. S. Reimarus's Vorschriften zur Anlegung einer Blitzableitung an allerlei Gebäuden, Hamburg 1778, 8. Vgl. Gilbert's Annalen 36. B. S. 113. 41) Vgl. de Luc's Meteorologie, Kraehenstein's Lichtensberg's Magazin f. d. Neueste u. s. w. 1. B. 4. St., Wilke in d. Schwedischen Abhandlungen 39. B., Forster in von Crell's neuesten Entdeckungen in der Chemie, 12. B., Karsten in der Anleitung zur gemeinnützigen Kenntniß der Natur, Kollat a. a. O., Van Marum in Gren's neuem Journ. 3. B., Brugnatelli in Gilbert's Annalen, 8. B. S. 234. 42) Ueberdies ist die Erzeugung eine Quelle von beiden.

Beweise der Identität lassen sich noch ins Unendliche vermehren, so wie daraus hinlängliche und für die Physiologie wichtige, auf Atmosphäre und Meteorologie sich beziehende Herleitungen Statt finden z. E. die hellen Mondnächte, in denen das Licht als EE die Auflöslichkeit der Dünste befördert u. s. w., welche zum Theil bereits in de Luc's neuen Ideen zur Meteorologie und andern Werken der Naturgeschichte angeedeutet sind. (Ficinüs.)

### Hierher gehörige Schriften:

Christ. Frid. Reimann diss. de succino, electricorum principe, Rost. 1714, 4.

Jallabert expériences sur l'électricité, avec quelques conjectures sur la nature de ses effets, à Genève 1740, 8. (Jallabert's experimenta electrica, aus dem Franz. Basel 1748, 8.)

T. T. Desaguliers dissertation concerning electricity, Lond. 1742, 8.

Chr. Aug. Hausenii novi profectus in historia electricitatis, c. Lips. 1743, 4.

G. Matth. Bose tentamina electrica in acad. Regiis Londinensi et Parisina primum habita, nunc repetita et novis aliquot accessionib. locupl. Witteb. 1744, 4.

Andr. Gordon phaenomena electricitatis exposita, Erf. 1744, 8.

Joh. Gabr. Doppelmayr neu entdeckte Phänomene der electrischen Kraft Nürnberg 1744, 4.

Joh. Heinr. Winkler's Gedanken von den Eigenschaften, Wirkungen und Ursachen der Electricität, Leip. 1744, 8.

Dessen Eigenschaften der electrischen Materie und des electrischen Feuers, Pelpz. 1745,

J. S. Wais's Abhandlung von der Electricität und ihren Ursachen, Berl. 1744, 4. (Goldrüdich, Amst. 1746, 8.)

J. Rud. Ant. Piderit dissert. II de electricitate, Marb. 1745, 4.

E. de Cisternes du Fay Versuche und Abhandlungen von der Electricität, Erf. 1745, 4.

Dell' elettricismo, o sia delle forze elettriche de corpi, Venez. 1746, 8.

Nollet essai sur l'électricité des corps, à Paris 1746, (2. éd. 1771, 1. Deutsch: Nollet's Vers. einer Abhandlung über die Electricität, aus dem Franz. Erf. 1749, 8.)

Dessen Recherches sur les causes particulières des phénomènes électriques à Paris 1749, 12.

Dessen Lettres sur l'électricité, Vol. I — III, à Paris 1754 — 1764, 12.

Chr. Gottl. Kratzenstein theoria electricitatis more geometrico explicata, c. f. Hal. 1746, 4.

Georg. Andr. Müller von den Ursachen und dem Nutzen der Electricität, Weid. 1746, 4.

Joh. G. Wagner's Erforschung der Ursachen von den electrischen Wirkungen Pögn. 1747, 8.

Bianconini lettre sur l'électricité, Amst. 1748, 8.

\* B. Franklin experiments and observations on electricity, made at Philadelphia in America, Part. I — III, Lond. 1751 — 1754, 4. (2. ed. 1769, 4., 3. ed. 1782, 8. Hieraus Deutsch: Benj. Franklin's Briefe v. der Electricität, aus dem Engl. überf. nebst Anmerk. v. E. Wille, Pelpz. 1758. S. auch dessen sämtliche Werke Deutsch durch G. Z. Benzel, 1. — 3. Th. Dresd. 1780, 8.)

Histoire générale et particulière de l'électricité, P. I — III, à Par. 1752,

Ger. Vanssen's Erklärung derer electrischen und magnetischen Kräfte, Frankf. Pelpz. 1752, 8.

J. Alb. Euleri disquisitio de causa physica electricitatis, ab acad. scientiar. Petropolitana praemio coronata, una cum aliis duabus dissert. de electricitate Petrop. 1755, 4.

F. U. T. Aepini tentamen theoriae electricitatis et magnetismi, c. f. E. trop 1759, 4. (Exposition raisonnée de la théorie de l'électricité et du magnétisme, d'après les principes de N. Aepinus par l'Abbé Haüy, à Paris 1787, 4. Deutsch: Darstellung der Theorie der Electricität und des Magnet. v. Haüy, aus dem Franz. mit Anmerk. v. E. Murchard, Altenb. 1801, (1788) 1.)



- Madlin und Wilson's Betrachtungen über eine Reihe electrischer Versuche, aus Engl. Pelpj. 1768, 8.
- Ilg. Bauer dissert. de electricitatis theoria et usu, Vienn. et Lips. 1767, Deutsch: Bauer's Theorie und Nutzen der Electricität, nebst Mather's Kirchvogel's Abh. von der Luftelectricität im menschl. Körper. Ebur und Pn. 1770, 8.)
- John Priestley the history and present state of electricity, with original experiments w. pl., Lond. 1767, 4. (1769, 4 Franz. Vol. I — III, à 1771, 12. Deutsch: Jos. Priestley's Geschichte und gegenw. Zustand d. Electricität, nebst eigenthümlichen Versuchen, übers. von J. G. Kühnig, m. R. und Straß. 1772, 4.)
- Condorcet de la Fond traité de l'électricité, à Paris 1770, 12.
- Ben précis historique et expérimental des phénomènes électriques, depuis l'origine de cette découverte jusqu'à ce jour, à Par. 1781, (1785,) 8.
- Lib. Cavallo a complete treatise of electricity in theory and practice, 1777, 8. (2. ed. 1781. Deutsch: L. Cavallo's vollständige Abh. der electricischen Lehre von der Electricität, m. R. aus dem Engl. (von Beer,) Pelpj. 1779, 8. 2. Ausg. 1783, 3. Ausg. 1785, 4. Ausg. in 2 Theil: J. M. W. Baumann 1797, 8.)
- El Socin's Anfangsgr. der Electricität, Hanau 1777, (1779,) 8.
- Antz Kav. Epp's Abhandlung von dem Magnetismus der natürlichen Electricität. 1777, 8.
- Ant. v. Marum's Abhandl. über das Electrisiren, aus dem Holl. v. J. W. Ger. Gotha 1777, 8.
- (Christoph Lichtenberg de nova methodo naturam ac modum electrici investigandi II comment. Goett. 1778 — 79, 8.
- Ed Mahon's principles of electricity, Lond. 1779, 4. (Deutsch: Ford von's Grundsätze der Electricität, aus dem Engl. mit Anmerk. v. J. S. See. m. R., Pelpj. 1789, 8.
- Ant. Demerr. v. Gallien Sendschreib. über einige Gegenstände der Electricität. Münst. und Pelpj. 1780, 8.
- Jungenhous Anfangsgr. der Electricität, aus dem Engl. mit Anmerk. von M. Hiltor, Wien 1781, 8.
- W. Aug. Donndorf's Sendschreiben über einige Gegenstände der Electricität, Hamb. 1781, 8.
- Ben Lehre von der Electricität, theoretisch und practisch aus einander gesetzt, Halle, Erf 1784, 8.
- Errat recherches physiques sur l'électricité, à Paris 1782, 8. (Deutsch: Ben Untersuchungen über die Electricität von Marat, aus dem Franz. von E. Hlgei, m. R., Pelpj. 1784, 8.)
- Ala Cope de essai sur le l'électricité naturelle et artificielle, à Paris 1783, 8.
- Christoph Kühn's Geschichte der niedl. und physikalischen Electricität und der Versuche, die in dieser Wissenschaft gemacht worden sind, (aus den neuesten Jahren zusammengetragen und mit eignen Versuchen vermehrt,) 1. und 2. Th. 1783, 8.
- Ben neueste Entdeckungen in der physikal. und niedl. Electricität, aus den wichtigsten Schriften zusammengetragen, als eine Folge der Geschichte der physikal. und Electricität, Pelpj. 1783, 8.
- Al. van Swinden recueil sur l'analogie de l'électricité et du magnétisme. Vol. I — III, à la Haye 1784, 8.
- W. Fiedr. Hartmann's Encyclopädie der electricischen Wissenschaften, Brem. 1784, 4.
- Pressan essai sur le fluide électrique, considéré comme agent universel. Paris 1786, 8.
- Edtherson's Abhandl. von der Electricität, nebst einer geraden Beschreibung der dahin gehörigen Werkzeuge und Versuche, aus dem Holländ. Pelpj. 1786, Fortsetzung 1796, 8.
- Ben vollständige Abhandlung der theoret. und pract. Lehre von der Electricität mit einigen Versuchen aus dem Engl. mit Anmerk. und Zus. (v. J. M. W. Baumann) 2 Bände, m. R. Pelpj. 1797, 8.

J. Pangenbucher's pract. Electricitätslehre, ganz neu bearb. Augsb. 1788, Materialien für Electricer, 1. u. 2. Bf. Halle 1788 und 1790, 8.  
 Jos. Weber's Lehre von der Electricität, Landsh. 1791, 8.  
 J. v. Bohnenberger's Beiträge zur theoretischen und practischen Electricitätslehre, 1. — 4. Stück, Stuttgart 1793 — 1794, 8.  
 Carl Alex. Faulwetter's kurze Geschichte der Electricitätslehre, 1. — 3. m. K. Nürnberg 1793, 8.

Jos. Gardini diss. de electrici ignis natura, ed. et praef. est J. Mayer Dresd. 1793, 8. (Deutsch: J. Gardini's Abhandl. von der Natur des electricen Feuers, aus dem Lat. v. J. G. Geisler, Dresd. 1793, 8.)

T. Cadogan Morgan lectures of electricity, T. I and II, Norwich 1798. (Deutsch: T. C. Morgan's Vorlesungen über die Electricität, aus dem Engl. mit Anmerk. Leipz. 1798, 8.)

J. G. J. Schrader's Versuch einer neuen Theorie der Electricität, welche Grundsätzen des neuen Systems der Chemie beruht, Altona 1797, 8.

C. Wilm v. Arnim's Versuch einer Theorie der electricischen Erscheinungen, J. 1799, 8.

W. A. Jones six letters on electricity, Rvintons 1800, 8.

\* J. Sartorpe's Darstellung der gesammten aus Erfahrungen und Versuche gegründeten Electricitätslehre, nebst einer vergleichenden Zusammenstellung der bekanntesten Theorien derselben, aus dem Dän. v. W. Sängel, m. K. 2 Th. Kopenhagen 1803 u. 1804, 8.

J. W. Ritter das electriche System der Körper, Leipz. 1805, 8.

**Electricitäts-erregung**, s. unter Electricisches Verhältniß.

**Electricitas**, s. Electricität. — *animalis*, s. Animalische Electricität. — *contractiva*, i. q. E. negativa. — *expansiva*, i. q. E. positiva. — *galvanica*, s. Galvanismus. — *negativa*, s. Negative Electricität. — *positiva*, s. Positive Electricität.

**Electricum fluidum**, s. unter Electricisches Princip. — **principium**, s. Electricisches Princip.

**Electricisch-chemisches System oder Verhältniß**, s. Electrochemismus.

**Electricische Atmosphäre**<sup>1</sup>, (*Electrica atmosphaera*), der Umkreis eines electricen Körpers, innerhalb dessen die electricen Einwirkungen desselben unterschieden werden. S. Electricität.

1) Kleinus, Anfangsgr. d. mediz. Phys. §. 298.

**Electricische Intensität**, s. unter Electricisches Verhältniß.

**Electriche Körper**<sup>2</sup>, (*Electrica corpora*<sup>2</sup>), Körper überhaupt, an denen Phänomene der Electricität bemerkbar sind. S. Electricität. Vgl. auch Bidoelectrische Körper.

1) Richn's Gesch. d. med. u. phys. Electr. 1. Bf. 1. Cap. 2) Wurdach's Encycl. d. Heilkunst. 1. B. §. 294.

**Electriche Materie**, s. unter Electricisches Princip. — **Natur**, s. unter Electricisches Princip. — **Polarität**, s. unter Electrochemismus.

**Electriche Spannung**<sup>1</sup>, die Stärke des Gegensatzes zwischen positiver und negativer Electricität. Vgl. Electricität.

1) Wurdach's Encycl. d. Heilkunst. 1. B. §. 298.

**Electriche Thätigkeit**, s. unter Electricisches Princip.

**Electricher Gegensatz**, s. unter Electrochemismus. — **Stand**, s. unter Electricisches Princip.

**Electriche Fluidum**, s. unter Electricisches Princip.

**Electriche Princip**, (*Electricum principium*), die electricen Erscheinungen untergelegte Grundursache, die nach hypoth.



als Voranfegung auch als Electrische Materie<sup>1</sup>, Electri-  
 3 Fluidum<sup>2</sup>, (Materia electrica<sup>3</sup>, Fluidum electricum,)  
 als Gegenstand der Wahrnehmung als Electrische Thä-  
 4 tigkeit<sup>4</sup>, Electrischer Zustand<sup>5</sup>, Electrische Natur<sup>6</sup>  
 bezeichnet wird. S. Electricität.

Winkler's Anfangsgr. d. Phys. 6. Th. 2) Kühn's neueste Entdeck. in  
 1. Electric. 1. Th. S. 15. 3) Winkleri phil. contempl. P. III. S.  
 7716. 4) Burdach's Encycl. d. Heilkwiss. 1. B. S. 294. 5) Dd.  
 6) Berzelius's Lehrb. d. Chemie, 1. Th. S. 79. 6) Sclerus Anfangsgr.  
 1. mediz. Chemie, S. 584.

Electrisches Verhältniß<sup>1</sup>, (Electrica ratio,) die Beziehung  
 der Körper von entgegengesetzten Electricitäten auf einander, oder  
 Grad der Electricitätserregung<sup>2</sup>, mit Beachtung der  
 3 Grenzf. auch als Electrische Intensität<sup>3</sup> bezeichnet. Vgl.  
 Electricität.

— 8) Burdach's Encycl. d. Heilkwissensch. 1. B. S. 294 u. 298.

Electrismus, s. Electricität.

Electrochemismus, (Electrochemismus,) Electrisch-  
 1 chemisches System oder Verhältniß<sup>1</sup>, Chemisch-electri-  
 2 theorie<sup>2</sup>, diejenige Naturansicht, nach welcher das electrische  
 3 Verhältniß des Körpers, welches sie als electropositive und electro-  
 4 negative Körper, also in ihrem electrischen Gegensatz oder in  
 5 electrischen Polarität<sup>3</sup> gegen einander haben, auch als  
 6 Grundprincip ihrer chemischen Verwandtschaften und Thätigkeiten auf-  
 7 gef. wird. Vgl. Electricität, auch Chemie.

Sclerus Anfangsgr. d. mediz. Chemie, S. 583. 2) Dessen Anfangsgr. d.  
 3 mediz. Phys. S. 350. 3) Burdach's Encycl. d. Heilkwiss. 1. B. S. 285.

Electrogen, s. Bitterstoff.

Electrologie<sup>1</sup>, (Electrologia,) die Lehre von der Elec-  
 2 tricität.

Burdach's Literatur der Heilkwissensch. 1. B. S. 281.

Electrometer<sup>1</sup>, (Electrometrum,) Electroscope<sup>2</sup>, ein  
 3 physikalischer Apparat, um den Grad zu bestimmen, in welchem ein  
 4 Körper positiv oder negativ electrisch ist. Vgl. Electricität.

Eravallio's Abh. v. d. Electr. 2. Aufl. S. 113. 2) Sclerus Anfangsgr.  
 3 mediz. Phys. S. 304.

Electronegative und Electropositive Körper, s. unter Elec-  
 1 trismus.

Electroscope, s. Electrometer.

Elementartheile des Körpers, (Elementares par-  
 1 ticipioris humani,) s. Elemente des menschlichen Kör-

1 mente<sup>1</sup>, (Elementa<sup>2</sup>.) Grundstoffe<sup>3</sup>, Urstof-  
 2 fe, Urfänge<sup>4</sup>, Einfache Stoffe<sup>5</sup>, Unzerlegte Stof-  
 3 fe (Principia primitiva<sup>6</sup>, Stoecheia<sup>7</sup>.) Alles wissenschaftliche  
 4 Wissen ist darauf gerichtet, Einheit in die Mannigfaltigkeit unserer  
 5 Sinneswahrnehmungen zu bringen. Daher mußte man auch schon  
 6 in frühesten Versuchen einer Naturforschung, nach nothwendigen

Grunds Handb. d. Chemie, 1. Th. 2. Aufl. S. 23. 2) Cicero. quæst.  
 3 grad. 1. 1. c. 7. 3) — 5) Gr-n's Handb. d. Chemie a. a. O. 6) — 8)  
 9) Berzelius's Lehrb. d. allgemeinen Chemie, 1. B. S. 17. 9) Vgl.  
 10) das Wort.

Gesetzen des Denkens dahin trachten, das in der Natur als mannigfaltig Unterscheidbare in seine einzelnen Theile zu zerlegen, die da in so fern sie in sich nichts neues Unterscheidbares der Wahrnehmung darbieten, als einfache Naturkörper erschienen. So leicht dieses Trennen des Verschiedenartigen auch häufig in Gemengen fester Körper, z. E. in untermischten Samenkörnern verschiedener Pflanzenarten, so schwierig ist es in Gemischen flüssiger Substanzen, und es geht erst die der spätern Zeit vorbehaltene Ausbildung der Chemie als Wissenschaft dazu, um nur auch erst das einfache Verfahren bei Proceßur zu finden, obgleich die rohe Kenntniß einzelner Scheidungsarten von Körpern in flüssigem Zustande, z. E. die Gewinnung des Eisens aus den Eisenerzen, sich in die graueste Vorzeit verliert. Noch mehr Schwierigkeit hat die Scheidung des Verschiedenartigen in den organischen Naturkörpern, und sehr bald mußte man bei Untersuchung von Thier- und Pflanzentheilen darauf Verzicht leisten das Einfache in dem Zusammengesetzten durch Versuche darzulegen. Man suchte daher das, was die Erfahrung nicht gewährte, durch Speculation zu ersetzen, und so bildete sich schon in den ältesten philosophischen Schulen Griechenlands die Lehre von den Urausfängen oder Urprincipien der Dinge aus, denen man späterhin den all gemein verbreiteten Namen Elemente gab.

Die Lehre von den Elementen setzt die Annahme, daß alles körperliche Daseyn in sich selbst seinen nothwendigen Grund habe, als kein Beweises bedürftig voraus; sie ist mit andern Worten nichts, als eine weitere Ausführung der Atomistik. Ist einmal zugegeben, daß überhaupt Körper nach innern nothwendigen Bestimmungen existiren; kommt es, um Einsicht in die Natur derselben zu erhalten, zunächst darauf an, die Eigenschaften auszumitteln, die diesen an sich und außer Verbindung mit andern eigen sind. Elemente würden hiernach für die in unendlicher Mannigfaltigkeit sich darstellenden Naturkörper das seyn, was Buchstaben für Worte, oder Linien und Winkel für mathematische Figuren sind. Mit dem wirklichen wissenschaftlichen Werth der Atomistik ist daher auch der Werth der Elementenlehre in der engsten Verbindung. Da jene an sich aber mehr eine historische als naturphilosophische Wichtigkeit hat; so wird auch hier zunächst nur das Historische dieser Lehre berührt werden. Vgl. den Artikel Atomistik.

Was die ältesten Lehrsätze der Griechischen Weltweisen vor Empedocles über die Urausfänge der körperlichen Dinge enthalten, mit eigentlich mehr für eine Vorbereitung der Elementenlehre, als für eine wirkliche Aufstellung derselben betrachtet werden. Man kann aber die Naturansichten, welche die Verständigsten der alten Hellenischen Welt früherer und späterer Zeit über die körperlichen Principien hatten, überhaupt auf folgende sieben zurückbringen.

1) Es gibt nur Einen uranfänglichen körperlichen Stoff und dieser ist das Wasser. Dieß war der oberste Grundsatz der Naturlehre von Thales von Milet<sup>10)</sup>. Die Lehre selbst ist aber, so wie alle übrigen der ältesten Griechischen Weltweisen, noch entferntern un-

10) 639 Jahr vor Christi Geb. G. Brucker hist. cr. phil. Per. 1. P. 1. 2. c. 1. §. 6.



scheinlich Indischen Ursprungs, und mag überhaupt in der alten die verbreitetste gewesen seyn. In diesem Sinne nennt auch Milet<sup>11</sup> den Ocean den Vater der Götter und der Menschen.

Der Urstoff aller Dinge ist nur ein einziger, dieser aber ist die Luft. Dieß war die Lehre des Anaximenes, ebenfalls von Milet. Eben so wie Thales alle körperlichen Dinge nicht nur aus Wasser hervorgehen, sondern auch wieder zu Wasser werden ließ, wiewohl, nach dieser Lehre, gegenseitig wieder in die Luft, als ihren Urstoff, aufgenommen. Diese Naturansicht wurde etwas später von Empedocles von Athen dahin ausgedehnt, daß die Luft zwar das eine Element sei, durch ihre Verdünnung aber das Feuer, wie durch die Verdichtung das Wasser erzeuge.

Der einzige Urstoff aller Dinge ist das Feuer. Dieses war die Grundlehre von Heraclid von Ephoe<sup>12</sup>, aus einem etwas späteren Zeitalter, aber mit der, besonders in Persien sehr früh ausgebreiteten Feuerlehre in Uebereinstimmung.

Auch die Erde gelangte in den Schulen der Griechischen Welt zu dem Rang, als einziger Urstoff aller Dinge zu gelten. Zwar dieses ein, wiewohl schon modificirtes Theorem des Stiftern der eleatischen Schule, Xenophanes von Kolophon<sup>13</sup>, der schon von mehreren Elementen sprach, worunter aber doch die Erde das Primat erhielt.

Mit allen diesen Naturansichten war folgender Lehrsatz des Parmenides von Milet<sup>14</sup> im Gegensatz: es gibt nur Ein Unveränderliches, aber dieses ist keines von allen in die Sinne fallenden Dingen, sondern in sich ein Unendliches, ein Unveränderliches, in seinen Theilen sich Ungleiches. Seine Ansicht, so sehr sie der neuesten Naturphilosophie sich anfügt, ließ aber zu vielen Zweifeln und Ungewissheiten über das wahre Seyn der Dinge, als daß man zu jener Zeit, wo man noch nicht alle Versuche durchgemacht hatte, auf einem der sinnlichen Natur näher gelegten Wege zu heben und zu klären, sie hätte befriedigen können.

Bei den angeblichen Bemühungen, die Mannigfaltigkeit der Körperwelt aus Einem Princip verständlich zu machen, wählte man auf den entgegengesetzten Weg, nämlich die Mannigfaltigkeit selbst als ursprünglich darzustellen. Auf diesem Wege bildete besonders Anaxagoras von Klazomene sein System. Er nahm an, daß die erste Materie aus einer unendlichen Menge von äußerst kleinen Grundkörperchen, und diese aus einer unendlichen Menge von verschiedenenartigen Qualitäten besteht, welche aber durch ein bestimmendes Princip, oder die Gottheit, so verband, daß Gleiches nur zu Gleichem fügte, wie wir dieß in der Natur finden<sup>15</sup>.

Die noch übrige letzte, aber zugleich den Verstand, in so fern er bei dem ihm am nächsten Gelegten beruhigt, am mehr beleuchtenden Naturansicht der ältesten Weltweisen war nun endlich die von mehreren bestimmten, aber doch nur wenigen endlichen Elementen.

11) Milet 14. Buch. 12) Bruckeri hist. etc. l. c. §. 11. 13) Bruckeri hist. etc. l. c. c. 19. §. 5. 14) Bruckeri hist. etc. l. c. c. 11. §. 6. 15) Bruckeri hist. etc. l. c. c. 1. §. 9. 16) S. hierüber besonders Sprengel's Vers. ein. Gesch. d. Arzneik. 2. B. §. 78. Vgl. auch Art. Atomistik, 2. B. S. 516.

den körperlichen Urprincipien. Pythagoras von Samos hatte zuerst die Bedeutenheit der Zahlen in Erklärung des Seyns der Dinge dargethan. Nach ihm mußte die erste Materie, aus der alles gebildet ist, als unbestimmt gedacht werden; ihr Daseyn aber nach Pythagoraischer Lehre ihr nur durch die Hinzukunft der Zahlen als bestimmender Principien, verliehen. Von den Zahlen enthält die Zehnzahl, oder der Denarius, alle numerischen und harmonischen Verhältnisse<sup>18</sup>. Hiernach stellten nun die Pythagoräer zehn Principien woraus alle Dinge entstanden, als Enantiosen auf, die wieder von der Dyas beherrscht, jede an sich wieder in zwei Gegensätze zerfallen. Diese zehn Enantiosen aber waren folgende: 1) Endlich, Unendlich; 2) Gerade, Ungerade; 3) Einheit, Vielheit; 4) Rechts, Links; 5) Männliches, Weibliches; 6) Ruhendes, Bewegtes; 7) Rechtlinig, Krumm; 8) Licht, Finsterniß; 9) Gut, Böse; 10) Quadratisch, ungleichseitiges Viereck<sup>19</sup>.

Statt dieser zehn an sich vag und willkürlich erscheinenden Gegensätze stellte nun Empedokles von Akragas<sup>20</sup>, welcher eigentlich erst als Begründer der Elementenlehre angesehen werden muß, nur zwei, nämlich Warm und Kalt, Trocken und Feucht auf, und die am allgemeinsten verbreiteten Naturdinge, auf welche nach ihm diese Gegensätze zunächst Anwendung fanden, oder deren körperliches Wesen er zunächst in jenen Gegensätzen aufgefunden zu haben glaubte, waren also: Feuer und Luft, Erde und Wasser<sup>21</sup>.

Die Autorität von Aristoteles mag am meisten dazu beigetragen haben, daß diese gedachten Naturelemente in der folgenden Zeit bis auf die letzten Jahrhunderte herab, nicht bloß in wissenschaftlichen Lehranstalten, sondern selbst in dem Volksunterricht, als die Basis aller Naturerkenntniß aufgestellt wurden, so daß noch jetzt in Elementarschulen der Ursprung der Körperwelt aus den vier Elementen, oder doch ihre Classification nach derselben Grundlage, einer der ersten Gegenstände ist, womit Kinder in dem Unterricht über die Natur bekannt werden.

Aristoteles nahm die Elementenlehre des Empedokles indessen doch nicht ohne Modificationen an. Schon Plato hatte versucht, sie mit höhern Weltansichten in Verbindung zu bringen. Nach ihm waren der Schöpfer des Weltalls, die Form, nach welcher und die Materie, aus welcher er schuf, die drei Urwesen, die der Schöpfung selbst vorausgingen, die Elemente aber erst ein Product dieser Schöpfung. Es setzte nämlich der höchste Verstand nach ihm die Elemente aus der in gewissen Dreiecken gebildeten Materie zusammen, die Erde aus einem gleichseitigen, und die übrigen Elemente aus ungleichseitigen Dreiecken, die alle in einander verwandelt werden können. Durch eine bestimmte Zahl von Dreiecken, und zwar durch die geringste, wird hiernach das Feuer gebildet, dessen Grundfigur die Pyramide ist; die Grundfigur der Luft dagegen ist das Do-

17) 580 — 500 Jahre vor Christi Geb. 18) Jamblich. introd. in Nicomachi Geras. Arithm.

19) Aristotel. metaph. l. c. c. 5. Vgl. auch Sprengel's Verf. u. f. w. a. a. D. S. 175.

20) etwa 460 Jahre vor Christi Geb.

21) S. besonders Aristotel. metaph. l. i. c. 1. und Sprengel's Verf. u. f. w. a. a. D.



äëdron, die des Wassers das Icosaëdron, die der Erde aus lauter gleichseitigen Dreiecken zusammengesetzte Cubus<sup>22</sup>. Diese Platonische Elementenlehre nahm nun Aristoteles in so fern, daß er die Figur der ersten Elemente außer Berücksichtigung. Ihm eigenthümlich aber war die Befügung eines fünften, aber irdischen Elementes, nämlich des Aethers, wodurch ihm den vier irdischen Elementen erst vollkommene Bewegung gegeben wird. Dieser Aether ist nach Aristoteles ein unveränderlicher Körper, der sich ewig in kreisförmiger Richtung bewegt. In dem Mittelpunct dieses Kreises, als Gegensatz des Kreises selbst, stellt die Erde, deren irdischer Gegensatz dann das Feuer bildet. Zwischen beiden inne stehen Luft und Wasser, ebenfalls wieder als Gegensätze. Von diesen vier Elementen streben zwei, nämlich Feuer und Luft, in ihrer Bewegung nach oben, oder sind leicht, zwei aber, Erde und Wasser, streben nach unten, oder sind schwer. Alle Körper haben nun, im Verfolg dieser Lehre, aus der Vermischung dieser Elemente hervor, und die Elementarqualitäten der ersten materiellen Principien gehen nun auch auf die daraus gebildeten Körper über. Diese Elementarqualitäten aber sind folgende: die des Feuers Wärme und Trockenheit, die des Wassers Kälte und Feuchtigkeith, die der Luft Wärme und Feuchtigkeith, die der Erde Kälte und Trockenheit. In Anwendung auf den menschlichen Körper brachte er besonders die Sinnesorgane mit den Elementen in nächsten Zusammenhang, so daß nach ihm das Wasser der Hauptbestandtheil der Augen, namentlich der Pupille, ausmacht, die Grundlage des Gehörorgans ist, eine Mischung von Luft und Wasser den Geruch constituirt, Erde das Wesen des Gefühls darstellt, Wasser aber entweder allen oder keinen Sinnen beigemischt ist<sup>23</sup>. Nach Galen<sup>24</sup> war Hippokrates der Urheber der Lehre der vier Elemente. Es ist aber nicht nur das Zeitalter des Hippokrates späteres als das des Empedokles, sondern es stehen auch der Authenticität der Hippokratishen Schrift<sup>25</sup>, in deren Anfange der Ursprung der vier Elemente gedacht wird, erhebliche Zweifel entgegen, ob ihr Ursprung gleich bis wenigstens nahe an des Hippokrates Zeitalter hinreicht. Durch die Anwendung aber, die in dieser Schrift von den vier Elementen auf die Natur des thierischen Körpers gemacht wird, der sich besonders Galen durch seine darauf sich gründenden Theorien in den römischen Schulen Eingang verschaffte, wurde die Elementenlehre besonders für die ganze medizinische Wissenschaft eine viele Jahrhunderte anerkannte Hauptstütze. Der menschliche Körper ist nämlich nach dieser vermeintlichen Hippokratishen Lehre aus vier Elementarqualitäten, nämlich gelber Galle, schwarzer Galle, Schleim, gebildet. Der gelben Galle entspricht, nach Galen, das Feuer, der schwarzen die Erde, dem Schleim das Wasser, wogegen im Blut kein Element besonders vorherrscht<sup>26</sup>. (Vgl. Galen'sches System der Physiologie.)

22) Plat. Tim. Vgl. auch Sprengel's Verf. u. f. w. a. a. D. 4. Abschn. 331 u. 32. 23) S. Aristotel. de coelo l. I et II, de gener et corrupt l. 2. Vgl. auch Sprengel's Verf. u. f. w. a. a. D. 5. 66 u. 67. 24) de elementis l. 1. 2 ad fin. auch meth. med. l. 1. 25) de natura hominis. 26) de elem. l. 2, und comment. 1. in Hipp. l. de nat. hum.

Der erste, der in neuerer Zeit die allgemein verbreitete Galenische Lehre von den Elementen mächtig erschütterte, war Theophrastus Paracelsus. Denn ob er gleich in seinen Schriften sich über die mentarische Natur der Dinge sehr unterschiedlich äußert<sup>27</sup>, und auch selbst nie eine klare Ansicht davon aufgefaßt haben mochte; wurden doch in den spätern chemischen und alchemischen Schulen, die er zunächst durch sein Ansehen Einfluß hatte, die von ihm nicht originär aufgefaßten, doch aber vorzüglich in seine chimärischen Ideen verflochtenen chemischen Elemente, Salz, Schwefel und Quecksilber<sup>28</sup>, die Anknüpfungspuncte chemisch-physischer Theorien.

Mit Baco von Verulam hebt in der Geschichte der Naturwissenschaften eine neue Periode an. Es begann zu tagen, doch mit Dämmerungslicht. Die neuere Corpuscularphilosophie bildete aus. (Vgl. den Artikel Atomistik.)

Die phantastischen Urkörper des Descartes wurden auch Form nach als dreifache Elemente bezeichnet. Das erste entsprach Aether der Alten, und besteht nach ihm in einer subtilen Materie, die alle Zwischenräume füllt, worin sich die übrigen Elemente bewegen; das zweite, welches gleichsam abgeriebene kugelförmige Körperchen bildete, ist nach ihm das Element des Lichts; das dritte eckigen Körperchen sich darstellend, constituirt nach ihm die eigentliche Körperwelt, und nach der unterschiedlichen Modification, die die Urkörperchen die Bewegung ertheilt, auch die Luft und das Wasser.

In der Leibnizischen Schule traten die Monadisten an die Stelle der Elemente, und so verwirrten sich die Begriffe von Elementen der Weise, wie die Atomistik sich in Form neuer Hypothesen ausprägte.

Zu gleicher Zeit aber erschien die Chemie als eine selbstständige auf eigenem Boden wurzelnde Wissenschaft. Je mehr man einsah, auf dem Gebiete der Metaphysik es keinen festen Anknüpfungspunct von dem aus das Seyn der Körperwelt aus Urprincipien für menschlichen Verstand, der sich nicht in die Fesseln der Scholastik beengen ließ, verständlich werden könnte; desto mehr bemühte sich, durch die Erfahrung, mittelst Zerlegung der Körper, über eigentlichen Bestandtheile Licht zu gewinnen.

27) bald (Piramid. l. 1, de origine morb. ex a. b. prim. sub. 4. u. a. m. D.) gibt er die vier Galenischen Elemente zu, bald (P. de elem. aer. c. 1) beschränkt er sie nur auf zwei, bald (l. de Az. 11, „stultus ille homo est, qui vel quatuor, vel tria, vel du. menta credit, hoc enim nihili est,“) scheint es, als ob er alle Elemente verwerfe: an einem andern Ort (Archid. l. 10. c. 11,) findet man die Elemente eine Quintessenz bei, die unter der Form eines Phlegmas entsteht, wenn man den Körper aufgelöst hat und ihn einer Destillation unterwirft. derum (chir. magn. de tumorib. l. 3. c. 4,) behauptet er, daß jedes Element wieder in sich mehrere von verschiedenen Gattungen und Arten von. So stellt er auch (phil. ad Aethan. l. 2. ext. 11,) den Satz auf: daß Element ein unsichtbares Wesen sei, das in den Dingen lebt, wie der Geist dem Körper; auch liest man (chir. magn. l. 5. o. 1,) daß die Elemente dem Körper treten, wie sie in ihn gelangt sind, daß die Erde wieder in das Wasser in Wasser, das Chaos in Luft, das Feuer in Sonnenwärme geht und da verharren, bis der Himmel und die Erde aufgelöst seyn: ja auch schon in Krankheiten sollen sie dem Körper entweichen. (S. oben 28) de hydropsi mar. l. u. a. m. D.



Robert Boyle war der erste, der es unternahm<sup>29</sup>, das Problem der Naturelemente durch die Chemie zu lösen. Er verwarf auf Autorität von Aristoteles in den Schulen allgemein angenommenen vier Elemente; gleichwohl war aber das Endresultat Bemühung nur ein negatives. Die einfach erscheinenden, bis zu welchen die Chemiker seiner Zeit in ihren Versuchs- gelangt waren, konnte er noch keinesweges als wirkliche anerkennen und er begnügte sich, freilich doch auch wieder poetisch, eine gleichmäßig verbreitete, untheilbare, undurch- bare Materie als einzigen Grundstoff aller körperlichen Forma- aufzustellen, dessen Verschiedenheiten durch die Größe, die Fi- die Ruhe oder Bewegung, so wie die gegenseitige Stellung der ren Theile bestimmt wären, welche Grundsätze ihm dann wieder auf das Wasser anwendbar erschienen, das er denn auch, in Einstimmung mit der allerältesten Ansicht, als Universalelement Dinge ansprach.

In der Folgezeit schlugen die Chemiker häufig auch den Weg ein, chemischen Principien, zu denen sie auf ihren Versuchen gelangt zu glaubten, noch hypothetische beizufügen. Vorzüglich be- te sich das von Stahl zum Rang eines chemischen Elements me Phlogiston, das von Becher schon früher unter dem en einer inflammablen Erde als eine Elementarsubstanz angedeutet u war, als solches lange Zeit in den chemischen Schulen, bis uerdings, besonders durch Lavoisier und überhaupt durch die dende pneumatische Chemie, wieder in Vergessenheit kam. (Vgl. rtikel Chemie.)

In den Chemikern der neuesten Zeit ist nun der Grundsatz aufge- Elemente der Körper sind solche Bestandtheile derselben, die, ch behandelt, keine ungleichartigen Stoffe weiter zeigen, und u dieser Hinsicht für einfach zu erachten sind. Hiermit soll je- nicht ausgesprochen werden, daß sie auch ihrer Natur nach und bsolut einfach sind, oder daß durch fortgesetzte chemische Bemü- n, nach noch unbekannten Proceuren, sie nicht noch weiter zer- und noch heterogene Bestandtheile in ihnen aufgefunden werden rn. Wenn also die Chemiker ein Verzeichniß von Grundstoffen Körper aufstellten, so kann und soll dieses nicht mehr andeuten, es wie weit wir, nach Maßgabe der uns zur Zeit zu chemischen uchungen zu Gebote stehenden Mittel, in Untersuchung der erwelt, ihren materiellen Bestandtheilen nach, gekommen sind. Che- ist aber mehr als irgend eine Wissenschaft eine solche, die erst a ihrer Bildung begriffen, keinesweges in sich abgeschlossen, ja rem Endresultat ihres Strebens vielleicht noch weit entfernt ist. enenig daher auch der Zweck, Einfachheit in die in Mannigfaltig- ch darstellende Körperwelt zu bringen, durch die bisherigen Be- ngen der Chemiker erreicht sei, ergibt sich aus folgender Ueber- der bis jetzt von den neuern Chemikern anerkannten che- Elemente<sup>30</sup>.

29) S. besonders dessen sceptical chymist, Lond. 1661. 30) Wir wäh- n hierzu die von Montegre im Dict. med. Vol. XI. p. 331 gegebene Dar- stellung. Fast in jedem neuen Handbuch der Chemie finden sich Abweichungen in r Anerkennung und Zusammenstellung von chemischen Grundstoffen.

## A. Imponderable Flüssigkeiten.

Diesen wird nur sehr uneigentlich der Name Stoff beigelegt, da sie sich in der Natur nur als Thätigkeiten manifestiren und Ponderabilität selbst, (freiwaltende Attractionskraft,) wesentlich in Begriff eines Körpers eingeht.

1. Wärmestoff, } Phlogiston nach Stahl.
2. Lichtfluidum, }
3. Electrisches Fluidum.
4. Magnetisches Fluidum.

## B. Einfache nicht metallische Körper.

5. Sauerstoff, oder Oxygen, auch Elt<sup>31</sup>, (als Lebensluft entdeckt von Priestley 1774.)
6. Wasserstoff, oder Hydrogen, auch Briet, (als brennende Luft entdeckt zu Anfang des 17ten Jahrhunderts.)
7. Jode, oder Iodine, (entdeckt in der Mutterlauge des Tangasche bereiteten Sodasalzes, von Courtois, 1813.)
8. Borium, (Basis der Borasäure, entdeckt von Thénard und Gay-Lussac, 1809.)
9. Kohlenstoff, oder Carbone, (Basis der Kohle.)
10. Phosphor, (entdeckt von Brand 1669 und Kunkel 1669.)
11. Schwefel.
12. Stickstoff, oder Azot, (entdeckt von Rutherford 1772 und Lavoisier 1773.)
13. Chlorine, (nach Davy, Antine nach Hildebrandt, auch Hal oder Halogen, (als oxygenirte Salzsäure entdeckt Scheele 1774.)
14. Fluorine, (nach Ampère,) auch Phlore, Basis der Flusssäure, der Chlorine sehr analog, (entdeckt von Scheele 1774.)

C. Metalle (nach der Ordnung von Thénard<sup>32</sup>.)

1. Section: Metallische Grundstoffe, die noch nicht von einem präsumtiven Oxygen haben können geschieden, und daher analog unter die Metalle gestellt werden.

15. Silicium, oder Flintär<sup>33</sup>, Basis der Kieselerde.
16. Zirconium, oder Zirconär, Basis der Zirkonerde.
17. Aluminium, oder Lehmär, Basis der Thonerde.
18. Yttrium, oder Ytterär, Basis der von Godolin entdeckten Yttererde.
- 19) Glucinium, oder Glycinär, Basis der von Wauquière entdeckten Beryll- oder Süßerde.
- 20) Magnesium, oder Talkär, Basis der Talk- oder Seifenerde.

2. Section: Metalloide: Körper, die, obgleich sie das Ansehen von Metallen haben, doch als metallische neuerdings gestellt worden sind.

21. Calcium, oder Kalkär, Metall des Kalks.
22. Strontium, oder Strontär, Metall der Strontionerde.

31) so wie mehrere der folg. noch ungewöhnliche Termino-logen nach Berzelius' nomenclatur. 32) Traité de chimie élém. T. I. Par. 1813. 33) v. Berzelius jedoch rein geschieden. S. Gilbert's neue Annalen der Physik, 6. B. n. 7 B. S. 355. Hiernach gehört dieser Stoff als Kieselmetalloid unter folgende Section.



- Barium; oder Barytär, Metall der Schwererde.  
(Alle drei wurden von Seebeck 1807 entdeckt, Davy stellte sie zuerst außer ihrer Verbindung als Metalle auf.)
- Sodium, oder Natrium, auch Nater, Natriummetalloid, oder Metall des Natrums, (nach Davy's Entdeckung 1807.)
- Potassium, oder Kalium, auch Landär, Kalimetalloid, oder Metall des Kali's, (ebenfalls nach Davy's Entdeckung 1807.)
- Section.
- Manganesium, oder Mangan, (im Braunstein zuerst als Metall vom Winterl dargestellt 1770.)
- Zink.
- Eisen.
- Zinn.
- Section.
- Arsenik, (als Metall zuerst von Brandt anerkannt 1733.)
- Molybdän, oder Wasserblei, (als Säure von Scheele genannt, reducirt von Hielm 1782.)
- Chrom, (von Vauquelin im rothen Sibirischen Bleierz entdeckt 1797.)
- Wolfram, (im Lungstein von Scheele 1781 als Lungsteinsäure entdeckt und von den Gebr. d'Elhuyart, sowohl in diesem Mineral als in dem Erze Wolfram, in metallischer Natur dargestellt.)
- Columb, oder Tantal, (in einem Nordamerikanischen Mineral, Columbit genannt, von Hatchet 1801, auch in Tantalit in Schweden von Ekeberg entdeckt. Beide wurden eine Zeit lang auch als verschiedene Metalle betrachtet.)
- Antimonium oder Spießglanz.
- Uran, (von Klaproth 1799 in der Pechblende entdeckt.)
- Cerium, oder Cerecium, (von Klaproth, Berzelius und Hisinger 1803 im röthlichen Lungstein oder Cerit in Schweden entdeckt.)
- Kobalt, (als Metalle durch Brandt 1733 entdeckt, obgleich seit 1540 schon zur Bereitung des Smalte benutzt.)
- Titan, (von Klaproth als Metall 1794 im Ungarischen rothen Schörl unterschieden.)
- Wismuth, oder Aschblei, (von Agricola im 16ten Jahrhundert erwähnt.)
- Kupfer.
- Tellurium, (von Müller von Reichenstein 1782 entdeckt, aber von Klaproth 1798 genauer beschrieben und benannt.)
- Section.
- Nickel, (von Cronstedt 1751 in dem Kupfernickel entdeckt, später von Richter 1804 zuerst rein dargestellt.)
- Blei.
- Quecksilber.
- Osmium; (in dem Platinerz von Tennant 1804 entdeckt.)
- Section.
- Silber.

48. Palladium, (von Wollaston 1803 im Platinerz entdeckt.)

49. Rhodium, (von ebendenselben 1803 in demselben Erz entdeckt.)

50. Platina, (durch Wood 1741 entdeckt.)

51. Gold.

52. Iridium, (von Descotils und Tennant 1803 in dem rohen Platin entdeckt.)

Befriedigender als dieser weitläufige Catalog, der unter fortgesetzten chemischen Untersuchungen noch vielfachere Bereicherungen erhalten dürfte, würde dem wissenschaftlichen Sinne folgende Zusammen-Entgegenstellung einfacher Naturelemente nach Schelling und Steffens<sup>34</sup> seyn,

1) Wasserstoff — Sauerstoff, als Polarstoffe in Rücksicht auf Electricität, (oder relative Cohäsion,) zwischen denen das Wasser gleichsam im Indifferenzpuncte liegt,

2) Stickstoff — Kohlenstoff in Rücksicht auf Magnetismus (oder absolute Cohäsion,)

wenn nur auf empirischem Wege nachgewiesen werden könnte, daß, nach der Behauptung, zwei oder mehrere dieser unzerlegbaren Stoffe in unendlichen Verschiedenheiten und Graden der Innigkeit alle andern irdischen Stoffe zusammensetzen.

34) Schelling's Ideen zu einer Philos. d. Natur, 1. B. S. 364 und Steffens Beiträge zur innern Naturgesch. d. Erde, S. 91; Vgl. auch Brandt's Lehrb. d. Chemie als Wissensch. und Kunst, S. 65. (H)

**Elemente der Chemiker, (Elementa chemica,) vgl. a. Chemische Elemente,**

**Elemente des menschlichen Körpers<sup>1</sup>, (Elementa corporis humani<sup>2</sup>,) Grundstoffe<sup>3</sup>, oder Einfachste Theile<sup>4</sup> oder Elementartheile<sup>5</sup>, oder Grundtheile<sup>6</sup> des Körpers (Stamina<sup>7</sup>, s. Partes constituentes materiales<sup>8</sup> corporis humani,) diejenigen einfachen Gebilde des Körpers, bei deren Aufhebung die Zergliederung ihr Ende erreicht hat, welche sich, so weit sie das Mikroskop reicht, als Fasern, Lamellen oder formlose Masse darstellen, oder, auch die chemischen oder auch nur ideellen Bestandtheile jener organischen Elemente. Vgl. Elemente.**

1) Haller's Grunde. d. Physiol. umgearb. von v. Leveiling, 1. Th. S. 2.

Halleri elem. phys. T. I. l. 1. initio. 3) 4) Haller's Grundr.

u. s. w. a. a. D. 1. Buch, Inhalt und S. 1. 5) — 7) Fadelot's

v. d. Natur d. ges. Körp. übers. v. Panzerbleter, S. 5. 8) Brandt's

Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 23..

**Elevatio arteriarum, i. q. Diastole.**

**Elevator alae nasi,** s. Comprimirender Nasenmuskel, auch der Elevator der Oberlippe und des Nasenflügels. — **auris,** s. tollirender Ohrmuskel. — **epiglottidis,** i. q. Hyoepiglotticus. — **humeri,** i. q. Deltoideus. — **labii inferioris, s. labii inferioris proprius,** s. Elevator des Kinns.

**Elevator labii superioris proprius,** der zur Oberlippe gehörige Theil des Levators der Oberlippe und des Nasenflügels. S. a. Elevator der Oberlippe.

**Elevator labiorum, s. labiorum communis,** s. Elevator des Mundwinkels. — **oculi,** s. Uttollirender Augenmuskel.



*Elevator palpebrae inferioris* <sup>1</sup>. So wurde früher, aber un-  
g, die untere Hälfte oder der im untern Augenside befindliche  
des Orbicularmuskel, welcher das untere Augenlid aufwärts zie-  
sollte, bezeichnet. Vgl. Orbicularmuskel der Augen-  
rr.

*Wronne's* verteutschte Besch. d. Musc. v. *Spener*, Berl. 1704, S. 11.

*Elevator palpebrae superioris*, s. Levator des obern Augenli-

— *patientiae*, s. *scapulae proprius*, s. Levator des Schul-

ttts. — *testiculi*, i. q. Cremaster. — *urethrae*, s. unter

rmuskeln des Perinäums, den tiefer liegenden Muskel.

*Elevatores*, s. Levatoren. — *labii inferiores*, s. Incisivmus-

der Ober- und Unterlippe.

*Allicoidis* <sup>1</sup> *tunica*, s. Vaginalhäute des Hodens und Samenstranges.

*Αλικοειδής*, schneckenhausartig gewunden. (*Paul Aegin.* de re med. l. 6. c 61.)

*Allenbogen*, s. Ulna. — *arterie*, s. Ulnararterie. — *artes*

der Finger, s. unter Ulnararterien der Finger. — *bein*, s.

— *blutadern*, s. Ulnarvenen. — *bug*, s. Cubitalflexur.

*collateralarterien*, s. unter Collateralarterien des Arms, innere.

— *venen*, s. unter Collateralvenen des Arms. — *Dau-*

*carterie und venen*, s. unter Pollicararterien und venen. —

*ter*, s. *Dlegranon*. — — *muskel*, s. unter Anconäen, innern

*äußern Muskel*. — *knochen*, s. Ulna. — *knorren*, s. *Dle-*

*on*. — *franzfortsatz*, oder *gipfel*, s. Coronoidischer Pro-

der Ulna. — *frone*, s. Coronoidischer Proceß der Ulna. —

*skel*, s. Ulnarextensor und Ulnarflexor der Hand. — *nerv*, s.

*ernerv*. — *pulsader*, s. Ulnararterie. — *röhre*, s. Ulna,

*Radius*. — *rücken- und volararterien und venen der*

*id*, s. unter Ulnararterien und venen der Finger. — *schlag-*

*r*, s. Ulnararterie. — *stachel*, s. Stylförmiger Proceß der Ulna.

*venen*, s. Ulnarvenen. — — *der Finger*, s. unter Ulnarve-

*der Finger*. — *vorsagesmuskel*, s. unter Anconäen, den klei-

*Anconäus*.

*Ellipse*, (*Ellipsis* <sup>1</sup>), nach mathematischer Bestimmung eine

sch selbst zurücklaufende Linie, die von der Kreislinie sich dadurch

scheidet, daß sie nicht wie diese nach allen Richtungen gleich

er Durchmesser hat, sondern daß man in ihr einen größten Durch-

er, (große Axe,) und einen rechtwinklich diese durchkreuzenden

stten, (kleine Axe, *Conjugata*,) unterscheidet, und die, so

jene in dem Segment einer Kugel, sich in dem eines nicht schiez-

Conus darstellt, vorausgesetzt, daß die Section nicht mit der Basis

eben parallel geschieht und daß der Conus noch oberhalb der Ba-

durchschnitten wird. In der Beschreibung der Bildung von Kör-

peilen oder Körperlichen Bewegungen wird, um anzudeuten, daß die

nn mehr länglichrund als Kreisrund sei, wie namentlich in den

enden Fällen, die einer Ellipse als Normal angenommen.

*Wolf's* Ausz. aus d. Anfangsgr. aller mathemat. Wissensch. Frankfurt und

*Leipz.* 1753, S. 455.

*Elliptica cavitas initii proprii canalis ossei semicircularis superioris et initii canalis ossei semicircularis exterioris*,

unter Cavitäten der semicirculären Canäle des Labyrinths.

Ellipticität der Blutbahn, s. Elliptische Blutbahn.

*Ellipticum foramen diaphragmatis*, s. Desophaguspalte Diaphragma's.

*Elliptische Blutbahn*, Ellipticität der Blutbahn. bezeichnet Wend<sup>1</sup> die von dem Blut im thierischen Körper von d. Herzen aus in den Blutgefäßen durchflossenen Räume, in Hins auf einen zwischen der Blutbewegung und den Planetenbahnen d. gestellten Parallelismus. Vgl. den Zusatz zu Blutcirculation.

1) In dessen Schrift: die elliptische Blutbahn, Würzb. 1809.

*Elliptische Vertiefung des besondern Ausganges des ober Bogenganges und des Anfangs des äußern Bogenganges*, s. unter Cavitäten der semicirculären Canäle des Labyrinths.

*Elliptischer Blutleiter*, s. Nidley'scher Gehirnsinus.

*Elliptisches Loch des Herzens*, s. Ovale Loch des Herzes *Ellychnia*<sup>1</sup>, s. Verheyensche Sternchen.

1) ελλυχνιον, ein Docht in einer Lampe.

*Eloquentia*, s. Beredsamkeit.

*Elpes*, in Uebertragung des Griechischen Wortes<sup>1</sup>, i. q. Sp. S. Hoffnung.

1) ελπις Hippocr. aph. l. 4. aph. 74.

*Elt*, s. Drygen. — *luft*, s. Dryngas.

*Eltung*, s. Drydation.

*Elytra*, in Uebertragung des Griechischen Wortes<sup>1</sup>, s. Scheide.

1) ελυτρον, eine Hülle, Decke, in der Bedeutung von Schelden. S. Gale de art. l. 3. t. 33.

*Elytroides tunica*, s. Vaginalhäute des Hodens und Samenstrang.

*Email der Zähne*, s. Schmelz der Zähne.

*Emanation*<sup>1</sup>, (*Emanatio*<sup>2</sup>.) Ausfluß, Ausströmung unterscheidet sich von Exhalation, womit es, besonders in die Französische Sprache übergetragen<sup>3</sup>, wohl auch als gleichbedeutend genommen wird, dadurch, daß ein feineres, entweder wirklich geistiges Princip oder doch ein hypothetisch körperlicher Stoff, wie Lichtstoff oder magnetische Materie, von einem Centralwesen, oder auch von einem Körper peripherisch sich entfernt und an andere übergeht. So gehen nach d. Emanationssystem der Mystiker die menschlichen Seelen ursprünglich vom göttlichen Wesen; nach dem der Physiker<sup>4</sup> geht auf gleiche Weise das Licht von der Sonne aus u. s. w. Vgl. Exhalation.

1) Görres Erbes. d. Physikal. S. 29. 2) nach der Vulgata (Sapient. c. v. 25.) 3) Vgl. Dict. des sc. méd. Vol. XI. art. émanation.

Suckam's Anfangsgr. d. Phys. u. Chemie, 1. Th. S. 638.

*Emasculatus*, s. Castrat.

*Embryo*<sup>1</sup>, (*Embryo*<sup>2</sup>.) Fötus<sup>3</sup>, Frucht<sup>4</sup>, Leibe.

1) Haller's Grundr. d. Physikal. umgearb. von v. Leveiling, 2. Th. S. 92.

2) nach dem Griechischen gleichlautenden Worte εμβρυον, von εν und βρυο pullulo, quasi εν τη γαστρι βρυον, in ventre pullulans. Eigentlich unterscheidet aber Hippokrates nach Galen (de semine l. 1.) a) γονη, genium, das flüßte Rudiment, als coagulierten Samen, b) κνεμα, conceptus, erste Andeutung sich entwickelnder Körpertheile, c) εμβρυον, ausgebildete Gießmasse, d) παιδιον, infans, ersichtliche Ausbildung aller Hauptkörpertheile. Hiernach bestehen auch ältere Schriftsteller das Wort embryo mehr auf die frühere, das Wort foetus aber mehr auf die spätere Periode des sich entwickelnden neuen Wesens im mütterlichen Körper. In neuerer Zeit wird dieser Unterschied nicht mehr beachtet. S. Haller i. el. phys. T. VIII. P. I. l. 29. s. 1. S. 31. Maner's Besch. d. menschl. K. 5. B. S. 292. 4) Fehler von der Frucht in der Gebärmutter, in dessen kl. Schrift, 1. Th. Nr. 11.



nt<sup>5</sup>, Kind<sup>6</sup>, Ungebornes Kind<sup>7</sup>, (Fetus<sup>8</sup>, Foetus<sup>9</sup>,  
as<sup>10</sup>, Nepion<sup>11</sup>, Infans<sup>12</sup>, Puer<sup>13</sup>, Paedion<sup>14</sup>, Infans  
gestatus<sup>15</sup>.) Mit diesem Namen bezeichnet man das durch  
zeugung entstehende Geschöpf bis zu der Periode der Entwicklung,  
welter dasselbe mit dem beginnenden Athmungsproceß das Leben  
ständig fortsetzen kann, außer den Hüllen des Eies bei eierle-  
genden Thieren, außer der Gebärmutter bei den Säugthieren, den  
einzig Gebärenden, im eigentlichen Sinne des Wortes.

Die Entwicklung des Embryo's geschieht entweder in einem Ei,  
welches neben dem Keime auch schon die Stoffe enthält, welche zur  
Ernährung des Embryo's erforderlich sind, ganz isolirt von der Mut-  
ter, oder doch nicht in genauer Verbindung mit derselben, bei den  
eierlegenden Thieren; oder in einem Ei, welches sich nur nach-  
träglich in einem besondern Behälter der Gebärmutter entwickelt,  
indem es sich mit dieser verbindet, immer in genauer Vereini-  
gung mit der Mutter bleibt, so daß der Embryo aus den Säften die-  
selben mittelbar durch das Ei die Nahrungsstoffe erhält, wie dieses bei  
den Säugthieren der Fall ist. Denn wenn gleich einige Thiere,  
wie die Fische, die Eier wie bei den eierlegenden gebildet sind, lebendig  
gebären, indem die Eier im Leibe der Mutter noch ausgebrütet wer-  
den, so bleibt doch das Eigenthümliche durchaus: daß das aus dem  
Ei abgetrennte Ei nicht wieder in genauem Zusammenhang  
mit dem Behälter tritt, in welchem der Embryo in ihm entwickelt  
wird, daß dieser während seiner Entwicklung keine ponderablen Nah-  
rungsstoffe von der Mutter erhält, sondern nur Imponderabiles, wahr-  
scheinlich nur der Wärmestoff seine Ausbildung bedingt, wie dieses  
bei den Eiern der Fall ist, die ganz getrennt von dem weibli-  
chen Geschöpfe ausgebrütet werden.

Wenig wissen wir von den untern Thierclassen über die allmähliche  
Entwicklung der einzelnen Theile des Embryo's im Ei; das Wenige,  
was uns über die Fische bekannt geworden ist, habe ich bei der Be-  
schreibung des Eies mit bemerkt. Ueber die Vögel, die Säugthiere  
und den Menschen wissen wir in dieser Hinsicht mehr; doch fehlen  
mehrfache und mehrmalige Untersuchungen, ehe wir eine voll-  
ständige Geschichte der Entwicklung aller einzelnen Organe der Na-  
gung entsprechend aufstellen können.

Um Vergleichung und als Beispiel, wie sich die Theile des Em-  
bryo's in dem Ei eierlegender Thiere entwickeln, will ich das angeben,  
was uns Beobachtungen über die allmähliche Ausbildung des Hühn-  
embryo's gelehrt haben, ehe ich die Bildungsgeschichte der menschlichen

5) Leber's Vorles. d. Zergliederungsk. Wien 1776, S. 451. 6) Hal-  
ler's Grundr. u. s. w. a. a. D. S. 942. 7) Danz's Grundr. d. Zer-  
gliederungsk. d. ungebornen Kindes, Frankf. u. Leipzig. 1792. 8) nach  
Wes (etymol.) von feo, gigno, und hiernach der gewöhnlichen Schreibart  
foetus vorzuziehn. Cicero n. de nat. Deor. l. 2. c. 51. S. auch Hal-  
leri elem. physiol. T. VIII. P. 1. l. 29. 9) Arantii de hum.  
foetu l. Rom. 1564. 10) Keuchen not. ad Sereni Sammonici  
ecarm. de med. p. 224. 11) Vgl. des Wort. 12) 13) entsprechend  
dem Griechischen Worte παιδιον, vgl. Note 2. Hippocratis de natura  
pueri l. in oper. ex interpr. Foessii. 14) Vgl. auch dieses Wort.  
15) Riolani anthropogr. l. 6. c. 6.

Frucht von ihrem Entstehen bis zu ihrer Reife, so weit diese bis jetzt bekannt geworden ist, beschreibe.

Der Embryo des Vogels bildet sich in dem Fleck, der Nabe oder dem sogenannten Hahnentritt, und erscheint in den ersten Tagen als ein gallertartiges, durchsichtiges Kugelnchen, in dem noch kein Organ erkennen kann. Von den Gefäßen aus, die zuerst auf dem Dotter als Gefäßraum zeigen, verbreiten sich Gänge zu der Stelle hin, wo sich der Embryo bildet, und führen ihm flüssigern Theil des Dotters zu, um ihn von außen her als Blutgefäßsystem zu dienen, da ihn der innere Blutumlauf noch ganz fehlt. Die Dottersubstanz röthet sich, oxydirt durch den Sauerstoff der Luft, es bildet sich das Herz, (*Punctum saliens*.) und damit beginnt der innere Blutumlauf. Aus dem Herzen kommen nach und nach Äste und Äste des Gefäßbaumes hervor, welche den aufgenommenen Nahrungstoff assimiliren und zu den Theilen hinführen, sich an den so gegebenen Mittelpunkt ansetzen, und der Erzeugungsproceß ist nun von dem Herzen abhängig, so wie er es früher von den Dottergefäßen lediglich war. Nur bei dem Beginnen der Bildung wird oben der flüssigere Theil des Dotters allein zur Erzeugung des Pipels verwendet. Bald wird durch die Hagelstränge das Eiweiß ausgesogen und dem Dotter zugeführt; dadurch wird der Dotter in der ersten Zeit des Brütens größer, blässer, milchig. Durch die Dottervenien, vielleicht Lymphgefäße, die auch auf der innern flachen Fläche der Dottershaut hervorragen, welche dadurch der innern zugegen Haut des Darmcanals ähnlich ist, wird diese Dottersubstanz aufgenommen und zu dem Embryo hingeführt. Durch das Drängen in das Ei dringenden atmosphärischen Luft wird diese Masse im Anfang allein in den Gefäßen, in der Folge vorzugsweise in dem Chorion oxydirt und geröthet, so daß man in dieser Haut das Blut, welches die Arterien aus den Hüftarterien zu derselben hinführen, von dem der Venenäste durch die hochrothe Farbe, welches das in sich enthaltene Blut angenommen hat, deutlich unterscheiden kann.

Alle Theile des Embryo's bilden sich allmählig aus einer flüssigen oder gallertartigen Masse zu den festeren und ihren Gebilden eigenthümlichen. Den dritten Tag erscheint der zu dem Leib beträchtlich große Kopf; am Vorderkopf unterscheidet man zwei Bläschen am Hinterkopf eins; sie sind durchsichtig und mit einer hellen Flüssigkeit gefüllt; von dem hintern Bläschen erstrecken sich mehrere Äste abwärts, in denen die Bildung des Rückenmarks, so wie jenem die des Gehirns beginnt. Die für das Rückenmark bestimmte Reihe von Bläschen endigt sich mit einer rundlichen Anschwellung und wird Carina genannt. Mit dem Rückenmark beginnt die Erzeugung des Centralpuncts des Nervensystems.

Der Magen und die Därme werden nach Wolf aus dem falschen Amnion, (*Amnium spurium*.) gebildet. So beuennet nämlich ein Blatt der Dottershaut, welches vom zweiten bis zum zehnten Tag den Embryo fast ganz umgibt, (nur ein kleiner Theil des Rückens bleibt frei,) allmählig aber zur Bildung des Magens und Darmcanals verwendet wird, so daß es den zehnten Tag schon ganz verschluckt ist. — Am ersten Tag der Bebrütung entsteht nämlich schon



ab der äußern allgemeinen Dotterhaut ein Blatt, auf welchem  
 sie verlaufen, die durch das äußere Blatt durchscheinen; daher  
 man diese Stelle *Area vasculosa*. Auf diesem Blatt liegt der  
 Embryo so, daß sie Anfangs unter der sich bildenden Bauchhöhle hin-  
 zuwächst und dem Rücken des Embryo nach dem äußern Blatt zu-  
 gewandt ist; die Stelle, wo der Embryo liegt, ist dem Anschein nach  
 durchsichtig, und wird von dem Grenzgefäß (*Vena ter-*  
*restialis*;) umgeben, Wolf nennt diese Gegend *Areola pellucida*.  
 Am fünften Tag verliert diese Stelle ihre Durchsichtigkeit und  
 verwindet ganz. Vom zweiten Tag an schlägt sich nun jene Haut  
 dem Rücken des Embryo hin um, und bedeckt denselben so,  
 nur ein kleiner Theil des Rückens frei bleibt. Darauf fängt der  
 innere Membran, welcher längs der sich bildenden Bauch-  
 höhle unter der Wirbelsäule hin ausgebreitet ist, an, sich an den  
 Seiten zu erheben, wodurch eine Grube entsteht, die so lang  
 wird, als die Wirbelsäule. Das obere Endtheil nennt Wolf  
*rudimentum cardiaca*, es ist dieses das Rudiment des Magens, der jetzt  
 noch offen ist. Nach vorn schlägt sich das falsche Amnion über den  
 Kopf, als Kopfscheide, nach hinten über den Schwanz, als Schwanz-  
 scheide. Am dritten Tag berühren die Ränder der Magengrube ein-  
 ander und verwachsen, und es zeigt sich die Naht, (*Sutura amnii*  
*anterior*;) das Rudiment des Darmcanals; eine Vertiefung, welche  
 die innere Fläche des hintern Segments des in der Bildung begriffe-  
 nen Darmes zeigt. Die Naht ist mit einem doppelten Wulst umge-  
 ben, der innere entsteht, indem sich das falsche Amnion, welches  
 über der Wirbelsäule hervorkommt, umschlägt, um die Seitentheile  
 der Blase zu bilden; der äußere entsteht, indem sich dieselbe Haut von  
 der Wirbelsäule nach vorwärts zu umschlägt, um in das wahre Am-  
 nion überzugehen. Am fünften Tag trennt sich die innere Haut der  
*Area vasculosa* von der äußern; das hinfällige Amnion zieht sich  
 vom Kopf und Schwanz ab, und da es nun nicht mehr gespannt  
 ist, so rollen sich die Rudimente des Darmcanals zusammen, die  
 an denselben legen sich an einander, und der Canal wird so ge-  
 bildet, daß nur noch eine kleine Oeffnung bleibt, durch welche er  
 mit dem Dotter Zusammenhang hat. Durch dieselbe Haut wird also  
 das Gefäß gebildet, und zwar das Rudiment desselben früher  
 als das des Darmcanals; denn erst nachdem sich die zwei Platten  
 des falschen Amnions von beiden Seiten an einander gelegt haben,  
 schließt sich die Naht, als Rudiment des Darmcanals.  
 Am vierten Tag zeigt sich die Leber; die Därme erscheinen deut-  
 lich; die Nieren fangen an sich zu bilden; das Chorion wächst aus  
 dem Unterleib hervor.  
 Am fünften Tag löst sich das falsche Amnion allmählig auf, in-  
 dem die Bildung des Darmcanals vollendet, der nur noch durch die  
 in der Beschreibung des Eies angegebene Oeffnung und den Dotterca-  
 nal mit der Dotterhaut zusammenhängt. Das Herz wird vollkom-  
 men ausgebildet; es erscheinen die Rudimente der Lungen als durch-  
 scheinige, schleimige Masse. Das Rückenmark zeigt sich als zwei weiße  
 Linien und ist schon consistent, also eher ausgebildet als das Ge-  
 hirn. Die Augen sind verhältnißmäßig sehr groß.

Den sechsten Tag ist der Embryo gegen zehn Linien lang; Schnabel fängt an sich zu bilden; man sieht die Hervorragungen Bildung der Extremitäten deutlicher. Mit Ende dieses oder dem Anfang des siebenten Tags bemerkt man eine Bewegung des Embryo's; der Kopf ist am siebenten Tag fast so groß als der Körper; die Hirnsubstanz hat die Consistenz eines weißlichen Schleims und ihr Gewicht verhält sich zu dem Gewicht des Körpers wie 1:14, nach Wenzel. Man sieht den Anfang der Zunge; die Extremitäten bilden sich mehr aus; es zeigen sich die weichen, durchsichtigen, gallertartigen knorpeligen Grundlagen der Knochen in den Halsbeinen und Extremitäten. Jedermann hat auch an diesem schon die Milz gesehen, Haller die Nebennieren und Eierstöcke.

Den achten Tag gewinnen die knorpeligen Grundlagen etwas Consistenz, und man sieht um sie gallertartige Masse, in der die Muskeln bilden.

Den neunten Tag ist der Embryo sechzehn bis achtzehn Linien lang; der Kopf ist immer noch verhältnißmäßig sehr groß; man sieht die erste Spur des Kammes; das Gehirn ist consistenter; das Rückenmark ist vollkommen gebildet; man bemerkt die Anfänge Hirnnerven; das Herz ist ganz ausgebildet. In den Röhrenknorpeln sieht man mit dem Vergrößerungsglas ein festeres netzförmiges Gewebe.

Vom zehnten bis zum fünfzehnten Tag entwickeln sich gebildeten Theile immer mehr. Die Verknöcherung beginnt; Muskeln sind Anfangs weiß, weich; die Lungen werden consistenter und größer. Nebennieren, Eierstöcke, Eierleiter sind sichtbar.

Vom fünfzehnten bis zum einundzwanzigsten Tag erhält der Embryo allmählig die Ausbildung, die ihm nöthig ist, um aus dem Ei fortbestehen zu können: die Haut wird mit Federn bedeckt, der Schnabel und Behenglieder mit einem hornartigen Ueberzug; die Muskeln werden röthlich; die Lungen erhalten die zum Athmen nöthige Organisation; die Bauchmuskeln bilden sich mehr heraus und engen den Nabelring; der Dottersack hängt durch den Dottersack noch mit dem Darmcanal zusammen und tritt in die Bauchhöhle; alle Digestionsorgane werden vollkommener; die Verknöcherung breitet sich immer weiter und stärker.

Den 21sten Tag verläßt der Fötus gewöhnlich das Ei. Despiert er schon im Ei, indem er das Athmen schon begonnen hat. Durch lebhaftere Bewegung zerbricht der Fötus ganz allein, ohne Mithilfe der Henne, das Ei und kriecht heraus. Der Nabel des Kücheldchens ist ganz geschlossen; nur kleine Stücke des Chorions und Amnions sieht man an ihm, die aber bald vertrocknen und abfallen. An der innern Fläche der Eischalenhaut bleibt der größte Theil des Chorions und Amnions mit dem ehemaligen Eiweißband. — In dem Absterben des Chorions, welches zur Verrichtung des Respirationsvorganges für das im Ei eingeschlossene Kücheldchen bestimmt war, ist die Hauptursache des Austrittes des Fötus aus dem Ei; denn die Menge der Luft in demselben ist zu gering, um zum Athmungsprozeß hinzureichen.

Nach dem Austritt aus dem Ei wird das Kücheldchen noch durch



Dotter ernährt, es tritt dieser theils durch den Dottercanal in Darmcanal, theils führen ihn die gelben Gefäße zu dem Gehirn. Gegen den sechzehnten Tag verschwindet der Dottersack, es bleibt am mittleren Stücke des dünnen Darmes ein einige langer Anhang zurück, ein Diverticulum, wie man es am Darmcanal des Menschen findet, wo es wahrscheinlich Rest des Bläschens ist <sup>16</sup>. — Da der Respirationsproceß nur durch die Luft vor sich geht; so schließt sich das eirunde Loch zwischen den Hohlkammern des Herzens und die beiden arteriösen Gänge, welche Magenarterien mit der Aorta verbinden. Die Magenwände werden dicker und fester, besonders die innere Haut desselben. Die Verdauungsorgane werden allmählig vollkommener. Die Knochen werden schnell ausgebildet; das gefäßreiche Mark, welches sie Anfangs bilden, wird aufgesogen, und die Höhlen der Knochen werden aus Eitersäcken mit Luft gefüllt. Schnell gehen die Vögel ihrer Auszucht entgegen, die meisten haben sie schon gegen das Ende des Jahres erreicht.

Vor das Erscheinen des Embryo nach der Empfängniß haben bei Säugethieren mehrere genaue Untersuchungen von den besten Männern. Nach Haller <sup>17</sup> zeigt sich derselbe beim Schaf am fünfzehnten Tag nach der Befruchtung, bei der Hirschkuh in der sechsten Woche nach Harvey <sup>18</sup>, beim Kaninchen am neunten oder zehnten nach de Graaf <sup>19</sup>, am achten Tag nach Cruikshank <sup>20</sup>. Nach Erfahrung zu Folge setzt Nuttenrieth <sup>21</sup> auch das Erscheinen des menschlichen Embryo's nach dem ersten Neuntel der ganzen Schwangerschaft, also ungefähr in die fünfte Woche; allein andere Beobachtungen sprechen doch für ein früheres Erscheinen des menschlichen Embryo's.

Der Embryo der Säugethiere und des Menschen liegt, umgeben von Häuten des Eies, in der Gebärmutter, indem dieses durch kleine oder großen Warzen hervorragenden Gefäßendigungen an der äußern Fläche des Chorions oder der Cotyledonen, oder, wo nur der Mutterkuchen ist, der kindliche Theil desselben, sich zwischen die Gefäßendigungen einlegen, welche den mütterlichen Theil des Mutterkuchens, die warzenförmigen, (cotyledones,) oder flockigen Fortreibungen auf der innern Fläche der Gebärmutter bilden; diese Verbindung findet beim menschlichen Eie immer in den ersten Perioden der Bildung durch die hinsfällige Haut, (membrana vitellina,) Statt.

Bei den einhufigen Thieren ist die ganze äußere Fläche des Chorions mit zarten Gefäßendigungen bedeckt, die sich an einen ähnlichen Ueberzug der inneren Fläche der Gebärmutter anheften. Einige Schriftsteller nennen dieses Anlegen des Mutterkuchens, die äußere Häute. Bei den Schweinen findet sich eine ähnliche Mutterkuchen, die aber nicht die ganze Oberfläche des Eies bedeckt, sondern gegen die Enden zu dünner wird und diese gar nicht überzieht.

<sup>16</sup> Val. Meckel's Arch. über die Ovarien am Darmcanal in Kell's und Meckel's Arch. für d. Physiol. 9 B. 3. S. 421. <sup>17</sup> Oper. T. II. p. 435. <sup>18</sup> ex. de generat. anim. ex. 69. <sup>19</sup> oper. T. p. 310. <sup>20</sup> Kell's Arch. für Phys. 5. B. 1. S. 82. <sup>21</sup> Meckel, ad hist. embryon. human. p. 2.

Eine jede Frucht der Thiere, welche mehrere Junge gebären, ihre eigenen Häute und ihren eigenen Mutterkuchen; auch bei Menschen und den Thieren, bei denen gewöhnlich nur eine Frucht vorkommt, hat eine jede ihre eigenen Eihäute und Mutterkuchen, wenn mehrere erzeugt werden.

In dem Ei liegt der Embryo, umgeben von dem Schafwasser, den ersten Monaten der Schwangerschaft, nicht weit entfernt von innern Fläche des Amnions, indem die Gefäße, welche die Nabelschnur bilden, noch sehr kurz sind; nach und nach werden diese länger und es entfernt sich der Embryo von jener Fläche, so daß gegen das Ende der Schwangerschaft bei den Thieren an das hintere Ende bei den Menschen an das untere Ende des Eies zu liegen kommt.

So lange das Schafwasser an absolutem und relativem Volumen dem menschlichen Embryo überlegen ist, was wahrscheinlich gewöhnlich bis zum sechsten Monat der Fall ist, hat der Fötus keine bestimmte Lage; ganz willkürlich, zum Theil abhängig von der Stellung der Mutter, nimmt er bald diese, bald jene Lage an. Allmählig aber, so wie der Kopf der verhältnißmäßig schwerste Theil wird, wendet sich dieser abwärts, nimmt nach und nach den tiefsten Platz ein. Ist zwar dabei immer noch sehr beweglich, und erst vom siebenten Monat an bekommt der Embryo eine beständigere Lage; denn nun vermindert sich die Quantität des Schafwassers im Verhältniß zu der Frucht, vermindert, diese dagegen an Umfang und Schwere zugenommen. Ehemals glaubte man, und auch jetzt glauben wohl noch manche, daß der Embryo stürze sich am siebenten Monat plötzlich auf den Kopf (mache einen Wurzelbaum, Culbutus<sup>22</sup>;) dieses ist aber nicht der Fall. Hat aber der Kopf diese Lage eingenommen, so bekommt der ganze Embryo bei einer regelmäßigen Schwangerschaft folgende Lage: der Kopf ist gegen den Muttermund zugekehrt und steht dem Eingang in das kleine Becken, das Hinterhaupt nach dem großen Schambein, gewöhnlich nach der linken Pfanne; das Gesicht ist nach der gegenüberliegenden Vereinigung des Kreuzbeins mit Hüftbein, also gewöhnlich der rechten, hingekehrt; der Nacken und Rücken sind dann nach der linken vordern, der Leib mit dem After nach der rechten hintern Mutterseite hin gerichtet. Der Kopf liegt gegen die Brust angedrückt, die Oberschenkel sind in den Knien gebeugt, und stark gegen den Unterleib angezogen, die Unterschenkel liegen abwärts, liegen dicht an die Oberschenkel an, und sind über einander geschlagen. Die Vorderarme sind gewöhnlich abwärts gebogen, an die Seitentheile der Brust angedrückt, so daß die Hände an den Wangen liegen. Oft haben aber die Vorderarme auch eine andere Lage; sie sind gegen die Füße ausgestreckt, oder sie liegen sich auf der Brust.

Erst mit herannahender Geburt verliert sich die Beweglichkeit des Kopfs; bis zu dieser Periode läßt er sich immer noch mit den Händen gern in die Höhe schieben, fällt aber schnell wieder auf den gesenkten Finger herab. — Dieses ist die gewöhnliche Lage des Fötus, von welcher im Durchschnitt unter hundert Geburten kaum fünf Ausnahmen

<sup>22</sup>) Vgl. Gehler progr. de situ foetus in utero, Lips. 1791. St. Anleit. zur Geburtsh. 1. Th. 7. Aufl. S. 428.



namen. Bei Zwillingen hat gewöhnlich das eine Kind diese Lage, andere die entgegengesetzte, mit den Füßen nach unten.

den Thieren liegt der Fötus auch der Länge nach mäßig am; der Rücken ist gewöhnlich gegen die untere Bauchwand mütterlichen Thieres, der Unterleib gegen die untere Fläche der Wirtin gekehrt, der Kopf liegt gebogen zwischen den beiden Vorderfüßen, den Muttermund hin, die Vorderfüße sind nach vorn zu gerichtet und liegen unter dem Kopf oder zu beiden Seiten, die Hinterfüße liegen bei den Thieren, die nur ein Junges bringen, in einer Hörner. Bei den Thieren, die mehrere Junge bringen, liegt jedes in dem Körper der Gebärmutter, die übrigen in den Hör-

Zeit der Entwicklung des Embryo's der Säugethiere ist verschieden: bei den Hausthieren ist dieses schon genau bekannt, am längsten dauert sie bei den einhufigen Thieren, eif bis zwölf Monate bei der Kuh acht bis neun, bei dem Schaf und der Ziege vier bis fünf, bei dem Schweine drei und einen halben bis vier Monate u. s. w. — In den ersten Tagen nach geschehener Schwängerung sieht man in dem Eie des Thiers bloß eine gallertige, fette Flüssigkeit; in der dritten Woche bemerkt man die Anwesenheit des Embryo's, die nach der Dauer der Trächtigkeit bald früher, bald später sich entwickeln. Bei einem Geschöpfe, welches acht bis eif Monate in dem Ei ausgebildet wird, sieht man im zweiten Monate den Kopf, als den dickern und größern Theil des ganzen Embryo's, durch die großen Augen und die anfangende Bildung der äußeren Glieder ausgezeichnet; der Rumpf läuft schmal zu und endigt in dem Nabelstrang, der, als Fortsetzung der Bauchhöhle, die sich im Darm enthält; im dritten Monat zeigen sich die Gliedmaßen als kurze Fortsätze, und gegen das Ende desselben sieht man die Geschlechtstheile; im vierten Monat hat der Embryo seine bestimmte äußere Gestalt, die nun nach der Dauer der Trächtigkeit in verschiedenen verhältnißmäßig, doch ziemlich schnell vergrößert wird.

Bei Berücksichtigung der bei den Thieren abweichenden Form mancher Organe, und der bei ihnen vorhandenen Allantois, oder einer der menschlichen entsprechenden Bildung, finden wir bei den Hausthieren nun in einer etwas vollständigeren Reihe der verschiedenen Stadien der Trächtigkeit zu untersuchen sind, eine dem menschlichen sehr ähnliche Entwicklung der einzelnen Organe und ihrer Einrichtungen.

Nabelarterien kommen aus den Beckenarterien und führen das Blut zum Mutterkuchen; die Nabelvene geht von diesem zu der vordern und der hintern Hohlvene; in der Scheidewand der Vorhöfen des Herzens ist das eiförmige Loch mit seiner Klappe, zwischen Lungenschlagader und der Aorta der arterielle Canal; die Lungen sind noch dicht, schwer, durch Luft noch nicht ausgedehnt, der Blutstrom daher ganz so, wie wir ihn bei dem menschlichen Fötus kennen lernen werden. Der Urachus, als Fortsetzung der Harnblase, geht in die Allantois über, oder endigt sich in dem Amnion und Chorion. Das Nabelbläschen hängt mit dem Urachus zusammen, dient Anfangs zur Zuführung des Nah-

rungsstoffes und bildet den Darmcanal zum Theil. Magen und Därme sind auch bei dem reifen Fötus noch eng, in dem Magen det man eine dem Schafwasser ähnliche Flüssigkeit, in der n Flocken schwimmen, in den dicken Därmen aber einen Uncath eigener Beschaffenheit, das Füllenpech, (Meconium.) Die N sind in mehrere Stücke getheilt, ihre Masse ist sehr weich; die bennieren sind verhältnißmäßig größer als bei erwachsenen Thie Die Leber und die Schilddrüse sind vorzüglich groß, im Verha zu der Größe und ihrer Beschaffenheit im erwachsenen Thiere; Farbe der Leber ist röthlich. Die Brustdrüse ist groß und hat ihr eigenthümlichen Bau noch vollkommen. Die Hoden liegen im Unterleibe und treten zu verschiedenen Perioden in den Ho sac. — Als Rudimente der Hirn- und Rückenmarksbildung sieht Anfangs nur einige Bläschen, die mit einer hellen Flüssigkeit ge sind, das Rudiment erscheint zuerst als eine breiige, in zwei Str getheilte Masse. Das Gehirn ist auch bei dem reifen Embryo sehr weich.

Die Knochen bilden sich anfänglich als knorplichte Masse, in sich erst nach und nach Knochenkerne niederlegen; die Knochen Hirnschale sind nicht durch Nähte, sondern durch Häute verbun Die Nebenhöhlen der Nase bilden sich erst allmählig bei dem gebornen Thiere. Die Zähne kommen meistens auch erst nach der burt, oder doch nur eine kurze Zeit vor derselben hervor.

Die Muskeln zeigen sich zuerst als eine gallertartige, blaßrothe Masse; die Flecken sind röthlich und erst in der zweiten Hälfte Tragzeit werden jene röther, diese dichter und weißlich.

Den menschlichen Embryo haben wir in dreifacher H zu betrachten: 1. die äußere Form desselben vom ersten bis zehnten Monate seiner Entwicklung; 2. die Entwicklung ei ner Organe desselben; 3. die Verschiedenheit der Functionen zur Bildung und Ernährung des Embryo's bestimmten Organe.

1) Äußere Form des Embryo's von der ersten bi der vierzigsten Woche, oder vom ersten bis zum zeh n Mondesmonate seiner Entwicklung <sup>23</sup>.

1. Monat. In den ersten Wochen nach der Empfängni scheint das Ei und in ihm zugleich auch, oder doch bald nachher, Embryo. Schwer zu bestimmen ist es, in welcher Woche nach e fruchtbaren Beischlaf dieses geschieht, und die genauesten Beobac sind darüber noch verschiedener Meinung. Die meisten stimmen für, daß das Ei und der Embryo in der dritten Woche nach Empfängniß sich zuerst entdecken lasse. Es ist nicht unwahrschein daß schon etwas früher zuerst das Ei und dann der Embryo ge

23) In den beiden Werken: Socmerring icon. embryonum hum. Hunter anatomie uteri gravidæ hum. findet man die trefflichsten Abb gen der Embryonen von der 3. oder 4. bis zur 40. Woche. Megele's träge zur vergleichenden Anatomie liefern einige der Natur sehr treue Darst gen der Embryonen aus den ersten Monaten der Schwangerschaft. Ich verwei her auf diese Abbildungen verweisen, so wie ich, neben eignen Beobachtu bei der Beschreibung der Embryonen die angeführten Werke besonders be habe. Nachstiche von einigen Hunter'schen Abbildungen sind in Mayer's tomischen Kupfertafeln, 6. B. und in Foder's anat. Kupfert. 32. und fol Taf. 89 u. 90.



## Embryo

allein die Theile sind zu klein und zerfließen zu leicht, als  
 sie entdecken könnten, auch ist rücksichtlich der Empfängniß  
 errechnen von einigen Tagen gar leicht möglich.

Embryo erscheint anfänglich als ein kleiner, gallertartiger,  
 unförmiger, (einer Made oder kleinen Ameise ähnlicher,) Körper,  
 zwei bis zwei und eine halbe Linie lang, eine bis eine und  
 halbe Linie breit. Die wenig consistente Masse, aus welcher er  
 ist weißlich und halbdurchsichtig, in Wasser ganz auflöslich.  
 am convergen Rand zeigen sich zwei nicht tiefe Einschnitte, bis-  
 auch noch zwischen dem obern Einschnitt und dem obern Ende  
 zwei kleine Einschnitte, wodurch dieser Rand ein gezahntes An-  
 erhält. An dem concaven Rand wird der ganze kleine Körper  
 einen etwas tiefern Einschnitt in zwei nicht ganz gleiche Hälft-  
 theilt. An dem einen Ende sieht man eine kleine rundliche An-  
 lung oder einige kleine Höcker, hier bildet sich in der Folge der  
 das andere Ende läuft, allmählig dünner werdend, in einen ab-  
 seten Stumpf aus, neben dem sich, etwas gegen das obere  
 zu, der Unterleib als eine kleine kegelförmige Hervorragung er-  
 und in den Nabelstrang übergeht; dieser ist kurz, nicht ge-  
 m, verhältnißmäßig sehr dick; neben ihm, zwischen der Schaf-  
 derhaut, liegt das Nabelbläschen. Auch mit Vergrößerungs-  
 kann man noch keine bestimmten Organe erkennen. — Das  
 welches diesen Embryo einschließt, ist ungefähr von der Größe  
 Haselnuß bis zu einer kleinen Wälschen Nuß, länglich rund, im  
 Durchmesser fünf Linien bis einen Zoll lang. An der äußern  
 hängt viel geronnenes Blut; reinigt man das Ei davon, so sieht  
 die flockigen Gefäßendigungen des Chorions und einzelne Stücke  
 zufälligen, zottigen Haut. Nach dem stumpfen Ende zu liegen  
 dicken dichter an einander. An dem spitzen Ende findet man zw-  
 dem sehr dünnen Chorion und Amnion einen mit wasserheller  
 angefüllten Raum; in der Höhle des Amnions ist verhält-  
 ßig zu der Größe des Embryo's viel Schafwasser<sup>24</sup>.

Monat. In der ersten Hälfte des zweiten Monats, der  
 bis sechsten Woche, hat die Consistenz der Masse des Em-  
 schon etwas zugenommen; er ist vier bis sechs Linien lang, die  
 weisßgegend von vorn nach hinten zwei bis drei Linien breit.  
 und Rumpf kann man deutlich unterscheiden, jener ist fast so  
 als die Hälfte des ganzen Körpers, schwärzliche, rundliche,  
 von Seiten hingerichtete Kreise oder Punkte an dem obern Theile  
 kopfs zeigen sich als Spuren der unbedeckten Augen. Der Mund  
 ant wie eine kleine Querspalte; die obern Extremitäten, biswei-  
 auch die untern, ragen wie kleine Höcker hervor; der Steiß bil-  
 des untere Ende des kleinen Körpers, als ein etwas stärkeren  
 . In dem obern Theil der Bauchhöhle, wo sich der Nabel-  
 trichterförmig ausbreitet, sieht man das mit Blut angefüllte  
 Uebrigens ist der ganze Körper von rothem Blute leer, weiß-  
 halbdurchsichtig.

Das Ei hat die Größe eines Hühnereies, die ganze äußere Fläche  
 Söemmering icon. Tab. 1. fig. 1 und Abbildung am Schlusse d. Werks.  
 Redel's Beltrage, Tab. 5. Fig. 1, 2, 3 u. 4.

des Chorions ist noch flockig, und das Nabelbläschen ist noch handen <sup>25</sup>.

In der zweiten Hälfte des zweiten Monats, der siebenten bis achten Woche, ist der Embryo vom Kopf bis zum Steiß zehn bis fünfzehn Linien lang. Der Kopf ist etwas weniger größer als der dritte Theil ganzen Körpers. Man sieht die Oeffnung, wo sich die Nase bildet; Nasen- und Mundhöhle sind aber noch Eins; auch die Einmündungen der Ohren zeigen sich nun als rundliche Vertiefungen. Man sieht auch schon in der ersten Hälfte des zweiten Monats, überhaupt ist zu bemerken, daß so wie in der Folgezeit des Lebens sich dieser oder jener Theil bald früher, bald später entwickelt, auch bei dem einen Embryo ein oder das andere Organ um ein bis zwei Wochen früher oder später ausbildet, als bei dem andern. Die schwärzlichen Punkte, welche die Bildung der Augen bedeuten, sind noch nach den Seiten hingerichtet, haben fast eine Linie im Durchmesser; es ist aber keine Spur von Augenlidern zu finden. Die kleinen Höcker, wo sich die Extremitäten bilden, sind größer, endigen sich in einem plattgedrückten Theil mit abgerundetem Rand aus dem in der Folge die Finger und Zehen hervordachsen. Der Oberarm zeigt sich kaum ein kleines Rudiment. — Die Geschlechtstheile bemerkt man gewöhnlich dann zuerst in ihren Rudimenten, wenn sich nun die Extremitäten etwas mehr entwickelt haben, doch weisen auch schon in der ersten Hälfte des zweiten Monats. Sie erscheinen zwischen dem Nabelstrang und dem Ende des Steißbeins als ein kleiner Höcker mit einer oder einigen kleinen Oeffnungen; in den letzten Tagen des zweiten Monats kann man bisweilen schon die männlichen und weiblichen Geschlechtstheile unterscheiden, bei den weiblichen aber die Clitoris verhältnißmäßig sehr lang, und von ihr laufen auf beiden Seiten nach den Schenkeln zu zwei Wülste aus. Der Uterus geht in die trichterförmig erweiterte Nabelschnur wenig schief von oben nach unten zu über, so daß das dem Fötus zugewandte Ende der Nabelschnur sich unmittelbar in die Unterleibshöhle fortsetzt. Der Nabelstrang ist noch nicht gewunden.

Das Ei ist größer geworden; der längste Durchmesser beträgt nun meistens  $2\frac{1}{2}$  bis  $2\frac{3}{4}$  Zoll, nur die fadenförmigen Gefäßendigungen des Chorions werden an dem stumpfen Ende etwas länger und drängen sich hier etwas mehr zusammen; übrigens ist die Beschaffenheit dieselbe, auch das Nabelbläschen ist noch vorhanden <sup>26</sup>.

3. Monat. In der ersten Hälfte dieses Monats ist der Embryo 1 Zoll bis 1 8 Linien lang. Der Kopf ist so groß als der dritte Theil ganzen Körpers. Die Stirne ragt etwas stärker als bisher hervor, die Nase erhebt sich nur wenig, ist sehr breit, es zeigen sich deutlich die beiden Nasenlöcher als längliche Spalten. Die Bildung der Augenlider und der Lippen beginnt in Form kleiner, schmalen Wülste. Die Ohröffnungen sind längliche Spalten; nach hinten und vorn erheben sich Wülste, woraus sich die Ohrknorpel bilden. Der Kehlkopf ist noch nicht, oder doch nur sehr kurz, der Gesichtstheil des Kopfes geht in die Brust über. Die obren Extremitäten sind mehr entwickelt.

25) Soemmerring icon. Tab. 1. fig. 2, 3, u. Thell. Medel's Beiträge 2. 5. Pl. 4, 5, 6.

26) Soemmerring icon. Tab. 1. fig. 4, 5, 6. Medel's Beiträge Tab. 5. Fig. 10, 11.



untern, doch ist der Oberarm noch viel kürzer als der Vorderarm; die Finger sind deutlich gespalten. Der Oberschenkel ist kürzer als der Unterarm, die Behen sind kleine Höcker. Die männlichen und weiblichen Geschlechtstheile sind noch leicht mit einander zu verwechseln, die Clitoris verhältnißmäßig sehr lang und stark ist. Der Nabelstrang entfernt sich etwas von den Geschlechtstheilen; die Höhle des Uterus geht nun mehr gerade gegen den Nabelstrang zu, und die Eier liegen noch zum Theil in diesem. Das Nabelbläschen ist öfters schon nicht mehr zu finden. Der Nabelstrang wird nun etwas länger als der Embryo und fängt an sich zu winden.

Die Größe des Eies steht in der Mitte zwischen der Größe eines Hühner- und Gänseeies; die Gefäßstämme des Chorions ziehen sich zum stumpfen Ende immer mehr zusammen <sup>27</sup>.

Am Ende der zweiten Hälfte des dritten Monats, der elften und zwölften, nimmt die Größe des Embryo's bis zu 3 Zoll und einige Linien zu. Der Kopf nimmt noch immer den dritten Theil der Größe des ganzen Körpers ein. Die Augenlider sind nun deutlich gebildet, und sind verschlossen. Die Sehhaut, (*Membrana pupillaris*,) schließt das Sehloch. Die Nase erhebt sich mehr, und durch die Mitte der Stirne und die ausgebildeten Lippen zeigt sich ein deutliches Profil. Die einzelnen Wölbungen und Vertiefungen des äußern Gehirns (*Helix* und *Antihelix*, *Tragus* und *Antitragus*.) zeigen sich, sind aber noch nahe an einander gedrängt. Der Hals läßt sich gut abzeichnen, so wie die Gegend, wo sich das Becken bilden wird; die Brusthöhle ist geschlossen, die trichterförmige Erweiterung des Magens am Unterleib hat sich mehr zusammengezogen, da der Magen nun schon ganz in der Unterleibshöhle liegt. Die Nase windet sich deutlicher, und das Nabelbläschen ist verschwunden. Die äußern Geschlechtstheile haben sich etwas mehr entwickelt; die Verwechselung des männlichen und weiblichen Geschlechts ist nicht mehr möglich.

Der obere Extremitäten hat nur der Oberarm die verhältnißmäßige Länge zu dem Vorderarm; die Hand ist aber noch sehr breit; die Knochen sind dick, und da, wo die Gelenke sich bilden, sieht man sie deutlich. Es hängen diese Gliedmaßen noch immer, wie von dem Kopf, ihrer Entstehung an, gegen den Unterleib herab. An den unteren Extremitäten ist der Oberschenkel auch länger geworden und in größerer Proportion zu dem Unterschenkel; er geht noch unter einem rechten Winkel nach vorn zu vom Körper ab; der Unterschenkel ist gegen den Oberschenkel zurückgeschlagen. Fuß und Behen sind noch sehr unvollkommen. Die Nägel erscheinen wie dünne, häutartige Fortsätze.

Die Knochenbildung fängt an, und zwar wahrscheinlich in der sechsten Woche in dem Schlüsselbeine, dem Ober- und Unterkiefer.

Die Weichteile von der bei der ersten Hälfte dieses Monats an, sind von Beschaffenheit nur dadurch ab, daß es noch größer ist, und die fleckigen Gefäße auf der Oberfläche der Lederhaut am stumpfen Ende sich immer mehr zusammendrängen <sup>28</sup>.

Boemmerring icon. Tab. 1. fig. 7, 8. Meckel's Beltr. Tab. 5. Fig. 17. Boemmerring icon. Tab. 1. fig. 9, 10, 11. Meckel's Beltr. Tab. 5. Fig. 27.

4. Monat. Zu Anfang dieses Monats wächst der Embryo was langsamer, schneller in der zweiten Hälfte; seine Länge beträgt gewöhnlich in der ersten Woche dieses Monats gegen 4, in der 2. gegen 5, und in der vierten Woche dieses Monats, oder der zehnten der Schwangerschaft, gegen 6 Zoll. Der Kopf beträgt mehr ganz ein Drittel der Länge des Körpers. Die Theile des Gesichts sind noch sehr nahe an einander gedrängt, die Augen fest geschlossen, die Ohren und die Nase mehr entwickelt; diese ist verhältnißmäßig ziemlich breit. Die Lippen sind vollkommen ausgebildet, die Zunge liegt etwas hinter der Mundspalte. — Die schlechtestheile sind so weit gebildet, daß man nun das Geschlecht erkennen kann. Bei dem männlichen Embryo sieht man den Hoden und an ihm die Naht; der Penis ist nicht von der Vorhaut bedeckt. Bei dem weiblichen Embryo ist die Clitoris noch verhältnißmäßig sehr groß; die Schamlippen fangen an sich zu bilden.

Die einzelnen Theile der untern Gliedmaßen erhalten nun auch gehöriges Verhältniß zu einander, wie dieses bei den obern Gliedmaßen schon gegen das Ende des dritten Monats geschehen ist. Füße und Zehen zeigen schon die einzelnen Glieder durch kleine Knöchel an den Stellen an, wo die Gelenke sich bilden; die dünnen, klaren Nägel bedecken das dritte Glied.

Das Ei wird immer größer, und zwischen der zwölften und sechszehnten Woche bildet sich der Mutterkuchen, indem die flockigen Gefäße des Chorions sich mehr und mehr zusammendrängen, in einen Kuchen unter einander vereinigen, und auch die hinfällige zottige Haut der Gebärmutter sich da verdickt, wo der Mutterkuchen gebildet wird, und sich fester an die innere Fläche der Gebärmutter anlegt. Der übrige Theil der Oberfläche des Chorions, welches dünner und consistenter wird, ist nicht mehr mit flockigen Gefäßen bedeckt, sondern nur wenig sammtartig. Chorion und Amnion liegen gewöhnlich überall dicht an einander und nur selten findet man zwischen beiden noch bis zu der Geburt hin eine Flüssigkeit, (das Fruchtwasser.) Die Nabelschnur ist deutlich gewunden und länger im Verhältniß zu dem Fötus, als früher. Das Gewicht des Schafwollens übertraf früher das Gewicht des Embryo, jetzt beträgt es nur die Hälfte und ist nicht mehr so hell.<sup>29</sup>

5. Monat. Der Fötus ist 8 bis 11 Zoll lang, 12 bis 14 Loth schwer. Alle Theile des Körpers zeigen mehr Proportion zu einander; der Kopf beträgt ungefähr den vierten Theil der Gesamtlänge des Körpers; er wird verhältnißmäßig schwerer, und fängt an, sich nach abwärts zu senken. Die Augenlider sind fest verschlossen. Die andern Theile, besonders die Gliedmaßen und Geschlechtstheile, sind noch mehr ausgebildet. Die Vorarme biegen sich gegen den Kopf an den Seitentheilen der Brust in die Höhe; die Oberschenkel sind gegen den Unterleib zu, und die Unterschenkel nach diese gebogen. Auf der Haut sieht man feine weiße Haare, (Lanugo.) Die Muskeln gewinnen an Kraft; der Fötus füllt den größten Theil des Eies aus und liegt näher an den Wänden desselben; fängt die Mutter gemeinlich zwischen dem vierten bis fünften

<sup>29</sup>) Soemmerling icon. Tab. 1. fig. 12 — 18. Hunter an. Tab. 32.



die Bewegung des Kindes zu bemerken. Außerhalb der Gebärmutter kann ein so weit ausgebildetes Kind nur einige Minuten

Es ist im Anfang dieses Monats im größten Durchmesser gespalterhin gegen 6 Zoll lang. Der Mutterkuchen ist vollkommen gebildet, sein Durchmesser beträgt ungefähr 4 Zoll<sup>30</sup>.

Monat. Der Fötus ist 11 bis 14 Zoll lang, 24 Loth bis 24 Loth schwer. Die Augenlider sind noch verschlossen, keine Härchen kommen als Augenwimpern und Augenbraunen, die Pupille ist noch durch die Sehhaut, (Membrana nris,) geschlossen. Auf dem Kopf bemerkt man kurze feine Haare. Die Nägel sind etwas fester. Die Farbe der Haut ist röthlich; sie ist noch faltig, weil sich noch nur erst wenig Fett unter ihr zu bilden beginnt. Der Hodensack ist noch leer; aber die Hoden haben schon gegen den Bauchring heruntergesenkt. Der Kopf ist dem Muttermund zu gerichtet; die Bewegungen des Kindes können von der Schwangeren lebhafter empfunden, weil verhältnißmäßig mehr Schamwasser vorhanden ist und der Embryo den größern Theil des Eies ausfüllt. Wird ein Kind in dieser Periode geboren, kann es zwar außerhalb der Mutter athmen, schreien, schlucken, aber wird nie länger als einige Stunden leben.

Der Länge Durchmesser des Eies beträgt gegen 6 Zoll, der Querdurchmesser gegen 5 Zoll. Der Mutterkuchen ist etwas größer, sein Gewicht dichter.

Monat. Die Veränderungen in der äußern Form des Fötus zeigen sich von nun an vorzüglich auf Vergrößerung und mehr Ausbildung der einzelnen Theile; auch erhalten sie unter einander ein besseres Verhältniß, und nähern sich so bis zum zehnten Monat dem allmählig, wie wir sie beim reifen Kinde sehen. Der siebente Monat alte, oder zwischen der 24. und 28. Woche der Schwangerschaft stehende Fötus ist 16 Zoll lang, 2½ Pfund schwer. Es tritt mehr Fett ausgeschieden, die Theile runden sich daher mehr, das Kind bekommt ein vollkommneres Ansehen. Der schwere Fötus neigt sich noch mehr nach dem Muttermunde zu, er ist aber noch beweglich, und man fühlt ihn durch den Scheidengrund über den Eingang des Beckens. Die Augenlider sind im Anfang dieses Monats noch fest verschlossen, gegen das Ende scheinen sie sich zu öffnen. Am Kopfe kommen feine, dünne und kleine Haare hervor. Die Hoden fangen an, durch den Bauchring in den Hodensack herabzusinken. In Hinsicht des Lebens gilt das bei dem sechs Monat alten Embryo bemerkte.

Monat, oder die 28. bis 32. Woche der Schwangerschaft. Der Embryo wächst in diesem und dem folgenden Monat nicht so beträchtlich in die Länge, als in einigen der vorhergehenden Monate; er nimmt mehr an Dicke zu; gewöhnlich ist er 16½ Zoll lang, 3½ Pfund schwer. Die Farbe der Haut ist sehr roth, sie ist im Allgemeinen auch über das Gesicht, mit feinen glänzenden Wollhaaren besetzt; solche Härchen vertreten auch die Stelle der Augenbraunen. Die schönsten Abbildungen von Embryonen vom vierten Monat bis zur Geburt enthält Panzer's angef. Werk, Tab. 35. u. folg.

und Augenwimpern; die Nägel sind noch sehr dünn und weich. Die Kopfknochen sind noch sehr beweglich; die Ränder derselben stehen an mehreren Stellen aus einander; die große Fontanelle ist ziemlich breit, tief und weich; die kleine Fontanelle etwas verengert. Die Augenlider sind geöffnet. Ein Hoden, meistens der linke, liegt schon in dem sehr röthen, nicht viel gerunzelten Hodensack. Bei weiblichen Fötus stehen die großen Schamlippen weit von einander; man sieht daher die kleinen Lippen deutlich, und der Rißler ist in Verhältniß zu diesen beträchtlich groß. — Das in diesem Monat geborne Kind schläft fast beständig, seine Stimme ist schwach und ächzend; ist es übrigens gesund, so kann es bei guter Pflege fortleben.

9. Monat, oder 32. bis 36. Woche der Schwangerschaft. Der Fötus ist gegen 17 Zoll lang, und 5 bis  $5\frac{1}{2}$  Pfund schwer. Die Glieder erscheinen voller und mehr gerundet. Die Kopfknochen nähern sich mehr, Seitenfontanellen und die Hinterhauptfontanelle werden kleiner. Auf dem Kopf zeigen sich Haare, und auch an den Augenbraunen und den Augenwimpern kommen statt der Wollhaare kleinere festere Härchen hervor. — Man behauptet, daß ein Kind in diesem Alter geboren, nicht so leicht zu erhalten sei, als ein acht Monate altes Kind.

10. Monat, oder 36. bis 40. Woche der Schwangerschaft. Der Embryo reift nun der dem zeitigen Kinde zukommenden Vollkommenheit entgegen. Dieses ist gewöhnlich 18 bis 20 Zoll lang,  $6\frac{1}{2}$  bis 7 Pfund schwer. Der Querdurchmesser des Kopfes beträgt gewöhnlich  $3\frac{1}{4}$  bis  $3\frac{1}{2}$  Zoll, der große Durchmesser  $4\frac{1}{4}$  bis  $4\frac{1}{2}$  Zoll, der Diagonaldurchmesser 5 Zoll, die Peripherie 13 bis 15; die Schulterbreite  $4\frac{1}{4}$  bis  $4\frac{1}{2}$  Zoll, die Trochanterdistanz  $3\frac{1}{4}$  bis  $3\frac{1}{2}$  Zoll. Die Stärke des ausgetragenen Kindes ist zwar sehr verschieden nach der Größe und Stärke der Aeltern, ihrer Lebensart, der Gesundheit der Mutter während der Schwangerschaft, zufälligen Einflüssen während dieser Zeit, der Beschaffenheit des Mutterkuchens, der Jahreszeit, und man muß bei der Beurtheilung der Reife und Unreife eines Kindes immer darauf Rücksicht nehmen; indessen zeichnet sich doch das ausgetragene Kind meistens von dem unreifen durch mehrere Wölbungen der Glieder, Völle, Stärke und Proportion der Theile hinlänglich aus. Die Haare des Kopfes sind schon ziemlich lang, die Augenbraunen und Augenwimpern haben sich gebildet, die Wollhaare meistens verloren; sind sie an einzelnen Theilen noch vorhanden, sind sie doch kurz und ohne Glanz. Die Nägel an den Fingern und Zehen sind fest, ragen zuweilen über die Fingerspitzen hervor. Die Farbe der Haut ist röthlich. Die Ränder der Kopfknochen liegen nahe an einander, die Ecken dieser Knochen, welche die kleine Fontanelle bilden, haben sich ganz an einander gelegt; die große Fontanelle ist noch 1 Zoll bis 1 Zoll und einige Linien breit. Das Gesicht hat nicht mehr das ältliche Ansehen, wie bei dem unreifen Kinde. Die Brust ist gehörig gewölbt; Arme und Schenkel haben die zukommende Stärke und Muskelkraft. Der Hodensack ist gerunzelt, nicht mehr so roth, beide Hoden liegen in ihm. Bei dem weiblichen Kinde we-



die kleinen Lezen zum Theil von den größeren bedeckt, und die Nabelschnur ragt nicht mehr so weit hervor.<sup>31</sup>

Die gewöhnliche Größe des Eies ist folgende: der lange Durchmesser beträgt 10 $\frac{3}{4}$  bis 11 Zoll, der Querdurchmesser 7 Zoll, der Umfang 18 $\frac{1}{2}$  bis 19 Zoll; der größte Durchmesser des Mutterkuchens beträgt meistens 9 Zoll, seine Peripherie 22 bis 24 Zoll, seine Dicke 1 Zoll, sein Gewicht 1 Pfund.

Aus der Vergleichung dieser Beschreibung einer reifen Frucht mit einem Embryo's aus dem siebenten bis neunten Monat ergeben sich die Merkmale einer unreifen Frucht. Die hauptsächlichsten sind: der Körper ist mager, die Haut faltig, roth, an einzelnen Theilen der Hände und Fußsohlen blau mit feinen Wollhaaren besetzt. Die Ränder der Kopfknochen sind weit von einander entfernt; Fontanellen sind groß, daher lassen sich die Kopfknochen betrachten und leicht hin- und herschieben; das Gesicht ist noch nicht ganz entwickelt, sieht verdrießlich und ältlich aus; die Haare des Kopfes sind kurz, zart und weißlich, Augenbraunen und Augenwimpern sind noch Wollhaare, oder doch sehr klein und glatt; die Augen sind selten geöffnet; der Hodensack ist roth, wenig gerunzelt, zu Ende des siebenten und im achten Monat öfters noch leer. Beim männlichen Kinde stehen die größern Schamlezen von einander ab, die Clitoris ist groß. Die Warzen der Brüste sind noch so klein als Stecknadelkopf. Die Länge und das Gewicht geben nun zusammen genommen mit den übrigen Zeichen richtige Merkmale ab; im allgemeinen kann man annehmen, daß Kinder, die viel weniger wie 5 bis 6 Pfund, und beträchtlich kleiner sind als 18 Zoll, unreif sind. Auch ist ihre Stimme immer schwach, und sie schlafen unbeständig.

Aus der Beschreibung der Ausbildung des Fötus ergibt sich auch, daß er nicht in allen Monaten gleich schnell zunimmt. Er wächst schneller im ersten Monat, langsamer im zweiten, schneller im dritten, langsamer im Anfang des vierten, wieder schneller von der Hälfte des fünften bis zum siebenten Monat, dann langsamer und mehr in der Dicke bis zur Reife.

Eine Frühgeburt, eine frühreife Geburt, (Partus praecox) oder eine Frucht von der 28. bis 32. Woche der Schwangerschaft, im achten Mondes- oder siebenten Sonnenmonat an, bis zum neunten Mondesmonat kann unter sehr sorgfältiger Pflege fortleben; doch sterben die meisten so frühzeitig gebornen Kinder.

Der gewöhnliche Termin zur Reife der Frucht ist die 38. oder 40. Woche des zehnten Mondes- oder neunten Sonnenmonats; hat man auch glaubwürdige Beispiele, daß Kinder später geboren worden sind, und diese nennt man spätreife Geburten, (Partus serotinus,) und sie zeichnen sich gewöhnlich durch größere Größe, Härte, Wölle und Länge aus; das Gewicht beträgt gemeinlich mehr als 8 Pfund, die Länge über 21 Zoll; der Kopf ist sehr groß; die Fontanellen lassen sich nicht leicht über einander schieben; die Fontanellen sind ganz oder fast ganz geschlossen. Die Kopfhaare sind

<sup>31</sup>) Hunter an, Tab. VI. n. folg. Albin, tabul. uter. muliebr. gravid. Tab. 2 — 6.

lang, die Nägel fest; öfters sind schon einige Schneidezähne im Durchbrechen begriffen; die Stimme ist sehr stark.

Ueber den äußersten Termin einer spätreifen Geburt hat man aber viel gestritten; jetzt kommen die meisten Schriftsteller darin überein, daß man das Ende des zehnten Sonnen- oder eilften Mondesmonats als den letzten Termin ansehen könne. Leicht kann aber bei der Berechnung der Zeit der Schwangerschaft ein Irrthum Statt finden, da die Frauenzimmer nur selten den Tag der Empfängniß mit Gewißheit angeben können; es ist daher zweckmäßig, vierzehn Tage vor dem Tage an, da die Menstruation zum ersten Mal ausblieb, zurückzuzählen, und von dem vierzehnten Tag an die Rechnung auf 280 Tage anzufangen.

Doch ist dabei zu bemerken, daß manche Weiber die Reinigung mehrere Monate lang nach der Empfängniß noch behalten, und da das Ausbleiben derselben daher nicht jederzeit den richtigen Moment zur Rechnung bezeichnet. Auch muß man immer auf die Körperbeschaffenheit und Gesundheit der Mutter Rücksicht nehmen.

Gewöhnlich erzeugt der Mensch nur Eine Frucht, indessen bilden sich auch zuweilen mehrere. Nach Süßmilch verhalten sich die Zwillinge zu den einfachen Geburten wie 1 zu 65 bis 70. Auf 6500 Geburten rechnet man ungefähr ein Drillingsgeburt. Unten 20,000 Geburten soll kaum eine Vierlingsgeburt vorkommen, Fünfling unter einer Million Geburten kaum ein Mal. Die Fälle, welche man von sieben bis fünfzehn auf ein Mal gebornen Kindern erzählt, verdienen keinen Glauben.

2) Beschreibung der Entwicklung der wichtigsten Organe des Embryo's.

a) Herz und Gefäßsystem<sup>32</sup>. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß, der Entwicklung des Hühchens im Ei ähnlich, auch bei den Säugethieren und dem Menschen die Bildung des Embryo's mit den größern Gefäßstämmen und dem Herzen beginne, und daß diese vor dem Chorion, also dem Ei, aus sich erzeugen. Mit Gewißheit läßt sich hier nichts bestimmen, sondern nur aus der Analogie mit Wahrscheinlichkeit schließen. Vermuthlich entstehen in den ersten Tagen nach der Empfängniß im Innern des durchsichtigen Eies, welches eine wasserhelle Flüssigkeit enthält, feine Blutstreifen, welche sich zu Aderstämmen in einem Kreis von Gefäßen da vereinigen, wo die Bildung des Embryo's beginnen soll. Aus diesem Gefäßkreis kommt die Hohlader und die Aorta hervor, in deren Mittelpunkt sich das Herz bildet, welches uns als röthlicher Punct beim Embryo der Säugethiere, als hüpfender Punct, (Punctum saliens,) beim Hühnchen erscheint, und somit ist zu dem Embryo die erste nothwendige Bedingung des Hervorbildens aus ihm selbst von dem Ei aus übergegangen.

32) Vgl. besonders J. F. Fr. Lobstein *Observations anatomico-physiologiques sur la circulation du sang dans l'enfant, qui n'a pas respiré*, à Paris 1805, 3., Halleri, diss. de foramine ovali et Eustachii valvula Goett. 1748, u. ej. icon. anat. Fasc. IV. Wolf comm. de foramine ovali ejusque usu in dirigendo motu sanguinis, in Nov. Comment. Petropol. Vol. XX. p. 357. Lobstein diss. resp. Dieboldt de valvula Eustachii, Argent. 1771, 4., Dieboldt diss. de foram. ovali, Argent. 1771, 4.



Von dem Herzen und den großen Gefäßstämmen aus bilden nun Stämme und Zweige in mannigfachen Verzästelungen, und meistens werden von dem Innern des Embryo's allmählig heraus sichelt, indem ihnen vom Ei der nahrhafte Stoff zugeführt wird, nur einige Theile entgegengebildet werden.

Da bei den Embryonen bis gegen die siebente Woche das Zwerchfell fehlt; so liegt das Herz mit den Eingeweiden des Unterleibs in der Höhle, die nach vorn offen ist, und man sieht durch die noch dünnen Hautbedeckungen die Organe durchschimmern; von jener an tritt zwischen Brust und Unterleibshöhle das zuerst ganz häu- Zwerchfell, welches im dritten Monate erst deutliche Muskelfasern zeigt; das Herz liegt dann noch unmittelbar über der Leber und theilt in zwei gleich große neben einander liegende Hälften getheilt; nach rechts zu liegende begreift die Herzohren, die linke beide Herzkammern, auf dieser läuft der Länge nach eine Vertiefung her, das untere Ende bilden zwei rundliche Spitzen. Es hängt fast ganz gerade von oben nach abwärts. Die Form des Ganzen ist rundlich, rechteckig, und im Verhältniß zu dem Fötus sehr groß. Die beiden Herzkammern und die beiden Herzohren stellen aber nur Eine Höhle dar, zwischen welchen sich allmählig die Scheidewände erst hineinbilden, so daß in den ersten Monaten, (bis zum dritten Monate?) in der Scheidewand zwischen den Herzkammern eine ähnliche Oeffnung zeigt, wie wir sie bei der Geburt des Kindes noch in der Scheidewand zwischen den Vorkammern finden. Die Herzohren sind beträchtlich groß, und gehen fast in gleichförmiger Weite in die Herzkammern über, die klein sind; die Ohren und eigentlich Vorhöfe bilden auch ohne Zusammenziehung oder Vorragung eine Höhle. Die Vorhöfe gehen unmittelbar in einander über, gleichsam als Fortsetzungen der Hohlvenen, und man kann mit Wolf annehmen, daß die Hohlvene in das linke und rechte Herzohr zugleich öffnet; beide Ohren werden nämlich nur durch den obern Rand des eirunden Loches in einen linken und rechten Theil getheilt. Beim zweimotthlichen Fötus ist der linke Theil, oder Vorhof, der größte, weil das Blut unmittelbar aus der Hohlvene in diesen Theil übergeht; die Eustachische Klappe befördert dieses noch durch ihre Größe und Richtung. Die Scheidewand erscheint zuerst wie ein schmaler Ring, der eine Oeffnung, das eirunde Loch, (*Foramen ovale*,) einschließt; dieser Ring wird breiter, die Oeffnung enger, und es fängt im dritten Monat die Bildung der Klappe des eirunden Loches, (*Valvula foraminis ovalis*,) an.

Im zweiten Monat und in der ersten Hälfte des dritten steigt die Lungenarterie fast gerade, wenig rechts in die Höhe, so daß es auszu- scheint, als entspränge sie zugleich aus der linken Herzkammer. Nahe bei dem Herzen kommt aus ihr ein Canal hervor, der zu der Aorta geht, der arteriöse Gang, (*Ductus arteriosus Botalli*,) welcher bestimmt ist, das Blut, welches in die rechte Herzkammer, und aus dieser in die Lungenarterie gekommen ist, in die Aorta zu führen, da beim Embryo der kleine Kreislauf durch die Lungen noch nicht Statt findet. Die Aorta entspringt dicht neben der Lungenarterie, weit nach rechts; so daß sie aus der rechten Herzkammer her-

vorzukommen scheint, und einen unbedeutenden Bogen macht. Nach und nach gehen die rundlichen Spitzen des Herzens in ein stumpfes Ende über; die Einschnitte, als Spuren der Theilung in zwei Kammer, werden seichter; das Herz nimmt eine länglichrunde Form und die ihm auch beim Erwachsenen zukommende Lage von der rechten nach der linken Seite zu, an. Die Herzkammern werden größer als die Vorhöfe, die Herzohren nähern sich dem Verhältnisse, welches sie beim reifen Kinde zu den Vorhöfen haben. Die linke Herzkammer ist Anfangs größer als die rechte; je mehr sich der Fötus der Geburt nähert, desto mehr nimmt auch die rechte Herzkammer an Größe zu, und wird der linken gleich. Der linke Vorhof des Herzens ist in der frühern Zeit, (bis zum zweiten Monat,) größer und dicker als der rechte, allmählig vergrößert sich auch dieser, so wie sich die Klappe des eirunden Lochs mehr ausbildet, die Eustachische Klappe weiter nach links gedrängt wird.

Die Klappe des eirunden Lochs wird durch eine Verdoppelung der innern Haut der Vorhöfe gebildet; sie erscheint zuerst wie eine ganz schmale Hervorragung und vergrößert sich allmählig so, daß sie gegen den siebenten Monat, wenn sie sich an das nun kleinere eirunde Loch anlegt, dieses bedeckt. Das eirunde Loch wird von einem ringförmigen Rand umgeben, der etwas dicker ist, als die Scheidewand, (*Limbus foraminis ovalis*;) mit diesem hängt der untere größere, convex Rand der Klappe zusammen; der obere kleinere concave Rand ist frey dem obern Theil des Ringes zugewandt, so daß zum Durchgang des Bluts ein Zwischenraum bleibt, der Rücktritt aber aus dem linken Vorhof in den rechten erschwert wird. Im fünften Monat gemeinlich fangen die beiden Enden des concaven Randes an, wie Zipfel hervorzuragen, Haller nennt diese Hörner, (*Cornicula*). So wird also das eirunde Loch allmählig enger, welches im Anfang des zweiten Monats so weit ist, daß noch gar keine Scheidewand zwischen beiden Vorhöfen sich zeigt. Nach der Geburt wird es durch Verwachsen der Klappe mit der Scheidewand der Vorhöfe ganz geschlossen.

Die Eustachische Klappe, (*Valvula Eustachii*,) liegt an der Mündung der Hohlvene; sie wird von der Haut der Vene und der vordern Nebenkammer gebildet, und geht von dem unteren linken Theil des Ringes des eirunden Lochs schief vorwärts, und recht zu der vordern Seite der Mündung der untern Hohlader. Ihre eine Fläche ist dem Eingang in die rechte Herzkammer, die andere der Mündung der untern Hohlader zugekehrt. Sie hat eine sichelförmige Gestalt; der concave Rand ist aufwärts gewandt. Es ist diese Klappe im Fötus von zwei Monaten verhältnismäßig am größten und so gerichtet, daß sie das Blut aus der untern Hohlader leicht in das linke Herzohr leiten kann. So wie das eirunde Loch sich verkleinert und die Klappe desselben wächst, wird die Eustachische Klappe weiter links gegen die venöse Oeffnung der rechten Herzkammer geschoben; sie wächst nicht verhältnismäßig mit den übrigen Theilen des Herzens, es vermindert sich daher die Leichtigkeit, das Blut nach dem linken Herzohr hinzuleiten. Bei neugeborenen reifen Kindern, noch mehr bei Erwachsenen ist sie durchlöchert. — Die Bestimmung dieser Klappe



das Blut der untern Hohlader in den linken Vorhof zu leiten das Hinabsinken desselben aus der obern Hohlvene in die untere Vorhöfen.

Das Herz wird von einem weiten und dünnen Herzbeutel umgeben, der Anfangs nur leicht mit dem Zwerchfelle verbunden ist.

Die Arterienstämme und ihre Aeste bilden sich aus dem Hauptstamme hervor, und eben so die Venen zu dem Hauptstamme hin; sind zart und zahlreich, alle Theile werden dicht von ihnen durchsetzt. Die Saugadern bilden sich auch schon zeitig. Die Ernährung des Embryo's ist vorzüglich durch die Einsaugung der Lymphflüssigkeit vermittelt, auch in dem neugeborenen Kinde ist das Saugader-System noch vorherrschend thätig, und zeitig findet man beim Kinde kleine Saugaderdrüsen.

In der Anordnung der Blutgefäße finden wir folgendes dem Embryo eigenthümliche.

Eine eigene Vene, die Nabelvene, (*Vena umbilicalis*), und Arterien, die Nabelarterien, (*Arteriae umbilicales*), unterhalten den Blutlauf zwischen dem Embryo und dem Mutterkuchen. Die Nabelvene kommt aus dem kindlichen Theil des Mutterkuchens, durch den Nabelring schräg aufwärts, und rechts an dem vordern Rand des Aufhängebandes der Leber, durch die linke längliche Wunde, (*Fossa longitudinalis anterior sinistra*), rückwärts zum Ende der Quergrube, (*Fossa transversa*). Nun theilt sie sich in zwei Aeste; der rechte, größere, (*Vena communicans*), geht in den linken Ast der Pfortader, der kleinere, der Blutabergang, (*truncus venosus Rotalli, s. Arantii, s. Glissonii*), senkt sich in die untere Hohlvene da, wo sie hinter der Leber in die Höhe geht. Hier nennt man die häutigen Verlängerungen, welche sich am Anfang und Ende desselben im Inneren finden, Klappen, weil sie dem durchgehenden Blute seine Richtung geben sollen. So gelangt der größte Theil des Bluts zuerst in die Leber, und durch die Lebervenen in die untere Hohlader, nur der kleinere Theil unmittelbar in diese.

Nach der Geburt verschließt sich die Nabelvene und der Blutabergang, jene bildet beim Erwachsenen das runde Band der Leber, (*Ligamentum teres*).

Das Blut geht aus der untern Hohlader, größtentheils der rechten Herzkammer vorbei, in den linken Vorhof, allein nach den verschiedenen Perioden der Entwicklung des Embryo's doch auch mehr oder weniger in die rechte Herzkammer, und um dieses Blut in die Aorta zu führen, ist der arteriöse Gang vorhanden. Daß die Quantität des Bluts, welches diesen Weg nimmt, nicht gering ist, läßt sich leicht vermuthen, weil man vom fünften Monat an den Anfang der Lungenarterie beim Embryo weiter findet, als den Anfang der

arteriöse Gang schließt sich nach der Geburt gemeiniglich als das eirunde Loch. Da über dem arteriösen Gang hinaus das Blut in die Lungenarterien gelangt, so sind diese klein.

Größe der Arterien richtet sich übrigens nach den verschiedenen Perioden des Fötuslebens. Die Gefäße der Leber, d. h. sind

schon zeitig ziemlich groß; die Schilddrüse, die Brustdrüse, die Nieren erhalten verhältnißmäßig größere Gefäße, als beim Erwachsenen.

Die Beckenarterie, (*Arteria hypogastrica*), ist weiter als die Schenkelarterie, und aus einer jeden entspringt eine Nabelarterie, (*Arteria umbilicalis*), sie geht zu beiden Seiten der Harnblase schräg aufwärts gegen den Nabelring zu, vereinigt sich mit den Nabelvenen und dem Urachus, um durch den Nabelring nach dem Mutterkuchen zuzugehen, und das Blut zu diesem zurückzuführen.

Nach der Geburt schließen sich die Nabelarterien, vom Nabel ab gegen die Blase zu, so daß nun in der Nähe dieser ein kleiner Theil offen bleibt. Bis zum Anfang des dritten Monats steht das Nabelbläschen, durch die Gefäßgefäße, (*Vasa omphalo-mesenterica*), einer Arterie und einer Vene, mit dem Gefäße in Verbindung.

b) Gehirn, Rückenmark, Nerven<sup>31</sup>.

Im ersten Monat ist der Kopf und die Carina, (der Theil, in dem sich das Rückenmark bildet,) noch ganz durchsichtig; eine helle Flüssigkeit füllt sie aus. Im zweiten Monat sieht man in der auch noch fast durchsichtigen Carina einen Canal, der sich im Kopf zu einer ründlichen Blase erweitert, (die Hirnblase,) welche eine weißlich fast durchsichtige Flüssigkeit enthält. Gegen das Ende dieses Monats kann man die harte Hirnhaut und die Gefäßhaut mit dem Vergrößerungsglase erkennen; die Hirn- und Rückenmarksmasse zeigen sich wie eine breiige Masse, von der Consistenz des Eiweißes; durch Weingeist kann man sie erhärten, und dann sieht man die Rudimente des Rückenmarks. Zu Anfang des dritten Monats sieht man die durch Weingeist erhärtete Rückenmark verhältnißmäßig schon als einen ziemlich starken, länglichen Körper, der sich nach oben zu in einen Wulst endigt, welcher das verlängerte Mark, die vierte Hirnhöhle, das kleine Gehirn und die ersten Anfänge des großen Gehirns enthält. Diese bestehen aus den vier Hügelu, den Hirnschenkeln, den gestreiften Körpern. Von dem Hirnknoten, den Commissuren, den Balken, den Fornix sieht man noch keine Spur.

Nerven kann man noch nicht erkennen.

Die Masse zeigt sich wie aus kleinen Kugeln oder Körnern gebildet. In der zweiten Hälfte des dritten Monats ist das Rückenmark bis ins Kreuzbein ausgebehnt; es fehlt der Pferdebeschweif, und in der Mitte sieht man die der Länge nach hinabgehende Höhle. Im großen Gehirn bemerkt man den Anfang der Bildung des Balkens und der Brücke, die Seitenhöhlen sind platt aus einander gezogen, die Hemisphären sind sehr niedrig, glatt, ohne Windungen, und gleich zwei hohlen membranartigen Blasen.

Nach Nerven kann man nun erkennen.

Im vierten Monat ist das Rückenmark verhältnißmäßig noch so lang. Die Brücke ist gebildet, die Bildung des Bogens, (Fornix) hat angefangen. Die Masse ist sehr weich und breiig.

32) Vgl. Carné Versuch einer Darstellung des Nervensystems und insbesondere des Gehirns, Leipz. 1814, 8. Tiedemann's Anatomie und Bildungslehre des Gehirns im Fötus des Menschen, Nürnberg. 1816.



Der fünfte Monat bringt zuerst die Rudimente der Bindungen hervor, es entwickeln sich der Balken, die vordere und hintere Commissur, die Hirnscheidewand.

Im sechsten Monat zeigen sich die Theile der Seitenhöhlen deutlich, der große Seepferdesfuß erscheint im Anfang wie eine Falte. Der Balken, der Bogen und die Hirnscheidewand nähern sich ihrer Ausbildung. Das Rückenmark erstreckt sich noch bis in das Kreuzbein, es enthält deutlich einen Canal, der gegen den siebenten Monat sich anfüllen scheint.

Bis zum achten Monat ist das Gehirn im Innern der Form und Structur nach ausgebildet; es entwickeln sich nur noch die peripherischen Gebilde; die Bindungen des großen Gehirns werden deutlicher, und nehmen so wie die Blättchen des kleinen Gehirns an Zahl zu. Alle andern Gebilde werden größer und stärker. Die Masse ist etwas consistenter, ist aber doch beim reifen Kinde noch ziemlich weich. Sie wird durch die Gefäße der Gefäßhaut erzeugt, die von der inneren Fläche dieser ausgehen, und sich in die Hirnsubstanz eintragen. Schichtenweis von innen heraus wird sie aufgetragen, in Form von Fasern auf die zuerst gebildeten Fasern. Ein Unterschied zwischen grauer und Markmasse läßt sich beim Embryo nicht deutlich wahrnehmen, alles erscheint gleichförmig, weißröthlich.

Im Verhältniß zu dem Körper des Fötus ist das Gehirn viel größer und schwerer als beim Erwachsenen. Das Gehirn eines viermonatlichen, von 15 Loth 14. Gran schweren Embryo hat 1½ Loth 43 Gran gewogen, fast den siebenten Theil der Schwere seines Körpers.

Das Gehirn eines reifen Kindes beträgt gewöhnlich 26½ bis 27 Loth. Die harte Hirnhaut ist verhältnißmäßig ziemlich stark und hängt mit vielen Blutgefäßen mit dem Knochen der Hirnschale zusammen.

Die Schleimhaut ist sehr zart; die Gefäßhaut ist fein, gefäßreich und innig mit der Hirnmasse verwebt.

Obgleich die Nerven ihre relative Bildung erhalten, so sind sie im Verhältniß zu der Größe des Embryo's von beträchtlicher Größe, aber zart. Besonders zeichnen sich der Geruchs- und Sehnerv durch ihre Größe aus. Der Geruchsnerv ist rundlich, dick und hohl.

3) Sinnesorgane.

Die Augen erscheinen schon zu Ende des ersten Monats als kleine runde Punkte oder Ringe, die an dem obern Theile des Kopfes an den Seiten hingerichtet sind; sie nehmen schnell an Größe zu, und sind im Verhältniß zu dem Kopfe sehr groß, in einem Embryo des vierten bis fünften Monat gleichen sie beinahe dem dritten Theile des Kopfes. Gegen das Ende des zweiten, oder im Anfang des dritten Monats fängt die Bildung der Augenlider an; denn bis dahin sind die Augen unbedeckt; wie kleine Wulste zeigen sie sich zuerst, und schließen nach dem Mittelpunkt zu, und schließen das Auge ganz zu; durch einer kleinen Wulst an dem Rand derselben ist die Spalte angedeutet, so daß man sie bis zum neunten Monatsmonat nicht leicht von einander ziehen kann; in diesem Monat trennen sich die Augenlider, und die Augenwimpern, so wie die Augenbrauen, welche im fünften und sechsten Monate nur durch kleine Punkte angedeutet waren, bekommen feine und glatte Haare.

Bei der ersten Bildung der Iris in der ersten Hälfte des zweiten Monats sieht man sie außen und oben, als eine schmale Hervorragung; innen und unten mangelt sie ganz; in der weitem Entwicklung findet man sie in dieser Gegend immer etwas schmaler. In der zweiten Hälfte des dritten Monats ist die Bildung der Iris nicht allein vollendet, sondern es hat sich auch eine sehr zarte Haut gebildet, welche das Sehloch verschließt, die Sehlochshaut, (*Membrana pupillaris*;) und im neunten Monatsmonat erst zu verschwinden anfängt; in diesem Monat sieht man dann noch kleine fluctuierende Gefäße am Rande der Iris, und gegen das Ende des zehnten Monats ist keine Spur jener Haut mehr zu sehen.

Die Crystalllinse liegt Anfangs dicht an der hintern Fläche der Hornhaut; nach und nach bilden sich erst die beiden Augenkammern, die bis zum neunten Monat durch die Sehlochshaut ganz von einander getrennt sind. Die vordere Kammer ist immer sehr klein, wo die Hornhaut nur wenig erhoben ist. Beide Kammern sind mit reiner Feuchtigkeit angefüllt. Die beiden Oberflächen der Crystalllinse sind sehr erhaben, und es hat dieselbe daher fast eine sphärische Gestalt. Die Häute des Auges sind dünn, und alle Theile von vielen zarten Blutgefäßen geröthet.

Die Bildung der innern Theile des Ohrs scheint zeitig beginnen; beim dritten und vierten monatlichen Embryo findet man die häutigen Bogengänge, (*Membranosi ductus semicirculares*) und ihren gemeinschaftlichen häutigen Sack, (*Alveus communis*) schon dicker und fester, als beim Erwachsenen, und mit einer besondern schleimigten Hülle überzogen. — Das Paukenfell ist rundlich liegt mehr horizontal, und ist nach außen mit einer dünnen Lage einer schleimartigen Masse, (*Lamina mucosa*;) überzogen; die Paukenhöhle enthält eine röthliche Flüssigkeit. — Die Eustachische Trompete ist noch ganz häutig. — Der äußere Gehörgang ist Anfangs häutig, nach und nach wird er knorplich; aber auch bei einem reifen Kinde findet man ihn noch nicht knöchern, sondern das Paukenfell ist nur von einem nicht ganz geschlossenen knöchernen Ring umgeben.

In der ersten Hälfte des zweiten Monats bemerkt man zuerst da, wo sich der äußere Gehörgang bildet, längliche Spalten. Gegen das Ende dieses Monats sieht man in länglichen Wülsten neben der kleinen Spalte herunter Rudimente, fast aller einzelnen Theile des äußern Ohrs. Sie erscheinen Anfangs an einander gedrückt, so daß sie den Eingang in die Spalte verschließen; allmählig entfalten sie sich und treten in ein regelmäßiges Verhältniß gegen einander, daß sie vom vierten Monat nur noch an Größe zunehmen.

Die Nasen- und Mundhöhle bilden bis zur zweiten Hälfte des zweiten Monats eine Höhle. Gegen das Ende dieses Monats sieht man die Rudimente des Gaumens, der nun eine hufeisenförmige Oeffnung läßt. Die Oeffnung der Nasenhöhle ist länglich, und hinten sieht man die Rudimente der Nasenscheidewand. Die äußere Nase fängt erst zu dieser Zeit an, sich wenig zu erheben, und bildet sie langsam aus; sie ist beim reifen Kinde noch kurz und klein. Die innern Theile der Höhle sind sehr unvollkommen, die Stirn- und Keilbeinhöhlen fehlen ganz, die Oberkieferhöhlen sind unbedeutend, da



Bein ist noch wenig entwickelt, mehr knorplich als verknöchert. In der zweiten Hälfte des dritten Monats sehen wir den Gaumen und die Lippen ausgebildet. Die Zunge entwickelt sich von hinten hervor, hängt Anfangs aus der Höhle, die sich zur Mundhöhle öffnet, hervor; so wie diese und die Lippen die ihnen zukommende Form erhalten, so liegt sie zwischen den Lippen, dann dicht hinter dem Gaumen, und endlich da, wo sie nur noch an Größe zunimmt, wenig entfernt von der hintern Fläche derselben. Die Zahnhöhlenränder der Ober- und Unterbeine fehlen noch; da, wo sie sich bilden, sehen wir eine verhältnißmäßig breite Fläche, die mit dem Zahnfleische völlig bedeckt ist.

#### III) Organe der Verdauung und Blutbereitung.

Bis zu der ersten Hälfte des dritten Monats sieht man noch keine Trennung von dem Hals, der Kopf sitzt gleichsam zwischen den Schultern auf der Brusthöhle auf; von diesem Monat an hebt er sich, immer länger werdend, heraus, und die an ihm liegenden Theile entwickeln sich. Brust und Unterleibshöhle sind im Anfang durch ein häutiges, und endlich ein deutlich muskulöses Zwerchfell zwischen sie. Sie werden auf eine ähnliche Weise, wie bei den Hühnchen gebildet. Das Amnion zieht sich über sie hin und bildet die allgemeinen Bedeckungen derselben über; ihm bilden sie den Rücken entgegen von der Wirbelsäule aus. Nach vorn sind sie Anfangs offen, und schließen sich von dem obern Theil der Brust an, abwärts, von hinten nach vornen. Daher sieht man zuerst eine vierseitige begrenzte Stelle an der vordern Fläche des Körpers des Embryos mit einer durchsichtigen Haut bedeckt, durch welche Herz und Lungen durchschimmern; diese verkleinert sich, wird länglich viereckig und endlich durch das Brustbein und die dichtern Bauchdecken ganz verdeckt. Die Unterleibshöhle geht Anfangs schräg abwärts in den Afterstrang über; allmählig bilden sich die Bauchdecken von unten auf, und die Richtung dieses Uebergangs liegt mehr von hinten nach vornen.

Die Brusthöhle auch ganz ausgebildet, so ist sie beim neugeborenen Kinde noch verhältnißmäßig enger als beim Erwachsenen, weil das Zwerchfell, durch die Leber in dieselbe gedrängt, sehr gewölbt in sie hineinragt, und die Lungen noch nicht ausgedehnt worden sind. Rippen schimmern bei den zarten Embryonen durch die dünne Haut durch.

Die ersten Rudimente der Leber, Bauchspeicheldrüse, Milz, Nieren, Nebennieren, Lungen erscheinen als kleine, weiche, unförmliche Flecken, zum Theil die nahe gelegenen in einander geflossen. Allmählig heben sich die einzelnen Gebilde heraus.

Die Leber bemerkt man schon sehr frühzeitig; in der ersten Hälfte des dritten Monats ist sie so groß, daß sie fast die ganze Unterleibshöhle ausfüllt, und alle Organe derselben bis auf die Harnblase und die äußern Theile der innern Geschlechtstheile bei weiblichen Embryonen verdrängt. Bis zum vierten Monat dauert dieses große Uebergewicht im Wachsthum der Leber, dann wird es etwas gehemmt, und die Därme treten unter und neben ihr deutlicher hervor; doch ist sie auch beim Fötus noch beträchtlich groß. In den frühern Monaten liegt

die Leber fast senkrecht, allmählig nimmt sie die horizontale Richtung an. Ihre Farbe ist röthlich.

Die Gallenblase zeigt sich zugleich mit der Leber, ist aber klein und zusammengefallen; beim reifen Kinde ist sie mit einer röthlich-schleimigen, unschmackhaften Galle angefüllt.

Die Milz ist klein, röthlich, liegt mehr nach vorn zu.

Die Bauchspeicheldrüse ist verhältnißmäßig groß; auch ihr Ausführungsgang, wie dieses überhaupt von allen Ausführungsgängen gilt; sie ist röthlich und weich.

Der Darmcanal liegt beim Anfang seiner Bildung größtentheils in dem Nabelstrang, welcher sich nach der Unterleibshöhle zu trichterförmig erweitert. Das Nabelbläschen hängt mit dem Darmcanal zusammen, und ein Stück desselben scheint unmittelbar in dasselbe überzugehen. Welches, wo und wie die Verbindung Statt findet, müssen fernere Untersuchungen noch deutlicher ins Licht setzen.

Nach Oken und Kiefer wird der Darmcanal durch das Nabelbläschen ganz gebildet; der Blinddarm ist die Stelle, wo es anfängt, von wo aus aufwärts das Magen-, abwärts das Afterstück sich entwickelt, und jener Darm nebst dem wurmförmigen Anhang wäre demnach der Rest desselben<sup>34</sup>. Nach Meckel verbindet sich die Nabelbläschen mit einem Stück des dünnen Darmes, und die Divertikula der Därme sind Reste desselben<sup>35</sup>.

Höchst wahrscheinlich trägt das Nabelbläschen wirklich zur Bildung des Darmcanals bei; es wird ihm aber zugleich auch ein Theil derselben von dem Fötus aus entgegengebildet. — Denken wir uns Amnion, Chorion, Nabelbläschen gebildet, ehe die Entwicklung des Embryo's beginnt, und letztern mit dem Amnion und Chorion durch Gefäße verbunden; so können wir uns den Antheil des Nabelbläschens an der Bildung des Darmcanals vielleicht auf folgende Weise erklären: Zu der Zeit, wenn von dem Chorion aus Gefäße sich verlängern, um die Hauptstämme der Gefäße und das Herz des Embryo's zu bilden, und sich so in das nach innen gelegene Amnion hineinsenken, daß sie dieses umstülpen, und von diesem aus die Entwicklung der Haut des Embryo's zum Theil geschieht, wird auch das Nabelbläschen mit hinabgezogen; es bilden sich nun diesem Darmenden entgegen und vereinigen sich mit ihm, so wie auch Gefäßgefäße, (Vasa omphalo-mesenterica,) sich in das ihm entgegengebildete Gefäß einssenken.

Im Anfang ist der Darmcanal sehr kurz, der größte Theil liegt dem Nabelstrang, ein Stück geht in fast gerader Richtung in die Unterleibshöhle; der Magen liegt ganz senkrecht von der Speiseröhre aus gegen jenes Darmstück herunter; deutlich erkennt man ihn als eine Erweiterung der Speiseröhre und des Darmcanals. In der Speiseröhre hat Meckel in eine verschlossene Erweiterung, die Mundhöhle auslaufen sehen; ein anderes Stück des Darmes geht abwärts, um sich im After zu endigen. Etwas später, gegen die siebente Woche sieht man einige Darmwindungen im Nabelstrang; das in dem Unterleib liegende Darmstück ist noch kaum gewunden; der späte W

34) Die hierhergehörige Literatur s. unter dem Artikel El. 35) Meckel's u. Meckel's Archiv f. Physiol. 9. B. S. 447.



welchen dasselbe mit dem Magen früher machte, indem es sich demselben umbog, ist nicht mehr zu bemerken; denn eine kleine Windung des Darms hat sich schon in den Unterleib zurückgezogen.

Die Darmwindungen im Nabelstrang vergrößern sich, und liegen wie ein Knäuel am Eintritt in den Unterleib; das Nabelbläschen ist der achten Woche, oder dem Anfange des dritten Monats vermundet. Nach und nach bilden sich die Bauchdecken immer mehr, und in der zweiten Hälfte des dritten Monats findet man meistens den Darmcanal schon in den Unterleib ganz hineingezogen.

Beim vierten Monat, und von diesem an entwickelt sich der Darmcanal schneller und nähert sich bald der Form, wie wir ihn beim neugeborenen Kinde sehen. Der Magen nimmt nach und nach eine horizontale Lage an; es bildet sich an ihm der Grund aus; die dünnen und dicken Därme verlängern sich, und so wie dieses geschieht, bilden sich die einzelnen Darmstücke, so legen sich die drei Theile der dicken Därme in die ihnen zukommende Lage; die dünnen Därme nehmen das gehörige Verhältniß in Hinsicht ihrer Weite und Einmündung in den dicken Darm. Der wurmförmige Anhang, der früher mehr einer conischen Verengerung des Anfangs des dicken Darms nach war, wird enger, der Blinddarm fängt an stärker hervorzutreten.

Beim reifen Kinde sind die Därme sehr eng, ihre Häute sind dünn; die Herkringischen Klappen ragen wenig hervor; der After ist geschlossen, so daß er nichts durchläßt. Die Därme enthalten Kinderspech, (Meconium;) eine zähe, klebrige Masse, die in den dünnen Därmen gelbgrünlich, in den dicken dunkelgrün, schwärzlichgrün ist. Bis zum vierten Monat findet man es nur in den dünnen Därmen, von dieser Zeit an auch in den dicken.

Die Nieren sind verhältnißmäßig größer, die Harnleiter dicker, als beim Erwachsenen, und jene in mehrere Lappen getheilt. Sie sind vorn weit schmaler als hinten, so daß sie einen Theil des Nierenbeckens ganz unbedeckt lassen.

Die Nebennieren sind größer als die Nieren, und verhältnißmäßig größer als bei dem Erwachsenen. Schon im dritten Monat sind sie in Betracht der Größe des Embryo's sehr groß. Ihre Gestalt ist oval, nach oben etwas schmaler, die Farbe außen aschgrau, innen weißlich oder röthlich. In einer kleinen Höhle enthalten sie eine geringe Quantität einer gelblichen, bräunlichen oder röthlichen Flüssigkeit.

Die Harnblase ist groß, länglichrund, nach oben geht sie spitz aus, und ihre Häute gehen in einen Canal, die Harnblasenschneur, (Urethrus,) über. (S. den Artikel Ei.) Da die Beckenhöhle klein ist, so liegt sie ganz über den Schambeinen und reicht fast bis zum Nabel hinauf.

Die Drüsen der Brüste, (Mammæ,) sind klein, rundlich, röthlichweiß; man findet in ihnen meistens eine lymphatische Flüssigkeit, welche einige für das durch die Warzen eingesogene Schafwaschsalz halten; die Warzen sind klein und ragen von der Größe der Nabelwarze conisch hervor.

Die Schilddrüse, (Glandula thyreoidea,) entwickelt sich vor-

züglich vom dritten Monat an, und wird dann verhältnißmäßig größer als beim Erwachsenen; sie ist sehr gefäßreich und weißlich.

Die Brustdrüse, (*Glandula thymus*.) liegt hinter dem Brustbeine in der Höhle der Brustscheidewand; sie füllt einen großen Theil der Brusthöhle aus; sie fängt öfters gleich unter der Schilddrüse und bedeckt den obern Theil der vordern Fläche des Herzbeutels, den Uterus der Aorta, und die übrigen in dieser Gegend liegenden großen Gefäße; oben theilt sie sich in zwei Hörner. Sie besteht aus mehreren kleinen Stücken, die durch Zellgewebe mit einander vereinigt sind; sie ist sehr weich, sieht röthlichweiß aus; zerschneidet man sie, fließt ein lymphatischer, milchähnlicher Saft heraus. Einen Ausführgang hat man bis jetzt in ihr nicht aufgefunden. Nach der Geburt wird sie allmählig kleiner und verschwindet endlich ganz, daß man nur noch einige kleine Stückchen Fett als Spur derselben findet.

Die ersten Rudimente der Lungen zeigen sich wohl bald, allein sie selbst mit der Luftröhre und dem Kehlkopf bleiben doch bis zur Reife des Kindes unvollkommen entwickelt, da sie die ihnen zukommende Function nicht verrichten können. Zusammengefallen, leer, von dichter Masse, der Lebersubstanz ähnlich, liegen sie im hintern Theile der Brusthöhle; in den ersten Monaten wird die linke Lunge von dem Herzen fast ganz bedeckt; zu dieser Zeit ist die Farbe weißlich, später wird sie dunkelbräunlich. Da sie durch Luft nicht ausgedehnt sind, so sind sie specifisch schwerer als Wasser; schwimmen daher nicht auf demselben, so lange das Kind noch nicht geathmet hat, oder durch Fäulniß Luft in ihr entwickelt worden ist; auf diese Erscheinung ist die hydrostatische Lungenprobe gegründet.

Die Luftröhre ist eng, mit einer lymphatischen Flüssigkeit gefüllt. Der Luftröhrenkopf ist im Anfang häutig; die Anorpelmembran hat auch beim reifen Kinde noch wenig Festigkeit.

e) Die Entwicklung der äußern Geschlechtstheile ist schon bei Betrachtung der äußern Form des Embryo's beschrieben worden; es ist daher hier nur noch einiges über die innern Geschlechtsorgane hinzuzufügen.

Bei dem männlichen Fötus ist die Lage der Hoden in der Unterleibe, und ihr Hinabsinken in den Hodensack in dem achten oder neunten Monatsmonate, oder zwischen dem sechsten und dem achten Sonnenmonate, besonders bemerkenswerth <sup>36</sup>.

In den ersten Monaten sind die Hoden sehr klein; man hat bei einem dreimonatlichen Embryo  $\frac{1}{4}$  Linie lang, von Gestalt einer Erbse gleich gefunden. Die Nebenhoden sind im Verhältnisse zu den Hoden größer als bei den Erwachsenen. Bis zu der oben bemerkten Zeit liegen sie in der Unterleibshöhle unter den Nieren und desto tiefer an denselben, je jünger der Embryo ist. Das Bauchfell geht ihnen herunter und überzieht den Hoden und den Nebenhoden ganz.

36) Vgl. Wrisberg diss. de testiculorum ex abdomine in scrotum descensu, Goett. 1779. Brugnone comm. de testium in foetu positione et eorum in scrotum descensu, ed. Sandifort, Lugd. B. 1783. Leveillé recherches et observat. sur la position des testicules dans le ventre du foetus, et leur descente dans le scrotum, p. J. Fr. Lobstein Par. 1801. Seiler diss. de testiculorum descensu, Lips. 1817.



auf die Stelle, wo die Gefäße in sie treten, oder aus ihnen hergehen, eben so wie der Magen, die Därme von der Bauchhaut begeben werden, so wird die eigene Haut des Hodens, (Albuginea,) gebildet. Die Samengefäße, (Arteria et Vena spermatica,) der Samengang, (Vas deferens,) liegen an der hintern Fläche des Bauchfells, und werden von einem etwas dichteren Zellgewebe umgeben; indem diese Gefäße zu dem Hoden gehen, krümmen sie sich etwas auswärts und aufwärts. Zu dem untern Ende des Hodens geht eine nach hinten offene Falte des Bauchfells von der inneren Fläche des Bauchrings an, in die Höhe; der Scheidenfortsatz (Processus vaginalis, Vagina Halleri, Basis Girardii, Cylindrus Camperi;) diese umgibt das Leitband des Hodens, (Gubernaculum Hunteri;) dieses besteht aus Zellgewebe, welches aus dem obern Theil des Hodensacks und von der rechten Scheide des Oberschenkels in der Gegend des Bauchrings kommt, durch diesen in die Unterleibshöhle tritt, und von einigen Muskelfasern umgeben wird, die sich, leicht krümmend, von dem inneren schiefen und dem queren Bauchmuskel an ihm hinaufziehen. Das Zellgewebe, welches die hintere Fläche des Bauchfells überzieht, und die Nieren umgibt, (nach einigen die äußere Platte des Bauchfells,) hängt mit dem Zellgewebe des Hodensacks zusammen und geht also in dasselbe über, wie das Zellgewebe der äußern Fläche der Bauchhaut in das Zellgewebe des Halses. Zur angegebenen Zeit senkt sich der Hoden in dem Scheidenfortsatz, indem er ihn nach unten zu schneidet, und tritt allmählig durch den Bauchring in den Hodensack, indem er den Scheidenfortsatz mit sich hinabzieht, und so von dem Bauchringe an in den Hodensack hinein, schräg von außen nach unten zu einen Canal bildet, den Scheidencanal, der nach der Unterleibshöhle zu offen ist. Dieser Canal schließt sich aber nach und nach am oberen Ende des Hodens; so wird die eigene Scheidenhaut des Hodens gebildet, welche in einem ähnlichen Verhältniß zu diesem, wie der Herzbeutel zu dem Herzen, und in dem Samenstrang zu dem Scheidencanal übrig, auf welches Schreger zuerst genauer aufmerk- gemacht hat. — Die Samengefäße und der Samengang werden von einem etwas dichteren Zellgewebe umgeben, welches schon bei ihrer Lage in der Unterleibshöhle bemerkt wird; dieses ist die eigene Scheidenhaut des Samenstranges; die gemeinschaftliche Scheidenhaut des Samenstranges und des Hodens bildet jenes Zellgewebe, welches die äußere Fläche des Bauchfells bedeckt, und mit dem Zellgewebe des Hodensacks zusammenhängt, dieses Zellgewebe selbst, welches schon beim Herabsinken des Hodens in den Hodensack liegt, und in dem Hoden gleichsam hineinsinkt; endlich trägt auch das Zellgewebe, welches das Leitband des Hodens bilden hilft, dazu bei; Muskelfasern des schiefen und queren Bauchmuskels, welche diese umgeben, schlagen sich mit herunter, werden durch neue verstärkt, so bildet sich der Hodenmuskel, (Cremaster.) — Ehe man diese Theile genauer untersucht hatte, herrschten sehr verschiedene Meinungen über die Art, wie die Häute gebildet werden, welche den Hoden und den Samenstrang umgeben; der Raum gefüllt nicht, sie

anzuführen, und es würde auch keinen wesentlichen Nutzen gewähren jene auf irrige Voraussetzungen gegründete Meinungen, welche Dazumal ziemlich vollständig zusammengetragen hat, hier zu wiederholen; verweise daher auf dieses Buch. — Ueber die Ursachen, welche die Herabsinken der Hoden bedingen, hat man auch mancherlei Meinungen geäußert. Nicht unwahrscheinlich ist es, daß das nicht gleichmäßig fortschreitende Wachsthum des Leitbandes, (Gubernaculum Hunteri,) und die Wirkung der Muskelfasern etwas dazu beitragen, besonders da bei den Nagethieren, bei welchen die Hoden zur Zeit der Brunst, wenn sie und die Nebenhoden sehr anschwellen und zu groß werden für den Raum in dem Hodensack, in den Unterhinein, und wenn sie wieder klein geworden sind, in den Hodensack zurücktreten, ein ähnlicher Bau rücksichtlich der Muskelfasern, von den Bauchmuskeln zu der Scheidenhaut gehen, Statt findet. Allein reichen diese Ursachen aber doch wohl nicht hin, und es diese Wanderung vielleicht andern ähnlichen Wanderungen von Thieren, die wir an Thieren wahrnehmen, analog, wo wir auch wohl in der Schwere der Theile, noch in den Muskeln, noch in irgend einer andern mechanischen Wirkung eine genügende Ursache finden.

Die Samenbläschen sind noch sehr klein und unvollkommen; sie liegen höher als bei dem Erwachsenen, und sind röthlich.

Bei den weiblichen Geschlechtstheilen ist die frühere Form der Gebärmutter besonders bemerkenswerth. Sie erscheint Anfangs als die etwas erweiterte und verdickte Vereinigungsstelle der Trompeten, so daß sie viel Aehnlichkeit mit der langgehörnten Gebärmutter mancher Thiere hat; diese Form ändert sich nur langsam; im vierten Monat sieht man noch ganz deutlich zwei nur etwas größere Hörner als früher; erst vom Ende des fünften Monats an kehrt sich die Form mehr der menschlichen.

Die Eierstöcke gleichen bei dem Anfange ihrer Bildung häutigen Schläuchen, die mehrfach zusammengewunden sind; nach und nach verliert sich diese Form; sie werden etwas dichter, und bekommen eine dreieckige Gestalt. Anfangs liegen sie ganz nahe an dem untern Ende der Nieren; allmählig sinken sie weiter herab und kommen neben der Gebärmutter zu liegen. Rosenmüller<sup>37</sup> fand äußerlich am Eierstocke in dem breiten Bande, welches zwischen diesem und der Muttertrompete innen liegt, einen kegelförmigen Körper, welcher mit einer Spitze in das Ovarium überging, oder mit demselben verwachsen war, und mit seiner Basis gegen die Muttertrompete hing. Dieser Körper bestand aus lauter neben einander laufenden Gefäßen, ähnlich den Ausführungsgängen der Nebenhoden. Man kennt die Bestimmung dieses Körpers noch nicht.

f) Die Muskeln bestehen zuerst aus einer ganz gallertartigen Masse. Vom dritten Monat an werden sie mehr geformt, sind aber noch weich und weißlich, allmählig werden sie consistenter und roth; auch sind sie auch beim reifen Embryo verhältnißmäßig noch sehr weich. Sehnen kann man bis zum fünften Monat hin nicht deutlich erkennen, weil viele Blutgefäße sie durchdringen. Man hat dar-

37) nach Sellen a. a. O. Tab. 2.

38) Progr. quaedam de ovario bryonum et foetuum humanorum, Lips. 1802.



atten, wie die Sehnen entstehen, Boerhave, Douglas, Mayer und andere behaupteten, sie seien verhärtete Muskeln; andere nehmen hingegen und gewiß mit Recht an, die Stränge der Sehnen sei eigenthümlicher Art; dahin gehören Adolph Bray, Moscati, Hunter, Brisberg, Sommerring, Mel.

39. Knochen. Von der dritten Woche an, in welcher nach meisten Beobachtern der Embryo zuerst sichtbar wird, besteht das Ganze aus einer so leicht zerfließbaren Gallerte, daß man durchaus keine Spur findet, wo sich in der Folge die Knochen bilden werden. In der fünften Woche wird die gallertartige Masse im Ganzen auch als Grundlage der Knochenbildung etwas fester; gegen sechste Woche hat sich die hierzu bestimmte Gallerte schon so weit verdichtet, daß man ein, aus sehr zarter Knorpelmasse bestehendes, Skelette ähnliches Gebilde im Innern der Theile des Embryo's kennt und den ersten Verknöcherungspunct in der untern Kinnlade (dem Schlüsselbeine) bemerkt. Von nun an legen sich mehrere Knochenkerne und meistens in folgender Ordnung nieder: in der achten Woche in dem Oberschenkelknochen, dem Oberkiefer und Stirnbein, in der neunten in den Seitenscheitelbeinen, dem Oberarmbeine, der Handwurste, dem Elbogenbeine, dem Schien- und Wadenbeine; bis zur zehnten Woche sieht man schon in allen Knochen, auch in den Halswirbeln Knochenkerne; nur die Wirbelbeine sind noch ganz unentwickelt und zeigen den ersten Knochenkern in der dreizehnten Woche; in der vierzehnten bemerkt man das erste Rudiment eines Augenknochens.

Die Knochenkerne oder Puncte werden in den Knorpeln eingelegt, indem aus dem Blute, welches die tief in ihre Masse eindringenden Blutgefäße hinführen, der reichlich mit phosphorsaurer Kalkerde versehene Knochenstoff ausgeschieden wird, sich ein zellfaserartiges Gewebe bildet, in welchem nach und nach immer mehr Knochenstoff niedergelegt wird, bis der Knochen seine Festigkeit erhalten hat. In den kleinern, flachen Knochen legt sich gemeiniglich nur ein Knochenkern nieder, in den meisten aber, besonders in den viereckigen, findet man mehrere Knochenkerne, die zu gleicher Zeit, oder nacheinander entstehen; daher bestehen solche Knochen im Verlaufe der Bildung aus mehreren Stücken. Bei allen Knochen fängt die Verknöcherung mehr oder weniger in der Mitte an, und verbreitet sich von da nach den Enden zu, in den flachen Knochen plattenförmig, in den langen Knochen faserartig, der Länge nach, in den rundlichen und vieleckigen Knochen nach allen Richtungen zu. — In der vierzehnten Woche an, zu welcher Zeit, wie bemerkt worden ist, schon in allen Knochen Knochenkerne sich finden, geht nun in jedem einzelnen Knochen die Verknöcherung mehr oder weniger schnell vor sich; doch sind auch bei dem reifen Kinde, die Endknochen der Theile des Ohres ausgenommen, alle Knochen noch unvoll-

40. Albini icones ossium foetus humani, L. B. 1757. Reichel diss. de oss. ortu atque structura, Lips. 1760. Scarpa diss. de penitiori ossium structura, Lips. 1799. Seuff nonnulla de incremento ossium embryonum, Hallae 1801.

Kommen, und erhalten nur langsam ihre vollkommnere Ausbildung, so daß man bis zum 15. bis 16. Jahre zwischen Knochenansätzen und Mittelfrühen noch dünne Knorpelscheiben findet, die verknöchern müssen, ehe der Knochen seine gehörige Festigkeit erlangen kann.

Die Farbe der Knochen des Fötus ist röthlichgrau; je mehr Knochen Erde niederlegt, desto weißlicher werden sie. Die Masse ist elastischer als in der Folge, wo sie durch die erdigen Theile spröde wird. — Die Knochenhaut ist im Verhältniß zu den Knochen dick, röther, läßt sich leichter von den Knochen trennen. — Statt des Knochenmarkes findet man eine gallertartige Masse, die allmählig erst eine fettige Substanz verändert wird. — Die Knorpel sind noch dünn, weich, und im Anfange von den zahlreichen, rothes Blut führenden Gefäßen röthlich.

Da sich die Ränder der Kopfknochen des Embryo's nicht an einander legen, und die Ecken derselben mehr oder weniger abgerundet sind; so bilden sich da, wo diese Ecken zusammentreffen sollen, Dünungen, die nur durch die knorpelartige Haut geschlossen werden, welche bei der Bildung der Kopfknochen zur Grundlage dient. Diese Stellen nennt man Fontanellen, (Fontanellae.) Die größte Scheitel- oder vordere Fontanelle, das Blättchen, (Fontanela anterior, s. major, s. quadrangularis, Vertex palpitans,) liegt zwischen den vordern, innern Ecken der Scheitelbeine und den innern Winkeln des in zwei Hälften getheilten Stirnbeins; sie zeichnet sich daher durch die vier stumpfen Ecken und ihre fast viereckige Gestalt aus; sie bleibt am längsten unverknöchert. Die kleinere, hintere oder Hinterhauptsfontanelle, (Fontanella posterior, s. occipitalis, s. triangularis,) wird durch die beiden hintern, innern Ecken der Scheitelbeine, und die vordere Ecke des Hinterhauptbeins gebildet; sie hat drei Ecken, und daher eine dreieckige Gestalt. Gemeiniglich ist bei dem reifen Embryo diese Fontanelle fast ganz oder ganz geschlossen. An den Seitentheilen des Kopfes finden sich auf jeder Seite zwei kleinere Fontanellen, zwei zwischen dem Stirn- und Scheitel-, den Schläfebeinen und den Flügeln des Keilbeins in der Schläfegrube; zwei da, wo die Scheitelbeine, die Pyramide der Schläfebeine und das Hinterhauptbein an einander stoßen; man nennt die Seitenfontanellen, (Fontanella lateralis, s. Casseri,) je nachdem sie die vordern, diese die hintern.

Je jünger der Embryo ist; desto größer ist der Kopf im Verhältniß zu dem Rumpf; desto kleiner sind die Gesichtsknochen gegen die Hirnschale; desto niedriger der untere Theil des Gesichts, und auch bei dem neugebornen Kinde ist das Verhältniß dieser Theile noch nicht so gebildet, als wir dasselbe bei Erwachsenen finden, sondern allmählig tritt dieses nach der Geburt hervor.

Die Geschichte der Ausbildung einzelner Knochen findet sich in der besondern Beschreibung derselben.

h) Die Haut, (Cutis,) ist im Anfange der Bildung des Embryo's sehr weich, durchsichtig, weißlich; die Schafhaut geht unmittelbar in sie über. Die Oberhaut bemerkt man schon frühzeitig; die Malpighische Drüse ist sehr zart. Allmählig wird die Haut fester, so viele Gefäße durchbringen sie aber auch bei dem reifen Kinde; das



eröthete Farbe derselben. Der größte Theil des Körpers ist mit den Wollhärchen bedeckt, zwischen welchen auf dem Kopfe die Kopfhaare, die Augenbraunen und Augenwimpern als sehr zarte, glänzende Härchen hervorkommen, wie dieses bei der Beschreibung der äußeren Form des Embryo's bemerkt worden ist.

Der ganze Körper wird mit einer fettigen, schlüpfrigen Masse, dem Kindesschleim, (*Vernix caseosa*,) überzogen. Ueber den Ursprung dieser Masse ist man noch nicht einig; die meisten halten sie für einen Niederschlag aus dem Schafwasser, andere für die auf der Oberfläche angesammelte Ausdünstung des Kindes; vielleicht ist es ein Product, welches aus dem Schafwasser bei seiner Aufnahme in die Lymphgefäße der Haut ausgeschieden wird.

Das Blut <sup>40</sup> des ungeborenen Kindes unterscheidet sich von dem, nach welchem die Respiration begonnen hat, durch mehrere Eigenthümlichkeiten. Das arterielle und venöse Blut unterscheidet sich beim Fetus nur wenig; es besteht das Blut desselben aus viel Serum und wenig Blutkuchen; die Temperatur des Blutes ist gering, so wie die des Embryo's überhaupt; man hat in ihm nicht die geringste Quantität von Phosphorsäure entdecken können. Während der ständigen Entwicklung des Embryo's werden Form und Functionen der Organe so umgeändert, daß ihre Metamorphose in einzelnen Perioden der Bildungsstufe bestimmter Thierclassen entspricht, wie Kiel und Autenrieth <sup>41</sup> so treffend ausgesprochen haben, Meckel <sup>42</sup> für mehrere Organe so scharfsinnig dargestellt hat, und weitere Versuche für alle Organe einst wohl darthun werden.

Nicht minder wichtig ist die genaue Kenntniß der Formen der Organe des Fötus in verschiedenen Perioden der Entwicklung, da für die angeborne Mißbildungen in dem Stehenbleiben auf einer niedrigen Stufe der Entwicklung die Ursache der ihnen zukommenden besonderen Form gefunden wird, wie Autenrieth <sup>43</sup> an mehreren Beispielen, Meckel <sup>44</sup> ausführlich für die meisten Organe gezeigt hat.

33) Von den eigenthümlichen Functionen der zur Bildung und Ernährung des Embryo's bestimmten Organe.

Die beschränkten Bewegungen der Muskeln ausgenommen, beziehen sich alle Functionen der Organe des Eies und des Embryo's auf Bildung und Ernährung; es sind daher nur die hierhergehörigen Einrichtungen und der damit verbundene, dem Fötus eigenthümliche Kreislauf des Blutes zu betrachten. Da aber die Bildung und Ernährung in verschiedenen Perioden der Entwicklung von einem Organe mehr auf das andere übertragen wird, ja einige die in der frühesten Zeit vorzüglich thätige waren treten ganz zurück; so wird es die deutlichste Uebersicht gewähren, wenn wir die Bildung, die Ernährung und den Blutumlauf des Embryo's durch die verschiedenen Stufen der Entwicklung verfolgen.

Mit der Zeugung ist in der Materie die Thätigkeit zur vollständigen

40) Schütz praes. Autenrieth diss. c. exper. circa calorem foetus et sanguinem ipsius instituta, Tübing. 1799. Zimmermann de sanguine foetus nonnulla, Erlang. 1806. 41) Observat. ad hist. embryon. p. 25.

42) Beiträge zur vergl. Anat. 4. B. 1. St. S. 3. 43) a. a. O. S. 49 u. 37. 44) Patholog. Anatomie.

Entwicklung des Eies und des Embryo's mit allen seinen Theilen erregt, so wie in dem Samenforn die Thätigkeit zur Production des Stengels, der Blätter und Blüthen bis zu der Einwirkung günstiger Einflüsse ruht, und durch diese nach bestimmten Gesetzen sich zu entfalten beginnt. So wie aber hier eines nach dem andern sich bildet, und von innen heraus sich bildet; so entwickelt sich auch auf ähnliche Weise bei dem Embryo ein Organ nach dem andern. Wahrscheinlich wird durch eine fruchtbare Begattung in dem Zeugungsstoff der Mutter eine ähnliche Veränderung hervorgebracht, welche wir in dem befruchteten Ei der eierlegenden Thiere oder Hahntritt wahrnehmen. Der so befruchtete Zeugungsstoff der Mutter gelangt in die Gebärmutter, und nun beginnt die Bildung des Eies, so wie wir es mit seinen einzelnen Organen im Anfange der Schwangerschaft finden; es besteht dann aus Chorion, Amnion, dem Nabelbläschen, und auf der innern Fläche der Gebärmutter hat sich eine flockige, hinsinkliche Haut, (*Membrana decidua*.) erzeugt. Wie gebet der befruchtete Zeugungsstoff durch die Muttertrompeten in die Gebärmutter gelange, läßt sich mit Gewißheit nicht bestimmen. Die ältern Versuche der größten Physiologen, so wie die neueren Untersuchungen schätzbarer Beobachter lassen diesen Gegenstand noch unentschieden. Nach de Graaf nehmen die Urfänge der Frucht in dem Eierstocke eine blasenartige Gestalt an, und gehen so als Blase geformt durch die Trompeten in die Gebärmutter. Nach Haller wider in den Eierstöcken befruchtete Stoff als ungeformte Masse von den Franzen der Trompeten aufgenommen und durch diese in die Gebärmutter geführt. Die neuern Untersuchungen von J. Haigh ton am Kaninchen stimmten nicht für de Graaf's Meinung, die von Cruikshank an denselben Thieren angestellten Beobachtungen stimmen für diese Meinung; das Ei wird nach Cruikshank in dem Eierstocke gebildet, und geht aus demselben heraus nach der Begattung<sup>45</sup>. Aus dem Chorion des Eies verlängern sich nun wahrscheinlich einige Gefäße nach dem Punkte des Zeugungsstoffes hin, wo die Bildung des Embryo's beginnt, (der Punct, den man im Eie der eierlegenden Thiere den Hahntritt nennt;) es bilden sich darauf die Hohlvene, die Arteria, das Herz, und hiermit ist die Entwicklung der Theile des Embryo's von innen heraus gegeben, denen aber einige Organe des Eies sich entgegenbilden, eben so, wie von dem Chorion aus die Gefäße in den Zeugungsstoff sich hineinsenken, der zur Entwicklung des Fötus bestimmt ist, und nur von da aus der Urfang der Materie von innen heraus beginnt. So entwickelt sich das Nabelbläschen dem Darmcanal, das Amnion der Haut entgegen, um tragen zur Bildung dieser Theile bei. Die Allantois, (wo sich dieselbe findet,) der Urachus hängen auf eine ähnliche Weise mit der Harnblase zusammen und repräsentiren das harnabsondernde System in dem Eie. Schwer ist aber zu bestimmen, ob diese Theile sich von der Harnblase aus entwickeln, oder auch von dem Eie aus der Harnblase sich entgegenbilden, und so zu ihrer Erzeugung beitragen. Das erstere scheint deswegen wahrscheinlicher zu seyn, weil man die Allantois durchaus gefäßlos findet, keinen Gefäßzusammenhang mit dem

45) Zell's Archiv für Physiologie, 3. B. 3. H. S. 31. u. 74.



anten entdeckt; man kann sich nicht erklären, wie eine so ausgebreitete Blase, ohne Gefäße aus jenen Häuten zu erhalten, sich bilden; wohl aber wird die Entstehung derselben etwas deutlicher, wenn sie als eine Fortsetzung der Häute der Harnblase ansieht. Verhält sich mit der Allantois auf diese Weise; so findet nicht unwahrscheinlich mit dem Rudiment derselben, dem Urachus, derselbe Fall statt.

Sobald der Embryo und das Ei so weit gebildet sind, so wird Fötus der Nahrungsstoff höchst wahrscheinlich auf doppeltem Wege führt. Zuerst durch das Nabelbläschen, (nach Blumenbach, Zimmerling, Oken, Meckel und andern,) und den milchähnlichen Saft, den die flockigen Gefäße des Chorions aufnehmen, und von der innern Haut der Gebärmutter abgesondert wird. — Nach dem soll auch die Flüssigkeit, welche die Allantois enthält, oder eine ähnliche Flüssigkeit, welche man bei dem menschlichen Embryo zwischen dem Chorion und Amnion in den ersten Monaten findet, durch den Urachus in die Harnblase und zu den Nieren bringen, zu der Ernährung beitragen; allein es ist dieses aus mehreren Gründen nicht wahrscheinlich. — Gegen das Ende des zweiten, oder Anfang des dritten Monats verschwindet das Nabelbläschen, die Gefäße des Chorions fangen an, sich zum Mutterkuchen zu bilden, die Einsaugung durch sie hört nun nach einigen Physiologen nach andern hat nie eine Einsaugung Statt gefunden. Es ist doch höchst wahrscheinlich, daß der milchähnliche Saft, den die innere Fläche der Gebärmutter ausscheidet, und den man zwischen ihrer den Flocken der Gefäße der Gefäßhaut findet, zu dem Blute, welches der kindliche Theil des Mutterkuchens führt, gelange, und sich zu dieser Art der Zuführung des Nahrungstoffes nun noch die Aufnahme des Schafwassers durch die Lymphgefäße der Haut ge-

Ob das Schafwasser auch durch Saugen mit dem Munde von dem Embryo aufgenommen werde, ist noch nicht entschieden. Es scheinen für diese Art der Aufnahme die zur weitem Leitung einer solchen Flüssigkeit wohl taugliche Ausbildung des Darmcanals, und die Flüssigkeiten, welche man in dem Magen und Darmcanal in so großer Menge findet, daß man sie nicht wohl allein als Producte der Ausscheidung aus den Gedärmen ansehen kann. Man will auch in dem Magen der Schweinsembryonen die Rothbeeren gefunden haben, welche diesen Thieren bisweilen schon in dem Ei durch den After abgehen, und gefrorenes Schafwasser in der Magenhöhle, dem Munde und Magen von Kuhembryonen.

Es wird also der Ernährungsproceß des Embryo's durch die Einsaugung bedingt; was die Saugadern der Haut und des Darmcanals aufnehmen, gelangt durch den Milchbrustgang, wie bei dem gebornen Kinde, zu dem Blute; was durch die feinen Gefäßendigungen des Chorions und der Placenta vielleicht aufgenommen wird, gelangt reich zu dem Blute, welches durch die Nabelvene zu dem Fötus führt wird.

Das Blut muß aber in der den Ernährungsproceß regelmäßig erfordern Mischung erhalten werden; es ist nöthig, daß wenigstens viel von dem Kohlenstoff und Wasserstoff ausgeschieden, so viel





in pätern Monaten ist also der Kreis der Functionen, in denen das Leben sich darstellt. Wesentlich nothwendig ist für den Embryo zur, oder doch gegen die Zeit seiner Reise die Verbindung mit Mutter; hat er jene erreicht, dann ist er fähig, das selbstständige zu beginnen; der erste Act desselben ist das Athemholen, mit dem wird der Umlauf des Bluts umgeändert, und die Organe alle nach und nach in die ihnen für dieses Leben nothwendige jeder Stufe desselben angemessenen Wirksamkeit. (Vgl. Ge-  
(Seiler.)

### Hierher gehörige Schriften:

- Hippocratis de natura pueri l. in operib. et gr. lat. a J. Willichio Bas. 1542, 8., (c. Gorraei interpr. et scholiis c. libro de genitura, 1545, gall. tit. Histoire de la nature de l'enfant de G. Chretien, 1553, 8. Divi de Garbo recollectiones in Hipp. de natura foetus Venet. 1502, 1518, fol.)
- Alleni de formatione fetus l. et an omnes particulae fetus una formentur operib. et lat. c. nonnullis aliis vert. J. Guinthero, Paris. 1556, (Gall. Par. 1559, 8.)
- Ant. Zeno de natura humana, deque embryone lib., Venet 1491, 4.
- Acc. de Forlivio expositio in Avicennae capitulum de generatione filii, Ven. 1502, (1512, 1518.) fol.
- Ill. Caes. Arantii de humano foetu l. Rom. 1564, 4. (1571, 1587, Bas. 1579, 8., Lugd. B. 1579; 1664, 8.)
- Georg. Fabricii ab Aquapendente de formatu foetu l. Venet. 1600, 1620, fol. Patav. 1604, fol. Francof. 1624, c. aliis Patav. 1525, fol. et operibus.)
- Art. Eiceti de perfecta constitutione hominis in utero l., in quo causae et foetum constituentes, singularum functiones et rationes operandi ex natura in peripato explicantur, etc. Patav. 1616, 4.
- Fiendi de formatione foetus l. 1, in quo ostenditur, animam rationalem infundi die tertio, Antv. 1620, 8. et l. 2. Lovén. 1624, 8. et apol. 1629, 8.
- Bar. Spigellii de formato foetu l., c. f. Patav. 1626, fol. (Francof. 1631, c. operib.)
- Georg. Nymmanni diss. de vita foetus in utero, Viteb. 1627, 4.
- Oct. Cardellini de origine foetus l. II. Vicent. 1628, 4.
- Riolani foetus historia, Paris. 1628, 8.
- SSperling de formatione foetus in utero, Vitemb. 1641, (1655.) 4.
- Geod. Kerkring anthropogeniae ichnographia, s. conformatio foetus quoad ossificationis principia etc. Amstel. 1641, 4.
- Marl. Lussault diss. de functionibus foetus officialibus, Paris. 1648.
- Esusd. functionum foetus officialium assertio, Niorri 1651, 8.
- Maude la Lournée de nutritione foetus in utero paradoxa, Gedani 4.
- Figuli (R. Restaurand) exercitatio med. de principiis foetus, Arans. 8. Andr. Graindorge animadversio in fictitiam Figuli exercitationem de principiis foetus, Narboun. 1653, 8., et responsio Figuli ad osas figulo figuli animadversiones, Narb. 1658, 8.
- Arn. Friderici γυμνασµα ιατρικον, foetum, quoad principia, communes et proprias, differentias, etc. offerens et exponens, diss. Gu. Rolfink, Jen. 1658, 4.
- Georg. Seger diss. de Hippocratis orthodoxia de nutritione foetus humani in utero, acc. binae diss. de Democriti heterodoxia in doctrina foetus in utero, et de cotyledonibus uteri, Bas. 1660, 4.
- Ant. Needham disquisitio anat. de formato foetu, c. f. Lond. 1667, 8. 1668, 12.
- Barbati diss. an. de formatione, organisatione, conceptu et nutritione foetus in utero, Pat. 1676, 4.
- Posner diss. de foetuum in uteris vita, Jen. 1676, 4.

Car. Drelincourt de humani foetus membranis hypomnemata, Lugd. Bat. 1685, 12.

Pet. Stalpaart van der Wiel de nutrone foetus in utero ex-  
tatio, Lugd. Bat. 1686, 4. (1727, 8. Gall. Par. 2. Vol. 1758, 12.)

Casp. Bartholini diss. de formatione et nutritione foetus in utero. Hafn. 1687, 4.

Dan. Taubry traité de la génération et de la nourriture du foetus, Paris 1700, 12.

Arm. Porpessac praelectiones de iis, quae spectant foetum humanum utero materio degentem, Tolos. 1706, 8.

Fr. Bellinger de foetu nutritio, or a Discourse concerning the nutrition of the foetus in the womb etc. Lond. 1717, 8.

J. Fr. Cassebohm progr. de differentia foetus et adulti anatomica, Hall. 1739.

Mart. Schurig embryologia historico-medica, Dresd. et Lips. 1732,

Christoph. Jac. Trew diss. de differentiis quibusdam inter hominem natum et nascendum intercedentibus, c. f. Norimb. 1736, 4. (übersetzt: E. Trew Abb. von einigen Verschiedenheiten, welche an dem Menschen vor und nach seiner Geburt wahrgenommen werden, Nürnberg. 1770, 4.)

Joh. Wolffg. Trier diss. de vita foetus in utero, Francof. ad V. 1737,

Jo. Ern. Hebenstreit anatome hominis recens nati repetita, Lips. 1738,

Jo. Georg. Roederer diss. de foetu perfecto, Argent. 1750, 4.

Ejusd. progr. de foetu observationes, Goett. 1758, 4.

G. Aug. Langguth descriptio embryonis 3½ mensium, Viteb. 1751, 4.

Henr. Aug. Wrisberg descriptio anatom. embryonis, observationibus ill. Diss. inang. Goett. 1764, 4. (rec. in Sandifort thes. diss. Vol. III.)

Alb. Henr. Engelb. van Bauchem diss. de oeconomia foetus in utero, Lugd. B. 1766, 4. (rec. in Schlegel syll. opusc. ad art. obstr. Vol. I.)

Thom. Math. Hobbes diss. pr. M. van der Belen, de foetus origine, ejusque incremento et nutritione, Lovan. 1782, 4.

Abt. van Solingen diss. de vita foetus propria, Traj. ad Rhen. 1782,

Andr. Roesslein et Friedr. Roesslein diss. de differentiis inter foetum et adultum, I et II, Argent. 1783, 4.

Fr. Danz Grundriß der Zergliederungskunde des ungeborenen Kindes in den verschiedenen Zeiten der Schwangerschaft, mit Anmerk. v. Sömmerring, 1. u. 2. Frankfurt. u. Leipzig. 1792 u. 1793, 8.

Jo. Henr. Ferd. Antenrieth observationes ad historiam embryonis facientes, (Supplementa ad historiam embryonis hum.) Tubing. 1797, 4.

Jo. Bapt. Franc. Leveillé dissertation physiol. sur la nutrition du foetus, considérés dans les mammifères et dans les oiseaux, à Paris au V. (im Auszug übers. in Reil's Arch. f. Physiol. 4. B. 3. H. S. 413.)

Sam. Th. Soemmerring icones embryonum hum. Francof. 1799, fol.

Jo. Fr. Lobstein essai sur la nutrition du foetus av. fig., Strasbourg au X. 4. (übersetzt: J. F. Lobstein über die Ernährung des Fötus, aus d. Fran-  
v. Th. F. Arn. Kastner, Halle 1804, 8.)

Jo. Theoph. Pohl diss. de embryochemia, Erl. 1803, 4.

Joh. W. Th. Zander's Beiträge zu einer Geschichte der Thiermetamorphose, Erl. 1807, 8.

Car. Fr. Burdach diss. de primis momentis formationis foetus, Regio-  
1814, 4.

**Embryographie, (*Embryographia*),** allgemeine naturhistorische Beschreibung der sinnlich wahrnehmbaren Eigenheiten des Fötus. Vgl. Embryo.

**Embryologie, (*Embryologia*),** Lehre von Embryonen in anatomischer und physiologischer Hinsicht. Vgl. Embryo.

1) Schurig embryologia, Dresd. et Lips. 1732, 4.

**Embryon**, in buchstäblicher Uebersetzung des gleichen Griechischen Wortes, s. Embryo.

1) εμβρυον. Avicennae can. med. 1. 3. fen. 21. tr. 1. c. 1. In fehlerhafter Uebersetzung Embryum: Jac. de Forlicio expos. in Avicennae de generatione embrii capit.



**Embryonenalter oder Zustand, (*Embryonatus* <sup>1</sup>.)** Leibesfruchtalter, in Eintheilung des menschlichen Lebens nach verschiedenen Perioden, der Zeitraum von der Empfängniß bis zur Geburt. S. Lebensalter.

Dieses Wortes bedienen sich besonders die ältern Chemiker und Alchemisten zur Bezeichnung eines mineralischen Körpers, der noch nicht seine Reife erlangt hat. Vgl. Dornaei de geneal. miner. c. 17, in Theatr. chym. Vol. I. p. 584.

**Embryotokie, (*Embryotokia*.)** Dieses Wortes bedient sich Jurin <sup>2</sup> zur Bezeichnung der von einigen Schriftstellern aufgezählten seltenen Fälle, wo ein neugeborenes Kind weiblichen Geschlechts in seinem Fruchthälter noch ein Kind getragen und genährt, sogar geboren haben soll.

Die hier zunächst gelegte Frage ist natürlich die: sind diese Begebenheiten wahr?

Jurin <sup>3</sup> gedenkt dergleichen an menschlichen Embryonen beobachtete Fälle besonders drei. Der eine, aus etwas älterer Zeit <sup>2</sup>, möchte besondere Rücksicht verdienen. Mehr Aufsehen erregten zu ihrer Zeit die beiden folgenden, die eine von Thomas Bartholin <sup>3</sup>, die andre von Gabriel Clauder <sup>4</sup> bekannt gemachten. Nach dem Bericht des erstern gebar eine Bauersfrau in Dänemark, deren Name und Wohnort angegeben wird, nicht ohne große Beschwerden, ein todttes Mädchen. Der starke Unterleib desselben und die darin liegende Härte veranlaßten, daß dieser geöffnet wurde, wo man dann zwar todt, aber noch frisch erhaltene Leibesfrucht, von etwa 6 Spanne Länge, mit völlig ausgebildeten Gliedern, auch Haaren und Nägeln fand, die mittelst ihrer eignen Nachgeburt mit dem Mutterkuchen des Kindes auf gewöhnliche Art zusammenhing. Der Fall wurde von der Hebamme beschworen, doch aber, (was freilich wie ein großer Zweifel erregt,) von der Mutter, die darüber gerichtlich befragt wurde, geläugnet.

Der zweite Fall ist besonders um deswillen merkwürdig, weil er der einzige aufgezeichnete von einem gebärenden neugeborenen Kinde vorkommt. Diese zweite Geburt erfolgte in dem bemerkten Falle 14 Tage unter großen Schmerzen nach der eignen; das zweite Kind kam ebenfalls lebend, von der Länge eines Mittelfingers; es wurde 14 Tage, starb aber den folgenden Tag mit dem andern, als seiner Mutter, zugleich. Clauder nennt den Ort (Beggendorf bei Naumburg) und die betreffende Person, berichtet jedoch nur, daß ihm der Fall von glaubwürdigen Personen berichtet worden sei. Derselbe ist wirklich in dem Kirchenbuch zu Neumark in der Superintendentur zu Naumburg in Thüringen vom Jahr 1645 aufgezeichnet, wiewohl eben-

<sup>1</sup> Syllapsiologia, s. 4. c. 1. <sup>2</sup> aus Isibordi ab Ameloxunxen breviar. rer. memor. Dieser Mensch aus dem 17ten Jahrhundert fand in einem alten Handschrift des Klosters auf dem Petersberge in Erfurt vom Jahre 896 folgende Geschichte aufgeschrieben: „Ein 19jähriges Mädchen läugnete hartnäckig vor Gericht ihre Schwangerschaft, deren sie beschuldigt wurde, mit den Worten, „wenn ich schwanger bin, so strafe mich Gott, daß es meine Leibesfrucht auch todt ist.“ Bald darauf gebärt sie ein todttes Kind weiblichen Geschlechts, mit einem ungewöhnlich aufgeschwellenen Unterleibe, nach dessen Öffnung sich eine zweite, auch todt, aber an allen Gliedern ausgebildete Frucht findet.“ <sup>3</sup> histor. anat. rar. cent 6. obs. 100, Hag. et Hafn. 1659. <sup>4</sup> Miscell. nat. curios. Dec. II. ann. obs. 72.

falls nur nach der erst mehrere Jahre später gethanen eiblichen Aussage der Hebamme<sup>5</sup>.

Haller<sup>6</sup> setzt auf diese wie auch ähnliche Fälle kein großes Gewicht, ungeachtet er für seine bekannte Theorie der Präformation der Keime von ihnen eine neue Stütze hatte hernehmen können.

Indessen sind die Fälle, wo in dem Unterleibe ausgetragener und einmal ausgebildeter Kinder beiderlei Geschlechts unentwickelte Fruchtkeime in eignen Hüllen gefunden wurden, wo dann jene Kinder wohl noch heranwuchsen, bis nach ihrem Tode die Leichensection diese von jener ihrer frühesten Existenz selbst ihren Ursprung nehmende Abnormität darlegte, durch neuere Beobachtungen außer Zweifel gesetzt<sup>7</sup>.

Wahrscheinlich war hier in der frühesten Periode der Schwangerschaft von zwei Fruchtkeimen einer in seiner freien Entwicklung stört, und durch einen Bildungsfehler des andern in die Organisation desselben aufgenommen worden. Als Mißbildung, und also eigentlicher pathologischer Gegenstand gehören aber Fälle dieser Art nicht hierher. Sie beweisen jedoch, daß jenen Beobachtungen, die, wie sie dargestellt sind, mehr ein Uebermaß und gleichsam Ueberschreiten von Zeugungs- und Entwicklungsvermögen andeuten, als als eigentliche Abnormität sich darstellen würden, doch wohl etwas Wahres zu Grunde gelegen haben möge, wo aber das wie viel? so laß unbestimmt bleiben muß, als uns wirkliche, völlige beglaubte Beobachtungen ähnlicher Fälle ermangeln.

An Thieren scheinen diese weniger Zweifeln ausgesetzt zu seyn. Schon Aristoteles<sup>8</sup> führt an, und Aelian<sup>9</sup> und Plinius schreiben es ihm nach, daß man in Persien in Mäuseembryonen häufig wieder Früchte findet. Auch neuere Beobachtungen scheinen es bestätigen<sup>10</sup>, eben so die von Schurig<sup>12</sup> gesammelten Fälle ähnlichen Wahrnehmungen in Kälbern, jungen Mauleseln, jungen Hunden u. s. w. Daß man in Vogeleiern häufig kleinere vollkommen eingeschlossene Eier findet<sup>13</sup>, ist vielleicht nur um desswillen selten nicht, weil die Gelegenheit, dergleichen zu beobachten, sich häufig ergibt. Bei Thieren niedriger Ordnung gehört diese Art Erzeugung, wie z. E. bei den Blattläusen<sup>14</sup>, wohl gar zu ihrer organischen Natur. Auch im Pflanzenreich ist es gar nicht selten, Frucht in einer andern eingeschlossen zu finden, mehr als Natur als als krankhaftes Erzeugniß.

- 5) Den selben Fall erzählt auch aus schriftlicher Nachricht seines Großvaters (G. Org Otto.) E. J. A. Otto epist. de fetu puerpera et de fetu in f. Weissenf. 1748, 4. 6) elem. physiol. T. VII. l. 29. s. 2. §. 7. Einen solchen Fall beschreibt schon Lentin (observ. med. fasc. 1. 1764, 33.) vorzüglich Bemerkung aber verdient Dupontren's Bericht über ein in dem Unterleibe eines 14jährigen Knaben nach dem Tode gefundenen Fötus. Journ. de méd. Vol. IX, Vendém. an XIII, wie auch Young's Bericht über einen in dem Unterleibe eines neunmonatlichen Knaben nach dem Tode gefundenen Fötus. (Wgl. med. chirurg. Abhandl. der med. chirurg. Gesellschaft London 1811, S. 278.) S. auch Prochaska's Bemerk. über den Fötus in den mediz. Jahrb. d. N. R. Oesterr. Staats, 2. B. 8. St. hist. animal. 1. 6. c. 37. 9) de animal. 1. 17. c. 17. 10) hist. med. 1. c. c. 65. 11) Wgl. Halleri el. physiol. 1. c. nota 9. 12) D. c. 2. 13) ältere zahlreiche Beobachtungen hat ebenfalls Schurig (D. 5. 3) gesammelt. 14) nach Bonnet (traité d'insectologie, P. 1.)



*eminens linea*, f. Leiste. — — *arcuata ossis ileum*, f. Bogenförmige erhabene Linie der innern Fläche des Hüftknochens. — *acustici*, f. Eminirende Linie des acustischen Sinus. — *cervicis*, f. Siebenter Halswirbel. — — *ossis sacri*, i. q. Promontorium ossis sacri.

*eminentes cruces ossis occipitis*, f. Kreuzförmige Spina des Occipitalknochens. — *lineae transversae ossis palatini*, f. Quertlinien des Gaumenknochens. — — *vesicae urinariae*, f. Eminirende Linien der Harnblase. — — *vestibuli*, f. Eminirende Linien des Vestibulum. — *valvulae coli*, f. Zellen des Colons.

*eminentia*, f. Eminenz, auch Apophyse, ingl. Leiste. — *calcanei*, f. Eminenz des Calcaneus. — *capitata ossis brachii*, f. Köpfe des Cubitalprocesses des Oberarmknochens. — *carpi radii superior*, f. Tuberkel des scaphoideischen Knochens. — *cavitas hepatis*, f. Geschwänzter Lobulus der Leber. — *collateralis cerebri*, s. *Meckelii*, f. Collateraleminenz des Gehirns. — *condylidea*, f. Condylus. — *minor in ventriculis anterioribus cerebri*, f. unter Anonyme Tuberkel in den vordern Hirnventrikeln. — *obliqua ossis cuboidei*, f. Tuberosität des cuboideischen Knochens. — — *pterygoidea*, f. Eminenz des pterygoideischen Processes des Gaumenknochens. — *rostriformis urethrae*, f. Hahnenkopf der männlichen Harnröhre. — *scapulae*, f. Spina des Schultergürtels. — *tibiae mediae*, f. Abclivität der Tibia. — *transversa, transversalis ossis temporum*, f. Articularhügel des Schläfenknochens. — *trochlearis*, f. Trochlea. — — *ossis brachii*, f. Gelenkfläche des Oberarmknochens. — *tympani papillaris*, s. *pyramidalis*, f. Pyramidenförmige Eminenz des Tympanums. — *tubuli pyramidalis*, f. unter Eminirende Linien des Vestibulum. — *eminentiae articulares ossis brachii*, f. Cubitalproceß des Oberarmknochens. — *candicantes*, f. Mammillarproceße des Gehirns. — *carpi*, f. Eminenzen des Carpus. — *coccygeae*, f. Afterhörner. — *cruciformes ossis occipitis*, f. Kreuzförmige Linien des Occipitalknochens. — *frontales*, f. Frontaltuberositäten. — *glaudulosae cerebri*, i. q. E. candicantes. — *jugulares*, f. Jugularproceße. — *mammillares*, i. q. E. candicantes. — *trigeminae*, f. Vierhügel des Gehirns. — *radii mediae*, f. Eminenzen des Radius. — *superciliares*, f. Superciliarbogen. — *vesicae*, f. Eminirende Linien der Harnblase.

**Eminenz**, (*Eminentia* <sup>1</sup>) überhaupt eine Erhebung, Erhabenheit, Hervorragung. Vgl. auch *Apophyse*, ingl. *Leiste*. (Plin. hist. mund. I. 37. c. 10.)

**Eminenz des Calcaneus**, (*Eminentia calcanei* <sup>1</sup>) die in der Mitte der äußern Fläche des Calcaneus befindliche längliche, vorwärts schwärzwerdende, bis über den vordern Proceß desselben Knochens sich erstreckende Erhabenheit. S. unter  *Fußknochen*, *Calcaneus*. (Roder's anat. Handb. I. B. S. 310.)

**Eminenz des pterygoideischen Processes des Gaumenknochens**, (*Eminentia* <sup>1</sup> *pterygoidea*, *Crista* <sup>2</sup> *processus pterygoideus*) (Roder's anat. Handb. I. B. S. 113. 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. I. B. S. 317.

Anatom. physiol. Realw. II. B.

rygoidei ossis palati,) die auf der Mitte der hintern Fläche pterygoideischen Processes des Gaumenknochens von oben nach un-  
gehende glatte, jedoch etwas ausgehöhlte Erhabenheit, welche in  
Lage in der pterygopalatinischen Fissur hat und so unterwärts zur Bil-  
dung der pterygoideischen Rinne beiträgt. Eine gleiche erhabene Linie  
(Crista <sup>3</sup>.) wird auch auf der untern Fläche unterschieden.

3) nach Hildebrandt (a. a. O. S. 316.)

**Eminenzen des Carpus,** (Eminentiae carpi <sup>1</sup>.) Erhaben-  
heiten der Handwurzel, die vier in der Volarseite des Carpus  
bemerklichen Knochenhervorragungen, welche zusammengenommen das  
Volarligament des Carpus, einzeln aber noch verschiedenen Muskeln  
zur Anlage dienen, und von denen man a) zwei an der Radialseite  
(radiales <sup>2</sup>.) und zwar, α) eine obere, (superior <sup>4</sup>.) welche das  
Tuberculum des scaphoideischen Knochens ausmacht, β) eine untere  
(inferior <sup>5</sup>.) mehr nach dem Metacarpus hin gelegene, die das Tuber-  
culum des großen multangulären Knochens des Carpus bildet, da-  
b) zwei an der Ulnarseite, (ulnares <sup>6</sup>.) und zwar wieder, α) ei-  
ne obere, (superior <sup>7</sup>.) in die Volarseite des Carpus hineinragen-  
de von dem lenticulären Knochen gebildete, und β) eine untere, (in-  
ferior <sup>8</sup>.) welche der hakenförmige Proceß des Hakenknochens  
des Carpus darbietet, unterscheidet. S. unter Handknochen.

1) Walther's Abh. v. trockn. Knochen, 2. Aufl. S. 314.

2) — 8) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 761.

**Eminenzen des Radius,** (Eminentiae mediae radii  
Erhabenheiten der Speiche <sup>2</sup>.) die an der äußern Fläche des  
untern Endes des Radius befindlichen Knochenleisten, durch welche  
einige Furchen, in denen Muskelsehnen laufen, gebildet werden. Man  
unterscheidet man, a) eine größere <sup>3</sup>., (major <sup>4</sup>.) mehr  
nach der vordern Fläche zu bemerkbare, welche als eine Fortsetzung  
des äußern Winkels des Radius zu betrachten ist, und b) eine klei-  
nere <sup>5</sup>., (minor <sup>6</sup>.) welche sich neben dieser, aber mehr nach der Seite  
der Ulna zu befindet. S. Radius.

1) — 6) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 727.

**Eminirende Linie des acustischen Sinus,** (Eminentia  
nea sinus acustici <sup>1</sup>.) diejenige hervorragende Knochenleiste, welche  
die beiden untern, im Grunde des acustischen Sinus befindlichen  
Öffnungen, von denen das hintere zum Vestibulum und den semicirculären  
Canälen und das vordere zur Cochlea des Labyrinths führt, von ein-  
ander scheidet. Vgl. unter Ohr, inneres Ohr.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1632.

**Eminirende Linien der Harnblase,** (Eminentes lineae  
vesicae urinae <sup>1</sup>.) Streifen im Blasenhalse <sup>2</sup>., (Colliculi <sup>3</sup>., s. Jugal vesicae urinae, Fibrae longae vesicae,  
ureteribus continuatae <sup>5</sup>., Tres eminentiae vesicae <sup>6</sup>.) zwei schma-  
le nach oben erhobene Fältchen der innern Haut der Harnblase, wel-  
che von den Mündungen der Ureteren am hintern Theile der inwendigen  
Fläche des Blasenhalses abgehen, und im männlichen Körper sich  
gegen den sogenannten Hahnenkopf einander nähern, jedoch nicht immer  
deutlich bemerkbar sind. Zuweilen wird noch eine dritte, mittlere

1) 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 2199 3) 4) Halle

cl. phys. T. VII. 1. 26 s. 2. S. 18. 5) Berengarii comm. in Mundi

an. p. 301. 6) Pallucci nouvelles remarques sur la lithotomie, p.



ebenheit am innern hintern Blasenhalse, (*Uvula vesicae* <sup>2</sup>.) un-  
 tchieden. S. Harnblase.

nach Kleutaud (*Mém. de l'acad. des sciences de Paris 1753, p. 11.*)

eminirende Linien des Vestibulums, (*Eminentes lineae*  
*vestibuli* <sup>1</sup>.) diejenigen scharfen Knochenleisten, welche sowohl die he-  
 miptische als auch die hemisphärische Grube des Vestibulums be-  
 grenzen, und von denen die eine sich durch ihre pyramidalische Figur,  
*eminentia pyramidalis vestibuli* <sup>2</sup>.) und seine durchlöcherzte Zäc-  
 ke auszeichnet. S. Ohr.

(2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1616.

emissaria Santorini, s. Santorinische Emissarien.

emissio seminis, s. Ejaculation des Samens. — *urinae*, s.  
 Harnausleerung.

emmenia, nach dem Griechischen gleichlautenden Worte <sup>1</sup>, i. q.  
*menstrua*. S. Menstruation.

εμμηνια (Vgl. Foessii oec. Hipp. h. v.)

emmenologie, (*Emmenologia* <sup>1</sup>.) Lehre von der Men-  
 struation der Frauen. S. Menstruation.

εμμηνολογία, s. de fluxu muliebri menstruo l. Lugd.  
 1711, 8.

empeiria, Empiria, in Uebertragung des gleichlautenden Grie-  
 chen Wortes <sup>1</sup>, i. q. *Experientia*. S. Erfahrung.

εμπειρια.

empfanglichkeit, s. Receptivität.

empfangniß <sup>1</sup>, Conception, (*Conceptio* <sup>2</sup>.) ist die durch  
 fruchtbare Begattung in einem Weibe erregte Thätigkeit zur Bil-  
 dung eines Kindes, verbunden mit der hierzu erforderlichen Umände-  
 lung in dem weiblichen Zeugungsstoff. Ein Weib, in welchem die  
 Bildung eines Embryo's beginnt, hat empfangen, ist befruchtet, ist  
 schwanger. Bei den Thieren bedient man sich gewöhnlich des Aus-  
 drucks: es ist trächtig.

Die Ausbildung des Körpers, welcher bei der Empfängniß erzeugt  
 wird, geschieht gewöhnlich in der Gebärmutter, Gebärmutter-  
 schwangerschaft, (*Conceptio uterina*;) bisweilen entwickelt sich  
 die Frucht außerhalb der Gebärmutter, (*Conceptio extraute-*  
*rina* <sup>3</sup>.) und dann benennt man die Schwangerschaft nach den Thei-  
 len, wo die Frucht liegt: Schwangerschaft der Eierstöcke,  
*Conceptio ovaria*;) — der Eiergänge, (*C. tubaria*;) — der  
 Bauchhöhle, (*C. abdominalis*.)

Gewöhnlich wird nur Eine Frucht erzeugt; indessen können aber  
 mehrere Begattungen, oder durch bald auf einander folgende Beiwoh-  
 nungen, ehe das Ei in der Gebärmutter sich gebildet hat, mehrere  
 Fruchte erzeugt werden; letzteres nennt man Ueberschwängerung,  
*superfecundatio* <sup>4</sup>.)

Wovon ist die Ueberfruchtung, (*Superfetatio*;) zu unter-  
 scheiden, worunter man die Erzeugung zweier Früchte in zwei oft  
 aufeinander folgenden Monaten versteht.

1) Meumann's Physiol. 4. Th. 47. Cap. 2) eigentl. Umfassung, in  
 allgemeinem Sinne auch von Classikern gebraucht. (*Cicero de divin. l. 2. c.*  
*Plinii hist. m. l. 32. c. 22.*) 3) Val. Weinknecht diss. de  
*conceptione extrauterina*, Hal. 1791. Deutsch diss. de graviditate ab-  
*ominati*, Hal. 1792. 4) Vgl. Oslander's Gründe d. Entbindungsk.  
 2. Th. S. 156. Kopp's Jahrb. d. Staatsarzneyk. 3. Jahrg. S. 277.

sehr weit entfernten Zeiträumen versteht. Es ist nicht zu zweifeln, daß eine Ueberfruchtung Statt finden könne, wenn ein Fötus von einer Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter zurückgeblieben und eine andere Frucht in der Gebärmutter erzeugt wird, oder wenn eine doppelte Gebärmutter vorhanden ist. Bei ganz normaler Beschaffenheit der weiblichen Geschlechtstheile kann aber eine Ueberfruchtung ganz nicht Statt finden, oder ist doch eine höchst seltene Erscheinung, denn es ist sehr wahrscheinlich, daß die Gebärmutter durch die Schwangerschaft so umgeändert wird, daß sie die Empfänglichkeit zu einer neuen Erzeugung verliert; sicher müßten die Fälle, welche man Beispiele von Ueberfruchtung anführt, viel häufiger seyn, da es sehr gewöhnliches ist, daß sich auch Schwangere noch begatten.

Sichere Kennzeichen der Empfängniß, oder daß eine Begattung fruchtbar gewesen sei, fehlen uns noch; erst dann, wenn in den ersten Monaten der Schwangerschaft die örtlichen Veränderungen der Gebärmutter und die sympathischen Zufälle deutlicher sich äußern, kann man mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit eine Empfängniß vermuthen. Doch sind auch öfters in den ersten Monaten die Zeichen der Schwangerschaft noch zweifelhaft, weil sie mit manchen kraßhaften Veränderungen der Gebärmutter Aehnlichkeit haben, und wenn zwischen dem fünften und sechsten Sonnen- oder sechsten und siebenten Mondesmonate die Bewegung des Kindes bemerkt wird, kommt man zur Gewißheit.

Manche Weiber, die schon mehrmals schwanger gewesen sind, können zuweilen mit Bestimmtheit den Zeitpunkt einer neuen Empfängniß angeben, aber nach Gefühlen, die sich nicht treffend beschreiben lassen. Indessen hat man doch versucht, einige Merkmale aufzufinden, die gleich nach einer Begattung anzeigen sollen, ob Empfängniß erfolgt ist. Es gehören dahin folgende: das Weib empfindet während der Begattung ein vorzüglich hohes Gefühl von Wollust; der eingespritzte männliche Samen dringt in die Gebärmutter, wird in ihr zurückgehalten und größtentheils wenigstens aufgenommen, die Scheide ist daher trocken, aber nicht als wenn dieses längere Verweilen des Samens die Befruchtung erst bewirke, es ist das Zurückbleiben desselben, und die Trockenheit der Scheide eine Folge des sehr erhöhten Reizes, des länger dauernden Orgasmus in den Geschlechtstheilen, welcher eine fruchtbare Begattung begleitet; ein leichter Schauer während oder gleich nach der Begattung, eine geringe schmerzhaft empfundene und ein leichter Krampf in dem Unterleibe wird gleich nach dem Beischlaffe bemerkt; in den ersten Tagen nach demselben empfindet das Weib ein allgemeines Unbehagen, fliegende Hitze, Mattigkeit, Verstimmung des Geistes, Niedergeschlagenheit; der Unterleib wird vorübergehend aufgetrieben, und etwas empfindlich bei der Berührung; auch will man einen Trieb, die Beine kreuzweise über einander zu schlagen, bemerkt haben.

- 5) Vgl. Lachausse diss. de superfetatione in utero duplici, Argent. 1770. Graeul diss. sist. conjecturas de superfoetatione, in Schlögel syll. oper. minor. Tom. I. N. x. Eyrich diss. de superfoetatione in simplici utero laud. possibili, Alt. 1770. Rose de superfetatione nonnulla, Brem. 1801, übers. in Reil's Arch. für Physiol. 5. B. 3. St. S. 439, u. in Rose's Beiträgen, 2. St. Nr. 6. Commentarius in Rose de superfetatione libell. auct. Varrentrapp. Francof. ad. M. 1803, 4. (Seiler.)



Empfindbilder, s. Traumbilder.

Empfindlei, vgl. Empfindlichkeit.

Empfindliches Glied, s. Clitoris.

Empfindlichkeit, Empfindsamkeit. Empfindlichkeit ist allgemein die Fähigkeit, leicht von äußern Eindrücken erregt, zu werden. In diesem Sinne wird es als eine Vollkommenheit leblosen und lebendigen Gegenständen beigelegt, z. B. ein empfindliches Thermometer, eine empfindliche Haut, und es ist dann leicht reizbar gleichbedeutend.

Wenn es vom Gemüthe gebraucht wird, so bezeichnet es zwar im gemeinen auch ein leicht zu erregendes Gefühlsvermögen; allein in ihrem und gewöhnlicherem Sinne drückt es die Stimmung des Geistes aus, leicht unangenehm erregt werden zu können, ist dann Unvollkommenheit, eine Art von Schwäche, und daher dem weiblichen Geschlechte, so wie den Kränklichen, insonderheit den Schwindkranken eigen. Die Ursache davon liegt nun nicht darin, daß unangenehmen Empfindungen häufiger wären, oder das Gemüth tiefer und tiefer ergriffen, (denn daraus könnte und würde gerade das Gegentheil, eine Abstumpfung des Gefühls, entstehen,) sondern die Ursache davon liegt eben in der Natur der Empfindlichkeit, nämlich in ihrer zu großen Reizbarkeit. Sie wird daher durch alle die Reize, welche mit mehr Heftigkeit einwirken, zu sehr, und dadurch unangenehm afficirt; denn jeder zu starke Reiz verursacht Schmerz, sei er an sich auch noch so angenehm. Eine Menge Reizen also, welche ein gewöhnliches Gefühlsvermögen gar nicht, sogar angenehm erregen, sind für den Empfindlichen zu stark, deshalb unangenehm. Schon der Ton eines Wortes, ein Blick, eine Bewegung afficirt den Empfindlichen unangenehm, und er findet daher weit mehr Veranlassung zu unangenehmen Gefühlen als der weniger Empfindliche. — Empfindlichkeit drückt sich auch durch die Gestalt aus; sie trägt die Augenbraunen hoch, und alle ihre Züge sind in einer gewissen Spannung und Beweglichkeit. Sie wirkt nach innen auf den Körper.

Empfindsamkeit dagegen wird von mehreren als der Normalheit der Stimmung des Gefühls angesehen, allein mit Unrecht. Der Empfindsame, sondern der Gefühlvolle, der Mann von Gefühl, hat den Normalgrad desselben. (S. Gefühl.) Empfindlichkeit im Gegentheil bezeichnet theils einen hohen Grad der Zartheit des Gefühls, vermöge welcher es leicht zur Theilnahme an dem Gefühl anderer, zur Rührung bewogen wird, theils und vorzüglich einen Hang zur leichten Beweglichkeit des wahren theilnehmenden Gefühls, nicht einer krankhaften Empfindlichkeit, nach der Analogie der Furchtsamkeit. Der Gefühlvolle hat Gefühl; es wird aber theils durch vielleicht nicht so leicht erregt, theils hat es keinen hohen Grad von Zartheit, theils begünstigt er selbst es nicht, oder arbeitet im Gegentheil gar entgegen. Ganz anders der Empfindsame. Er hat ein tiefes, reges Zartgefühl, einen Hang, es durch Theilnahme angegriffen zu lassen, und begünstigt es durch eigenes Wollen und Bestreben. Doch ist bei ihm stets wahres Gefühl, wahre Theilnahme, und gegründete Veranlassung dazu vorhanden.

Empfindlichkeit und Empfindsamkeit bezeichnen beide ein leicht zu regendes Gefühl: jene ein zu heftig, und daher unangenehm wirkendes, diese ein lebhaftes, aber der Stimmung entsprechendes, da angenehmes; jenes mit Abneigung gegen den erregenden Gegenstand, dieses mit Wohlwollen gegen ihn verbunden.

Eine zu große Begünstigung dieses Hanges zur Empfindsamkeit artet in Fehler aus, welchen der Sprachgebrauch durch dasselbe Wort ausdrückt. Empfindsam bezeichnet daher sehr oft einen Menschen, der seinem Gefühl zu sehr den Zügel schießen, und es überlaut und zu laut sich äußern läßt. Dieser Fehler ist mehr dem reizbaren weiblichen Geschlechte, und selbst einer kränklichen Stimmung eigen; es liegt dabei aber immer wahres Gefühl zum Grunde.

Sobald dieß nicht der Fall ist, und Empfindsamkeit bloß affectisch und zur Schau getragen wird, artet sie in Empfindelei aus, welche ihrer Natur nach nichts anders ist, als Affectation, Schaутragung der Empfindsamkeit, äußeres Zeichen derselben, ohne jenes Gefühl. Empfindelei ist daher nicht ein hoher Grad von Empfindsamkeit, noch ein Hang zu starken, zärtlichen Rührungen, mit ihren Ursachen in keinem richtigen Verhältnisse stehen, sondern Ostentation von Empfindsamkeit; denn Empfindelei ist bloßes Spiel mit Gefühl, und in der Regel ganz leer und entblößt davon. Daher läßt es Empfindelei auch bloß bei Worten und leeren Zeichen anwenden, Empfindsamkeit aber und Gefühl sprechen sich thätig aus. Empfindelei ist daher eine Art von Piererei, Affectation. S. Piererei. (Dzondi.)

Empfindung, s. Gefühl.

Empfindungsassociationen nennt Darwin<sup>1</sup> diejenigen associirten Bewegungen im thierischen Körper, welche ursprünglich durch Anstrengung der Empfindungen, um ihre Gegenstände zu erhalten oder zu vermeiden, in gleichzeitige oder unmittelbar nach einander folgende Bewegung gesetzt waren. S. Associationsbewegungen.

<sup>1)</sup> *Zoonomie*, überf. von Brandis 1. Th. 1. Abth. S. 8.

Empfindungslosigkeit, vgl. Indolenz. — organ, s. Sensorium. — vermögen, s. Gefühl.

Emphyton, in Uebersetzung des gleichlautenden Griechischen Wortes<sup>1</sup>, i. q. Innatum, besonders in Verbindung mit calidum S. Angeborne Wärme.

<sup>1)</sup> *εμφύτον*. <sup>2)</sup> *ἰσχυρὸν εμφύτον*. (Hippocr. aph. s. 1. aph. 14.)

Empiria, s. Empeiria.

Empörtseyn, s. Indignation.

Emporium<sup>1</sup> spirituum, s. Sensorium.

<sup>1)</sup> *εμποριον*, eigentlich ein Handelsplatz.

Emporsteigen des Uterus, s. Aufsteigen des Uterus.

Empsychosis, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte s. Metempsychosis, vgl. auch Belebung.

<sup>1)</sup> *εμψυχωσις*. Vgl. Helmont *jus duumviratus in operib.* Lugd. 1666. p. 185.

Empusa, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte<sup>1</sup>, i. Spectrum. S. Gespenster.

<sup>1)</sup> *εμψουστα*.

Emsigkeit, s. Fleiß.





tend mit Diploe. In einer andern Bedeutung deutet es auch an, was im Herzen ist, oder auf das Herz Bezug hat, so auch Ort, wo das Herz sich befindet. Vgl. Herz.

*Encephalica arteria*, f. Cerebralcavotis.

*Encephalon*, *Encephalos*, *Encephalum*; entsprechend dem gleichlautenden Griechischen Worte <sup>1</sup>, f. Gehirn, ingl. Cerebrum

<sup>1</sup>) *εγκεφαλον*, (*εν τη κεφαλη*), *εγκεφαλος*. (Galenus de adm. an. l. 9. c. 1.)

*Encephalotomie*, (*Encephalotomia*<sup>1</sup>), Hirn- oder Gehirnzergliederung, anatomische Darstellung der Gehirnthetheile. Vgl. Gehirn.

<sup>1</sup>) V. Malecarne encephalotomia nuova universale, Torin. 1780, 8.

*Encephalum*, f. Encephalon.

*Encheiresis*<sup>1</sup> *anatomica*, Geschicklichkeit in Zergliederung eines Körpers, oder kunstgerechte Zergliederung. Vgl. Anatomische Technik.

<sup>1</sup>) *εγχειρησις*, der Handgriff, Vorthell in Angreifen.

*Encoelia*, entsprechend dem gleichlautenden Griechischen Worte alles im Unterleib Befasste, also die Eingeweide des Unterleibs. Eingeweide, auch Därme.

<sup>1</sup>) *ενκοιλια*. Vgl. van der Linden sel. med. ex. 9. §. 57.

*Encranion*, *Encranis*, *Encranium*, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte <sup>1</sup>, i. q. Cerebellum.

<sup>1</sup>) *εγκρανις*, *εγκρανιον*. (Aristotel. hist. an. l. 1. c. 16.)

*Endäste*<sup>1</sup>, (*Rami-finales*<sup>2</sup>, s. *ultimi*<sup>3</sup>), werden diejenigen kleinen Aeste von Gefäßen (und Nerven) genannt, welche sich nicht weiter in noch kleinere Aestchen oder Reiser theilen. S. Ader und Nerven.

<sup>1</sup>) Willibrand's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. §. 2362 u. 2916.

*Enddarm*, f. Mastdarm.

*Enden*, f. Extremitäten. — an Knochen u. s. w., f. Extremitäten an Knochen u. s. w. — des Nebenhoden, f. Kopf und Schwanz der Epididymis.

*Endmündung des Magens*, f. Pylorus. — Stück oder theil des Dickdarms, f. Mastdarm.

*Endtheile*, f. Extremitäten. — an Knochen u. s. w., Extremitäten an Knochen u. s. w.

*Energetica substantia*. An diese Bezeichnung knüpfte besonders Lisson<sup>1</sup> zuerst die Idee eines allgemeinen Naturlebens. Nach ihm kommt jeder Substanz ein dreifaches substantielles Rudiment zu: ein fundamentales, wodurch es seine Existenz hat; ein energetisches, wodurch es wirkt, und ein additionelles, wodurch es sich accidentelle Eigenschaften erfreut. Der Materie kommt also, als Substanz, eine energische Natur zu, oder eine freithätige bewegende Kraft, und das Leben ist selbst nichts anders, als die Wirkung der inneren energetischen Natur; der Tod aber löst die Verbindung der Energetischen und der additionellen vegetativen und animalischen Eigenschaften. Vgl. Naturleben.

<sup>1</sup>) de natura substantiae energeticae, s. de vita naturae l., London. 1673.

*Energie*, (*Energia*), nach dem Griechischen gleichen Worte

<sup>1</sup>) *ενεργεια*.



et, jede erhöhte und ausdauernde Kraftäußerung, sowohl des  
ers als des Geistes, in so fern sie einem beabsichtigten Zweck ent-  
Bgl. Kraft.

ervatio, s. Aponeurose.

ervationes tendineae musculi recti abdominis, s. Tendin-  
Inscriptionen des geraden Abdominalmuskels.

ngastrimith, (*Engastrimythos*), nach dem gleichlau-  
Griechischen Worte<sup>1</sup>, i. q. Ventriloquus. S. Bauch-  
er.

γγαστριμυθος.

enge Därme, Enger Darm, s. Dünndarm.

ngherzigkeit ist eine Ausartung der Selbstliebe, und bildliche  
inung der Selbstsucht. Ein Herz — Gefühl — das für an-  
Wesen kein Wohlwollen hegt, für fremde Ansprüche auf Mit-  
ll zu eng ist. (Diond.)

ngkel, s. Knöchel.

ngomphosis, in Uebersetzung des gleichlautenden Griechischen  
es<sup>1</sup>, i. q. Gomphosis.

γγομφωσις.

ngonios, sc. habitus, beßgl.<sup>1</sup>, s. Winkelform.

γγωνιος, angularis, elnen rechten Winkel bildend, wie bei der Biegung des  
Secreräarms gegen den Oberarm. Bgl. Foesii oec. Hipp. h. v.

uischomena, in Uebersetzung des gleichen Griechischen Wor-  
Contenta. S. unter Enthaltende und Enthaltene  
le.

ενισχομενα.

uixio fetus, s. Gebären.

uorchiten, (*Enorchites*), s. unter Orchiten.

uormantica natura. Dieses Ausdrucks bedient sich v. Hel-  
it<sup>1</sup> zur Bezeichnung der allgemeinen und eigenthümlichen Na-  
turst. Bgl. Naturkraft.

alle magn. vulnere curacione in operib, Lugd. B. 1667, p. 463, nr. 60,  
SSat est, his obiter ostendere, naturam coelestem et enoꝛmantia-  
nam rebus ipsis inesse."

uormon, entsprechend dem gleichlautenden Griechischen Worte,  
Hippokratische Bezeichnung<sup>1</sup> der Lebensthätigkeit, ihrem nicht  
riellen Princip nach, (Impetum faciens<sup>2</sup>.) Bgl. Lebens-  
it.

ενορμων, η ενορμων. Bgl. Foesii oecon. Hipp. h. v. 2) S. Kaauw  
Boerhave impetum faciens dictum Hippocrati, per corpus  
oon-entius observationibus et experimentis, passim firmatum, Lugd.  
B. 1745, 8.

uosteos, s. unter Osteolithen.

uurythmos pulsus, s. Eurythmos pulsus.

aus<sup>1</sup>, alles, dem ein Daseyn zukommt, oder auch nur beigemess-  
werden kann; der Gegensatz ein Non ens. Bgl. Existenz.

von Sergius Flavius nach dem Griechischen (ον) gebildet, nach Quinc-  
illans (inat. orat. l. 8. c. 3.) Zeugnisse.

usicalata<sup>1</sup> cartilago sterni, s. Xiphoideischer Proceß des  
nnums.

von ensiculus, Diminutiv von ensis gebildet.

usiforme<sup>1</sup> os, i. q. Sternum.

Schwertförmig, von ensis, Schwert, gebildet.

*Ensiformes processus ossis sphenoidi*, s. unter Sphenoidflügel, kleine Flügel.

*Ensiformis cartilago sterni*, i. q. *Ensiculata cartilago sterni*, s. Körper des Sternums. — *processus sterni*, s. Xiphoideischer Proceß des Sternums.

**Entbildung, Selbstentbildung.** So wird namentlich Luca<sup>1</sup> der der Bildung entgegengesetzte Vorgang im thierischen Körper, wodurch, auch im gesunden Zustande, organische Materie hinweggenommen wird, so wie der erste Act derselben, der der Absorption und Excretion vorhergeht, oder der erste der unterschiedlichen Entbildungsproceß, als Desassimilation, ihr Material aber als Entbildungsstoff, Desassimilationsstoff bezeichnet. Vgl. Excretion.

1) Entw. ein. Systems d. med. Anthropol. 1. B. 3. Absch. 1. u. 2. Cap.

**Entbildungsproceß, — stoffe**, s. unter Entbildung.

**Entbrennbarkeit**, s. Dephlogistisiren.

**Entehrung**, s. unter Ehrlosigkeit.

**Enteltung**, s. Desoxydation.

*Entera*, in Uebersetzung des gleichlautenden Griechischen Wortes<sup>1</sup>, s. Därme.

1) *εντερα*.

*Enteradenes*, nach dem Griechischen gebildet<sup>1</sup>, Darmdrüsen, insbesondere Peyer'sche Drüsen.

1) aus den Worten *εντερον* und *αδενες*. Die Bezeichnung rührt von Peyer her. S. dess. epist. ad Harderum in Poconis et Pythagorae ex epist. anat. med. ex. 31.

*Enteradenographia*, Beschreibung der Darmdrüsen<sup>1</sup>. S. *Enteradenes*.

1) ebenfalls nach Peyer's Bezeichnung a. a. D.

*Entericus humor*, s. *liquor*, s. *succus*, s. Enterischer Saft.

*Enterione*, in Uebersetzung des gleichen Griechischen Wortes<sup>1</sup>, die Innere eines Theils, und in dieser Hinsicht gleichbedeutend mit *Enterion*.

1) *εντεριον*.

**Enterischer Saft**, (*Entericus humor*, s. *liquor*<sup>1</sup>, s. *succus*<sup>2</sup>), Darmsaft<sup>3</sup>, Gedärmsaft<sup>4</sup>, Därmesaft<sup>5</sup>, (*Humor intestinorum*, s. *intestinalis*<sup>6</sup>), die von den Arterien die Höhle des Darmcanals abgesonderte, die inwendige Oberfläche des flockichten Haut beständig feucht erhaltende Lymphe, welche immer mit schleimiger Feuchtigkeit aus den Darmdrüsen, (Darmschleim) vermischt ist. Vgl. Darmcanal.

1) Mayer's Beschr. d. menschl. K. 4. B. S. 397. 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 2027. 3) 4) Mayer's Beschr. u. f. a. a. D. u. Note. 5) Schmeering's Eingeweidel. S. 212. 6) Halleri elem. phys. T. VII. l. 24. c. 1. S. 18. 7) Mayer's Beschr. f. w. a. a. D.

*Enteroides processus cerebri*, s. Windungen des großen Gehirns.

**Entfärbung**, s. Erblässen.

**Entflammen**, **Entglühen**, bildliche Ausdrücke, welche höhere Grade von Gefühl und Affect bezeichnen, insonderheit des Zorns, der Begeisterung, der Liebe und des Hasses, der Rache u. s. w. (*Diondi*).



- Entflammung**, f. Enthusiasmus.
- Entgegenstellender Muskel** oder **Entgegensteller des Daumens**, f. Opponirender Muskel des Daumens.
- Entglühen**, f. Entflammen.
- Enthaltende und Enthaltene Theile**, (*Partes continentes continentae*<sup>1</sup>, s. *Contenta*<sup>2</sup>, s. *Enischomena*<sup>3</sup>, s. *Ischo-*<sup>4</sup>, s. *Synechomena*<sup>5</sup>,) Umfassende und Aufgefaßte Theile<sup>6</sup>, sind in Bezug auf einander die festen und die in den Höhlen und Höhlungen dieser befindlichen flüssigen Theile des Körpers, oder auch die Körperhöhlen und die von ihnen umgebenen Eingeweide oder auch organische Mischungen und Bestandtheile. Vgl. alle diese Artikel.
- Ente**, Heisteri comp. anat. ed. 2. p. 7. 2) van der Linden sel. med. 2. 15. §. 71, wo wieder *Detenta*, als *Contenta naturalia* und *Retenta*, als *Contenta praeternaturalia* unterschieden werden. 3) — 5) S. ebendaf. 70 u. 71. Vgl. auch diese Worte. 6) Jadelot's Lehre v. d. Natur d. menschl. Körper. übers. v. Panzerbleter, §. 4.
- Enthaltensamkeit**, (*Abstinentia*<sup>1</sup>, *Continentia*<sup>2</sup>,) Entsagung. Enthaltensamkeit ist freiwillige Entbehrung eines Genusses, welcher uns darbietet; Entsagung freiwilliges Aufgeben eines bisher habten Genusses, oder besessenen Gutes. Wer im Genuß eines Vergnügens oder eines Gutes innerhalb der Grenzen bleibt, welche der Verstand und Vernunft ihm vorschreiben, ist mäßig, wer seinen Genuß desselben ganz versagt, ist enthaltsam, wer ihn unvollständig, nachdem er ihn eine Zeit lang gehabt hat, aufgibt, enthaltsam ihm. Es ist oft schwerer, mäßig zu seyn, als enthaltsam, weil das Vergnügen des Genusses uns leicht zu weit führt, da im Genuß ein entferntes Gut, ein unbekannter Genuß, uns weniger anlockt. *Ignoti nulla cupido*. Im engeren Sinne wird Enthaltensamkeit von freiwilliger Entbehrung der Befriedigung des Geschlechtstriebes gebraucht. Vgl. übrigens Mäßigkeit. (Diondi.)
- 2) Cicero de offic. 1. 2. c. 21.
- Entheatus**, **Entheus**, f. Enthusiast.
- Enthusiasmus**, (*Enthusiasmus*,) nach dem gleichlautenden Griechischen Worte<sup>1</sup> gebildet, f. Begeisterung.
- ἔνθουσιασμος*.
- Enthusiast**, (*Enthusiasta*<sup>1</sup>, *Enthusiasticus*<sup>2</sup>,) Begeisterter, (*Entheatus*<sup>3</sup>, *Entheus*<sup>4</sup>,) ein Mensch, der sich dem Enthusiasmus leicht hingibt oder desselben fähig ist, und von ihm beherrscht wird. Vgl. Begeisterung.
- 2) nach den Griechischen Benennungen *ἔνθουσιαστος* und *ἔνθουσιαστικός*, gebildet. 3) 4) Martialis epigr. 1. 10. ep. 57. v. 11. et 1. 5. ep. 42. v. 3.
- Entthymesis**, in Uebersetzung des gleichlautenden Griechischen Wortes<sup>1</sup>, f. Gedanke.
- ἐνθύμησις*.
- Entia**, i. q. *Essentia*, f. Wesen. Vgl. auch *Ents*.
- Entkräftung**, f. Müdigkeit.
- Entladung des Mastdarms**, f. Darmausleerung.
- Entmannung**, f. Castration.
- Entmanneter**, f. Castrat.
- Entrichoma**, in Uebersetzung des gleichlautenden Griechischen

Wortes<sup>1</sup>, der äußerste Theil der Augenlider, aus dem die Wimpern hervortreten. S. Ränder der Augenlider.

1) ΕΥΤΡΙΧΥΜΟΣ.

**Entrüstung**, s. Zorn.

**Entsäuerung**, **Entsäuerstoffung**, s. Desoxydation.

**Entsagung**, s. Enthaltbarkeit.

**Entscheidungslinien**<sup>1</sup>, **Discriminallinien**, (**Lineae criminales**<sup>2</sup>), nach der Bezeichnung der Chiromanten in der Hand die Querlinien, welche die Hand von dem Arm abgrenzen, wovon die erste den besondern Rahmen *Nasceta* führt. Vgl. **Chiromantie**.

1) 2) Deuschel's Abb. d. Physiogn. Metoposc. u. Chiromantie, S. 302.

**Entschlafen**, eigentlich der Uebergang in den Schlaf, oder **Einschlafen**, im tragischen Sinne aber **Sterben**.

**Entschlossenheit** ist die Fertigkeit des Willens, sich schnell und kräftig zu bestimmen. Sie ist mithin eine Vollkommenheit, die die Natur in einer gewissen Stärke und Gewandtheit des Willens besitzt. Das, wozu sich der Wille bestimmt, mag nun ein Handeln oder Dulden seyn, dieß hat auf die Natur der Entschlossenheit keinen Einfluß. Das Gegentheil ist **Unentschlossenheit**. Um sich zu entschließen, etwas zu wollen, dazu ist ein gewisser Grad von Reife erforderlich, welcher dem Unentschlossenen gänzlich fehlt. Er schwankt bald hin, bald her, kann nicht zum Entschlusse kommen, und verläßt darüber die beste Gelegenheit zu handeln. (Diondi.)

**Entschluß**. Sich entschließen, heißt nach freier Willkür bestimmen, etwas zu thun oder nicht zu thun. Ein Entschluß ist also: freie Bestimmung unsers Willens. Zu einem Entschlusse, im strengen Sinne, gehört also jederzeit Freiheit der Willkür; denn er hängt immer von uns ab, etwas nicht zu wollen, d. h. uns nicht dazu zu entschließen. Einen vernünftigen Menschen kann keine äußere Gewalt zu irgend einem Entschlusse zwingen, wohl bewegen; das höchste Zwangsmittel, Androhung des Todes, kann er durch freien Entschluß zu sterben, vernichten. Im weitern Sinne aber bezeichnet dieser Ausdruck jede Selbstbestimmung unsers Willens, sie sei frei oder erzwungen, und man unterscheidet daher einen freien Entschluß und einen erzwungenen. Die innern und äußern Beweggründe des freien Entschlusses können entweder in der Sinnlichkeit, dem Verstande oder der Vernunft liegen. S. **Begehrung** und **Vermögen**. Die äußern Beweggründe zu erzwungenen Entschlüssen sind insgesamt Modificationen des Schmerzens, von welcher Art er auch sei, oder von welchem Grade.

Es liegt im Entschlusse eigentlich zweierlei, theils eine Beziehung auf vorhergegangene Antriebe und Bestimmungen, theils Hinweisen auf künftige Ausführungen unsers Willens.

**Beschluß** unterscheidet sich von Entschlusse durch die Theilnahme mehrerer an einem Entschlusse. Ein Entschluß, den mehrere, nach vorhergegangener Ueberlegung, fassen, heißt ein **Beschluß**, und gilt von ihm übrigens dasselbe, was vom Entschlusse gesagt worden ist.

**Beschließen** wird aber auch von einem einzigen Individuum gebraucht, und unterscheidet sich dann von sich entschließen dadurch



hieses immer ein vorhergegangenes Wanken und Ungewißheit, daher geradehin die Bestimmung des Willens ohne vorhergegangenes Schwanken bezeichnet. (Diondi.)

Entseelung, s. Tod.

Entsinnung, s. unter Besinnung.

Entstehung, s. Ursprung.

Entwicklung, s. Evolution.

Entwickelungslehre, s. Evolutionsystem.

Entwöhnen, Entwöhnung, Entwohnung, Abgewöhnen, (Desuetudo<sup>1</sup>), die Beseitigung des Einflusses, welchen eine frühere Gewohnheit auf Lebensthätigkeiten aller Art äußerte, an sich zu ändern, entweder durch die Macht des Willens, welche jene Gewohnheit besiegt, oder durch Annahme einer gegengesetzten Gewohnheit. Vgl. Gewöhnung und Gewohnheit.

Enovidii Trist. l. 5 et 7. v. 57.

Entyposis, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wortes<sup>1</sup>, s. Glenoidalhöhle des Schulterblatts.

εντυπωσις. (Stephani dict. med. 1564, p. 594.)

Entzauberung, Aufheben von Bezauberung. Vgl. Magie, auch Antitation.

Entzücken, vgl. Vergnügen.

Entzückung, s. Ecstase.

Ennula, Enulon, in Uebertragung der gleichen Griechischen Bezeichnungen<sup>1</sup>, das Innere des Zahnfleisches. Vgl. Ulon, auch Zahnfleisch.

ενουλον, ενουλα. (Julii Polluc. onomast. in Stephani dict. med. 1564, p. 591.)

Enypnion, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wortes<sup>1</sup>, s. Traum.

ενυπνιον, wörtlich was im Schlaf vorkommt.

En, dessgl.<sup>1</sup>, der ganze Umfang des Auges. Vgl. Auge.

ενων δε, πασα η των οφθαλμου περιγραφη. (Jul. Polluc. onomast. in Stephani dict. med. Par. 1564, p. 588.)

Enagogion, dessgl.<sup>1</sup>, s. Vorhaut.

ενταγωγιον. (Dioscorid. de med. mat. l. 3. c. 25.)

Enacar, i. q. Hepar, s. Leber. — uterinum, s. Placenta.

Enaticus, a, um etc., i. q. Hepaticus, a, um etc.

Enecranis, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte<sup>1</sup>, i. rebellum.

εντεκρανις (Galen de usu part. l. 8. c. 13.)

Enhebaeon, dessgl.<sup>1</sup>, die tiefere Gegend des Abdomens bis zu Schamtheilen. S. Pubisregion.

ενηβαιον. (Rufi Ephees. de appell. part. c. h. in Stephani dict. med. Par. 1564, p. 535.)

Enhebe, (Ephebus<sup>1</sup>, Puber<sup>2</sup>, Pubes<sup>3</sup>), ein junger Mensch tritt aus dem Knabenalter, in der Periode der sich entwickelnden Geschlechtsreife. S. Pubertät.

ενηβος. (Galen de temperam. l. 2. c. 5.) S. auch Censorini de nat. c. 14. 2) Catulli carm. 62. v. 63. 3) Corn. Nep.

at. Dion. c. 4.

Enhebia, dessgl.<sup>1</sup>. S. Pubertät.

ενηβια, εφηβεια.

Enhebus, s. Ephebe.

*Ephedrana*, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wortes<sup>1</sup>, i. q. Nates. S. Hinterbacken.

- 1) εφεδρανα. (Rufi Eph. de appell. part. c. h. in Stephani dict. Par. 1563, p. 536)

*Ephidrosis*, deßgl.<sup>1</sup>, ein gelinder Schweiß, doch auch überhaup Schweiß.

- 1) εφιδρωσις, sudatiuncula, nach Hippocrates in Krankheiten ein zu geringer, nicht entscheidender Schweiß. (Foesii occ. Hipp. h. v.) In allgemeiner Bedeutung von Schweiß braucht dieß Wort Z. B. Willis (de medicamentor. oper. s. r. c. i.)

*Ehippium*, deßgl.<sup>1</sup>, i. q. Sella Turcica.

- 1) εφιππιον, ein Sattel.

*Ephodi*, deßgl.<sup>1</sup>, s. Excretionswege.

- 1) εφοδοι. Vgl. Foesii occ. Hipp. h. v. Eine andere Bedeutung des Wortes von Umsäßen von Krankheiten, oder Einwirkungen äußerer Dinge auf Körper, gehört nicht hieher.

*Epicanthides*, deßgl.<sup>1</sup>, i. q. Canthi oculorum. S. Winkel des Auges.

- 1) επικανθιδες.

*Epicanthis*, deßgl.<sup>1</sup>, s. Thränenendrüse.

- 1) επικανθις. (C. Hofmanni comm. in Galeni de usu part. l. v. n. 78)

*Epicheiresis*, deßgl.<sup>1</sup>, i. q. Encheiresis.

- 1) επιχειρησις.

*Epicholi*, deßgl.<sup>1</sup>, s. Choleriche Personen.

- 1) επιχολοι. biliosi. Vgl. Foesii occ. Hipp. h. v.

*Epichordis*, deßgl.<sup>1</sup>, i. q. Mesenterium.

- 1) επιχорδισ (Aretaei de caus. et sign. ac. morb. l. 2. c. 6,) so bene weil es über die Därme, (Chordae,) sich herumschlägt. Vgl. Stephani de med. Par. 1564, p. 289, „lactes enim epichordida Graeci veteres minarunt.“

*Epicoelis*, deßgl.<sup>1</sup>, das obere Augenlid. Vgl. Augenlider.

- 1) επικοιλις, im Plural επικυλιδες.

*Epicoemasis*, deßgl.<sup>1</sup>, vgl. Schlaf.

- 1) επικοιμωσις, eigentlich die Lage des Körpers im Schlaf, wie z. B. das Schließen auf dem Rücken, auf der Seite u. s. w. Vgl. Foesii occ. Hipp. l. i.

*Epicolicae*<sup>1</sup> regiones, i. q. Iliacae regiones.

- 1) Von Glisson (anat. hepat.) wird insbesondere die Gegend um das Colon als epicolica pars, unterschieden.

*Epi-condylo-cubitalis musculus*, s. unter Anconden, den ersten Anconden. — — *cubito-supra-metacarpieus musculus*, Ulnarextensor der Hand. — — *radialis musculus*, s. unter Supinatoren, den kurzen Supinator. — — *supra-phalangeus musculus digiti minimi*, s. Extensor des kleinen Fingers. — — *metacarpieus musculus*, s. unter Radialextensoren der Hand, den kurzen Extensor. — — — *phalangeus musculus communis*, s. Extensor der Finger.

*Epicrania membrana*, s. Aponeurotische Galea des Kopfs.

*Epicranius*, (*Epicranius*<sup>1</sup>, sc. *musculus*), Stirnschädelmuskel, Stirn- und Hinterhauptsmuskel<sup>2</sup>, Muskel über dem Schädel<sup>3</sup>, Großer Augenbraunmuskel<sup>4</sup>.

- 1) Albini hist. musc. hom. 4. ed. p. 136. 2) nach Sommering (Muscul. §. 61.) 3) Mayer's Besch. d. menschl. K. 3. B. S. 15 4) Grands sourciliers, nach Steutend (s. d. d. Bergliederungs. Übers. S. 1782, 2. B. S. 257.)



culus occipito-frontalis<sup>5</sup>), der zuerst von Albin<sup>6</sup> als ein zusammenhängender einziger, aus dem Zusammentritt der Frontal-Occipitalmuskeln mittelst der ihnen gemeinschaftlichen, unter dem Namen der aponeurotischen Galea des Kopfs bekannten Sehnenhaut gebildet ist, Muskel. S. Frontal- und Occipitalmuskeln.

und Douglas (myogr. compar. c. 4) 6) v. d. D.

Epictenion, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wortes. P. Pubisgegend.

ἐπικτενιον, locus supra pecten.

Epicyema, nach dem gleichlautenden Griechischen Worte<sup>1</sup>, (Epicyema, Fetus succedaneus<sup>2</sup>), ein durch Superfetation erzeugter Fötus. Vgl. Superfetation.

ἐπικυησις, superfetatum. Vgl. Foessii oec. Hipp. h. v. 2) Hipp. vict. rat. ex vers. Foessii, l. 1. c. 11.

Epicyesis, beßgl.<sup>1</sup>, s. Superfetation.

Hippocr. l. περὶ ἐπικυήσεως, i. e. de superfetatione.

Epideris, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wortes. i. q. Clitoris.

ἐπίδερσις. (Jul. Polluc. onomast. in Stephani dict. Par. 1564, p. 599.)

Epidermatis, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wortes<sup>1</sup>, i. q. Epidermis.

ἐπίδερματις (Galenii comm. ad aphor. Hipp. l. 4. partic. 77.)

Epidermis<sup>1</sup>, (Epidermis<sup>2</sup>), Oberhäutchen<sup>3</sup>, Oberhautlein<sup>4</sup>, Oberhaut<sup>5</sup>, Aeußerstes dünnes Häutlein<sup>6</sup>, die der Haut<sup>7</sup>, (Cuticula<sup>8</sup>, s. Cuticula extrema, s. extrema<sup>9</sup>, s. summa<sup>10</sup>, s. ultima<sup>11</sup>, Pellis summa<sup>12</sup>, Pellesumma, s. superior<sup>13</sup>, Lamina prima, s. Efflorescens. Operculum<sup>14</sup>, s. Epiphysis<sup>15</sup>, s. Summitas<sup>16</sup>, s. Superficies<sup>17</sup> cutis, Epidermatis<sup>18</sup>, Hymen<sup>20</sup>), das feine, dünne, einfache, unempfindliche, die äußere Oberfläche der Körperbedeckende Häutchen, welches mit den tiefern Theilen der Haut kleine Fädchen zusammenhängt, mit einer Menge kleiner Löcher die erhaltenden und absorbirenden Gefäße und die Oeffnungen der Talgdrüsen der Haut, so wie für das Durchtreten der Poren versehen ist, und als ausgetrocknetes Malpighisches Schleimhäutgesehen werden kann. Es wird nach Verletzungen leicht ersetzt, verheilt durchs Reiben, wird von der Luft nicht angegriffen, schützt so die ihm liegenden empfindlichen Theile der Haut, und indem es die Oeffnungen der äußern Haut mit derselben in unmittelbarem Uebertragung des Griechischen Wortes ἐπίδερμις. (Hippocrat. de puer. l. c. 6.) S. auch Halleri elem. physiol. T. V. l. 12. s. 1. 3.) 3) Kleutand's Gergliederungsk. Uebers. Vebj 1782, 2. B. S. 4.) 4) Kulmus anat. Tabell. Tab. 6. 5) Scharschmidt's anatomol. Tabell. Tab. 1. 6) Valign's chr. Anat. übers v. Duth, 1783. S. 8. 7) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1733, 3. B. 4404. 8) Vesalii de hum. c. fabr. l. 2. c. 5. 9) Hippocr. anat. pueri l. v. Foessio l. c. 10) nach Celsus (de med. l. 3. 25.) 11) C. Bauhini theat. anat. l. 1. c. 9. 12) Persii tr. 4. v. 14, „Summa ne quidpiam pelle decorus.“ 13) Bauhini th. an. l. c. not. a. 14) Vesalii de h. c. fabr. l. c. 15) Bagelii de hum. c. fabr. l. 8. c. 1. 16) Winslow (expos. anat. T. III. tr. des tegmens, §. 3, u. Uebersetzung Francof. et Lips. l. c.) 17) Spigelii de h. c. fabr. l. c. 18) nach Galen. S. Riolani chronogr. l. 2. c. 4. 19) 20) Vgl. diese Worte.

barer Verbindung stehenden innern Höhlungen überzieht, gewährt insbesondere den zur Respiration, zur Aufnahme der Nahrungsmittel, zur Generation und zur Urinausscheidung gehörigen Organen durch seine Bedeckung gleiche Vortheile. — *S. Integumente Corporis.*

*Epidermis linguae*, *s. Periglottis*.

*Epididymis*, (*Epididymis*<sup>1</sup>), Nebenhode<sup>2</sup>, D<sup>3</sup> hode<sup>3</sup>, Oberhötlein<sup>4</sup>, Nebengaille<sup>5</sup>, Zukömmlingsde<sup>6</sup>, (*Testiculus accessorius*<sup>7</sup>, *Caput testis*, *Supergeminal*, *Parastata*<sup>9</sup>, *Parastata varicosa*<sup>10</sup>; *s. cyrsoides*<sup>11</sup>, *Corpus ricosum*<sup>12</sup>; *s. variciforme*<sup>13</sup> *testis*), der an der obern und tern Seite des Hodens gleichsam als ein eigner Anhang unterstehbare Theil desselben, dessen Anfang oder Kopf von den conisch bildeten Endigungen der Graafischen Samenröhrchen gebildet wird, welche in den Canal der Epididymis übergehen, der, vielfach geschwungen, den übrigen Theil dieses Gebildes constituirte, und endlich dem deferirenden Gang sich endigt. *Columb*<sup>14</sup> und andere anatomische Schriftsteller bezeichnen auch die Albuginea des Hodens als Epididymis. — *S. unter Genitalien des männlichen Geschlechts Hoden.*

- 1) entsprechend dem gleichlautenden Griechischen Worte *epididymus*. (*Galenus* voc. Hipp.) Vgl. *Riolani anthropogr.* l. 2. c. 31. 2) *Holl* Gruner, d. Physiol. umgearb. von v. Leveiling, 2. Th. S. 871. 3) *de* *debrandt's* Lehrb. d. Anat. d. M. 3. Th. S. 2230. 3) 4) veraltete drücke 6) *Winslow's* anat. Abh. Uebers. Berl. 1733, 3. P. S. 7) *Schaarschmidt's* splachnol. Tab. Tab. 10. 8) nach *E. Hofmann* Uebers. (*S. dess. Comment. ad Galeni de usu part. l. n. 1016.*) *Bauhini* theatr. anat. l. 1. c. 26. Vgl. auch dasselbe Wort. 10) *L* *rentii* hist. an. l. 7. c. 3. 11) *S. ebendas.* Vgl. *Riolani* anat. l. c. 12) *Verheyen* c. h. anat. l. 1. tr. 2. c. 22. 13) *Bartholini* anat. l. 1. c. 23. 14) *de re anat.* l. 11. c. 14

*Epigastrica arteria*, *s. unter Coronarische Magenarterien, obere Arterie*, *ingl. unter Epigastrische Arterien, untere Arterie. regio, i. q. Epigastrium.* — *vasa*, *s. Epigastrische Arterien Venen.*

*Epigastricae arteriae*, *s. Epigastrische Arterien.* — *venae* *s. Epigastrische Venen.*

*Epigastrici muscoli*, *s. Abdominalmuskeln.*

*Epigastricus plexus*, *s. Epigastrisches Saugabergeflecht.*

*Epigastrische Arterien*, (*Epigastricae arteriae*<sup>1</sup>), Bauchdeckenarterien<sup>2</sup>, Oberbaucharterien<sup>3</sup>, oder Schlagaden, Oberbaucharterien, Schlag- oder pulsader, Schmerbaucharterien, Schlag- oder pulsader, deren we a) eine obere<sup>6</sup>, (*superior*<sup>7</sup>), die Endigung der innern mammarischen Arterie, welche abwärts zu den Abdominalintegumenten geht, und eine untere<sup>8</sup>, (*inferior*<sup>9</sup>), ein Zweig der Cruralarterie, den sie vor ihrem Austritt unter dem Inguinalligament aus dem Becken

- 1) *Maner's* Besch. d. Blutgef. S. 87 u. 158. 2) *Schmerrin* Gefäßl. S. 192 u. 307. 3) *Paltyn's* Chirurg. Anat. Uebers. v. H. 1. Th. S. 335. 4) *Leber's* Vorles. über d. Zergliederungsk. S. 5) *Heuermann's* Physiol. 1. B. S. 138. 6) — 9) *Schmerrin* Gefäßl. a. a. D.



der sich aufwärts in die Abdominalmuskeln verbreitet, untergen. S. unter Subclaviculararterie, innere Mamma und Cruralarterie.

**epigastrische Gegend oder Region, f. Epigastrium.**

**epigastrische Venen, (Epigastricae venae<sup>1</sup>),** Bauchdölutadern oder venen, Bauchblutadern, Oberbauchvenen<sup>2</sup>, oder venen<sup>3</sup>, die den gleichnamigen Arterien ihrem Verlaufe nach entsprechenden, und sich auch in gleichnamige Venen einmündenden Venen. S. unter Jugularvenen, äußere, ingl. Halsvene.

Violani anthropogr. 1. 2. c. 25.

2) Bientand's Zergliederungsf.

Uebers. Leipz. 1782, 1. B. S. 787.

3) Eoder's anat. Tafeln, Taf.

24. Fig. 2. Nr. 32.

**epigastrisches Saugaderngeflecht, (Epigastricus plexus<sup>1</sup>),** besonders unterschiedenes Geflecht von Saugadern, welches, dem ober oder untern epigastrischen Vene entsprechend, in der Inguinalgegend in die Inguinaldrüsen übergeht. S. Plexus lymphaticus Gefäße.

Wildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 277r.

**epigastrium<sup>1</sup>, (Epigastrium<sup>2</sup>),** Epigastrische Gegend oder Region, (Epigastrica regio<sup>3</sup>), Oberbauch<sup>4</sup>, Oberbauchgegend<sup>5</sup>, Obere Gegend des Bauchs<sup>6</sup>, Oberschmerzgegend<sup>7</sup>, die obere mittlere Fläche des Unterleibs, oder der Raum zwischen der Herzgrube abwärts bis zu einer ideellen Linie, die man sich zwischen untern Rändern der letzten Rippen von der rechten zur linken Seite gezogen denkt. Im engeren Sinn wird jedoch unter Epigastrium bloß der mittlere Theil dieser Fläche, der von den kurzen Rippen unbedeckt bleibt, auch Magengegend, Gegend über dem Magen<sup>8</sup>, (Regio cardiaca, s. stomachica, s. stomachalis<sup>9</sup> ventrale<sup>10</sup>), begriffen. S. Abdominalregionen.

1) entsprechend dem gleichlautenden Griechischen Worte επιγαστριον, nach Auffass (de appell. part. c. h. in Stephani dict. med. Par. 1564, p. 15) cutis supra ventrem posita. In diesem wahren Sinne wird dieß Wort auch von Galen genommen. S. auch Th Bartholini an. l. 1. c. 1. Winslow exp. anat. lat. vers. T. III. tr. synopt. §. 79. 4) Winslow's anat. Abb. Uebers. Berol. 1753, 3. B. S. 379. 5) Leber's Vorles. über d. Zergliederungsf. J. n. 1776, S. 577. 6) Maner's Besch. d. menschl. K. 1. B. S. 141. 7) Kulmus anat. Tabell. Tab. 2. 8) Maner's Besch. u. f. w. a. a. D. 9) Veslingii syntagma anat. commun. Blasii c. 1. not. ad epigastrium. 10) Spigelii de h. anat. 1. 1. c. 3.

**epigenese, (Epigenesis<sup>1</sup>),** Aneinanderreihung<sup>2</sup>, Geschehe oder Virtuelle Präformation<sup>3</sup>, diejenige Art der Bildung der Erzeugung organischer Wesen, nach welcher ein allmähliges Anfügen der Theile an einander nach bestimmten Gesetzen vorausgesetzt wird, im Gegensatz der Evolution, oder auch Metamorphose. S. Erzeugung.

nach dem Griechischen Worte επιγενεση gebildet und besonders von Harvey (gener. anim. ex. 45.) in obiger Bedeutung gebraucht. 2) Ladelot's Abh. v. d. Natur d. ges. menschl. K. Uebers. v. Panzerbieter, S. 46r. 3) Schlegel über d. Erzeugung, S. 52.

at. physiol. Reakw II. B.

*Epiglossis*, in Uebertragung des gleichen Griechischen Wortes i. q. Epiglottis.

1) *επιγλωσσις*. (Rufi Ephes. de appell. part. c. h. l. in Stephani dict. med. Par. 1564, p. 532.)

*Epiglottalis*, i. q. Epiglottis. — *cartilago sterni*, i. Xiphoidens processus sterni.

*Epiglottis*<sup>1</sup>, (*Epiglottis*<sup>2</sup>), Stimmrihrendeckel, Kehldedeckel<sup>3</sup>, Kehldedecklein<sup>4</sup>, Kehlklappe, Athemzähllein, Lufttröhrendeckel, (*Epiglottalis*, *Epiglossis*<sup>5</sup>, *Chlithron*<sup>7</sup>, *Ligula*<sup>8</sup>, *Lingula*<sup>9</sup>, *Lingula exigua*<sup>10</sup>, s. *fistulae s. minor*<sup>12</sup>, *Sublinguum*, *Operculum cannae pulmonum s. laryngis*<sup>14</sup>, *Operimentum*<sup>15</sup>, s. *Opertorium*<sup>16</sup> *rimae*, *rimulae*, s. *cannae pulmonis*<sup>17</sup>), der an der hintern Grenze obern Fläche der Zunge vor der Stimmrinne befindliche, nach der Zunge zu convex, nach der Stimmrinne zu concave Knorpel, welcher, seiner Richtung nach, der Luft zum Eintritt wie zum Austritt in die Luftröhre freien Durchgang verstattet, beim Niederschlucken aber, indem die Zunge an den Gaumen sich anlegt, durch Bedeckung der Stimmrinne dieselbe gegen das Eindringen der Speisen und Getränke sichert. S. *Larynx*. Vgl. auch *Uvula*.

1) 2) In Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wortes *επιγλωττις*. (Hippocratis de corde l.) Riolani anihropogr. l. 4. c. 11. 3) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1834. 4) Mayer's Med. menschl. R. 4. B. S. 128. 5) Fenermann's Physiol. 2. Th. S. 6) Plinii hist. mundi l. 11. c. 37. Vgl. auch dieß Wort. 7) In bestimmter Anwendung. Vgl. dieß Wort, auch *Clastrum gutturis*. Aristotel. hist. animal. vert. Gaza l. 1. c. 16. 9) Hildebrandt Lehrb. u. f. w. a. a. O. 10) Celsi de med. l. 4. c. 1. 11) — C. Bauhini theatr. an. l. 3. c. 96. et ibid. not. d. 14) Vesali de h. c. fabr. l. 1. c. 38. 15) Veslingii syntagm. anat. c. 11. Jul. Casserii Plac. nov. an. Fref. 1612, p. 68. 17) Laurentii hist. anat. l. 9. c. 16.

*Epiglutis*, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wortes<sup>1</sup>, der obere hervorragende Theil der Hinterbacken im Gegensatz Hypoglutis. Vgl. Hinterbacken.

1) *επιγλουτις*. Gorraei def. med. p. 145.

*Epigonatis*, *Epigonis*, *Epigunis*, in Uebertragung der gleichlautenden Griechischen Worte<sup>1</sup>, s. Kniescheibe.

1) *επιγονατις*, (Rufi Eph. de app. part. c. l. in Stephani dict. med. 1564, p. 537.) *επιγονις*, *επιγουνις*. (Jul. Poll. onom. l. c. p. 602.)

*Epigonon*, desgl.<sup>1</sup>, i. q. *Epicyema*.

1) *επιγονον*. (Hippocr. de vict. rat. l. 1. c. 11.)

*Epigunides musculi*, ebenfalls in Uebertragung des eigentlichen Griechischen Wortes<sup>1</sup>, s. Kniemuskeln.

1) *επιγουνιδες*. (Rufi Eph. de appell. part. c. l. in Stephani dict. med. Par. 1664, p. 537.)

*Epigunis*, s. *Epigonatis*.

*Epimylis*, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wortes<sup>1</sup>, s. Kniescheibe.

1) *επιμυλις*, nach Hippocrates. Vgl. Foessii occ. Hipp. h. v.

*Epinephridion*, desgl.<sup>1</sup>, s. Nierensett.

1) *επινεφριδιον*, eigentlich was um die Niere ist.



*epinotion*, in Uebersetzung des gleichlautenden Griechischen Wortes *ἐπινώτιον*, f. Schulterblatt.

*ἐπινώτιον*, eigentlich auf dem Rücken gelegen. (Julii Polluc. onom. in Stephani dict. med. Par. 1564. p. 593.)

*pipechy*. Mit diesem rein Griechischen Worte<sup>1</sup> wird der obere Theil des Vorderarms bezeichnet, im Gegensatz von *Agostos*<sup>2</sup> oder *Agostus*<sup>3</sup>, die innere Seite des Vorderarms mit Inbegriff der Hohlhand. Vgl. *Arme*.

*ἐπιπεφυκος*. 2) *αγοστος*. S. Julii Polluc. onomast. in Stephani dict. med. Par. 1564, p. 595 3) *αγος*, nach Hesychius. S. Gortaei def. med.

*pipephycos*, die Griechische Benennung der *Tunica adnata*<sup>1</sup>. *Conjunctiva*.

*ἐπιπεφυκος*. (Galen de comp. medic. secund. loca l. 4 c. 2)

*epiphania*, in Uebersetzung des gleichlautenden Griechischen Wortes *ἐπιφάνεια*, f. Erscheinung, ingl. Oberfläche.

*ἐπιφάνεια*. (Galen de tuenda sanitate l. 3. c. 8.)

*epiphlebi*, in Uebersetzung des gleichen Griechischen Wortes<sup>1</sup>, Hippokrates<sup>2</sup> Menschen, deren Hautvenen bei übrigens magerem Körper aufgetrieben und mit Blut erfüllt erscheinen. Vgl. *blutige Personen*.

*ἐπιφλεβος*. 2) *aphor*. s. 4. *aph*. 25 et Galeni comm. ad eor.

*epiphoros*. Dieß rein Griechische Wort<sup>1</sup> bezeichnet sowohl überhaupt eine Schwangere, als auch insbesondere eine, die ihrer Niederkunft nahe ist, oder auch eine Frau, die leicht empfängt. Vgl. *schwangere*.

*ἐπιφορος*. S. Foessii occ. Hipp. h. v.

*epiphysse*, (*Epiphysis*<sup>1</sup>), *Ansatz*<sup>2</sup>, oder *Anhang*<sup>3</sup>, oder *Anwuchs*<sup>4</sup>, oder *Anwachsung*<sup>5</sup> eines Knochens, *Beinansatz*<sup>6</sup>, s. *Additamentum*<sup>7</sup>, s. *Appositio*<sup>8</sup>, s. *Appuratio*<sup>9</sup>, s. *Adnexum*<sup>10</sup>, s. *Adnexus*, s. *Annexus*, s. *Adventitia*<sup>11</sup> ossis, *Perone*<sup>12</sup>), das in dem frühern Alter noch von dem Hauptstück des Knochens getrennte, und nur durch Knorpelsubstanz an ihm befestigte, späterhin aber mit ihm verwachsene Endstück eines Knochens, das noch bestimmter auch wohl als *Knochenansatz*<sup>13</sup>, (*Epiphysis ossea*<sup>14</sup>), im Gegensatz von *Knorpelansatz*<sup>15</sup>, (*Epiphysis cartilaginea*<sup>16</sup>), wo nämlich der Knochen bloß ein Knorpel ist und bleibt, bezeichnet wird. S. *Knochen*.

In Uebersetzung des gleichen Griechischen Wortes *ἐπιφύσις*, *Anwachsung*, und schon von Galen in derselben Art, wie noch jetzt in allen anatomischen Schriften von *Epiphysse* unterschieden. S. dessen libell. de ossib. ad tyrones c. 1. Vgl. auch Riolani comm. in hunc libr. annex. ej. anthropogr. Par. 1626, p. 750. 2) 3) *Μοντρο*'s Knochenl. übers. v. Krause, S. 166. 4) *Schmerring*'s Knochenl. S. 42. 5) *Winslow*'s anat. libh. Uebers. Berl. 1733, 1. Th. S. 14. 6) *Vesalii* de h. c. fabr. l. 1. c. 1. 7) *Riolani* comm. de ossib. ann. ej. anthropogr. Par. 1626, p. 750. 8) *Winslow* exp. anat. lat. vers. T. I. tr. de ossib. sicc. S. 45. 9) 10) *Montro*'s Knochenl. u. f. w. a. a. D. Note g. 11) Th. Bartholini anat. libell. 4. c. 1. 12) *Montro*'s Knochenl. u. f. w. a. a. D. Vgl. auch das Wort. 13) — 16) *Mayer*'s Besch. d. menschl. K. 1. B. S. 228.

*epiphysis cartilaginea*, f. unter *Epiphysse*. — *cutis*, i. q. *Dermis*. — *dentis*, f. Krone eines Zahns. — *incudis*, f. *Os*.

bicularknöcheldchen des Dhrs. — *ossea*, s. Epiphyse. — *os sacri*, i. q. Os coccygis. — *xiphoidea*, s. Xiphoidei Proceß.

*Epiplerosis*, in Uebertragung des gleichen Griechischen Wortes *Superimpletio*, nach Galen<sup>2</sup> das Ueberfüllen der Arterien mit nem lustigen Geiste aus dem Herzen, worauf nach der Ansicht Crisistratus die Erweiterung der Arterien beim Pulsschlag bestehen sollte. Vgl. Diastole.

1) επιπληρωσις. 2) de diff. puls. l. 4. c. 6 et 17.

*Epiploa*, s. Neße.

*Epiploe*, in Uebertragung des eigentlich Griechischen Wortes i. q. Complexio.

1) επιπλοκή.

*Epiploica membrana*, s. Neßhaut. — *supplementa*, s. Epiploische Anhänge.

*Epiploicae appendices*, s. *appendiculae*, s. Epiploische hänge. — *arteriae et venae*, s. Neßarterien und venen.

*Epiploici sacci*, s. Neß.

*Epiploicum marsupium*, s. Neß.

*Epiploische Anhänge*, (*Epiploicae appendices*, s. *appendiculae*<sup>1</sup>.) Fettanhänge, oder Fettstückchen<sup>2</sup>, oder Fettzipfel<sup>3</sup>, oder Neßchen<sup>4</sup>, oder Neßähnliche Verlängerungen<sup>5</sup>, oder Anhängsel am Dickdarm, Fettige Anhänge des Grimms- und Mastdarms<sup>6</sup>, Kleine Neße<sup>7</sup>, Zugabe zum Neße<sup>8</sup>, Kleines Neß<sup>9</sup>, (*Appendiculae*, s. *Fimbriatae*, s. *Excrescentiae carnae*<sup>10</sup>, s. *ramosae*<sup>11</sup> *colici*, s. *Omenta*<sup>12</sup>, s. *Omentula*, s. *Epiploa*<sup>13</sup> *parva*, *Supplementa epiploica*<sup>14</sup>, *Appendices coli et recti adiposae*<sup>15</sup>, s. *pingues*, *Appendiculae pingues coli*<sup>17</sup>.) die an dem Dickdarm unterscheidbaren häutigen Lappchen, welche, eben so wie die Neße, aus zwei einander liegenden Plättchen bestehen, Fortsätze der äußern Hülle des Dickdarms sind, und mehr oder minder Fett zwischen sich haben. S. *Datmcanal*, ingl. Neße.

1) Halleri el. physiol. T. VI. l. 20. s. 1. §. 17. 2) — 4) Schmidt's ring's Eingeweidel. S. 142 u. 143. 5) Lieutaud's Zergliederung Uebers. Leipz. 1782, 2. B. S. 492. 6) — 8) Winslow's anat. Uebers. Berl. 1733, 4. B. S. 568 u. 565. 9) nach Lieutaud (a. O.) 10) 11) nach Willis (de convuls. l. p. 124.) 12) Haller el. phys. l. c. 13) — 15) Winslow exp. anat. lat. vers. T. I. tr. de abd. §. 365 u. 366. 16) nach Vesal (d. h. c. fabr. l. 5. c. 17) Spigelii de h. c. fab. l. 8. c. 9.

*Epiploocomistes*, in Uebertragung des gleichen Griechischen Wortes<sup>1</sup>, *Omenti gestator*<sup>2</sup>, ein Mensch mit einem mit vielem Fett erfüllten Neße. Vgl. Neße.

1) επιπλοοκομιστής. (Vgl. Vesalii de h. c. fabr. l. 5. c. 4.) 2) S. ebenda.

*Epiploon*, *Epiplun*, in Uebertragung derselben Griechischen Worte<sup>1</sup>, s. Neße.

1) επιπloon, επιπλων. (Hippocrat. aph. l. 5. aph. 6.)

*Epiploon magnum*, s. Großer Neß. — *parvum*, s. Kleiner Neß.



*Epischion*, in Uebertragung des gleichen Griechischen Wortes <sup>1</sup>,  
(Os pubis. S. Schooßstück des Hüftknochens.

*ἐπισχιον*. (Gorræi def. med. h. c.)

*Episcynia*, beßgl. <sup>1</sup>, i. q. Supercilia. S. Augenbraunen.

*ἐπισκυνια*.

*Episeion*, beßgl. <sup>1</sup>, i. q. Ephebaeon. S. auch Pubisregion.

*ἐπισειον*, *ἐπισειον*. (Foesii oec. Hipp. h. v.)

*Epispasmos*, beßgl. <sup>1</sup>, f. Inspiration.

*ἐπισπασμος*, eigentlich Attractio, nach Galen (comm. in Hipp. Epid.  
15. c. 5) gleichbedeutend mit *εισπνοη*.

*Episphaeria cerebri*, beßgl. <sup>1</sup>, f. Windungen des Ge-  
83.

*ἐπισφαιρια*.

*Epistaphylinus musculus*, i. q. Azygos uvulae.

*Epistata*, i. q. Parastata.

*Episteme*, in Uebertragung des eigentlich Griechischen Wortes <sup>1</sup>,  
Scientia. S. Erkenntniß.

*ἐπιστημη*.

*Epistomia*, nach dem Griechischen gleichlautenden Worte <sup>1</sup>, f.  
ßmündungen.

*ἐπιστομία*, eigentlich Stöpsel, bei den Chemikern aber verschleißbare Luftlöcher.

*Epistropheus*, f. Epistropheus.

*Epistrophe*, in Uebertragung des gleichen Griechischen Wortes <sup>1</sup>,  
Inversio. S. Umwenden.

*ἐπιστροφή*.

*Epistrophea*, uneigentliche Benennung von Epistropheus.

*Epistropheus* <sup>1</sup>, (*Epistropheus* <sup>2</sup>, Epistrophus <sup>3</sup>, Epi-  
thaeus <sup>4</sup>, Epistrophea <sup>5</sup>.) Zweiter Halswirbel <sup>6</sup>, Zwei-  
Halswirbelbein <sup>7</sup>, Umdreher <sup>8</sup>, Umtreiber <sup>9</sup>, Dre-  
10, Achse <sup>11</sup>, Axe, Wirbelbein mit Einem Zahn <sup>12</sup>,  
Wirbel <sup>13</sup>, (Axis <sup>14</sup>, Axon <sup>15</sup>, Vertebra secunda <sup>16</sup>, s.  
17, s. dentata, Dens <sup>17</sup>, Spondylos <sup>18</sup>.) Dieser zweite der sie-  
Halswirbel hat in seinem Bau und auch in seiner Bestimmung  
11 Ausgezeichnetes, daß er mit gleichem Recht als der unter  
besondern Namen Atlas bekannte einen besondern Artikel ver-

ter dem Artikel Atlas ist bemerkt worden, daß dieser eben so  
als eine Unterlage des Kopfs, und also als ein intermediärer

nach dem Griechischen Worte von gleicher Bedeutung *ἐπιστροφους*. (Jul.

colluc. onom. in Stephani dict. med. Par. 1564, p. 593.) S. Man-

er's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 129. 3) Verheyen anat. c. h.

5. c. 8. 4) Heisteri comp. anat. ed. 2. p. 28. 5) Mon-

er's Knochenl. übers. v. Krause, S. 269. 6) Blumenbach's Besch.

Knoch. S. 225. 7) Maner's Besch. u. f. w. a. a. D. 8) Ro-

er's anat. Handb. 1. B. S. 158. 9) Kulmus anat. Tabell. Tab. 5.

10) Edmerring's Knochenl. S. 285. 11) Palfyn's chr. Anat.

übers. v. Huth, 1. Th. S. 139. 12) Walther's Abh. v. trochn. Knoch.

1. Aufl. S. 222. 13) Eleutaud's Zergliederungsß. Uebers. Leipz. 1782,

1. B. S. 141. Note. 14) Leberi pract. anat. ed. nov. Vindeb. 1778,

1. 60. 15) nach Pollux (*αξων*.) onom. in Stephani dict. med.

Par. 1564, p. 593. 16) Verheyen anat. l. c. 17) nach Hippo-

crates (*οδων*, *οδους*, Epid. 1. 2. s. 2. n. 69.) S. Laurentii hist.

anat. l. 2. c. 24. 18) ebenfalls nach demselben (*σπονδυλος*.) Bgl. Foe-

ii oec. Hipp. h. v.

Knochen, als wie ein Halswirbel betrachtet werden kann. Nach jener Ansicht aber erscheint der Epistropheus als der oberste Halswirbel, welchem also die ganze Rückenwirbelsäule nach oben vollendet ist. so ein oberes Endstück und Spitze der ganzen Rückenwirbelsäule. Er ist sich vornehmlich derjenige Knochentheil dar, der von allen Wirbeln diesem allein zukommt, und unter dem Namen des zahnförmigen Fortsatzes, (Processus odontoides,) bekannt ist. Ehe wir uns nun zur besondern Betrachtung des letztern kommen, wollen wir die übrigen einzelnen Theile dieses Knochens gedenken, welche derselbe mit den übrigen Halswirbeln gemein hat, und bei jedem das Gleiche, nebst den Ursachen anführen, aus denen der Epistropheus nicht den übrigen Halswirbeln durchaus conform gebildet seyn kann.

Wie an allen Wirbeln unterscheidet man an ihm 1) einen Körper und 2) einen durch das Zusammentreten von sieben Knochenfortsätzen oder Processen, a) hinterwärts den dornigen Fortsatz, zur Seite b) zwei Querfortsätze und c) zwei obere und zwei untere schalenförmige Fortsätze oder Gelenkfortsätze, mit eben so viel Articulationsflächen gebildeten Bogen, den der Körper vorwärts schließt, welches auf demselben Art entstehende Loch in Verbindung mit den gleichen Löchern in den übrigen Wirbeln den Rückenmarkscanal bildet.

1) Der Körper, (Corpus,) hat vorzüglich das Ausgezeichnete, daß von den zwei Gelenkflächen, die an den Körpern aller Wirbel unterschieden werden, und wodurch jeder sich mit den gleichen Theilen der beiden nächsten Wirbel verbindet, die obere fehlt, und statt derselben der angegebene zahnförmige Fortsatz vorhanden ist. Die untere Gelenkfläche, wodurch die Hauptverbindung mit dem dritten Halswirbel bewirkt wird, ist von hinten nach vorn mit einer Concavität abwärts gesenkt, indem von hier an die Halswirbel ihrer Gesammtheit ihre Richtung hinterwärts nehmen. Die hintere oder nach innen zu gekehrte Fläche zeigt sich etwas rauh von der Unterlage von Ligamenten, die vordere, oder nach außen gekehrte aber unten hervorragend, und ebenfalls rauh, besonders von der Unterlage des langen Halsmuskels. Von dieser untern Tuberosität steigt eine erhabene Linie aufwärts, an deren beiden Seiten sich Vertiefungen zeigen. Oben läuft sie an der Stelle, wo das Tuberculum des Atlas sich hinter dem zahnförmigen Fortsatz an den Epistropheus anfügt, flach aus. Hier kann man auch zwischen den beiden obern schrägen Processen eine schwache Querlinie unterscheiden, die sich mit dieser kreuzt. Uebrigens ist dieser Körper der größte von allen Körpern der Halswirbel und ziemlich zwei Mal so hoch als die übrigen. Daher dieser Wirbel auch unter den übrigen Halswirbeln bei der Bewegung des Halses durch die dafür geeigneten Muskeln den andern freien Spielraum gewährt.

2) Die beiden Gelenkfortsätze, (Processus obliqui, articulares,) liegen nicht wie bei den übrigen Halswirbeln an jeder Seite gerade über einander, sondern die obern bedeutend vorwärts, die untern dagegen mehr nach hinten. Die untern sind hinterwärts abhängig, und verbinden sich mit den aufsteigenden Articulationsprocessen des dritten Halswirbels; die obern, mehr horizontal, doch immer noch etwas schief von innen nach außen gehend, und von vorn



re Wölbung, entsprechen, ihrer länglich runden Form nach, den Articulationsflächen des Atlas, mit denen sie sich verbinden, namentlich durch sie dem Kopf bei aufgerichtetem Körper seinen Stützpunkt zu geben; doch sind sie etwas breiter als jene, wodurch die Beweglichkeit zwischen diesem Wirbel und dem bei Drehung des Kopfs begünstigt wird<sup>19</sup>. Vesal<sup>20</sup> hat an beiden Articulationsflächen einen eignen kleinen Knorpel gesehen; ein Fall der unter die sehr ungewöhnlichen gehört, da die Schriftsteller seiner nicht erwähnen.

Die Querprocessse, (Processus transversi,) sind unter der Halswirbel die kürzesten, abwärts geneigt und nur wenig, von den obern articulirenden Processen gleichsam bedeckt. Diese mindere Breite des ganzen Wirbels wird vorzüglich die schräge Bewegung des Atlas mit dem Kopfe sehr erleichtert. (Vgl. Artikel Atlas.) Das Vertebraalloch, welches, wie in allen Wirbeln, die beiden Wurzeln eines jeden Querprocesses zwischenlassen, hat seine Richtung schräg nach außen, welcher Richtung auch die Vertebraarterien sich, durch sie hindurchgehend, abwärts auswärts biegen müssen, um das Vertebraalloch in dem zu erreichen.

Der spinöse Proceß, (Processus spinosus,) ist breiter als den übrigen Halswirbeln, auch länger als an den drei folgenden, bedeutend über das Tuberkel des Atlas hinausragend. Oberwärts zeigt er eine scharfe Linie, die in die beiden Seitenränder des Bogens ausläuft; unterwärts spaltet er sich in zwei stumpfe Enden. Auf solche Weise finden besonders die Muskeln, die zur Bewegung des Kopfs hinterwärts und seitwärts dienen, namentlich der untere schiefe und der hintere größere Kopfmuskel, nebst dem Ligamentum, vortheilhafte Insertionsstellen.

Von dem spinösen Proceß aus krümmt sich nun der Bogen des Rückenmarkslachs hinterwärts schief zu den articulirenden Processen, welche mit dem Körper des Wirbels dasselbe vorwärts in die Gelenkflächen ausbilden, daß das Loch selbst etwas größer, rundlicher oder hörmiger erscheint, als in den folgenden Wirbeln, ob es gleich bei dem Atlas besonders um deswillen weit nachsteht, weil dieses Loch zugleich dem odontoidischen Proceß Raum gewährt. Der Einschnitt, (Incisura,) am obern Rande des Uebergangs des Bogens in die articulirenden Processen für den Durchgang des zweiten Cervicalnerven ist nur leicht, da der Atlas hier den größern Theil des dafür erforderlichen Raums darbietet; weit ansehnlicher ist derselbe am untern Rand für den Durchgang des dritten Cervicalnerven.

Der bereits oben gedachte ausgezeichnete Theil dieses Wirbels nun, der zahnhörmige Fortsatz, (Processus odontoidens,) hat den Zweck, den Wirbel, insbesondere aber den Körper desselben zu seiner Verankerung. Wenn man den Epistropheus und einen andern der tieferen Wirbel neben einander stellt, so hat es das Ansehen, als ob die Gelenkfläche des Körpers während eines frühern Zustandes

<sup>19</sup>) Sabatier tr. compl. d'anat. 3. éd. T. I. p. 114.    <sup>20</sup>) de h. c. fabr. 1. 1. c. 15.

von Nachgiebigkeit und Bidsamkeit in die Höhe gezogen und zu nem rundlich warzenartigen Theil gemodelt worden war. Diese Bildung konnte aber auch schon in der frühern Anlage des Knochens keine andere seyn, weil die offenbare Bestimmung dieses Theils eine Zapfenverbindung des Schädels und der Rückenwirbelsäule, ter Vermittelung des eingeschobenen Atlas, als Kopfträgers, zu wirken.

Als ein solcher Zapfen ragt nun der odontoideische fast so hoch als der eigne Körper desselben ist, über demselben in die Aushöhlung hinein; die der hintere Bogen des Atlas zwischen den Articulationsflächen desselben läßt. Seine Form nähert sich der cylindrischen, einem conischen Ende. Vor- und hinterwärts ist er jedoch etwas platter geformt. Insbesondere macht sich an der vordern Seite eine ovale glatte Fläche bemerklich, welche eine wahre Articulation mit einer ihr entsprechenden an der hintern Seite des vordern Bogens des Atlas bildet, welche beide Flächen in natürlichem Zustande mit Knorpel überzogen und von einem Capselligament eingeschlossen sind, wodurch eine Seitenbewegung beider Knochen, und also auch die Drehung des Kopfs mit dem Atlas verstattet wird. Die entgegengesetzte hintere Fläche dieses Zapfentheils ist uneben in der Mitte von oben nach unten gerechnet etwas vertieft, weil das Querligament des Atlas, welches zunächst, indem es sich hinter dem odontoideischen Proceß wegzieht, hinterwärts die gedachte zapfenartige Verbindung bewirkt, hier zugleich eine Anlage findet. Die Seitenflächen zeigen ebenfalls von Befestigung der Lateralligamente des odontoideischen Processes Rauhigkeiten. Die Eintheilung des ganzen Zapfens in die Wurzel, (Radix,) den Hals, (Collum,) oder den mittlern nur wenig schmälern Theil, den Kopf, (Caput,) den fortgehenden etwas stärkern Theil, und die ziemlich stumpfe Spitze, (Apex,) gehört unter die anatomischen Subtilitäten. In der letztern zeigen sich auch die Spuren der Anlage des suspensorischen Ligaments des odontoideischen Processes. Vgl. hierüber sowohl über die Ligamente, wie auch die Muskeln, die sich überhaupt an den Epistropheus ansetzen, die Artikel: Kopf- und Halsgelenke, und auch Kopf- und Halsmuskeln.

Beim Fötus unterscheidet man am Epistropheus nicht, wie den übrigen Wirbeln drei, sondern vier einzelne Hauptstücke, dem der odontoideische Proceß sich hier ebenfalls als ein eigener Theil und zwar, wie Meckel<sup>21</sup> bemerkt, aus zwei Stücken bildet, daß dieser Wirbel bis zu Ende des siebenten, oder gar zur Mitte des achten Monats wenigstens fünf Knochenstücke zeigt. Bis zu einer Periode nämlich besteht der odontoideische Proceß aus zwei symmetrischen, neben einander liegenden Knochenkernen, die Anfangs, an zusammengenommen, weit kleiner als der Knochenkern des Körpers sind, allein schon beim reifen Fötus nach ihrer Verwachsung die an Größe bedeutend übertreffen. Höchst wahrscheinlich findet sich außerdem auch noch beständig ein eignes Paar von Knochenkernen diesem Wirbel, welches den übrigen nicht allgemein zukommt, und

21) Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 490.

22) ebenfalls nach Meckel.



an jeder Seite ein ansehnlich rundlicher Knochenkern vorn zwischen den Körnern des Körpers, des odontoidischen Processes und dem Ende des Seitentheils, der von vorn nach hinten weit schma-  
ler das Körperstück ist. Man findet ihn fast immer bei Kin-  
dern unter Einem Jahre, und wenn gleich verkleinert, auch wohl nur  
an einer Seite vorhanden, bis zum dritten Jahre hin. Meßbitt<sup>23</sup>  
hat dieser Knochenkern als häufig beim reifen Fötus vorkom-  
men, wo sie jedoch Meckel nach seinen Untersuchungen nie finden  
sah; vielmehr bilden sie sich nach ihm<sup>24</sup> erst nach der Geburt.  
Im Fötuszustande zeigen sich die Seitentheile zuerst, dann die  
Knochenkern des Körpers und darauf erst die des odontoidischen Pro-  
cesses. Nach der Geburt verbinden sich die Seitentheile an ihren hin-  
teren Enden, hierauf die zuletzt entstandenen Zwischenknochenkern  
des Körpers und den Seitentheilen, dann der Körper mit den  
Seitentheilen, zuletzt der odontoidische Process, mit diesen und dem  
Körper, so daß die letzte Spur einer Trennung der verschiedenen Kno-  
chenkerne eine Quersfurche an der vorderen Fläche zwischen dem Kör-  
per und dem odontoidischen Processus ist.

Epistropheus, S. 66.

24) a. a. O.

(H.)

Epistrophico - occipitalis musculus, s. Epistrophicus des

Epistrophicus atlantis, s. Epistrophicus des Atlas. — capi-  
tis Epistrophicus des Kopfs.

Epistrophicus des Atlas, (Epistrophicus atlantis<sup>1</sup>.) Un-  
terer schräger Kopfmuskel<sup>2</sup>, Unterer, oder Größerer schrä-  
ger Kopfmuskel<sup>3</sup>, Drehmuskel des Atlas oder Trägers<sup>4</sup>,  
unterer schräger Muskel des Kopfs<sup>5</sup>, Unterste Quer-  
muskeln des Kopfs<sup>6</sup>, (Musculus capitis obliquus inferior<sup>7</sup>,  
inferior<sup>8</sup>, s. spinoso-transversarius<sup>9</sup>, s. spino-axoïdo-tra-  
cheoïdoïdeus<sup>10</sup>, s. axoïdo-atloïdeus<sup>11</sup>.) der kleine, platte  
Muskel, welcher vom Ende des spinösen Processes des Epistropheus  
an jeder Seite entspringt, schräg auf- und auswärts gehend, sich an  
dem vorderen Theil des Querprocesses des Atlas ansetzt, und so mit-  
telst des letztern den Kopf zur Seite dreht. S. Kopfmuskeln.

nach Hildebrandt (Lehrb. d. Anat. d. M. 2. B. S. 1125.) 2) nach  
Müllerring (Muskel. S. 203.) 3) Wagner's Besch. d. menschl. K.  
Bd. 2. S. 351. 4) nach Wiedemann (Handb. d. Anat. Braunsch. 1796,  
S. 128.) 5) nach Scharschmidt (myolog. Tabell. Tab. 9.) 6)  
Lecomte's vertauschte Besch. d. Musc. v. Spener, Berl. 1704, S. 47. 7)  
Albin (hist. musc. hum. 4. ed. p. 340) 8) nach Alolan (an-  
thropogr. 1. S. 21.) 9) nach Schreger (Nomenclat. d. Muskel. S. 15.)  
10) (spino-axoïdo-tracheoïdoïdien) nach Chaussier (exp. sommaire  
d. musc. etc. p. 50.) 11) (Axoïdo-atloïdien) nach Dumeril (Eubler's  
Atlas. über vergl. Anatom. S. 285.)

Epistrophicus des Kopfs, (Epistrophicus capitis<sup>1</sup>, sc.  
capitis,) Hinterer größerer gerader Kopfmuskel<sup>2</sup>,  
Hinterer gerader Hintermuskel des Kopfs<sup>3</sup>, Großer ge-  
rader Kopfmuskel<sup>4</sup>, Kopf- und Drehmuskel<sup>5</sup>, (Musculus

nach Hildebrandt (Lehrb. d. Anat. d. M. 2. B. S. 1122.) 2) nach  
Müllerring (Muskel. S. 201.) 3) nach Scharschmidt (myol. Tabell.  
Bd. 9.) 4) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 422. 5)  
Wiedemann (Handb. d. Anat. Braunsch. 1796, S. 127.)

capitis rectus posticus major<sup>6</sup>, s. rectus magnus<sup>7</sup>, s. rectus major, s. superficialis<sup>8</sup>, s. epistrophico-occipitalis<sup>9</sup> capitis, s. spinoso-occipitalis brevis, s. prior<sup>1</sup> spino-axoido-occipitalis<sup>11</sup>, s. axoido-occipitalis<sup>12</sup>), der platte Muskel, welcher mit einer ründlichen Glehse oberwärts spinösen Proceß des Epistropheus kommt, breiter werdend, schräg wärts zum Occipitalknochen, an dessen unterer semicirculären Einsicht befestigt, in die Höhe steigt und den Kopf schief rückwärts mit dem gleichnamigen aber zusammenwirkend, zur Streckung desselben nach hinten beiträgt. S. Kopfmuskeln.

6) nach Albin (hist. musc. hom. 4. ed: p. 338.)

7) Schaarschmidt

myol. Tabell. a. a. D. 8) 9) Meckel's Handb. u. f. w. a. a. D.

nach Schreger (Nomenclat. d. Muskl. S. 15)

11) (Spino-axoido-

occipital) nach Chaussier (expos. sommaire des musc. etc. p. 50.)

(Axoido-occipitien) Dumeril in Cuvier's Vorles. über vergl. Anat. S. 125.

*Epitecnos*, *Epitocos*, in Uebersetzung der gleichlautenden Griechischen Worte<sup>1</sup>, i. q. Foecundus. S. Fruchtbar.

1) *ἐπιτεκνος*, in Beziehung auf beide Geschlechter. (Hippocrat. aph. aph. 62.) *ἐπιτόκος*. (Hippocr. Epid. 1. 6. s. 8)

*Epitex*, in Uebersetzung des gleichlautenden Griechischen Wortes<sup>1</sup>, eine ihrer Niederkunft nahe Frau. S. Hochschwanger.

1) *ἐπιτεξ*. (Hippocr. de morb. mulier. 1. 1. c. 9.)

*Epithelium*, (*Epithelium*, *Epithelis*<sup>1</sup>, *Integumentum papillare*<sup>2</sup>.) So wurde namentlich von Ruysch<sup>3</sup> der Ueberzug der Epidermis genannt, der, ohne eigentlich deutlich unterscheidbares Corium (Derma,) unter sich zu haben, wie z. B. an Lippen, sich über von ihm angenommene Warzensubstanz wegzulagert. Vgl. Integumente des Körpers.

1) 2) Ruysch thes. anat. III. Nr. 25 aus *επι* und *θηλη*, Warze, gelblich.

5) a. a. D.

*Epitheleium* des Gehirns, nach Reil<sup>1</sup> die lederartige, einer Membran und structurloser Nervensubstanz bestehende Hülle mit welcher die nachliegenden markigen Theile des Gehirns bekleidet sind. S. Gehirn.

1) Archiv für Physiol. 9. B. 1. H. S. 143 u 261.

*Epithelium labiorum*, s. Lippenhaut. — *linguae*, s. Peritongue. — *ventriculi et intestinorum*, s. unter Häute des Magens und der Därme, innerste Haut.

*Epitocos*, vgl. *Epitecnos*.

*Epitrochlo-carpo-palmaris*, s. unter Palmar-muskeln, kurzer Muskel. — *corono-phalangiens musculus*, s. unter den Fingern der Hand, den oberflächlich liegenden Muskel. — *cubitus carpiens musculus*, s. Ulnarflexor der Hand. — *metacarpus musculus*, s. Radialflexor der Hand. — *palmaris longus*, s. unter Palmar-muskeln der Hand, den langen Muskel. — *phalangius musculus*, s. unter Flexoren der Finger, den oberflächlich liegenden Muskel. — *radialis musculus*, s. unter Pronatoren, oberer Muskel.



*Epode*, in Uebersetzung des gleichen Griechischen Wortes <sup>1</sup>, f. *Incantation*.

*Epodos*, auch *επωδος*, incantatio, besonders das vermeintliche Vermögen, durch übergesungene Krankheiten zu heilen. (Vgl. Ceren. Sammon. carm. de med. Knechten proleg.) Daher auch *epodos* (*επωδος*.) *Epode*, der auf diese Weise, oder auch überhaupt zauberisch Heilende. S. Galeni de usu c. l. 17 in fine und C. Hofmanni comm. ad hunc l. n. 140. Vgl. Hufeland's n. Parles Journ. d. pract. Heilk. 1815, Mon. Aug. S. 48. *Vomitis*, beßgl. <sup>1</sup>, f. *Scapularextremität* des Schlüsselbeins.

*Enipus*. (Jul. Polluc. onom. in Stephani dict. med. Par. 1564, 1593.)

*Equina cauda*, f. *Pferdeschweif*.

*Eucarmen*, f. *Warmherzigkeit*.

*Erbitterung*, *Animosität*, ist vom Zorn nicht bloß dem Grade, sondern nach Ursache verschieden; sie ist nicht bloß Zorn über bitteres Wort und Beleidigung, sondern ein aus Zorn und Haß zusammengesetztes Gefühl, welches durch fortgesetzte Beleidigungen oder Entgegnungen eines Gegners nach und nach hervorgebracht wird, die Stärke des Affectes sich erhebt, und in Rache und Nachsicht übergeht. Erbitterung ist also hassender Zorn, oder zürnender Haß, hat die Quellen beider Gefühle, aus welchen sie zusammengesetzt ist gemeinschaftlich. S. Zorn, Haß.

Da sie zu den Affecten gehört, so gilt von ihr dasselbe, was von ihnen gesagt worden ist. S. Affect.

Erbitterung wirkt nachtheilig auf den Körper, und zwar um desto mehr, je mehr der Zorn in dieser Verbindung an Aerger grenzt, und desto mehr nach außen zu thätig zeigen kann. Weniger aber, wenn Zorn und Zorn in Thätigkeit übergehen und in Handlungen sich auswirken können, z. B. bei Soldaten, von denen man sagt: sie fechten mit Erbitterung, d. h. sie haßten ihre Feinde und zürten ihnen zu aus irgend einer Ursache. (Dzondi.)

*Effluvia*, *Erbleichen*, *Entfärbung*, (*Decoloratio* <sup>1</sup>), der Abgang der der Haut, besonders in einzelnen Theilen, namentlich von Wangen und den Lippen, eigenen Röthe in eine mehr weiße Farbe, vom Zurücktritt oder Zurückdrängen des rothen Bluts in den Gefäßen, durch Zusammenziehung dieser, oder auch von Verstopfung des Antriebs des Bluts dahin, und um deswillen theils verrather eines innern Gemüthszustandes, wobei der Geist sich nicht fühlt, wie beim Schreck, theils das begleitende Symptom eines Schwächezustandes bei Ohnmachten und sonstigen Erschöpfungen, in dieser Hinsicht auch gleichbedeutend mit Tod. Vgl. Blässe. Ciceron. de divinatione l. 2. c. 27. (H.)

*Effluvia*, f. unter *Bliss*.

*Erbrechen* <sup>1</sup>, *Brechen* <sup>2</sup>, *Speien* <sup>3</sup>, *Vomiren* <sup>4</sup>, (*Vomitum* <sup>5</sup>, *Vomitum* <sup>6</sup>.) Nach den Gesetzen der thierischen Natur werden die in den Magen gebrachten Nahrungsmittel, wenn sie nicht eingeatmet sind. 1) Haller's Grundr. d. Physiol. 2) Haller's Grundr. d. Physiol. 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) 208) 209) 210) 211) 212) 213) 214) 215) 216) 217) 218) 219) 220) 221) 222) 223) 224) 225) 226) 227) 228) 229) 230) 231) 232) 233) 234) 235) 236) 237) 238) 239) 240) 241) 242) 243) 244) 245) 246) 247) 248) 249) 250) 251) 252) 253) 254) 255) 256) 257) 258) 259) 260) 261) 262) 263) 264) 265) 266) 267) 268) 269) 270) 271) 272) 273) 274) 275) 276) 277) 278) 279) 280) 281) 282) 283) 284) 285) 286) 287) 288) 289) 290) 291) 292) 293) 294) 295) 296) 297) 298) 299) 300) 301) 302) 303) 304) 305) 306) 307) 308) 309) 310) 311) 312) 313) 314) 315) 316) 317) 318) 319) 320) 321) 322) 323) 324) 325) 326) 327) 328) 329) 330) 331) 332) 333) 334) 335) 336) 337) 338) 339) 340) 341) 342) 343) 344) 345) 346) 347) 348) 349) 350) 351) 352) 353) 354) 355) 356) 357) 358) 359) 360) 361) 362) 363) 364) 365) 366) 367) 368) 369) 370) 371) 372) 373) 374) 375) 376) 377) 378) 379) 380) 381) 382) 383) 384) 385) 386) 387) 388) 389) 390) 391) 392) 393) 394) 395) 396) 397) 398) 399) 400) 401) 402) 403) 404) 405) 406) 407) 408) 409) 410) 411) 412) 413) 414) 415) 416) 417) 418) 419) 420) 421) 422) 423) 424) 425) 426) 427) 428) 429) 430) 431) 432) 433) 434) 435) 436) 437) 438) 439) 440) 441) 442) 443) 444) 445) 446) 447) 448) 449) 450) 451) 452) 453) 454) 455) 456) 457) 458) 459) 460) 461) 462) 463) 464) 465) 466) 467) 468) 469) 470) 471) 472) 473) 474) 475) 476) 477) 478) 479) 480) 481) 482) 483) 484) 485) 486) 487) 488) 489) 490) 491) 492) 493) 494) 495) 496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) 550) 551) 552) 553) 554) 555) 556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602) 603) 604) 605) 606) 607) 608) 609) 610) 611) 612) 613) 614) 615) 616) 617) 618) 619) 620) 621) 622) 623) 624) 625) 626) 627) 628) 629) 630) 631) 632) 633) 634) 635) 636) 637) 638) 639) 640) 641) 642) 643) 644) 645) 646) 647) 648) 649) 650) 651) 652) 653) 654) 655) 656) 657) 658) 659) 660) 661) 662) 663) 664) 665) 666) 667) 668) 669) 670) 671) 672) 673) 674) 675) 676) 677) 678) 679) 680) 681) 682) 683) 684) 685) 686) 687) 688) 689) 690) 691) 692) 693) 694) 695) 696) 697) 698) 699) 700) 701) 702) 703) 704) 705) 706) 707) 708) 709) 710) 711) 712) 713) 714) 715) 716) 717) 718) 719) 720) 721) 722) 723) 724) 725) 726) 727) 728) 729) 730) 731) 732) 733) 734) 735) 736) 737) 738) 739) 740) 741) 742) 743) 744) 745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) 783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) 796) 797) 798) 799) 800) 801) 802) 803) 804) 805) 806) 807) 808) 809) 810) 811) 812) 813) 814) 815) 816) 817) 818) 819) 820) 821) 822) 823) 824) 825) 826) 827) 828) 829) 830) 831) 832) 833) 834) 835) 836) 837) 838) 839) 840) 841) 842) 843) 844) 845) 846) 847) 848) 849) 850) 851) 852) 853) 854) 855) 856) 857) 858) 859) 860) 861) 862) 863) 864) 865) 866) 867) 868) 869) 870) 871) 872) 873) 874) 875) 876) 877) 878) 879) 880) 881) 882) 883) 884) 885) 886) 887) 888) 889) 890) 891) 892) 893) 894) 895) 896) 897) 898) 899) 900) 901) 902) 903) 904) 905) 906) 907) 908) 909) 910) 911) 912) 913) 914) 915) 916) 917) 918) 919) 920) 921) 922) 923) 924) 925) 926) 927) 928) 929) 930) 931) 932) 933) 934) 935) 936) 937) 938) 939) 940) 941) 942) 943) 944) 945) 946) 947) 948) 949) 950) 951) 952) 953) 954) 955) 956) 957) 958) 959) 960) 961) 962) 963) 964) 965) 966) 967) 968) 969) 970) 971) 972) 973) 974) 975) 976) 977) 978) 979) 980) 981) 982) 983) 984) 985) 986) 987) 988) 989) 990) 991) 992) 993) 994) 995) 996) 997) 998) 999) 1000) 1001) 1002) 1003) 1004) 1005) 1006) 1007) 1008) 1009) 1010) 1011) 1012) 1013) 1014) 1015) 1016) 1017) 1018) 1019) 1020) 1021) 1022) 1023) 1024) 1025) 1026) 1027) 1028) 1029) 1030) 1031) 1032) 1033) 1034) 1035) 1036) 1037) 1038) 1039) 1040) 1041) 1042) 1043) 1044) 1045) 1046) 1047) 1048) 1049) 1050) 1051) 1052) 1053) 1054) 1055) 1056) 1057) 1058) 1059) 1060) 1061) 1062) 1063) 1064) 1065) 1066) 1067) 1068) 1069) 1070) 1071) 1072) 1073) 1074) 1075) 1076) 1077) 1078) 1079) 1080) 1081) 1082) 1083) 1084) 1085) 1086) 1087) 1088) 1089) 1090) 1091) 1092) 1093) 1094) 1095) 1096) 1097) 1098) 1099) 1100) 1101) 1102) 1103) 1104) 1105) 1106) 1107) 1108) 1109) 1110) 1111) 1112) 1113) 1114) 1115) 1116) 1117) 1118) 1119) 1120) 1121) 1122) 1123) 1124) 1125) 1126) 1127) 1128) 1129) 1130) 1131) 1132) 1133) 1134) 1135) 1136) 1137) 1138) 1139) 1140) 1141) 1142) 1143) 1144) 1145) 1146) 1147) 1148) 1149) 1150) 1151) 1152) 1153) 1154) 1155) 1156) 1157) 1158) 1159) 1160) 1161) 1162) 1163) 1164) 1165) 1166) 1167) 1168) 1169) 1170) 1171) 1172) 1173) 1174) 1175) 1176) 1177) 1178) 1179) 1180) 1181) 1182) 1183) 1184) 1185) 1186) 1187) 1188) 1189) 1190) 1191) 1192) 1193) 1194) 1195) 1196) 1197) 1198) 1199) 1200) 1201) 1202) 1203) 1204) 1205) 1206) 1207) 1208) 1209) 1210) 1211) 1212) 1213) 1214) 1215) 1216) 1217) 1218) 1219) 1220) 1221) 1222) 1223) 1224) 1225) 1226) 1227) 1228) 1229) 1230) 1231) 1232) 1233) 1234) 1235) 1236) 1237) 1238) 1239) 1240) 1241) 1242) 1243) 1244) 1245) 1246) 1247) 1248) 1249) 1250) 1251) 1252) 1253) 1254) 1255) 1256) 1257) 1258) 1259) 1260) 1261) 1262) 1263) 1264) 1265) 1266) 1267) 1268) 1269) 1270) 1271) 1272) 1273) 1274) 1275) 1276) 1277) 1278) 1279) 1280) 1281) 1282) 1283) 1284) 1285) 1286) 1287) 1288) 1289) 1290) 1291) 1292) 1293) 1294) 1295) 1296) 1297) 1298) 1299) 1300) 1301) 1302) 1303) 1304) 1305) 1306) 1307) 1308) 1309) 1310) 1311) 1312) 1313) 1314) 1315) 1316) 1317) 1318) 1319) 1320) 1321) 1322) 1323) 1324) 1325) 1326) 1327) 1328) 1329) 1330) 1331) 1332) 1333) 1334) 1335) 1336) 1337) 1338) 1339) 1340) 1341) 1342) 1343) 1344) 1345) 1346) 1347) 1348) 1349) 1350) 1351) 1352) 1353) 1354) 1355) 1356) 1357) 1358) 1359) 1360) 1361) 1362) 1363) 1364) 1365) 1366) 1367) 1368) 1369) 1370) 1371) 1372) 1373) 1374) 1375) 1376) 1377) 1378) 1379) 1380) 1381) 1382) 1383) 1384) 1385) 1386) 1387) 1388) 1389) 1390) 1391) 1392) 1393) 1394) 1395) 1396) 1397) 1398) 1399) 1400) 1401) 1402) 1403) 1404) 1405) 1406) 1407) 1408) 1409) 1410) 1411) 1412) 1413) 1414) 1415) 1416) 1417) 1418) 1419) 1420) 1421) 1422) 1423) 1424) 1425) 1426) 1427) 1428) 1429) 1430) 1431) 1432) 1433) 1434) 1435) 1436) 1437) 1438) 1439) 1440) 1441) 1442) 1443) 1444) 1445) 1446) 1447) 1448) 1449) 1450) 1451) 1452) 1453) 1454) 1455) 1456) 1457) 1458) 1459) 1460) 1461) 1462) 1463) 1464) 1465) 1466) 1467) 1468) 1469) 1470) 1471) 1472) 1473) 1474) 1475) 1476) 1477) 1478) 1479) 1480) 1481) 1482) 1483) 1484) 1485) 1486) 1487) 1488) 1489) 1490) 1491) 1492) 1493) 1494) 1495) 1496) 1497) 1498) 1499) 1500) 1501) 1502) 1503) 1504) 1505) 1506) 1507) 1508) 1509) 1510) 1511) 1512) 1513) 1514) 1515) 1516) 1517) 1518) 1519) 1520) 1521) 1522) 1523) 1524) 1525) 1526) 1527) 1528) 1529) 1530) 1531) 1532) 1533) 1534) 1535) 1536) 1537) 1538) 1539) 1540) 1541) 1542) 1543) 1544) 1545) 1546) 1547) 1548) 1549) 1550) 1551) 1552) 1553) 1554) 1555) 1556) 1557) 1558) 1559) 1560) 1561) 1562) 1563) 1564) 1565) 1566) 1567) 1568) 1569) 1570) 1571) 1572) 1573) 1574) 1575) 1576) 1577) 1578) 1579) 1580) 1581) 1582) 1583) 1584) 1585) 1586) 1587) 1588) 1589) 1590) 1591) 1592) 1593) 1594) 1595) 1596) 1597) 1598) 1599) 1600) 1601) 1602) 1603) 1604) 1605) 1606) 1607) 1608) 1609) 1610) 1611) 1612) 1613) 1614) 1615) 1616) 1617) 1618) 1619) 1620) 1621) 1622) 1623) 1624) 1625) 1626) 1627) 1628) 1629) 1630) 1631) 1632) 1633) 1634) 1635) 1636) 1637) 1638) 1639) 1640) 1641) 1642) 1643) 1644) 1645) 1646) 1647) 1648) 1649) 1650) 1651) 1652) 1653) 1654) 1655) 1656) 1657) 1658) 1659) 1660) 1661) 1662) 1663) 1664) 1665) 1666) 1667) 1668) 1669) 1670) 1671) 1672) 1673) 1674) 1675) 1676) 1677) 1678) 1679) 1680) 1681) 1682) 1683) 1684) 1685) 1686) 1687) 1688) 1689) 1690) 1691) 1692) 1693) 1694) 1695) 1696) 1697) 1698) 1699) 1700) 1701) 1702) 1703) 1704) 1705) 1706) 1707) 1708) 1709) 1710) 1711) 1712) 1713) 1714) 1715) 1716) 1717) 1718) 1719) 1720) 1721) 1722) 1723) 1724) 1725) 1726) 1727) 1728) 1729) 1730) 1731) 1732) 1733) 1734) 1735) 1736) 1737) 1738) 1739) 1740) 1741) 1742) 1743) 1744) 1745) 1746) 1747) 1748) 1749) 1750) 1751) 1752) 1753) 1754) 1755) 1756) 1757) 1758) 1759) 1760) 1761) 1762) 1763) 1764) 1765) 1766) 1767) 1768) 1769) 1770) 1771) 1772) 1773) 1774) 1775) 1776) 1777) 1778) 1779) 1780) 1781) 1782) 1783) 1784) 1785) 1786) 1787) 1788) 1789) 1790) 1791) 1792) 1793) 1794) 1795) 1796) 1797) 1798) 1799) 1800) 1801) 1802) 1803) 1804) 1805) 1806) 1807) 1808) 1809) 1810) 1811) 1812) 1813) 1814) 1815) 1816) 1817) 1818) 1819) 1820) 1821) 1822) 1823) 1824) 1825) 1826) 1827) 1828) 1829) 1830) 1831) 1832) 1833) 1834) 1835) 1836) 1837) 1838) 1839) 1840) 1841) 1842) 1843) 1844) 1845) 1846) 1847) 1848) 1849) 1850) 1851) 1852) 1853) 1854) 1855) 1856) 1857) 1858) 1859) 1860) 1861) 1862) 1863) 1864) 1865) 1866) 1867) 1868) 1869) 1870) 1871) 1872) 1873) 1874) 1875) 1876) 1877) 1878) 1879) 1880) 1881) 1882) 1883) 1884) 1885) 1886) 1887) 1888) 1889) 1890) 1891) 1892) 1893) 1894) 1895) 1896) 1897) 1898) 1899) 1900) 1901) 1902) 1903) 1904) 1905) 1906) 1907) 1908) 1909) 1910) 1911) 1912) 1913) 1914) 1915) 1916) 1917) 1918) 1919) 1920) 1921) 1922) 1923) 1924) 1925) 1926) 1927) 1928) 1929) 1930) 1931) 1932) 1933) 1934) 1935) 1936) 1937) 1938) 1939) 1940) 1941) 1942) 1943) 1944) 1945) 1946) 1947) 1948) 1949) 1950) 1951) 1952) 1953) 1954) 1955) 1956) 1957) 1958) 1959) 1960) 1961) 1962) 1963) 1964) 1965) 1966) 1967) 1968) 1969) 1970) 1971) 1972) 1973) 1974) 1975) 1976) 1977) 1978) 1979) 1980) 1981) 1982) 1983) 1984) 1985) 1986) 1987) 1988) 1989) 1990) 1991) 1992) 1993) 1994) 1995) 1996) 1997) 1998) 1999) 2000) 2001) 2002) 2003) 2004

nachdem sie, um zur Assimilation vorbereitet zu werden, eine Zeitlang darin verweilt haben, durch die dem Magen, (wie dem ganzen Darmcanal) eigne, als peristaltische Bewegung bekannte Thätigkeit weiter oder abwärts getrieben. So wie also die obere Magenmündung, oder die Cardia, zur Aufnahme der Nahrungsmittel oder zur Magenfüllung bestimmt ist; so ist es die untere, oder der Pylorus, zur Magenentleerung, oder um den Uebergang der Speise aus dem Magen in den Darmcanal zu vermitteln.

Thiere, welche keinen Darmcanal, sondern nur einen einfachen Speisebehälter haben, der dann dem Magen der übrigen Thiere entspricht, (wohin aber nur die auf der niedrigsten der Animalität stehenden Polypen gehören,) entleeren diesen ihren Magen, nachdem von dem eingenommenen Nahrungsstoffe das ihnen Taugliche aufgesogen worden ist, auf demselben Wege wieder, durch den dieser in ihren Körper gelangte. Eine solche Egestion der in den Magen theils eingebrachten, theils daselbst abgesetzten Stoffe durch die obere Magenmündung und von da weiter durch die Speiseröhre und den Mund ist nun Erbrechen. Es erfolgt bei denjenigen Thieren, die einen eignen Apparat zur Egestion, oder einen Enddarm und After haben, unter Umständen, die aber an sich nicht durchaus zu den widernatürlich gehörenden, häufig indessen den Uebergang dazu machen, wo nicht selbst Krankheitserscheinungen sind. Nur in ersterer Hinsicht verdient der Gegenstand hier einige Erwähnung; ohnedieß würde er als ein pathologischer Artikel ausgeschlossen bleiben müssen.

Schon das Wiederkäuen der mit einem vierfachen, eigen dafür eingerichteten Magen versehenen Säugethiere kann als eine Art von Erbrechen angesehen werden, wovon es sich indessen besonders dadurch unterscheidet, daß das Genossene nicht durch den Mund wieder aus dem Körper zurückgelangt, sondern zu einer nochmaligen Verarbeitung durch das Kauen bloß wieder in die Mundhöhle aufgenommen, damit aber von neuem verschluckt wird. Vgl. Wiederkäuen.

Es ist aber nicht nur einzelnen Geschöpfen der niedrigsten Thierclassen, ob sie gleich mit einem After versehen sind, eigen, die ihnen überflüssigen Nahrungsstoffe durch ein wirkliches Brechen wieder auszuleeren, wie namentlich dem Blutigel<sup>8)</sup>, sondern es vermögen auch Vögel und Fische willkürlich einen Theil von dem, was sie genossen haben, durch den Mund wieder auszuwerfen<sup>9)</sup>. Säugethiere aber erbrechen sich zum Theil sehr leicht, besonders nach etwas zu reichlichem, oder auch ungehörigem Genuß, wie z. B. Hunde und Katzen; andere dagegen, wie Rinder und andere wiederkäuende Thiere, ingleichen auch Pferde, (wegen der schiefen Insertion der Speiseröhre in den Magen) erbrechen sich nie, oder doch nur in höchst seltenen Fällen<sup>10)</sup>.

8) Vgl. hierüber besonders die neueste Schrift: J. D. L. Langmann's anatomisch-physiologische Untersuchungen über den Blutigel, Berlin 1817, 8. Nach des Verfassers Untersuchungen besteht der Darmcanal des Thiers bloß aus einem durch den ganzen Körper des Thiers sich hindurchziehenden Magen und dem Mastdarm, zu welchen zwar Urath excretet wird, und der mit jenem Magen wohl im Zusammenhang steht, aber keine Communication hat, so daß weder Luft, noch sonst etwas aus einem Theil in den andern übergetrieben werden kann. 9) mehrere gesammelte Fälle in Haller's chem. physiolog. T. VI. 1. 19. S. 4. 14. 10) Vgl. Blumenbach's Handb. d. vergl. Anat. 2. Aufl. S. 125.



Der menschliche Magen insbesondere ist aber so organisirt, daß er zum Wiederauswurf des Genossenen zu bringen ist, oder auch eigenen Trieb der Natur dazu angeregt wird, was bei der Mangelhaftigkeit der Dinge, die der Mensch zu seiner Nahrung benützt, wobei den im gewöhnlichen Leben so nahe gelegten Veranlassungen, Mangel der Verdauungskräfte durch Ueberladung des Magens zu schreiten, oder auch zur Verdauung überhaupt, oder relativ für individuelle Constitution, oder den temporären Körperzustand unauflösbare Stoffe in dem Magen aufzunehmen, von großem Vortheil ist.

In dieser Rücksicht erscheint das Erbrechen als ein naturgemäßer Zustand des Verdauungsorgans gegen das, was ihm über die Gebühr aufgedrungen werden soll. Bei einem ideell gesunden Menschen seiner regelmäßigen Lebensordnung kann der Fall nicht vorkommen, daß der Magen den ihm dargebotenen Nahrungsstoff verschmäht; ein einfaches Erbrechen, wodurch bloß das Uebermaß des Genossenen oder auch das der Verdauung Ungeeignete ausgeleert wird, ist wenig eine Krankheit, als das durch einen fremden Reiz in der Magenhöhle, wie z. B. durch scharfen Tobak bewirkte Niesen, oder durch einen die Augen reizenden Rauch bewirkte Thränen derselben.

Saugende Kinder erbrechen sich durch das kleinste Uebermaß von mütterlicher Muttermilch, ohne die geringste Andeutung von Uebelbefinden, und ein gemeines Sprichwort ist in der häufigen Beobachtung der Unschädlichkeit dieses Erbrechens begründet. In spätern Jahren ist wenigstens ein vorübergehendes Uebelbefinden der gewöhnliche Begleiter des Erbrechens, und es zeigen sich in Ansehung der Ueberschüssigkeit, das Ueberflüssige oder Ungehörige durch Erbrechen auszuwerfen, bedeutende Verschiedenheiten in der Constitution verschiedener Menschen, so daß einige auf die geringste Veranlassung, und Uebelbedeutende Störungen in ihrem Befinden zu erleiden, sich erheben, andere nur mit größter Mühe, oder auch wohl gar nicht dahin gewöhnlich wirkende, als Brechmittel bekannte Substanzen gebracht werden können.

Reichsam stufenweise Uebergänge zum Erbrechen macht das sogenannte Aufstoßen, (Ructatio,) oder das Zurückdrängen von in dem Magen angehäufter oder daselbst entbundener Luft durch einfache Zusammenziehungen des Magens, (s. unter Blähungen,) wie auch das Aufsteigen eines Theils der in dem Magen in nüchternem Zustand angehäuften gastrischen Feuchtigkeit, (bei Magenschwäche,) oder der Zurücktritt einer geringen Portion schnell oder übermäßig genossener Getränke oder auch eines Theils der kurz vorher genossenen Speise, (Regurgitatio,) welches alles schnell vorübergehende, Wohlbefinden nicht störende Zustände sind. Sonst ist der Ekel gewöhnliche Begleiter, oder vielmehr der Vorgänger des wirklichen Erbrechens. Vgl. Ekel.

Man bezeichnet diejenige Bewegung des Magens, wodurch in ihm haltene Stoffe aufwärts gelangen, als antiperistaltische Bewegung, (Motus antiperistalticus.) In so fern diese auch auf den übrigen Darmcanal sich erstreckt, ist sie immer ein ausgebildeter pathologischer Zustand. Zu ihm macht der gewöhnliche Ekel

den Uebergang, indem dieses Gefühl wahrscheinlich schon durch die Contractionen der Magensfibern, die selbst schon eine anhebende regelmäßige Bewegung sind, veranlaßt wird. Diese Bewegung erstreckt sich aber von dem Magen aus, durch die ganze Speiseröhre, bis zum Schlund herauf, welcher selbst aber so organisirt ist, daß ungewöhnliche mechanische Reize, besonders in ungewohnter Bewegung unten nach oben, wie beim Nübel dieses Theils, eine Zusammenziehung des Magens in umgekehrter Richtung, unter gleichzeitigem zur Folge haben. Auf diese Art vermögen auch die mehrsten, von gesunden Personen sich bei gefülltem Magen Erbrechen zu erzeuget, indem sie den tiefern Theil der Mundhöhle durch einen eingebrachten Finger oder sonst auf eine mechanische Weise reizen. Man weiß, daß schon die schwelgerischen Römer, und vor wie nach ihnen Schlemmer aller Zeiten, um ihre Tafelgenüsse zu verlängern, oder Wettseifer mit andern Vielesern und Vieltrinkern es auszuhalten, dieses Mittels bedienten.

Außerdem geht die Wirkung des Brechens gewöhnlich von dem Magen aus, so daß nach längere oder kürzere Zeit vorhergegangenem Erbrechen (während zugleich in dem Schlunde und in der Speiseröhre die Disposition zur Zusammenziehung in entgegengesetzter Richtung sich schon dem im Schlunde häufiger sich absondernden, und aufwärts bewegten Schleim andeutet,) und unter Begleitung von mehreren oder andern Symptomen von Uebelbefinden, als Mattigkeit, Gesichtsblassheit, trockner Haut, Angst und Unruhe, und mehrerer oder minderer Intensität dieser Lebensstörungen, entweder nach mehrmaligen fühlbaren Zusammenziehungen in der Magenegend und Aufwärtsdrängen, bei der Respiration und der Rückfluß des Bluts von dem Kopf geschehen ist, oder auch sogleich unter diesen, sich die obere Magenmündung öffnet, und nun auf einmal oder in Absätzen ein größerer oder geringer Theil der in dem Magen enthaltenen Stoffe durch die Speiseröhre hindurchgedrängt, und durch den Mund, ja zum Theil auch durch die Nase, (da unter diesem Act die Nasenhöhle hinterwärts nicht, bei dem Niederschlucken, verschlossen ist,) auch durch diese ausgeworfen wird.

Das Erbrechen ist ein zusammengesetzter Act der Zusammenziehung der Muskelhäute des Magens und der Speiseröhre, und des aufsteigenden Magens mittelst des Diaphragma's und der Abdominalmuskeln wirkten Drucks. Versuche an Thieren haben bewiesen, daß beide Organe hierbei thätig sind <sup>11</sup>, obgleich Magen die neuerdings nach seinen Beobachtungen den Satz geltend zu machen versucht hat, auf die eigene Zusammenziehung des Magens hierbei nichts zu rechnen sei, sondern daß allein das Diaphragma mit den Abdominalmuskeln alles bewirkten <sup>12</sup>. Es ist aber hier ganz dasselbe Verhältniß, bei der Darmausleerung, und das Erbrechen, eben so wie diese, theilweise ein Act der Willkür. Ältere und neuere Versuche beweisen jedoch so viel, daß die Muskularthätigkeit der Respirationsorgane weitem mehr, als die einfachen Contractionen des Magens zum Erbrechen beitragen.

<sup>11</sup>) S. dieselben von älterer Zeit in Haller's elem. physiol. l. c. §. 12 §. 140 zusammengestellt. <sup>12</sup>) S. Magen die mém. sur le vomissement à Paris 1813, 8.



man hat Fälle aufgeführt, daß Menschen, ohne besondern Reiz Magens oder des Schlundes, nach bloßer Willkür sich haben Erbrechen erregen können; sie scheinen aber auf Taschenspielererei herauskommen<sup>13</sup>. Außer dem oben gedachten Reiz des Schlundes aber sind mehrere Mittel dem Menschen zu Gebote, die indirect Erbrechen bewirken; dahin gehören zuvörderst die geflissentliche Ueberfüllung des Magens mit Feuchtigkeiten, besonders lauem Wasser, vorzüglich in Verbindung mit dem mechanischen Reiz des Schlundes, dann die durch qualitativen Reiz, (eigentlich als ungehörige Genußsache,) den Magen zu antiperistaltischer Bewegung anregenden Mittel, welche bekanntlich zu Heilzwecken benützt werden, oder auch, bei Vergiftungen, als directe Schädlichkeiten wirken. Auch haben viele andere geistige und körperliche Einwirkungen auf den lebenden Menschen, im Verhältniß der vorhandenen Empfänglichkeit das indirect wegen Nervenconsens, oder allgemeiner Aufregung antiperistaltischer Bewegungen in dem Körper, an denen dann der Magen consecutiv Theil nimmt, Erbrechen zur Folge oder zur Begleitung. Ist das Erbrechen ein bekanntes Symptom der anhebenden Schwangerschaft, und kehrt bis zur Hälfte der Dauer dieser leicht zurück; verursacht auch ungewohnte Körperbewegung, z. E. bei Rückwärtsgehen in einem Wagen, beim Schaukeln, beim Drehen in einem Stuhl, Erbrechen. Die sogenannte Seekrankheit ist nichts anders als ein widriger Eindruck, den das Schwanken des Schiffs dem Ungewohnten auf den Körper, und consecutiv auf den Magen macht, und besonders dadurch zur Krankheit, daß die Ursache, die es einleitet, während des Aufenthalts auf dem Schiff nicht gehoben werden kann. Ein lebhaft unterhaltener Ekel, auch bloß durch Phantasie aufgeregt, führt auch wohl zu Erbrechen; bei seekranken Frauenzimmern veranlaßt es wohl schon eine täuschende Abbildung des Meeres durch Ideenassociation<sup>14</sup>.

Obgleich dem Act des Erbrechens selbst hat der Wille in der Art bestimmten Einfluß darauf, daß es schon durch die bloße Willenskraft gesteuert werden kann, indem der Mensch seinen Gedanken eine fremde Richtung gibt, und sich körperlich passiv verhält. Doch vermag, so wie bei der Darmausleerung, der Wille über einen gewissen Grad hinaus, das Erbrechen nicht zurückzuhalten, und auch die der Natur unterworfenen Respirationsorgane werden gleichsam convulsiv in den Act des Erbrechens verflochten, welches überhaupt immer in einem Zwischenraume zwischen dem Ausathmen und Einathmen erfolgt. Beschleunigt aber wird das Erbrechen bei schon vorhandenem Ekel, sowohl indirect durch Anfüllung des Magens mit Galle, besonders lauem, was erschlaffend auf die obere Magenmündung wirkt, als auch direct, durch Richtung der Aufmerksamkeit darauf und eine entsprechende Körperstellung, bei der der Leib gebeugt und der Kopf gebeugt ist, die Brust aber durch Anstemmung an der Wand der Wirbelsäule durch die Wirkung des Diaphragma's und der Abdominalmuskeln eine feste Stütze erhält.

Das Erbrechen hat immer auch, wenn es nicht eigentlich krank-

<sup>13</sup> Vgl. Halleri elem. ph. l. c. §. 14.  
<sup>14</sup> Vgl. Halleri elem. ph. l. c. §. 14.

<sup>14</sup> Sömmering's Einge-

weidehre, §. 179.

haft, sondern nur Ausgleichung einer vorübergehenden Lebensstörung ist, eine temporäre Unthätigkeit des Magens zur Folge, der da immer etwas Schonung und Ruhe bedarf, ehe er wieder zu kräftiger Verdauung geeignet ist. (H.)

**Erbsenbein, Erbsenförmiger Knochen des Carpus,** Lenticulärer Knochen des Carpus.

**Erdatmosphäre, s. Atmosphäre.** — **ball, s. Erdorganismus** — **beschreibung, s. Geographie.**

**Erdbewohner, (Terricolae<sup>1)</sup>.)** Die Naturwesen, denen n Leben im engern Sinn des Wortes beilegt, bieten sich in ihrer sammtlichkeit von zwei Seiten als ein Gegenstand der Betrachtung d 1) in ihren generischen und speciellen Charakteren, wornach sie Classen, Gattungen und Arten zerfallen; 2) in der Beziehung, we sie auf diejenigen Umgebungen haben, innerhalb deren sie sich turgemäß befinden.

Unter dem Artikel Erdorganismus wird insbesondere das Verhältnis, das der Erdkörper oder Erdplanet zu den auf ihm befindlichen einzelnen organischen Wesen hat, berührt, und gezeigt wird, daß es eine sehr beschränkte Ansicht ist, wenn man jenen bloß einen Wohnplatz für lebendige Geschöpfe betrachtet, daß vielmehr der Erdkörper selbst, eben so wie den besonders als Organismen unterschiedenen Wesen, organische Natur, nur in weiterem Kreise zukommt und daß der Unterschied zwischen organischer und unorganischer Natur überhaupt nur ein relativer sei. Gleichwohl ist dieser Unterschied für den Standpunct, den wir im Reiche der Wesen einnehmen, heftig genug, um gar sehr beachtungswerth zu bleiben.

Von den ältesten Zeiten an sind daher unbelebte und belebte Körper auf der Erde unterschieden worden, und die gemeine Abtheilung aller irdischen Naturproducte in drei Reiche, das Mineralreich, das Unbelebte befassend, das Pflanzen- und Thierreich, die beiden Hauptabtheilungen der belebten Wesen, hat unter wenigen Beschränkungen noch immer seine unverrückte Basis. Wir können indessen hier in den Charakter und den Unterschied von Pflanzen- und Thierleben nicht eingehen, und müssen auf die darauf insbesondere Bezug habenden Artikel verweisen. Wir betrachten da gegenwärtig Pflanzen und Thiere überhaupt nur, in so fern ihre Erhaltung, ihre Erhaltung und Fortpflanzung von Bedingungen abhängen, die sich unmittelbar auf den Ort, den ihnen die Natur anweist, beziehen.

In dieser Hinsicht also verdient es zunächst Bemerkung, daß we Pflanzen noch Thiere anderswo als auf der Oberfläche des Erdkörpers ihr Bestehen haben, und daß sie überhaupt nur da angetroffen werden, wo in einer mittlern Temperatur von Wärme Wasser, Luft und Licht Zutritt haben. Diejenigen noch zum Theil räthselhaften Stellen, wo man Thiere, z. E. Kröten, in zusammenhängenden Steinmassen eingeschlossen antraf, oder ähnliche wundervolle Naturerscheinungen, können auch in Voraussetzung ihrer historischen Beglaubigung den Grundsatz nicht umstoßen, daß ihnen immer Bedingungen

1) Apuleji de Deo Socrat. l. p. 45.



de liegen, die wenigstens auf ganze Geschlechter von Organis-  
nicht Anwendung finden.

Wir haben durchaus keinen Grund, anzunehmen, daß, nachdem  
erhin der Erdkörper ausgebildet worden, nun auch Pflanzen und  
er durch einen unmittelbaren Schöpfungsact, oder durch eine,  
in der Sphäre des Erdkörpers liegende Naturkraft, in einem oder  
ern Individuen an diejenigen Orte, wo sie ihrer Natur nach sich  
gegenwärtig erhalten und fortpflanzen, gesetzt worden seien. Die  
zeugung der ersten Geschlechter der Organismen, die wir jetzt nicht  
als von schon vorhandenen gleichen Organismen ihren Ur-  
gang nehmen sehen, bleibt indessen ein großes Problem. Da es  
keinem Zweifel ausgesetzt scheint, daß auch noch jetzt eine Menge  
organischer Wesen aus unorganischer Substanz sich erzeugen, und wir  
eine Menge Andeutungen auf und in dem Erdkörper haben, daß  
die Natur in frühern Perioden eine ganz andere gewesen sei, als  
wir sie jetzt beobachten; so gewinnt dadurch die Annahme sehr  
Wahrscheinlichkeit, daß, wo nicht primär, doch in auf einander  
folgenden Bildungsstufen, die ersten Geschlechter aller organischen Kör-  
per aus dem eignen Bildungsvermögen der Erde, unter Vermittlung  
anderer cosmischer Kräfte, insbesondere des Sonnenlichts hervorge-  
gangen seien.

Wir wollen als Thatsachen anführen, was die Natur noch jetzt  
thut. Werden indifferente feste Stoffe, besonders vegetabilische,  
Kleiemehl, Schleim u. s. w., mit Wasser übergossen und der Luft  
ausgesetzt; so entstehen, unter Begünstigung der Wärme und des  
Lichtes, Infusionsthierchen: Puncte, die sich im Kreise und ne-  
ben einander bewegen, woraus sich dann bestimmtere Gestalten, Oval-  
formen, Traubenthierchen, Astropolypen, entwickeln. Nach Verschie-  
denheit der festen Substanz, die man zum Aufguß nimmt, der Be-  
feuchtigkeit der Luft, des Grades von Licht und Wärme, entste-  
hen auch verschiedene eigene Formen von Thierchen. Diese drän-  
gen sich nach solchen Stellen des Aufgusses zusammen, wo sie die  
Nahrung finden, und bewegen sich nach dem Lichte. Sie pflanzen  
sich durch Zertheilung fort. Setzt man aber neue Substanzen  
zum Aufguß; so verändern sie ihre Gestalt, oder sterben auch wohl  
ab, und kommen neue neben und nach den alten hervor; die verschie-  
denen Arten zehren einander auf, und von den abgestorbenen nähren  
sich die lebenden. Auf diese Art sind die Rudimente der organi-  
schen Natur animalisch; aus ihnen, oder ihren Rückständen bilden  
sich nun gemeiniglich erst vegetabilische Cryptoganismen, Mucor,  
u. s. w.; nur selten entstehen diese gleich vom Anfang an.  
Priestleysche grüne Materie ist ein Aggregat von Infusorien,  
die in vegetabilische Natur übergehen. So bilden sich auch auf  
Kalksteinen, aus den, an an der Luft verwitterten Feldspath zer-  
setzten Tropfen Flechten; indem diese absterben, legen sie den Grund  
der Mooserde, auf welcher sich unter Zutretender neuer Feuchtigkeit  
Moose, dann Laubmoose erzeugen, welche an die vollkommnern  
Pflanzen sich anschließen<sup>2</sup>. Daß auch diese nicht immer aus Sa-  
den, oder überhaupt aus der Zeugung von ihres Gleichen hervor-  
gehen. B. Wurda ch's Encycl. d. Heilmiff. 1. B. S. 791 u. 792.

sprossen, erhellt unter andern daraus, daß auch in den heißen Zonen auf Berghöhen, wo der Boden ein beständiges Klima hat, das in der Polarländer gleich kommt, auch dieselben Pflanzen wie in die natürlich gefunden werden, die sonst auf großen Erdstrichen in Tiefe sich nirgends finden; ja daß auf Inseln der Südsee, die erst nur erst durch sich aus dem tiefen Meeresgrund über die Meerfläche erhebende Corallenbänke entstehen, sich eben so erst Nothmann Gräser und andere Pflanzenarten erzeugen, und dieß in einer solchen Entfernung vom festen Lande, daß durchaus nicht anzunehmen ist, es sei der Same von da durch irgend eine zufällige Verlassung hierhergelangt. Ja man will selbst beobachtet haben, daß nach großen Bränden, oder an Orten, wo der Blitz eingeschlagen hat, mit einem Male Vegetabilien in einer Gegend hervorsprossen, wo derselben ganz fremd waren<sup>3</sup>.

So hat auch jede Pflanze ihre eignen Insecten, ja viele in großer Verschiedenheit, und dieß auch, wenn weit von einer einzelnen Pflanze keine andere gleiche wächst. Eben so hat jedes größere Thier seine eignen Eingeweidewürmer, die durchaus nicht von außen in den Körper gelangt seyn können, da sie sich auch in ungeborenen Thieren schon finden. Wo Wasser sich zu einem Teiche angesammelt hat, oder ein seit langer Zeit ausgetrockneter Teich, wo nicht zu glauben ist, daß Fischeier sich so lange daselbst haben erhalten können, und der mit Wasser sich füllt, finden sich auch nach einiger Zeit wieder Fische darin<sup>4</sup>.

Daß also die Erde als Mutter alles Lebendigen auf ihr zu trachten sei, und häufig sich Thier- und Pflanzengeschlechter ausbilden, sowohl niedriger als höherer Art, erzeugen, ist wenigstens theilweise auch durch die Erfahrung nachgewiesen, wenn es auch in der Naturordnung ist, daß die größern und vollkommnern Organismen jetzt auf gewöhnliche und verbreitete Weise nur durch Fortpflanzung früherer Geschlechter sich erhalten. Wahrscheinlich ist's eben so hohle Naturbestimmung, daß ganze organische Geschlechter, wie einzelne Individuen, nur eine Zeit lang zum Daseyn gelangen, sich entwickeln, vermehren und fortpflanzen, endlich aber wieder untergehen, um andern organischen Bildungen zu weichen. Vgl. Erzeugung.

Merkwürdig sind in dieser Hinsicht besonders die vielfachen Spuren früherer Erdenbewohner, die zufolge großer Naturereignisse, wodurch die ganze Form der Erdoberfläche eine Veränderung erfuhr, untergegangen sind, und welche die mannigfaltigen Versteinerungen enthalten; aber nicht minder merkwürdig die Verhältnisse in denen wir die fossilen Ueberreste einer frühern Thier- und Pflanzenwelt finden. Besonders wichtig für die Geschichte der Thierbildung ist, daß man die Reste von Thieren der untersten Classen durchaus nur in den tiefsten und allem Anschein nach ältesten Erdschichten, die der höhern Classen dagegen nur in den obern und anscheinend neuern antrifft<sup>5</sup>.

Man findet nämlich diese Thierreste in einem dreifachen Zustande

3) Burdach's Encycl. u. s. w. a. a. O. S. 793.

4) ebendas.

5) D.



a) durchdrungen von einer fremden erdigen Substanz, als eigentliche Petrefacten; b) metallisirte Körper, mit erzhaltigen Massen durchzogen; c) in calcinirtem Zustande, nämlich harte Thierreste, die aber ihre Gallerte verloren, wogegen sich fremde Erdtheile gesetzt haben, als eigentliche Fossilien. Hierher gehören die Reste von ganzen Thieren und Thiertheilen, welche in andern Substanzen, die sie gegen die Vernichtung sicherten, eingeschlossen sind, wie z. E. Insecten im Bernstein, ingleichen bloße Abdrücke von Formen, und dieß sowohl von Pflanzen als Thieren, Sandstein, Thonschiefer u. s. w., als Steinkerne, oder Abdrücke in innern Höhle von Muscheln u. s. w., oder Spurensteine, Typen, Abdrücke der äußern Oberfläche lebender Organismen in weichen, aber nachmals erhärteten Steinmassen.

In den Steinarten der Urgebirge, dem Granit, Gneiß, ursprünglichem Thonschiefer und Kalkstein, dem Urtrapp, Quarz u. s. w., findet man keine Spuren frühern organischen Lebens. Die ersten Thierreste aus der Classe der Polypen findet man in dem Kalkstein der Jura-gebirge, als Encriniten und Pentacriten, die dem noch vorhandenen Geschlechte der Seefedern, (Encrinus,) ähneln, fernere die Madreporiten aus dem Geschlecht Madrepora. Die Versteinerungen werden stufenweise in den Gebirgsarten der Flözformation, weiter in dem Holzkalke, Gyps, den Sandsteinlagen, Stein- und Kalkflözen u. s. w., wo sich auch erst Pflanzenabdrücke finden. In den frühesten Spuren gehören noch die Reste von Thieren aus der Classe der strahlen- oder sternförmigen Thiere, die Echiniten und Stelen aus den Geschlechtern der Seeigel, (Echinus,) und Seeanemonen, (Asterias.) Zu der Classe der Anneliden oder eigentlichen Würmer sind wahrscheinlich die Tubuliten, Dentaliten und andere zu rechnen. Von allen diesen findet man durchaus nicht mehr die ursprünglichen Formen unter den jetzt bekannten Arten. Eben so findet man sehr mannigfaltige Petrefacten aus der Classe der Mollusken, wovon man nicht einmal die Geschlechter mehr antrifft, z. E. die Ammoniten, Belemniten und andere, unendlich viele auch aus Gesteinen, die bekannt sind, aber in andern Arten, z. E. die Nautiliten, Turbiniten, Strombiliten aus den Geschlechtern Nautilus, Strombus, ferner von zweischaligen Conchylien die Pectiniten, Chamiten, Soliniten, Telliniten aus den Geschlechtern Pecten, Chama, Solen, Tellina.

Viele jener Conchylien zeichnen sich durch ihre außerordentliche Größe aus, wie die Ammoniten von 4 bis 5 Fuß im Durchmesser. Die Zahl dieser Arten und einzelnen Individuen ist so ungeheuer, daß manche Uebertreibung ganze Gebirge von ihnen gebildet sind. Gestrichelt ist die Zahl der Crustaceen, die man in denselben Lagern findet. Reaumur entdeckte in Douvaine in Frankreich eine Zusammenhäufung von Schalengehäusen, oder Stücken solcher Gehäuse, ohne die geringste Vermengung mit andern, Sand oder einer sonstigen fremden Materie, die er nach einer sehr niedrigen Berechnung über 130 Millionen Kubikfolln schätzte. Die Landschaft, wo man sie antrifft, wenn man die Erde ausgräbt, dergleichen dort unter dem Namen Malm bekannte Masse wenigstens auf 20 Fuß tief findet, macht eine Fläche von neun Quadrarmellen aus. S. Buffon's allg. Naturgesch. 1. Th. Übers. Berl. 1771, S. 48.

det. Hierher gehören die Trilobiten, (*Entomolithus paradoxus* von einem unbekannten Geschlecht und andere. Erst in den spät Flözgebirgen finden sich theils Versteinerungen von Fischen, Ichtholithen, oder auch Abdrücke von Fischen. Zu den versteinerten Thierresten gehören die Glossopeteren, oder Schlangenzungen und Bufoten, welches Fischzähne von einem unbekannten Geschlecht sind.

Die sich findenden Pflanzenreste und Pflanzenspur kommen nie in den Gebirgsarten vor, in denen man versteinerte Polypen, sternförmige Thiere, Würmer und Mollusken findet, Andeutung, daß die Thierorganisation noch ältern Ursprungs als Pflanzenorganisation ist. Die auf jene Thierreste aber folgenden Stanzanzen, namentlich die Steinkohlen, die bituminöse Holzerde, offenbar vegetabilischer Natur, noch unbezweifelte wirkliche Holzkohlen und fossiles Holz. Sie sind häufig mit Steinarten bedeckt und vermischt, worin sich viele Pflanzenabdrücke vorfinden. Auch der Gagat und der Bernstein scheinen Substanzen von Vegetabilien einer frühern Zeit zu seyn. Die mehresten Pflanzenabdrücke, welche im Schiefer, auf und zwischen Steinkohlenflözen finden, sind von Farrenkräutern; auf sie folgen Reste von Palmen und rohrartige Pflanzen. Unter dem bituminösen Holz und den Holzkohlen, offenbar erst nach den Steinkohlen entstanden sind, kann man Eichen, Buchen-, Espen- und anderes bekanntes Holz unterscheiden.

Erst mit dem Pflanzenreich scheinen Landthiere ihren Ursprung genommen zu haben; denn in keiner Gebirgsart, welche früher die Steinkohlenflöze ist, finden sich Reste davon. Mit dem Pflanzenresten aber kommen auch Spuren von Landschnecken vor, so wie in dem Bernstein eingeschlossene Landinsecten, als Mücken, Spinnen und Ameisen. Von gleicher Zeitperiode scheinen die in Stein- und Kalkbrüchen hin und wieder aufgefundenen fossilen Knochen von Cobillen, Schildkröten, Fröschen und Kröten zu seyn.

Erst in der letzten Erdschicht werden fossile Reste von Säugethieren, und hier zunächst wieder von Wasserbewohnern, wie von Wallfischen, gefunden, sodann von wiederkäuenden Thieren, Schweinen, Faulthieren, überhaupt von Thieren, welche von Vegetabilien leben. Viele aber derselben sind wohl von bekannten Geschlechtern, aber durchaus von unbekannten Arten. Zu letztern aus der Ordnung der schweinartigen Thiere gehören insbesondere: a) aus dem Elephantengeschlecht das Mammuth, (*Elephas mammutus*, nach Cuvier,) und das Rhinotherium, (*Elephas Americanus*;) b) aus dem Nashorngeschlecht mehrere Arten; c) ein völlig ausgestorbenes Geschlecht, *Palaeotherium*, nach Cuvier<sup>7</sup> und zwar  $\alpha$ ) eine größte Art, (*P. magnum C.*;) von der Größe einer Kuh,  $\beta$ ) eine mittlere, (*P. medium C.*;) von der Größe eines Schweins,  $\gamma$ ) eine kleinere, (*P. minus C.*;) von der Größe eines Schafs; d) ein anderes unbekanntes Geschlecht, (*Anoplotherium*, nach Cuvier) in vier Arten von der Größe eines Schweins bis zu der eines Menschen herab; e) mehrere Tapirarten. Zu den fossilen Resten von wiederkäuenden Thieren gehören a) sehr große Schädel und Hörn-

7) *Annals du Muséum d'hist. nat.* T. III. p. 275, 464, 442. S) ebendasselbst.



einigen Ochsenarten, die sich häufig in Sibirien finden<sup>9</sup>; b) große Edel und Geweihe hirschartiger Thiere in Irland<sup>10</sup>. Auch von Affen und Giraffen will man fossile Reste gefunden haben, so ganzes Gerippe von 12 Fuß Länge zu Paraguay in der Nähe Plataflusses, anscheinend von einer Faulthiergattung, nach Cuvier<sup>11</sup>, jedoch von einem ganz eignen Geschlecht, (*Megatherium americanum*.) Nur selten kommen von fleischfressenden Thieren fossile Reste vor, am häufigsten noch dergleichen aus dem Bärengehirne. An Fossilien von Vögeln ist gezweifelt worden; doch behauptet Cuvier<sup>12</sup> einen in Gyps versteinerten Vogelfuß. Liedenhard fand im Jahre 1805 in denselben Gypslagen des Montmartre bei Paris, in dem die fossilen Reste der Paläotherien, Anoplotherien u. s. w. vorkommen, einen Lerchensfuß, und führt mehrere ähnliche Fälle an<sup>13</sup>.

Gegenüber aber hat man noch keine, oder doch sehr sparsam fossile Reste von Menschen gefunden<sup>14</sup>, (vgl. Anthropolithen;) ja einmal von Affen kommen dergleichen vor, zur Andeutung, daß auch dem Menschengeschlecht auch diese ihm am nächsten gestellten neusten Ursprungs auf der Erde sind. Ueberhaupt dienen alle diese hier nur oberflächlich gedachten, und ähnliche Fälle als archivalische Belege dafür, daß die Erde auch in einer über alle geschichtliche Denkmäler weit hinausreichenden, und wieder in einzelne Zeiten unterscheidbaren Periode ihre Bewohner hatte, oder daß ihr Leben sich, wie jetzt in besondern organischen Wesen vegetabilischer und animalischer Natur, vielfach reflectirte, deren Formen selbst Theil nicht einmal noch jetzt vorhanden sind, oder die auch jetzt in der Natur noch da nicht mehr leben können, wo man ihre Reste findet, so Meeresgeschöpfe, deren Ueberbleibsel in ungeheurer Verbreitung auf dem festen Lande und selbst in höhern Berggegenden angebracht werden, eben so wie Thiere der heißen Zone in Polargegenden vorkommen u. w.

Wir verlassen jedoch diese Betrachtung, um die noch jetzt auf der Erde vorhandenen und von den Naturforschern unterschiedenen vegetabilischen und animalischen Organismen in einem allgemeinen Ueberblick aufzufassen, in so fern das höhere Erdenleben in der ihnen gegebenen unendlichen Mannigfaltigkeit offenbar wird.

Die Oberfläche des Erdkörpers unterscheidet sich insbesondere, wie es in dem Artikel Erdorganismus näher gelegter Gegenstand der Be-

Pallas *comm. nov. acad. scient. Petropol. T. XIII. p. 461.* 10) Moirlineux *nat. hist. of Ireland.* 11) *Magaz. encycl. T. I. p. 303.* 12) *Annales du Mus. d'hist. nat. T. III. p. 18.* 13) *E. dess. Zoologie, v. 2. p. 80.* 14) In den *Philos. transact. of the Royal soc. of Lond. for the year 1814, T. I. p. 107*, werden mehrere Anthropolithen aus Guadeloupe gedacht, die jedoch alle Andeutung haben, neue, bloß locale Erzeugnisse zu seyn. Nach Kopp (*Propädeutik der Mineralogie, S. 203*), ist jedoch das Vorkommen von fossilen Menschenknochen in einigen Kalksteinlagern der aufgeschwemmten Gebirge, z. E. bei Bilsingleben und bei Meißen, nicht zu bezweifeln; ja auch am Ganges sollen in einer Tiefe von mehr als 80 Fuß in Sand- und Thonschichten Menschenknochen entdeckt worden seyn. W. Jacob (*Travels in the South of Spain 1809 and 1810, Lond. 1811*), berichtet, daß in der Gegend der Sierra Nevada Menschenknochen, zusammengeklüftet mit thierischen Resten, unter einer Decke von Kalkstein und 5 — 6 Fuß Dicke vorkommen.

trachtung seyn wird; in eine mit Wasser bedeckte, und eine über Wasserstand und dem Wasserabflusse hervorragende Fläche. In Wasser, wie über diesem in der als äußere, dem Erdkörper zugegebene atmosphärischen Hülle, entwickelt und erhält sich organisches Leben, aber, eben so wie in den Gewässern, nicht ohne Vermittelung dessen zur Unterlage dienenden Bodens, oder zur Einfassung dienenden Ufers, so auch auf dem festen Lande nicht ohne Mitwirkung des demselben aus, (wenn dieß nicht durch einschließende Grenzen gehen wird,) dem das feste Land in größern und kleinern Inselmassen und strömenden Ocean wieder zusießenden Wassers. Wenn daher die Organismen nach ihrem gewöhnlichen Aufenthalt in Wasser = Landgeschöpfe getheilt werden, so geschieht dieß, in so fern Wasser oder das über selbigem hervorragende feste Land mit der atmosphärischen Luft größern Antheil an ihrer Erhaltung haben, die Gegensätze sind, wie so gewöhnlich in der Natur, auch hier relativ.

Von den Pflanzen finden wir bei weitem den größten Theil dem wenn auch feuchten, doch gewöhnlich nicht mit Wasser bedeckten Boden entwachsen, und auch die eigentlichen Wasserpflanzen meistens in der Blüthezeit mit ihren Fructificationstheilen sich über Wasserfläche erhebend. Das Meer, das Meergestade, die Wasserquellen, die Bäche, Flüsse und ihre Ufer; die Wassergräben, Teiche, Sümpfe und Landseen haben alle ihnen eigenthümliche Gewächse. Auf dem festen Lande bringen Niederungen und Thäler je nachdem sie mehr oder weniger dem Wasser Zugang und Vertheilung verstatten, abhängiges und plattes Land, minder oder mehr erhebende Gebirge, so auch verschiedene Erdlagen verschiedene Gewächse hervor. Am günstigsten für die Vegetation ist überhaupt niederer, doch gelind abhängiger Boden, auf dem die überflüssigen Wasser ablaufen, aber die Reste früherer Organismen, als Dünen, zum Wurzelboden, nicht abgeschwemmt werden.

Den Hauptunterschied der Erdvegetation aber begründen climatische Verhältnisse. Die großen Einwirkungen des Clima's auf alles, wohl thierisches als Pflanzenleben, wurden auch in der frühesten Zeit der Naturwissenschaft beachtet. Unter den mehreren Climates wurden besonders das heiße, und auf jeder Hemisphäre das temperirte und kalte unterschieden, und darnach die Bewohner eines jeden, nach dem Schatten, den sie während der gewöhnlichen Jahreswechsel nehmen, a) in der heißen Zone, in welcher die Sonne zwei Mal jährlich über den Scheitelpunct geht und daher der Schatten bald nördlich bald südlich fällt, Zweischattige, (Amphiscii,) oder auch weil der Zeit, wo die Sonne den höchsten Stand hat, der Schatten auf dem Ort, den die Körper auf dem Boden einnehmen, selbst fällt, Unschattige, (Ascii,) b) in der temperirten Zone, wo der Schatten der Sonne das ganze Jahr hindurch in den Mittagsstunden nur auf Einer Seite, in der nördlichen nördlich, in der südlichen südlich, fällt, nur nach Verschiedenheit der Jahreszeiten länger oder kürzer ist, Einerschattige, (Heteroscii,) c) in der kalten Zone, wo die Sonne in der Sommerzeit mehrere oder wenigere Tage gar nicht untergeht.



die Schatten also im Kreis herumwirft, Umschattige, (Perioeci,) genannt <sup>15</sup>.

Die ähnliche, jetzt indessen, wie die vorige, nur noch als Schultheorie betrachtete Benennung ist folgende, welche sich auf das Verhältniß gründet, in dem die verschiedenen Erdbewohner, wegen der Rotation der Erde, ihrer täglichen Umdrehung, und des von dem Wechsel der Jahreszeiten abhängigen verschiedenen Standes der Sonne um die Mittagszeit gegen einander stehen: Synoeci, Zusammenwohner, mit ihren drei Gegensätzen: a) Antipodes, Gegenfüßler, vollkommen jenen entgegengesetzt, nämlich auf der andern Hemisphäre in denselben Breitengraden, aber den entgegengesetzten Längengraden wohnen, welche außerhalb der Aequatorialgegenden die entgegengesetzten Jahres- und Tageszeiten haben; b) Antioeci, Gegenwohner, auch auf der andern Hemisphäre unter gleichen Breitengraden, aber auch Einem Meridian, die entgegengesetzte Jahreszeiten, aber gleiche Tageszeiten haben; c) Perioeci, die auf derselben Hemisphäre, auf gleichen Breitengraden, aber unter entgegengesetzten Meridianen wohnen, also gleiche Jahreszeiten, aber entgegengesetzte Tageszeiten haben <sup>16</sup>.

In Hinsicht der climatischen Verschiedenheit findet sich nun die schon gelegentlich berührte Eigenheit, daß Pflanzen, welche eigentlich kalten Climates in der Ebne angehören, in heißen Climates auch öfters auf solchen Berghöhen finden, die ihrer Erhabenheit jenem Clima gleich kommen. So findet man Grönländische Lappländische Pflanzen nicht nur auf den Alpen und Pyrenäen, sondern sogar unter dem Aequator auf den Cordilleras. Tournefort fand am Fuß des Ararat die Pflanzen des umliegenden Armeniens, weiter hinauf Italienische, dann Französische, noch weiter auf Schwedische, auf dem Gipfel Grönländische. Doch haben die hohen Gebirgsgegenden auch wieder Pflanzen, die sich in niedrigen Thälern an andern Orten in der Tiefe nicht finden, und umgekehrt. Eine Menge Pflanzen sind auch auf ebenem Boden über die ganze Erde verbreitet, andere nur gewissen Ländern eigen, ob sie gleich häufig nur durch Verpflanzung auch in andern einheimisch geworden sind, vorzüglich aber durch Cultur, Sicherung und Schonung auch in solchen Ländern fortkommen, die ihrer Natur nach ihnen eigentlich unangemessen sind. Ein großer Theil von ihnen wächst häufig in großen Gruppen zusammen; so weit der Boden ihnen günstig ist, auf diese Art entstehen besonders bemooster mit Rasen überzogener Boden, Heide- und Waldungen, und bringen dadurch auch dem menschlichen Leben manche Vortheile. Vorzüglich verbreitet sind auf dem Erdboden die antiscorbutischen und als Gemüse benutzbaren. Dieser ältern Eintheilung gedenkt schon Strabo (op. geograph. l. 2.) als immer zu seiner Zeit angenommenen. Doch hat die Ascios erst Achilles Tatius, ein Alexandrinischer Mathematiker, besonders Antisciden und diesen Abtheilungen noch folgende: Gegenschattige, (Antiscii,) Bewohner der gegenseitigen Hemisphäre, Langschattige, Kurzschattige, (Macroscii, Brachiscii,) beigelegt. S. dess. isag. ad Arantii phaenomena, c. 31. 16) nach Geminus, einem Mathematiker von Rhodus, der jedoch (isagoc. c. 13.) nur synoecos und perioecos, letztere auch nicht mit obiger Schärfe unterscheidet, denen dann neuere die übrigen hinzusetzen. S. Achill. Tatius isag. c. 30.

Pflanzen, als Kresse, Sellerie, Petersilie, Löffelkraut, Saurampfer u. s. w., so auch Gesträuche, die genießbare Beeren tragen. In den kalten Zonen, nebst Moosen, Farrenkräutern und an der Erde fortlaufenden Pflanzen, die vornehmsten Gewächse der kalten Zone aus, wegen der Einwirkung der Kälte das vegetabilische Leben am weitest zurückgedrängt ist; Bäume sind wenigstens krüppelhaft gestraucht. Die temperirte Zone ist immer noch zu verschiedenartig, um diese Pflanzen auf gleiche Weise zu begünstigen. Allgemein verbreitet sind die bekannten Getreidearten: Weizen, Roggen, Buchweizen, Gerste, Hirse, Hafer, besonders auch die Kartoffeln; dem kältern, an den Polarkreis grenzenden Theil gehören mehr unsere gewöhnlichen Baumarten, als Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, an, außerdem Fenchel und Hanf, Rhabarber, Ginseng, Rüben, Krapp, von Küchenschwämmen, wachsenden Erbsen, Kohl, Rüben. Der wärmere, die heiße Zone grenzende Theil bringt als eigenthümliche Getreidesorten den Mais, den Mais und Dinkel hervor, außerdem die edlern Baumfrüchte, die Olive, die Citrone, die Feige, die Dattel, ferner den Mandel, die Manna, die China, die Tamarinde, die Pistacie, das Salzkehlbäumchen, die Aloe, den Sonnenstrauch, den Safran, den Kümmel, die Zedern, das Süssholz, von Hülsenfrüchten am besten Bohnen und Erbsen, von Waldbäumen die Eiche, die Cypressen, den Kork- und Eichenbaum. Zwischen den Pflanzen der kältern und wärmern Zone steht der Weinstock und der Maulbeerbaum in der Mitte, ihnen schließen sich die feinen Obstsorten an, die Walnuss, die Castanie, die Mandel, die Mispel, die Pfirsche, die Quitte, die Aprikose. In der eigentlich schon tropischen Zone reicht doch das Zuckerrohr und die Baumwollenstaude auch in sie hinein. Die heiße Zone hat nicht außer diesen die meisten Gewächse des wärmern Erdstrichs der gemäßigten Zone, sondern auch viele, in denen sich der höchste Reichtum der Natur andeutet, und die nur durch die sorgfältigste Pflege und künstliche Wärme außer den Tropen fortkommen. Als eigentliche Getreidearten hat sie die Durra, die Poa, die Holcusarten, den Cambraru, Solam u. s. w. Besonders ausgezeichnet ist in ihr aber die üppige kräftige Wuchs der Palme, des Pisangs, des Kaffeebaums, des Brotbaums, des Papiermaulbeerbaums. Eben so charakteristisch sind die hier gewonnenen kräftigen Gewürze, der Cacao, die Vanille, der Pfeffer, Ingwer, Zimmt, die Muskat, Gewürznelken, feine Oelarten, die Ananas, die Limonie, der Kampfer, der Indigo, der Safran, die zahlreichen trefflichen Fische- und Farbehölzer u. s. w.

Am äußerst wichtig ist aber in Hinsicht des Pflanzenlebens die mehr oder mindere Erhebung des Bodens, wie auch seine Natur und Verschiedenheit seiner Abhängigkeit so wohl dem Grade, als auch der Richtung nach. So wird im Durchschnitt im Mittellande von Europa der Getreidebau bis zu einer Höhe von etwa 2000 Fuß, der Meeresfläche an gerechnet, Waldzucht zu 4000 Fuß, Wiesenbau bis zu 5000 und Hüthung bis zu 6000 Fuß Höhe getrieben; vor dem Schnee- und Eishöhe wachsen nur Moose und Flechten. Fichten, Tannen, Birnbäume gedeihen am höchsten bis auf 4000 Fuß, vorzüglich auf den Mitternachtseiten der Berge; nächst dem Fichte kommen Birken, Lärchenbäume, Rothbuchen ebenfalls auf den der Sonne



arten Seiten der Berge; Kiefern aber, jedoch mit schlechtem Nadelholz, auf den Mittagsabhängen, nur in lockerem, sandigen Boden bis auf 3000 Fuß Höhe, ebenfalls auf der Mitternachtsseite Eichen, Nüßern und Weißbuchen bis auf 2000 Fuß Höhe. Fichten und Lerchenbäume gedeihen am besten auf feuchtem thonigen und thonigen Boden, Kiefern auf warmem, sandigen oder steinigem, Rothbuchen auf schattigem und felsigem Boden, Birken auf jedem Boden, am besten aber auf feuchtem Lehmboden, Eichen, Ahorn, Ulmen u. s. w. auf feuchter, lehmiger, kleiiger Erde, Erlen auf feuchtem thonartigen Boden, Erlen auf quellenreichem, moorigem Boden, Weiden nur an Quellen und Bächen, Auweiden an den Ufern der Bäche in moorigem und schlammigem Boden. — Der Roggen gedeiht bis auf eine Höhe von 2000 Fuß in trockenem erdigem Boden, Hafer bis auf 3000 Fuß Höhe in steinigem, schuttigen, lehmigen Boden, Gerste in feuchtem, fettem Boden bis auf 1000 Fuß Höhe, Weizen in feuchten, kalkartigen Boden bis auf 800 Fuß, Heidekorn, Hirse in warmem, trockenem, sandigen, kleiigen Boden, Erbse und Linsen in thoniger, fetter Erde bis in die Höhe wie Weizen, Erdäpfel in erdigem Boden von jeder Beschaffenheit bis auf eine Höhe von 2000 Fuß, Kraut und Kohl auf warmem, kalkartigem Boden, Flachs auf feuchtem, lehmigen, kalkigen Boden bis zu 2000 Fuß Höhe, Tabak in warmem, kleiigen, lehmigen Boden u. s. w. Von Fruchtbäumen gedeihen die Apfel-, Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäume nur bis auf eine Höhe von ungefähr 1000 Fuß; der Weinstock gedeiht nur auf der Mittagsseite am Fuße der oder sandiger Abhänge hoher Berge. — In tiefen, besonders Morgen gegen Abend laufenden Gebirgsthälern gedeihen alle Pflanzen auf weit größern Höhen. In Gebirgsthälern, die von Mittag nach Mitternacht abfallen, ist der Pflanzenwuchs immer befruchteter, in den Thälern, die gegen Mittag streichen dagegen gerät; der Gebirgsabhang, der nach Mittag und Morgen gerichtet ist ihm jederzeit günstiger als der entgegengesetzte u. s. w. Noch mehr als die Pflanzen sind die Thiere von dem Ort ihres Aufenthalts abhängig. Man unterscheidet darnach, wo sie gewöhnlich aufhalten, Wasserthiere, unter diesen wieder Meeresthiere (Einwohner des süßen Wassers; ferner Landthiere und unter diesen auch Thiere, die in der Erde selbst, jedoch nie tief in dem Erdinneren, leben, so daß die Luft nicht ihnen zugänglich wäre, dagegen fliegende Thiere, die in andern Thieren besonders als Eingeweidethiere aufhalten, aber auch Pflanzenthiere, die lediglich gewissen Pflanzentheilen sind<sup>17</sup>, mit diesen entstehen und untergehen, ferner fliegende Thiere, die sich von dem Erdboden auf einige Zeit losmachen und in der Luft auf gleiche Weise, wie schwimmende Thiere in der See und auf der Oberfläche der Gewässer, einige Zeit in Bewegung verhalten können. Zwischen den Wasser- und den Landthieren stehen die Amphibien in der Mitte.

<sup>17</sup>) Eichen Käfer (Insectenbelustigung, 1. B. S. 270.) kannte auf 200 Insecten, die einzeln auf der Eiche gefunden werden, Pinné (pand. insect. in amoen. acad. Vol. V. p. 250.) 55 Arten auf der Weide u. s. 10.

Je niedriger eine Thierklasse steht; desto mehr ist ihr Aufenthalt ort fixirt. Die Polypen und die sternförmigen Thiere kommen im Wasser vor; das auch der Fische eigentlichstes Element ist; Eingeweidewürmer kommen bloß in thierischen Säften vor, die Milben (Würmer,) halten sich im Wasser oder an feuchten Orten an. Insecten dagegen sind nur während ihrer ersten Bildungsstufe an Wasser und an feuchte Orte gebunden. Auch Amphibien halten entweder im Wasser oder doch in dessen Nähe auf, Vögel und Säugethiere aber leben am wenigsten abhängig von einem wässerigen Aufenthalt, obgleich Wasser auch bei ihnen zum nöthigsten Lebensbedürfnisse gehört. Doch sind die niedrigsten Ordnungen beider Classen von den Vögeln die Schwimmvögel, von den Säugethiern die Cetaceen auch ihrem Aufenthalt nach an das Wasser gebunden. Dem Verhältniß, als das Bedürfniß des Aufenthalts im Wasser den vollkommnern Thieren abnimmt, nimmt aber das Bedürfniß atmosphärischen Luft zu.

Die climatischen Verschiedenheiten und die davon abhängigen Nahrungsmittel sind daher auch für die vollkommnern Thierclassen wichtiger als für die niedern, obgleich sie auch diesen nicht gleichmäßig sind. Ganz untauglich für alles thierische Leben sind nur die kalten Orte und Gegenden, wo die mit einer Eisdecke überzogene Oberfläche auch alle Vegetation zurückhält, und die thierischen Säfte in den höhern Graden von Kälte selbst erstarren, was wahrscheinlich nur in der Winterszeit in der Nähe der Erdpole der Fall ist, dann eine so versengende Hitze, die gleichfalls keine Pflanze zu keimen läßt, wie vielleicht stellenweise in den heißen Sandwüsten der mittlern Erdgegenden, unter dem alles thierische Leben vernichtenden Siroccowinde, und dann in der Nähe von Vulkanen oder heißen Quellen, die, gleich anderem Feuer, oder bis zum Siedegrad und über demselben erhitzten Stoffen, die thierischen Fibern zersprengen und die Säfte zum Gerinnen oder zum Verdunsten bringen. Die Erdbewohner sind, da die Temperatur des Meeres in der Tiefe ziemlich gleichmäßig ist, weniger an gewisse Gegenden gebunden. Der Wallfisch, der Hai und andere Fische befinden sich unter dem Pol der Pole eben so wohl, als zwischen den Wendekreisen; doch haben auch wieder andere angewiesene Grenzen; so gehen z. B. die Saugfische, so wenig als die Doraden aus der wärmern Zone. Insecten und Gewürme dagegen sind sowohl wegen des ihnen nöthigen Temperaturgrades, als auch ihrer Nahrung wegen an gewisse Gegenden der Erde, ja an gewisse Pflanzen gebunden.

Vögel haben öfters, als Zugvögel, ein doppeltes Vaterland und entgehen dadurch der ihrer Organisation feindlichen Winterjahreszeit; andere sind nur einer Gegend, oft wohl nur einer kleinen Insel treu. Zu den allgemein verbreiteten gehören der Rabe, die Gans, das Huhn, die Taube, die Schnepfe, der Sturmvogel, der Eisvogel; die kalte Zone bewohnen vorzüglich das Schneehuhn, die Roggengans, der Eidervogel; in der südlichen Zone macht der Pinguin den Uebergang von den Bewohnern der kalten Zone zu denen der gemäßigten. Den gemäßigten Zonen gehören an: der Fink, die Nachtgall, überhaupt alle Sperlingsarten, der Auerhahn, das Rebhuhn.



Asien, der Kalkut, der Ortolan, der Trapp, der Kranich, der Fasan; den Uebergang von der gemäßigten zu der heißen Zone bilden der Pelican und der Flamingo. Der heißen Zone eigen sind der Strauß, der Kasuar, das zahlreiche Papageiengeschlecht, der Paradiesvogel, (in Neu-Guinea und den benachbarten Inseln,) die Fregatte, und der eigentlich sogenannte Tropikvogel. Ueberhaupt enthält die heiße Zone die meisten Vögelarten, und jede wieder in reichsten Individuen und größtentheils von dem üppigsten Federputz, so daß die Tropen für das eigentliche Vaterland der Vögel angesehen werden können.

Eine besondere Bemerkung verdient auch die Vertheilung der Säugethiere auf der Erde. Eine große Menge derselben ist mit dem Menschen über einen sehr großen Theil der Erde verbreitet, doch theils durch Zucht der Menschen als Hausthiere. Unter letztern zeichnet sich der Hund aus, der als getreuer Gefährte dem Menschen all hin gefolgt ist; der Wolf dagegen, von dem er abstammt, findet sich zwar in der alten Welt von dem Polarcirkel an bis zur Südspitze von Afrika, in Amerika aber nur von Canada bis Mexico. Die Fenneke gedeiht am besten in den wärmern Theilen der gemäßigten Zone, und steigt höchstens bis zum 64ten Grad, und als Amerikawild nur bis zum 54ten Grad hinauf. Das Schaf und die Ziege ertragen zwar die Kälte des Polarcirkels und die Hitze des Aequators, erträgt jedoch besser die Kälte, letzteres besser die Hitze. Der Urmufflon, von dem das Schaf abstammt, lebt auf den Gebirgen der gemäßigten Zone aller vier Welttheile, der Steinbock und der Giege, die Stammväter der Ziege, auf den höchsten Spizen der Berge. Das Pferd wird in Europa schon am Polarcirkel, in Asien noch etwas höher nördlich angetroffen; der Esel kommt dagegen nur bis zum 60sten Grad fort, gedeiht aber besser in der Hitze, und das Pferd im Ganzen dauerhafter ist und einen größern Theil der Erde einnimmt. Ihre Stammväter, der Kulan oder Onager oder Dschiggetai, sind im mittlern Asien zu Hause. Das zahme Kamel lebt bis unter dem 64ten Grad der nördlichen Breite, das Eselthier jedoch nur bis zum 60sten; in Amerika findet es sich erst vom 30ten Grade an; von da an südwärts ist es über die ganze Erde verbreitet worden, nach der Entdeckung von Amerika auch dahin, wo es theils zahm, theils verwildert bis zu Magellans Land sich findet; es fand es sich auf den Inseln des großen Oceans schon bei der ersten Entdeckung. Die zahme Katze findet sich in der alten Welt von Island bis zum Cap, in der neuen Welt fängt sie von den Coloniien an und ist bis nach Patagonien verbreitet; weniger ist die Wildkatze. — Außerst bemerkenswerth, selbst für die Geschichte des Menschengeschlechts ist es, daß alle diese Hausthiere des Menschen nirgends als in Hochasien wild beisammen finden. Außer diesen sind auch folgende Landthiere von allgemeiner Verbreitung: der Fuchs, von Nova Zembla und Grönland bis nach Japan, Guinea und Peru, dann wieder bis in Magellans Land; der Bär von den Lappen und Samojeden an bis nach Siam, von Sibirien durch ganz Amerika hindurch bis zur Magellanischen Enge; das Nashorn in ganz Europa und in Asien von Mangasea bis Ceylon, Senegambien und Guinea, in Amerika von der Hudsons-Bay an;

das Kaninchen in etwas beschränkteren Grenzen; der Hirsch in Europa vom 64sten Grad der Breite an bis nach Griechenland, in Asien vom 55sten — 60sten Grade an, in Afrika in der Barb. Abyssinien und Guinea, in Amerika ursprünglich von der Hudson Bay an bis nach Mexico und Peru; das Reh in ziemlich allgemeiner Verbreitung in Europa und Asien; das Eichhorn auch ziemlich in allen Welttheilen und Climaten; die Ratte und die Maus, eigentlich Europäischen Herkunft, aber durch Schiffe allgemein verbreitet, doch unfähig, die Kälte des hohen Nordens zu vertragen; Hermelin, fast in allen Climaten, vorzüglich aber in kalten leben. Von Seethieren wird der gemeine Seehund fast auf allen Küsten des Oceans beider Hemisphären getroffen, am häufigsten jedoch in großen Heerden in dem nördlichen Meere, aber auch in Land mit salzigem und süßem Wasser, im caspischen Meere, im Bosporus u. s. w.

Auf die kalten Zonen beider Hemisphären sind beschränkt: Seelöwe und der Seebär, auf die heiße Zone in beiden Welten kleine Manati.

In der nördlichen kalten Zone allein findet sich das Polarthier, in Europa bis zum 63sten Grad, in Asien jedoch bis zum 50sten, in Amerika sogar bis zum 45sten Grad herabsteigend, weiße Bär, (Eis- oder Polarbär,) der Stein- oder Polarsuchs, (Polarfuchs,) das Wollroß, mehrere Robbenarten. In der kältern gemäßigten Zone der alten und neuen Welt leben unter verschiedenartiger Beschränkung: der Zobel, die Fluß-, Sumpf- und Meerotter, Uiber, der Bielfraß, der Marder, der Luchs, das Elch, das gemeine Eichhorn, der Dachs, das Murmelthier und mehrere. Besonders merkwürdig ist, daß alle Landthiere, die beide Welten gemeinschaftlich besitzen, insgesammt im Norden zu Hause sind, und meistens bis zum 60sten Grad der Breite herumgehen, wo beide Welttheile einander näher rücken und in der Beschaffenheit des Bodens wenig Differenz haben.

In der alten Welt allein sind zu Hause, und zwar vom 60sten Grad an in allgemeiner Verbreitung, der Igel, in der kalten Zone der alten Welt allein lebt der Lemming, in der kältern gemäßigten Zone das Bisamthier vom 60sten bis 35sten Grad, der Hamster vom 58sten bis 42sten Grad und mehrere.

Der wärmern gemäßigten Zone gehören vorzüglich an die Wanderratte und der Springhase, der Damhirsch, das Kameel, wohl der Dromedar als das Trampelthier, das wichtigste Thier des Orients, und von Nordafrika, vom 60sten Grad, (am Umruff) bis zum 15ten, doch wild nur noch im mittlern Asien, die Gemse in den Kettengebirgen des gemäßigten Erdstrichs, die Gazelle in Arabien und Afrika, die Unze, der Schafel, die Hyäne.

Den ganzen heißen Erdstrich bewohnen das Stachelschwein, Büffel, die heiße Zone alle die verschiedenen Affengattungen, Pavian, die Giraffe, der Babrussa, das Rhinoceros, der Hippopotamus, der Elefant, (der ungefähr da anfängt, wo das Kaninchen aufhört,) der Löwe, der Tiger, der Panther, der Leopard, die Irtyskatze und das Sibeththier.



Thiere der neuen Welt sind von beinahe allgemeiner Verbreitung: der Jaguar, und der Cuguar, (der Tiger und Löwe dieses Theils,) das Guanico oder Lama, (das Kameel der neuen Welt,) die Vicunna; auf die kalte Zone in Amerika beschränkt ist das Muskusochse, (Bisamstier,) auf die gemäßigste nördliche Zone der (Buckelochse.) Reicher an eignen Thierarten ist die heiße Zone der neuen Welt, wovon die Meerkatze, (in den zwei Gattungen Sagou und Sagoins,) das Faulthier, (der Ai,) und der Ameisenbär, Armadill, der Tajassu, (Bisamschwein,) der Tapir, das größte Thier von Südamerika, die merkwürdigsten sind.

Überhaupt zählt Zimmernann<sup>18</sup> nur vier Arten von Quadrupeden, die der Eiszone bis zum 63sten Grad gehören, 134 Arten für die gemäßigten Gegenden und 222 Arten in den wärmsten Erdgegenden, die aber größtentheils nur längs der Küsten bekannt sind. Auch hat also die heiße Zone das Uebergewicht in Steigerung des Lebens.

Aber eine andere nicht minder beträchtliche Menge von Quadrupeden ist auf einem verhältnißmäßigen geringen Theil der Erde eingetheilt.

Die Krone der Schöpfung, das Höchste aller Erdproductivität, ist der Mensch, nicht als ob alles auf der Erde um seiner willen da wäre, (welchem Wahn nur der Eigendünkel und der Unverstand einander überreden können,) aber weil er allein das ganze Reich des Seyns, also auch alles, was die Erde hervorbringt, in eine Idee aufzunehmen, und also geistig sich noch einmal zu regeneriren und dann von allem Reichthum der Natur auf der Erde allein, wenigstens eine Probe, Gebrauch machen, und ihn zu seinem Nutzen zu verwenden, endlich weil er nur allein mit Besonnenheit und nach Zwecken, nicht nach blinden Trieben, wie andere Erdbewohner innerhalb der vorgewiesenen Grenze wohl auch es vermögen,) die Erde selbst auf ihrer Oberfläche, in einer ziemlich weit reichenden Sphäre, umzuwandeln und in ihrer Form zu verändern vermag.

Nach den vielseitigen Betrachtungen, zu denen der Mensch, als vorzüglicher Erdbewohner, nach den Bestimmungen seines Seyns den Anspruch bietet, halten wir hier nur die fest, die ihn in seinem unmittelbaren Verhältnisse zur Erde als seinen Wohnort aufstellt.

Das Menschengeschlecht ist ungleich weiter als irgend eine Thiergattung über die ganze Erde vertheilt, und dieß zwar nur in einer einzigen Gattung, die aber nach Verschiedenheit der Erdstriche, wo der Mensch heimisch ist, Varietäten bildet. Diese hiernach bestimmte Absonderung wird unter dem Artikel Menschenstämme näher betrachtet werden. Hier nur das Allgemeine in naturhistorischer Hinsicht. Ueberall findet sich der Mensch in Gruppen, nicht nur in Familien, sondern auch in wahrscheinlich überall aus dem Familienleben Anfangs hervorgegangenen Verbindungen von Völkern, und aus diesen zusammengesetzten geselligen Vereinen, in denen das Eigenthum des Einzelnen anerkannt, das Recht gehandhabt, das Heilige, jenseit der Sphäre des Menschenlebens verehrt wird, werden aber auch unaufhörlich Spannungen zur Sicherung und Erhaltung geographische Zoologie, 3 Th. S. 58.

höhung des eignen Seyns, sowohl unter den einzelnen Gliedern, dessen jene Vereine als Völker oder Staaten bestehen, als auch selbst zunächst gegen benachbarte, in der Folge auch gegen entfernte ähnliche Vereine, oder Befehdungen und Kriege entstehen, die entweder mit Unterdrückung der schwächern Partei, oder durch Erpfung in einen, wiewohl immer auch nur temporären Friede stand auflösen. Unter diesem unaufhörlichen Wogen des Völkerlebens, dessen nur geringern Theil uns die Weltgeschichte darstellt, entstehen so wie einzelne Individuen, auch ganze Völker von großen und kleinerem Umfange, erhie'ten sich, eben so wie die einzelnen Individuen, längere oder kürzere Zeit, und lösten sich, eben so wie einzelne Mensch sich vom Leben löst, auch später oder früher einander, indem sie entweder von andern größern Völkern um wurden, oder in einzelne kleinere sich zerspalteten. So stellt die Geschichte, so die mittlere, so die neuere jede andere Völker mit andern Nahmen, andern Verfassungen, andern Religionsformen, andern Sprachen, andern Sitten. Allen aber blieb doch eine gewisse Natureigenthümlichkeit, die vom Boden ausging, der den verschiedenen Völkern zum Schauplatz diente, auf dem sie auf- wieder abtraten, die aber gleichwohl durch die Vermischung der Boden entsprossenen und der in das Land gekommenen fremden Völkern modifizirt wurde.

Diese Natureigenthümlichkeiten oder Nationalcharaktere der verschiedenen Völkerschaften, wie wir solche besonders in neuerer Zeit, welcher erst eine universelle Völkerkenntniß anhebt, unterscheiden, liegen aber bei weitem nicht allein, ja kaum zunächst von der climatischen Verschiedenheit ab, die einzelne Erdstriche in Hinsicht der Jahreszeitwechsel haben, sondern stehen mit der allgemeinen Form der Oberfläche, die diese zur Erhaltung des vegetabilischen und animalischen Lebens, nach den besondern Bedürfnissen der menschlichen Natur mehr oder minder geschickt macht, und den Bedingungen der Entwicklung der geistigen und körperlichen Kräfte der Menschen mehr oder minder günstig ist, in nothwendigem Zusammenhange, deren besondere Betrachtung aber dem Artikel Erdorganismus vorbehalten bleibt, wo dann auch des allgemeinen Völkerlebens, in so fern von der Erdform und dem eignen organischen Verhältniß der Erde zunächst bedingt ist, noch besonders gedacht werden wird. (H.)

**Erden** <sup>1</sup>, (Terrae <sup>2</sup>.) Die Körper, welche der Chemiker mit diesem Nahmen belegt, müssen sorgfältig von dem, was im gemeinen Leben Erde genannt wird, unterschieden werden. Der Oekonom spricht oft von Gartenerde, Torferde, Haselerde, Dammerde u. s. w., diese Gegenstände sind aber nur Gemenge von jenen chemischen Körpern, verbunden mit Alkalien, Metalloryden, Säuren und andern Dingen.

Chemisch reine Erden besitzen folgende Merkmale: sie haben keine Farbe, zeigen jede für sich im gewöhnlichen Ofenfeuer Unschmelzbarkeit, Unauflöslichkeit im Wasser, und also Geschmacklosigkeit und Geruchlosigkeit. Kalk, Baryt und Strontian, die sonst bei den

1) Gren's Handb. d. Chemie, 1. Th. 4. Abschn.  
subterr. 1. 1. s. 3.

2) Becheri p.



standen, müssen sonach zu den Alkalien gezählt werden, und es kann als wirkliche Erden nur Kiesel-erde, Thonerde, Zircon-erde, Kreb-erde, Süßerde und Ytter-erde übrig. Bis zum Jahre 1807, Davy's Entdeckung der metallischen Grundlage des Kali's, hielt man die Erden für einfach, obgleich sie die Eigenschaften der Metalle in hohem Grade besitzen. Allein Davy's Fund ward bald auf die Erden angewendet und später sogar ihre metallische Natur erkannt. Zwar ist es noch nicht gelungen, sie allein ihres Sauerstoffs zu berauben, doch sind mehrere Versuche geglückt, eine oder mehrere in Verbindung mit Eisen zur wirklichen Metalllegirung zusammenzuschmelzen<sup>3</sup>. Wenn wir also die Erden jetzt unter die Metalle ordnen müssen, so machen sie doch eine eigene Abtheilung aus, die ihren frühern Namen behält. Zwei davon, Kiesel-erde und Thonerde, spielen gegen Alkalien und einige Metallorxyde die Rolle einer Säure, obgleich sie gegen die Säuern sich, gleich andern vier Erden, basisch verhalten.

Die Kiesel-erde, (Silicea,) ist knirschend, schwer, pulverförmig, mit Säuern Verbindungen, von denen die mit Flußsäure am besten ist, die übrigen mehr oder weniger aber unhaltbar sind. Ihre Verbindungen mit Wasser, Eisenorxyd, Kalkerde, Kali, Natrium und andern kommen als regelmäßig gesättigte Salze in sehr vielen Steinen vorzüglich in denen vor, die zum Kieselgeschlecht, (z. E. Bergkristall, Scolith,) gezählt werden. Die mit Alkalien schmelzen leicht Glas, auf welcher Eigenschaft die Bereitung des gemeinen Kieselglases beruht. Pott gab im Jahre 1746 von ihr die erste Beschreibung. Bergmann setzte ihre Eigenschaften später mehr aus einander.

In der organischen Welt kommt diese Erde selten vor, zwar findet sie sich im Urin; dahin kommt sie aber wahrscheinlich mittelst des Getränks aufgenommenen Quellwassers, worin neuere Untersuchungen jederzeit etwas davon aufgefunden haben. In dem Bammberg des Andesgebirges fand sie von Humboldt als Concretion, Thon genannt, das nach John's Untersuchung aus 70 Theilen Kiesel-erde, und überdieß aus Kalk, Thon, Eisen, Wasser zusammenge setzt ist<sup>5</sup>. Derselbe Chemiker fand diese Erde ebenfalls in den Steinen der Orleansamen<sup>6</sup>.

Die Thonerde, Alaunerde, (Argilla, Alumina,) macht einen Theil aller Thonarten aus; in denselben kommt sie mit Kiesel-erde, Eisenorxyd und andern vor. Sie ist darin der Kiesel-erde ähnlich, daß sie mit Alkalien<sup>7</sup>, gleich einer Säure, sich leicht verbindet und wieder auch mit Säure zu salzigen Verbindungen zusammenge treten kann. Daher ihre Auflöslichkeit in reinem Kali sowohl, als in jeder Säure. Die Verbindungen mit Säuern sind nicht cry stallisierbar<sup>8</sup>, vielmehr trocknen sie zu zähen Teigen ein; wie denn

3) A. Schandl, i Fysik, Kemi, och Mineralog b. Hisinger u. Berzelius, Stockholm 3. B. S. 117. Commentat. soc. Regiae sc. Goett. re-  
gior. Vol. I. Gilbert's Annalen d. Physik, 38. B. 2. St. S. 321.  
4) G. dess. opuscul. physica et chemica, Vol. II. p. 29. 5) John's  
chemische Untersuchungen, 2. B. S. 10. 6) G. Magazin der Gesellschaft na-  
turforschender Freunde zu Berlin, 3. B. S. 60. 7) Ammonium ausgenom-  
men. 8) Der Alaun ist zwar cry stallisierbar, aber er enthält auch neben der  
Thonerde und Schwefelsäure noch Kali oder Ammonium.

diese Erde auch schon mit reinem Wasser einen solchen Teig gibt, im Feuer so zusammensintert, daß er am Stahle Funken geben kann. Auf dieser Erhärtung durch Feuer beruht die Verfertigung des nützlichen Töpfergeschirres, (der Häfnerarbeit, Pfeifen, Schmelzgefäße, Fayence, des Steinguts, Porzellans.) Diese Erde findet sich in Thierkörpern gar nicht, selten in Pflanzenstoffen. Im Saffor findet sie sich für nebst Bittererde<sup>9</sup>, und im Indig ist sie nach Chevreul auch vorhanden.

Die Glycinerde, Süßerde, Beryllerde, (Glycina, s. Beryll) kann in so fern hierher gezählt werden, weil sie ebenfalls Auflöslieh in reinem Kali zeigt. Sie wird übrigens nur im Beryll, Euclase und Schmaragd angetroffen, worin sie Bauquelin<sup>11</sup>, 1798 zuerst fand. Sie ist sehr leicht, gibt mit Säuern süße Salze und erhärtet nicht im Feuer.

Die übrigen drei Erden sind vollkommen basisch.

Zirconerde, Hyacintherde, (Circonia,) ist ein Bestandtheil der Zircone und Hyacinthen, in denen sie Klaproth<sup>12</sup> auffand. Sie gibt mit Säuern, Kohlensäure ausgenommen, schrumpfende Verbindungen.

Talkerde, Bittererde, Bittersalzerde, Magnesie, (Magnesia Terra muriatica,) deren eigenthümliche Natur Marggraf<sup>13</sup> und Black<sup>14</sup> zuerst außer Zweifel setzten, nachdem schon Fr. Hoffmann<sup>15</sup> solche gemuthmaßt hatte<sup>15</sup>. Sie verbindet sich mit allen Säuern und bitterschmeckenden Salzen, (z. B. mit Schwefelsäure zum Bittersalz, in welcher Verbindung sie auch natürlich vorkommt;) im Feuer erhärtet sie nicht, sondern verliert vielmehr ihre anhängenden Säuern mit ihr Wasser, und kommt dadurch in ganz reinen Zustand, (Magnesia usta, calcinata, pura,) in welchem sie zum Arzneigebräuche dient. Im Mineralreiche findet sie sich vor, größtentheils mit Kalkerde, im Serpentinsteine, Meerschäum, Tripel, Talk u. s. w. ziemlich rein im Magnesit, im Meerwasser mit Salzsäure verbunden u. s. w. Im menschlichen Urin kommt sie als phosphorsaures Salz vor; als solches zeigt sie sich zwar auch in dem Urin einiger Thiere, wie in dem der Kaninchen und des Kameels<sup>16</sup>, jedoch bei weitem nicht in den meisten; dagegen ist sie jederzeit in den Knochen der pflanzenfressenden Thiere zu finden<sup>17</sup>, wodurch diese sich von den menschlichen sehr unterscheiden. Zwar soll phosphorsaure Bittererde nach Berzelius auch in den Knochen der Menschen einen Bestandtheil ausmachen<sup>18</sup>, wogegen aber Hildebrandt großen Zweifel erhoben hat. Uebrigens kommt sie in der Kern- und Emailsubstanz der Zähne vor<sup>19</sup>; ebenfalls in den menschlichen Excrementen<sup>20</sup>.

- 9) Annal. de Chymie, Vol. XLVIII. p. 293. 10) Journal de physique LXV. 11) Annal du Museum d'histoire naturelle, Vol. XV. à Paris 1810. 12) S. dess. Beiträge, 1. B. S. 203. 13) Mémoires de l'Académie de Berlin 1759. 14) Essay and observ. of the society of Edinburgh 1755. 15) Observat. physico-chemicae 1722. 16) Chevreul (Annal. de Chymie, Vol. LXXXII.) Hatchett in Philos. transact. 1806, II. ist damit im Widerspruche. 17) nach Berzelius u. Bauquelin. (S. Annal de Chymie, Vol. XLVII, p. 244.) Vgl. Aushandlung. i Fysik, Kemi etc. v. Hisinger u. Berzelius, Stockholm 1806. 19) nach Berzelius. S. ebendas. 20) S. Schwann's neues allgemeines Journal der Chemie, 6. B. S. 509.



terer Erde, (Yttria,) ist bis jetzt nur im Gadolinit und Yttror-  
 zwei Schwedischen Fossilien, durch Gadelin<sup>21</sup> und Eke-  
<sup>22</sup> aufgefunden worden. Klaproth, Wauquelin, Berze-  
 haben ihre Eigenthümlichkeit später bestätigt. Sie gibt mit  
 Salze von süßem Vorgeschmack und herbem Nachgeschmack,  
 edet sich nicht mit reinen, wohl aber mit kohlen-sauern Alkalien.  
 S. Vetensk. Acad. Stockh. Handling. 1794, auch Erell's chemische  
 anal. 1796, 1. B. S. 313. 22) Vetensk. etc. 1797. (Jacinus.)  
 Erdgegend, s. Clima. — Kunde, s. Geologie.

Erdorganismus<sup>1</sup>, Erdplanet<sup>2</sup>, Erde<sup>3</sup>, Erdkörper<sup>4</sup>,  
 Kugel<sup>5</sup>, Erdball<sup>6</sup>, Gea<sup>7</sup>, Gōa<sup>8</sup>, (Tellus<sup>9</sup>, Terra<sup>10</sup>,  
 das terraqueus<sup>11</sup>.) Unter den mehrern Gegenständen der Außen-  
 die der menschliche Geist in Entwicklung seines Erkenntnißvermö-  
 von sich und andern unterschied, und die er in bestimmten Begrif-  
 faßte, war der Weltkörper, den wir als Erde oder Erdplaneten  
 nen, erst einer der spätern. So lange der Mensch in dem Kin-  
 der, oder in der diesem analogen frühern Periode der humani-  
 Cultur, noch nicht diejenige Verstandesreife erlangt hat, um  
 en engern Beschränkungen seiner sinnlichen Natur zu entziehen,  
 das Maß seiner Erkenntniß nicht weiter als sein Auge, sein  
 und überhaupt die Sphäre seines Sinnenlebens. Unter den  
 ern Dingen, die er sieht, hört, oder überhaupt durch seine  
 geistig auffaßt, gehört die Erde nur als Boden, und wie  
 Himmel dem Kinde, so wie dem rohen Naturmenschen, als ein  
 lbe erscheint, das sich hoch über ihn und seine nächsten Umge-  
 m herumzieht; so ist die Erde unter ihm, ihrem allgemeinsten  
 fter nach, ihm auch nur ein Fußgestell, eine Unterlage, und da  
 reien bei unbeschränktem Blick, wegen gleichmäßiger Abgrenzung  
 resichtssphäre, dieser Erdboden stets rund erscheint, eine Scheibe,  
 ilt ihm nun als solche, als die erste und wesentlichste Bedingung  
 örperlichen Seyns, und alles dessen, was mit ihm im Leben in  
 hung steht. Was aber unter oder jenseit dieser Scheibe ist, bis  
 durch Eingraben in die Erde die menschliche Betriebsamkeit  
 ellangen nicht vermag, läßt der rohe Naturmensch entweder  
 gestellt seyn, da kein sinnliches Bedürfniß vorhanden ist, zu  
 Stillung die Bekanntschaft damit, reichen könnte, oder er  
 t auf phantastische Dichtungen, die seinem Vorstellungsver-  
 wohl ein Bild geben, aber, wie die zwölf großen Elphanten,  
 deren Rücken nach Indischem Glauben die Erde ruht, indem sie  
 Räthsel lösen sollen, selbst wieder eine neue Räthselaufgabe sind,  
 allen Sprachen ist daher auch die Bezeichnung der, unter er-  
 sten Naturkenntnissen, in der Folge als Weltenkörper unterschie-  
 Erde dieselbe, die auch das Material führt, das der Mensch  
 er Oberfläche derselben absondern, und zum eignen Gegenstand  
 Druckstücke zu einer künftigen Geschichte des Erdorganismus in Stücken's  
 chriften, 1. B. Nr. 2. 2) Bodens Anseht. zur Kennen. d. gestirnt. Him-  
 kts, 7. Aufl. S. 571. 3) — 6) S. die Literatur am Ende des Artikels.  
 8) ersteres dem Griechischen Nahmen γεα nachgebildet, letzteres entsprechend  
 am Nahmen der Deutschen Göttin Gōa, d. i. die freundlge, von genden, sich  
 neuen. S. Vorrede zu Zeune's Gōa, 2. Aufl. S. XII. 9) Ciceron.  
 omu. Scipion. c. 4. 10) Ciceron. Tusc. qu. 1. 1. c. 17. 11)  
 eecheri physica subterranea, 1. 1. s. 2. c. 1.

seiner Betrachtung machen kann, oder sie deutet, wie z. E. Wort Erdkreis, (Orbis terrarum,) auf die Vorstellung Scheibe hin, welche die Erde in der sinnlichen Wahrnehmung stellt. Die richtigern Bezeichnungen: Erdkugel, Erdplanet, aber den in den Schulen gebildet, und gewannen erst von da aus weise in die Sprache des gemeinen Lebens Eingang.

War nun aber der Zweck des Erdplaneten, seiner Natur nach, in zug auf den Menschen bloß der, ihm zum Wohnplatz zu dienen; so n die nähere Betrachtung desselben von der Lehre der menschlichen tur auszuschließen sehn; und in wissenschaftlicher Hinsicht würde Kenntniß des Erdplaneten kein näher gelegtes Interesse haben, das ist, welches uns antreibt, uns über die Localität eines Ha oder eines Grundstücks, das uns zum Besitz gegeben, oder d Kenntniß uns für ein Geschäft oder sonst einen Lebenszweck noth dig ist, zu orientiren, und uns darin heimisch zu machen. In sem Sinne und in dieser Beziehung wird auch die Kenntniß des planeten in den gewöhnlichen Unterrichtsanstalten als Erdbesch bung oder Geographie mitgetheilt, und man glaubt den sten Anforderungen der Wissenschaft ein Genüge geleistet zu h wenn man die Größenverhältnisse und die allgemeinen Naturver denheiten, die der Erdplanet, so weit er dem Menschen zugän ist, zeigt, als mathematische und physische Geograp der politischen oder statistischen, auf willkürlich erscheinende Ein tungen, Abgrenzungen und Anordnungen beruhenden Geographie ausschickt.

Von einem höhern wissenschaftlichen Standpunct aus aber, dem allein dem Physiologen seine eigentliche Aufgabe: Erkenn des Lebens, klar wird, erscheint der Erdplanet keineswegs als bloß äußere Bedingung des menschlichen Daseyns, als eine gleich willkürlich oder zufällig ihm angewiesene Wohnstätte, die viel auch wohl eben so gut eine andere, etwa der Mond oder irgent anderer Himmelskörper seyn könnte, indem das individuelle I nur in so fern Verständlichkeit für ihn erhält, als es, gleich e engern Kreise, von einem größern, von einem universellern I umfaßt wird, das ihm zum Träger dient, von dem es ausgeht, in das es, wenn es sich der Wahrnehmung entzieht, wieder a nommen wird, vielmehr gelangt er nothwendig dahin, das Seyn Erde nicht als ein abgesondertes, für sich bestehendes, sondern al nen Erdorganismus anzuerkennen, der, eben so, wie er s innerhalb einer noch höhern Sphäre des Seyns eingeschlossen, au nem noch umfassenderen Leben hervorgegangen und in dieses n wendig verflochten ist, auch die Myriaden einzelner, individuelle bendiger Wesen, die wir auf der Erde täglich entstehen, eine lang dauern und dann wieder untergehen sehn, in den Geschlech eines jeden, und unter diesen also auch das menschliche Gesch mit jedem einzelnen Menschen in sein eignes Leben aufnimmt, daß sie alle nur relative Gegensätze, als eigne selbstständige Nat bilden, an sich aber nur theilweise von dem Leben der Erde lo lassen sind, indessen immer durch solche Bande an sie und ihr L



bleiben, daß keine Anstrengung und keine ihnen zu Gebote  
Macht sie davon zu lösen vermag.

Unerkennung dieses Verhältnisses erschien auch schon in der  
Zeit die Erde den Menschen als eine Mutter, als eine Ge-  
ni, aus deren Schooß alles Lebendige hervorging, und erhielt  
Elybese oder Vesta, (Alma mater, ein Ausdruck mit dem  
immer nicht nur den Begriff von Ernährung, sondern auch den,  
Ehre, Ehrwürdigkeit, Schönheit, liebendes Wesen verbanden<sup>12</sup>),  
Mutter und Altäre<sup>13</sup>.

Das organische Leben der Erde nun, in Beziehung auf das in-  
tellectuelle, vegetabilische und thierische, insbesondere aber auf das  
menschliche Leben zu würdigen, oder die Momente darzustellen, die  
bei besonderer Betrachtung des Erdkörpers, so viel davon zu er-  
mitteln bisher möglich gewesen ist, darbieten, und die auf jenes  
menschliche Leben den nächsten Bezug haben, ist der Zweck gegen-  
wärtigen Artikels, dessen Aufnahme hier in dem oben Berührten volle  
Rechtfertigung finden wird.

1. Allgemeine Form der Erde, als Erdkörper.

Die Form der Erde ist die einer Kugel. Auf dieses Resultat  
kam man nothwendig kommen, sobald man es unternahm, die Grund-  
gesetze der Mathematik, und namentlich der Messkunst, auf die Erd-  
messung anzuwenden. Es konnte auch in den frühesten Zeiten der  
Astronomie nicht entgehen, daß man auf ebenen Flächen, noch be-  
sonderer aber vom Meer aus, oder auf dem Meere, von entfernten  
Orten, denen man sich nähert, oder die sich uns nähern, zuerst  
die niedrigen oder die obern Theile erblickt, die tiefern aber erst spä-  
ter in den Gesichtskreis treten, welches nur dadurch Erklärung er-  
hält, daß auch eine dem Auge eben erscheinende Erdoberfläche, wie z. B.  
das Meer, doch convex gekrümmt, und inbemi man dieß an allen  
Orten der Erde übereinstimmend beobachtet, ein Kugelsegment ist.  
Zuverlässiger und bestimmter mußte aber bei Betrachtung des  
sternenreichen Himmels, oder bei Vergleichung der scheinbaren Sonnen-  
am Himmel, in derselben Zeit, von verschiedenen Orten aus, die  
Krümmung der Erdoberfläche, als Resultat eines nur leichten Calculs her-  
vorgehen. In den großen Ebenen Mittelasiens, und bei dem meist wol-  
kenreichen Himmel jener Gegenden, gelangten aber die Bewohner der-  
selben sehr zeitig zur Kenntniß des gestirnten Himmels, so viel davon  
in den Gesichtskreis derselben trat, und die unterschiedlichen Haupt-  
sterne wurden, ihrer Configuration nach, oder als sogenannte  
Sternbilder, sehr zeitig unterschieden, und als solche feste Merkzeichen,  
wie man dann die einzelnen Erdgegenden, von denen aus man  
beobachtete, ihrer Lage nach beziehen konnte. Noch früher konnte  
beobachtern des gestirnten Himmels die Bemerkung nicht entgehen,  
während die meisten Sterne, (so wie am Tage auch die Sonne,)  
immer und derselben Seite in den Gesichtskreis treten, und nach-  
dem sie sich in Bogen am Himmel zu unterschiedlichen Höhen erho-  
ben. Vgl. auch Columellae de re rustica l. 5. c. 31, „Alma tellus, quae  
omnia vixit, velut aeterno quodam puerperio, lacta, mortalibus distenta  
mundo demittit ubera.“ 15) Auch in der Tartarischen Sprache hat die  
Erde die Benennung Mamma, die bekanntlich als Matrusant der Kinder zur Be-  
zeichnung von Mutter in andere Sprachen übergegangen ist.

ben haben, auf der andern entgegengesetzten in bestimmten Zeiten wieder aus dem Gesichtskreis verlieren, einige von ihnen sich Himmel in concentrischen Kreisen, in der Richtung der übrigen gleichzeitig mit ihnen sich bewegend, von einem gemeinschaftlichen Mittelpunct nicht so weiten scheinbaren Abstand haben, daß sie rend ihrer Bewegung um jenen Mittelpunct sich bis unter den Gesichtskreis oder den Horizont herabsenken. Dieser Punct am Himmel, der überdies durch einen ihm nahen Stern sich auszeichnet, der nur einen so kleinen Kreis um ihn beschreibt, daß seine Bewegung kaum oder auch wohl gar nicht bemerkt wird, wurde daher früh als der Himmelspol, so wie jener Stern als der Polstern unterschieden. Unter den mehreren ideellen Kreisen, die zum Behuf, um sich an dem Sternenhimmel zu orientiren, an der scheinbaren Himmelsgewölbe zog, war nun derjenige, der von den unterschiedenen Himmelspol aus durch diejenigen Sterne hindurchging, die zur Zeit der Beobachtung die höchste Höhe erreicht haben, wie man dieß später benannte, culminiren, d. i. dem Scheitelpunct oder dem Zenith des Beobachters am nächsten gekommen sind, die erste und bedeutendste, und wurde, da auch die Sonne in dem Meridian ihn täglich durchschneidet, Meridian oder Mittagslinie genannt. Nach ihm wurden nun zunächst am Himmel, und da auf ihm am Horizont die Erdoberfläche ihn scheinbar berührt, auch auf der Nord- und Südseite als Himmelsgegenden, (oder auch Erdgegenden,) so wie nach einem zweiten, rechtwinklich jenen im Himmel durchkreuzenden ideellen Kreise am Himmelsgewölbe, Osten und Westen als Puncte am Horizont unterschieden, in denen zur Zeit, da Tag und Nacht sich einander gleich sind, die Sonne genau auf- und untergeht, und von denen in der übrigen Zeit des Jahres sie doch in ihrem Auf- und Untergang nicht allzubedeutend entfernt, wohin sie nach bestimmten Zeiten wieder zurückkehrt, auf welche auch gleich der Auf- und Untergang aller Sterne bezogen werden können. Deren Verschiedenheit in Hinsicht der scheinbaren Bahn, die sie am Himmelsgewölbe durchlaufen, von dem mehreren oder mindern nördlichen oder südlichen Abstand abhängig ist, den sie von jenen Puncten bei ihrem eignen Auf- und Untergang haben. Nachdem nun nach einmal am Himmel feste Puncte zur Vergleichung gefunden waren, konnte es, indem man, wenn auch mit noch rohen Meßinstrumenten, die scheinbare Höhe eines Sterns am Himmel von verschiedenen Orten aus maß, der Beobachtung nicht entgehen, daß hierbei Differenzen zeigten, die nur in Anerkennung der gewölbten Form der Erdoberfläche erklärlich wurden.

Ungeachtet daher über die eigentliche Form der Erde auch unter den ältesten Weisen Griechenlands sehr verschiedenartige Ansichten herrschten<sup>14</sup>; so gewann die, daß diese Form die einer Kugel sei, doch bald ein entschiedenes Uebergewicht und war zur Zeit der höhern Bildung der Griechischen Cultur die allgemein verbreitete. Aristoteles

<sup>14</sup>) Ptolemaeus gab der Erde die Gestalt einer Walze, welche Ansicht späterhin mehrere Kirchenväter durch ihre Autorität unterstützten; Demokrit gab ihr die Figur eines Kohnes, welche Vorstellung auch die Chaldäer von ihr sich machten. Vgl. Riccioli almagest. nov. T. I. 1, 2. c. 1. <sup>15</sup>) in seiner Cosmologia l. 2. c. 15.



an er die Meinung mehrerer Philosophen, welche der Erde eine Kugelform beilegen, widerlegt hat, stützt sich in seiner Behauptung, daß selbige rund sei, vornehmlich darauf: daß man in Egypten Sterne sieht, welche man in Griechenland nicht sieht, und daß im Norden viele beständig über dem Horizonte sind, im südlichen Ländern untergehen, und bestimmt, (wahrscheinlich) Messungen von Anaximander, der zuerst die Erde, so wie zu jener Zeit bekannt war, auf einem Globus verzeichnete<sup>16</sup>), den Umfang der Erdkugel zu 400,000 Stadien. Diese Angabe würde mit den nach neuern Messungen gefundenen nicht bedeutend abweichen, wenn man darunter Egyptische Stadien verstehen könnte; Olympischen Stadien aber, welche hier vorauszusetzen sind, würde die Angabe um die Hälfte zu hoch seyn<sup>17</sup>. Indessen beweist es, wie man schon zu jener Zeit nach dem Himmel nicht nur die Kugelform der Erde, sondern auch den Umfang eines ihrer größten Kreise, und darnach ihre Größe überhaupt zu ermessen versucht

Die Bestimmungen konnten aber nicht eher die erforderliche Genauigkeit erhalten, um ein völlig genügendes Resultat zu geben, bis astronomischen Meßinstrumente selbst diejenige Vollkommenheit erreichten, welche ihnen erst in den letzten Jahrhunderten zu Theil

Das Verfahren bei diesen Messungen ist nun im wesentlichen fol-

Da der Meridian, oder ein jeder größter ideeller Bogen am Himmel, als die Hälfte eines Kreises, nach derselben Eintheilung, wie Mathematiker alle Cirkel zu theilen gewohnt sind, in 180 Grade betrachtet wird; so kommt es darauf an, die Distanzen zweier Orte auf der Erdoberfläche zu finden, von denen aus ein Punkt am Himmel um einen Grad, oder eine Zahl jener Grade von einander verschieden erscheint. Wenn z. B. ein Stern, während seiner Culmination beobachtet, von einem andern Ort aus unter demselben Azimut ebenfalls culminirend, aber um 1 Grad höher oder tiefer, als vom Scheitelpunkte näher oder entfernter erscheint; so ist die Distanz beider Standorte eben so als  $\frac{1}{360}$  des ganzen Erdumkreises, als der bemerkte Gradunterschied am Himmel  $\frac{1}{180}$  eines Kreises ist, dieß nämlich unter der Voraussetzung, daß die Erde eine vollkommenere Kugel sei, und übrigenz alle Umstände gleich sind, wie auf den Calcul einfließenden Differenzen, (wie die der Strahlung,) nicht außer Acht gelassen worden sind. Es darf also die gefundene Distanz beider Standorte mit 360 multiplicirt werden, um den Betrag des Erdumkreises zu erhalten.

Die erste neuere Messung, die den Anforderungen einigermaßen genügte, nachher zur Grundlage der Berechnung der Größe der Erde gegeben worden ist, ist die von Picard<sup>18</sup> im 17ten Jahrhundert. Er maß einen Meridiangrad von Paris bis Amiens, und fand ihn an 57,060 Toisen. Allein mehrere Beobachtungen zu eben

nach Diogenes Laertius (vit. phil. 1. 2. c. 1.)

17) Man rechne 75 Egyptische und 40 olympische Stadien auf die geographische Meile. 18) E. Mesure de la terre par M. Picard, à Paris 1671, 8.

der Zeit, von denen in der Folge die Rede seyn wird, begründet Zweifel, daß die Kugelgestalt, (auch abgesehen von den Ungleichheiten, welche Berge und Thäler machen,) eine vollkommene sei. Erlangte hierüber einige nähere Kenntniß, indem man in großen Entfernungen nördlich und südlich Grade abmaß. So fand sich den Messungen von drei Graden unter dem Aequator in der Gegend Quito, welche von den Französischen Mathematikern Bouguer de la Condamine mit Beihülfe des Spaniers de Ulloa veranstaltet wurden, daß ein Grad hier nach einer Mittelzahl 56,753 Toisen bei Tornea unter dem arctischen Polarcirkel aber ein von Maupertuis mit andern Franzosen und dem Schweden Celsius abgemessener Grad 57,423½ Toisen betrug, woraus sich eine Abplattung der Erde nach Norden zu ergab<sup>19</sup>. Ungeachtet nun genaue Messungen auf der südlichen Hemisphäre der Erdoberfläche noch fehlen, und mit Bestimmtheit vorauszusetzen ist, daß die südliche Erdhälfte mit nördlichen ganz einerlei Gestalt habe<sup>20</sup>; so sind doch obige Messungen zur Grundlage der Bestimmungen der Größe der Erde genommen worden, indem die etwanigen Differenzen nicht erheblich seyn können. Es wird also hiernach der Erdkörper nicht sowohl als eine Kugel, vielmehr als ein elliptischer Sphäroid betrachtet, dessen größerer Durchmesser durch den Aequator, (wo er bei seiner Umdrehung in der Folge gedacht werden wird, den größten Umschwung bildet, dessen kürzerer aber durch die Pole, (den ideellen fixen Punkten bei der Kugeldrehung,) geht. Indessen sind die Differenzen beider Durchmesser nicht allzubedeutend, und obgleich die eigentlichen Bestimmungen der Mathematiker hierüber abweichen<sup>21</sup>; so kann doch aus dem Complexus der Gradmessungen in England, Frankreich und Norwegen das wahrscheinliche Verhältniß des Aequatordurchmessers zum Polardurchmesser wie 310 zu 309 annehmen<sup>22</sup>.

Nach dieser Grundlage würde der Erdquadrant, (der Viertelkreis von einem Punkt des Aequators bis zum Pol, 5,130,740 Toisen oder ein mittlerer Grad 57,008 Toisen betragen, wovon  $\frac{1}{7}$  gewöhnlich eine geographische Meile also von etwa 3800½ Toisen gerechnet wird<sup>23</sup>. Eine solche Meile (= 22,803 Pariser, oder 22,589 Rheinische Fuß,) verhält sich zu einer Deutschen wie 15 zu 17½, zu einer Fr

19) La figure de la terre déterminée par les observations des MM. de Maupertuis, Clairaut, Camus etc. à Par. 1738, 8. et la figure de la terre déterminée par les observations des MM. Bouguer et de la Condamine, à Paris 1749, 4. und andere Schriften. 20) Der auf dem Vorausbirge der guten Hoffnung unter 37° südlicher Breite gemessene Grad ist

gerade von gleicher Größe als der in Frankreich unter einer Parallele von 46° 21' nach Grise (oper. Mediol. 1783, T. III. p. 133, vgl. Zimmermann Annalen der Geographie, 1. B. S. 16,) ist das Verhältniß beider Durchmesser

= 251 : 230, nach Hube hingegen = 178 : 177, nach Astruc seiner Erchel. = 187 : 186, nach Bode 370 : 329. 22) Hier beträgt die Abplattung 10,553 Toisen. Diese sowohl, als die meisten der folgenden Zahlenbestimmungen verdankt der Vf. dem Director der Göttinger Sternwarte, Hrn. Kammerherrn von Lindenau, der die in den gewöhnlichen

Büchern enthaltenen hierhergehörigen zum Theil schwankenden Angaben nach den neuesten astronomischen Beobachtungen zu revidiren, und nöthigen Falls zu berichtigen die Güte gehabt hat. 23) Etwas größer ist das Maß einer geogr. Meile wenn man sie als  $\frac{1}{7}$  eines Aequatorialgrades rechnet und wird gewöhnlich 38 Toisen gleichgeschätzt.



man wie 15 zu 25, zu einer Englischen Seemeile wie 15 zu 20. In diesem Maßstabe wird nun der Umfang der Erde zu 5400 geographischen Meilen, der Durchmesser aber, (nach dem mathematischen Satz, daß der Cirkel zum Durchmesser sich beinahe wie 355 zu 224 verhält,) fast 1719 Meilen<sup>24</sup> gerechnet. In weiterer Berechnung (durch Multiplication der Peripherie mit dem Durchmesser,) ist der Betrag der Oberfläche der Erdoberfläche zu 9,282,152 geographischen Meilen, der cubische Gehalt der Erde aber, (durch Multiplication der vorigen Zahl mit dem sechsten Theil des Durchmessers,) etwas über 2659 Millionen Cubikmeilen<sup>25</sup>, nach noch genauer Berechnung aber, mit Berücksichtigung der sphäroidischen Bildung der Erde, etwas über 2663 Millionen Cubikmeilen<sup>26</sup>.

Die geringen Unterschiede, die in dieser Berechnung die Ungleichheit der Erdoberfläche durch Berge und Thäler veranlaßt, können in der That unbedenklich vernachlässigt werden, da, so wichtig auch diese Ungleichheit für das organische Leben der Erde ist, doch in Bezug auf den körperlichen Gehalt der Erde auch der höchste Berg, als nicht der 1900ste Theil ihres Durchmessers, so wenig ihrer runden Form Abbruch thut, als dieß auf einer Kugel von etwa sechs Fuß Durchmesser ein Sandkorn von etwa  $\frac{1}{2}$  Linie thun würde.

Man kann die Kugelform der Erde nach dem Angeführten noch auf andere Weise beweisen bedürfte; so würde solcher auf eine noch einfachere Weise daher genommen werden können, daß seit Magellan's Reise nun schon zu mehreren Malen<sup>27</sup> die ganze Erde in einer und derselben Hauptrichtung west- und ostwärts völlig umschifft worden ist, und die Polargegenden wenigstens so weit berührt worden sind, daß man auch hier die gleichmäßige runde Form bemerken konnte. Seit dieß geschehen ist denn auch jeder bekannte Ort der Welt nach seiner respectiven Lage gegen andere auf künstlichen Erdgloben, oder auf nach diesem projectirten Karten, so genau bestimmt, daß nur an wenigen noch unzugänglichen Orten, besonders in den Polargegenden, einige erhebliche Zweifel und Ungewißheiten obwalten.

Endlich erreichen auch die Beobachtungen von Sonn- und Mondfinsternissen, (auch die Verdunkelungen der Jupiterstrabanten,) die unter der Voraussetzung der Abrundung der Erde so zutreffen, nämlich 1718. 9 oder 6,532,660 Toisen im Mittel, im kleinern Durchmesser nämlich zu etwa 1716  $\frac{1}{2}$  Meilen, oder genau zu 6,522,010 Toisen, im größern aber zu etwa 1721  $\frac{1}{2}$  Meilen, oder genau zu etwa 6,543,116 Toisen. 25) 1659. 172,000 E. M. 26) 266,3543,000 E. M. 27) Von den etwa 1659maligen Umschiffungen der Erde sind folgende die merkwürdigsten: die von Magellan in den Jahren 1519 — 1522, von Drake in den J. 1577 — 1580, von Dampier in den J. 1689 — 1691, von Anson in den J. 1740 — 1744, von Byron in den J. 1764 — 1766, von Wallis und Carteret in den J. 1766 — 1769, von Bougainville in den J. 1766 — 1769, vor allen aber die drei Seereisen von Jam. Cook, die erste in den J. 1768 — 1771 mit Banks und Solander, die zweite mit den beiden Forsters in den J. 1772 — 1775, und die dritte, (auf welcher er jedoch umkommen kam) als Entdeckungseise im Ocean zwischen Amerika und Asien in den J. 1776 — 1780. Seitdem die verunglückte Seereise von La Perouse in den J. 1783 — 1783 und die Weltumsegelungen von Merchand in den J. 1790 — 1792, von Krusenstern mit Langsdorff, Illiesius u. m. in den J. 1803 — 1806, und neuerdings die noch unendliche von Rogebue seit dem J. 1815.

und ganz oder theilweise bemerkbar seyn können, zur Bestätigung selbst, ja es stellt sich bei Mondfinsternissen der Erdschatten im M augenscheinlich als ein runder dar, welches wenigstens gleichmäßig der Fall seyn würde, wenn ihre Form eine andere die einer Kugel, oder doch eines von der Kugelform nur wenig abweichenden Körpers war.

II. Die Erde in ihren allgemeinen cosmischen Verhältnissen.

Die Erde ist ein integrierender Theil desjenigen Sonnensystems, dem allein uns, als einer Verbindung eines Solarkörpers mit planetarischen Weltkörpern, eine Kenntniß zusteht. Wir sehen zwar Tausenden von leuchtenden Sternen am nächtlichen Himmel, denen gleiche Natur wie der Sonne, die der Erde ihren Tag verleiht, messen dürfen; ja sie erscheinen uns auch wohl selbst aus unermesslicher Ferne her in Gruppen zusammenverbunden, die auch ein Ordnungsprincip unter ihnen voraussetzen lassen; aber wegen ihrer unermesslichen Entfernung sind uns die etwanigen untergeordneten Weltkörper, die organisch zu ihnen gehören, durchaus unerkennbar, wir können das Daseyn dieser nur nach Analogie voraussetzen.

Die Sonne wird von Weltkörpern umgeben, die ihr eben so große als an Lichtglanz nachstehen, und die, da der letztere in Vergleich auf das Licht der Sonne ein Minimum ist, ihr als dunkle Körper entgegengesetzt sind. Diese bewegen sich um sie in ziemlich gleichmäßigen, bekannten, von der Kreisform nur wenig abweichenden, auch in sehr ungleichen Ellipsen mit weit aus einander gezogenen Brennpunkten, die selbst größtentheils noch nicht mathematisch bestimmt sind, und so als Parabeln erscheinen. Erstere Körper sind als Planeten; letztere als Cometen bekannt. Beide bilden, in Verbindung mit den, einigen dieser Planeten zugegebenen Trabanten, das Sonnensystem. S. diesen Artikel.

In diesem Sonnensystem ist aber die Erde von den der Sonne hern kleinern oder sogenannten helischen Planeten<sup>28</sup> einer ansehnlichern, und zwar des dritte in der Folgereihe, gegen die in weiteren Kreisen die Sonne umwandelnden sogenannten uranischen Planeten<sup>29</sup>, aber ein höchst geringer Theil des ganzen Sonnensystems.

Wahrscheinlich wird aber in den großen cosmischen Verhältnissen wenig als in den uns bekannten tellurischen, der Werth der Dinge nächst durch die Masse bestimmt, da bei der Unendlichkeit des Raums derjenige Raum, den ein Himmelskörper durch sein Volumen einnimmt, nicht in Betrachtung kommen kann. Wäre dieß, so würde der Werth der Erde und alles dessen, was sie erzeugt, trägt und erhält, zu nem relativen Nichts herabsinken, wie aus folgender oberflächlichen Vergleichung hervorgeht.

Der Durchmesser des Sonnenkörpers, (= über 192,070 geographische Meilen,) übertrifft den der Erde über 111 Mal<sup>30</sup>, die Oberfläche desselben, (= 115,896 Millionen Meilen,) die der Erde 12,4 Mal der cubische Gehalt, (= 3710 Billionen Cubikmeilen,) den der Erde 1,395,324 Mal. Hiernach erscheint der Erdkörper gegen

28) 29) nach Wurdach's Bezeichnung Encycl. d. Pöllnitz. 1. B. S. 430.  
Verhältniß = 111,74 : 1.



umkörper wie ein Sandkorn von etwa 1 Gran zu einer steiner-  
nugel von etwa 200 Pfund <sup>31</sup>. Die sämtlichen planetarischen  
betragen noch nicht  $\frac{1}{577}$  des Sonnenkörpers <sup>32</sup>, wovon wieder  
de weniger als  $\frac{1}{337}$  beträgt, indem die drei äußersten bekann-  
aneten unsers Sonnensystems, Jupiter, Saturn und Uranus,  
er gegen 1281 Mal, Saturn gegen 975 Mal, Uranus aber  
al größer als die Erde <sup>33</sup>), gegen die übrigen Planeten als wahre  
erscheinen.

aber der Erdplanet in dem Sonnensystem selbst kein indiffe-  
Körper sei, sondern wie die übrigen der Sonne nähern Pla-  
und überhaupt jeder in dem Sonnensystem aufgenommene  
zur Verbindung des Ganzen eine nothwendige, wenn auch  
über unsere Erkenntnißsphäre liegende Bestimmung habe, geht  
ers aus dem merkwürdigen Zahlenverhältniß hervor, in dem  
ämtlichen Planeten in ihren an sich nur wenig divergirenden  
rn, von der Sonne und von sich entfernt sind.

man nämlich von dem innersten Planetenkreis des Mer-  
aus, der als ein Planet von nur gegen  $\frac{1}{8}$ , (der Masse nach  
über  $\frac{2}{5}$ ), der Größe der Erde die Sonne in einer mittlern  
nung von etwa 9304 Halbmessern der Erde, wiewohl in einer  
eccentrischen Bahn, umkreist, die Entfernungen der Bahnen der  
n Planeten gegen einander vergleicht, und  $\frac{1}{4}$  des Abstandes des  
ers von der Sonne in der mittlern Entfernung zum Maßstab  
3; so folgen die Entfernungen der übrigen Planeten in ihren  
en von der Sonne, mit nur geringen Differenzen, in einer  
mäßigen geometrischen Proportion aufeinander, so daß a) Ven us,  
Planet von fast  $\frac{7}{10}$ , der Masse nach etwas über  $\frac{2}{5}$ , so groß  
er Erde,) drei solcher Räume, (oder sieben von der Sonne, ei-  
ch 17,386 Erdhalbmesser,) b) die Erde sechs solcher Räume,  
zehn von der Sonne, eigentlich 24,029 Erdhalbmesser,) c) Ma rs,  
 $\frac{1}{7}$ , der Masse nach über  $\frac{1}{8}$ , kleiner als die Erde,) zwölf sol-  
Räume, (oder sechzehn von der Sonne, eigentlich 36,622 Erd-  
messer,) entfernt ist. Mit diesem Planeten schließt sich die Reihe  
er Sonne in engern concentrischen Bahnen umkreisenden Pla-

In den folgenden Abstand d) von 24 solcher Räume, (oder  
Doch bloß dem Volumen, nicht der Masse nach, da die Astronomen aus den  
charkten Bewegungen der Planeten, nach den Grundsätzen der Attraction, die  
ichtigkeit des Sonnenkörpers über vier Mal geringer schätzen als die der Erde,  
nämlich  $\equiv 0.236 : 1$  32) Das Verhältniß ist  $\equiv 2558 : 1595524$ , dem Vo-  
men nach, der Masse nach hingegen betragen sie nur etwa  $\frac{1}{12}$ , nämlich in dem  
Verhältniß  $\equiv 406 : 529630$ . 33) ebenfalls nur dem Volumen nach, indem  
e Dichtigkeiten der Planeten mit ihren Entfernungen bedeutend abnehmen, wie  
es folgender Tabelle erhellt. Bestimmt man das Volumen und die Masse, ( $\equiv$   
m Product aus dem Volumen in die Dichtigkeit,) der Erde  $\equiv 1$ ; so ist das

	Volumen	die Masse
des Mercurus	0.0565	0.1627
der Venus	0.8828	0.9243
der Erde	1.0000	1.0000
des Mars	0.1586	0.1294
des Jupiters	1280.9000	308.9400
des Saturns	974.7800	93.271
des Uranus	81.2600	1.690
der Sonne selbst aber	1595524.40	329630.0

28 von der Sonne,) der bis zu Anfang des laufenden Jahrhunderts von Weltenkörpern leer zu seyn schien, (obgleich Newton bereits eine noch unentdeckten Planeten hier vermuthet hatte,) fallen die sich theil durchkreuzenden, und einander sehr nahen Bahnen der neu entdeckten kleinen Planeten, Vesta, Juno, Ceres und Pallas, (Vesta 56,738, Juno 64,185, Ceres 66,496, Pallas 66,642 Erdhalbmessweit,) als intermediäre und verbindende Glieder der gedachten und folgenden weit größern Planeten. Von diesen ist dann e) die Bahn des Jupiters, (der fast 1281, der Masse nach jedoch nur fast 30 Mal größer als die Erde ist,) 48 der gedachten Räume von der Mercurbahn, (52 von der Sonne, eigentlich 12,5050 Erdhalbmesser,) die (des fast 975, der Masse nach jedoch nur etwas über 93 Mal größeren) Saturns 96 der gedachten Räume, (100 von der Sonne, eigentlich 22,9265 Erdhalbmesser,) und g) Uranus, (der an Größe über 81 Mal, der Masse nach aber doch nur  $1\frac{52}{100}$  Mal die Erde übertrifft,) 192 derselben Räume, (196 von der Sonne, eigentlich aber 46,1071 Erdhalbmesser,) entfernt.

Nicht minder beweisend für ein organisches Verhältniß der Erde dem Sonnensystem sind die mehrern Andeutungen von Lebendigkeit und selbstständigem Charakter, die den Planeten in dem Verhältniß als sie der Sonne näher stehen, zukommen, und wodurch das Milieuverhältniß in ihrem Volumen sich zum Theil wieder ausgleicht. Dahin gehören die mehrere Lichtstärke, die raschere Bewegung, die nach den Rechnungen der Astronomen zu supponirende stärkere Dichtigkeit der der Sonne nähern Planeten, welches alles in dem gleichen Verhältniß abnimmt, als die planetarischen Körper von einander entfernt ihre Bahnen durchlaufen, von welchen Verhältnissen jedoch in Zusammenhange erst unter dem Artikel Sonnensystem die Rede seyn kann.

III. Bewegungen des Erdplaneten und die davon abhängenden Erscheinungen.

Der Erde kommt, als Weltenkörper, eben so wie allen Planeten eine zweifache Bewegung zu: 1) eine rotirende, eine Umdrehung um sich selbst, und 2) eine progressive, kreisförmige, um die Sonne herum, welche letztere sich hierdurch von der einen ihrer Hauptseiten als Centralkörper des ganzen Systems darstellt.

#### 1) Rotation der Erde.

Wie an jeder Kugel, oder jedem kugelförmigen Körper, werden auch an der Erde in ihrer Drehung, a) zwei sich entgegengesetzte Punkte, welche dabei als indifferent erscheinen, als Pole, b) eine mittlere durch den Körper von einem Pole zum andern sich erstreckende ideelle Ebene, ebenfalls bei der Bewegung als indifferent erscheinende Linie, als Aequator, sodann, c) auf der Oberfläche mehrere, nach Willkür unterschiedbare concentrische Kreise in der Richtung des Umschwunges, deren Umfang und Geschwindigkeit der Bewegung in dem Verhältniß zunimmt, als sie von den Polen entfernter sind, und d) zugleich die von beiden Polen gleichmäßig entfernte, weiteste und am schnellsten umschwingende Kreis, als Aequator, unterschieden.

In Hinsicht der Rotation der Erde sind nun besonders folgende Momente für das organische Leben derselben höchst bemerkenswerth



a) Die Pole der Erde bei ihrer Umschwingung sind in Hin- auf die Erde selbst unverrückt; mithin ist solches auch ihre und eben so auch der Aequator derselben ein unverrückter. Es dieß in nothwendigem physischen Zusammenhange mit der, wenn nur geringen Abplattung ihrer runden Form nach den Polen zu, um eine auf einer horizontalen Fläche sich rollende Kugel durch die größte Seiteneinwirkung ihre Pole und Axc, verändert, eine Scheibe auch ein durch Abplattung der Form einer Scheibe sich nähernder flacher Körper aber nur in der Richtung des größten Durchmessers sich mit Leichtigkeit fortbewegt.

bb) Die Richtung der Bewegung ist von Westen nach Osten, gegen Norden gewendet, von der linken Seite zur rechten. Die nothwendige Folge davon ist, daß alle Himmelskörper, im Gesammten dieser Bewegung, sich über die Erdoberfläche weg, von Osten nach Westen zu bewegen scheinen, oder daß in den Aequatorialgegenden der Erde alle Himmelskörper ostwärts in den Gesichtskreis treten, aufgehen, und westwärts aus demselben gelangen und untergehen, in den übrigen Erdgegenden aber ein größerer oder geringerer Theil der Himmelskörpern, nach Verhältniß der Entfernung des Standorts des Beobachters vom Aequator, nach dem einen oder andern Pol zu, zwar auch in höchstem Grade in gleicher Richtung am Himmel zu bewegen scheint, aber scheinbar um einen auf der nördlichen Erdseite als Nordpol, auf der südlichen als Südpol am Himmel unterschiedenen Punct einen kleinern oder größern Kreis beschreibt, während auf der entgegengesetzten Seite am Himmel ein gleich großer Raum, mit den auf ihm unter dem Aequator dem Auge sich darbietenden Himmelskörpern, nie in den Gesichtskreis tritt.

cc) Die Bewegung ist eine durchaus gleichmäßige, so daß derselben Schnelligkeit der Bewegung die völlige Umwälzung der Kugel immer genau in 23 Stunden 56 Minuten und etwa 4 Sekunden unserer Zeit bewirkt wird, nach welcher Periode nämlich die Erde auf jedem Punct zu jedem Himmelskörper, gegen welchen sie vorher zurückgelegten Zeit ihre Stellung im Ganzen als Weltkörper nicht merklich veränderte, in dieselbe relative Stellung zurückkehrt, die, da sie demzufolge bloß nach den Fixsternen am Himmel erscheint, dieser Zeit entspricht.

dd) Durch diese Bewegung wird nun zunächst auf der Erdoberfläche Tag- und Nachtzeit bestimmt. Während dessen, daß die eine Hälfte in dieser ihrer Umwälzung der Sonne zugewendet ist, (welche von ihrer zweiten Hauptseite als Centrankörper des ganzen Systems dadurch darstellt, daß sie demselben Licht zusendet und hierdurch als zeugendes Princip alles Leben vermittelt,) ist es auf dieser andern Hemisphäre Nacht, auf der entgegengesetzten in Schatten gestellten Tag, und da die Abgrenzung zwischen beiden Hälften, eben wegen der steten Umwendung der Erde sich unaufhörlich ändert, so hängt in jedem Augenblick die Sonne auf einigen Orten der Erde über den Gesichtskreis, oder geht auf, während sie auf andern gegenwärtigen dem Auge wieder verschwindet, und indem sie sich hier dem Gesichtskreis entzieht, untergeht. Es ist also auf der ganzen Erdoberfläche zu jeder Zeit Morgen und Abend, Tag und Nacht, und

diese Zeiten folgen sich regelmäßig und mit höchster Bestimmtheit, nach der Lage, welche die verschiedenen Orte und Gegenden auf der Erdoberfläche in der Richtung von Osten nach Westen gegen einander haben.

e) Es ist nämlich auf der Erdoberfläche, außer den Polen und dem als Aequator bezeichneten größten Kreis, von jedem außerhalb der vorgedachten Standpunct aus ein Halbkreis unterscheidbar, der von einer Pole zum andern durch den genommenen Standpunct, eben so wie an dem scheinbaren Himmelsgewölbe von den Himmelspolen durch das Zenith, hindurchgeht. Dieser Halbkreis wird der Meridian genannt. Alle Orte der Erde nun, die unter Einem Meridian liegen, haben nicht nur, wie der Name besagt, zu demselben Augenblick Mittag, d. i. die Sonne hat von ihrem Aufgang bis zu ihrem Niedergang mit ihrem Mittelpunct, wenn sie den ihm am Himmel entsprechenden Bogen durchschreitet, die Mitte ihres scheinbaren Weges, und zugleich ihre größte scheinbare Höhe erreicht, oder auch ein auf dem Meridian aufgestellter senkrechter Stab wirft auf ihn selbst im wahren Mittag seinen Schatten, während dessen er des Vormittags westlich, des Nachmittags aber östlich fällt. Eben so wie die Sonne culminiren auch zufolge des täglichen Umschwungs der Erde, alle übrigen Himmelskörper in Orten, die unter einem und demselben Meridian liegen, zu gleicher Zeit.

f) Der Meridian, der also als ein den Aequator rechtwinklig durchschneidender, um den ganzen Erdkreis herum beweglicher ideeller Halbkreis sich darstellt, und in der täglichen in der Zeit von 24 Stunden von Osten nach Westen fortrückenden Mittagszeit sich verwirklicht, gibt nun zugleich in Verbindung mit dem Aequator eine natürliche Abscheidung der Erdgegenden. Zuvörderst zerfällt darnach der Erdkörper in eine nördliche und in eine südliche Hemisphäre, die auf dem Aequator selbst sich begrenzen und in einander übergehen und wovon die erstere den Nordpol, letztere den Südpol in ihrer Mitte hat. Zur Bezeichnung der Abstände der Erdgegenden in einer oder der andern Hemisphäre aber hat man die Benennungen Breite gewählt und unterscheidet darnach eine nördliche und eine südliche Breite. Ueber jede also zieht sich die Hälfte des Meridians als ein Viertelcirkelbogen hinweg, und da jeder Cirkelbogen am einfachsten in 360 Theile oder Grade sich theilt; so werden auch jene Abstände vom Aequator nach einem oder dem andern Pol auf dem Meridian nördlich und südlich in 90 Abtheilungen oder Breitengraden, so wie jede einzelne wieder nach Minuten und Secunden, die jede sich wieder mit 60 theilen, gemessen. Wenn demnach der Umfang der Erdoberfläche (mit Vernachlässigung des gedachten Unterschiedes, welchen die Abplattung der Erde nach den Polen zu veranlaßt,) auf 5400 Meilen geschätzt wird; so kommt auf jeden Breitengrad 15 Meilen, auf jede Minute  $\frac{1}{4}$  Meile oder etwa  $\frac{1}{2}$  Stundenwegs u. s. w. Man ist aber gewohnt, die Breitengrade von dem Aequator aus nach den Polen zu zählen, so daß der erste nördliche oder südliche Breitengrad vom Aequator selbst anhebt, 15 Meilen nördlich oder südlich abwärts der zweite nördliche oder südliche anhebt, auf den Polen selbst aber der 90ste ausläuft.



gg) Wenn solcher Gestalt die Lage eines Orts auf der Erde nach Norden und Süden hin genau bestimmbar ist, so thun dasselbe die Theilungen nach geographischer Länge, d. i. die Abtheilungen, wie von einem Punct irgend eines Meridians ein anderer ost- oder westwärts entfernt ist, wobei außer Berücksichtigung gelassen ist, ob er seinem Meridian die gleiche, oder auch eine andere nördliche oder südliche Breite hat.

Die Längengrade müssen, der Form der Kugel nach, wenn sie auf dem Aequator selbst unterschieden werden, hier denen der Breite gleich sein, da der Aequator, eben so wie der über die Pole hinaus fortgezogene, und auch auf der entgegengesetzten Seite gezogene Meridian große Kreise sind. Der Natur einer sich schwingenden Kugel gemäß müssen aber die von dem Aequator entfernten Theile der Kugeloberfläche sich in dem Verhältniß in kleineren aber concentrischen Kreisen schwingen, als sie sich den Polen nähern. Diese Kreise werden nach natürlicher Bezeichnung als Parallelkreise des Aequators unterschieden. Es müssen also nothwendig die einzelnen Längengrade, oder die 360 zu machenden Abtheilungen jedes Parallelkreises auf jedem Grade der Breite von dem Aequator nach den Polen zu abnehmen. Dies geschieht aber wegen der Kugelform der Erde nicht in gleichmäßigen, sondern in wachsenden Differenzen. Mathematisch wird der Längengrad auf jedem Parallelkreise so berechnet, daß man 15 Meilen als die Größe eines Aequatorgrades mit den Cosinus der Breite multiplicirt. Wenn darnach der Parallelkreis des ersten Breitengrades etwa um 1 Meile geringern Umfang hat als auf dem Aequator, so beträgt nur etwa 5399 Meilen; so ist die Differenz vom 45sten zum 46sten Grad schon 67, oder geht von 3818 Meilen auf 3751 Meilen über, unter dem 60sten Grad reducirt er sich erst auf die Hälfte, oder auf 2700 Meilen, auf dem 90sten Grade aber läuft er in der letzten Differenz noch von 94 Meilen auf 0 aus.

Da aber auf einem geschlossenen Circle, vergleichen der Aequator mit jedem seiner Parallelkreise sind, ein jeder Punct als der erste betrachtet werden kann, und eben so gut von einem willkürlich genommenen zu den übrigen nach entgegengesetzten Richtungen fortgezählt werden kann; so ist auch auf dem Erdkörper, als Kugel, kein Meridian als der erste gegeben, und die auf dem Aequator abgetheilten Längengrade können eben so gut ostwärts als westwärts gezählt werden.

Bewöhnlich ist es jedoch, den durch die Mitte der Insel Ferro, als westlichsten der Canarischen Inseln, gehenden Meridian, der auch sehr nahe an dem westlichsten Vorgebirge von Afrika vorbeistreift, als den ersten Meridian zu betrachten, und davon die Längengrade sich um den ganzen Erdkreis herum bis wieder dahin, also bis zu dem ersten abzuführen, oder auch bis auf 180° westliche wie östliche Längengrade von da aus zu unterscheiden, so daß der 360ste Grad hier der erste westliche ist <sup>34</sup>.

Die Breitengrade werden vorzüglich durch Aufnahme der Polhöhe

34) Unter den übrigen willkürlich angenommenen ersten Meridianen ist der der Sternwarte von Greenwich in England 17° 41' östlicher Länge von Ferro, und der von Paris 20° östlicher Länge der gewöhnlichste.

am Himmel, oder Messung des Abstandes des Polarsterns in nördlichen Hemisphäre vom Scheitelpunct, (mit Berechnung seines Abstandes von dem nördlichen Himmelspol,) oder eines andern Stern dessen Stellung am Himmel bekannt ist, während seiner Culmination gemessen, die Längengrade aber durch Beobachtung von Vorgängen am Himmel, die an allen Orten auf der Erde übereinstimmend und gleichzeitig erscheinen, wie die Verfinsterungen der Jupiterstrahlent oder auch Mondfinsternissen, in gleichen Sternbedeckungen mit Berechnungen auf einen gewissen Stand und Vergleichung der Mittagshöhen oder darnach gestellten Uhren; oder völlig übereinstimmende Uhren, (Chronometer,) und Bemerkung, zu welchen Zeiten der wahre Mittag, oder sonstige Culminationen von Sternen am Himmel in einem solchen Chronometer eintreten, mit Vergleichung der daraus bekannten Zeit eines andern Ortes.

## 2) Umlauf der Erde um die Sonne.

So wie alle Planeten in bestimmten elliptischen Bahnen von geringer Excentricität, in derselben Hauptrichtung wie der Sonnenkörper selbst sich dreht oder rotirt, nämlich von Osten nach Westen mit einer Geschwindigkeit, die den Entfernungen derselben von Sonne proportionirt ist, und, wenn wir relative Dichtigkeiten verschiedenen Planeten voraussetzen, genau mit den physischen Gesetzen der Schwere, der Centripetal- und Centrifugalkraft übereinstimmt, sich regelmäßig um die Sonne herumbewegen; so ist auch bei der Erde dies der Fall, wodurch sie also insbesondere mit der Sonne in dasjenige organische Verhältniß tritt, in dem allein sie ihr Bestehen hat. Dieses Verhältniß gründet sich aber zunächst darauf, daß ihr eignes inneres Leben, durch das von der Sonne ausstrahlende Licht, welches wahrscheinlich zugleich der Träger allgemeiner belebenden Kräfte ist, angeregt wird.

Damit dieses aber gerade so, wie es geschieht, auf die Erde einwirken mußte, müßte sie in einem gemessenen Abstand von der Sonne kommen und sich auch wenigstens innerhalb gewisser Grenzen in diesem ertönen, welches letztere ihr aber bloß, wie jedem Planeten, dadurch möglich wurde, daß die Erde die Sonne umkreist. Die erste und allgemeinste cosmische Kraft ist Attraction, (s. dieß Wort,) durch welche zunächst Weltenmassen nicht nur sich bilden, sondern auch in entfernten Räumen zu einander zu gelangen streben. Würde nun auch diese Kraft allein im Universum walten, so würden alle jetzt als einzeln unterschiedene Weltenmassen in eine einzige zusammentreten und würde also auch unsere Sonne alle Planeten an sich ziehen, und mit ihnen ihre eigne Masse vergrößern. Dieses ist auf einfache Art dadurch verhütet, daß die untergeordneten, an Masse und Volumen den Hauptkörper weit nachstehenden Weltenkörper jenen mit einer Geschwindigkeit umkreisen, die dem Moment der Attraction in der Entfernung welche jeder einzelner von dem Hauptkörper hat, genau proportionirt ist. (Vgl. den Artikel Centralkräfte.) Auf solche Weise sind die Planetenbewegungen, und also auch der Umlauf der Erde um die Sonne wissenschaftlich erklärbar.

Es kann streng mathematisch erwiesen werden, wienach es kommen muß, daß die Erde auf dieser Bahn, so wenig wie irgend ein Pla-



oder seinigen in die Sonne fälle; aber auch nicht von derselben in den Himmelsraum hinausgeschleudert werde, wie also die Zentrifugalkraft immer die Centripetalkraft so beschränke, daß die Umrundung der Erde in der elliptischen Bahn die notwendige Folge davon ist; indessen ist der erste Impuls, den die Erde seitdem erhielt, um in jene Bahn zu gelangen, aus mathematischen und bekannten physischen Gründen nicht zu deduciren, so wenig aber irgend eine andere organische Bewegung, und wir müssen uns begnügen, die ihr von dem Moment ihrer Entstehung an ertheilte Umlaufbewegung als einen Theil ihrer organischen Natur, wie bei jeder Menge anderer aus keinem höhern Gesetze als dem der Zweckmäßigkeit abzuleitenden organischen Bewegungen anzuerkennen.

Die Hauptmomente nun, die in Hinsicht des Kreislaufs der Erde um die Sonne zu beachten sind, sind folgende:

a) Aus astronomischen Beobachtungen ist außer allem Zweifel gesetzt, daß die Erde in einem Zeitraum von 365 Tagen 6 Stunden 9 Minuten und etwa 11 Secunden wahrer Zeit eine Bahn um die Sonne durchläufe, welche insbesondere nach den auf die Beobachtung der Durchgänge der Venus durch die Sonne in den Jahren 1671 und 1769, (woraus sich die mittlere horizontale Sonnenparallaxe von  $8\frac{1}{2}''$  ergibt,) sich gründenden Rectificationen, wenn man die Bahn als Kreis berechnet, 129,681,100 geographische Meilen beträgt. Die Schnelligkeit dieser Bewegung sowohl, als der unermessliche Raum, den jeder Erdenbürger jährlich auf dieser Reise macht, müssen befremden, so lange man sich noch nicht entwöhnt hat, Größernach bloß von der Erde selbst entnommenen Maßstäben zu urtheilen. Man berechnet, daß eine abgeschossene Kanonenkugel, mit einer gewöhnlichen Geschwindigkeit von 600 Fuß auf die erste Secunde ihres Flugs, wenn diese Geschwindigkeit dieselbe blieb, von der Sonne um die Erde gesendet, den Abstand der Erde von der Sonne, (über 1000 Erdballdurchmesser,) erst nach 25 Jahren durchlaufen würde. Obgleich wohl durchfliegt die Erde mit allem, was auf ihr ist, nicht in gerader Linie, sondern in einem halben Cirkelbogen, das Doppelte dieses Raumes in halbjähriger Frist. Der Weg, welchen sie in jeder Stunde zurücklegt, beträgt  $4\frac{1}{2}$  Meile, täglich 355,000 Meilen.

b) Daß diese Kreisbewegung der Erde um die Sonne Statt findet, ist aus einfachen Beobachtungen am Himmel nicht zu erkennen, aus denen bloß eine relative Veränderung der Stellung der Erde und der Sonne gegen einander erhellt. Sobald man nämlich Beobachtungen am Himmel anzustellen anhub, konnte es den Beobachtern auch in einem Zeitraum weniger Tage nicht entgehen, daß die Sonne nicht jeden Tag in der Nähe derselben Sterne auf- und untergeht, oder daß die Sterne, die nach Sonnenuntergang auf der Westseite sichtbar werden, eben so wenig als die, die vor Sonnenaufgang auf der Ostseite nach zuletzt sichtbar waren, immer dieselben sind, daß überhaupt der ganze Sternenhimmel in der Folge mehrerer Nächte einander allmählig sein ganzes Ansehen verändert, daß Sterne, die vorher erblickt wurden, nicht mehr, oder zu andern Nachtzeiten, dagegen andere, die vorher, oder doch zur selbigen Zeit nicht bemerkt worden

c) genau 11" 4."

waren, später sichtbar werden. Diese Beobachtungen konnten so lange fortgesetzt werden, ohne zu dem Resultat zu führen: daß Sonne scheinbar, innerhalb einer gewissen Periode, am Sternenhimmel in der Richtung von Westen nach Osten einen Kreis durchläuft, da man bald auch fand, daß der Mond, wie gewisse unterschiedene Wandelsterne, ihre Stellung nur in der Nähe jenes Kreises verändern, so weit jene Veränderungen der Stellung seitwärts Statt haben, ein 12 Grade breiter Kreis unterschieden, und weil man die unänderlich ihre Stelle darin behauptenden Sterne darin in Configurationen zusammenstellte, wovon die Bilder größtentheils von Ägypten hergenommen waren, als den Thierkreis, oder den Zodiac bezeichnete.

c) Sehr bald brachte man mit diesen Beobachtungen am Sternhimmel auch die Verschiedenheit des Sonnenstandes während der täglichen scheinbaren Bewegung der Sonne von Osten nach Westen, den davon abhängigen Wechsel der Jahreszeiten in Verbindung, und man theilte das Jahr nach den zwölf Zeichen, oder Theilungen des Thierkreises ein, indem man unterschied, daß während jeder der vier Jahreszeiten die Sonne auf ihrer scheinbaren Bahn auch drei solche Zeichen durchwanderte, nach einer Jahreszeit aber wieder auf derselben Stelle im Thierkreis auf- und unterging, wie ein Jahr früher beobachtet worden war. Diese zwölf Himmelszeichen oder Sternbilder erhielten schon in den ältesten Zeiten die jetzt üblichen Namen: Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Scorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische. Der Anfang, oder der erste Theil des Widders und der Waage fielen in den ältern Zeiten, von denen wir sichere Beobachtungen haben, in den Aequator. Jedes Zeichen erhielt 30° zu seiner Begrenzung, und sie folgen sich in angegebenen Ordnung, in der Richtung von Westen nach Osten.

d) In der Richtung dieses Zodiacus, dessen Mitte oder eigentliche Sonnenbahn den besondern Namen Ecliptik erhielt<sup>36)</sup>, vorzüglich von je die Abweichung bemerkungswürdig, welche sie im Vergleich mit der Richtung des Aequators zeigt, indem die Ecliptik wie nach neuern und auf unsere Zeit gültigen Messungen sich gegen den Aequator in einem Winkel von fast 23½° durchschneidet. Nun die Erde ihren täglichen Umschwung in der Richtung des Aequators hat, so folgt aus ihrer Kugelform, daß die Sonne am Himmel unter dem Aequator auch nur dann, wenn die Sonne eben in der Ecliptik auf den Durchschnittspuncten selbst ihren Stand hat, von Ost zum Westpunct, Mittags über den Scheitelpunct am Himmel ihren Fortgang nehme, in der übrigen Jahreszeit aber allmählich bis zur angegebenen Entfernung in nördlicher oder südlicher Breite auch am Himmel vom Scheitelpunct abweichend in einem Bogen bewege, dann wieder zurückkehre, den Scheitelpunct beim andern Durchschnittspunct wieder durchschreite, um auf der entgegengesetzten Seite dieselbe Abweichung zu zeigen, und nun auch von da zu

36) von *εκλιντικῆ*, verdunkeln, weil Sonnen- und Mondfinsternisse nur da eintreten, wenn auch der Mond so in seinem Kreise sie durchschneidet, daß entweder seinen Schatten auf die Erde wirft, oder selbst in den Erdschatten tritt.



Punct, von dem nach der Voraussetzung diese Beobachtung anzurückkehren muß. Da die frühesten Beobachtungen aber nicht dem Aequator, sondern in der nördlichen Hemisphäre geschahen, so konnte man diese Beobachtung nur auf die Weise machen, wie Sonne in einem am Meridian abzumessenden Räume von doppeltem Betrag von  $23\frac{1}{2}^{\circ}$  oder von  $47^{\circ}$ , in einer Hälfte des Kreis von ihrem tiefsten Stande am mittäglichen Himmel allmählich höher aufsteigt, zugleich zeitiger sich über den Horizont erhebt, aufgeht, und später sich wieder unter ihm hinabsenkt oder untergeht, in der andern Hälfte aber auf gleiche Weise von ihrem höchsten Stande zu ihrem tiefsten, mit Verspätung ihres Aufgangs und ihrem Eintreten ihres Untergangs, wieder zurückkehrt, von welchem Winkel und verschiedenem Stand der Sonne am Himmel bekannt: die Sommer- und Winterzeit und Frühling und Herbst als Uebergangszeiten abhängen.

1) Wie hoch aber die Sonne hiernach, nach Verschiedenheit des Standorts auf der Erde, im Sommer am Himmel heraufsteigt, und wie sehr dadurch sich die Tage verlängern, wie weit gegenseitig sie zur Winterzeit wieder hinabsenkt, und die Tage sich verkürzen, ist von der Polhöhe ab, welche der Ort der Beobachtung hat. In dieser Hinsicht aber, wurden auch schon früh, sobald man über die Kugelform der Erde nicht mehr in Zweifel war, besondere Erdzonen als Zonen unterschieden, und insbesondere

a) eine mittlere, von der Intensität der Sonnenstrahlen als die heiße Zone, vom Aequator, nördlich und südlich bis  $23\frac{1}{2}$  Grad, oder überhaupt von  $47$  Breitengraden,

b) zwei temperirte, eine in jeder Hemisphäre, vom  $23\frac{1}{2}$  bis  $66\frac{1}{2}^{\circ}$  nach den Polen zu, und

c) zwei kalte, oder Polarzonen, der Raum von jedem Pole bis  $66\frac{1}{2}$  Breitengrade unterschieden.

1) Ungeachtet man in der ältern Zeit, so lange die Schiffahrt sich auf die Beschränkung des Meeres in der Nähe der Küsten beschränkte, man von diesen Zonen nur die nördliche gemäßigte kannte, von Osten und Süden nur unsichere und unverbürgte Nachrichten hatte; wurden doch, meist nach mathematischer Bestimmung, der heißen Zone darnach ihre Grenzen gesetzt: daß die Tages- und Nachtlänge wohl wegen geringer Abweichung der Erdkrümmung von der Aequalfäche nur unerheblichem Wechsel unterworfen ist, daß die Sonne wohl den Bewohnern jährlich zwei Mal Mittags über dem Scheitelpunct steht, in der einen Hälfte des Jahres, (in der Mitte in gleichen Zeiten, nach den Grenzen zu aber im Verhältniß der Nähe Begrenzung in ungleichen Zeiträumen;) die Schatten nordwärts, der zweiten aber südwärts wirft; die temperirten Zonen erhielt darnach ihre Grenzen, daß in jeder die Sonne auch in ihrem höchsten Stande Mittags den Scheitelpunct nicht erreicht, und nur in dem Verhältniß sich nähert, als ein Standort der heißen Zone nahe liegt, in ihrem niedrigsten Stande aber sich doch auch wenigstens etwas über den Horizont erhebt, wiewohl immer um so geringer; je näher der Standort der kalten Zone ist, daß dabei der Winkel der Tages- und Nachtlänge in dem Verhältniß nach der

Grenze der kalten Zone hin zunimmt, daß hier im höchsten Sonnenstande kaum eine bemerkbare Zeit Nachtzeit ist, (die hier auch nur in Dämmerung besteht,) im tiefsten Sonnenstande aber eine eben so große Zeit Tageszeit ist, (wenn man nämlich die Dämmerung bei nur geringer Senkung der Sonne unter den Horizont zur Nachtzeit rechnet,) daß zugleich die Sonne zu aller Zeit des Jahres in der nördlichen Zone ihre Schatten in den zwölf Tagesstunden südlich, in der südlichen Zone aber nördlich wirft; die kalten Zonen endlich wurden nach bestimmt, daß in dem Verhältniß, als der Standort sich von den Polen nähert, die Sonne in einem mindern, oder größern Theile der einen ganzen Jahreshälfte, während der Sommerszeit, nicht unter den Horizont gelangt, in der entgegengesetzten aber gleichem Verhältniß während der Winterszeit gar nicht über den Horizont sich erhebt, die Tageslänge aber von der Zeit, wo die Sonne auf ihrer Bahn den Aequator durchschneidet, oder den genannten Tages- und Nachtgleichen, wo auf der ganzen Erde die Sonne eben so lange über als unter dem Horizont ist, bis zu der Periode, wo die Sonne gar nicht wieder untergeht, und ein in der Nähe der Pole Monate langer Tag ist, täglich rasch zunimmt, gesetzmäßig aber auch von da an bis zu der Periode, wo sie gar nicht wieder aufgeht, und eben so in den höhern Polargegenden Monate lang Nacht ist, eben so rasch wieder abnimmt. Vgl. übrigens Artikel Klima.

Die Paralleltreise, welche die heiße Zone in sich schließt, wie auch als die Wendekreise, (Circuli tropici,) und zwar der nördliche als der Wendekreis des Krebses, der südliche als der Wendekreis des Steinbocks, die Paralleltreise aber, welche die kalte Zone oder die Polargegenden einschließt, als die Polarkreise bezeichnet.

g) Daß nun aber diese gedachten Phänomene am Himmel von einer Bewegung der Sonne um die Erde, wie der Anschein früherer Beobachter glauben ließ, sondern gegenseitig von einer Bewegung der Erde um die Sonne in entgegengesetzter Richtung rühre, wozu seit des Copernicus Zeiten kein Sachkundiger zweifelt, ist nicht nur daraus abzuleiten, daß die übrigen Planeten alle, in deren Reihe die Erde einen bestimmten Platz einnimmt, evident um die Sonne, als einen ihnen an Masse, Volumen und Umlaufzeit bei weitem überlegenen Centralkörper, bewegen, und schwertlich das Princip, (das in der Newtonschen Attractionstheorie sich so offenbart, wenn die Sonne in das Centrum der sammelnden Planeten versetzt wird,) aufgefunden werden dürfte, das erklärlich macht, die an sich so kleine Erde zu so einem Supremat über die andern, das ihr insbesondere nach dem erkünstelten Systeme des Tycho Brahe verliehen ist. (Vgl. den Artikel Astronomie.) Auch einen directen Beweis der Erdbewegung um die Sonne haben die Astronomen der neuern Zeit, insbesondere Bradley in den Beobachtungen über die Aberration des Lichts gefunden. Nach wiederholten scharfen Beobachtungen scheinen nämlich alle Fixsterne in dem Laufe eines Jahres eine kleine Ellipse um einen Mittelpunkt am Sternenhimmel zu beschreiben, welches Phä-



abließ in den besonders von Beobachtungen von Verfinsterungen der Mercurmonde abstrahirten Gesetzen der Geschwindigkeit der Lichtfortsetzung, in Verbindung mit denen der Erdbewegung um die Sonne, Erklärung findet. Vgl. Licht.

ii) Die Schiefe der Ecliptik, oder der Erdbahn gegen den Aequator, die Verschiedenheit der Richtung ihrer Kreisbewegung um die Sonne und ihres eignen Umschwungs, hängt mit höhern cosmischen Gesetzen zusammen. Bei allen Planeten, deren eigne Rotation bekannt ist, wird die Richtung dieser oder ihr Aequator auch von ihrer Bahn in einem mehr oder minder großen Winkel durchschnitten; und weichen sie alle nicht allzu weit von einander, und von der Richtung des Sonnenaquators ab, die mit der Erdbahn einen Winkel von  $70^{\circ} 29'$  macht. Diese Winkel scheinen insbesondere von der gewöhnlichen Attraction der Planeten abhängig zu seyn, und sind daher auch einer, wiewohl nur langsamen, Veränderung unterworfen. Von der Erdbahn wenigstens weiß man, daß ihr Winkel mit dem Aequator ein veränderlicher ist. Ungefähr 1100 Jahr vor unserer Rechnung wurde nach Chinesischen Beobachtungen, der Winkel der Ecliptik gegen den Aequator  $23^{\circ} 54'$  gefunden. Jetzt beträgt er  $26'$  weniger.<sup>37</sup> Man schreibt solches besonders der gemeinschaftlichen Einwirkung der Venus und des Jupiters zu, von denen die Erde wegen ihrer wirklichen Erdnähe, letzterer aber wegen seiner überwiegenden Größe hauptsächlich Einfluß auf die Bewegung der Erde erhält. Würde diese Abnahme der Schiefe der Ecliptik immer fort dauern; so würde endlich, (nach etwa 148,000 Jahren,) dieselbe mit dem Aequator ganz zusammenfallen, und dann gar kein, wie lange vorher nur ein geringer, Wechsel der Jahreszeiten mehr auf der Erde seyn. Doch haben die Astronomen Ursache zu vermuten, daß diese Schiefe nicht so sehr bedeutend ferner abnehmen, sondern aber wieder zunehmen werde.<sup>38</sup>

iii) Mit dieser Erscheinung steht eine andere in Verbindung, welche die Astronomen das Vorrücken der Nachtgleichen benennen. Die Schnittpuncte der Ecliptik und des Aequators sind nämlich nicht jährlich genau dieselben, sondern rücken nach der Ordnung der Zeit von Westen nach Osten weiter. Diese Veränderung ist nun seit langer Zeit, als genaue Beobachtungen am Himmel angestellt werden, sehr merklich geworden. Vor ungefähr 2200 Jahren fiel die Vernalnachtsgleiche in den ersten Punct des Widders, oder die Sonne stand sich zur Zeit des Frühlingsanfangs bei dem ersten Sterne des genannten Sternbildes. Jetzt entspricht aber schon die Stelle, die man jetzt immer in Bezug auf die Erdbahn als Widder bezeichnet, dem Sternbild der Fische, oder dem letzten Gestirn des Zodiacus, welches aber eigentlich das nächste des Widders ist. Eben so weichen den ganzen Zodiacus hindurch die Sternbilder, nach denen die Ecliptik früher in 12 Theile eingetheilt erhielt, um noch etwas mehr als ein ganzes Sternbild ab, so daß an den Sonnenwendepuncten der des Krebses in das

37) Den 1sten Januar 1815 ward sie  $= 23^{\circ} 27' 48''$  gefunden, die jährliche Abnahme wird  $= 0'' 45$  geschätzt. 38) Ungeachtet es gewiß ist, daß die Abnahme und Zunahme der Schiefe der Ecliptik ihre Grenzen hat; so gibt doch die Theorie über die Periode dieser Grenzen keine feste Bestimmung.

Sternbild der Zwillinge, der des Steinbocks in das Sternbild des Stiers fällt, so wie auch der Herbstäquinotialpunkt in dem Sternbild Schützen gesucht werden muß. Diese scheinbare Fortrückung sammt der, den Zodiacus bildender Gestirne und mit ihnen eine scheinbare Drehung der Pole der Ecliptik mit dem ganzen Sternenheer um Aequatorialpole am Himmel von Westen nach Osten beträgt jährlich gegen  $50\frac{1}{2}$  Secunden<sup>39)</sup> oder etwa nach 72 Jahren einen Grad, daß zu gänzlicher Beendigung des Cyclus ein Zeitraum von fast 26 oder etwa 25,791 Jahren erforderlich ist, während dessen die Durchschnittspuncte der Ecliptik und des Aequators alle Zeichen des Zodiacus in der angegebenen Ordnung durchlaufen werden. Diese Veränderung hat auf den relativen Sonnenstand gegen die Erde keinen Einfluß, sondern bloß auf den Stand der sammtlichen Fixsterne gegen den Aequator und also auch gegen jeden Standort der Erde, die hier allmählig dem Aequatorialkreis am Himmel theils näher rückt, theils sich davon entfernen, wodurch auch der jetzige Polarstern noch eine Zeit lang, (bis zum Jahr 2102,) sich dem Himmel noch mehr wie jetzt nähern, dann aber allmählig so entfernen wird, daß er andern Sternen, die jedoch immer mit ihm von dem Pol der Ecliptik gleichen Abstand haben, und die dann jenem wahren Pol näher kommen werden, nachstehen wird, welche dann nach und nach zur ungefähren Andeutung des nördlichen Himmelspols dienen werden. Etwas jedoch wird die Schiefe der Ecliptik periodisch dadurch vermehrt oder vermindert, daß wegen Einwirkung der Sonne und des Mondes, vorzüglich des letztern auf die gewölbtere Erdmasse in den Aequatorialgegenden, vermöge der Attractionsgesetze, während der Periode in der die Durchschnittspuncte der Mondebahn ebenfalls die Ecliptik durchlaufen, oder in etwa 18 Jahren und 7 Monaten, Aequator auf dieser Stelle etwas mehr nach der Ecliptik zu gezogen wird. Das daraus entstehende Phänomen am Himmel ist unter dem Namen das Schwancken der Erdaxe bekannt. Die Neigung der Ecliptik gegen den Aequator wächst hierdurch die Hälfte jener über, oder etwas über neun Jahr lang, und verringert sich dann in der zweiten Hälfte hierdurch wieder um eben so viel. Die ganze Differenz beträgt aber nur gegen  $18''$ , oder es beschreibt der wahre Pol der Erde nur einen Punkt, den man als den mittlern Ort des Pols ansehen kann, eine kleine Ellipse, deren größter Durchmesser gegen  $18''$  beträgt. Eben um desswillen ist aber auch das Vorrücken der Nachtgleichen bald größer, bald kleiner, von 58 bis 43 in einem Jahr, wovon also die mittlere Zahl auf etwa  $50\frac{1}{2}$  geschätzt werden kann. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß diese Veränderung auch in dem Umlaufzustand der Erde eine Periodicität begründe, die nur wegen der vielseitigen Momente, die nebst denselben daran directen Einfluß haben, schwer bemerkbar wird.

k) So wie die Sonne in keiner der Planetenbahnen genau in der Mitte einnimmt, indem alle Planeten in mäßigen Ellipsen die Sonne umkreisen; so ist dieß auch in Hinsicht der Erdbahn der Fall. D

39) Dieses Vorrücken betrug im Jahre 1800  $\approx 50''$  1892. Es nimmt jährlich um  $0'' 000244$  zu; allein auch über die Grenzen dieser Veränderung keine feste Bestimmung vorhanden.



Excentricität der Erdbahn hat aber auf den Umlauf der Erde die Sonne unterschiedliche Einwirkungen. Vermöge derselben ist die Erde auf einem Punkte ihrer Bahn der Sonne am nächsten, auf dem entgegengesetzten am entferntesten von ihr. Wenn man die mittelmäßigen Entfernung der Erde von der Sonne  $= 1$  setzt; so beträgt in der Thattheilen die größte Entfernung 1.01677976, die Excentricität 0.016779, die kleinste Entfernung 0.98322024, wornach also die Erde zur Zeit ihrer Sonnennähe, oder ihres Periheliums nach Berechnung 20,297,860 Meilen, zur Zeit ihrer Sonnenferne, oder Apheliums aber 20,990,400 Meilen von dem Mittelpunkt der Sonne entfernt ist, ihr also dort um 692,540 Meilen näher kommt, als um so viel von ihr weiter absteht. Die Zeiten, wo beides der Fall ist, sind astronomisch genau bestimmbar. Das Perihelium der Erde fällt jährlich in gegenwärtiger Zeit, dem Ort am Himmelsglobus nach, bei  $9^{\circ} 30'$  des Steinbocks, der Zeit nach entspricht es dem 30sten Januar; das Aphelium derselben dagegen fällt dem Ort nach in  $21^{\circ} 30'$  des Krebses, und entspricht der Zeit nach dem 1ten Juli. Dieses hat denn für das organische Leben die wichtige Folge, daß die Winterkälte der nördlichen Hemisphäre der Erde, da die Mitte der Winterzeit ziemlich mit obigem Tage zusammenfällt, durch die Erdbahn- und Erdbnähe proportionirte Intensität des Sonnenlichts, so wie auch die Sonnenwärme auf derselben Hemisphäre aus entgegenstehenden Ursachen vermindert wird, daß aber auf der südlichen Hemisphäre der umgekehrte Fall eintritt. Wenn dieses Moment das einwirkende war, was eine Verschiedenheit der Einwirkung des Sonnenlichts auf die nördliche und südliche Erdhemisphäre begründet, so würde das natürliche Resultat dies seyn: daß der summarische Betrag der Winterkälte wie der Sommerhize auf der südlichen Hemisphäre, und der Temperaturwechsel innerhalb Jahresfrist größer seyn würde, als auf der nördlichen. Aber ein zweites, mit der Excentricität der Erdbahn in unmittelbarem Zusammenhang stehendes Moment verleiht hierbei gleich nahe Berücksichtigung. Nach dem allgemeinen Gesetze der Planetenbewegung, daß solche in dem Verhältniß größer seyn als die Planeten in größerer Ferne von dem Centralkörper ihn umkreisen, ist auch die Bewegung der Erde in einem gegebenen Zeitraume in ihrem Perihelium und in dem Verhältnisse der Nähe desselben schneller, als in ihrem Aphelium und in dessen Nähe  $4^{\circ}$ . Es ist daher auch die Erde, um diejenige Hälfte ihrer Bahn, in der die Mitte das Perihelium ist, zu durchlaufen, kürzere Zeit, als zur Durchlaufung der andern Hälfte, auf deren Mitte das Aphelium ist. Da nun in jetziger Zeitperiode der Zeitraum, wo sie auf ersterer befindet, ziemlich der Zeit, von der Herbstnachtgleiche bis zur Frühlingsnachtgleiche, oder unserm Winter, die, wo sie auf letzterer befindet, der Zeit, von der Frühlingsnachtgleiche bis zur Herbstnachtgleiche, oder unserem Sommer, entspricht; so befaßt auch erstere Periode 178 Tage 18 Tage 29 Minuten, letztere aber 186 Tage 11 Stunden 20 Minuten. Es ist also das Sommerhalbjahr auf unserer nördlichen Hemisphäre um 7 Tage 16 Stunden 51 Minuten länger. Die tägliche Bewegung der Erde ist in Perihelium  $= 61' 13''$ , in Aphelium  $57' 11''$ .

ger, als auf der südlichen. Um so viel Zeit ist auch die intensive Einwirkung des Sonnenlichts und die Verlängerung desselben in einzelnen Tagen andauernder. Der Zuwachs also, den die Winterkälte auf der südlichen Hemisphäre durch das erste Moment, der gleichzeitig mit der Winterszeit eintretenden Sonnenferne erhält, wird durch die Verlängerung der Winterszeit um etwa vier Tage über die mittlere Zeit noch erhöht. Der Zugang der Sommerwärme aber, welchen die nördliche Hemisphäre durch die dort gleichzeitige Sonnennähe erhält, wird wieder durch Verkürzung der Sommerszeit um etwa vier Tage über die mittlere verringert, woraus von dieser Seite her mit der Grund einleuchtend wird, warum die südlichen Erdgegenden im Ganzen kälter sind, als die unter gleichen Breitengraden liegenden nördlichen.

#### IV. Erdmond

Wenn den äußern oder größten Planeten unsers Sonnensystems mehrere Weltkörper eines untergeordneten Ranges zukommen, wieder sie als einen Centralkörper umkreisen, so dem Uranus sechs, dem Saturn sieben, dem Jupiter vier; so ist die Erde unter innern und kleinern Planeten der einzige, der einen solchen Gesellen in seinem Lauf beigelegt erhalten hat. Denn der Venusmond, einige Astronomen in früherer Zeit entdeckt zu haben wähnten, sich in vielfältigen, diesfalls wiederholt angestellten Untersuchungen nicht bestätigt. Sind also wirklich dergleichen vorhanden, so sind wenigstens zu klein, um für unsere astronomischen Instrumente kennbar zu werden. Eine innere Nothwendigkeit ihres Vorhandenseyns für das Bestehen der planetarischen Naturen kennen wir nicht; indessen ist doch das Daseyn des Erdenmondes in das Leben der Erde so sehr verflochten, und gewährt auch den Erdbewohnern so offenkundige Vortheile, als daß derselbe in der Darstellung des Erdorganismus ganz übergangen werden könnte.

Bei der Nähe des Mondes ist es auch den Astronomen möglich gewesen, weit mehrere genaue Bestimmungen über seinen Lauf, seine übrigen Eigenheiten zu erhalten, als von irgend einem andern Himmelskörper. In eine Menge astronomischer Bestimmungen in Hinsicht anderer Planeten sind erst Folgerungen von dem, was wir an dem Mond erkannt wurde. Hierher gehört vorzüglich folgendes:

1) Der Mond bewegt sich um die Erde in einer excentrischen Bahn von 326,187 geographischen Meilen, in einer Entfernung von der Erde, die zwischen 56,364 und 48,116 Meilen sich hält, wohnach mittlere Entfernung von der Erde 51,914 Meilen oder gegen 60 Erdhalbmesser beträgt. Die Mondbahn verhält sich zur Erdbahn  $1 : 394$  und ist kaum halb so groß, als der Umfang der Erdenkugel.

2) Diese Bahn wird von dem Mond in einer mittlern Zeit 27 Tagen 7 Stunden 43 1/4 durchlaufen, die Differenzen für längere oder kürzere Zeit betragen. Diese Bewegung ist wegen der mindern Gravitation des Mondes gegen die Erde weit langsamer, als die der andern bekannten Monde der größten Planeten, die nach Verhältniß um ihre weit voluminösern Centralkörper eine gleiche Bahn in etwa 2 bis 5 Tagen durchlaufen.

41) Excentricität des Mondes = 0.0635.



Zeitraum einer Stunde, während der der Mond zugleich mit der Lauf der Erdbahn um die Sonne herum über 14.000 Meilen läuft<sup>42</sup>, legt er in seiner eignen Bahn nur 498 Meilen, d. i. in jeder Minute etwa  $8\frac{1}{2}$  Meile zurück.

Die Größe seines Durchmessers beträgt 468 geographische Meilen, ( $\frac{3}{11}$  des Erddurchmessers,) seine Oberfläche 690.330 Meilen<sup>2</sup>, ( $\frac{1}{121}$  der Erdoberfläche,) sein cubischer Gehalt aber 9.000 Meilen<sup>3</sup>, ( $\frac{1}{47}$  des Erdgehalts.) Nach Berechnungen aber ist sich seine Dichtigkeit zu der der Erde wie  $0.717 : 1$ , und zu der der Sonne wie  $3.04 : 1$ .

Die Bahn des Mondes macht mit der Erdbahn, oder der Ekliptik, einen Winkel von  $5^{\circ} 8'$  und kann um  $9'$  sich ändern. Sie schneidet also die Erdbahn auf zwei einander entgegengesetzten Punkten, die man Knoten nennt, und der Mond befindet sich also zu einer Hälfte seines Laufs nordwärts, in der andern südwärts der Ekliptik. Der Knoten, durch den der Mond in die nördliche Hälfte seiner Bahn gelangt, wird als aufsteigender Knoten, (Nodus ascendens,) der, wodurch er in die südliche Hälfte gelangt, als absteigender Knoten, (Nodus descendens,) bezeichnet.

Da der Mond in der verhältnißmäßig kurzen Zeit seines Laufs am Himmel scheinbar eben so den ganzen Thierkreis durchwandert, als die Erde in der entgegengesetzten Bewegung der Erde die Sonne scheinbar in demselben verhältnißmäßig langen Zeitraum eines Jahres es thut; so verändert der Mond auch in sehr kurzer Zeit und sehr merklich, (ungefähr  $13^{\circ}$ ), schon täglich seinen relativen Stand gegen die Sonne, und gelangt erst nach etwa 24 Stunden 50 Minuten 28 Secunden zu dem Meridian. Da er nun, so wenig wie ein Planet, selbst ein Fixstern, ein eigenthümliches Licht, wenigstens nicht hat, daß er durch dasselbe uns am Himmel leuchtet, sondern nur durch Bescheinung der Sonne uns sichtbar ist; so sehen wir ihn auch während seines Umlaufs um die Erde auch a) indem er zwischen der Erde und der Sonne steht, (in der Conjunction,) gar nicht, b) in der ersten Hälfte seiner Bewegung, im Verhältniß als er dem aufsteigenden Punkt nahe kommt, an der Westseite Anfangs nur als ein schwach scheinendes Licht, dann bei Vollendung des ersten Viertels der Bahn halb, späterhin nach und nach auch auf der bisher dunkel gebliebenen Hälfte erleuchtet, (sobald c) wenn die Erde zwischen dem Mond und der Sonne steht, (in der Opposition,) in ganzer oder vollständiger Beleuchtung, d) in der zweiten Hälfte seiner Bewegung dann in dem Verhältniß, wie er vorher scheinbar sich füllte, nun auf der westlichen Seite auch wieder dunkel werdend, bei Vollendung des dritten Viertels seiner Bahn, nur noch östlich halb, von da an noch östlich scheinend erleuchtet, bis er dem Auge sich wieder entzieht. Auf diese Art werden die periodischen Lichterscheine oder Mondeswechsel, die als Phasen unterschieden werden, hervorgebracht. Gegen den scheinbaren Stand der Sonne am Himmel für jede Gegend der Erdoberfläche haben diese Phasen das Verhältniß, daß bei Vollmond der Mond aufgeht, wenn die Sonne un-

Die tägliche Bewegung des Mondes beträgt 11,952 Meilen, oder scheinbar am Himmel im Mittel  $13^{\circ} 10' 35''$ .



tergeht, in den Sommermonaten daher auch nur die kurze Zeit einer Sommernacht, in den Wintermonaten die lange Zeit einer Winternacht über dem Horizont ist, und zwar dort ungefähr denselben tiefen Bogen am Himmel, wie die Sonne in den Wintermonaten, hier aber den hohen Bogen, wie die Sonne in den Sommermonaten durchläuft, weil der Mond hier immer in dem dem Stand der Sonne entgegengesetzten Zeichen der Ekliptik sich befindet; daß beim ersten Theil der Mond, während Sonnenuntergangs, beim letzten während Sonnenaufgangs durch den Meridian geht, dort um Mitternacht, hier zu Mittag untergeht. In den Zwischenzeiten geht der Mond daher auch täglich um einen bedeutenden Theil später auf als den Tag vorher; die Zeit um wie viel, kann aber je nachdem der Mond in tiefer oder höher am Himmel stehendes Zeichen ruht, von etwa  $\frac{1}{2}$  Stunde bis gegen  $\frac{1}{2}$  Stunde differiren; ersteres ist der Fall wenn der Mond im Wassermann, in den Fischen und in dem Widder, letzteres wenn er im Löwen, in der Jungfrau und in der Waage ist. Auf westlichen Himmel findet beim Untergang das Gegentheil Statt. Daher bleibt auch der Mond immer länger über dem Horizont als die Sonne, wenn sie denselben Stand in der Ekliptik hat. Daher gibt es auch in jedem Monat Tage (Perioden von 24 Stunden) wo der Mond gar nicht auf, andere, wo er nicht untergeht. Uebrigens leuchtet der Mond ein ganzes Jahr hindurch an irgend einem Ort der Erde nur die Hälfte der Zeit aller Nächte, oder 2190 Stunden = 91 $\frac{1}{2}$  Tage, die Zeit mit eingerechnet, da er während der Abend- und Morgendämmerung niedrig am Himmel steht, selbst nur schwach erleuchtet ist und keinen Schein von sich wirft, woraus erhellt, daß der Zweck des Mondes, die Erleuchtung der Erdenächte durch ihn der Hauptzweck desselben nicht seyn kann, und dieser noch kaum zu Hälfte erfüllt wird, und der Mond, wenn es darauf angekommen wäre, daß die Erdbewohner immer auch des Nachts mäßiges Licht hätten, entweder immer als Vollmond gleichen Stand gegen die Erde behaupten, oder noch einen Gefährten zugesellt erhalten mußte, der mit ihm sich immer in entgegengesetzter Stellung um die Erde bewegte.

6) Da der Mond in seiner elliptischen Bahn sich bewegt; so hat er, eben so wie die Erde einen Punct der Sonnennähe und einen der Sonnenferne (Perihelium und Aphelium); hat auch einen Punct der Erdnähe (Perigäum) und einen Punct der Erdferne (Apogäum). Während des ersten ist der Mond der Erde gegen vier Erdhalbmesser, oder etwa 2820 Meilen näher.

7) Sowohl die Knoten als die Perigäen und Apogäen sind veränderlich und rücken, aber in einander entgegengesetzter Richtung, nämlich die Knoten von Osten nach Westen, und also gegen die Ordnung der Zeichen; so daß sie in einem Zeitpunkt von gegen 19 Jahren, (18 Jahre 223 Tage) den ganzen Himmelskreis durchlaufen, das Perigäum und Apogäum aber von Westen nach Osten; und also in der Ordnung der Zeichen, so daß sie in einem Zeitraum von fast neun Jahren, (8 Jahr 309 Tage 8 Stunden 34 Minuten) denselben Kreis vollendet haben. Diese Eigenheiten der Bewegung des Mondes in seiner Bahn sind eben sowohl als die Abweichungen von der



kleinern Geschwindigkeit seiner Bewegung, aus den Gesetzen der Gravitation, insbesondere aus der vereinten Wirkung der Sonne und der Erde erklärbar.

8) Die einzige völlig gleichförmige Bewegung des Mondes ist die um seine eigene Ase, welche völlig dem Umlauf des Mondes um die Erde entspricht. Mit andern Worten: der Mond kehrt um die Erde während seines Laufs um dieselbe beständig nur die eine Hälfte zu, während welcher Zeit daher auch auf dem Mond scheint nur einmal die Sonne ihren Lauf vollendet, so daß ein Tag da ist so lang als ein Monat bei uns, und auf der Mitte der der Erde zugekehrten Mondfläche im ersten Viertel Sonnenaufgang, im Vollmond Mittag, im letzten Viertel Sonnenuntergang, im Neumond Mitternacht ist. Wegen des ungleichförmigen Laufs des Mondes und seiner starken Abweichung von der Ecliptik aber kommen kleinere Streifen der entgegengesetzten Mondhälfte abwechselnd auch in den Gesichtskreis der Erdbewohner, oder die Mondscheibe scheint zu schwanken, weswegen man diese Erscheinung als Libration des Mondes bezeichnet. In dieser Umdrehung des Mondes um seine Ase steht diese seine Ase fast senkrecht auf der Ebene seiner Bahn; es kann so auf dem Mond ein solcher Wechsel der Jahreszeiten wie auf der Erde nicht Statt finden.

9) Je nachdem der Mond, während er mit der Erde rücksichtlich der Sonne in Opposition oder Conjunction kommt, (zur Zeit des Vollmondes oder Neumondes,) zugleich in seinen Knoten, oder auch nur in deren Nähe, oder gegenseitig in weitesten Abständen nördlich oder südlich davon zu jener Zeit sich befindet, gelangt er ganz oder theilweise, (als Vollmond,) in den Erdschatten; oder wirft, ganz oder theilweise, (als Neumond,) seinen eignen Schatten auf die Erde; oder er geht, (wie das meiste Mal,) im ersten Falle neben dem Erdschatten vorbei, oder es bleibt im letztern Falle die Erde von seinem Schatten unbedeckt. Hieraus gründet sich das bekannte Phänomen der Monden- und Sonnen- (eigentlich Erdfinsternisse,) oder Mondfinsternisse; sehen wir über dem vollen Mond eine schwarze Scheibe von Morgen gegen Abend wegstreichen, die Anfangs einen Rand desselben unsichtbar macht, worauf immer mehr von der sichtbaren Mondfläche, und endlich diese wohl ganz, verschwindet, aber eben so, wie sie sich dem Auge entzog, auch wieder zum Vorschein kommt. Man rechnet den Erdschatten (oder den kegelförmigen Raum, den sie, wo sie sich auch auf ihrer Bahn befindet, gegen die Sonne in Schatten setzt, zu etwa 217 Erdballmessern in der Länge; die Ase desselben fällt immer in die Ecliptik. Die Mondfinsterniß ist total, wenn der ganze Mond von der Erde beschattet wird, partial, wenn nur ein Theil des Mondes nördlich oder südlich durch den Erdschatten geht, central, wenn der Mittelpunkt des Erdschattens auf den Mittelpunkt der Mondscheibe fällt. Da in der Gegend des Mondes der Erdschatten im Durchschnitt fast drei Mal größer ist als die Mondscheibe; so ist eine centrale Mondfinsterniß allemal auch total. Ueberhaupt kann eine Mondfinsterniß etwa 23

45) Doch ist er in den meisten Fällen dem Auge noch als eine rötliche Kugel erkennbar, obgleich wegen Brechung der Sonnenstrahlen in der Erdatmosphäre.



Stunden betragen. — Bei Sonnenfinsternissen sehen wir die jetzt dunkle Mondescheibe vom Abend gegen Morgen vor der Sonne vorüberziehen; die Sonne bekommt mehr oder minder das Ansehen eines ab- oder zunehmenden Mondes, indem sie ganz oder theilweis von dem Mond verdeckt, und also unsichtbar wird; der Mondschatten hat aber wegen des geringern Volumens des Mondes nur im Mittel  $58\frac{1}{2}$  Erdhalbmesser, daher erreicht er die Erde nur selten, und die meisten Sonnenfinsternisse werden nur durch den Halbschatten des Mondes bewirkt, wo die Sonne nur theilweise bedeckt wird. Wenn die Spitze des Mondschattens nur eben die Erde erreicht, so entsteht eine totale Sonnenfinsterniß auf demjenigen Theil der Erdoberfläche, wohin der Schatten fällt, aber nur einen Augenblick. Dies ist der Fall, wenn der Mond während er seinen Schatten auf die Erde wirft, zugleich etwas weniger als in seiner mittlern Entfernung mithin seinem Perigäum näher als seinem Apogäum ist. Steht er aber zu gleicher Zeit seinem Perigäum sehr nahe oder in demselben, so tritt eine totale Sonnenfinsterniß mit Verweilen ein, deren Maximum aber doch nur 3 Minuten 41 Sekunden ist. Ist jedoch der Mond zur Zeit, wenn er vor die Sonne tritt, weiter als  $58\frac{1}{2}$  Erdhalbmesser von der Erde entfernt, mehr in seiner mittlern Entfernung oder gar seinem Apogäum näher als seinem Perigäum, oder befindet sich auch wohl in ersterem; so kann, auch wenn er mitten vor die Sonnenscheibe tritt, nur sein Halbschatten die Erde erreichen, und die Sonnenfinsterniß erscheint dann ringförmig, d. i. es bleibt an der Sonne in der Mitte der Verfinsternung noch ein Lichtrand sichtbar. Da der Halbschatten aber, oder der Schatten, der nur vor Bedeckung eines Theils der Sonnenscheibe entsteht, auf der Erdoberfläche einen Kreis bildet, dessen Durchmesser etwa  $\frac{2}{3}$  des Erddurchmessers beträgt; so hat auch nur ein verhältnismäßig kleine Theil der von der Sonne beschienenen Erdhemisphäre, wenn der Mond zwischen der Sonne und der Erde hindurchgeht, eine Sonnenfinsterniß. Der Anfang der Finsterniß ist immer da, wo die Sonne aufgeht, und am westlichen Rande derselben; das Ende derselben ist immer da sichtbar, wo die Sonne untergeht, und am östlichen Sonnenrande. Geht nicht der Mond mitten durch die Sonnenscheibe, wo dann, nach Maßgabe seiner Entfernung, eine totale oder ringförmige Verfinsternung eintritt; so bleibt, je nachdem er entweder nördlich oder südlich abweicht, in der Mitte der partialen Sonnenfinsterniß ein größeres oder kleineres Stück des südlichen oder nördlichen Randes der Sonnenscheibe sichtbar.

Da die Sonnenfinsternisse meist nur durch den Halbschatten des Mondes verursacht werden, die Mondfinsternisse aber bloß durch den wahren Erdschatten; so sind auch erstere weit häufiger, als letztere, indessen sind, für einen gewissen Ort, es wieder die Mondfinsternisse, weil diese überall, wo der Mond über dem Horizont steht, erblickt werden, jene aber immer auf dem größten Theil der erleuchteten Erdhemisphäre nicht. Es braucht also auch der Mond, um eine Sonnenfinsterniß zu bewirken, bei Eintritt des Neumondes seinem Knoten nicht so nahe zu stehen, als wenn bei Eintritt des Vollmondes dieser verfinstert erscheinen soll. Eine Sonnenfinsterniß ist überhaupt mög-



), wenn der Mond weniger als 21 Grade von seinem Knoten absteigt, und irgendwo auf der Erde gewiß, wenn der Abstand von dem Knoten unter  $15^\circ$  beträgt. In jedem Jahre können höchstens sieben Finsternisse an Sonne und Mond vorkommen, in jedem sind meistens zwei Sonnenfinsternisse; Mondfinsternissen fehlen oft gänzlich. Totale Mondfinsternisse sind gewöhnlich in vorhergehendem und in nachfolgendem Neumonde mit Sonnenfinsternissen, aber von geringer Größe, begleitet, bei centralen Sonnenfinsternissen aber sind die Neumonde vor und nachher ohne Mondfinsternis.

Zu Bestimmung der Größe einer Sonnen- oder Mondfinsternis wird die Sonnen- und Mondgröße von Osten nach Westen in zwölf gleiche Theile getheilt, die man Zölle nennt, in jedem Zoll werden wieder 60 Theile als Minuten unterschieden.

10) Die uns sichtbare Oberfläche des Mondes stellt sich im Verhältniß der Entfernung des Mondes als eine Scheibe dar, die mit der der Sonnenscheibe ungefähr gleichen Durchmesser, d. h. etwa  $\frac{1}{4}$  Grad hat. In dem Perigäum und in der Nähe desselben ist der Durchmesser auch auf eine dem gekübten Auge des Astronomen schon merkbare Weise größer, in dem Apogäum und in dessen Nähe aber gegenseitig kleiner. Messungen zeigen, daß wenn der scheinbare Durchmesser der Sonne, je nachdem die Erde im Perihelium oder im Aphelium ist, nur von  $31' 33''$  bis zu  $32' 38''$  differirt, der scheinbare Durchmesser des Mondes, im Perigäum gemessen,  $35' 58''$ , im Apogäum  $29' 29''$  beträgt.

So bedeutend auch die Erhellung erscheint, welche der Mond, während er am nächtlichen Himmel sichtbar ist, im Verhältniß seiner Höhe über dem Horizont und nach seinen verschiedenen Phasen gewährt; so ist sein Licht doch nicht bedeutender, als etwa das einer am Tage erleuchteten Wolke von der scheinbaren Größe des Mondes für einen einzelnen Standpunkt der Erde sein würde, da er nicht heller erscheint, wenn er am Tage während der Periode seines Zu- oder Abnehmens, mit der Sonne zugleich über dem Horizont ist. Man hat die Intensität dieses Lichtglanzes nach Messungen zu bestimmen gesucht, und schätzt sie kaum den 200,000sten, nach andern nicht einmal den 300,000sten Theil des Sonnenglanzes. Um begreifen zu können, es auch nicht möglich, von dem vom Mond reflectirten Sonnenlichte, selbst mit Benutzung der stärksten Brennspiegel, eine höhere Temperatur für dadurch beschienene Gegenstände auf der Erdoberfläche zu erhalten.

11) In der Refraction der Lichtstrahlen in der Erdatmosphäre haben unterschiedliche optische Täuschungen in dem Ansehen der erleuchteten Mondscheibe ihren Grund. Hierher gehört, daß der Mond, (ebenso wie andere Himmelskörper,) eher auf- und später unterzugehen scheint, als er wirklich (astronomisch) aber auch unter den Horizont gelangt. Um begreifen zu können, wenn der Auf- oder Austritt einer Mondfinsternis für einen gewissen Standpunkt eben in die Zeit fällt, wenn der Mond auf- und die Sonne unter-, oder die Sonne auf- und der Mond untergeht, den Mond am Rande verfinstert, während die Sonne noch sichtbar über dem Horizont steht, ungeachtet die Erde durch ihren Stand zwischen beiden den Mond verfinstert. So erscheint auch bei hohem Stand am Himmel der Mond, wegen Nicht-



unterscheidung der scharfen Grenzen hellleuchtender Gegenstände, um etwa vier Minuten größer, als er seiner wahren Größe nach erscheinen sollte. Auch bei zu- und abnehmendem Monde, (wie auch bei Finsternissen,) scheint die Mondessichel, oder der erleuchtete Theil von größerem Umfang, als er nach Messungen erscheinen sollte, oder in astronomischen Sehrohren, die jenen Strahlenkreis um das wirkliche Mondbild entfernen, wirklich erscheint. Wenn wir, aber, während der Mond nach dem Neulicht wieder am Himmel sich sichel-förmig zeigt, oder in dieser Form im Abnehmen noch sichtbar ist, auch den gegen die Sonne noch im Schatten liegenden Theil der Mondessichel wie in Dämmerung liegend erblicken; so ist dieß durch das von der Erde in diesen dunklen Mondstheil reflectirte Licht, indem jene bei dem gegebenen Stand des Mondes diesem noch einen großen Theil ihrer von der Sonne erhellten Fläche zukehrt, und die Erde im Verhältniß ihrer Größe in ihrer Beschattung von der Sonne auf dem ihr zugekehrten aber dunkeln Theil des Mondes, vierzehn Mal größer im Flächenraum und auch unter übrigens gleichen Verhältnissen mit vierzehn Mal stärkerem Licht erscheinen muß.

Eine andere Täuschung, daß der Mond (wie auch die Sonne,) beim Auf- und Untergehen größer erscheint, als bei hohem Stande am Himmel, hat in einer falschen Schätzung seiner Entfernung von uns nach dem Augenmaß seinen Grund, indem wir eine Menge Gegenstände auf der Erdoberfläche, oder doch einen weiten Raum auf dieser zwischen ihm und unserm Auge erblicken, und indem wir ihn doch unter demselben Sehinkel, (genau genommen jedoch einen etwas kleinern, weil der Abstand um einen halben Erddurchmesser weiter ist,) erblicken, als wenn er weiter am Himmelsgewölbe heraufgekommen ist, ihm eine mehrere Größe beilegen, die er haben müßte, wenn er uns in der scheinbaren größeren Entfernung wirklich so erscheinen sollte.

Die zuweilen bemerkbaren farbigen Kreise um den Mond, so wie auch die Nebenmonde, die man zu Zeiten am Himmel bemerkt, sind meteorologische Vorgänge, deren an andern Orten gedacht werden wird.

12) An der uns sichtbaren Mondessichel sind hellere und dunklere Flecke bemerkbar, welche in astronomischen Sehrohren sich noch deutlicher zeigen und eine unperänderliche Form haben, so daß sie also mit der Bildung der Mondoberfläche in unmittelbarem Zusammenhange stehen. Genauere Untersuchungen haben gezeigt, daß einzelne Theile dieser Formationen Schatten auf dem Monde fallen lassen, und daß überhaupt diese Ungleichheiten der Lichtvertheilung auf dem Monde von Gebirgen herkommen, die im Verhältniß mit der Größe des Mondes, von ungemeiner Höhe, von 10,000 bis 25,000 Pariser Fuß sind, zwischen denen sich wieder eben so bedeutende Abgründe von 2000 bis 3000 Klaftern befinden, die jene Gebirge zu Trichtergebirgen machen. Diese Mondthäler sind zum Theil geräumig genug, um, ohne ausgefüllt zu werden, den größten der Erdberge in sich aufnehmen zu können. Von Meeren, Strömen und überhaupt Wasser zeigt sich auf dem Monde keine Spur, auch nicht von einer dichten Atmosphäre, die, wie auf der Erde, Wolken bildet, oder eine



erkläre Refraction der Lichtstrahlen zu bewirken geeignet ist. Doch strahlet der Mond nicht, wie man wohl geglaubt hat, einer Atmosphäre gänzlich. Nach Schröter's Beobachtungen reicht jedoch die stärksten verdickte Dunschülle nur bis zu  $\frac{1}{3}$  der Mondthaler hin (ff. 44; sie bewirkt Abend- und Morgenämmerungen auf dem Monde; jedoch ist sie zum mindesten noch nicht einmal 28 Mal so dünn als die Erdatmosphäre.

V. Zeittheilung nach Erd- und Mondbewegung.  
Die Regelmäßigkeit der Bewegung himmlischer Körper, und insbesondere der den Erdbewohnern so nahe gelegte scheinbare Sonnen- und Mondentlauf, mußte in den frühesten Zeiten darauf führen, die Menschen gleichzeitig mit der frühesten Entwicklung ihrer Verstandeskraft, so notwendige Zeittheilung nach Sonnen- und Mondentlauf zu bewirken. Es ist diese daher auch noch jetzt bei allen, auch den uncultivirtesten Nationen in der Hauptsache eine und dieselbe, die auch auf der tiefsten Stufe der intellectuellen Ausbildung stehenden Nationen nahmen von den cultivirteren Nationen mit, da sie in Verbindung traten, mit Verbesserungen der Zeitrechnung; diese selbst aber wurde überall auf der Welt, wo Menschen aneinander auffanden, ursprünglich angetroffen, oder ist eine der ältesten und unversehrten Traditionen.

Alle Nationen älterer und neuerer Zeit unterscheiden also Tage, Monate, Jahre; die ersten nach der täglichen Umdrehung der Erde, (oder dem scheinbaren Sonnenauf- und Untergang); die zweiten nach der regelmäßigen Wiederkehr der verschiedenen Mondphasen, vornehmlich des Neulichts; die dritten nach der scheinbaren Wiederkehr der Sonne zu einem früher bezeichneten Punkte der Ecliptik, oder dem hiernach bestimmten regelmäßigen Wechsel der Jahreszeiten.

1) In der Zeittheilung nach Tagen ist sowohl die Länge des Tages, als auch der Wechsel der Tageszeiten in einer bestimmten Ordnung durch das Erdenleben selbst, nämlich den bestimmten Stand der Erde gegen die Sonne während ihrer täglichen Umdrehung um ihre Achse bestimmt.

Die Länge des Tages hängt von der Zeit ab, die verstreicht, während die Erde auf irgend einem Punkte ihrer Oberfläche, (die Pole abgesehen) von dem Augenblicke an, daß das Centrum der Sonne durch den Meridian geht, sich nicht allein einmal völlig im Westen nach Osten umdreht, sondern auch noch so weit fortwälzt, als sie alldahin den Betrag, wie weit die Sonne selbst in dieser Zeit scheinbar in der Ecliptik fortgerückt ist, noch mit in diese ihre Kreisbewegung aufnimmt. Es ist oben bei den Bemerkungen über die Erde zukommende Nebenbewegung gedacht worden, daß der Zeittrag einer einmaligen Umdrehung der Erde 23 Stunden 56 Minuten 4 Secunden sei, mithin an dem Betrag eines eben nach obiger Bestimmung in 24 Stunden eingetheilten Tages 3 Minuten 56 Secunden ermangeln.

Nach Verlauf obiger Zeit geht nämlich ein Fixstern, dessen Umdrehung des Standes am Himmel wenigstens für uns unmerklich ist, das zweite Mal durch den Meridian. Ein hiernach bestimmter Tag (44) Der Barometere würde auf dem Monde keine Rolle spielen.



wird daher auch zum Unterschied von einem Sonnentage ein Sternentag genannt. Ein solcher Sternentag ist nun wegen der durch aus sich gleichbleibenden Geschwindigkeit des Umschwunges der Erde immer von gleicher Länge, nicht aber das ganze Jahr hindurch jeder Sonnentag. Nämlich es lehrt die Beobachtung, daß die Differenz von einem Sternentage und einem Sonnentage nach bestimmten, für jeden Tag des ganzen Jahres zu berechnenden Verhältnissen, etwas ab- und zunehme. Die Ursache davon ist eine doppelte; nämlich 1) die mehrere Schnelligkeit der Bewegung der Erde um die Sonne in ihrem Perihelium und in der Nähe desselben, und gegenseitig die mindere Schnelligkeit derselben wenn die Erde in ihrem Aphelium und in der Nähe desselben ist; 2) der relativ größere Theil, um welchen die Erde in einem Bogen auf den Aequator bezogen täglich weiter rückt wenn sie in den Sonnenwendepuncten und der Nähe derselben ist, in dem hier die Bogen auf der Ecliptik, um welche die Sonne scheinbar weiter rückt, ziemlich dem Aequator parallel sind, und gegenseitig der mindere Betrag dieses Bogens auf dem Aequator, zu den Aequinoctialzeiten, wo in dem Verhältniß des Winkels, unter dem der Aequator und die Ecliptik sich durchschneiden, der tägliche Bogen der Fortrückung auf dem Aequator von dem Bogen, welcher zur Zeit der Solstitien täglich zurückgelegt wird, auch in entsprechende Maße unterschieden ist. Man unterscheidet hiernach nun eine mittlere Zeit, in welcher alle Tage von gleicher Länge angenommen werden, und die wahre Zeit, nämlich nach dem Sonnenstand oder von dem Moment an, in dem das Centrum der Sonne durch den Meridian geht, bis wieder zu demselben Augenblick des folgenden Tages, nach welcher eben so viele Differenzen der Zeit in frühem Eintritt dieses Moments, als in späterem Eintritt desselben das Jahr hindurch Statt finden. Erstere, oder die mittlere Zeit, zeigen genaue gehende astronomische Uhren, diese, oder die wahre Zeit die täglich genommenen Sonnenhöhen oder genaue Sonnenuhren an. Die Differenz kann im Maximum bis etwas über oder unter ein Viertel Stunde betragen. Nach gegenwärtiger Lage der Perihelien und Aphelien wirken beide Veranlassungen, die eine Abweichung der wahren Zeit von der mittlern bewirken, in der Mitte des Winters zusammen, in der Mitte des Sommers wird aber eine durch die andere beschränkt. Der Unterschied der täglichen Bogen auf dem Aequator und der Ecliptik, um wie viel die Sonne scheinbar weiter rückt begründet aber stärkere Differenzen, als die Ab- und Zunahme der Schnelligkeit der Erdbewegung; daher wird die Differenz der wahren und der mittlern Zeit im Sommer nicht ganz ausgeglichen, nur beschränkt, so daß die Abweichung hier kaum um den dritten Theil merklich ist. Es hat nämlich die wahre Zeit das Maximum ihrer Abweichung 7<sup>te</sup> Wochen vor, und 7<sup>te</sup> Wochen nach dem Wintersonstitium, indem sie den 3ten November  $+ 16^{\circ} 15'$  und den 11ten Februar  $+ 14^{\circ} 40'$  beträgt. In den 5 Wochen, und etwa 2 Tagen vor dem Sommersolstitium und 5 Wochen 2 Tagen nachher aber sind die größten Differenzen, nur den 15ten Mai  $+ 3^{\circ} 59'$  und den 27sten Julius  $+ 6^{\circ} 15'$ . So wie hiernach jährlich vier größte Abweichungen der wahren Zeit von der mittlern vorkommen; so trifft auch vier Mal jährlich die wahre und mittlere Zeit zusammen, nämlich einmal



Mitte des Aprils, in gewöhnlichen Jahren den 15ten oder 16ten April, das zweite Mal in der Mitte des Junius, den 15ten oder 16ten Junius, das dritte Mal den letzten August oder ersten September, das vierte Mal kurz nach dem Wintersollstitium, den 23sten oder 24sten December. Der längste natürliche Tag im ganzen Jahr aber vom Mittag des 20sten bis Mittags des 21sten Decembers, und um 30" länger als der mittlere Tag.

Da die Bewegung der Erde, wovon die Tagesbestimmung abhängt, eine rotirende ist; so hat sie keinen natürlichen Anfangs- und Endpunkt. Nach astronomischer Bestimmung würde der Mittag der sich am nächsten legende Anfangspunct seyn; weil er am leichtesten mit Genauigkeit beobachtet werden kann; auch wird darnach die Zeit von diesem Mittag zum andern, wiewol sie besonders auf Seefahrten beachtet wird, als natürlicher Tag unterschieden. Für die gewöhnlichen Lebensverhältnisse aber sind die beiden Perioden, in welchen in den kältern Gegenden der Erdoberfläche die Erde abwechselnd von der Sonne beschienen, oder in der Nacht im engeren Sinne des Wortes, und gegenseitig wieder von derselben unerschienen bleibt, oder wo Nacht ist, zu wichtig, um nicht zunächst die Hauptabtheilung eines Sonnen- oder Calendertages zu geben. Für die Tagesperiode aber der Mittag die natürliche Mitte, wie auch das Wort selbst sagt, sein. Beginnen dagegen als Morgen, und sein Schluß als Abend machen sich eben so auffallend unterscheidbar; durch beide wird der Uebergang der Tages- und der Nachtperiode in einander ermittelt. In dem gewöhnlichen bürgerlichen Tage wird daher der Anfang mit der Mitte der Nacht (Mitternacht) gemacht; doch diese Abtheilung theilweise immer eine willkürliche, daher auch einzelne Völker, zumal da wo kein so auffallender Unterschied in den Stunden des Auf- und Niedergangs der Sonne Statt hat, entzweit. Abends oder frühsten Tag zu zählen anfangen. Eben so willkürlich sind die Abtheilungen des Tages in 24, oder auch zwei Mal zwölf Stunden, und die Abtheilungen dieser in 60 Minuten, dieser in 60 Sekunden, und dieser in 60 Theilen, als die kleinsten und kaum noch merkbaren Zeitunterschiede, bloß wegen Bequemlichkeit der leichten Eintheilung derselben in einzelne kleinere Zahlen, so wie die Eintheilung des Tages in 360 Theile ziemlich allgemein angenommen. Ueber den Unterschied der längern oder kürzern Tage oder Nächte nach den verschiedenen Jahreszeiten in den verschiedenen Clima's s. unten Clima.

2) In den Zeitabtheilungen, in welchen der Mondesstand darauf Rücksicht genommen, in welcher Periode übereinstimmende Mondesphasen eintreten. Diese Mondesphasen werden, wie oben gemeldet wurde, als Neumond, erstes Viertel, Vollmond, und letztes Viertel unterschieden. Auch hier ist an sich wohl die Länge der Periode, aber nicht ihr Anfang oder ihr Ende bestimmt. Diese Eintheilung ist also willkürlich. Abohe Nationen, wie noch jetzt die Türken, beginnen ihren Monat, wenn sie den Mond, nachdem er in seinem Stand zwischen der Erde und der Sonne unsichtbar gewesen, wieder das erste Mal mit einem schwachen sichelförmigen Rande erblicken. Astronomisch ist es gewöhnlich, von dem Moment an, wo man nach Rechnung weiß, daß der Mond zwischen der Erde und der Sonne



durchgeht, oder ober- oder unterhalb der Sonnenscheibe am Himmel vorbeigeht, oder von eintretendem Neumond an, den Monat zu beginnen. So wenig aber ein Sonnentag der Erde und ein Sternentag derselben zusammenfällt; so wenig ist die Periode, in welcher der Mond einmal die Erde umkreist, und die, in welcher er nach und nach alle verschiedene Lichtgestalten annimmt, also auch nicht die Zeit von Einem Neumonde bis wieder zum folgenden, eine und dieselbe. Erste beträgt, wie oben erwähnt wurde, im Durchschnitt 27 Tage 7 Stunden 43 Minuten 11 Secunden. Wenn nun aber der Mond diese durchlaufen hat, so ist die Erde in ihrer Bahn auch um etw.  $\frac{1}{3}$  fortgerückt. Um so viel und noch etwas mehr, wegen der Fortdauer des Weiterrückens der Erde, muß der Mond nun also in seiner Bahn auch noch weiter sich bewegen, ehe er wieder in Hinsicht seiner Erleuchtung von der Erde aus sich so zeigt, als zu der Zeit, von wo aus man die Periode begann. Man unterscheidet also hier nach doppelte Monate, nämlich a) einen periodischen, oder die Periode des wirklichen einmaligen Umlaufs des Mondes um die Erde, und b) einen synodischen, oder die Zeit von Einem Neumonde zum andern, oder überhaupt bis dahin, daß eine früher beobachtete Mondesphase wieder eintritt. Der letzte beträgt im Durchschnitt 29 Tage 12 Stunden 44 Minuten 3 Secunden, und ist also um 2 Tage 5 Stunden — Minuten 52 Secunden länger als der periodische. Nach dieser Beobachtung nun, daß die verschiedenen Mondwechsel alljährlich wenigstens zwölf Mal eintreten, hat man auch sobald man einmal Jahre unterschied, diesem zwölf Abschnitte gegeben. Da aber hiernach jährlich 11 bis 12 Tage übrig blieben, hat man entweder dem Jahre von Zeit zu Zeit einen Monat eingeschaltet, oder bei übereinstimmender Eintheilung der einzelnen Monate zu 30 Tagen, ohne Rücksicht darauf, daß die Mondwechsel aller zwei Monate um einen Tag früher eintreten, den Ueberschuß an Tagen auf 5 bis 6 verringert, und diese als Supplementartage gegeben, (wie noch neuerlich in Frankreich, zur Zeit der republikanischen Zeitrechnung,) oder man hat die Monate willkürlich zu 30 und 31 Tage abgetheilt; die dann aber noch ermangelnden zwei Tage oder wenigstens einen Tag wieder an einem Monat, (bei uns der Februar,) fehlen lassen, wie dieß der Fall in unsern Calendern ist. Nach diesen Sonnenmonaten kommen auf jeden wenigstens vier Mondeswechsel, meist zweimal im Jahr auch fünf, und es kehre gewöhnlich von den vier Phasen zwei dreizehn Mal im Jahre wieder. Jede aber tritt monatlich, (mit Ausnahme des März,) meist um 1 bis 2 Tage früher ein, als denselben Calendertag des vorigen Monats. Der monatliche Ueberschuß eines Sonnenmonats über einen Mondemonat, oder auch der jährliche eines Sonnenjahrs über den Betrag von 12 Mondemonaten, oder ein Mondesjahr, wird unter der Benennung Epacten begriffen. Nach 19 Jahren, aber als der ungefähren Periode, in welcher die Knoten der Mondesbahn die ganze Ecliptik durchlaufen haben, fallen die Mondesphasen wieder auf dieselben Tage im Jahre. Es wird dieser Zeitraum daher auch der Mondesirkel genannt. In ihm kehren auch die größern Sonnen- und Mondesfinsternisse wieder; doch werden sie je



Mal. Kleiner und bleiben in der spätern Zeit aus. Doch ist darnach Mondesstand nur 312 Jahre bestimmbar, wornach die Tage um ein rückwärts rücken.

Die fernere Abtheilung der Monate in 4 Wochen kann wohl Beobachtungen der 4 Mondeswechsel entstanden seyn. Sie ist alt und ziemlich allgemein; man fand sie selbst bei den Peruanern in Amerika. Doch rechneten die Römer 8 Tage auf Eine Woche, (Griechen aber theilten, wie eine Zeit lang die Franzosen,) der ästern Rechnung wegen, den Monat von 30 Tagen in drei Decern.

3) Bei der Zeitabtheilungen nach der Erdbewegung, oder scheinbaren Sonnenbewegung durch die Ecliptik, ist die Rücksicht zu nehmen, daß die Sonne, nachdem sie die ganze Ecliptik, von einem willkürlichen Punct aus, scheinbar durchlaufen hat, d. i. wieder der Nähe derselben Fixsterne auf- und untergeht, wie zur Zeit, man die Periode zu berechnen anfing, auch am Himmel dieselbe Lage, die im Mittag am besten bemessen werden kann, wieder habe. während dieser scheinbaren Sonnenbewegung von der Schiefe der Ecliptik gegen den Aequator abhängigen vier Puncte, der größt-nördlichen und der größten südlichen Abweichung vom Aequator, der Solstitien im Zeichen des Krebses, (des Sommersolstitiums auf der nördlichen Hemisphäre,) und im Zeichen des Steinbocks, (des Wintersolstitiums auf der nördlichen Hemisphäre,) und zwischen beide fallenden Durchschnittspuncte des Aequators und der Ecliptik als Aequinoctien ist bereits oben gelegentlich gedacht worden. Die Periode eines Wiedertzusammentreffens der Sonne mit einem festen Punct in der Ecliptik, und die Periode des scheinbaren Durchgangs der Sonne durch einen oder genannten vier relativen Puncte, oder des Wiedereintritts des Frühlings, oder Herbstäquinoc- tiums, des Sommer- oder Wintersolstitiums, fallen ziemlich nahe zusammen, doch nicht ganz genau, und differiren, wegen der Rückweichens der Durchschnittspuncte des Aequators und der Ecliptik, in falls, wie schon erwähnt, jährlich um einige Secunden. Da aber letztere Bestimmung für die Erdbewohner die wichtigste ist, so ist sie nicht die Zeit der wirklichen einmaligen Umdrehung der Erde um die Sonne, zur Jahresbestimmung gewählt worden. Eigentlich ist aber, eben so wie ein zweifacher Tag als Sternentag und Sonnen- und ein zweifacher Mondenmonat als periodischer und synodischer, so auch ein zweifaches Jahr, als periodisches oder siderisches Jahr, und als tropisches oder Sonnenjahr, unterschiedbar. Jenes, als die Periode der einmaligen Vollendung des Umlaufs der Erde um die Sonne, beträgt, wie ebenfalls schon gesagt wurde, 365 Tage 6 Stunden 9 Minuten 11 Secunden. Ehe die Erde diesen ganzen Kreis völlig beendigt, nämlich schon nach 365 Tagen 5 Stunden 48 Minuten, 37 Secunden, hat, wegen der ungleichmäßigen langsamen Umdrehung der Erdpole um die Puncte der Ecliptik, und wegen des davon abhängigen Vorrückens der Durchschnittspuncte des Aequators und der Ecliptik, oder des Vorrückens der Zeitgleichen, die Erde gegen die Sonne den relativen Stand, wie so viel früher. Das tropische Jahr ist mit andern Worten auch

die Periode von einem Frühlingsäquinocetium bis zum andern, oder gleich dessen Anfang willkürlich von jedem andern Zeitpuncte aus genommen werden kann. Es ist also um 20 Minuten 34 Secunde kürzer als das periodische Jahr, und wenn die ganze Periode zurückgelegt seyn wird, daß nach unserer Zeitrechnung die Aequinoctia puncte die ganze Ecliptik rückwärts durchlaufen haben, wozu nach obiger Bemerkung aber weniger nicht als 25,791 Jahre gehören, wi die Erde sich doch nur 25,790 Mal um die Sonne gedreht haben <sup>45</sup>.

So allgemein es aber von jeher war und noch ist, die Haupttheilung des Jahres in Bezug auf den Sonnenlauf nach Monaten zu machen; so ist man doch, besonders wegen der doppelten Schwierigkeit, die jährlichen 12 bis  $12\frac{1}{2}$  Mondescyclen mit dem Sonnen cyclus in Uebereinstimmung, und die überschüssigen Stunden eines jeden Jahres gehörig einzubringen, in Anstöße gerathen, die er in den neuften Zeiten und auch nur theilweise unter den cult virtesten Nationen glücklich besiegt sind. Die Griechen, wie auch die Juden, bei denen es Religionsforderung war, daß ihre Feste nicht nur übereinstimmend auf denselben Monatstag, sondern auch dieselbe Jahreszeit fielen, hatten ein verbundenes Monden und Sonnenjahr. Meton führte bei erstern, (433 vor Christi Geburt,) einen Cyclus von 19 Jahren ein, in welchem zwölf Jahre jedes Jahr 12 Monate von 29 und 30 Tagen, sieben Jahre aber noch einen eingeschalteten Monat von 30 Tagen hatten. Von der Zeit wurde ein Monat noch um einen Tag verlängert, so daß der ganze Cyclus astronomisch 6939 Tage 16 Stunden 31 Minute 45 Secunden betrug. Die Jahre waren also ungleich; aber die ganze Periode war doch nur um 2 Stunden 4 Minuten 33 Secunden kürzer, und die Solstitien und Aequinoctien fielen darnach erst nach 219 Jahren um Einen Tag zu früh. Eben dieß cyclische Jahr haben die Juden mit einigen Modificationen noch jetzt. Ihr bürgerliches Jahr fängt mit einem Neumonde,  $5\frac{1}{2}$  Monat nach dem Ostern fest, gewöhnlich im September an.

Die Araber führten ein freies Mondenjahr ein, das, so wie der Mohammedanische Religionsgebrauch herrscht, noch jetzt allgemein ist. Es besteht aus 12 Mondenmonaten. In einem Cyclus von 3 Jahren kommen auf 19 Jahre 354 Tage, und auf 11 Jahre 355 Tage. In Hinsicht auf die Jahreszeit fängt jedes Jahr um 10 bis 12 Tage früher an. Das Neujahr mit allen Festen läuft also durch alle Jahreszeiten hindurch, und wenn der ganze Cyclus zu Ende ist haben die darnach rechnenden Orientalen ein Jahr mehr als nach unsern Sonnenjahren.

Dieses freie Sonnenjahr wurde zuerst von den Aegyptiern eingeführt; die 12 Monate erhielten darnach jeder 30 Tage. Mercurius Trismegistus hing 5 supplementäre Tage an. Der Ueber schuß des tropischen Jahres über 365 scheint auch schon früh von den Aegyptiern gekannt worden zu seyn.

45) Außer dem periodischen und tropischen Jahre unterscheiden die Astronomen auch noch die anomalistische Umlaufszeit der Erde, oder die Periode welche sie braucht, um von ihrem Aphelium aus bis wieder dahin zu gelangen. Sie beträgt 365 Tage 6 Stunden 13 Minuten 59 Secunden, ist also 25 Minuten 22 Secunden länger als das tropische Jahr.



Das Römische Jahr wurde von Romulus in 10 Monate zu 30  
31 Tagen eingetheilt, die übrigen 61 Tage wurden jedem Jahre  
gehängt, ohne sie in Monate zu befaßen. Numa Pompilius  
achte den Januarius und den Februarius daraus. Doch begriff  
Jahr nur 355 Tage, (war also ein Mondenjahr.) Dagegen  
den alle zwei Jahr 22 oder 23 Tage in dem Monat Februar ein-  
schaltet, und die Pontifices maximi erhielten den Auftrag, den  
änder von Zeit zu Zeit zu rectificiren. Dennoch entstand zu des  
llius Cäsar's Zeiten ein Unterschied von 87 Tagen, welche in  
sogenannten annus confusionis, (707 Jahre nach Erbauung  
ns,) in zwei zwischen dem November und December eingeschalte-  
Monaten nachgeholt wurden, wornach der Anfang des Jahres  
gleich auf das Wintersolstitium gesetzt, und die Bestimmung ge-  
füen wurde, daß jedes Jahr 365 Tage bekommen, in jedem vier-  
Jahre vor den letzten 5 Tagen des Monats Februar noch ein  
eingeschalten, ein jedes solches Schaltjahr also 366 Tage bekommen  
te. Dieses ist also das Julianische Jahr, und die Zeitrech-  
ung darnach der Julianische Calendar. Da aber hiernach ein  
Jahrlang aus 365 Tagen 6 Stunden besteht, so ist es um 11 Mi-  
nuten 12 Secunden zu lang. Nach jedesmal 128 Jahren; zeigt sich  
darnach eine Differenz von Einem Tag, und so kam es denn,  
man im 16ten Jahrhundert um 10 Tage in der Zeitrechnung  
aus war. Papst Gregor XIII. verordnete also in der Katholischen  
Kirchenheit eine Verbesserung, die dadurch bewirkt wurde, daß man  
Jahr 1582 im Monat October 10 Tage wegließ, und statt des  
11 Octobers vom 4ten auf den 15ten fortzählte. Zugleich wurde  
gesetzt, daß die Schlußjahre jedes Seculums, die, wie alle mit vier  
theilbare Jahrzahlen ein Schaltjahr wären, in der Regel keins sind, je-  
der aber wieder jedes vierte eines seyn sollte, so das Secularjahr 1600,  
künftig wieder das Jahr 2000 u. s. w. Hierauf gründet sich also  
Unterschied zwischen dem Julianischen und Gregoriani-  
schen Calendar, dessen Unterschied, wo jener, (wie in der Zeit-  
rechnung der Russen, und überhaupt in der Griechischen Kirche,)  
gilt, alle Jahrhunderte, wo das Schlußjahr kein Schaltjahr ist,  
einen Tag wächst, und jetzt zwölf Tage beträgt. Das Jahr aber  
geht in beiden, nach frühen Kirchenbestimmungen, den 1sten Ja-  
nuar an. Nur die Franzosen haben in Wiederannahme des alten  
Römischen Calenders zur Zeit ihrer republikanischen Verfassung,  
vorläufig eine Ausnahme gemacht, und ließen ihr Jahr vom Herbst-  
äquinoccium beginnen <sup>46</sup>.

Die Protestanten in Deutschland haben den Gregorianischen Ca-  
lendar im Jahr 1700 als verbesserten Calendar angenommen,  
man von dem 16ten Februar an die noch übrigen Monatstage  
schloß, und statt dieses Tages gleich den 1sten März zählte; doch mit  
einigen Unterschiede, daß die Zeit des Osterfestes, (als der nächste Sonn-  
tag nach dem ersten Vollmond, der nach dem Frühlingsäquinoccium  
tritt, wovon dann alle beweglichen Kirchenfeste des ganzen Jah-

66) Diese Republikanische Zeitrechnung hob den 23sten September 1792 an, wurde  
aber den 1sten Januar 1805, nachdem sie 13½ Jahr gedauert hatte, wieder  
aufgegeben.

res abhängig sind,) nicht nach den Epacten, sondern nach richtigen astronomischen Tabellen bestimmt wurde, wornach aber manchen Jahren das Osterfest 8 Tage später fällt als nach jener Rechnung. Um die davon abhängigen Störungen zu vermeiden, wurde im Jahre 1777 von den Deutschen protestantischen Ständen der Gregorianische als Reichscalender angenommen <sup>47</sup>.

#### VI. Dynamische Natur der Erde.

Bisher haben wir die Erde, ihrer allgemeinen Form nach, als Kugel, in ihren cosmischen Verhältnissen als Weltenkörper, und sowohl gegen die Sonne, in deren Organismus sie eingeht, und unter Rotation um die eigne Ase in einer elliptischen Bahn umkreisend, als auch gegen den Mond, der, als Weltenkörper untergeordneten Ranges, in ihre eigne Organisation eingeht, betrachtet, und nach der Angabe der hauptsächlichsten räumlichen Bestimmungen allen diesen Verhältnissen, indem wir auch zugleich die von den natürlichen Verhältnissen abhängigen Zeitbestimmungen berührten, so ziemlich vollständig das erschöpft, was man unter mathematischer Erdkunde begreift, in so fern dieß zu einer wissenschaftlichen Kenntniß des Erdorganismus hierher gehörig erschien. Wir machen nun demjenigen Theile der Erdkunde den Uebergang, welcher zunächst die qualitativen Eigenheiten der Erde zum Gegenstand hat, und wo auch die Grundsätze der Mathematik uns nur in so fern noch zur Leitungsprincip dienen, als Größenbestimmungen nicht ganz außer Beachtung bleiben; wo aber auch das wirklich Erkennbare, so wie sich dem Calcul der Mathematiker entzieht, nicht weitere Grenz hat, als bis wohin die sinnliche Wahrnehmung uns leitet, und Hypothesen, die wir jedoch nur leicht und nebenher berühren werden, um so größerer Spielraum gegeben ist, als das Resultat aller bisherigen Bearbeitungen der physischen Erdkunde doch das ist: daß die Summe dessen, was wir von der Natur der Erde nicht wissen, kaum je zu erforschen hoffen können, die Summe dessen, was wir wirklich erkannt haben, bei weitem übersteigt.

Wir können die Erde als ein Naturproduct, als etwas Gewordenes, in ihrem Seyn, oder auch ihrer Bildung nach, in ihrem fortwährenden Werden, oder in ihrer Lebendigkeit betrachten. Da aber Seyn nur ein relatives die Dauer des Seyns selbst nur ein langsam sich fortsetzendes Werden ist, indem es sonst der Wahrnehmung keine Veränderung eines einmal vorhandenen Zustandes darbieten würde; so verdient in einer physiologischen Würdigung nothwendig die letztere Betrachtungsweise den Vorzug.

1). Die Erde entstand, als Weltenkörper, nothwendig auch nach einem diesen allen gleichen Grundgesetze. Da aber die erste Bildung eines Weltenkörpers weit über die Grenze aller möglich

47) Die Perser haben bereits seit dem Jahr 1079 eine Jahreseltheilung, die in dem Sonnenlaufe selbst noch genauer, als unser verbesserter Calender übereinstimmt. Das Jahr hat gewöhnlich 365 Tage, aber es wird immer sieben Mal hinter einander alle vier Jahr, das achte Mal aber erst im fünften Jahre ein Mal eingeschaltet. In 33 Jahren sind 25 gemeine und acht Schaltjahre. Jedes Jahr hat also im Durchschnitt 365 Tage 5 Stunden 49 Minuten 5 Sekunden 28 Theilen und weicht mithin von der wahren Größe nur etwa um 20 Sec. ab, daß es erst in 4320 Jahren um Einen Tag zu lang ist.



nahrung hinausgerückt ist; so haben wir hierüber durchaus kein  
 andres Leitungsprincip, als die allgemeine Beobachtung, wie noch  
 die Erde als ein Ganzes, oder ihrer Masse nach verbunden bleibt.  
 Es ist es einer der frühesten Erfahrungssätze und von durchaus all-  
 gemeiner Bewährung, daß alle von dem Zusammenhang mit dem  
 Erdkörper gelöste, und in einen Abstand von der Erdoberfläche gebrachte,  
 gegen sich selbst überlassene, und nicht durch einen anderwei-  
 gen Impuls in eine bestimmte Bewegung gesetzte körperliche Mas-  
 se in einer Richtung sich nach dem Erdkörper bewegen, oder auch,  
 nur in einzelnen Puncten berührend, in einer Richtung ihm an-  
 liegen, die allen oberflächlichen Erdtheilen selbst gemein ist, d. i.  
 die unter Voraussetzung, daß der Erdkörper durchaus ein massi-  
 ges sei, eine in dem Mittelpunct derselben convergirend zusammen-  
 wirkende ist. Man kennt dieses Naturphänomen unter dem Namen  
 der Gravitation oder Schwere. Mit andern Worten: alle kör-  
 perliche Theile, die zur Erde gehören, wie qualitativ verschieden sie  
 seyn mögen, gravitiren gegen die Erde, und was nicht gravi-  
 tirt, ist auch nicht als körperliche Substanz, sondern als Freithätiges  
 der Natur anzusprechen. Das Princip der Schwere aber mani-  
 festirt sich selbst als ein Freithätiges, und erhält als solches den Na-  
 men der Attraction. Wir müssen in Hinsicht der nähern Ausführung  
 des Gegenstandes, so wie über die Anwendung, die man von den  
 Lehren der Attraction und der Schwere auf die Entstehung und  
 Erhaltung der Körperwelt, oder des Weltsystems überhaupt gemacht  
 hat, auf die besondern Artikel verweisen. Hier kommt es zunächst  
 darauf an, diejenigen Momente zu berühren, die auf die Gravita-  
 tion der Körper gegen die Erde, oder auch die Gravitation der ein-  
 zelnen Körpertheile selbst, nächsten Bezug haben.

Wir müssen es durchaus dahingestellt seyn lassen, bei welcher der ver-  
 mutheten Hypothesen <sup>48</sup>, in Hinsicht der Entstehung des Erdplane-  
 tes, durch Attraction oder Zusammenballung der in dem Himmels-  
 raum unendlich fein zertheilten Körpermasse durch irgend ein unbekann-  
 tes Princip <sup>49</sup>, durch Losreißung eines Theils der Körpermasse der  
 Sonne; entweder aus einem innern Princip, durch eine Art von Ex-  
 plosion, oder auch durch einen vorbeistreichenden Cometen <sup>50</sup>, durch  
 48) Lichtenberg zählt in seinen geologischen Phantasien, (im Göttingischen Za-  
 schenbuch f. 1795, S. 79) mit der ihm eignen Laune nicht weniger als 50  
 Hypothesen von der Entstehung und Bildung der Erde, unter denen wenigstens  
 10 nicht zur Geschichte der Erde, wohl aber zur Geschichte des menschlichen Gei-  
 stes gehören. 49) Dies ist im Grunde die älteste Ansicht, oder der erste  
 Versuch des menschlichen Geistes, die Erdentstehung aus einfachen Naturprinci-  
 plen zu erklären, und die der Bildung der Welt aus einem Chaos, oder aus  
 Atomen, nach Leucipp, Epikur, Demokrit u. s. w. keine andere. (Vgl.  
 Chaos und Atome.) Hierhin gehört aber besonders Newton's Gedanke  
 eines Niederschlags der Welt aus einem flüchtigen Wesen, in der Art, wie sich  
 Wasser aus Dampf niederschlägt, und einer Gerinnung zu festen Formen aus je-  
 ner Flüssigkeit. (S. Birch hist. of the Royal soc. T. III. p. 230.)  
 Mit gleich philosophischem Scharfsinne gründete Kant eine Theorie der Erde auf  
 den Satz: daß alle Materie mit ihren Kräften, wie ein Dunst durch den Raum  
 verbreitet sei. Vgl. Berliner Monatschr. 1785, 1. Th. S. 210. 50) Hierher  
 gehört besonders die brillante Hypothese von Buffon, (Hist. nat. gen. et par-  
 t. T. I, Théorie de la terre und Suppl. T. IX. et X.) Er geht von dem Satz  
 aus: daß sich alle Planeten um die Sonne und ihre Axen nach einerseits Selten  
 zu bewegen, und daß ihre Bahnen nur kleine Winkel, höchstens von 7½° mit

Zusammenrücken und Vereinigung mehrerer in der Nähe befindlicher kleiner Körper, oder auch aus den Trümmern untergegangener oder verückter größerer Weltenkörper<sup>52</sup>, die wenigsten Fragen und Zweifel unbeantwortet und unaufgelöst bleiben. Wir wissen bloß, daß die Erde wie alle Planeten, gegen die Sonne, als ihren Centralkörper, gravitirt, und daß eben daraus nur ihre Bewegung um ihn in einem bestimmten Kreise erklärlich ist; wir wissen ferner, daß der Mond gegen die Erde gravitirt, und eben dadurch an sie als Trabant gekettet ist, durch seine Seitenbewegung aber eben so gegen das wirkliche Fallen auf die Erde gesichert ist, als die Kreisbewegung der Erde um die Sonne das Fallen jener auf diese verhütet. Die Berechnungen der Astronomie belehren uns überdieß, durch Vergleichung der Geschwindigkeit der Bewegungen im Verhältniß ihrer Entfernung, um wie viel ein Weltenkörper gegen den andern gravitire; die Schwere aber verhält sich überall bei gleichem Volumen mehrerer Körper wie die Dichtigkeit, wie die Vermehrung der körperlichen Masse in einem bestimmten Raume; denn eben der Grundcharakter der Körperlichkeit ist kein anderer als die Gravitation. Wir wissen also, von den Astronomie belehrt, daß die Dichtigkeit der Erde gegen die der Sonne, wie 1 zu 0.236, zu der des Mondes aber wie 1 zu 0.717 sei. Dieß alles gibt uns jedoch über die absolute Schwere des Erdkörpers noch keinen Aufschluß. Um diese wenigstens approximativ zu bestimmen, hat man unter Voraussetzung, daß wenigstens der größte Theil des Erdkörpers aus Erd- oder Steinmasse bestehe, deren Gewicht unter mehreren bekannten als ein mittleres betrachtet werden kann, erst ein System einander machen. Dieß findet nach ihm darin seine Erklärung, daß ein Centeschief gegen die Sonne gefallen und von ihr etwa  $\frac{2}{3}$  abgestoßen, auch den Seiten die Umdrehung um ihre Axe nach derselben Richtung mitgetheilt habe; ein solches Stüek war also noch ihm auch unsere Erde; durch die Umdrehung, Anfang und Jahrtausende lang in dem Zustande von Glühen, erhielt sie ihre Abplattung durch das Erkalten wurde sie auf ihrer Oberfläche bläsig, daher die Berge und Thäler der Erde, die Erddöhlen u. s. w.; erst nach 25.000 Jahren sei die Erde so weit erkaltet, daß das Meer tropfbare Gestalt habe annehmen können u. s. w. Von Just (Gesch. des Erdkörpers, Berl. 1771) läßt ebenfalls die Erde aus der Sonne entspringen, eignet ihr aber zugleich ein Centrafeuer zu, wodurch die Urgebirge in die Höhe gehoben worden wären. Wiedeburg, der dieß System widerlegt, glaubt, (Neue Muthmaß. über die Sonnenflecken u. s. w. Göttingen 1776, 8.) daß die Erde, wie alle Planeten, erst ein Sonnenfleck, dann ein Comet gewesen sei. 51) Leibniz (protogea in Act. erud. Lips. 1692) läßt die Erde aus einem ausgebrannten und geschmolzenen Körper entstehen, auch nach Moisset (Telliamed ou entretiens d'un philosophe Ind. avec un missionnaire Franc. nouv. éd. à la Haye 1755,) ist die Erdkugel eine ausgebrannte Sonne. Nach der neuern schorffinnigen Theorie von de Lenc (geologische Briefe, übers. im Gothaischen Magazin für d. Neueste u. s. w. 8. B. 4. C. 1. 9. B. 1. u. 4. St.) bestand vor der Erdbildung eine primitive Masse aus bloß schweren Elementen ohne Zusammenhang und Affinitäten, die erst unter Vermittelung des Lichts hervortraten, worauf der Erdkörper erst selbst entstand. Sullivan (a View of nat. Lond. 1794, übers. Leipz. 1795,) setzt allen diesen Theorien die Bemerkung entgegen: daß jede Cosmogonie und Geogenie doch immer wenigstens auf Ein Wunder hinoutstiehe, (das sich aller Erklärung entziehe) nämlich das: wodurch das nicht Existirende zur Wirklichkeit gelangt. Er leiht davon den Satz ab, daß es unmöglich sei, eine Theorie der Schöpfung aus naturhistorischen Principien aufzustellen, sondern daß wir bloß darauf beschränkt seien, die Ursachen der successiven Veränderungen der schon geformten Natur erforschen.



mittleres Gewicht auszumitteln gesucht. Nun wiegt 1 Cubik-  
Wasser 72 Pfund, Sand 132 Pfund, Schieferstein 156 Pfund,  
mehr die compactern Steine, besonders die metallhaltigen, ein  
Cubikfuß gewöhnlicher Erde aber 95 Pfund. Wenn man nun mit  
Pater Mersenne einen Cubikfuß Erde zu 100 Pfund rechnet,  
würde nach dessen, wiewohl noch mancher Rectification bedürftigen  
rechnung der ganze Erdkörper, vergleichungsweise mit wägbaren  
Mäßen auf ihm, ein Gewicht von etwas über 3 Quadrillionen Pfund  
haben <sup>52</sup>.

Mehr wissenschaftliches Verdienst haben diejenigen Versuche, durch  
man die Abweichung der Richtung der Schwere auf der Erde,  
die sich bekanntlich durch das Senkblei und die darnach bestimmte  
rechte Linie, (wovon auch der Scheitelpunct am Himmel abhängt,)  
erregt, durch Seitenattraction von Bergen, die sich durch Masse,  
durch ihre Form auszeichnen, in deren Nähe man das Senkblei  
hängen läßt, hat bestimmen wollen. Von diesen verdienen besonders  
die von Maskelyne am Berge Schiehallien in Schottland angestellte  
Versuche <sup>53</sup> hier Bemerkung, aus denen Hutton <sup>54</sup> sich zur  
Anerkennung berechtigt glaubte: daß die Erde nicht nur durchaus mas-  
siger, sondern daß auch der Erdkörper, (wahrscheinlich wegen eines  
höheren, und auf  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{1}{2}$  anzuschlagenden Metallgehalts,)  $4\frac{1}{2}$   
mal dichter als das Wasser sei, wornach obige problematische Summe  
der absoluten Schwere der Erde sich wenigstens um das dreifache  
erhöhen würde. Wenn indessen den Versuchen und den darauf sich  
grundenden Berechnungen zu trauen ist, welche Cavendish bekannt  
gemacht hat, die sich auf einen von Coulumb erfundenen Apparat  
gründen, der wesentlich in einer feinen Drehwaage besteht, an wel-  
cher Bleikugeln aufgehängt, und mittelst ihnen genäherter Bleimas-

22) Die Berechnung gibt: 5,161,589,729,420,263,959,360,000. S. Bruzen la  
Martiniere's geogr. Kelt. Per. 4. Th. S. 1287. 53) Schon Bouguer  
und de la Condamine hatten gefunden, daß der Eithumborasso in Südamerika  
das am Quadranten hängende Bleiloß gegen sich von der lothrechten Linie abzog.  
Sie bestimmten durch mehrere, auf der Nord- und Südseite des Berges gemessene  
Höhen der Sterne diese Abweichung auf 7" bis 8". Diese Beobachtungen  
erregten den Wunsch, die Anziehungen mehrerer Berge zu messen, um dadurch  
auf die mittlere Dichtigkeit der Erde schließen zu können. Der K. Astronom  
zu Greenwich, Nevil Maskelyne, legte der Societät zu London einen Plan  
dazu vor, den er auch im Sommer 1774 ausführte. (Phil. transact. Vol. LXV,  
for 1775, nr. 48, 49.) Der Berg Schiehallien in Perthshire schien vorzüglich  
dazu geschikt, weil er einzeln steht, sich von Osten nach Westen streckt, dabei  
aber von Norden nach Süden steil ist und eine schmale Grundfläche hat. Es  
kam darauf an, südlich und nördlich vom Berge die Abstände einiger Fixsterne  
vom Scheitel zu messen. Das Resultat von 169 Beobachtungen auf der Süd-  
seite, und 168 gleichen auf der Nordseite an 43 Sternen, von welchen 40 mit  
einander verglichen wurden, war ein Unterschied der Scheitelpuncte beider Orte  
von 54.6 Sec. Nach geometrischen Messungen fand aber nur ein Unterschied der  
Breite von 42.94 Sec. Statt, so daß also die beiden entgegengesetzten Anzie-  
hungen des Berges diesen Unterschied um 11.66 Sec. zu groß machten. 54)  
Die gedachten Abmessungen wurden noch bis zum Jahr 1776 fortgesetzt und be-  
richtigt. Hutton (Phil. transact. Vol. LXVIII, for 1778, nr. 33.) be-  
rechnete, daß sich die Anziehung der Erde zur Anziehung des Berges gegen das  
Bleiloß wie 9 : 5 verhalte. Da aber der Berg aus einem gleichförmigen Granit  
besteht, dessen Dichtigkeit  $2\frac{1}{2}$  Mal größer als die Dichtigkeit des Wassers ist;  
so gründete er darauf die oben angegebene Berechnung der Erddichtigkeit.

sen durch einfache Attraction in fibrirnde Bewegung gesetzt werden; ist die Erddichtigkeit noch etwas größer, nämlich zu 5,48 gegen die spezifische Schwere des Wassers zu schätzen<sup>55</sup>. Indessen kann absolut da die Körpertheile, woraus die Erde besteht, gegenseitig auf einander drücken und der allseitige Druck dadurch eine Indifferenz wirkt von einem eigentlichen Gewicht der Erde gar nicht die Rede seyn und in dieser Hinsicht mochte Archimedes vollkommen Recht haben, indem er, um die ganze Welt zu bewegen, bloß einen Stützpunkt außer ihr forderte.

Alle Gravitation der Körper gegen einander ist eine gegenseitige (vgl. den Artikel Schwere.) Ein kleinerer Körper zieht einen größern eben so gut an, als der größere den kleinern, und zwischen beiden kann ein Gravitationspunct unterschieden werden, nach dem sie gemeinschaftlich hinstreben, der aber dem größern Körper um so näher liegt, als er selbst an Masse den kleinern übertrifft. Ist er also jenem unendlich, oder doch in einer ungeheuern Zahl überlegen; so ist auch die Gravitation des großen Körpers gegen den kleinen ein relatives Nichts. Ein solches ist die Gravitation der Erde gegen alle auf der Oberfläche der Erde fallende Körper; denn jeder zieht, aber nur in der unendlichen Geringfügigkeit, als er selbst an Masse den Erdkörper nachsteht, den ganzen Erdkörper im Fallen zu sich heranzieht, als er mit gegenseitiger Ueberlegenheit an den Erdkörper gezogen wird und auch diese geringfügige Gravitation wird durch die Menge von allen Theilen der Erdoberfläche her auf ihn gleichzeitig fallender Körper ausgeglichen. Aber in der Gravitation der Weltenkörper gegen einander, so wie besonders des Mondes und der Erde, ist dieß Verhältnisß als ein gegenseitiges schon bemerkbar, und dient zur Erklärung von einzelnen Naturphänomenen, wie z. B. der Ebbe und Fluth.

Die Intensität der Gravitation ist uns auf der Erdoberfläche in der Wahrnehmung gegeben; sie stellt sich in der Schnelligkeit dar, mit der ein fallender Körper in gerader Linie, bloß durch die Schwerkraft getrieben, in einem kleinsten Zeitraum zur Erde fällt. Diese beträgt in einer Secunde 15 $\frac{1}{2}$  Rheinländische Fuß<sup>56</sup>. Das Gesetz der Beschleunigung dieser Bewegung durch den Fall selbst ist aber folgendes: Die Räume, welche der fallende Körper ungehindert zurücklegt, verhalten sich wie die Quadrate der Zeiten, die er dazu braucht. So wird also in zwei Secunden ein vier Mal größerer, in drei Secunden ein neun Mal größerer, in vier Secunden ein sechzehn Mal größerer Raum durchstrichen, oder was auf dasselbe hinauskommt: ein Körper, der in der ersten Secunde den oben gedachten Raum zurücklegt, eilt in der zweiten durch drei, in der dritten durch fünf, in der vierten durch sieben solcher Räume und so fort, bis er an seinen Ziel ist. Um so viel stärker ist aber auch nach den Gesetzen des Stoßes sein Aufstossen, wenn er dieses erreicht hat, oder auch in gleichem Verhältnisß die Gewalt, die er theils selbst erfährt, theils ausübt, wenn er in dieser seiner Bewegung einen Zwischenkörper findet.

<sup>55</sup> S. diese Bemerkung in Parron's Grundriß der Physik der Erde S. 47, wo das letztere Resultat als das wahre spezifische Gewicht der Erde seinen fernern Untersuchungen zu Grunde liegt. <sup>56</sup> noch genauer nach Hungen's 15,625 Rheinländische Fuß, (der sich zum Pariser Fuß, als dem sechsten Theil einer Elle, wie 30 zu 29 verhält).



Die in dem ersten Moment sich äußernde Schwere, die dem Grad nach dem Druck eines Körpers auf einen untergelegten, d. i. zwischen ihm und dem Erdkörper befindlichen, gleich kommt, ist aber im Verhältniß der Annäherung der Körper an einander. In derjenigen Erde, die zugleich die Grenze unsers Aufenthalts auf der Erde ist, oder Unterschied der Abnahme der Schwere, ob er gleich dem Quadrat der Entfernung proportionirt ist, kaum merklich. Daß er es jetzt nicht ganz ist, geht aus den Versuchen mit Pendeln hervor, die man in der Nähe des Aequators in der Ebne, und wieder auf verschiedenen Berghöhen gemacht hat, indem die Pendelschwingungen hier geringer werden, als sie nach Berechnung wegen alleiniger Abnahme der Schwere durch Vermehrung der Schwingkraft werden müßten <sup>57</sup>. Sehr bedeutend ist aber der Unterschied in derjenigen Entfernung, in welcher der Mond sie umkreist, und schon so merklich; so, wie aus der Geschwindigkeit der Mondesbewegung sich ergibt, daß der Mond gegen die Erde nur mit einer solchen Kraft angezogen wird, die Folge deren, hätte er keine entsprechende Seitenbewegung, er, um einen Raum von etwa 15 $\frac{1}{2}$  Rheinländischen Fuß zurückzulegen, welchen ein Körper nahe an der Erdoberfläche in der ersten Secunde durchläuft, etwa 60 Mal so viel Zeit, oder etwa eine Minute brauchen würde. Nach Berechnung ist aber die Gravitation des Mondes gegen kleinere Körper in seiner Nähe nur etwa  $\frac{1}{2}$  der Schwere der Erde auf ihrer Oberfläche, wogegen nach gleichen Berechnungen auf der Oberfläche der Sonne ein fallender Körper schon in der ersten Secunde seines Falles 311 Fuß durchläuft, welche Schwere die auf der Erdoberfläche nur um mehr, als 20 Mal übertrifft.

Ein fallender Körper wird aufgehalten und in seiner Bewegung retardirt, wenn er durch ein Medium fällt, daß er erst durch sein Gewicht trennen muß, wie schon beim Fall in der und durch die Erdatmosphäre, ferner in Bewegung auf einer schiefen Fläche in dem Verhältniß der Friction, welche der sich senkende Körper erfährt. Feste Körper fallen, wenn ihr Schwerpunct nicht unterstützt ist, d. i. wenn mehr oberirdische Theile ununterstützt als unterstützt sind, und die unterstützten Theile nicht etwa durch Cohärenz den ununterstützten eine Bestätigung geben. Lockere feste Körper, wie ein Sandhaufen, senken sich, wenn der Winkel, in dem sie pyramidenförmig über einander liegen, nicht ein größerer als wenigstens 45° ist. Flüssige dagegen rutschen sich, oder laufen ab, wenn auch der Abhang noch so gering ist, ja breiten selbst nach den Gesetzen der Bewegung der Flüssigkeit sich auf Horizontalflächen aus. Von diesen Bestimmungen der Schwere wird in einzelnen Artikeln noch später die Rede seyn. In allgemeinen verdient aber hier diejenige Modification der Schwere besondere Bemerkung <sup>58</sup>. Nach den Beobachtungen von Bouguer und Condamine (la figure de la terre determinee etc. à Paris 1749, 4.) kommen auf 98,770 tägliche Pendelschwingungen am Ufer des Amazonenflusses, zu Quito (1606 Toisen höher,) 30 und auf dem Berge Pichinche, (2498 Toisen höher,) 50 Schwingungen weniger. Nach der aus dem Gesetz der Verminderung der Schwere nach dem Quadrat der Entfernung hergenommenen Theorie sollte aber diese Verminderung auch mit Berücksichtigung der eignen Anziehung des Bergs noch mehr, als doppelt so groß ausfallen, woraus Parrot (a. a. O. S. 38) sich nach Berechnung zu dem Schlusse berechtigt glaubt, daß unter dem Ptoleu von Quito eine Höhlung in dem Erdkörper von etwa 1,2 geogr. Cubikmeilen sich befinden müsse.

kung, die dieselbe durch eine Seitenbewegung des fallenden Körpers erfährt. Es ist nämlich bekannt, daß ein auf der Erdoberfläche in horizontaler Richtung geworfener Körper in einer Curve, oder in einem Bogen zur Erde fällt, die dadurch beschrieben wird und ihre Form erhält, daß, (mit Nichtachtung des Widerstandes, den das Medium — die Luft — durch die er hindurchgeht, in seinem Laufe macht,) die ihm mitgetheilte horizontale Bewegung ihrem Triebe nach sich gleich bleibt, die perpendiculäre Bewegung durch den Fall aber in der angegebenen Weise wächst. Ein Körper, der in einer solchen Curve sich bewegt, hat nun, während seiner Bewegung nicht diejenige Schwere, die er haben würde, wenn er durch dieselbe allein getrieben würde, sondern nur noch diejenige, welche ihm übrig bleibt, wenn man den Beizug der Kraft, die ihn in einer Seitenrichtung, zu bewegen strebt, davon abzieht. Da nun der Erdplanet, in der Bewegung um seine eigene Ase, die einzelnen Körper in und auf ihm in eine solche Seitenbewegung versetzt, diese Seitenbewegung aber, ihrer Intensität nach als Schwingung, eine verschiedene ist, je nachdem einzelne Theile der Erdoberfläche näher oder ferner liegen; so folgt: daß die Schwere der Körper auf der Erde um deswillen noch eine verschiedene seyn müsse, und da auf den Polen die einzelnen Körper auf der Erdoberfläche auf der Erdbachse selbst liegen, werden sie hier auch lediglich durch das Schwerprincip allein, durch die Schwerkraft aber gar nicht bewegt. Je mehr sie aber nach dem Aequator zu ihre Lage haben, desto mehr wird ihre Schwere, und zwar im Verhältniß des Quadrats der Entfernung, vermindert, so daß auf dem Aequator, wo die Entfernung von der Erdoberfläche die eines halben Erdburchmessers ist, diese Verminderung ihr Maximum erreicht.

Auf demselben Grundsatz beruht die Kreisbewegung aller Weltenkörper. Es sind nämlich die Richtungen, in denen sie auf verschiedenen Puncten ihrer Bahn durch ihre Schwere nach dem Centralkörper gezogen werden, nirgends parallel, wie sie in den nächsten Puncten wohl zu seyn scheinen, sondern überall convergirend. Nach der Seitenbewegung aber, die ihnen verliehen ist, streben sie, sich in einer geraden Richtung, die mit der der Gravitation einen rechten Winkel bildet, von dem Centralkörper zu entfernen, oder haben Centrifugalbewegung, im Gegensatze jener centripetalen. Durch die gemeinschaftliche, einander proportionirte Wirkung beider aber bleiben sie in kreisförmiger Bewegung, oder wenn eine von beiden Kräften der andern temporär überlegen ist, so gleicht sich dieß durch Beschleunigung oder Verzögerung der Bewegung, (die das nothwendige Resultat dieses Mißverhältnisses ist, so aus, daß die Kreisbahn dadurch um so viel mehr oder minder in eine Ellipse ausgezogen wird.

Daß aber auf der Erdoberfläche eine, die Richtung der Schwere modificirende Seitenbewegung, und zwar von Westen nach Osten, also eine wirkliche Rotation der Erde selbst, (nicht eine tägliche Bewegung der Himmelskörper um sie,) Statt habe, hat, (wenn es nach dem früher Bemerkten noch eines Beweises bedürfte,) in neuerer Zeit Benzenberg<sup>58</sup> auch auf empirischem Wege evident dargethan, in-

<sup>58</sup>) Versuche über das Gesetz des Falles, über den Widerstand der Luft und über die Umdrehung der Erde, nebst der Geschichte aller frühern Versuche, Dortmund 1804, 8.



ni er von einer bedeutenden Höhe herab in einen verschlossenen Raum Bleifugeln fallen ließ, und fand, daß sie wegen der aus dem ertern Abstand von der Erdmitte mitgebrachten größern Schwingkraft so viel weiter östlich von der Perpendicularlinie abwichen, als sich jener Voraussetzung dieß der Fall seyn mußte. Daß ferner die Schwere in den Aequatorialgegenden der Erde wirklich geringer sei, in den den Polen näher gerückten, ist besonders dadurch in der Erfahrung erkannt worden, daß Pendel, wenn sie sich, (wie z. E. Uhren,) gleichmäßig bewegen sollen, in den Aequatorialgegenden öfter gemacht werden müssen<sup>59</sup>. Eine natürliche Folge davon ist, daß die beweglichen Theile der Erde, wie namentlich das Meerwasser, wegen des größern Schwungs der Erde sich in verhältnißmäßig größrer Menge daselbst anhäufen müsse. Wär nun die Erde ihrer Form nach nicht eine etwas abgeplattete Kugel; so würde das feste Land in den Aequatorialgegenden ganz überschwemmt seyn. Zufolge jener Bildung ist aber die ganze Aequatorialgegend als ein über die Erdoberfläche hervorragender breiter Bergrücken anzusehen, wodurch das auf der Erdoberfläche erforderliche Verhältniß des festen Landes zum Wasser hergestellt wird. Würde aber aus irgend einer Ursache der Umdrehung der Erde aufhören, oder auch nur langsamer erfolgen; so würde der größte Theil des Meerwassers, das jetzt in den Aequatorialgegenden ist, nach den Polargegenden zu zurückströmen, und der größte Theil des festen Landes auch in den gemäßigten Zonen unter Wasser gesetzt werden. Würde aber gegenseitig diese Bewegung noch mehr beschleunigt, so würde sich der größere Theil des Meerwassers in den Polen her nach dem Aequator hinziehen, sich da anhäufen, so daß ein großer Theil des mit Wasser bedeckten Bodens, besonders in der nördlichen Hemisphäre ins Trockne kommen. Ja wenn die Umdrehung der Erde so beschleunigt würde, daß ein Punkt derselben 21,000 Fuß in einer Secunde durchläuft; so würden nicht nur das Wasser daselbst, sondern auch alle Theile mit dem Erdkörper bedeutend cohäerirenden Körper von dem Erdkörper losgeschleudert werden, und denselben in kleinen Distanzen trichterartig umkreisen.

Es erhellt hieraus, wie die Rotationsbewegung der Erde nicht nur, wie oben berührt wurde, abwechselnd Tag und Nacht zu theilen, sondern auch, um das organische Leben auf ihrer Oberfläche zu erhalten, nothwendig sei.

Wir übergehen jetzt die besondern Modificationen der Attraction, indem sie electiv wirkt, den einzelnen Körpern auf der Erde ihre

<sup>59</sup>) S. Newton's princ. math. philos. natural. prop. 20. Nach neuern Versuchen von Richer und Borda ist der Pendel, der zu Paris Secunden abtheilt, 440' 6''' lang, zu Cayenne muß er um  $1\frac{1}{2}'''$  verkürzt werden. Mithin ist die Schwere zu Paris und zu Cayenne  $= 352,5 : 351,5$ . Das Resultat aus den Schwingungszahlen gibt ein Verhältniß  $= 360 : 359$ , indem der Secundenpendel zu Paris täglich 86,400, derselbe zu Cayenne aber nur 86,280 Mal schwingt. Nach Berechnungen würde die Secundenpendellänge gerade unter dem Aequator  $= 439,2$ , und am Pole  $= 441,747$  seyn, woraus die Abplattung der Erde nach den Polen zu noch auf eine andere Art Bestätigung erhellt. Doch bedarf diese Art der Berechnung mancherlei Correctionen; denn nach ihr allein würde sich der Polardurchmesser der Erde zum Aequatorialdurchmesser wie 184 : 185 verhalten.

besondern Qualitäten verleiht, da wir uns hier bloß mit dem unersättlichen Leben der Erde beschäftigen. Desto mehr aber verdient jene besondere Aeußerung der Attraction hier Bemerkung, die sich in den Erscheinungen des Magnetismus zu erkennen gibt.

2) Wenn uns in der Erkenntniß der Phänomene der Schwere die Mathematik noch ein etwas zu Hülfe kam, um klare Einsicht von ihnen zu gewinnen; so sehen wir uns in Erkenntniß des Erdmagnetismus lediglich auf die Wahrnehmung beschränkt.

Ueber die allgemeine Erscheinung des Magnetismus aber müssen wir auf den Artikel Magnetismus verweisen. Hier kommt es bloß darauf an, das zusammenzustellen, was auf den Magnetismus in so fern er sich an den Erdkörper überhaupt veroffenbart, Bezug hat.

Das Wesen des Magnetismus scheint im allgemeinen darauf hinauszukommen, daß in denjenigen Körpern, an welchen magnetische Erscheinungen sichtbar sind, oder mittelst anderer magnetischer Körper aufgeregt werden können, (worin sich besonders das Eisen auszeichnet,) entgegengesetzte Strebungen frei werden. Die Richtungen dieser Strebungen werden als magnetische Pole bezeichnet, wovon die Erfahrung lehrt: daß entgegengesetzte, (befreundete,) Pole sich anziehen, gleichnamige, (feindliche,) aber sich abstoßen. Nur äußert sich aber der Erdkörper selbst in der Richtung seiner Pole gegen magnetische Körper, (die künstliche Magnetnadel,) als ein Magnet, jedoch mit der merkwürdigen, bisher noch nicht erklärten Modification, daß die Richtung, in welcher eine in magnetischen Zustand gesetzte, und in ihren Mittelpunkt so leicht in horizontaler Stellung unterstützte eiserne Nadel, daß sie durch Friction ihrer Drehung nur den möglichst kleinsten Widerstand leistet, mit dem einen ihrer Pole dem Nordpole der Erbkugel sich zuwendet, nicht immer genau die Richtung der Erbachse ist, mit andern Worten, daß die Magnetnadel nicht genau nach Norden zeigt, sondern bald östlich, bald westlich abweicht, oder eine Declination zeigt. Dieser Declinationswinkel des magnetischen Meridians, oder der Richtung der Magnetnadel und der Erbachse, ist weder an allen Orten, noch an Einem Orte zu allen Zeiten gleich, sondern nimmt nicht nur in Zeiträumen von mehreren Jahren, ja sogar in Einem Tage ab und zu. Diese Veränderung steht auch mit mancherlei Naturereignissen, Witterungswechseln besonders electrischen Erscheinungen, am meisten aber mit dem Nordlicht <sup>60</sup> in noch nicht hinlänglich ausgemitteltem Zusammenhang.

Ueber die constanten Declinationen der Magnetnadel sind nach Beobachtungen folgende Grundsätze aufgestellt. Es finden sich auf der nördlichen Erbhemiſphäre vier Linien, auf der südlichen aber zwei, wo die Magnetnadel gar keine Declination zeigt. Die erste dieser Linien auf der nördlichen Hemisphäre findet sich an den Westküsten der Hudsons-Bay, die zweite auf der Grenze des Europäischen und Asiatischen Rußlands, die dritte ein wenig östlich von Irkutsk, die

60) Die Nordlichter halten mit den Richtungen der Magnetnadel gleichen Gang und erscheinen darnach auf der nördlichen Hemisphäre bald mehr nordöstlich, bald mehr nordwestlich, auf der südlichen bald mehr südöstlich, bald mehr südwestlich. Während ihrer Erscheinung ist die Nadel am unruhigsten, am meisten wenn das Nordlicht seine Stellung ändert.



orte zwischen Jesso und Kamtschatka. Auf der großen Strecke von ersten zur zweiten Linie, so wie auf der kleinen zwischen der dritten und vierten ist sie westlich, auf der kleinen zwischen der zweiten und dritten, wie wieder auf der großen zwischen der vierten und der ersten, ist sie östlich. Es ergeben sich hieraus zwei westliche und zwei östliche Systeme, jedes von verschiedener Ausdehnung, die mit einander abwechseln. Auf der südlichen Hemisphäre sind nur zwei große östliche Systeme, bei  $60^\circ$  Abstand südlicher Breite zwischen  $33^\circ$  und  $260^\circ$ , und zwischen dem  $261^\circ$  und dem  $8^\circ$  der Länge von Ferro. Beide hatten früher ein kleineres westliches zwischen sich, wovon sich keine Spur weiter zeigt. Man will bemerkt haben, daß die östlichen Systeme eine östliche Bewegung haben, jedes aber mit einer verschiedenen Geschwindigkeit. Das erste nördliche würde nach der Berechnung 1733 Jahre brauchen, um alle 360 Grade der Erde einzeln zu durchlaufen, das entgegengesetzte dritte bewegt sich ungefähr die Hälfte langsamer. Seine Umdrehungszeit war nämlich nur 44 Jahr. Ueberhaupt stehen die berechneten Umdrehungen aller vier östlichen Systeme in dem Verhältnisse: 2, 3, 4, 10, denen folgenden Umdrehungszeiten: 864, 1296, 1728, 4300 entsprechen; das erste südliche System würde in 4000 Jahren, das zweite etwa 1800 Jahren seinen Umlauf machen. Doch mögen wohl alle diese Berechnungen noch mancher Berichtigung bedürfen<sup>61</sup>. Nach Beobachtungen zu Paris vom Jahre 1550 betrug damals die östliche Declination  $8^\circ 10'$ , im Jahre 1663 war sie 0, von da an begann die westliche Declination, und stieg bis zum Jahre 1804 bis zu  $22^\circ 15'$ . In den letztern Jahren ist sie wieder in Abnahme begriffen. Im Jahr 1815 war sie  $15^\circ 32'$  westlich.

Ueber die tägliche Variation der Magnetnadel hat besonders Cassini in den Jahren 1783 — 1798 genaue Beobachtungen angestellt<sup>62</sup>. Er fand, daß vom Mittag bis Nachmittags 3 Uhr die Nadel gewöhnlich unbeweglich ist, dann bis Abends um 8 Uhr dem Mitternachtpunct etwas näher rückt, und bis gegen 8 Uhr des Morgens stehen bleibt, wo sie sich dann gegen Mittag wieder um eben so viel von entfernt, als sie sich Tags vorher ihm genähert hatte. Diese oscillatorische Bewegung zeigt aber wieder Unterschiede. Von der Frühlingsnachtgleiche bis zum Sommersolstitium ist die Nadel etwas rückgängig; oder die westliche Declination nimmt ab, von da aber bis zum folgenden Frühlingsnachtgleiche, (also neun Monate lang,) nimmt sie wieder zu, als Folge davon, daß die westliche Declination jährlich zunimmt. Die Unterschiede sind überhaupt in den Grenzen von 18 Minuten besetzt.

Hutton<sup>63</sup> erklärt die täglichen Variationen aus der durch die Haken hat die ersten Abweichungsarten der Magnetnadel für das Jahr 1700 auf einer Karte verzeichnet, (Philos. transact. No. 195.) Lambert hat eine neuere Karte für das Jahr 1772 entworfen. (S. Verh. astron. Jahrb. 1799, Taf. 2.) Außerdem haben Hutton und Marsden für die nördliche Hemisphäre Cook, Gournear, Latham, Marsden für die südliche Beobachtungen angestellt. Vgl. Abweichungen und Neigungen der Magnetnadel, beob. auf Cook's dritter Entdeckungsfahrt 1776 — 1780, angez. v. Gilbert in seinen Annalen d. Phys. 35, B. S. 206. 62) S. De la declinaison et des variations de l'aiguille aimantée par Mr. Cassini, à Par. 1791, 4. 63) Phil. transact. Vol. LI. P. I. p. 598.

Wärme geschwächten magnetischen Anziehung, fand aber doch auch schon kleinere Abweichungen, die von Zufälligkeiten oder Witterungszuständen abhängig erschienen.

Von der Declination der Magnetenadel ist die Inclination derselben verschieden. Wenn nämlich eine wagrecht gestellte eiserne Nadel magnetisch gemacht wird; so beugt sich die Spitze derselben nach dem Horizont, oder senkt sich. Dieser Winkel der Nadel mit dem Horizonte, (der durch ein besonderes Werkzeug, das Inclinatorium, gemessen werden kann,) ist eben so ungleich, als der der Declination. Die nördliche Inclination nimmt mit der Annäherung nach dem Nordpol zu. Auf Spitzbergen beträgt sie  $81^{\circ} - 82^{\circ}$ , in Frankreich, England, Deutschland ist sie  $71^{\circ} - 73^{\circ}$ , noch jenseit des Aequators unter dem  $11^{\circ}$  südlicher Breite und  $34^{\circ}$  Länge ist sie  $9^{\circ}$  beobachtet worden. In südlichen Breitengraden wird sie südlich, auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung  $41^{\circ}$  südlich. Sie variirt aber sehr nach den Längengraden, auch an Einem Ort im Fortgang der Zeit doch langsam.

Man hat die Richtungen des Magnets oder magnetischen Eisens nach dem Nord- und Südpol dadurch zu erklären gesucht, daß man entweder einen unterirdischen anomalistischen Magnet von vier Polen wie Halley, oder auch einen großen Erdmagnet von zwei Polen deren Lage aber Veränderungen ausgesetzt wären, wie Euler und Meyer annahm. Aber die magnetische Eigenschaft der einzelnen magnetischen Körper ist vielmehr aus dem Erdmagnetismus, als der Erdmagnetismus aus jenen zu erklären, (welches auch außer mehreren magnetischen Erscheinungen darin seinen Bestätigung findet, daß eine in den magnetischen Meridian horizontal gebrachte Eisenstange sogleich magnetische Polarität annimmt,) und die Ursache, warum einzelne Körper magnetisch sind, ja nicht minder in Dunkel gesetzt und nur aus unmittelbarer Wahrnehmung erkennbar, als der Erdmagnetismus überhaupt. Indessen deuten doch die oben gedachten Phänomene der Declination und Inclination der Magnetenadel auf ein großes Geheimniß hin, das die äußere Erdrinde in der Tiefe des Erdkörpers umschließt, dessen Enthüllung vielleicht der spätern Zukunft vorbehalten ist, wodurch dann über manche Verhältnisse des Erdenlebens ein helleres Licht verbreitet werden dürfte.

3) Mit den Phänomenen der Electricität, die wir ebenfalls als eine Aeußerung des Erdenlebens ansprechen müssen, hat der Magnetismus das Uebereinstimmende, daß sie sich, wie dieser, ihrem innern Wesen nach eben so polarisch, (nämlich als  $+$  und  $-$  E entsprechend  $+$  und  $-$  M) äußert. (Vgl. Electricität.) Indessen zeichnet sie sich besonders durch die mit ihr verbundenen Lichterscheinungen und die in ihr sich veroffenbarende Ueberlegenheit der freithätigen mehr expansiv als contractiv sich äuffernden Kraft über den körperlichen Stoff in Aufhebung seiner Cohäsionsverhältnisse aus.

Wir sehen die Erscheinungen der Electricität am Erdkörper im Gewitter, besonders in dem Blitz am nächsten gelegt. So wie aber in der Atmosphäre die Wasserbildung zunächst mit ihr in Verbindung steht; so hat die Erdelectricität im Innern des Erdkörpers gewiß ein weit größeres Feld, als noch jetzt erkannt ist. Nicht nur stellt sie bei



bildenden Wolken die Erdelectricität, vornehmlich an den Spizen Gebirge, sich als relativen Gegensatz der atmosphärischen Electricität dar, sondern auch die, eben so wie Wolken- und Regenbildung oder Luft über der Erdoberfläche, wechselnden Wassererzeugungen und Wasserzuflüsse in den Berggruben, die die Bergleute ebenfalls betonen; die vulkanischen Ausbrüche und die Erderschütterungen stehen mit der Erdelectricität in unlängbarem, wenn auch nur theilweise erkanntem, Zusammenhang.

Es ist bereits unter dem Artikel Electricität bemerkt worden, und es wird auch bei spätern Artikeln wieder zur Sprache kommen, in welchem nächsten Bezug Electricität, Wärme und Licht mit einander stehen. Es muß dahin gestellt seyn, ob und wie fern die stete, doch in unterschiedlichen Punkten der Erdoberfläche auch in unterschiedlicher Tiefe erst bemerkbare gleichmäßige Temperatur, und also die Wärme des Erdkörpers ein Product der Erdelectricität ist. Eine Analogie derselben mit der Wärme des thierischen Körpers ist nicht zu verkennen.

Uebrigens mögen wir Wärme und Lichtprincip, jedes für ein eigenes, oder beide als ein gemeinsames, aber von der Electricität vermitteltes, oder auch beide von gleicher Natur mit dieser erachten; so daß Wärme und Licht als eigne Manifestationen freier Thätigkeit der Natur in unendlichen, täglich und stündlich zu beobachtenden Fällen unerkennbar. War dieß nicht, so würde ohne Vermittlung der Sonnenstrahlen, oder eines andern Himmelslichts, weder eine Erwärmung, noch eine Erhellung auf der Erde, und also auch keine Feuererzeugung, möglich seyn. Im Nordchein aber tritt wieder ein theil von der Erde erzeugtes Licht, Electricität und selbst Magnetismus, in ein, wiewohl ebenfalls nur theilweise erkannte, Verbindung.

Wenn übrigens die Wärme und das Licht dadurch von Electricität, als Gesamtheit der sinnlichen, von jedem andern scharf unterscheidbaren electrischen Phänomene sich auszeichnen, daß sie nicht an einen besondern Körper fixirt werden können, und sich durchaus nur passiv oder strahlend äußern; so haben sie als solche Thätigkeiten in Hinsicht ihrer peripherischen Verbreitung und der dieser entsprechenden Verminderung ihrer Intensität den Schall in ihrer Mitte. Dieser kann, in so fern man von der Perception des Tons abstrahirt, und also sein Wesen bloß in das Dröhnen oder Vibriren eines in Spannung gesetzten Körpers setzt, (indem das Hören doch immer nur ein dem Gehörorgan selbst mitgetheiltes und nur erst hier vermitteltes Vibriren oder Dröhnen, so wie das Sehen eine Erleuchtung der Netzhaut des Auges ist,) als eine Erdthätigkeit angesprochen werden, und manifestirt sich nicht nur im Donner, im Rauschen der Meereswogen, im Brausen des Sturms, sondern auch auf andere Weise, wo auch keine individuelle organische Natur durch laute Laute, wie in dem Vogelgesang, den Thiersstimmen, oder auch durch willkürliche Bewegungen hervorgebrachte Geräusche, ihr inneres eigenthümliches Leben bezeugt.

4) Was wir bisher, (Nr. 1 — 3,) betrachteten, waren aber nur die, nur in der Abstraction für sich bestehende Seiten des Erdorganismus. Unmittelbar aber thut sich dieses in der Wahrnehmung in den

unendlichen Gebilde kund, die in den mannigfaltigsten Gestalten in steter Wiederholung derselben Form, aber mit stetem Stoffwechsel aus der Erde Schooß hervorsprossen, und nach längerer oder kürzerer Dauer wieder formloses Material für neue Gebilde werden. Nicht erklärt, aber scharf, und in so fern auch richtig bezeichnet wird die Princip durch den umfassenden Namen Bildungstrieb. (Vg. diesen Artikel.) Es äußert sich also nicht bloß durch Fähigkeit zu Bildung, sondern durch einen innern Drang dazu, und wenn wir von allem, was gebildet wird, als erst hierdurch hervorgehendes Zeugniß abstrahiren, ist nichts in der Natur vorhanden, dem man die Bildung einzelner Wesen nach Formen und Zwecken als Eigenschaft beilegen könnte, als eben der Erdkörper in seiner Gesamtheit.

Durch die nach Zwecken bestimmbarren Formen der einzelnen Gebilde ist diesen selbst zugleich der Charakter der Selbstständigkeit verliehen, die aber immer nur eine relative ist, jedoch in verschiedenen Abstufungen, und daher auch in diesen verhältnißmäßiger Abnahme der Relativität hervortritt. Auf der niedrigsten Stufe der Selbstständigkeit stehen die einfachen Erdengebilde in mehr oder minder unterscheidbarer crystallischer Form, die Erden, (nach Oken,) oder was man überhaupt als Mineralien befaßt; sie sind mit dem Erdkörper selbst verwachsen, oder in fester Cohäsion verbunden, oder haben doch den Charakter, es früher gewesen, und nur gewaltsam von ihm getrennt zu seyn. Sie sind überhaupt die zunächst den Erdkörper constituirenden Theile. Die Mittelstufe nehmen die Pflanzen ein. Sie sind auch an sich mechanisch mit dem Erdkörper verbunden; aber dieser, in dem er sie durch ihre Wurzeln mit sich selbst zu Einem Ganzen vereint, dient ihnen doch mehr nur als Boden, über den hervorragend sie in Licht und Luft ihr eigenthümliches Leben suchen und finden. Auf der obersten Stufe steht die gesammte Thierwelt, (mit Ausnahme der niedern Thierclassen, die die Uebergänge zu den Pflanzen und den Erden machen.) Sie sind in so fern von der Erde losgelassen, daß sie aus eignen erwachten Kräften, nach den Bedingungen ihrer Organisation, in größern oder kleinern Kreisen sich auf der Erdoberfläche bewegen können, aber doch nicht bloß durch ihr Nahrungsbedürfnis, sondern zunächst durch das auch sie beherrschende Schwerprincip an die Erde gebunden bleiben, so daß auch der Mensch in dem Besitz der Mittel, von des Meeres Gründen und den tiefsten Erdhöhlen auf bis zu den höhern Wolkenregionen in jeden Raum zu gelangen, der nur irgend einem lebenden Wesen zugänglich ist, doch die ihm sowohl in der Erde, Tiefen, als in den obern atmosphärischen Räumen gezogenen Grenzen seines Weiterdringens nicht zu überschreiten vermag; ja selbst in einzelne Gegenden der Erdoberfläche, wie z. E. in die äußersten Polar Gegenden, noch bis jetzt vergebens zu dringen gesucht hat, und also weit davon entfernt ist, die Erde als Herr zu beherrschen, vielmehr allseitig an seine Abhängigkeit von ihr, als Erdensohn, erinnert wird.

Wenn aber die Erde auf diese Weise Princip für alles, auch das höchste Leben auf derselben ist; so ist sie dieß doch nur von einer Seite, keineswegs als selbstständiger Naturkörper, sondern lediglich



ihrem allgemeinen cosmischen Verhältniß, und insbesondere in ihrer Verbindung mit der Sonne. Wenn also die Erde als Mutter der lebendigen Wesen auf ihr erscheint; so kann die Sonne, und überhaupt das Aetherische, das nur in dem Sonnenkörper uns zu nächst gestellt ist, als ein noch höher gestelltes Lebensprincip betrachtet werden, das gleichsam zeugend erst der Erde Schooß befruchtet, damit ihm neues, und wenigstens relativ eignes Leben entsprosse. Des höhere, rein ausgebildete und eigentlich organische Leben tritt aber nicht nur auf der Oberfläche der Erde, (wenn auch zum Theil, z. E. auf dem tiefen Meeresgrund, stets und durchaus mit Wasser bedeckt,) sondern auch in solchen Erdgegenden hervor, die dem Sonnenlicht und den Sonnenstrahlen wenigstens abwechselnd sich entgegenkehren, z. E. zwar im Verhältniß dieser Entgegenstellung, wo nicht andere bessere Bedingungen, z. E. der Mangel an Feuchtigkeit, hemmend einwirken. Es ist indessen dabei nicht vorauszusetzen, daß die Thätigkeit der Erde in ihrem Innern, z. E. die Erzeugung von Metallen, eine völlig abgeschlossene seyn sollte, da ja die Wasser- und Erdbildung in der Tiefe der Erde und in der Atmosphäre, die Erd-Luftelecricität so nahe in Verbindung mit einander sind, daß gemeine cosmische Verhältnisse wohl auch indirect hierauf Einfluß haben, eben so wie sich ja auch niederes Thierleben, wie z. E. das von Regenwürmern, auch in dem Innern von Thieren höherer Ränge erzeugt und erhält, auf welches das Licht und überhaupt auf das Pflanzenleben nur indirect Einfluß haben. In Anwendung eines solchen Verhältnisses, wenn auch nach chimärischen Voraussetzungen, eignen sich auch die Alchymisten jedem Metalle seinen eignen Planeten zu, in dem Gesamtleben der Organismen. auf der Erdoberfläche steht die Erde erst als ein Ganzes, und da wir in jenen durchaus Zweckmäßigkeit der Form und der Kräfte erkennen; eben als ein organisches Ganzes da. Ein mehreres aber, als zweckmäßige Form und harmonisches Zusammenwirken der Kräfte, von einem Organismus auszusprechen, der nicht mit dem menschlichen auch in der Zusammenstellung seiner Organe Analogie zeigt, überschreitet die Grenzen einer rationellen Naturforschung. Es war eine der ältesten cosmischen Ansichten, daß die Erde ein großes Thier sei, also auch Selbstbewußtseyn habe. Es ist keine unwürdige Idee, daß alles, was in den einzelnen Organismen der höhern Thierwelt, insbesondere in dem menschlichen Organismus als Selbstgefühl und Selbstbewußtsein darstellt, in dem großen Erdorganismus eben so in eine geistige Einheit aufgenommen werde, als z. E. jeder einzelne Gedanke in dem menschlichen Vorstellungsvermögen. Indessen ist dieß Ausweisung in ein Feld, wo die Phantasie einen großen Tummelplatz hat, aber für die Wissenschaft keine Ausbeute zu erwarten ist. Uns, Vernunftwesen, ist gleichwohl in Erforschung der Natur das teleologische Princip, oder die Würdigung der Dinge nach Zwecken, zur Leistung nicht minder nahe gelegt, als das Causalprincip; oder die Würdigung der Dinge nach ihren Ursachen, und so wenig uns jenes veranlaßt, die Entstehung der Welt aus einem zufälligen Zusammentreffen der körperlichen Bestandtheile zu erklären, von denen es sich nun gerade traf, daß sie so zusammengekommen sind, wie sie eben

nat. physiol. Reakw. II. 25.

passen, und zu ihrem Bestehen es nothwendig ist; so wenig verdiene die so gemeinen Vorstellungen von der Bildung des Erdkörpers Billigung, nach denen man ihn nur als einen, auf mechanische Weis zusammenhaltenden großen Klumpen ansieht, dem durch Naturrevolutionen, deren Veranlassungen noch weiter jenseit in die Dunkelheit gerückt sind, vielfach große Gewalt geschehen ist, und auf welche nun die Thier- und Pflanzenwelt auf eine Weise, über welche gleichfalls ein ewiger Schleier ruht, so gut sie konnte, sich anstellte, und in fortgesetztem Kampfe mit allen Elementen, und wieder unter sich so gut es gehen will, sich erhält, und in so fern sie in jenem Kampfe nicht erliegt, sich von Geschlecht zu Geschlecht durch eignes Erzeugungsvermögen fortpflanzt.

Wenn wir einmal Zweckmäßigkeit der Natureinrichtung im Einzelnen, wär es auch nur im menschlichen Leben, anerkennen; müssen wir auch eine allgemeine Naturzweckmäßigkeit, von der jetzt nur ein Theil ist, zugestehen, und mit nicht minderem Grunde, als wir, nach den Forderungen unserer Vernunft, auch die Bedingungen des menschlichen Daseyns mit denen des Seyns aller Dinge in Verbindung zu bringen genöthigt sind, alles auf der Welt in dem Sinne durch harmonischen Verein aller Naturkräfte herbeigeführt, und nach innerer Nothwendigkeit, so wie es ist, gestaltet und geformt errathen, als nach der Mosaischen Schöpfungsgeschichte der erschaffene Welt der Stempel der Vollkommenheit durch den göttlichen Ausspruch selbst ertheilt wird <sup>64</sup>.

Es darf also wohl als physiologischer Grundsatz ausgesprochen werden: daß der Erdkörper, um des organischen Lebens auf der Erdoberfläche willen, und eben, um dadurch sich in seiner innern Lebendigkeit zu veroffenbaren, so geformt wurde, und theilweise sich noch jetzt so formt, als es geschieht, ja daß selbst die für das individuelle Leben in der Nähe ihrer Ausbrüche vernichtend wirkenden Erdrevolutionen, wie Bergstürze, Erdbeben, vulkanische Explosionen, Orkan, Schneelavinen u. s. w., doch nicht minder dem allgemeinen organischen Leben entgegen, und eben so wenig unnatürlich und zweckwidrig sind, als solches die Vernichtung einer Menge lebender Individuen ist, auf deren Raub und Verzehrung wieder andere gewaltige Naturen angewiesen sind, um ihre eigene Subsistenz zu erhalten.

#### VII. Materielle Natur der Erde.

Die folgenden Betrachtungen verhalten sich zu den bisherigen ungefähr so, wie in der Betrachtung des menschlichen Organismus Anatomie zu der Lehre sich verhält; die man gewöhnlich unter Physiologie des Menschen befaßt. In letzterer ist das Leben selbst der unmittelbar vorliegende Gegenstand, in ersterer die in der Erfahrung gegebene Grundlage desselben, die als solche sich besonders beim Erlöschen des Lebens als ein von ihm Verschiedenes, ja relativ Entgegengesetztes, oder als ein Todtes darstellt, und als Todtenkörper Gegenstand willkürlicher Behandlung in Lösung des im Leben verbunden gewesenen wird.

Wir können eben so gut die Idee einer Erdzergliederung, als die

64) 1. Buch Mos. 1. Cap. 31. B. „Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut.“



Zergliederung eines organischen Körpers auffassen. Nur wär jene, um wir sie wirklich zu realisiren vermöchten, einer Vivisection gleich gerachten; das Erdenleben selbst würde dann, wenn es z. E. ein menschlichen, oder überhaupt einer irdischen Macht verliehen wär, der Erdkörper bis in seinen Kern zu spalten oder zu sprengen, eben zu Grunde gehen, wie jeder organische Körper durch Lösung seiner Kern Theile und Vernichtung des zu seinem Bestehen nothwendigen Zusammenhanges zerstört wird. Aber eben in diesem Unvermögen des Menschen, tiefer als in die äußerste Rinde der Erde zu dringen, um die materielle Natur zu erkennen, oder auch um Theile aus jenen zu willkürlichen Zwecken hervorzuholen, ist das innere Erdenleben gegen alle Beeinträchtigung gesichert, und wir erhalten auch aus dieser Erfahrung eine neue Bestätigung der Ueberlegenheit des Lebens der Erde über das menschliche. Freilich aber wissen wir auch nichts von dem innern Erdorganismus, seiner eigentlichen Form nach, dochans nichts mehr, als was wir etwa von der Construction des irdischen Körpers wissen würden, wenn man nie von ihm etwas mehr als höchstens hier und da ein Stück der Hautbedeckungen abgenommen hätte, und wir etwa auch noch der Vortheile, durch das Gefühl auf der Oberfläche des Thierkörpers tiefere Bildungen, wie z. B. Knochen, zu unterscheiden, entzatheten. In dem aber, was von dem Erdorganismus in dieser seiner Rinde, und noch mehr in seiner offen gelegten Oberfläche sich darbietet, ist gleichwohl zu Mannigfaltiges, und dabei für unser eignes Leben zu Wichtiges befaßt, als daß wir dasselbe mit derjenigen Geringsfügigkeit betrachten sollten, in der es erscheinen würde, wenn wir bloß jene Pausen vor Augen hätten.

Die Hauptunterschiede aber, die sich bei Betrachtung der Erdoberfläche, ihrem materiellen Seyn nach, darbieten, sind die von drei Schichten über einander gelagerter körperlicher, aber ihrer Form nach ganz verschiedenartiger Stoffe. Ueberall finden wir nämlich, nach den Gesetzen der Schwere die tiefsten Räume behauptend, eine feste, erdige oder steinige Schicht, oder eine Erdfeste, aber in ungleichen Höhen sich über den Erdkörper seiner kugeligen oder sphäroidischen Haupthaltung nach erhebend; dann eine Wasserbedeckung, die nach den physischen Gesetze, welches allen wasserförmigen oder tropfbarflüssigkeiten gemeinschaftlich ist, sich, so weit sie anreichert, horizontal ausbreitet, wo sie aber unter der horizontalen Linie gesunken festensinken, oder Spalten und Zwischenräume in diesem findet, sich in die Tiefe hinabzieht, und indem sie so alle ihr zugänglichen Erdtiefen ausfüllt, den höhern Theil der Erde dann als festes Land in so weit vorragen läßt, als die Wassermasse nicht auch zur Bedeckung desselben hinreicht; endlich eine Lufthülle, oder eine die Erdfeste und das Wasser theilweise bedeckende Wasser gleichförmig umziehende, und vermöge ihrer mindern Schwere die von denselben gelassenen obren Räume, wiewohl in zunehmender Verdünnung, zu einer noch unbenannten Höhe hinauf erfüllende feine elastische Flüssigkeit. Von keiner, als einer Hauptbedingung alles besondern organischen Lebens, nur innerhalb derselben sich entwickeln, erhalten und fortsetzen können, ist unter dem Artikel Atmosphäre die Rede gewesen. Un-

ter dem Artikel Wasser wird dieses, das organische Leben gleich nothwendig bedingend, seiner eigentlichen Natur nach näher erörtert werden. Hier beschäftigt es uns nur in so fern, als es zu zweckmäßiger Gestaltung der Erdoberfläche für das organische Leben zunächst mit wirkt, besonders in der nachfolgenden Betrachtung. Gegenwärtig ist es aber die Erd feste, welche für die Kenntniß der materiellen Natur der Erde insbesondere unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt.

Es ist dieß eigentlich der besondere Gegenstand derjenigen Wissenschaft, welche man gewöhnlich als Geologie, oder noch schärfer als Geognosie bezeichnet. (Vgl. dieß Wort.) Sie hat ihren empirischen und ihren speculativen Theil. Der erstere hat das zum Augenmerk, was wir wirklich aus Erfahrung durch Anschauung, physische und chemische Untersuchung der verschiedenen Theile der Erd feste, so weit diese uns zugänglich ist, wissen. Der letztere ist für den menschlichen Geist von dem höchsten Interesse: er geht von Folgerungen aus, die sich unmittelbar an das, was uns die Erfahrung lehrt, anknüpfen; er hat zuvörderst die frühere Geschichte des Erdenlebens und die Erdbildung selbst zum Gegenstand, indem der speculative Geolog das, was ihm in der Mineralogie, (als der empirischen Kenntniß der unterschiedlichen, in der Erd feste unterscheidbare Formationen,) dargeboten ist, wie der Archeolog ein Antikencabinet benutzt; nicht minder nahe gelegt ist das Streben, aus den auf der Oberfläche der Erde hervorgehenden Producten des innern Erdenlebens auf das, was in jenen noch keinem Auge sich veroffenbarenden Tiefen der Erde übermächtig ist, wenigstens nach Grundsätzen der Probabilität einen Schluß zu machen, so wie auch vielleicht den Schleier der Zukunft in Hinsicht möglicher künftiger neuer Gestaltungen an der Erdoberfläche wenigstens in etwas zu lüften. Die Resultate dieser Forschungen haben aber an sich, abgerechnet, daß sie der Phantasie eine lebhafte Anregung geben, in dem Verhältniß einen nur geringen wissenschaftlichen Werth, als den „Vielleichts,“ zu denen sie führen, immer auch in Lichtenbergischer Laune ein „Vielleicht auch nicht“ entgegengesetzt werden kann. Ohne Ausbeute sind indessen die darauf gerichteten wissenschaftlichen Bemühungen doch auch nicht, wenn sie auch nur Negativen, oder Bestimmungen, was nicht wohl seyn kann, z. E. eine innere Höhlung der Erde, ein Centraalfener ein frei in der Erdrunde schwebender Erdkern u. s. w., zum Resultat haben, oder wenn sie die Sphäre bezeichnen, innerhalb welcher entweder das eine oder das andere, oder auch noch ein drittes, viertes u. s. w. Statt haben muß.

Wir werden uns, um nicht allzuweit auszuschweifen, in der Folge mehr auf das empirisch Bekannte, und auf die allernächsten Folgerungen daraus beschränken, als auf das nur durch Phantasiebilder Blendende älterer und neuerer Geologen eingehen, wodurch, indem Eine Aufgabe gelöst wird, sich immer eine zweite, dritte, vierte u. s. w. in unabsehbarer Reihe darbietet, und wo dann der Gorgische Knoten, so oft er auch gedreht wird, doch endlich noch durchhauen werden muß.

Wenn wir auf unterschiedlichen Orten der Oberfläche der Erd feste



sie eindringen, oder auch diese ihre Oberfläche, wie sie sich an verschiedenen Orten, bloß mit Pflanzenüberzug, oder auch zum Theil, wie besonders im Meere, mit festen thierischen Gebilden bedeckt liegt, oder auch einzelne getrennte Stücke von ihr beachten, die Spuren selbstständiger Organisation entrathen; so finden wir in den Erdtheilen die höchste Verschiedenheit, die jedoch bei weitem die Mannfaltigkeit der Pflanzen- oder Thierorganismen nicht erreicht. Man theilt diese verschiedenen Erdtheile nach ihrer qualitativen Verschiedenheit in drei Klassen: 1) Mineralien oder Fossilien, nach Oken<sup>65</sup> in drei Klassen. Die Lehre von denselben, Mineralogie, oder noch besser: Mineralogische Diagnostik, ist erst in neuerer Zeit wissenschaftlich bearbeitet worden. Früher stand sie fast bloß nur im Dienste besonderer technischer Wissenschaften, wie der Bergbaukunde, eben so wie die Chemie im Dienste der Pharmaceutik.

Die vielseitigen wissenschaftlichen Bearbeitungen derselben in der neueren Zeit kann man besonders auf folgende vier Systeme bringen: 1) das System der äußern Kennzeichen; es wurde vorzüglich durch Wallerius begründet, und erreichte seine vollkommene Ausbildung durch Werner; 2) das chemische, das besonders die Bestandtheile der Mineralien Rücksicht nimmt; es wurde von Berzelius begründet, von Kirwan aber besonders ausgebildet; 3) das crystallographische oder mathematische, das zunächst auf die Verschiedenheit der äußern Form in der Crystallisation beruht und Haüy zu seinem Urheber hat; 4) das genetische, das besonders die Entstehung der einzelnen Mineralien aus einem nach philosophischen Princip aufzuhellen sucht, indem es alle drei Systeme in Verbindung zu stellen trachtet. In diesem Geiste hat Oken besonders sein System aufgestellt<sup>66</sup>.

Nach dem Wernerischen System, dessen hohe Vorzüge anerkannt werden, wenn auch die neuern Fortschritte der Chemie einzelne Abweichungen davon begründen, sind alle Mineralien unter vier Classen zu bringen: 1) Erd- und Steinarten, 2) Salze, 3) inflammabilien, oder brennbare Stoffe, 4) Metalle. Hier beschäftigt uns aber nicht sowohl die Verschiedenheit dieser Classen, als der unter ihnen befaßten Ordnungen, Gattungen und Arten, vielmehr die Verbindung, in der sie mit einander gewöhnlich vorkommen, und dadurch den Erdkörper, so weit wir ihn kennen, wesentlich constituiren.

Bei weitem am häufigsten finden sich Erden und Steinarten, oder Gesteine im engeren Sinne des Wortes, und auch diese nur in wenigen Gattungen, in großen Landstrecken, unter der Erdoberfläche vorkommend. Zwischen ihnen erscheinen die übrigen, nur wie eingesprengt oder vereinzelt, in Höhlen und Klüften, welche jene zwischen sich haben.

Der Erdplanet würde von seiner Form nichts verlieren, wenn letztere auch alle fehlten, und jener würde nur dann mehrere größere oder kleinere Höhlen in sich lassen. Doch nehmen Salz- und Stein- und Metalle in der Tiefe auch große Landstrecken ein; späterhin sind Metalle und die übrigen brennbaren Stoffe eingeschoben.

65) Naturgesch. 1. Th. S. 21.

66) In seiner Naturgesch. 1. Th.

Wenn wir nun, um das Innere des Erdkörpers zu erforschen, von der Oberfläche desselben aus in die Tiefe dringen, oder bei Gelegenheit, daß dasselbe für irgend einen besondern Lebenszweck geschieht, die Erdformation in ihrem Innern beachten; so gelangen wir auf Orten, wo vorher ein Pflanzenwuchs war, oder auch animalische Stoffe ihre Wiederaufnahme in das allgemeine Naturleben erhielten, auf die als Dammerde sich darstellenden Rückstände derselben, die relativ, wie z. E. auf jedem Ackerland, nur eine äußerliche Umkleidung des Erdkörpers ist, oder wir treffen auch auf Orten über welche eine Wasserströmung ging, wie in einem Flußbeet, oder in der Nähe derselben, zunächst auf ab- oder angespültes Gestein, auf ab- oder angeschwemmten Sand, Lehmen, oder auf andere, offenbar erst von andern Theilen der Erdoberfläche dahin gelangte Stoffe zu deren Verrückung, wenn sie fein und leicht sind, wohl auch der Wind beigetragen haben kann, oder auch auf eine, durch menschliche Industrie, oder als Trümmer von Producten früherer menschlicher Betriebsamkeit, einzelnen Orten verleihe Erdoberfläche. Erst wenn die fest und ähnliches als Abraum entfernt ist, kommt man zu dem was als reine Erdoberfläche von einer frühern Zeit her, die dem allgemeinen Menschenleben, wie jedem individuellen organischen Leben vorausging, angesprochen werden muß.

Aber auch hier zeigt sich an den verschiedenen Orten, wo man den Erdkörper untersucht, eine so große Verschiedenheit, und zugleich eine so große Schwierigkeit in Auffindung eines allgemeinen Bildungsgesetzes zur Erklärung dieser Verschiedenheiten, daß es durchaus das Ansehen hat, als sei jene Oberfläche eben so nach und nach und auf eben so vielseitige Art auf einer noch tiefern Erdoberfläche gebildet worden als täglich die Form der bewohnten Erdoberfläche durch zufällig erscheinende Ereignisse sich verändert, und dieß nicht bloß auf einige Tiefe, in die Erde hinab, sondern so weit, als es dem Menschen in dieselbe einzudringen bisher möglich geworden ist.

Im allgemeinen kann man aber doch hierüber folgendes aufstellen. Die meisten Erd- oder Steinarten, die man findet, sind in gewissen Strecken von einer und derselben Art, oder auch als Conglomerat auf eine und dieselbe Art in sich verbunden. Diese Strecken sind meist horizontal, doch auch häufig nach verschiedenen Winkeln, und gewöhnlich in denselben Neigungen, wie die Erdoberfläche selbst erscheint, geneigt. Sie sind von unterschiedlicher und nicht immer gleichförmiger Dicke; wenn sie in ihrer Streckung hin und wieder durch andere Erdlagen unterbrochen werden, setzen sie sich doch jenseit derselben häufig wieder fort. Die verschiedenen Schichten wechseln zum Theil in unterschiedlichen Tiefen mit einander ab; doch sind auch mehrere Erdlagen mit einander häufiger verbunden, als mit andern, so daß man schon aus der Auffindung der einen nach Wahrscheinlichkeit darauf rechnen kann, auch die andere zu finden. Diese Wechsel sind häufiger in den obern Schichten; die tiefern werden dichter und gleichförmiger. Die Consistenz und das ganze Aussehen dieser verschiedenen Erdlagen deutet auf einen ganz verschiedenartigen Ursprung derselben hin. Zum Theil haben sie das Ansehen einer Zusammenschmelzung und Versinterung durch Hitze, zum Theil das einer Ab-



ang, aus einer Flüssigkeit; Feuer und Wasser mögen daher auch in der frühern Zeit des Erdenlebens bedeutend zur Bildung des Erdkörpers und namentlich seiner Oberfläche gewirkt haben, beides aber wohl zu verschiedenen Zeiten, oder in unterschiedlichen Perioden, über größere oder kleinere Strecken des Erdkreises. Was jetzt noch zur Veränderung der Erdoberfläche Ausbrüche von Vulkanen, oder auch Ueberfluthungen beitragen können, ist bekannt, auch was Fluß- und Meeresschwemmungen zur Veränderung der Formen der Ufer vermögen. Einige hohe Berge auf der jetzigen Erdoberfläche haben das Ansehen ausgetrockneter Vulkane, viele Erdlagen jetzt in der Erdtiefe Andeutungen einer frühern Anschwellung durch Wasser. Besonders ist es die ungeheure Menge von Resten von Schalthieren, die bloß aus dem Wasser ihre Entstehung und ihr Bestehen haben konnten, in vielen, selbst den höchsten Erdgegenden, und eine Menge Erdlagen, die durchaus die Andeutung haben, daß sie durch Wasser zu- und abgetragen sind, erwiesen, daß bei weitem der größte Theil des gegenwärtig bewohnten Landes längere Zeit hindurch vom Meer bedeckt gewesen sei. Auf einzelnen Orten sind auch, wie z. B. in Resten von Waldungen und den in ihnen sich findenden Spuren, daß Bäume nach Einer Richtung niedergelegt worden sind, Andeutungen einer allgewältigen Wasserströmung unverkennbar; aber sie reichen bei weitem nicht hin, um daraus zu bestimmen, ob dergleichen Strömungen universell Statt gefunden haben, woher die Gewässer gekommen, wohin sie abgelaufen sind, obgleich ältere und neuere Geologen nicht unterlassen haben, ihren Scharfsinn in Angabe solcher Strömungen zu versuchen, und diese mit einer Bestimmtheit zu bezeichnen, als ob sie ein Protokoll darüber aufgenommen hätten. Insbesondere kann es einer allgemeinen Naturansicht, von einem bestimmten Standpunct aus, nicht zusagen, dergleichen große Ereignisse über der Erde als einen revolutionären Zustand, als einen vagen Zerstörungssact zu bezeichnen, da, wo auch relative Zerstörung vorwaltete, doch nur eine Uebergangsperiode aus einer frühern Form des Erdenlebens in eine spätere bildete, wenn auch während derselben ganze Generationen lebender Wesen das Ziel ihres doch immer nur auf einen begrenzten Zeitraum berechneten Daseyns fanden. Jeder eintretende Winter bringt ja das Leben von Myriaden von Insecten und anderer Geschöpfe zur Erstarrung, ohne deswegen eine Zerstörung zu seyn.

Unter den einzelnen Erdarten, welche in den mineralogischen und chemischen Systemen besonders unterschieden werden, haben eigentlich nur drei allgemeine Verbreitung, so daß sie als Hauptbestandtheile der Erdkruste, so weit wir sie kennen, erscheinen. Es sind die Kieselerde, die Thonerde und die Kalkerde; aus ihnen sind alle bekannten Gebirge und Felsen, wiewohl in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen, zusammengesetzt. Keiner von ihnen ist die Kalkerde nur nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch Erde ist, ist unter dem Artikel Erden bemerkt worden. Die übrigen chemisch unterscheidbaren Erdarten kommen nicht in Betrachtung, da, die Talk- oder Bittererde, als die häufigste, auch im Thonschiefer, wo sie am reichlichsten sich findet, nicht mehr als 3 p. C., im Basalt um 2 p. C. beträgt. Dies, so wie das Nachfolgende, besonders nach Parrot's Grundr. d. Phys. d. Erde, 2. Abschn. 2. Cap.

dieser so allgemeinen Stoffe kommt aber in großen Massen rein vor die Kalkerde, bloß mit Säuren und Wasser verbunden, als kohlensaurer Kalkstein, (gemeiner Kalkstein, Marmor, Kalkspat Kreide,) als schwefelsaurer Kalkstein, (Gyps,) und flußsaurer Kalkstein, (Flußspath.) In kleinern Massen ist die Thonerde im Töpferthone nur mit etwa 0,15 Eisenoryd vermischet. Die Kieselerde findet sich im Quarz, besonders im Bergcrystall ziemlich rein.

Die Steinarten aber, denen die gedachten Erden zur Hauptgrundlage dienen, können auf sechs zurückgebracht werden, aus denen wesentlich alle Felsen bestehen, nämlich a) Quarz, (Kieselerde 0,90 Thon 0,005, Wasser 0,01;) b) Feldspath, (Kieselerde 0,667 Thon 0,175, Kali 0,12, Kalk 0,0125,) c) Glimmer, (Kieselerde 0,47, Thon 0,20, Kali 0,13, Eisenoryd 0,155, Manganooryd 0,0175; d) Thonschiefer, (Kieselerde 0,471, Thon 0,26, Kalkerde 0,041, Eisenoryd 0,141, Talkerde 0,080;) e) Hornblende, (Kieselerde 0,42, Thon 0,12, Kalk 0,11, Eisenoryd 0,32, Wasser 0,0075, eine Spur von Kali;) f) Basalt, (Kieselerde 0,44, Thon 0,167, Talkerde 0,0225, Kalk 0,095, Manganooryd 0,001 Natron 0,026, Eisenoryd 0,20, eine Spur von Salzsäure, Kohlen und Wasser.) Letzterem können auch der Trapp und die Wacke nach ihren Abarten beigeßelt werden, da sie ihren Bestandtheilen nach nur wenig davon abweichen, obgleich sie die regelmäßige Form des Basalts nicht haben.

Außer dem Kalkstein bilden der Thonschiefer, der Basalt und zuweilen auch die Hornblende für sich sehr verbreitete Felsenmassen. Die übrigen Gebirgsarten sind aber Gemenge aus jenen Steinarten, und dieß zwar auf eine dreifache Weise: a) so daß die Gemengtheile, ohne ein besonders bemerkbares Bindemittel in unmit. einander verwachsen erscheinen, b) so daß die eine Steinart die Haupttheil ausmacht, und eine oder mehrere andere in geringer Menge in sich einschließt; c) so daß die Gemengtheile sichtlich durch ein Bindemittel mit einander vereint sind, wiewohl dieß nur einen kleinen Theil der Masse ausmacht. Zu der ersten Gattung gehören zunächst der Granit, zur zweiten der Porphyr, zur dritten der Sandstein.

Alle diese Gebilde haben in sich den Ausdruck des Todten. Unter Vermittlung der fossilen entzündlichen Substanzen, wohin auch die Metalle zu rechnen, gelangt Leben und Thätigkeit in sie. Von den Metallen kommt bloß das Gold und die Platina allein gediegen vor. Am verbreitetsten ist das Eisen, und kann fast aus jedem Gestein geschieden werden, worin es, in oxydirtem Zustande, besonders das färbende Princip ist. Es verbindet sich, wie die meisten Metalle mit Schwefel, und bildet dann die Eisenkiese. Das Bergöhl kommt nicht nur rein als Bergnaphtha vor, sondern ist auch die Grundlage mehrerer verbreiteten Steinkohlenarten und des Torfes, als Product untergegangener Generationen von Pflanzen und Thieren.

Die Art und Weise, wie diese und alle Fossilien im allgemeinen vorkommen, wird gewöhnlich von den neuern Geologen nach der Lagerung dargestellt, welche Eintheilung jedoch nur in der Art zulässig



als die Data rein aus der Erfahrung, nicht aus einer supponirten  
 icken Geschichte des Erdkörpers entnommen sind, von der diese Data  
 entlich erst die einzigen, wiewohl immer unvollkommene und unzurei-  
 che Andeutungen sind. Man kann nämlich von der Lagerung, in wel-  
 entlich die Gebirgsarten gewöhnlich auf der Erdoberfläche zeigen, nichts  
 ers aussprechen, als: es hat das Ansehen, als ob die Bildung  
 der Masse in einer frühern Zeit auf diese oder jene Weise entstan-  
 en wäre, so wie die Unebenheiten der Rinde einer alten Eiche oder  
 es ähnlichen Baums wohl auch das Aussehen haben, als seien  
 für in ihnen sich ansiedelnde Ameisen oder andere Insecten wohl  
 als Klüfte und Abgründe anzusprechenden Furchen und Rigen  
 ch äußeres Eindringen aushöhlender und zerstörender Stoffe, so wie  
 hervortragenden Manigkeiten durch Ansaß von außen bewirkt worden,  
 erachtet sie nichts als lebendige Erzeugnisse der innern Vegetation, im-  
 pflict mit der Außenwelt sind. Weil man sich aber in Darstellung  
 Unterscheidung einzelner Zeitperioden einer frühern Weltgeschichte  
 el, die das Entstehen der Erdoberfläche auch hypothetisch nur  
 lweise, durchaus aber nicht umfassend erklären; so unterscheidet  
 n auch noch in den neuesten geologischen Schriften die Forma-  
 en der Gebirge nach jenen supponirten Perioden als Urgebirge,  
 ergangsgebirge, Flöggebirge und aufgeschwemmte Massen, alles als  
 egen von Niederschlägen aus dem Wasser, oder auch als Producte  
 Einwirkungen überwältiger Gewässer, denen dann wieder vulka-  
 ne Gebirge als Producte von Eruptionen, in denen das Feuer  
 allgewaltige Element war, entgegenstehen.

II) Zu den Urgebirgen rechnet man zunächst und vorzüglich den  
 anit. Seine Gemengtheile sind Quarz, Feldspath und Glim-  
 , alle drei im Zustande einer Crystallisation, die wenigstens durch  
 bewaffnete Auge immer unterscheidbar ist. So bestimmt diese  
 mation nach innen ist, so unbestimmt ist sie nach außen, und  
 sehr auch die Crystallenbildung, (Drusenbildung,) eine uranfänglich  
 ende Kraft andeutet, und der Granit sonach das Ansehen einer  
 ersten Erdenformation hat; so ist doch kein Gesetz bekannt, nach  
 sich die ungeheuern Gebirgsstrecken, die zunächst aus Granit be-  
 en, zusammengesetzt haben mögen, oder woraus auch die quan-  
 itative Verschiedenheit der drei dem Granit eignen Steinarten er-  
 etbar wird; die höchst veränderlich ist, obgleich der Feldspath im-  
 , nach ihm der Quarz darin vorwaltet. Man hat den Granit  
 eine allgemeine Grundlage und tiefste Schicht aller übrigen Ge-  
 e betrachtet, die dann auf den höchsten Gebirgshöhen, die an-  
 a Erdbarten durchbrechend, auf der Oberfläche hervortritt. Allein  
 ist nicht erfahrungsmäßig, daß die höchsten, und überhaupt die Ur-  
 erge dadurch allein gebildet werden. Häufig kommt der Granit auch  
 andern Gebirgsarten untermengt in Schichten vor, auch wohl nur  
 Blöcken und kugelförmigen Massen, die dann wieder aus concen-  
 schen Schalen, abwechselnd von größerer und geringerer Härte, be-  
 en. So finden sich auch in Granitfelsen kleinere Granitkugeln von  
 erem Korne eingewachsen; auch ist fremdes Gestein dem Granit  
 gemengt.

Der Syenit unterscheidet sich vom Granit bloß dadurch, daß er

noch Hornblende zu seinem Gemengtheile hat. Der Gneus dagegen hat dieselben Gemengtheile wie der Granit; aber sein Gefüge schieferig, zuweilen blättericht; er hat in der Regel seinen Sitz auf dem Granit. Der Glimmerschiefer enthält als Gemengtheil keinen Feldspath, dagegen reichlicher Glimmer; er kommt zuweilen unmittelbar auf dem Granit, jedoch auch auf andern Urgebirgsarten vor. Ein drittes Hauptglied der Schieferformation als Urgebirge bildet der Thonschiefer, (Urthonschiefer.)

Zu den Urgebirgen werden auch gewöhnlich die Porphyrformationen gerechnet, obgleich ein großer Theil derselben nach andern Geologen zu den Uebergangsgebirgen gehört. Man unterscheidet insbesondere zwei Arten: den Taspisporphyr, dessen Hauptmasse aus Kiesel Erde, Thon und rothem Eisenoryd besteht, und den Grünsteinporphyr, dessen Hauptmasse Grünstein, nämlich Hornblende und Feldspath ist; in beiden Gattungen ist Feldspath eingemengt isolirt und auch in die Hauptmasse überfließend.

Auch Kalkgebirge werden als Urgebirge, (Urkalke,) unterschieden, sie sind durchaus ohne Versteinerungen, kerniger und crystallischer als anderes Kalkgestein, und befinden sich unter den verschiedenen Urschiefen gelagert. Zu ihnen gehört auch ein eben so unterschiedener Urgyps. Nicht so begründet ist die Annahme eines Urtrapp. Dagegen gehört die Hornblende, rein, oder mit Feldspath, oder mit Glimmer gemengt, billig auch mit in diese Reihe, indem sie auch neben dem Thonschiefer als selbstständige Gebirgsart vorkommt.

Alle Urgebirgsarten führen Erze, namentlich der Granit Eisen in Gängen und Zinn in Lagern; am reichsten an Erzen sind indessen die Schiefergebirge, besonders der Gneus und der Thonschiefer.

2) Zu den Uebergangsgebirgen, (nach der Annahme Niederschläge, die nach der Urzeit sich am Abhänge der Urgebirge in verschiedener Richtung lagerten,) rechnet man besonders die Grauwacke (Quarz, Thon- und Kiesel-schiefer durch eine thonige Masse verbunden.) Man findet sie, zuweilen ansehnliche Berge bildend, auf den Urschieferformationen, oder auch unmittelbar auf dem Granit. Man nimmt an, daß sie das Product älterer zerstörter Gebirgsarten, daß sie mechanisch mit Wasser vermengt gewesen sei, und sich aus diesem zugleich mit einem Niederschlag von Thon abgesetzt habe.

Sodann wird ein Uebergangskalkstein unterschieden, Kalk der, wiewohl noch sparsam, mit Petrefacten untermengt ist. Hierhin gehört auch ein Uebergangsgyps. Beide Uebergangsgebirgsarten enthalten Erze, vorzüglich die Grauwacke.

Noch wird der Trapp hierher gerechnet unter verschiedenen Verhältnissen der Mischung und Mengung, des Gefüges und der Form als Grünstein, Mandelstein, Ringfels u. s. w.

3) Zu den Flözgebirgen, welche, nach unverkennbaren Andeutungen, ihre Bildung erst zu einer Zeit erhalten haben, wo schon vorher eine mit organischen Wesen besetzte Oberfläche vorhanden war, die nicht bloß chemische Niederschläge zu seyn scheinen, sondern auch Spuren mechanischer Zerkümmernng früherer Bildungen



1, und am Fuße der Ur- und Uebergangsgebirge mit gleichmä-  
 2 Lagerung angelegt sind, gehört zunächst der gemeine Sand-  
 3. Er ist ein Conglomerat, der Quarzsand zu seinem wesentli-  
 4 Bestandtheil hat, der durch Thon, Kalk oder Mergel in verschie-  
 5 en Verhältnissen verbunden ist.  
 6 vorzüglich bemerkenswerth sind auch die vielfachen Flözkalk-  
 7 ne von anscheinend verschiedenem Alter, wohin auch der Flöz-  
 8, die Kreide, der Mergel s. u. w. gehören. In allen findet  
 9 Versteinerungen, nur nicht im Gypse. Der Muschelkalkstein  
 10 ist sogar selbst nur ein Product verwitterter Muscheln zu seyn.  
 11 Das Steinsalz findet sich theils in einzelnen kleinen Lagern in  
 12 eingeschlossen, von wo sich Salzquellen bilden, theils in gro-  
 13 mit Gyps oder Thon eingesakten Salzlagern oder Stöcken, theils  
 14 eigenthümlichen, weit ausgebreiteten Flözen, unter Gyps- oder Kalk-  
 15, meist in niedrigen Gegenden; es enthält wenige Petrefac-  
 16 und führt kein Erz.  
 17 von der Flözperiode wird auch die Steinkohle abgeleitet, die, al-  
 18 tendungen nach, so wie das bituminöse Holz, der Torf und das  
 19 köhl, ein Ueberrest früherer organischer Körper, namentlich von  
 20 pflanzen seyn mag, die eine eigenthümliche Auflösung erhalten  
 21. Die Bestandtheile der Steinkohle sind verhärtetes, zum Theil  
 22 hftes Bitumen, mit allerlei Erdaten, auch etwas Eisen ver-  
 23 gt, die beim Verbrennen als Asche oder Schlacken zurückbleiben.  
 24 öhlich findet sich die Steinkohle geschichtet, doch auch oft mit  
 25 n Gebirgsarten mächtig gelagert; vorzüglich wechselt sie mit  
 26 pferthon und Sandstein; auch findet sie sich als Nebengebirgsart  
 27 n Sand- und Kalksteingebirgen der Flözformation. Ihre Bil-  
 28 ist durchaus als eine partielle anzusehen, obgleich sich auch Stein-  
 29 mlager Meilen weit erstrecken; öfters findet man in ihnen Erze  
 30 agern und in Gängen, Eisen, Kupfer, besonders Bleiglanz.  
 31 erher wird auch der Basalt gerechnet, ein räthselhaftes Pro-  
 32 das, ohne crystallisirt zu seyn, eine symmetrische und zugleich  
 33 nigfaltige Structur zeigt. Gewöhnlich ist er säulenförmig zerklüf-  
 34 drei-, sechs-, neunseitig, selten vier-, fünf-, sieben- und  
 35 itig; noch seltner ist der Tafel-, der Kugel- und der Pyrami-  
 36 salt. Meist findet man zahlreiche fremde Mineralien ihm bei-  
 37. Diese Gebirgsart, die in verschiedenen Höhen, (bis 4000  
 38 über der Meeresfläche,) vorkommt, ist vorzüglich sehr der Ver-  
 39 rung unterworfen; durch das eindringende gefrierende Wasser  
 40 häufig Spaltungen und Umstürzungen bewirkt. — Man hat  
 41 gestritten, ob der Basalt dem Feuer oder dem Wasser seine  
 42 ehung zu danken habe. Alle Hypothesen seiner Entstehung ha-  
 43 ihre Schwierigkeit. Die Wahrscheinlichkeit ist dafür, daß er durch  
 44 nische Ereignisse verändert, nicht aber erzeugt worden.  
 45 ) Als aufgeschwemmtes Land besaßt man alle Gebirgsart-  
 46 welche, ohne feste Bindemittel, Trümmern anderer Gebirge älte-  
 47 formation zu seyn scheinen. Man unterscheidet angeschwemmte  
 48 garten des Hochlandes, (Seifengebirge,) und aufge-  
 49 mmte Gebirge des niedern Landes. Erstere befinden sich in hoch-  
 50 den Thälern zwischen Bergen, besonders von der Urformation,

in Verbindung mit späterem Gerölle, welches noch immer von den Uebergebirgen herabfällt und hier verwittert; sie enthalten häufig Erze. Letztere werden in Gebirgsarten mechanischen und chemischen Niederschlags getheilt. Jene bieten den Sand-, Lehm-, Kalk- Moor- boden u. s. w. dar, diese sind der Kalktuff und Sinter, oder chemische Niederschläge auf Pflanzen und thierische Ueberreste, die aber in ihnen meist verschwunden sind. Hierher gehört auch der Kalksinter von Carlsbad, Töplitz u. s. w., auch der Tropfstein der Höhlen.

Dies ist der Hauptsache nach die beliebte Eintheilung der Gebirgsarten nach dem Wernerischen System, dessen Mängel und Gebreche gleichwohl unverkennbar sind, und das durchaus von keiner allgemeinen Anwendbarkeit ist. Keinem neuen Geologen ist es indessen gelungen, etwas Besseres aufzustellen. Alle neuere Theorien enthalten nur particuläre Wahrheiten.

Der vulkanischen Producte wird unter dem folgenden Abschnitt Erwähnung geschehen, wo die vulkanischen Eruptionen als eine besondere Aeußerungen des organischen Lebens auf der Erdoberfläche zur Sprache kommen werden.

Eine besondere Berücksichtigung hier verdient aber noch das Vorkommen der Metalle in dem Innern der Gebirge.

Die Metallurgen unterscheiden Lager von Gängen. Lager, (denen übrigens Metalle nur gesucht werden, die sie jedoch nicht immer enthalten,) sind eigenthümliche Massen von Gebirgsarten, die zwischen den Hauptgebirgen mit denselben einerlei Streichen und Fallen haben. Der Winkel des Falls an der Oberfläche des Lagers wechselt öfters, indem sich die Lagermasse an einigen Orten mehr oder weniger anhäuft. Die Dicke, (Mächtigkeit,) der Lager reicht von einigen Zollen bis zu einigen Fächtern; in geringer Ausdehnung und Länge nach bilden sie Stöcke. In den Lagern und Stöcken kommen Metalle in demjenigen rohen Zustande vor, in dem sie im allgemeinen als Erze bezeichnet werden, und in dem sie meist mit andern mineralischen Körpern innig verbunden, des in ihrer reinen metallischen Natur ihnen eigenen Gefüges, Ansehens und ihrer übrigen bekannten Eigenschaften enttrathen. Die Erze finden sich entweder in dem gelagerten Gestein in Verbindung, oder auch allein, so daß das ganze Lager aus ihnen besteht.

Gänge werden gewöhnlich von Lagern darnach unterschieden, daß sie das Hauptgebirge in allerlei Richtungen durchschneiden und gewöhnlich sich unter einem Winkel von mehr als  $45^\circ$  das Hauptgebirge einsenken; ihr wesentlicher Unterschied besteht aber darin, daß ihre untere Fläche nicht, wie bei den Lagern, auf der natürlichen Fläche des Gebirges anliegt und daß sie nicht nach oben von der Masse des Gebirges überdeckt werden. Sie sind als Risse und Klüfte im Hauptgebirge zu betrachten, welche mit der Gangmasse erfüllt sind. Sie sind weit vorzüglichere Lagerstätte der Metalle, als die Lager. Sie werden oft von dem Gestein des Gebirges unterbrochen, oder auch enger zusammengedrängt, zuweilen auch in Wette getheilt, die auch wohl wieder zusammentreten. In einem und demselben Gebirge finden sich oft mehrere Gänge mit parallelen oder au



durchkreuzenden Richtungen, Lager und Gänge untermischt, als ohne erkennbare Regel.

Wie die Gänge ausfüllenden Fossilien, in so fern sie eine zusammenhängende Masse bilden, werden als die Gangmasse bezeichnet. Uebrigens finden sich die Gänge auch leer, als Gebirgsrisse. Die Gangmasse ist nur selten von derselben Gebirgsart, wie das Nebengebirge und immer etwas verändert. Manche Gänge sind nur mit einer einzigen Gebirgsart gleichförmig erfüllt, so mit fein körnigem Granit, Thonschiefer, Porphyr, Sandstein, Basalt, Steinkohle, Steinsalz, Flözkalstein, Conglomeraten und aufgeschwemmten Gebirgsarten; zuweilen sind Stücke vom Nebengebirge untergesetzt, so auch Bruchstücke einer fremden Gangmasse; auch finden sich wohl Versteinerungen darin. Die wirklich erzführenden Gänge haben eine eigenthümliche Gangmasse, welche nicht eine eigentliche Gebirgsart ausmacht, sondern eine derbe Masse ist, welche aus zahlreichen, in einander übergehenden, fest zusammenhängenden Steinarten besteht, welche von Seitengrenzen, (den Saalbändern,) aus in ungleichen Schichten nach der Mitte zu, so auf einander folgen, daß eine Symmetrie zwischen beiden Seiten des Ganges herrscht. Die am häufigsten vorkommenden Steinarten sind Quarz, Kalkspath, Flußspath, Schwerspath, Braunspath, Bergcrystall, Feuerstein, Speckstein.

Die Crystalle in der Gangmasse sind alle nach innen gekehrt. Außerdem findet man aber noch häufig in den Gängen eigene geordnete Crystallbildungen, die man Drusen nennt, von weniger als einen Zoll bis über eine Lachter Größe, die kleinern kugelförmig; die größern irregulärer, gedehnt oder platt gedrückt; ihre mit einwärts gerichteten Crystallen besetzte Höhlung ist bisweilen mit Wasser erfüllt. Die Erze selbst nehmen, wo sie nicht allein den Gang ausfüllen, immer die Mitte des Ganges ein, bisweilen der Länge des Ganges nach bis zu 100 Lachtern ununterbrochen zusammenhängend, gewöhnlich aber in kürzern Massen abgetheilt, oft nur in ganz kurzen, (Nestern.) Meist finden sich mehrere Erze zugleich in einem Gange, in einer gewissen Ordnung mit der Gangmasse. Bemerkenswerth ist auch, daß das Nebengestein der Gänge, mehr oder weniger verwittert, wie verwittert, oder auch an der Gangmasse in Uebergangswachsthum angewachsen, ingleichen wenn es schieferig oder sehr porös ist, Erz oder auch gediegenen Metallen wie eingespritzt sich zeigt.

Ueberhaupt zeigt sich in vielfachen Andeutungen die Erzeugung der Metalle als ein organischer Proceß in dem Innern der Erde; bezeugt durch die Erscheinungen, welche der Herrmann Schwaben oder Wetter nennt, eben so unverkennbar durch den Einfluß, als die Atmosphäre der Erde auf Vegetabilien und Thiere hat. Diese selbst mögen aus Verwittern früherer Erze ihren Ursprung nehmen, und so mögen auch Wasserbildungen in den Tiefen der Erde geschehen, und eben so mag ein steter Wechsel der Stoffe in der Erde wie über derselben Naturordnung seyn, deren Zusammenhang mit dem organischen Leben auf der Erdoberfläche noch nicht hinlänglich ausgemittelt ist. Vgl. Metalle.

VIII. Die Erdoberfläche in ihren organischen Verhältnissen.

Betrachten wir, wie dieß von dem naturphilosophischen Standpunkte aus, nach dem früher Angeführten, sich als nothwendig darstellt, die Erde als ein organisches Ganzes; so ist die Erdoberfläche der Blüthen- und Fruchtboden des Erdorganismus, auf dem allein das Erdenleben sich in unendlicher Mannigfaltigkeit, nach gegebenen Causalbedingungen und nach in den einzelnen individuellen Organismen sich offen darlegenden Zwecken, reflectirt. Alle innere Erdmasse, mit allen ihr waltenden und aufgeregten Kräften würde, wenn wir von jenem auch etwas mehr, als die äußerste Rinde erforschen könnten, doch nur dem Stamme und dem Holze eines Baumes gleichen, der er durch seine Fructification, durch seinen Blätter- und Blüthenschmuck und den Reichthum seiner Früchte sich als als lebendiges Gebilde verherrlicht. Eben so gewinnt erst die Erdkunde in so fern für uns ein lebendiges Interesse, als die Erde sich mit ihrer, der ewigen Natur entrückten Außenseite dem himmlischen Lichte zukehrt, und nun erst ein höheres Leben dem Erdenschooß entlockt wird.

Der allgemeine Charakter des Erdkörpers, als Kugel, ist höchst Einheit; gegen sie im Größenverhältniß verschwindet alles Ungleichmäßige, alle Mannigfaltigkeit der Formen der Erdoberfläche als ein relatives Nichts, aber doch nur dem von allen Lebensverhältnissen abstrahirenden Verstande in der leeren Anschauung. Für alles Groß und Kleine im Leben, und mit lebendigem Sinne aufgefaßt, ist der Mensch selbst erst der natürliche Maßstab. Groß ist ihm, was nur mit Mühe, (körperlich oder geistig,) ausspannen, ausschreiten, ausklastern kann, klein, wofür er in seinen Körperteilen, (selbst der Breite seines Haars,) des Maßstabes entrathet, und dann in dem Verhältniß darnach gesundener Größen. So erscheint uns dann auch die Natur in den uns nächsten Umgebungen auf der Erdoberfläche im Großen wie im Kleinen, und in der Mannigfaltigkeit ihrer Formen wie in der Einfachheit ihrer Geseze, gleich bewunderungs-, gleich beachtungswürdig.

Wie sich das Erdenleben auf der Erdoberfläche in einzelnen selbstständigen Organismen ausdrückt, ist unter dem Artikel Erdbeobachtung näher gelegter Gegenstand der Betrachtung gewesen. Hierher gehörig ist nun insbesondere die Würdigung der unendlichen Verschiedenheiten der Erdoberfläche, ihrer Form nach, wodurch sie aber zunächst erst fähig wird, nicht nur überhaupt Thier- und Pflanzentypen, sondern auch diese in der unendlichen Mannigfaltigkeit auf ihrem Schooß hervorgehen zu lassen, in der das gesammte Reich des Lebens Gegenstand der Naturforschung ist, und deren Umrisse alle unsere systematische Naturkunde befaßt.

Um das Leben in seinem eigenthümlichen Charakter richtig aufzufassen, müssen wir nie verkennen, daß es selbst durchaus ein Bewegliches und Bewegtes, und überhaupt ein vorbeistreichender Zustand ist. Wir haben diesen ewigen Ausdruck des Lebens in jedem fließenden Wasser vor Augen, und es ist dieser so bezeichnend, daß der Satz „alles fließt“ schon längst zum Axiom aller Naturkunde erhoben worden ist. Unter allen verbreiteten Naturstoffen ist keiner in dem materiellen Leben aller Naturwesen so verflochten, als das Wasser, das dann seinem Wesen nach selbst wieder Träger der übrigen Leben



dingungen; Luft, Wärme u. s. w., wird; aber nicht das Wasser seiner Abgeschlossenheit von der übrigen Natur, sondern in seiner eignen lebendigen Circulation. Diese Circulation ist aber nicht allein durch ihr Beginnen und ihren Endpunct, durch die Wasserbildung und die Wasserzersehung, an das große Naturleben gebunden, sondern insbesondere durch die Beweglichkeit auf horizontalen Flächen und noch mehr Leichtigkeit, mit der das Wasser jedem, auch noch so leisen äußern Impuls nachgibt, also auch durch die Leichtigkeit seiner Bewegung, durch das alles Materielle beherrschende Schwerprincip. Das Abfließen der Gewässer auf der Erdoberfläche, von den höhern Gegenden in die tiefern, nebst dem Niedersiegen dieser Strömungen, der große Hebel, wodurch das Thier- und Pflanzenleben auf der Erde allein sein Bestehen hat; wenn auch einzelne Thier- und Pflanzenclassen, Gattungen und Arten weniger direct davon abhängig sind. Insbesondere ist die Wasserströmung mit dem Leben der höhern Thierclassen, und namentlich mit dem allgemeinen humanistischen Leben in so nothwendiger Verbindung, daß wenn auch einzelne Individuen für einen beschränkteren Lebenskreis derselben entzogen werden, doch die Erhaltung ganzer Generationen nothwendig daran knüpft ist. Am wenigsten würde, bei den verbreiteten Lebensverhältnissen der Menschen, ein allgemeines Familien- und Völkerverleben, ohne Benutzung strömender Gewässer, Statt haben; daher auch die Menschen von jeher, wie noch jetzt, sich zunächst an Wasserquellen, Bächen und Flüssen, am Meeresufer in der Nähe dahin abfließender Gewässer ansiedelten, und nur da im allgemeinen Völkerleben sich frei zu entwickeln vermochten. Selbst auf der Höhe, auf Steppen und in Sandwüsten bedarf der Mensch zu seinem kümmerlichen Leben wenigstens eines Brunnens oder einer Cisterne für die Aufnahme der von den Höhen zusammenfließenden Gewässer.

Diesen großen Vortheil des Wasserabflusses von den Höhen in die tiefern den lebenden Organismen zu gewähren, damit das Wasser überall, wo sonst ein organisches Leben gedeihen kann, diesem entgegenströme, mußte die Erdoberfläche eine ungleiche werden. Eine völlig abgeglättete Erdoberfläche würde nur einen allgemeinen Meeresboden geboten haben, und da auch selbst zum Bestehen der Seegeschöpfe ein Gegensatz von festem Land und Meeresverbreitung und eine allgemeine organische Natur, wie sie erst durch diesen Gegensatz bedingt wird, erforderlich scheint; so würden auch diese, wenigstens auf die Dauer nicht leben und bestehen können.

Der hauptsächlichste und wesentlichste Unterschied, der sich bei allgemeiner Betrachtung der Erdoberfläche darbietet, ist also der eines Hochlandes, welches in verschiedenen Höhen über ein niederes Land hervortragt, in welches, nach dem Gesetz der Schwere, die theils aus der Atmosphäre, theils in den höhern Erdmassen selbst erzeugten Gewässer, von jenem sich senken, und endlich in eine allgemeine Masse als Meer zusammenfließen.

Um nun aber das Hiehergehörige unter allgemeine Gesichtspuncte zu bringen, betrachten wir 1) das Allgemeine der Bildung der von

dem Meere unbedeckten Erdoberfläche; 2) das Meer mit seinen Eigenschaften; 3) die besondere Bildung und Form der Erdoberfläche in Bezug auf das Pflanzen-, Thier- und Menschenleben; 4) das Völkerleben der Menschen insbesondere, in wie fern es in der Bildung der Erdoberfläche seine nächste Bedingung hat.

1) Der als Land, im Gegensatz des Meeresgrundes, bezeichnete Theil der Erdoberfläche steht an Flächengehalt dem letztern weit nach. Nach der höchsten Schätzung kann es höher nicht als zu 2,339,528 geographische Quadratmeilen angeschlagen werden, wogegen nach der früher angegebenen Bestimmung des Betrags der Oberfläche der Erde 6,942,624 Quadratmeilen auf den vom Meer bedeckten Theil kommen, wovon das feste Land noch bei weitem nicht, wie man es gewöhnlich schätzt,  $\frac{1}{3}$  der Erdoberfläche überhaupt, sondern nicht viel mehr als  $\frac{1}{4}$  beträgt <sup>68</sup>.

Das feste Land wird durchgängig in größern und kleinern Massen vom Meere umflossen. Hiernach ist zwischen Continenten, oder festem Land im engerm Sinne, und Inseln nur ein relativer Unterschied. Unter ersterem befaßt man insbesondere ein östliches Continent, oder eine Ostfeste, (Europa, Asien und Afrika,) und ein westliches Continent, oder eine Westfeste, (Amerika,) denen (eigentlich als Zubehör der Ostfeste,) neuere Geographen noch ein Südcontinent, (Neuholland,) zugesellen <sup>69</sup>. Die kleinern als Inseln bezeichneten Ländermassen werden dann den Welttheilen beigezählt, in deren Nähe sie liegen, von denen man, nach alter Einteilung, in der Ostfeste die drei gedachten Massen, besonders, und dann die Westfeste als einen vierten, und in neuerer Zeit die zerstreuten großen Ländermassen der Südsee, als Südindien oder Polynesien, als einen fünften unterscheidet <sup>70</sup>.

Häufig liegen größere und kleinere Inselgruppen in der Nähe von

68) Hiermit stimmt Bode, (Anleit. zur Kenntn. d. Erdkugel,) überein, nach dessen Schätzung die fünf Welttheile 24 Millionen, die übrigen Inseln aber fast 100,000 Quadratmeilen betragen, so daß für den vom Ocean eingenommenen Flächenraum gegen sieben Millionen übrig bleiben. 69) Nach Bode ist der Flächenraum

von Europa	184,194	Quadratmeilen.
— Asien	752,505	—
— Afrika	509,950	—
— Nord- und Südamerika	620,879	—
— Neuholland nebst Neuseeland und Neuguinea	172,000	—

Summa 2,239,528 Quadratmeilen.

Hiernach befaßt Asien den 12ten, Amerika den 15ten, Afrika den 18ten, Europa den 50sten, Neuholland mit den beiden großen Inseln Südindiens 84sten Theil der Erdoberfläche. Es müssen aber auf die übrigen Inseln Südindiens ingleichen für die Größe von Nordamerika noch etwa 100,000 Quadrat Meilen zugerechnet werden.

70) Auch die größern Inseln der Welt stehen den angegebenen Landmassen, wenn man auch Neuholland, (161,000 Quadr. Meil.) Continent betrachtet, bedeutend nach, wie aus der folgenden Angabe des Inhalts der vorzüglichsten derselben erhellt:

Barneo hat	14,250	Quadratmeilen.
Madagascar	10,500	—
Sumatra	8062	—
Großbritannien	4516	—

alle übrigen noch weniger.



continenten, oder auch entfernt von ihnen zusammen, und heißen man Archipelagus.

Werden Ländermassen nur durch einen schmalen Strich Hochland mit einander verbunden; so bekommt dieser Strich den Namen Erd- oder Landenge, (Isthmus,) und der Theil, der dadurch mit einer andern verbunden wird, wenn dieser jenem an Masse überlegen ist, den Namen Halbinsel, so wie eine in beträchtlicher Länge in das Wassergebiet auslaufende Landmasse den Namen Landzunge.

Das feste Land, wie die Inseln, theilt sich wieder nach Verschiedenheit seiner Erhabenheit über die Meeresfläche, ebenfalls in Hochland und in Niederungen. Inseln sind an sich nur Fortsetzungen des Continentes. Das Hochland derselben unterscheidet sich von dem Hochlande des Continentes nur dadurch, daß die Niederung zwischen ihnen und dem ihnen nahen Continent so sehr sich senkt, daß diese vom Meere überflossen wird. Inseln befinden sich daher gewöhnlich in der Nähe von festem Lande und bei einander, und haben meistens in ihrer Form und der Beschaffenheit der Klagen und Gebirge, die diese Form bedingen, Aendeutungen, daß die Landhöhe mit sich gleichbleibendem Charakter von dem Continent aus zur Insel, oder von der größern Insel zur kleinern erstreckt.

Wär die Wassermasse des Meeres nur in etwas eine mindere; so würden viele Inseln durch Zurücktreten des Meeres fortlaufende Strecken der größern Ländermasse werden, in deren Nähe sie sich befinden. Wär gegenseitig die Wassermasse des Meeres eine noch größere; so würden nicht nur mehrere Theile des festen Landes Meeresboden, sondern wohl auch manche auslaufende Theile desselben Inseln werden, obgleich die Erdengen und die Erdzungen meist selbst eine bedeutende Höhe bilden, oder Gebirge zu ihrer Grundlage haben, durch die sie gegen Zertrümmerung und Abspülung durch das Meer gesichert sind.

Die Niederungen eines Landes sind gewöhnlich große Landstrecken in der Nähe des Meeres, die, nur wenig über die Meeresfläche haben, keine oder nur eine geringe Erhebung nach der Mitte des Landes zu haben. Das Hochland aber bekommt den Namen Gebirge, wenn es gegen die angrenzenden Gegenden in einem bemerkbaren, wiewohl immer durch Krümmung verflachten, Winkel zu einer gewissen Höhe ansteigt. Einzelne, nach allen Richtungen ziemlich gleichmäßig ablaufende Erdhöhen werden Berge genannt, von denen sich Hügel bloß durch ihre mindere Höhe unterscheiden.

Im Ganzen aber ist es Charakter der Gebirgsbildung, daß die Landhöhen in Strichen sich fortsetzen, die, ob sie gleich mannigfaltig sich krümmen und in ihren höchsten Punkten Ungleichheiten, (Bergkuppen,) bilden, doch mit ihnen nahen, in großen Strecken mehr oder minder Parallelität zeigen. Eine solche fortlaufende Strecke Hochland wird nun, wenn es nach entgegengesetzten Seiten zu eine divergirende Richtung, (Abdachung,) zeigt, ein Gebirgsrücken, (Gebirgskamm,) genannt, der aber auch selbst, wenn er zugleich der Breite nach weit sich ausdehnt, eine Bergebene seyn kann. Man bemerkt gewöhnlich, daß der Abfall oder die Abdachung eines Gebirges auf einer Seite steiler ist, als auf der andern, ohne jedoch zur Er-

Klärung dieser Eigenheit ein genügendes Grundgesetz gefunden zu haben. Eine zweite häufig vorkommende Eigenheit zweier neben einander liegender Gebirgsrücken ist: daß wo der eine seitwärts ausbiegt, der andere eine verhältnißmäßige Einbiegung macht, und daß so die Parallelität der Gebirge sich gewöhnlich auch in den Krümmungen erhält. Entsprechend zwei parallel laufenden Gebirgen bilden und krümmen sich nun auch die zwischen ihnen besaßten tiefern Gegenden, oder Thäler, deren tiefste Theile sich gewöhnlich da bilden, wo das ein Gebirge den steilsten Abfall hat.

Gewöhnlich erhebt sich ein Gebirge aus einer Landebene erst allmählig, und das Land wird bloß hügelig. Man nennt diesen Theil des Landes, wo das Gebirge anhebt, den Fuß des Gebirges. Sonst unterscheidet man auch häufig an den Hauptgebirgen zuerst zusammenhängende, mäßige Erhöhungen oder Vorgebirge<sup>71</sup>; dann eine zweite etwas höhere Bergreihe, Mittelgebirge, hierauf erst die höchsten Berggrücken, Hochgebirge.

Höchst bemerkenswerth für die Bildung der Erdoberfläche ist die Art und Weise der An- und Zusammenfügung der Gebirge, indem in dem höchsten Gebirgszuge einer Ländermasse, oder auch einer Welttheils, sich seitwärts nach allen Richtungen, die aber im Durchschnitt mit der eines rechten Winkels in Vergleich gebracht werden können, andere, meist kleinere Bergzüge wie Rippen an ein Rückgrath, an diese aber wieder andere, wiewohl meist schon verflachten, auf gleiche Weise, und so fort sich anfügen, bis zuletzt das ganze Land sich abplattet. Es bilden nämlich auf gleiche Weise sich auch die zwischen den Gebirgen laufenden Thäler in mehr oder minder ausgehöhlten, oft aber auch nur in leichten, kaum merklichen Vertiefungen oder muldenförmig aus, und eben so wird auch der Abfluß der dickflüssigsten Stellen der Thäler einnehmenden Gewässer darnach bestimmt. Oft treten auch in den höhern Berggrücken Seitengebirgszüge so ein, daß von den höchsten Punkten an nach vier Gegenden zu zugleich Abhänge sich bilden, nach denen hin die Gewässer verlaufen<sup>72</sup>. Ueberhaupt ist aber die Form und Verbindung der Gebirge so mannigfaltig, um in ihren Verschiedenheiten unter gewisse Begriffe gebracht werden zu können. Häufig wechseln in einem Zug höhere und tiefer Gebirge, und bilden so eine Bergkette, oder die Verbindung durch Seitengebirge ist auch negartig, wodurch mehr oder minder geschlossene Thäler gebildet werden u. s. w.

Die Gebirge haben größtentheils Andeutungen, die Bildung ihrer Form theilweise erst in späterer Zeit erhalten zu haben, dieß nicht allein in ihrem innern Gefüge, wovon früherhin die Rede gewesen ist, sondern auch in ihrem äußern Ansehen, wo es unverkennbar ist, daß Theile von ihnen in späterer Zeit, zufolge irgend einer übermächtigen

71) In der Nähe des Meeresufers wird auch jede Berghöhe, die einen vorragenden Winkel des Landes bildet, und aus festem Gestein besteht, ein Vorgebirge genannt. 72) So hat der Höhenzug der Alpen in der Nähe des St. Gotthardberges eine vierfache Abdachung, in deren nördlichen die Reuß, in der westlichen die Rhone, in deren südlichen der Tessin, und in deren östlichen Mittel- und Vorderelbe entspringt. Von gleicher Art ist das Fichtelgebirge, von dem aus nördlich die Saale, westlich der weiße und rote Main, südlich die Maab, östlich die Eger abfließt.



Viele Berge auf der Erdoberfläche, vorzüglich von kegelförmiger Form, ob diese bei weitem nicht alle, sind Producte früherer vulkanischer Eruptionen, oder wirklich ausgebrannte Vulkane. Sie stehen gewöhnlich auf ebener Fläche isolirt, öfters nahe bei einander in mehrerer Anzahl. Die noch von Zeit zu Zeit brennenden sind meist einzeln, auf Inseln, nahe am Meer<sup>71</sup>; auf dem Gipfel zeigen sie gewöhnlich eine trichterartige Vertiefung, (Crater,) durch der Ausbruch erfolgt; doch entstehen auch öfters Oeffnungen

43 ½

in den Seiten des Berges. Die Vulkane bilden keine eigene Classe von Gebirgen, sondern drängen sich durch die Ur- und Flözgebirge wie durch die Ebenen und den Meeresboden hervor.

Die Eruptionenphänomene der Vulkane sind von verschiedener Art. Mächtige Erschütterungen des Berges und der umliegenden Gegend gehen ihnen zuvor, in dem Maße, als die Eruption sich verzögert, oder erschwert erscheint. Zuerst steigen Rauch, dann Asche und Steine, (Napilli,) aus dem Crater auf; nun erhebt sich, gewöhnlich in Form eines Pinienbaums, eine mehrere tausend Fuß hohe Feuersäule von dem Durchmesser des Craters selbst. Ist die ungeheure Kraft, welche aus des Berges Tiefe diese, aus glühendem und geschmolzenem Gestein bestehende Masse zu dieser Höhe zu schleudern und, indem jene durch ihre Schwere zurückfällt, ihr neue Masse nachsendend, welche sie, gleichsam spielend, in den Lüften Stunden und Tage lang zu erhalten vermag, endlich erschöpft; so erfolgt ein Ausfluß von denselben glühenden Stoffen, (Lava,) zu den Seiten des Berges hinab, die dann Meilen weit langsam fortströmt, oder vielmehr sich vorwärts schiebt, und alles Zündbare, was sie erreicht, in Flammen setzt. War der Crater vor dem Ausbruch verschlossen; wird das Gewölbe desselben mit Gewalt gesprengt, und es erfolgt auch wohl Risse des vulkanischen Kegels längs seines Abhanges. Die Ausbrüche erfolgen mit mannigfaltigem Wechsel der Erscheinungen und Absätzen, mit wechselnder Stärke, längere oder kürzere Zeit hindurch nach längern oder kürzern Zwischenräumen wiederkehrend, ohne ersichtliches allgemeines Grundgesetz. An dem vulkanischen Erdproceß nimmt zugleich die Atmosphäre thätigen Antheil. Um die gebildete Feuersäule zieht sich dickes Gewölke zusammen, das von unzähligen Blitzen durchleuchtet wird, und das Gebrüll des Donners gesellt sich zu dem furchtbaren Artilleriefalven ähnlichen Krachen von Explosionen des Gesteins im Innern des Gebirges. Auf mehrere hundert Meilen in der Runde erstreckt sich der dadurch aufgeregte meteorologische Proceß. Aus weit entfernten Gegenden ziehen Wolken nach dem Vulkan hin und ergießen sich in dichten Regengüssen. Die vom Wind ebenfalls Meilen weit umhergetriebene Asche, als letzter Rückstand des vulkanischen Processes, fällt mit dem Regen zugleich auf die umliegende Gegend herab, wo sie zwar oft nicht geringe Verheerungen anrichtet, aber für die spätere Zeit der Vegetation von höchstem Vortheil ist. — Nach beendigtem Ausbruch dringt noch an tiefern Stellen des Berges kohlen-saures Gas als Mofetten hervor.

Die vulkanische Feuersäule ist ein ungeheurer Entzündungsproceß von aus dem Vulkan sich entwickelndem Wasserstoffgase. Es deutet dieß auf eine mächtige Wasserzersezung in der Tiefe der Erde hin. Mit dem Wasserdampfe, der Lava, der Asche und Napilli wird eine Menge kohlen-saurer Schwefelsäure und oxydirtes Eisen ausgeworfen zu deren Bildung der Sauerstoff des Erdwassers verwendet wird, außerdem viel rohes Gestein.

Die einfache Beobachtung der vulkanischen Eruptionen führt zu der Voraussetzung, daß im Innern des Erdkörpers, und zwar tief unter dem Meeresgrund, große Höhlen befindlich seyn müssen, die der Herd des Vulkans bilden; unter welchen Bedingungen aber



in welcher Verbindung mit dem übrigen Erdenleben, ist und bleibt problematisch. Die bewegende ungeheure Kraft ist wahrscheinlich bloß der erhitzten Wasserdämpfe. Eben so wahrscheinlich haben Schwefel diese die Hauptrolle in Erzeugung der hohen Temperatur, da wesentlich ein Gemisch von gleichen Theilen Schwefel- und Eisenfeile, natürlichen Feuchtigkeit der Erde überlassen, sich erhitzt, Explodiren bewirkt und einen Dampf gibt, der bei der Berührung der atmosphärischen Luft sich entzündet.<sup>74</sup>

Die vulkanischen Producte sind überhaupt nicht eigenthümliche Formationen, sondern Gesteine und Gemische von allerlei Art, welche der vulkanischen Einwirkung ausgesetzt waren, und dadurch Veränderungen erlitten haben. Die eigentlichen vulkanischen Producte sind aber solche, welche vom vulkanischen Herde oder der Stätte, wo der vulkanische Proceß ausgeht, selbst ihren Ursprung nehmen, uneigentliche aber Theile der darüber liegenden Erdoberfläche, welche abgesprengt, und zugleich der vulkanischen Einwirkung allweise ausgesetzt gewesen sind. Vulkanische Producte haben indessen das Eigene, daß in ihnen und Theile der Erdoberfläche, aus (noch ungründeten,) Tiefen zur Schau gelegt sind, die außerdem, (selbst im Bergbau,) dem Menschen durchaus unzugänglich sind. Zu Umwandlung der vulkanischen Masse, mögen aber, außer dem Feuer, auch das Wasser und die Säuren wesentlich mit wirken. In denjenigen Vulkanen, die, ohne sich zu entzünden, bloß Wasser und Schlamm auswerfen<sup>75</sup>, ist dies unverkennbar.

Das vorzüglichste vulkanische Product ist die Lava, die aber an sich nichts ist, als eine mineralische Masse von sehr verschiedener Art, welche durch Einwirkung einer großen Hitze in einem Vulkan flüssig wurde. Die wenigsten Laven sind förmlich geschmolzen oder verglast; die meisten sind im Bruch mattglänzend, oder auch ganz matt und beinahe erdicht; alle fließen jedoch mit Rothglühhitze aus. Merkwürdig ist die Menge der ausgeworfenen Laven, aus denen in einem einzigen Ausbruche nicht selten bedeutende Berge, ja wohl Berge größer als jeder bekannte, einzelne Berg, der Masse nach, gebildet werden konnten.<sup>76</sup> Die Hitze der Laven und zugleich ihre Dauer ist so groß, daß auf einem laugen Wege ihres Abflusses nicht nur alle vegetabilischen und animalischen Substanzen dadurch entzündet und verkohlt, sondern auch Metalle geschmolzen werden<sup>77</sup>. Die Hitze der glühenden Lava am Rande des Craters ist gewiß nicht geringer als 1400° Reaumur, wahrscheinlich aber noch bedeutend größer.

74) Die nähere Ausführung der Hypothese, nach der aus großen Wasserhöhlen in der Erde von Zeit zu Zeit eine große Wassermenge in die vulkanischen Herde gelangt und den vulkanischen Proceß einleitet, oder auch, wo dieser verhindert wird, Erdbeben zur Folge hat, s. in Warron's Grundr. d. Phys. d. Erde, S. 192. u. f. 75) wie mehrere Amerikanische, die Humboldt untersuchte, und der sogenannte Eniwulkan Masalaba in Sicilien. 76) Die im Jahr 1783 in Island ausgeworfene Masse wird einer Masse von 60 Quadratmeilen Fläche und 100 Tollen Tiefe gleich geschätzt. Dies gibt einen kegelförmigen Berg von 4700 Tollen Höhe und 9400 Tollen Durchmesser, sechs Mal so groß als der Montblanc und mehr als  $2\frac{1}{2}$  Mal so groß als der Ehlborasso. 77) In den zerstörten Städten in der Nähe des Vesuv, die jedoch einen Abstand von mehreren italienischen Meilen von seinem Crater haben, fand man Silber geschmolzen und Kupfer gelichtet.

Die Unterschiede der Laven beruhen, nach dem Gesagten, wozu nicht auf oryctognostischen Charakteren <sup>78</sup>. Meist sind sie von schwärzer Farbe; doch variiert die Farbe auch bis ins Hellgraue mit ein grünen Tinte; zuweilen sind sie auch rothbraun. Sie bestehen größtentheils aus Kiesel- und Thonerde mit einem reichlichen Eisengehalt und vielem Natron. Sie sind mit einer Menge Crystallen untermengt, die in den dichten Laven oft den größten Theil ausmachen und die man als Augitcrystallen von dunkelgrüner, und Leucitcrystallen, von weißlicher Farbe unterscheidet. Hiernach theilt man auch die Laven selbst in Augit- und Leucitlaven; in der sogenannten Glaslava fehlen beide; in der schlackigen Lava sind sie feltner <sup>79</sup>. Die Laven verwittern sehr langsam; erst nach Jahrhunderten wachsen einige Flechten darauf. Dagegen bemerkt man an vulkanischer Asche schon nach wenigen Jahren den schönsten Pflanzenwuchs. — In den Laven gehört auch der Peperino von aschgrauer Farbe, mit vielen braunen Glimmercrystallen.

Die vulkanische Asche und die Kapilli sind concrete Auswürfe, mit allen Kennzeichen der Vulkanität. Sie unterscheiden sich durch die Feinheit. Kapilli wird die gröbere Asche nebst den sandartigen Auswürfen genannt. Sie scheinen Bruchstücke von Bimsstein zu seyn; mit Augit- und Leucitstücken. Ihre Bestandtheile sind eben so mannigfaltig als die der Lava.

Der Bimsstein ist ein vulkanisches Product von lichtgelber und rauchgrauer Farbe; die aber beide mannigfaltig nuanciren, von geringem specifischen Gewicht. Auch er enthält Kieselerde, Thonerde und Eisen, oft auch andere Gemengtheile. — Der vulkanische Tuff ist ein Conglomerat aus Kapilli, Bimsstein und Lava mit vulkanischer Asche und Wasser; der Peperino nichts anders, als eine weiße, graugeflammete Lava, die Feldspathlava ein nur wenig modificirter Feldspath.

Außer diesen steinartigen Massen liefern die Vulkane noch Kochsalz in Crystallen und efflorescirt, Schwefel sublimirt, zwischen den Rissen der Lava, Schwefelsäure und Salmiak in großer Menge, ebenfalls in den Rissen der Laven, Natron und Kalischwefelsaures Eisen, salzsaures Kupfer u. s. w.

Mit den schlammigen Auswürfen der Amerikanischen Vulkane werden auch wohl frische, wenig veränderte Fische ausgeworfen, welches beweist, daß die Substanz dieser Auswürfe gleichsam nur einen Gang durch den vulkanischen Herd gemacht hat, ohne darin aufzuhalten.

Das Erdbeben ist bei vulkanischen Ausbrüchen ein begleitendes meist ihnen vorausgehendes Ereigniß; ohne diese ist es um so mächtiger als die dabei thätige Kraft nicht, wie dort, einen freien Austritt die ihr keinen Widerstand leistende Atmosphäre findet. Entbundene und sprengende Dämpfe in den innern Räumen der Erde scheinen auch hier das Hauptagens zu seyn; doch werden nicht alle Erschei-

78) Man unterscheidet von den Laven des Vesuvius allein neunzehn Arten, und schwach ist die Aufzählung derselben erschöpft. 79) Wahrscheinlich bilden sich beide erst während der Erstarrung der Lava unter ihrem Ausströmen, und die Letztere später als die Augite.



agen daraus erklärlich, so nicht die ungeheure, nur den electrischen inomenen ähnliche Geschwindigkeit der Verbreitung der Wirkung, nicht die Wahrnehmung, daß man an ganz entfernten Orten, aber durch Eigenheiten sich auszeichnen; gleichzeitige Wirkungen Erdbeben wahrnimmt, nicht die Vorempfindungen, welche Thiere Erdbeben haben, die meteorologischen gleichzeitigen Vorgänge u. 80; daher der Proceß wohl hauptsächlich mit ein electrischer, der noch lange nicht genug ausgemittelten Bedingungen seyn mag. Die Uebereinstimmung des Erdbebens mit vulkanischen Ausbrüchen heißt das eigene Getöse und Rollen, was häufig dabei unter der vernommen wird; der zuweilen unter demselben aus der Erde steigende Dunst in Art der Mofetten, auch wohl das wirkliche Hervordringen von Rauch und Flamme aus der sich spaltenden Erde. Der Erdboden wird dabei bald in horizontaler Richtung gehoben, bald nur in verticaler erschüttelt, wodurch Gebäude umstürzen, Quellen, Flüsse und Seen theils verschwinden, theils überfließen, und wenn Erdbeben sich unter dem Meeresboden hin erstreckt, dieses in die stärkste Bewegung geräth<sup>81</sup>. Zuweilen ist die mit der Zerstörung einiger Erdstriche verbundene Erschütterung des Erdbodens das Werk einiger Minuten<sup>82</sup>; andere Male dauern die Bewegungen, doch in minderer Stärke, Tage und Wochen lang.

In gleicher Art, wie bei Erdbeben sich Land plötzlich und gewaltsam hebt, erfolgt dieß zuweilen auch, ohne Begleitung zerstörender Erhebung. Die ältere und neuere Geschichte gedenkt einer Menge neuer Inseln, die auf diese Art aus dem Meeresgrund gestiegen<sup>83</sup>, ja auch in Flüssen hat man ähnliche Beobachtungen<sup>84</sup>. Auf dem festen Lande sind dergleichen Erhebungen des Bodens minder beobachtet, oder es leisten wohl auch die Gebirgsrücken zu viel Widerstand. Bemerkungswerth ist, was Streffen's (geognostisch-geolog. Auff. S. 321) über die Zerstörung der Steinkohlenlager, ingl. der warmen Quellen an Erdbeben u. vulkanischen Eruptionen sagt. 81) Bei dem Erdbeben, welches im J. 1746 Lima und Callao in Amerika zerstörte, gingen 25 Schiffe im Hafen von Callao unter, vier andere wurden fast eine Meile weit an das Land geworfen. 82) Das Erdbeben, welches im Jahre 1759 Syrien verheerte, legte beim ersten Stöße Antiochien nebst sieben Städte in Trümmer, und kostete über 30 000 Personen das Leben. Das Erdbeben, welches im Jahr 1797 Peru verwüstete, wüthete bis auf 170 Meilen in der Länge und 140 Meilen in der Breite. Die geborstene Erde bildete ungeheure Schlünde, Berge zerrissen, und spien eine ungeheure Menge von stinkendem Wasser und Schlamm; während des Erdbebens war ein Vulkan in der Nähe in einer Eruption begriffen, die augenscheinlich nicht genug Ableitung bewirkte. 83) Nach dem Berichte des Seneca stieg die Insel Sanceria, (Sancorin,) plötzlich vor den Augen der Seelente aus dem mittelländischen Meere hervor. Plinius (hist. mundi c. 84) meldet ebenfalls, daß in früherer Zeit zugleich dreizehn neue Inseln aus demselben Meere emporgestiegen seyen, unter ihnen Rhodus und Delos, wos man indessen auch aus einem Zurückziehen des Meeres erklären könnte. Im Jahre 1707 erblickte man auf der Insel Santorin auf einmal zwei bis drei Meilen vom Lande einen neu entstandenen Felsen. Diejenigen, welche ihn näher untersuchten, fanden Blinsstein und Ainstern auf ihm, und bemerkten, daß derselbe unter ihren Füßen immer größer wurde. Die neue Insel wuchs mehrere Tage lang. Bald darauf sah man in der Nähe mehrere Klippen aus dem Meere aufsteigen. Mehrere Beispiele s. in Buffon's allg. Naturgesch. 3. Th. 17. Art. Die eiparischen Inseln scheinen alle durch vulkanische Wirkung erst in späterer Zeit entstanden zu seyn. Auch bei Island entstand bei der großen vulkanischen Eruption im Jahr 1783 eine neue Insel. 84) wie vor einigen Jahren in der Havel unweit Potsdam.



stand. Häufiger sind die Einsenkungen einzelner Theile des Bodens oder die sogenannten Erdfälle.

So wie diese auf nahe liegende Höhlen unter dem Erdboden, deren Form sich von Zeit zu Zeit ändert, hindeuten; so sind dergleichen Höhlen auch in Bergen von unterschiedlicher Form und Größe und von unterschiedlichen Eigenheiten, die als Naturmerkmale aufgestellt werden, nicht selten<sup>85</sup>. Sie kommen meist in Kalkstein vor; zum Theil sind sie jedoch auch Basalthöhlen. In ersteren ist der sich zu unzähligen Configurationen bildende Tropfstein bemerkenswerth, zu dessen Entstehung die über dem Kalkfelsen, die die Höhle deckt, wachsenden Vegetabilien wesentlich mitwirken müssen<sup>86</sup>. Die Temperatur in diesen Höhlen ist nicht nur von der jetzigen maligen Temperatur der äußern Luft, sondern auch von der mittleren Jahrestemperatur, und der Temperatur tiefer Keller und Gruben verschieden, wechselnd und steigend, öfters der äußeren Temperatur entgegen, so daß sich im Sommer Eis in der Höhle bildet, welches im Winter schmilzt. In andern Höhlen, (Windhöhlen,) findet man eine beständigen starken Zug durch kleine Oeffnungen.

Die relative Höhe der Berge, von welcher Art diese übrigen seyn mögen, ganzer Gebirgszüge, Gebirgsketten und Bergebenen, so wohl als einzeln stehender Berge oder Bergkluppen, ist mit Recht ein besonderer Gegenstand der physischen Erdkunde, da von ihr besonders die Bildung des Landes und seine natürliche Abtheilung, die Richtung des Laufes der Gewässer u. s. w. abhängt. Man nimmt bei Bestimmung einer Berghöhe, entweder, und besonders wenn sich ein Berg mit einem Mal merklich von einer ebenen Fläche aus erhebt, dies zum Augenmerk, und berechnet den Abstand des Berggipfels von seinem Fuß in perpendicularer Richtung; oder man bestimmt in unversellener Beziehung die Erhabenheit eines Berggipfels über die Meeressfläche, nämlich von der sphäroidischen Form aus, welche das Weltmeer wegen der Abplattung der Erbkugel nach den Polen zu, und wegen ihrer Umschwingung um ihre Are gleichmäßig bilden würde, wenn sich nirgends festes Land über dasselbe erhöhe. Man hat insbesondere in dem tiefern oder höhern Stand des Barometers, je nachdem es in höhere oder niedere Räume der Atmosphäre gelangt und darnach einem mindern oder mehreren Luftdruck ausgesetzt ist, ein angemessenes Mittel gefunden, unter Benützung hierzu nöthiger Red

85) In Deutschland sind die bekanntesten: die mit Tropfsteinbildungen ausgezeigten Höhlen des Müggendorfschen Thals im Fichtelgebirge, unter ihnen die Rosenmüllersche und Galsenreuthsche Höhle mit Rückständen von Thierknochen; die Baumannshöhle am Unterharz, und andere. Außerdem verdienen Bemerkung: die Höhle im Petersberge bei Braunschweig wegen Boosgethen; die Grotte de St. Vaast in den Ebenen wegen Tropfsteinbildungen; die Höhle de la Verguilla in der Spanischen Provinz Murcia desgl.; die Höhle vom Carleton in Derbyshire, mit ihrem See, den man in der Verhale derselben durchfahren muß, und ihrem in einen unabhiehbaren Abgrund sich stürzenden Flusse; die Fingalsöhle nebst mehreren Basalthöhlen auf der Insel Stoffa; die Adelsberger Höhle, sechs Meilen von Teisitz, durch welche Gewässer strömen und deren Wellen weite Räume nach zum ersten Theil unterforscht sind; die Höhle Dolsteren in Harroo in Norwegen, die weit unter dem Meere fortläuft, und der Sage nach sich bis Schottland erstreckt; die Fjeldrichshalle im Nisther Røse in Norwegen mit ihrer unregelmäßigen Tiefe, welche die Höhe des Chimborasso zwei bis drei Mal übersteigt; u. s. w. 86) wenigstens nach Parrot's Voraussetzung (a. a. O. S. 99.)



ocationen, den hiernach relativen Standpunct auf der Erdoberfläche bestimmen. (Vgl. den Artikel Barometer,) und vorzüglich nach sind nicht nur die bekanntesten Berghöhen, sondern auch relative Lage der mehesten bekannten Wohnorte der Menschen gegen die Meeresfläche wenigstens approximativ eben so genau bestimmt, die geographische Länge und Breite derselben.

Man kennt kein allgemeines physisches Gesetz, wornach sich die relative Höhe der Berge richtet. Außerdem daß die Aequatorialgegenden wegen der Erdform selbst, als ein großer Berg Rücken zu betrachten sind, finden sich hohe Berge sowohl in der Nähe des Aequators, als auch in unterschiedlichen Abständen von demselben, doch nicht so, wie überhaupt die großen Ländermassen mehr in der nördlichen Hemisphäre sich zusammenhäufen, auch mehr in der letztern. Man ist begreiflich, daß wo die Länder sich breiten, auch in ihnen ihr gebirgige Gegenden sich finden; doch ist es keine Regel, daß gerade in der Mitte des Landes die Berge am höchsten sind. Auf kleinen Inseln finden sich oft sehr hohe Berge. Man muß indessen in Hinsicht auf das allgemeine organische Leben hohe Landebenen von einzelnen hohen Bergen und Bergspitzen unterscheiden. Als Hochland überhaupt zeichnet sich Hoch-Asien durch seine Verbreitung aus, in das nach neuern Messungen des Engländers Obersten Crawford, der eine Spitze des Mustags 25,000 Fuß hoch gefunden hat, die höchste Berghöhe fallen würde, als welche gewöhnlich der Chimborasso in dem an Flächenraum viel geringeren Hoch-Amerika betrachtet wird.<sup>87</sup>

187) Folgende sind die relativen Höhen der vorzüglichsten genau gemessenen Berge. Gr. Fuß.	
Chimborasso, nach v. Humboldt,	19,320
Die größte auf den Anden von v. Humboldt, und überhaupt von Menschen erstiegene Höhe	18,186
Antisana auf den Anden, nach Gilbert,	18,096
Elbrus auf dem Caucasus, nach Wislizenus,	16,854
Cologori auf den Anden, nach v. Humboldt,	16,464
Moyna Naa auf den Sandwichs Inseln, nach Marchand,	15,468
Tumburagna auf den Anden, nach v. Humboldt,	15,186
Mont Blanc in Savoyen, nach Saussure,	14,706
Carajon auf den Anden, von Condamine erstiegen, nach v. Humboldt,	14,620
Plichina d'egl. nach Condamine,	14,580
Monterosa in den Penninischen Alpen, nach dems.,	14,580
Egmontsburg im nördlichen Theile von Neuseeland, nach Forster,	14,373
Ortefe in Thral, nach Falken,	14,004
Mont Cervino in den Penninischen Alpen, nach Saussure,	13,854
Glacierarhorn in den Berner Alpen, nach dems.,	13,256
Jungfrauarhorn daselbst, nach Müller,	12,840
Mönch daselbst, nach dems.,	12,631
Schreckhorn daselbst, nach dems.,	12,527
Dohr auf Emmaua, nach Schuckburgh,	12,163
Großglockner in den Salzburg. Alpen, nach Schlegel,	11,982
Kleinglockner, nach dems.,	11,972
Wetterhorn in den Berner Alpen, nach Müller,	11,718
Pic de Tenzde auf Teneriffa, nach v. Humboldt,	11,502
Ambohimene auf Madagascar, nach Rocher,	10,800
Montperdu, der höchste der Pyrenäen, nach Ramond,	10,578
Vetna, nach Saussure,	10,278
Monte de Salazas auf Isle de France, nach de La Caille,	10,158

Meist ist ein durch seine Höhe sich auszeichnender Berg von kleinen umgeben, so daß er sich terrassenförmig erhebt. Die höchsten Punkte desselben nehmen nie an der höhern Temperatur Theil, welche die niedern Erdgegenden, außer der Polnähe, nach Verschiedenheit ihrer Lage, wenigstens in einem Theile des Jahres genießen. Sie sind daher auch stets mit Schnee bedeckt. Diese Decke reicht im allgemeinen um so tiefer herab, je mehr die Berge außerhalb der Aequatorialgegenden liegen. Man bezeichnet diese Grenze des ewigen Schnees nach dieser climatischen Verschiedenheit auch als die Schneelinie. Unter dem Aequator selbst beträgt sie, (nach v. Humboldt,) 2464 Toisen. Erst unterhalb dieser Höhe fängt hier die Vegetation an. Unter 35° nördlicher Breite fällt sie schon auf 1600 Toisen, unter 45° auf 1300 Toisen herab; unter etwa 75° nördlicher Breite verläuft sie im platten Lande. Doch hat das physische Klima hierauf bedeutenden Einfluß, und modificirt obige Bestimmung.<sup>88</sup> Dieser verweilende Schnee nimmt auf hohen Bergen unterschiedene Charaktere an. Die obersten Bergspitzen, woran der Schnee sich immer erneuert, sind mit einem weißen lockern Schnee umzogen, zwischen dem einzelne Zacken des Gebirges schroff hervortragen. Von diesen, (Firn), senken sich die Schneemassen durch Anhäufung, oder Schmelzen der Grundflächen in die Thäler des Mittelgebirges, als Schneebänke, von mehrerer Festigkeit und in das Graue fallender Farbe. Hier bilden sie öfters große Spalten und Klüfte, die sich zum Theil wieder mit frischem Schnee auffüllen. Die Schneebänke der

St. Gotthards Spitze, nach Müller, (der Durchs. 6357 Fuß.)	10,022
Washington im weißen Gebirge in Nordamerika, nach Tim,	10,000
Berg auf Dahall, nach Förster,	9350
Kamtschatka auf der gleichnamigen Halbinsel, nach Lamangon und	
Monger,	9000
Spitze des Libanon, nach La Villardiere,	8946
Stadt Duito, die höchste in der Welt, nach Condamine,	8796
Jurca in der Schweiz, nach Müller,	7795
Hospiz auf dem großen St. Bernhard, die höchste Wohnung der alten	
Welt, nach Mäyer,	7506
Altarusberg, nach Pfeiffer,	7128
Gipfel der blauen Berge in Jawa, nach Ewart,	6828
Der kleine Altai in Asien, nach Larman,	6780
Mont Ceris, nach de Luc,	5982
Alpigberg, nach Müller,	5536
Pico Mictino, höchster Berg in England, nach Heberdeen,	5281
Schneekoppe im Riesengebirge, nach v. Gerstorf,	9420
Endkalk-Jökul auf Island, nach Vorelsen,	4800
Besuv, nach Hamilton,	3700
Varnassusberg auf Spitzbergen, nach Mülgrave,	3678
Fichtelberg bei Wiesenthal, nach Charpentier,	3621
Tafelberg am Cav, nach Veldges,	358
Schneekopf im Thüringer Walde, nach v. Zach,	3275
Brocken, nach de Luc,	3269
Hecla, nach Wüch,	322
Inselberg in Thüringen, nach Gaspart,	3127

<sup>88</sup>) In den Alpen ist nach Gaussure, bei 45° Breite die Schneelinie 1300 Toisen; allein isolirte Berge sind noch bei 1400 bis 1450 Toisen im Sommer ohne Schnee. Auf dem Caucasus ist die Schneelinie 1647 Toisen, auf den Pyrenäen welche mit jenem unter 43° Breite liegen, nur 1250 Toisen.



den Thäler werden nun im Sommer von dem schmelzenden Schnee der Oberfläche durchdrungen, und verlieren an Dike; das geschmolzene Wasser aber, welches seiner Lage nach nicht abfließen kann, tritt im nächsten Winter und bildet nun eine Eisdecke, welche von dem Schnee erhält, der ebenfalls wieder anstaut und theilweise wieder gefriert. Diese Massen heißen Gletscher, die durch zunehmendes Herabrücken gewöhnlich einen Damm von Erde vor sich bilden, der ihnen zur Grenze dient. Auf diese Art steigt partiell auch in einer Reihe Jahren die Schneelinie herab. Die Kanten der Schneefurke und der Gletscher und die Ränder der Spalten sind gewöhnlich zackig oder bilden Klämme, die vielfache Formveränderungen erzeugen. Der mannigfaltig gefärbte Schnee liefert ein mannigfaltiges Lebensspiel, nuancirt von Weiß und Grau in Meergrün, Azurblau, Rosenroth, Orange gelb u. s. w.

Hierher gehören auch die Lawinen oder die Schneefälle. Man unterscheidet Sommer- oder StaUBLawinen, die von Firnen, der hochliegenden Schneebänken, Anfangs in lockern, dann aber in compacten Massen, doch auch im Fallen sich wieder zerbrechend und theilend in die Thäler herabfallen, und Winterlawinen, die in ungeheure Klumpen von verhärtetem Schnee, ohne sich zu zerbrechen, vielmehr im Fallen durch lockeren Schnee sich noch vergrößern, aber auch um desto zerstörender sind.

Die theilweise unter höhern Temperaturgraden immerfort schmelzenden Schnee- und Eismassen der höhern Gebirge sind unversiegliche Magazine für das Quellwasser der größten Ströme, die gewöhnlich zu ihnen verfolgt werden können. Doch sind die Quellen, die in fließenden Gewässern auf der Erdoberfläche ihren ersten Ursprung haben, überall da zu finden, wo nur in etwas ein höher liegendes Erdgatter lockeres Gestein enthält und dieses den Zusammenfluß von Feuchtigkeit begünstigt. Wir finden Quellen in den höchsten Regionen von Bergen, auch wenn selbige nicht mit Schnee bedeckt sind<sup>89</sup>. Alle Bergspitzen sind der Erzeugung von Gewölke in der Atmosphäre günstig, und von diesen Dünsten mag ein großer Theil, während sie die Vegetation des Berges, in so weit der Boden solche zuläßt, förderlich sind, durch das Geflüste und die Bergspalten in den Berg fließen, und hier sich zu Quellen ansammeln, die dann, nach den Besessen des Falls, in die Thäler herab- und zusammenfließen. Wir sind aber dadurch nicht berechtigt zu glauben, daß alles Wasser der Quellen ein atmosphärisches sei, und daß sich nicht auch in dem Innern der Erde nach einem organischen Prozesse Wasser bilde, da, zumal Quellwasser durchgängig sich von filtrirtem atmosphärischen Wasser, und zwar auf so eine constante Art unterscheidet, daß der Antheil, den auch ein reines Quellwasser an Kohlensäure, und dadurch aufgelöste Kalkerde hat, nicht bloß als eine zufällige Beifügung erachtet werden kann. Auch gibt es Quellen, die, ohne Abhängigkeit von dem Bitterungsstande und der Jahreszeit, immer mit gleicher Mächtigkeit

(89) Der Heidenbrunnen auf dem Brocken ist nur 12 Fuß tiefer als der höchste Gipfel des Berges, von dem diese Quelle 55 Ruthen entfernt ist; er liefert täglich 1440 Cubikfuß Wasser.

fließen<sup>90</sup>, andere dagegen, welche periodisch fließen oder periodische Zu- und Abnahme haben<sup>91</sup>.

Die gemeinen Quellwasser und sogenannte Mineralquellen unterscheiden sich nur durch die Menge der in ihnen außer dem reinen Wasser zu unterscheidenden Bestandtheile. Das Constante der Natur und der Bestandtheile einmal gefasster, d. i. gegen den Zufluß atmosphärischer und der Flußwasser geschürter Quellen, dient zu einem neuen Beweise der Entstehung der Wasserquellen durch einen innern organischen Proceß, zu dem nur theilweise der aus der Atmosphäre gezogene Stoff benützt wird, so daß auch hier, wie in dem Thierkörper, das ewige Gesetz der Metamorphose bei der lebendigen Circulation vorherrschend erscheint. Die lautersten Quellen, die zugleich das zur Löschung des Durstes kräftigste Trinkwasser darbieten, werden auf Berghöhen gefunden, und wo das Wasser sich durch kieselartige Steine, besonders Sandstein, in natürliche Höhlen oder gefasste Brunnen senkt. Mineralquellen heißen sie dann, wenn sie einen reichlichem Vorrath an Kohlensäure, und außer einem mehreren Antheil an Kalkerde, auch noch allerlei fremde Stoffe in Gasform, und als Salze und Erde aufgelöst enthalten, wodurch sie sich auch im Geschmack, Geruch und Aussehen qualitativ verschieden zeigen. Sie sind in dem Verhältniß dieser Verschiedenheit weniger zur Stillung des Durstes geeignet; dagegen bewirken sie in dem thierischen Körper Umänderungen, die in krankhaften Zuständen mit Vortheil für den Heilzweck benützt werden können, und die nicht durchaus von den chemisch erkannten Bestandtheilen derselben abzuleiten sind. Sie sind überall auf dem festen Lande verbreitet, wo nur der Boden bergig ist; doch sind sie nicht überall so erkannt und benützt, als in Deutschland, nächst dem in Frankreich, England, Schweden, Ungarn u. s. w.<sup>92</sup>

Man theilt die Mineralwasser gewöhnlich: 1) in kohlenstoffsaurehaltige, die außer kohlenstoffsaurem Gase von andern Stoffen nur ein Minimum enthalten<sup>93</sup>; 2) in alkalische, die kohlenstoffsaures Natron, kohlenstoffsaure Erden, salz- und schwefelsaure Salze und Erden enthalten, wornach sie wieder in erdige und salinische getheilt werden<sup>94</sup>; 3) in eisenhaltige, als die gemeinsten, welche Eisen mittelst der Kohlensäure aufgelöst enthalten, das dann nach Entweichung des kohlenstoffsauren Gases als ein gelber Oker abgesetzt wird<sup>95</sup>; 4) in muriatische, die salzsaures Natrum zum

90) so die Pader in Westphalen, der Rumpelbrunnen in Schlesien, welche mit stets gleicher Wassermenge nahe bei ihrem Ursprung Mühlen zu treiben vermögen.

91) Der Vulkanborn im Paderbornschen fließt im Sommer von sechs zu sechs Stunden, die Quelle Fontestorre in Neapel in den Sommermonaten und den Wintermonaten abwechselnd 6½ Minuten, und bleibt 3½ Minuten aus, in den übrigen Theil des Jahres setzt sie nicht aus. Die Quelle bei Almes fließt etwa aber 7 Stunden und bleibt 5 Stunden aus, und diese Periode verzögert sich täglich um 50 bis 55 Minuten. In Gebirgsgegenden findet man viele solcher Brunnen mit bestimmten periodischen Intermittenzen, die durch Witterungswechsel bloß Störungen erleiden. 92) Böhmen allein hat 97 bekannte Mineralquellen, wovon jedoch nur 13 mehr oder weniger Ruf haben. In Schweden kennt man 360, in Ungarn über 230 Mineralwasser. 93) wie der kalt Sauerling bei Karlsbad. 94) hieher gehören in Deutschland der Wiltner Sauerbrunnen, das Selterwasser im Erlerschen, der Warmbrunnen in Schlesien, die Mineral-salzquelle zu Pyrmont und mehrere. 95) Sie werden wieder in alkalisch-salinische, und alkalisch-erdig-salinische, und in muriatisch-salinische ge-



Hauptbestandtheil haben<sup>96</sup>, und die, wenn sie in vorzüglichem Grade reichlich sind, als Salzsole zu Gewinnung eines der unentbehrlichsten Lebensbedürfnisse benutzt werden<sup>97</sup>; 5) in Bitterwasser, deren Hauptbestandtheil schwefelsaurer Talk ist<sup>98</sup>; 6) in Schwefelwasser, die durch das in ihnen enthaltene Schwefelwasserstoffgas, der den an Erden gebundenen Schwefel den ihnen eignen, den faulen Eiern ähnlichen Geruch und Geschmack erhalten<sup>99</sup>; 7) in Salzwasser mit salpetersaurem Kali, dergleichen es in Ungarn eine unzählige Menge gibt. Auch gehören hierher die Alaun- und Nitriolwasser und die Kupferwasser, (Cementwasser.)

Die sogenannten incrustirenden Quellen enthalten erdige Theile in so großer Menge, daß sie sich, unter Verdunstung oder unter der Temperatur der äußern Luft nicht mehr darin aufgelöst halten können, sondern sich an feste Körper, die man in sie legt, eine Rinde absetzen<sup>100</sup>. Von den Incrustirungen unterscheiden die Versteinerungen dadurch, daß das ganze vegetabilische oder animalische Gefüge mit Steinmasse durchdrungen ist, worin die Kieselerde prädominirt.

Auch die den Quellen meist eigenen Temperaturen deuten auf ein inneres Erdenleben hin. Die meisten Quellen sind kälter als die atmosphärische Luft, und nicht selten kälter, als die mittlere Temperatur im Innern der Erdoberfläche, einige aber auch wärmer, und theilt. Zu den ersten gehören in Deutschland vorzüglich das Carlsbad, der Kaiser-Franzens Brunn bei Eger, das Töplitzer Wasser, der Gießhübler Sauerbrunn, das Brücknauer und Gachinger Wasser; zu den zweiten der Liepwerder Neubrunnen, die Quellen zu Spaa, die Wildunger Sauerbrunn, das Darß-Geldmarische, das Schwalbacher Wasser u. s. w.; zu den dritten die sechs altern Quellen zu Pyrmont, das Driburger Wasser, der Liepwerder alte Brunn, der Weinberger Tinkbrunn, ferner das Rissinger, Weinberger, Schwalbthurer Wasser.

96) wie die muriatische Quelle bei Erfurt! 97) Die Salzquellen sind eine der gemeinsten Verbreitungen über den ganzen Erdboden. Nicht nur finden sich große Massen von Salz als Steinsalz, und diese gewöhnlich in Gypsgebirgen, aus denen Salzquellen dann auch wohl ihren Ursprung nehmen, sondern es finden sich die mächtigsten Salzquellen an Orten, wo, (wie z. B. im nördlichen Deutschland,) man kein Steinsalz antrifft, obgleich Höhlen in Gypsgebirgen, die auf ausgewaschene Salzstöcke hindeuten, und die auch wohl, indem die darüber befindliche Erdoberfläche ihrer Unterlage beraubt worden, Erdfülle zur Folge haben. Gleichwohl beweist die gleichförmig anhaltende Ergiebigkeit so vieler Salzquellen viele Jahrhunderte lang, wo durchaus keine Spur von Steinsalz sich findet, wie namentlich in Deutschland die Salzquellen zu Halle, zu Frankenhäusen, zu Plünerburg, eine immer erneuerte Erzeugung des Salzes in der Erde. Was hierüber insbesondere die Bemerkungen über die Frage: Wie entstehen die Salzquellen in den Gypsgebirgen in Stréssens' geogr. geol. Vorfällen, S. 293. 98) Hierhin gehören besonders die Galdschitzer, Töplitzer Bitterwasser, das Eszomer Wasser in England; auch Rußland ist an ihnen sehr reich. 99) Sie werden wieder nach den zugleich aufgenommenen Stoffen in alkalishe, salinische, eisenhaltig-salinische und eisenhaltig-muriatische getheilt. Hierhin gehören besonders das Wächner Bad, das Gasstener Wildbad, das Neubauer und Weinberger Schwefelwasser, das Niederbadener Bad, die Bäder von Baden bei Wien u. s. w. 100)

Diese incrustirende Eigenschaft haben besonders warme Mineralwässer, und die als Luff oder Sinter bekannte Eruste besteht, (wiewohl nicht einzig,) entweder aus Kalk wie bei dem Carlsbader Wasser, oder, seltener, aus Kieselerde, wie im Genfer in Island.

1) Die Versteinerungen sind nicht bloß ruhende sondern noch fortgehende Proceß des Erdorganismus. Ein Peller der vom Kaiser Eröjan erbauten Donaubrücke wurde unter der Reiterung des Kaisers Franz I. ausgezogen, und man fand ihn bis auf  $\frac{1}{2}$  Zoll tief versteinert.

was bemerkenswerth ist, von einem in jeder sich ziemlich gleichen eignen Wärmegrad; bei manchen erreicht die Hitze den Siedepunct. Man nennt diese insbesondere Warme Quellen. Merkwürdig sind in dieser Hinsicht die Isländischen heißen Quellen, deren vornehmste als Geysir bekannt ist, die in offenbarem Zusammenhang mit dem vulkanischen Boden dieses Landes stehen.<sup>2</sup> Man hat Ursache zu vermuthen, daß bei allen heißen Quellen ein chemischer Proceß in der Erdtiefe vorgehe, der denen der Vulkane analog ist, und daß die gewöhnlichen heißen Brunnen nur unterste Glieder einer Kette gleichmäßiger Operationen sind, deren nächstes Glied die Isländischen Springbrunnen, so wie das ihm nächste die Schlammvulkane, das höchste aber die Lavavulkane constituiren.<sup>3</sup>

Die von den höchsten Gegenden des festen Landes herabfließenden Quellen strömen in Gerinnen herab, in denen sie bald neuen Zuwachs, theils aus kleinern aus der Erde hervordringenden meist unbemerkten Wasserquellen, theils durch hinzutretende gleiche Gerinne gewinnen. Das hierdurch entstehende Fließwasser wird, nach seiner relativen Größe und Mächtigkeit und der fortgehenden Wiederholung von Seitenzuflüssen, ohne bestimmte Charaktere des Unterschiedes, als Bach, Fluß und Strom bezeichnet. Die Benennung eines Flusses würde indessen füglich als Collectivausdruck für den ganzen Wasserzug von der obersten Quelle an bis zu seinem endlichen Erguß, welcher gewöhnlich das Meer ist, gebraucht werden können, wornach dann nur Hauptfluß, als der größere Zug, der seinen Rahmen unverändert behielt, und Seitenflüsse, die in den Hauptfluß sich ergießen, aber ebenfalls wieder Seitenflüsse zu ihrer Massenvermehrung erhalten, und in so fern als größere und kleinere, oder als ersten und untergeordneten Rangs, zu unterscheiden wären. Zuweilen theilt sich auch ein Fluß in seinem Lauf wieder in mehrere Arme, die sich entweder wieder vereinigen, oder auch einzeln sich ergießen, oder auch wohl Verbindungen mit nahe fließenden Gewässern eingehen, seltner theilweise versiegen; dergleichen durch die Kunst bewirkte Ableitungen von Flüssen sind als Canäle bekannt. Hin und wieder durchströmen kleinere Flüsse wohl auch Berghöhlungen, oder verlieren sich eine Strecke lang unter der Erde.<sup>4</sup>

Die höchsten Quellen kommen entweder schon als Fließwasser aus der Erde, zur Seite oder am Fuße eines Berges oder Hügels hervor, oder sie entspringen sich aus einem sumpfigen, schlammigen Boden, einer hohen Stelle, dessen Wasserzusammenfluß selbst aus mehreren ununterscheidbaren kleinen Quellen gebildet wird; oder sie entstehen

- 2) Island hat mehr als zwanzig von Zeit zu Zeit Feuer auswerfende Berge, (Jökul) und ist unaufhörlichen Erdbeben unterworfen. Heiße Wasserquellen werden an mehr als hundert Orten angetroffen. Mehrere sind Sprinkquellen, die perlend das siedend heiße Wasser zu bedeutenden Höhen, wie namentlich der Geysir, zu 60 bis 70 Fuß hoch treiben. 3) Befriedigender als aus unterirdischen durch verwitternde Schwefelkiese entzündeten und Jahrhunderte lang ruhig fortbrennenden Steinkohlenshöfen lassen sich nach Steffens (a. a. O. S. 319) die heißen Quellen aus einer Galvanischen Spannung erklären, die in Gegenden, wo sie vorkommen, durch abwechselnde Schichten von Sand, Schiefer und Steinkohlen, durch welche Gewässer hindurchfließen, obgleich noch vieles hypothetisch und problematisch bleibt, und Gegenstand fortgesetzter Naturforschung ist. 4) wie die Rhone bei Ecluse.



in einem stehenden Wasser, (Teich, See,) das selbst erst auf gleiche Weise seinen Ursprung nimmt. Von dem Wasser, aber, das als Quellwasser in die tiefern Landgegenden strömt, geht ein großer Theil durch Verdunstung in die Atmosphäre über; ein anderer Theil dringt in die tiefern Erdräume, wenn und wo ihm Abzug dafür gegeben ist; ein anderer Theil wird zur Vegetation, und zur Unterhaltung animalischen Lebens, insbesondere auch für mannigfaltige Zwecke des menschlichen Lebens verwendet. Dagegen bekommt das Quellwasser durch Regen und überhaupt atmosphärische Niederschläge überreichen Zufluß, so daß nach Berechnungen das Wasser, was beim Ausfluß des Stroms in das Meer gelangt, noch immer nicht so viel beträgt, als man den Betrag des fallenden Regens, und überhaupt des atmosphärischen Wassers schätzen kann; indem auch dieses wieder, ehe zum Ausfluß eines Stromes gelangt, mannigfaltig consumirt wird. Aber füllen auch alle Bäche, Flüsse und Ströme durch Regen, oder im Winter durch eintretendes Thauwetter, sich weit über den Betrag der Wassermenge in trockner Jahreszeit an, und es treten temporäre, wohl auch periodische Ueberschrömungen ein.

Die Schnelligkeit des Abströmens, die Biegungen, welche ein Fluß macht, die Breite und Tiefe des von ihm gewöhnlich bedeckten Bettes, oder das Flußbett, richten sich nach der Natur des Landes, der Abhängigkeit desselben, dem festen oder lockeren Gestein, aus dem es besteht u. s. w. Ein Wasser fließt um so schneller, je stärker die vorrängende Wassermasse, je enger der Raum, zwischen dem, und je steiler der Boden ist, über den es wegschließt. Bildet dieser einen gleichmäßigen Abhang, so entsteht dadurch ein Wasserfall. Auf ebenen Oberflächen, und überhaupt, wo das Wasser eines Flusses keinen Widerstand findet, fließt es schneller als in der Tiefe und in Krümmungen.

Weil das Wasser, nach den Gesetzen der physischen Einwirkungen, durchdringt Stoffe auf feste, besonders bei Vermehrung seiner Masse durch reichlicheren Zufluß, einen Theil der Hindernisse, die das feste Land seinem Lauf entgegenstellt, aus dem Wege räumt; so hat auch der Fluß sich sein Bett zum Theil selbst ausgebildet und ausgehöhlet. Die bloße Kraft des Wasserdrucks würde aber nicht hingereicht haben, tiefe Thäler zwischen parallelen Gebirgen auszuhöhlen und ihnen ihre Richtungen zu geben, wie wir dies jetzt bemerken; wir müssen vielmehr die Ausbildung der Erdoberfläche, als meist längliche muldenartige Vertiefungen mit offenen Enden, (nicht bloß als kesselförmige Höhlungen in Ringgebirge, in denen die Gewässer stehen bleiben müssen,) als eine ursprüngliche, der Bestimmung der Erde, ein organisches Leben auf sich zu erhalten, nöthwendige betrachten. Noch jetzt aber finden sich alle fließenden Gewässer mit dem festen Lande, über das und durch das sie hindurch fließen, in einem beständigen Conflict, in dem unaufhörlich, besonders unter stärkerem Andrang der Gewässer,

6) Wie die den Bewohnern von Nieder-Aegypten so wichtigen Austrittungen des Nils von den vorhergehenden periodischen Regnen in Abhänghen. 6) Der bekannteste in Europa, des Rheins bei Schaffhausen, hat 75 Fuß Höhe, der höchst in der Welt ist, der des Flusses Bonora in Südamerika, der senkrecht 1200 Fuß herabstürzt, der größte aber der des Flusses Niagara in Nordamerika, der senkrecht 150 Fuß herabfällt.

von den obern und höhern Theilen feste Stoffe abgeführt und hin und wieder angelegt, oder auch die Ufer der Ströme durchbrochen und Theile des festen Landes mit fortgeführt werden, wodurch selbst der Lauf eines Flusses mannigfaltige Umänderungen erleiden muß, in welchem Conflict dann der Mensch, je nachdem es zu seinem Vortheil ist, bald dem Strom in seinem Streben, sich freien Lauf zu verschaffen, bald dem Ufer in seinem Widerstand gegen den Strom zu Hülfe kommt, wie überhaupt die menschliche Industrie vielseltig eingreift, um das strömende Gewässer für die besondern Lebenszwecke zu benutzen und es sich zu unterwerfen.

Der Boden, über den ein Fluß wegstießt, oder das Flußbett zeigt an sich die nämlichen Verschiedenheiten, welche auch die von Wasser unbedeckte Erdoberfläche zeigt. Da aber das Wasser, wo es seine volle Strömung hat, die erweichbaren und leichten Erdtheile mit sich nimmt; so ist er an sich gewöhnlich fest und steinig, zugleich aber mit dem größern und kleinern Gestein angefüllt, welches das Wasser von den höhern Gegenden abespült hat, und welches, da die scharfen Ecken durch das Forttollen abgebrochen und abgeschliffen sind in Verbindung mit dem völlig zerbröckelten Gestein, (aus dem man auch wohl hin und wieder Gold durch Waschen gewinnt,) als Flußgestein und Flußsand sich darstellt, und dessen feinste leicht fortzuschleppen die Theile, wenn sie sich in irgend einer tiefern Stelle des Flußbettes angehäuft haben, als Trieb sand bekannt sind. Die Hauptströmung des Wassers ist aber nicht eben in der Mitte des Stromes sondern bei Krümmungen desselben gewöhnlich in der eingebogenen Stelle; überhaupt ist auch nach der Bildung der Thäler, wo der Strom überhaupt häufiger der Seite des Thals, wo das feste Land am steilsten sich senkt, folgt, das Flußbett selbst ein geneigtes und auf einer Stelle gewöhnlich tiefer als auf der andern, daher die Flußtiefe, (das Fahrwasser oder der Thälweg der Schiffer,) nicht gerade mit seiner Mitte übereinstimmt. In den Theilen nun wo die Strömung geringer ist, häuft sich auch leicht lockeres Erdreich an, oder es wird daselbst abgelegt, das theilweise selbst der Vegetation, wie dem animalischen Leben der Wasserthiere, günstig ist, und Boden für Wassergewächse wird. Durch zufällig in der Mitte sich erhebenden Boden, welcher auch wohl über die Wasserfläche hervorragend oder eine Insel bildet, auf der sich dann wohl auch Vegetation entwickelt, entstehen auch wohl zwei oder mehrfache Strömungen u. s. w.

Die Seitengrenzen eines Flusses, oder seine Ufer, hängen vorzüglich von der Beschaffenheit des Bodens ab. Entweder findet ein Fluß in seinem Lauf nach den Seiten zu große Ebenen und tritt dann aus, oder breitet sich; oder er bahnt sich auch wohl selbst nach und nach mehr Weg, und wäscht seine Ufer aus. Da aber bei zunehmender Breite eines Stroms die Strömung zugleich schwächer wird; so setzt er auch eben da wieder mehr feste Stoffe ab, die das Wasser mit sich fortrifft, und es bilden sich in solchen breiten Flußbeeten um so eher wieder neue Ansätze als Inseln oder Halbinseln oder auch Sandflächen von eben der Form.

Erhebt sich aber das Land in dem Zug eines Stromes weiter hinauf wieder mehr, so daß das Wasser davon aufwärts gedrängt wird, und



Lage der Gegend begünstigt ein Austraten des Wassers zur Seite; entstehen Landseen; von denen Leiche, durch die kleine Bäche durchströmen, nur durch mindere Größe sich unterscheiden. So sind oft große Landstriche zu Seen, die ohne diese Bildung eines klaren Bodens der Landescultur fähige Gegenden geworden sind, die aber doch, wie die bekannten größeren und kleineren Schweizer (Seen) den Bewohnern ihrer Ufer zum großen Vortheil gereichen. Gegen haben manche Landstriche das Ansehen, früher verglichen zu gewesen zu sein, deren Ausfluß nur in der Folge der Zeit tiefer ausgehöhlt worden ist, wodurch dann das Land ins Trockne gekommen. Gewöhnlich haben Landseen einen Hauptzugang durch einen schon bedeutenden Fluß, und dann mehrere Zugänge durch kleinere Flüsse; meistens aber nur einen Ausfluß; die Strömung ist in ihnen in dem Maße unbemerkt, als ihre Breite ihre Tiefe übertrifft; übrigens haben sie Charaktere, die denen der Flüsse des Meeres gemeinschaftlich sind: Inseln, Halbinseln, Buchten, eine Wasserbewohner, einen dem Zutritt der Winde und der mindesten eignen Strömung proportionirten Wellenschlag, und bieten die Vortheile der Schifffahrt dar. Hat ein Landsee eine verhältnißmäßige Verbreitung; so bekommt die Masse, die ihm durch Abdunstung weicht, das Uebergewicht über das Wasser, welches von dem ihm zufließenden wirklich wieder abfließt. Nimmt die Verbreitung aber noch überhand; so erhebt sich, weil das Zustießende alles wieder verfließet, der See nicht zu der Höhe, daß er eine niedrige Uferstelle findet, durch welche er abfließen könnte. Es bilden sich auf diese stehende Landseen, oder große Wasseranhäufungen von fernem Land umgeben, die keine Gemeinschaft mit dem Weltmeere haben. Man findet deren größere und geringere, doch lange nicht so große Anzahl wie die Landseen mit einem Abfluß, wehn wir nämlich die kleinern Wasseranhäufungen ausnehmen, die bloß durch kaltes Quellwasser oder auch einzig von Regenwasser ihren Zugang halten, und während warmer und trockner Jahreszeit ganz oder theilweis wieder verdunsten und versickern. Haben verglichen stille stehende Wasser nur so eine geringe Tiefe, daß kein teines Wasserregul entsteht, sondern der Boden nur wassersatt, oder so naßgewird, daß feste Körper, die auf Wasser nicht schwimmen, in sich einsenken; so werden solche als Sümpfe oder Moräste unterschieden; in denen immer viele Pflanzen wachsen und Insekten erzeugen, die späterhin verwesen und zu Gasbildung, (Kohlensäure und Wasserstoffgas,) Veranlassung geben. Durch Zersetzung der Pflanzenrückstände erzeugt sich Torf, der in verschiedenen Abtheilungen So würde Böhmens noch jetzt ein großer, von den Böhmischen Gebirgen umfaßter Landsee sein, wenn die einzige Stelle, durch welche alle Gewässer Böhmens in der Elbe ihren Ausfluß haben, statt des schmalen Thals, welches sie jetzt bildet, etwa bei Pernitzschen, von einem Seitengebirge verschlossen wär, dagegen der Bodensee größtentheils ins Trockne kommen würde, wenn das Flußbett des Rheins bei seinem jetzigen Ausfluß aus ihm schon die Tiefe hätte, welche er erst unterhalb des Rheinfalles bei Schaffhausen bekommt. 8) Hierhin gehört vorzüglich das Caspische Meer, das außer der Wolga den Ural, Terek, Kur und mehrere Flüsse aufnimmt, ohne einen bekannten Ausfluß zu haben, ingleichen der in seiner Nähe befindliche Aral, ferner das todte Meer, in das sich der Jordan verliert, der See Titika in Südamerika u. m.

stufungen, wie auch die Braunkohle, als Ueberreste früherer, durch einen Gährungsproceß veränderter Vegetabilien, sich an die Steinkohlenbildung anreicht. Mehrere Landseen haben ein salziges Wasser, doch nie in der Stärke wie das Meerwasser<sup>9</sup>. Manche Seen bieten in ihren Eigenheiten dem Naturforscher Räthsel dar, die nur zum Theil einige befriedigende Auflösung zulassen<sup>10</sup>.

Mit Flüssen, die in stehenden Seen sich endigen, haben Steppenflüsse das Gemeinsame, daß die Menge des Wassers, welches in beiden verdunstet, oder sich in das Erdreich zieht, völlig der Menge des zuströmenden Wassers gleich ist. Der Unterschied beider gründet sich aber darauf, daß letztere bei sich abflachenden Ufern und dadurch bewirktem Austritt des Wassers keine Begrenzungen von umgebenden höher liegenden Lande finden; von denen das Wasser, wie dort, zusammengehalten wird, sondern daß dieses in mehreren Armen ausläuft, und bei wieder mannigfaltiger Vertheilung dieser, meist in dem lockern Erdreich, das es findet, versickert. Die Steppenflüsse kommen hauptsächlich in Gegenden vor, wo das Land von Gebirgen aus lange zusammenhängende flache Sandwüsten ausläuft, und wo das Klima zugleich die schnellere Verdunstung des Wassers begünstigt. Viele dergleichen Steppenflüsse fließen bloß während der Regenzeit, andere werden nur durch Regenströme bedeutend<sup>11</sup>.

2) Das Meer<sup>12</sup> ist die auf dem tiefsten Theile der Erdoberfläche sich nach den Gesetzen der Schwere zusammenhaltende große Wassermasse, welche zugleich in ihrer Oberfläche, oder in dem Meerespiegel, diesen als den, wie bereits früher bemerkt wurde, im weitern größten Theil so abplattet und hier die sichtbare Erdoberfläche bildet, daß, mit Nichtbeachtung der relativen Verschiedenheiten, welche nur wechselnd die Meereswogen und die Anschwellungen und Senkungen des Meeres durch Ebbe und Fluth, oder auch dauernder Differenzen der relativen specifischen Schwere des Meerwassers an unterschiedlichen Orten wegen unterschiedlichen Salzgehalts darbieten, das Meer in Hinsicht auf die Erhöhungen des festen Landes als ein

9) Dahin gehört auch das Caspische Meer und der Aralsee; der Vulkal in Sibirien dagegen, der die Flüsse Irkut und Ilda nebst vielen kleinern aufnimmt und nur wenig Wasser durch die Angara an den Jenissei abgibt, hat süßes Wasser, auch der See Urtika. Das rothe Meer ist mit dem reinsten Kochsalz völlig gesättigt, schmeckt aber dabei bitter, und kein Thier lebt in ihm; in der umliegenden Gegend finden sich viele Quellen von Bergöhl; es scheint ein eingesunkenes Land zu seyn, dessen cultivirten Zustand nicht nur die Mosaische Geschichte, sondern auch die bei niedrigem Wasserstande sich noch jetzt findenden Trümmern gesunkener Städte bezeugen.

10) So hat der Vulkalsee oft bei mäßigem Winde hohe Aufwallungen und tobt heftig. Der Chrenker See in Krain wird durch zwei oder auch dreimaliges Eindringen von Wasser aus der Tiefe angefüllt, wodurch er binnen 24 Stunden eine Ausdehnung von 2 Meilen Länge und 3 Meilen Breite bei 15 Fuß Tiefe erhält; dann verfliehet sich das Wasser binnen etwa 25 Tagen wieder; das Thal wird nun nur noch von acht Wochen durchflassen, die sich der tiefsten Stelle vereinen; in den getrockneten Waden wird Hirse gesät und den gemäht; im Herbst füllt sich das Thal mit Regenwasser an, das dann im Winter fließt; bald aber bricht das Eis wieder, da das untere Wasser abfließt.

11) Als der größte Steppenfluß wird der Niger im mittlern Afrika angesehen, ob man gleich Gründe aufstellt, die es wahrscheinlich machen, daß wenigstens ein Theil seines Gewässers einen südlichen Ausfluß in den Ocean hat. Von Landseen ist es dem Sprachgebrauch gemäß, auch die Caspische ein Meer zu nennen. Hier ist bloß von dem Erd- oder Weltmeer die Rede.



me, oder vielmehr als ein wirkliches Kugelsegment angesehen werden kann <sup>13</sup>.

Die eigentliche Erdgrenze unter dem Meer, oder der Meeresboden, zeigt aber im allgemeinen dieselben Unebenheiten, wie das die Meeresfläche sich erhebende feste Land. Wie weit diese Unebenheiten aber gehen, ist unbekannt, da die größten Meeresstiefen so, wie die größten Bergeshöhen gemessen sind, oder das Meer an vielen Orten unergründlich ist <sup>14</sup>. Es ist eine unbegründete Annahme, daß die Meeresstiefen den Landhöhen gleichkommen. Sie können eben so gut geringer als größer wie diese seyn.

Wichtiger ist die Bemerkung, daß die Senkungen des Meeresbodens gewöhnlich denen des anliegenden festen Landes entsprechen, so ein flach auslaufendes Land meist auch einen flachen Meeresgrund, steil oder klippig auslaufendes Land auch gleich vom Ufer aus in tiefen Meeresboden andeutet. Auch gleicht die Beschaffenheit des Gesteins, welches den Meeresboden in seiner Grundlage bildet, häufig der des benachbarten Landes, so daß sich auch dieselben Gesteinslagen häufig von einem festen Lande aus unter dem Meere zu dem Ufer einer benachbarten Insel fortsetzen <sup>15</sup>.

Man theilt überhaupt den Meeresgrund in den flachen und klippigen.

Der flache Meeresgrund bildet, wenn er so niedrig unter der Meeresoberfläche liegt, daß Schiffe auf ihn stoßen, die Untiefen. Dergleichen Grund erstreckt sich häufig von Küsten weit in das Meer hinaus. Werden solche Stellen mit Sand überdeckt; so nennt man sie Sandbänke, die auch wohl zum Theil über das Wasser hervorragen, oder während der Ebbezeit ins Trockne kommen <sup>16</sup>. Durch das Schwimmen von dergleichen Sand an die Ufer entstehen die sogenannten Dünen, natürliche Erdwälle, die durch sich über einander bewegten Sand auf gleiche Weise das hinter ihnen liegende Land

33) Um sich eine Idee von der ungeheuern Menge des in dem Meere besaßten Wassers zu bilden, dient folgende oberflächliche Berechnung. Setzt man die mittlere Tiefe des Meeres nur auf die mäßige Zahl von 200 Klaftern oder  $\frac{1}{5}$  einer Französischen Meile; so würde das Meerwasser für sich allein eine kugelförmige Masse konstituiren, deren Durchmesser mehr als 60 Französische Meilen betrüge. S. Buffon's allg. Naturgesch. 1. Th. 6. Art. <sup>14</sup> Capitän Whipp's, (Lord Mulgrave,) fand im Nordmeer mit 780 Faden, (4680 Fuß,) noch keinen Grund. Diese Tiefe entspricht fast erst der Höhe der Schneekuppe im Riesengebirge. Die Schwierigkeit, sehr große Meeresstiefen zu ermessen, kommt daher, weil das getheerte Seil, an dem das Senkblei in das Meer hinabgelassen wird, als ein specifisch leichterer Körper als das Wasser, in großen Tiefen dieses nicht mehr sinken läßt, oder wenn auch dieses Mißverhältniß ausgeglichen werden könnte, von der Ablenkung von der perpendicularen Richtung, die das Senkblei in großen Tiefen häufig durch die daselbst befindlichen Meeresströmungen erleidet. <sup>15</sup> Wie dies unter andern die Kreidegebirge der sich entgegenstehenden Englischen und Französischen Küsten bewelsen. <sup>16</sup> So erstreckt sich von den Küsten der Deutschen und Niederländischen Provinzen in die Nordsee in der Breite einer Meile und darüber ein hoher sandiger Grund, das Watt oder Paff genannt, welches kaum 2 — 3 Fuß sich unter das Meer erniedrigt. Im Sindersee gibt es viele solche flache Stellen. Die Dagersbank, die sich von England bis Gothland erstreckt, ist ein langer abschüssiger Erdhügel unter dem Wasser, auf dem man gleichwohl ankern kann. Vortüglich berühmt wegen der Fischelei ist die große Bank bei Newfoundland, ein unter dem Wasser 140 Seemeilen fortstreichender Landrücken, über dem jedoch die größten Schiffe vorsegeln, u. s. w.

gegen das Eindringen des Meeres schützen, als dieß auch wohl durch künstliche Dämme, wie in Holland, durch die Landesbewohner geschieht, um sich ihre Wohnplätze zu sichern, und dem Meere so die Cultur fähiges Land abzugewinnen <sup>17</sup>.

Der klippige Meeresgrund bietet ganze Rüge von Erhöhungen mit zwischen laufenden Vertiefungen dar, deren Gipfel entweder in weichem und culturfähigem Boden, als Inseln, oder schroff als Klippen über dem Meer hervorragen. Sie hängen unter sich eben so wie die Berge des festen Landes in Ketten und Gruppen zusammen, doch weniger in allmählichen Uebergängen, sondern häufig in schroffen Mäßen sich neben einander erhebend, weil die Lücken nicht, so wie auf dem Lande, durch angelegtes bröckliches oder leichtes Gestein in Conglomeraten ausgefüllt sind; daher häufig auch Seefahrer, nachdem in ihnen unbekannten Meeresgegenden noch kurz vorher mit dem Senkblei gar keinen, oder einen Grund von mehreren hundert Faden fanden, nun auf einmal in nur wenigen Faden Grund antreffen und dadurch zur Vorsicht, um nicht an verborgene, bis zum Kiel des Schiffes heraufragende Klippen zu scheitern, ermahnt werden.

Die Beschaffenheit des Meeresbodens bestimmt zunächst auch die Form der Meeresufer, die für die Schifffahrt von so großer Wichtigkeit ist. Das Meeresufer bildet hiernach entweder Meeresbuchtungen, (Buchten, Bayen,) Ausbuchtungen von größerem oder geringem Umfange, wovon besonders die kleinern, wenn die Ufer steil sind und dadurch die Annäherung der Schiffe erlauben, dabei einen guten Ankergrund haben, (der weder aus leichtem Sand und sumpfigen Boden, noch aus dichtem Felsen besteht, worauf der Anker nicht fassen kann,) zu Häfen benutzt werden, oder Vorgebirge, steile auslaufende Ecken von Landgebirgen, von denen das leichtere Erdreich durch die Meereswogen abgespült ist, oder auch flach auslaufende Strecken, die man, wenn sie Ankergrund für die Schiffe enthalten, besonders in der Nähe von Häfen, Rreden nennt.

Riffe werden insbesondere diejenigen steilen und schmalen Klippen genannt, die sich vor Risten hinziehen, theils den Zugang zu ihnen erschweren, theils aber auch ihnen, besonders Inseln, zur Schutzwehr gegen das Meer dienen. Bemerkenswerth sind insbesondere die Corallenriffe, ein lebendiges Erzeugniß der als Lithophyten oder Corallenpolypen bekannten Geschöpfe, durch die sich der Meeresboden fortwährend theilweise bis zur Meeresoberfläche erhebt, und da die Polypen, denen dieß steinige Gehäuse zur Wohnstätte dienen, außer dem Meerwasser nicht leben können, dann seitwärts verbreitet. Dergleichen Corallenriffe finden sich in unendlicher Menge in der Südsee, und umgeben die daselbst zerstreuten Inseln, wovon die meisten, nach Forster's Untersuchungen, durch sie selbst erst ihre Existenz erhalten haben, und noch erhalten, indem die überragenden Felsenspitzen verwittern, Corallensand bilden, und so eine Grundlage zu festem Boden werden, der dann wieder der Träger vegetabilischer und animalischen Lebens wird <sup>18</sup>.

(17) So ist die Nehrung an der Preussischen Küste bloß eine, hin und wieder mehrfache Kette von Sandhügeln, im Durchschnitt von 1 Meile Breite. Vgl. unter andern Pops's. Dritte Reise, 1. B. 2. Buch 3. Cap.



Das Meer ist in seiner Gesamtheit eine zusammenhängende Masse, und umgibt die einzelnen größern und kleinern Erdtheile. In dieser Einheit bekommt es auch den Namen Weltmeer oder Ozean. Es ist bloß willkürliche, obgleich zur Orientirung für die Schifffahrt nothwendige Unterscheidung, daß das Meer in der Nähe der großen Landstrecken, oder zwischen solchen eine Benennung bekommt. Lassen zwei Landstrecken eine tief und vorwaltend in die See sich erstreckende Bucht; so bekommt dann das Meer hier den Namen eines mittelländischen <sup>19</sup>. Sind aber zwei Ufer verschiedener Länder, oder eines festen Landes und einer Insel, auf eine kurze Strecke einander bedeutend, und nur noch höchstens in der Distanz weniger Meilen genähert; so heißt diese Stelle eine Meeresenge, oder Meerestraße, wenn sich solche etwas mehr in der Länge erstreckt, oder wenn man wenigstens die Ausdehnung derselben der Länge nach berücksichtigt, einmal, (im Schifferausdruck eine Straße.)

Das Meerwasser zeichnet sich vor anderem Wasser durch den eigenthümlichen Salzgehalt aus, der aber selbst aus verschiedenen, von dem Wasser aufgenommenen Stoffen besteht; daher hat der Geschmack desselben nicht rein salzig, sondern salzig-bitter ist. Die Hauptbestandtheil ist salzsaures Natron, oder Kochsalz, obgleich in unterschiedlicher Menge. Im allgemeinen nimmt man an, daß 1 Pf. Meerwasser 1 Pf. Salz enthalten <sup>20</sup>. Nach Lavoisier <sup>21</sup> ge-  
40 Pf. Meerwasser in Diepe geschöpft:

salzsaures Natron	8 Unz.	6 Qu.	—	Gr.
schwefelsaures Natron und Talk	—	4	—	26 —
salzsauren Kalk	1	—	5	— 10 —
salzsauren Talk	1	—	—	— —

Auf den Salzgehalt haben die höhere Temperatur und der mindere Druck des von den einströmenden Flüssen zugemischten nicht salzigen Wassers großen Einfluß; doch bestimmen sie ihn nicht allein. Durch den Salzgehalt wird aber das Meerwasser specifisch schwerer, und dadurch zum Tragen von Schiffen, und überhaupt schwimmender Körper so geschickter <sup>22</sup>. Der dem Meereswasser eigene bittere Geschmack rührt aber nicht her, welcher bloß vom Zusatz salzsaurer Bittererde entstehen würde, sondern noch andern Beimischungen zuzuschreiben, die ehemals einem Erdharz, nach der Vermuthung von Steinkohlen dem Meeresgrund, beimaß, dergleichen aber nach chemischen Untersuchungen sich nicht darin findet. Mehr Wahrscheinlichkeit hat es sich, daß er von der Menge im Meere faulender thierischer und

20) welchen Namen das Meer zwischen Europa, Afrika und den vorliegenden Ländern Asiens nur vorzugsweise führt.

21) Das Mitteländische Meer enthält sogar  $\frac{1}{17}$  an den Küsten und  $\frac{1}{10}$  in der Mitte, die Ostsee aber nur  $\frac{1}{10}$ .

22) Nach Horne's Untersuchungen, die in der Krusenstern'schen Reisebeschreibung mitgetheilt sind, ist das mittlere Gewicht des Seewassers, auf die Temperatur von  $+10^{\circ}$  Reaumur reducirt, im Atlantischen Meere von  $60\frac{1}{2}$  nördlicher Br. bis zu  $53^{\circ}$  südlicher Br. 1,0279, und die Extreme sind 1,0295 und 1,0251; in der Ostsee zwischen  $52^{\circ}$  nördlicher Br. bis zu  $57^{\circ}$  südlicher Br. ist es 1,0264, und die Extreme sind 1,0281 und 1,0252; in der Ostsee zwischen  $56^{\circ}$  und  $60^{\circ}$  nördlicher Br. ist es 1,00635. Als allgemeines mittleres specifisches Gewicht des Meereswassers kann man 1,0271 annehmen und darnach nahe an 2 Pf. Tronngewicht Salz im Pariser Cubikfuß Meerwasser.

vegetabilischer Stoffe herrühre, indem die Bitterkeit des Meeres an der Oberfläche desselben größer, als in der Tiefe ist, um deß willen das Meerwasser selbst die Fäulniß thierischer Stoffe, denen es zugesetzt wird, eher fördert, als hindert, daher nicht allein nicht trinkbar ist, was schon eine Folge seines Salzgehalts ist, sondern auch Ekel und Erbrechen erregt, ob es gleich, wiewohl nur durch mühsame und practisch im Großen schwer ausführbare Vorkehrungen zur Reinigung, trinkbar gemacht werden kann.

Woher das Meer die ihm beigemischten salzigen Stoffe bezieht, ist eine leere Frage. Bei der alle auflösliehen festen Stoffe, die die Erdoberfläche darbietet, weit überwiegenden Quantität des Meerwassers müssen wir den Salzgehalt desselben für einen ihm eigenthümlichen und ursprünglichen erachten, die besonders für die Erhaltung des animalischen Lebens im Ocean und überhaupt zum zusammenwirkenden allgemeinen Leben, wobei das Weltmeer wegen seiner Verbreitung eine Hauptrolle spielt, nothwendig bedingt ist.

Sowohl seines Salzgehalts wegen, als auch wegen seiner steten Bewegung ist das Meerwasser weniger und nur in geringern Temperaturgraden, als bei dem das Wasser überhaupt gefriert, dem Uebergange in Eisform unterworfen<sup>23</sup>. Jedoch friert das Meer unter hohen Breitengraden nicht nur theilweise in jedem Winter zu, sondern wird mit Eis überlegt, und es bilden sich Eisseider, die an der festen Land, in dessen Nähe sie entstehen, sich anlegen, sondern treiben sich auch in den Polargegenden, wenn das Meer daselbst offen ist; große Eismassen, zum Theil von Meilen weitem Umfang mit einer Erhebung von wohl 100 Fuß über dem Wasser, und von einem verhältnißmäßigen Einsenkung von etwa 1000 Fuß in das Wasser umher. Diese als Treibeis bekannten Massen, welche Bergen und Inseln von Eis gleichen, sind es vorzüglich, welche auch bei guter Jahreszeit das Vordringen der Schiffe nach den Polen hin auf den offenen Meere höchst gefährlich und fast unmöglich machen<sup>24</sup>. Sie werden zum Theil durch die Winde bis zu 40° der Breite in das Meer getrieben und zerschmelzen endlich, wiewohl langsam, oder zerbröckeln und zerklüften sich daselbst. Wegen ihrer schwerfälligen Bewegung, und weil sie dem Winde so wenig Fläche darbieten, verhalten sie sich aber meist in den Polargegenden, und vergrößern sich, wenn die mildere Jahreszeit sie nicht ganz schmilzt, bis zum folgenden Winter.

Wenn das Meer an sich friert, wird immer ein, wiewohl geringer Theil seines Salzes mit in das Eis aufgenommen; die gefrorenen Eismassen im Treibeis enthalten aber nach der Schmelzung kein Salz. Man hat geglaubt, sie nähmen in den großen Landströmen ihren Ursprung und würden auf selbigen in das Meer getrieben; aber hier ist das Treibeis zu reichlich und in zu großen Stücken in den Polar-meeren vorhanden; überdies sind auch in den südlichen Polargegenden keine zusammenhängenden Landstriche, von denen große Ströme abfließen. Man hat ferner geglaubt, das Treibeis erzeuge sich auf dem Meere.

23) Nach Irwin's und Mairne's Versuche friert das Meerwasser bei — 1,8 Reaumur. 24) Sie verbreiten an dem Himmel einen weißen Niederschlag, den die Grönlandsfahrer den Eiblick heißen.



werden; allein ob es gleich erwiesen ist, daß die Temperatur des Meerwassers in der Tiefe abnehme<sup>25</sup>; so widersteht sich doch der Druck, dem sich das Wasser in großen Tiefen befindet, der zum Gelingen nöthigen Einwirkung der Luft und der Dampfbildung, wie Versuche über das Gefrieren in Bomben beweisen. Auch würden Massen von vielleicht 1200 Fuß bis zu dieser Dicke auf dem Meeresgrund sich nicht fest erhalten können, da sie mit einer Kraft von 16 Pfund auf einen Quadratfuß sich heraufdrängen<sup>26</sup>. Es ist daher wahrscheinlicher, daß, wenn das Meer wirklich, wie man jetzt vermuthet, über beide Pole sich hinwegzieht, es in den höchsten Breiten, oder unter den Polen selbst ewige Eiskuppeln bilde, welche sich über den Meereshorizont erheben, daselbst, von dem immer geschmolzenen Schnee, im Winter wahre Gletscher bilden. Diese Annahme spricht zugleich die Bildung von Schichten von Eisbergen, die das Ansehen von Jahrgängen der Eisbildung haben. Die Massen dieses geschmolzenen und wieder gefrorenen Schnees verschieben sich nun längs des Eisabhangs bis an das Meer und frieren ab; in den folgenden Jahren gelangen neue Schichten an sie, endlich die Masse durch ihr Gewicht, unter Mitwirkung der Winde und Meeresfluthen, die selbige aushöhlen, losbricht und fluthend in das Meer gelangt.

Die Farbe des Meeres ist überhaupt eine zufällige. In einem Meere aufgefunden hat das Meerwasser die Durchsichtigkeit eines gewöhnlichen Wassers. In der Entfernung erscheint das Meer grünlich oder auch dunkelblau, am Horizont beinahe schwarz, wenn die Sonne hinter dem Beobachter steht. Einzelne sich brechende Wogen zeigen meergrüne Farbe. Ueberhaupt ist die Farbe des Meeres ein Widerschein der Farbe des Himmels. Nach Verschiedenheit dieser nimmt auch das Meer verschiedene Farben an<sup>27</sup>. Das ruhige Meer ist durchsichtiger als das ruhige süße Wasser, so daß man wohl bis 20 Faden tief den Boden erblickt<sup>28</sup>. Sobald sich aber das Meer bewegt, wird es undurchsichtig. Im ruhigen Wetter ist unter dem Meeresspiegel das Sonnenlicht, ungefähr wie Mondenlicht. Nach Linné<sup>29</sup> wird das Licht, wenn es durch 10 Fuß Meerwasser geht, im Verhältniß wie 5 : 3 oder 5 : 3½ geschwächt; unter einer Tiefe von Meerwasser von 679 Fuß ist das Meer ganz finster<sup>30</sup>.

Hin und wieder ist das Meer mit Meerpflanzen<sup>31</sup>, oder andern (32) Besonders auch nach neuern Versuchen von Forster, Peron und Bornee und zwar in Verhältnissen der geographischen Breite, obgleich noch nicht deutlichen physischen Gesetzen. Vgl. die nähern Angaben in Parrot's Grundr. d. phys. d. Erde, S. 234. 26) Val. Parrot's Grundr. u. s. w. S. 256. 27) Meere, die nach ihrer Farbe unterschieden werden, wie das rothe, weiße, schwarze Meer, haben diese Benennungen von zufälligem Aussehen benachbarter Gegenstände, so das rothe von einem rothen Sande, oder den Madreporen, welche, von verschiedener Farbe die vorherrschend rothe dem Wasser selten, das schwarze Meer von der schwarzen Farbe der Kleidung der Bewohner seiner Küsten erhalten. 28) Bei den südlichen Inseln sieht man Schildkröten auf dem tiefen Meeresboden, wie auf einer grünen Wiese. 29) traité d'optique sur la gradation de la lumière, p. 65. 30) nach Lambert (photometr. S. 468.) 31) Linné unterscheidet mehr als 50 Arten von Meergras, (Fucus,) wovon das Meer oft in großen Strecken bedeckt wird. In der Mitte des Atlantischen Meeres gibt es einen Streich von 200 — 300 Meilen, der von der sogenannten Meerpetasche einer grünen Wiese ähnlich sieht.

zufälligen Stoffen bedeckt, die ihm ein eigenes Aussehen geben. Hierher gehört auch besonders das Leuchten des Meeres bei Nachtzeit, von dem man eine zweifache Art unterscheidet, nämlich es leuchtet das Meer nur auf seiner Oberfläche mit einem fortlaufenden phosphorartigen Schein, oder es leuchtet die Oberfläche und auch die Innere des Wassers in unzähligen kleinen Punkten. Das erste nach Le Roi, Canton und Forster ein Erzeugniß der Fäulnis von Fischen und andern Seethieren, wobei sich wahrscheinlich phosphorsaures Wasserstoffgas entwickelt, letzteres, nach Richaud, Forster, Tilesius u. a., mehreren Gattungen kleiner Mollusken zuschreiben.

Das Meer erhält unaufhörlich durch die vom festen Lande aus dasselbe sich ergießenden Ströme einen schwerlich auf einen gewissen Calcul zu bringenden Zugang von Wasser; gleich erheblich ist der Zugang durch die Regenströme auf dem Meer selbst. Es ist sehr begreiflich, daß dieser Zuwachs des Meeres bei der verbreiteten Oberfläche desselben durch Ausdunstung sich völlig wieder ausgleicht. Das Meerwasser geht also im allgemeinen, ebenfalls wie das Wasser auf dem Lande, in die große Metamorphose ein, der alle körperlichen Stoffe früher oder später eiliegen, ohne diejenige Metamorphose Anschlag zu bringen, die es unter Vermittelung des animalischen und vegetabilischen Lebens in ihm erfährt. Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob das Meer im Ganzen in der Folge der Zeit abnehme; man hat für die Behauptung einer fortgehenden Abnahme des Meeres, außer hypothetischen, von ersichtlichen Umständen der Form des festen Landes hergenommenen Gründen, auch Beobachtungen angeführt, aus denen es sich ergibt, daß das Meer sich von einigen Gegenden des festen Landes abgezogen habe; dagegen muß man aber auch in Anschlag bringen, daß von andern festen Erdtheile abgewaschen werden, und hier das Meer neue Eroberungen mache. Man hat Ursache anzunehmen, daß das Verhältnis des Meeres zum festen Lande im Ganzen ein nothwendiges sei, in wenn es auch in gewissen Grenzen in etwas Veränderung erleide, doch auch auf entgegengesetzte Weise wieder Ausgleichen eintreten, so daß also auch hier im Wechsel, wie so allgemein in der Natur, Gleichmäßigkeit und das Gesetz der festen Norm vorherrschend sei.

Das Meer geht aber in das allgemeine organische Erdenleben hauptsächlich durch seine Bewegung, (dem allgemeinsten Ausdruck alles Lebens,) ein. Die Bewegung der Gewässer des festen Landes besteht vorwiegend in Strömung, die des Meerwassers vorwiegend in Fluctuation.

Das Phänomen der Wellenbildung auf den Oberfläche flüssiger Körper, durch den Druck oder Stoß auf diese Fläche wirkender Körper, ist besonders von Newton<sup>32</sup> auf das Gesetz der Pendelbewegung zurückgebracht worden. Indessen bleibt es immer eine der schwierigsten Aufgaben der angewandten Mathematik, die Bildung der Wasserwellen auf kleinen und großen Wasserflächen vorwiegend in schiefer Richtung wehenden Winden, und die Form, die jene im Verhältniß ihrer freien oder gehemmten Verbreitung annehmen, zu erklären. Wichtiger für den Physiker ist die Bemerkung



Spannung, in die durch den Wellenschlag der Gewässer bei Wind die einzelnen Theile der Wasseroberfläche unter sich, und der Wechselung, in die das Wasser mit der Atmosphäre gesetzt wird. Ein Hauptzweck der großen Stürme auf dem Meere scheint der zu seyn, durch die dadurch bewirkte Ausbuchtung des Meeres in dem Winkel desselben eine innige Einwirkung der Meeresmasse auf die Atmosphäre und dieser auf jene vermittelt werde, und dadurch die Thätigkeit beider mehr den Charakter einer zusammentretenden organen annehme.

Was wir hier von den Meereswellen, oder den Meereszügen, (als den größern derselben,) zu bemerken haben, beschränkt sich auf folgendes.

Indem der Wind in seiner nie ganz horizontalen Richtung, auch seiner nie ganz gleichmäßigen Stärke, stoßweise schief auf die Meeresfläche drückt, wird diese aus ihrem Gleichgewicht gebracht. Ein Theil des Meerwassers erhebt sich in der Richtung dieses Stoßes über die nächste gelegenen; es bilden sich momentan kleine Wasserberge in der Richtung, die mit der des Windes rechtwinklich ist. Indem das Wasser von der Höhe eines solchen Wasserberges durch seine Schwere sogleich wieder, und zwar auf beiden Seiten, also vor- und rückwärts, (doch mit etwas mehrerer Leichtigkeit in jener als in dieser Richtung, wegen des fortwirkenden Luftstromes,) abfließt, und fallender Körper selbst wieder drückend auf die nächsten Wassertheile wirkt, werden diese ebenfalls gehoben, und die undulirnde Bewegung setzt sich auch schon nach hydrostatischen Gesetzen, wird aber durch die fortgehende Einwirkung des Windes, auch nach Beschaffenheit des Meeresgrundes, wenn dieser nicht tief genug, oder nach dem nahen Meeresufer, so modificirt, als wir die in der Verschiedenheit der sich bildenden Meereswogen wahrnehmen. Es ist zu bemerken, daß das wogende Meer in und durch diese Unterbrechung, im Ganzen genommen, nicht vorwärts bewegt wird, sondern sich nur hebt und senkt, obgleich, wenn man bloß auf Entstehung einer einzelnen Welle aus der ihr nächsten bei wehendem Winde achtet, dieß scheint. Unter fortgesetzter Einwirkung der Winde werden die unregelmäßigen Meereswellen und Meereswogen immer höher steigend. Auf meist geschlossenen Meeren erreichen sie eine Höhe von 6 + 8 Fuß, auf dem Ocean steigen sie weit höher. Doch schätzt man auch ihre Höhe bei großen Stürmen nur etwa auf 24 Fuß, wofür die Hälfte, oder 12 Fuß, auf dem Berg und eben so viel auf das Thal der Welle oder die Vertiefung des Meeres unter die Horizontalfläche zu rechnen ist. Die Wirkung dieser schaukelnden Bewegung der Meeresoberfläche erstreckt sich aber tiefer, und setzt auch die untern Wasserschichten in Bewegung, doch nicht über eine mäßige Grenze hinaus.<sup>33)</sup> Wellen, die von steilen Küsten zurückgeworfen werden, und mit den ihnen entgegenkommenden brechen, bilden Brandungen. Wegen der ungleichen Oscillationen beider holt die folgende Welle vom Meer aus die vorhergehende ein, und vergrößert sie, wie sie selbst wieder durch die nachfolgende vergrößert wird, bis diese Wellen

<sup>33)</sup> Taucher, die beim Sturm in den Grund des Meeres glnaen, versichern, in einer Tiefe von 15 Klaftern ruhiges Wasser getroffen zu haben.

lenerrhöhung endlich so weit ansteigt, daß die Welle nach hydrostatischen Gesetzen überstürzen muß. Die Zahl der Wellen, bei welchen dieß geschieht, ist an verschiedenen Küsten eine verschiedene<sup>34</sup>. Auf gleiche Weise erheben sich auch durch Rückschlag aus der Tiefe die Wellen auf Untiefen und verborgnen Felsen und bilden Wasserwände 10 — 12 Fuß hoch.

Die Größe der Meereswogen erreicht erst ihr Maximum, wenn der Sturm sich gelegt hat, und wird dann hohle See genannt. Es ist das reine Wellenspiel durch bloße Oscillation des Wassers bewirkt und erhält nur allmählig durch den Widerstand, den die Cohäsionskraft des Wassers der Bewegung entgegensetzt, sein Ende<sup>35</sup>.

Eine andere constante, den Bewohnern aller freien Seeküsten bekannte Meeresbewegung ist die Ebbe und Fluth. Das einfache Phänomen ist folgendes: Täglich zwei Mal, zu bestimmten Zeiten weicht das Meer von den Küsten in einer beträchtlichen Weite rückwärts wenn sie flach, oder senkt sich, wenn sie steil sind, (macht Ebbe, und kehrt wieder dahin zu der vorigen Weite und Höhe zurück, (macht Fluth.) Ersteres wird auch als tiefe See, letzteres als hohe und volle See bezeichnet. Das jedesmalige Fallen und Steigen des Wassers dauert gewöhnlich sechs Stunden, das Verweilen des Wassers auf dem niedrigsten und höchsten Stand etwa  $12\frac{1}{2}$  Minuten. Mithin kommt jede zweimalige Ebbe und Fluth täglich um etwa 50 Minuten später als den Tag vorher. Um so viel später geht aber jeden Tag der Mond durch den Meridian<sup>36</sup> und jede Fluth tritt immer um eine bestimmte Zeit von etwa 2 — 3, auch mehreren Stunden später ein, als der Mond entweder über dem Ort der Erde, wo sie Statt hat, oder auf dem derselben direct entgegengesetzten durch den Meridian geht. Diese Beobachtung mußte schon die frühesten Beobachter des Naturlebens darauf hinführen, die Entstehung der Ebbe und Fluth von der Mondsbewegung abzuleiten. In der Folge ist aber diese Theorie durch die Mathematiker mehr als irgend eine dergleichförmig beobachteten Naturerscheinungen genügend bearbeitet worden, und entspricht allen Beobachtungen dieses Vorganges<sup>37</sup>.

34) In Guinea ist die größte Welle die siebente oder achte, deren Uebergang die Schiffer erwarten müssen, wenn sie landen, und nicht mit dem Boote umgeworfen werden wollen. Die Römer unterschieden etiam *lucum decumanum*. (Ovidii Metam. l. x. c. 530 und Trist. l. 2. cl. 2. v. 49.) 35) Auf einer mäßigen Fläche wird dieß Wogenspiel durch ausgegossenes Oehl unterbrochen, da nicht wie das theilbarere Wasser sich ihm leicht hingibt. Im Großen ist jedoch hier von keine Anwendung zur Beruhigung des Meeres zu machen, wie dieß Aristoteles und Plinius anführen, und hienächst noch Franklin geltend zu machen gesucht hat. Vgl. v. Zach's geogr. Ephemeriden, 2. B. S. 516 u. 575. 36) S. oben S. 631, eigentlich in etwas geringerer, obgleich jeden Tag zwischen 42 u. 6 Minuten veränderlicher Zeit, die jedoch sämmtlich in der Periode eines synodischen Monats von 29 Tagen 12 Stunden 44 Minuten 5 Secunden genau 24 Stunden beträgt. 37) Schon Pytheas von Massilien und Aristoteles schrieben die Ebbe und Fluth dem Monde zu. Kepler leitete sie schon ab, stimmt von der Attraction des Mondes gegen die Erde ab. Newton war in dessen der erste, der dieselbe aus den allgemeinen Gesetzen der höhern Mechanik deducirte. Euler, Don. Bernoulli, MacLaurin und Coallier vervollkommneten die Newtonsche Theorie; ihre Vervollständigung aber erhielt sie vornehmlich durch Laplace. S. dess. Darstellung des Weltsystems, übers. v. Hauff 1. Th. 13. Cap. und 2. Th. 10. Cap.



Die Erfahrung lehrt, daß man außer der oben schon berührten monatlichen Periode der Ebbe = und Fluthzeit auch eine monatliche und eine jährliche Periode unterscheiden könne. Zwei in jedem Monate erreicht nämlich die Fluth ihr Maximum und Mal ihr Minimum<sup>38</sup>, jenes nämlich entspricht den Voll- und Neumonden, dieses den beiden Mondvierteln; es fällt aber mit diesen Mondesständen nicht zusammen, sondern tritt gewöhnlich  $11\frac{1}{2}$  Tag später ein. Ferner sind die Fluthen zur Zeit der Nequinoxen in dem Voll- und Neumonde stärker als in dem ersten und dritten Viertel; zur Zeit der Solstitien aber hat der umgekehrte Statt<sup>39</sup>.

Es ist aber die jedesmalige Fluth die directe Wirkung der gemeinsamen Attraction des Mondes und der Sonne auf die Erde; (vgl. Section 1.) Da aber der Mond, ungeachtet er als Himmelskörper der Sonne so bedeutend untergeordnet ist, doch in so geringem Abstände von der Erde sich befindet; so ist seine attrahirende Wirkung das Meer auch der der Sonne überlegen, und kann = 3 : 1 gesetzt werden. Fallen also die Wirkungen beider Himmelskörper zusammen auf Einen Ort der Erde, so erhöht die der Sonne die des Mondes; weichen sie aber von einander ab, so mäßigt und modificirt jene nur die Wirkung dieses, und die Sonnenfluth, die nicht wohl von der Mondesfluth in der Theorie unterscheiden kann, wird in der Wahrnehmung als solche nicht bemerkbar.

Wenn nun während der täglichen Umdrehung der Erde um ihre Achse ein Theil des Weltmeeres dem Monde gerade entgegengesetzt ist; so wird das Wasser daselbst im Verhältniß der mehreren Annäherung von ihm angezogen, dadurch aus seinem natürlichen Gleichgewicht mit dem übrigen Weltmeer gebracht, es erhebt sich in etwas über die Horizontalsfläche; in demselben Verhältniß drängt sich aber das Wasser von den Seitengegenden dahin; zieht sich also theilweise von den Landküsten zurück, und bewirkt dadurch die Erscheinung der Ebbe. So entsteht die Fluth an Orten, wo der Mond durch den Meridian geht. Etwas schwieriger ist die Erklärung der gleichzeitigen Fluth auf dem entgegengesetzten Theile des Erdkörpers. Hier wird der Erdkörper selbst in seiner Gesamtheit, aber in seinen einzelnen Theilen im Verhältniß der Annäherung dieser gegen den Mond, der directe Gegenstand der Anziehung des letztern, die daher auch auf den Erdmittelpunct bezogen werden kann. Dahin ist aber auch die Gravitation des Meerwassers, der dem Mond während seines Durchganges durch den Meridian entgegengesetzten Seite gerichtet; diese wird nun in dem Verhältniß schwächer, als die Gravitation der dem Mond entgegengesetzten Seite der Erde gegen diesen Zuwachs erhielt. Das Meer gravitirt daher dort in derselben Zeit gegen den Erdmittelpunct weniger, wird also um so viel leichter und nun von dem von der Seite herströmenden Gewässer gehoben. Was von der Mondesfluth gilt, gilt entsprechendem Maße auch von der Sonnenfluth. Sind Mond

38) Man unterscheidet jene als Springfluth, diese als Wispfluth. 39) Auch hat die Mondesnähe auf Erhöhung der Fluth Einfluß. La Place schätzte diesen Zuwachs gegen die mittlere Fluth zu  $\frac{1}{25}$ .

und Sonne in Opposition, so bewirken sie übereinstimmende Fluthen auf entgegengesetzten Erdhälften, aber aus entgegengesetzten Principien; sind sie in Conjunction, so verbinden sie sich aus übereinstimmenden Principien zu derselben gleichmäßigen Wirkung.

Wär die Erde ringsherum vom Meer umflossen; so würde in der Mondesfluth, (von der Sonnenfluth entweder erhöht, oder gebrochen und modificirt, aber nie überwältigt,) gleichzeitig mit dem Eintritt des Mondes in einem Meridian, unter diesem und zugleich unter dem entgegengesetzten Meridian das Wasser sich heben; es würden sich also zwei leichte Wassererhöhungen bilden, die in den Aequatorialgegenden am höchsten reichen, nach den Polen zu aber sich verlaufen und in 24 Stunden und etwa 50 Minuten sich um die Erde von Osten nach Westen herumziehen würden. Durch die ungleiche Unterbrechung der Meeresfläche durch Landstreifen aber werden die Erscheinungen der Ebbe und Fluth verwickelter, obgleich, indem sie doch erst durch den Gegensatz des festen Landes und der Meeresfläche Gegenstand der sinnlichen Wahrnehmung werden, schärfer hervorgehoben. Ehe nämlich sich zur Bildung des gedachten Wasserberges, auf Orten, wo direct die Fluth eintritt, das erforderliche Wasser von den theilweise unterbrochenen Seitengegenden zuströmt, verstreicht etwas Zeit; indessen hat der Mond sich schon etwas vom Meridian entfernt; die Fluth erreicht daher ihre Höhe erst einige Zeit nach der Culmination des Mondes. Die Büge der Meeresküsten, Inseln u. s. w., auch Winde hemmen und beschränken das Wasser in seinem Lauf; daher entstehen Abweichungen im Eintreten der Ebbe und Fluth, die um so größer sind, je weiter der Zenith eines Orts von dem Stand des Mondes am Himmel, und je mehr ein Meerestheil durch vorliegende Küsten zu einem abgeschnittenen gemacht worden ist <sup>40</sup>. Dringt die Fluth durch entgegengesetzte Meerengen ein, so entstehen auch darauf mancherlei Abweichungen <sup>41</sup>. Gleiche Abweichungen zeigen sich wegen der besondern Lage der Küsten in dem Verweilen des Wassers, in der Fluth <sup>42</sup>.

Nach der Berechnung sollte die Fluth bei ganz freiem Ocean nur 3 Fuß Höhe haben. So zeigt sie sich auch im großen Südmeere aber auf Küsten kommen viele Abweichungen vor, die sich jedoch allmählich auf die Theorie zurückbringen lassen. In gegen Osten offenen Meeren steigt das Wasser bis auf 30 bis 50 Fuß. Gewöhnlich nimmt aber die Größe der Fluthen in der nördlichen Hemisphäre bis zur 49° zu. Eine gewöhnliche Fluthhöhe ist hier etwa 18 bis 20 Fuß. Von da nehmen sie wieder ab. Doch auch am Nordcap ist die Fluth noch merklich.

Das Meer theilt auch den größern Strömen Ebbe und Fluth mit, doch ist wegen des Herabströmens des Flußwassers, das die Fluth aufhält

40) So tritt die Fluth an der Ostküste von Madagaskar 1 Stunde 20 Minuten am Cap 2½ St., bei Drest 3 St. 30 M., bei St. Malo 6 St., zu Havre de Grace 9 St., bei Calais 11½ St., bei dem Ausfluß der Themse 12 St. später, als die Culmination des Mondes ein, so daß oft im Ocean schon eine neue Fluth anhebt, ehe die vorhergegangene bis zu dem letzten Ort gelangt ist. 41) In dem Hafen Valsbam in Dänken ist um deswillen nur binnen 24 St. ein Mal Ebbe und Fluth. 42) Zu Macao fluthet das Meer 9 St. und ebbe nur 3 St. Wehnliche Verschledenhelten sind nicht ungewöhnlch.



Ebbe von längerer Dauer, als die Fluth <sup>43</sup>. Ja auch Seitencirculationen erhalten ihren Antheil.

Alle mittelländischen Meere, die nur in geringer Verbindung mit Weltmeere sind, haben keine, oder doch nur sehr unmerkliche Ebbe und Fluth; so auch die Landseen von einiger, (immer auch nicht, um Phänomen zu geben, weit genug gehender,) Verbreitung, wie das Caspische Meer <sup>45</sup>.

Nicht nur die tägliche zweimalige Ebbe und Fluth bewirkt eine Bewegung im Meerwasser, die im allgemeinen ihre Richtung von Osten nach Westen nimmt, indem der Mond einen Theil des Meerwassers in dem scheinbaren täglichen Lauf desselben um die Erde sich zieht, sondern es wird auch diese westliche Strömung noch durch die steten, in den Aequatorialgegenden vorherrschenden Ostwind, (eine Folge des hier gleichmäßigen, der scheinbaren täglichen Sonnenbahn entsprechenden Temperaturwechsels in den Tages- und Nachtstunden,) begünstigt. Es findet daher auch auf den Meeren zwischen den beiden Hauptcontinanten eine stete Strömung des Meerwassers in dieser Richtung in den Aequatorialgegenden Statt, nur mit dem Unterschied, daß die Strömung von der Ostküste von Afrika nach der Ostküste von Amerika an letzterer, zwar in der Bucht, welche unter dem Namen des Mexikanischen Meerbusens bekannt ist, gebrochen wird, und nördlich und östlich zurückfließt, die Strömung von der Westküste Amerika's aber, schon innerhalb der Aequatorialgegenden befindlichen Durchgänge der Asiatischen Küste, (wenn man die südlichen Inselländer Particellen von Asien betrachtet,) und um die Afrikanische Südküste herum, dem südlichen Rückstrom, der von Amerika sich herüberzieht, theils entgegen-, theils mit ihm in Verbindung tritt.

Eine zweite beständige Meereströmung hat von den Polen aus nach den Aequatorialgegenden Statt, weil hier die Ausdunstung stärker ist, das Wasser von den in den Polgegenden schmelzenden Eismassen zugleich in der nördlichen Hemisphäre das Wasser aus den Landmassen dahin abfließt. Sie ist aber an sich weniger bemerkbar, als aus Localitätsverhältnissen in einzelnen Meeresgegenden entstehende Strömungen, die jedoch alle mehr als größere oder kleinere Wirbel (in Art von Strömungen von Flußwasser bei großen Einbiegungen in das Land, wo das Wasser theilweise eine rückgängige Bewegung zu nehmen genöthigt ist,) anzusehen sind. So befinden sich im Weltmeer größere oder kleinere Seitencirculationen von Meerwasser, deren Bildung im Einzelnen nicht immer leicht zu erklären, je-

43) In der Elbe wird die Fluth noch 20 Meilen stromaufwärts verspürt. In Hamburg gelange die Fluth 5 Stunden 23 Minuten später an, als sie zu Mägebüttel eintrifft, die Dauer der Fluth ist 4 St. 18 M., die der Ebbe 8 St. 6 M. 44) Man bemerkt in dem eigenthümlich sogenannten mittelländischen Meere nur an einigen Orten, bei Marseille, an der Küste der Barbarel, im Adriatischen Meerbusen, schwache Spuren von Ebbe und Fluth. Auch die Ostsee hat, da sie ebenfalls als mittelländisches, bloß durch Meerengen mit dem Ocean zusammenhängendes Meer zu betrachten ist, fast gar keine Ebbe und Fluth. 45) Bei kleinen Wassersammlungen kann sie unbedeutend aneclatiren, da solche sich dem Mond immer nur als eine Fläche, nicht als ein in mehreren Graden des Cirkelbogens geneigtes Kugelsegment darstellen, die Wirkung des Mondes auf sie also keine ungleichartige ist.

doch im allgemeinen auf bekannte hydrostatische Geseze zurückzubringen ist, und wodurch das Leben im Meere und dessen Metamorphosen selbst vielfach begünstigt wird <sup>46</sup>. Die Einstömungen von großen Flüssen des festen Landes, die Ebbe und Fluth, die vorwaltend Winde, (auf welche wieder die vorspringenden Ländermassen bedeutenden Einfluß haben,) wirken wesentlich darauf ein <sup>47</sup>.

Bemerkungswerth ist auch, daß in der Tiefe des Meeres häufig das Wasser einen andern Zug hat, als auf der Oberfläche, theils wegen Unebenheiten des Meeresbodens, theils wegen Unterschied der Temperatur, oder auch des Salzgehalts des Wassers <sup>48</sup>.

Eigentliche Meeresstrudel nennt man diejenigen Meeresbewegungen, wo dergleichen Strömungen in einem kleinen Raum sich kreisförmig zeigen. Sie setzen ein heftiges Gegeneinanderfließen von Wasser aus entgegengesetzten Richtungen in Gegenden voraus, die ihm ein nur geringen Weg zum Durchgang lassen <sup>49</sup>.

3) Wenn wir auf einem künstlichen Erdglobus die unterschiedlichen Theile der Erdoberfläche nach ihren Umrissen, Abgrenzungen und den Eigenheiten betrachten, die sie in ihrer Erhebung über die Meeresfläche und dem Zusammen- und Abfluß ihrer Gewässer darbieten; scheint in allen diesen verschiedenen Formen der Ländermassen, und den Einschnitten, welche das Meer in dieselben macht, so viel Regellooses und Zufälliges zu seyn, daß die Geologen bisher meist darauf Verzicht leisteten, einem Naturgesez oder einer Naturordnung nach alles dieses sich bildete, nachspüren zu wollen. Ja auch der neuesten Zeit waren die Bemühungen denkender Naturforscher mehr dahin gerichtet, in der Gestalt der Hauptmassen, in welcher die über das Meer hervorragende Land gebildet ist, Spuren großer, zerstörender Naturvorgänge einer frühern Zeit aufzufinden. Wird aber in jenen großen Krisen, die der Erde ihre gegenwärtige Gestalt gaben, nichts als das Vorwalten roher Naturkräfte beachtet; faßt man in den Erklärung jener Formationen gebildeten Hypothesen nichts ins Auge, als das Einstömen übermächtiger Fluthen, wodurch Ländertheile des frühern Erdkörpers abgerissen und durchbrochen wurden, oder das Einsinken ganzer Länderstriche in sich öffnende Erdschlünde: so stellt freilich die Erdoberfläche, wie sie jetzt sich darbietet, zunächst nur das traurige Bild von Trümmern einer frühern Erdenherrlichkeit dar,

46) Den Strömungen der nordischen Gewässer verdanken die Einwohner der Polarregionen das Treibholz aus den Nordamerikanischen, zum Theil jedoch auch aus den Sibirischen Strömen. 47) Die Geschwindigkeiten dieser Localströmungen deren Kenntniß für die Schifffahrt von der höchsten Wichtigkeit ist, sind sehr verschieden. Am schnellsten gehen sie zwischen Inseln und Sandbänken; durch allein legen Schiffe in Einer Stunde mehrere Seemeilen zurück; bisweilen gehen in Meerengen Strömungen zur Seite der Ufer dem Hauptstrom entgegen.

In der Meerenge bei Gibraltar geht oberwärts das Wasser aus dem Ocean hineln, seitwärts strömt es täglich zwei Mal, entsprechend der Ebbe und Fluth zurück; außerdem geht in der Tiefe ein steter Wasserzug aus dem mittelländischen Meere nach dem Ocean.

49) Hierher gehören die berühmten Schiffe von Ebnahbis in dem Canal von Messina; in dem Euribus, (dem Chalcidischen Meeresstrudel,) zwischen dem alten Eubotien und der Insel Euböa, fließt das Wasser bald von Norden, bald von Süden zu, 10 bis 14 Mal des Tages, in der Geschwindigkeit eines reisenden Stroms; der größte bekannte Meeresstrudel ist der Mälstrom an der Küste von Norwegen.



und nach' nur, wie noch jetzt die Schutthaufen einer verwüsteten Gegend von Pflanzen, Thieren und Menschen nach den Bedürfnissen jedes, in Besitz genommen und benutzt wurden.

Diese einseitige Ansicht steht aber mit der bei Betrachtung aller Erdbildnisse im Einzelnen so in die Augen springenden Zweckmäßigkeit der Formen sowohl als der Kräfte in zu großem Mißverhältniß, als man sich dabei begnügen könnte, und nicht auch hier, wie überall in andern besondern Erscheinungen des Lebens, eine unter Zerstörung anderer Gebilde, die ihre Bestimmung erreicht hätten, hervortretende Bildungsthätigkeit nach Normen der Zweckmäßigkeit voraussetzen.

Schwerlich dürfte auch wohl eine Idee ausgebildet werden können, wie die Form der Erdoberfläche ehemals beschaffen gewesen seyn möchte, um auch im verjüngten Maßstabe in der äußern Darstellung den Forderungen einer ästhetischen Anschauung zu entsprechen, zugleich dem Zweck zu genügen, den wir doch als einen primären postuliren müssen, nämlich die freie Entwicklung der Kräfte von Anfang an zu bedingen. Denn für niedere Organismen aller Art, bloß auf die engen Lebenskreise beschränkt sind, wie die gesammte Pflanzen- und Thierwelt, ist es ganz gleichgültig, was die Erde überhaupt für eine Form habe, wenn sie nur für den Stand- und Ernort jeder Pflanze und jedes Thiers diesen ihre Bedürfnisse dar-

stellt. Symmetrischer aber die Erdoberfläche ausgebildet war und je länger dabei gewisse sich gleichbleibende Normen als Grundlagen sich legten; desto einfacher und sich wiederholender würde das Leben der Menschen, für die doch allein die Erde als ein Ganzes besteht, die einzig von allen Erdentwesen eine Idee davon auffassen können, sowohl im Einzelnen als im Ganzen seyn. Dieß widerspricht der Bestimmung der menschlichen Natur, so weit diese für uns erkennbar ist, durchaus. Denn das Leben der Menschen ist in allen Andeutungen nur ein Durchgangspunct, ein Hinstreben zu Zielen, die sich verrücken, ehe sie noch erreicht sind. Für Wesen dieser Art, deren Wissen so wenig als ihr Wirken ein Vollendetes seyn kann, und für das Leben dieser mußte mit der gesammten Natur, in die der Mensch in seinem Erdenbafeyn verflochten ist, die Erde in ihrer Außenseite, als ein höchst Mannigfaltiges, in unendlichen Abstufungen Verschiedenes, die Kräfte des Menschen selbst, Hemmungen Aufregendes, und dem Allen bloß zur allgemeinen Zusammenhaltung Einheitsprincipe zum Grunde liegen, gebildet seyn. Aber gleichwohl der Bildung der Erdoberfläche, bei aller Mannigfaltigkeit und bei allem Mangel symmetrischer Verhältnisse ein solches Einheitsprincip unterliege, daß sie nicht, wie es bei der oberflächlichen Betrachtung scheint, eine chaotische Zusammenstellung sei, daß auch in der Zerstörung des Alten Bildungsthätigkeit für neue Erzeugte vorherrschend blieb, kann mit Recht wohl ausgegangen werden. Die Erdoberfläche ist nämlich, wie zerfallen und auseinander geschichtet, auch die Erdmasse unter derselben, jenseit der Grenze des höhern organischen Lebens erscheinen möge, nicht bloß in einzelnen Strecken für das; meist nur zunächst auf diese beschränkte Pflanzen- und Thierleben, sondern insbesondere für das menschliche

Leben, dieses nämlich als ein großes Ganzes betrachtet, in ih durchgängigen Verbreitung so gebildet, als es durchaus zweckförmig erscheint, nämlich für den Kampf, in dem der Mensch während sein irdischen Daseyns unanhörlich mit dem Leben selbst befaungen. Des Menschen Bestimmung ist bloß Erriung von Zufriedenheit gegen ihm widerstrebende Kräfte, worin doch nur der Menschen wres Heil besteht. Was der Mensch in seinem Erdenleben bisher vseitig geworden ist, lehrt die Geschichte; was er noch werden kälßt sie nur ahnden. Was aber jeder einzelne Mensch ist, ist er n allein durch das Socialleben; jenes große Band, das einzig d Menschengeschlecht als ein Ganzes, in Verbindung setzt und erhö. Aber auch dieses Socialleben mußte, wenn das menschliche Leben allen seinen Evolutionen ein so mannigfaltiges werden sollte, als bisher war und noch ist, und, als es auch in der Folge ohne Brufel immer sehn wird, sich über die ganze Erdoberfläche erstrecken, doch auch innere Spannungen behaupten, wodurch allein das Le seine ewigen Anregungen erhält. Die Erdoberfläche mußte daher gebildet seyn, daß sie, wiewohl nicht ohne Schwierigkeit, in den e zelnen Orten, an denen sie Menschen Subsistenz verleiht, zngäng ist; sie mußte also Menschen, die nur in Gruppen zusammen menschlches Leben führen können; also Stämme und Völker, e sowohl scheiden als auch vereinigen.

Es kann nun keinesweges Forderung an die Naturwissenschaft se zu zeigen, warum gerade diese und jene besondere Bildung der E oberfläche nothwendig war; (denn hierzu ermangelt uns der höf Standpunct, zu dem die Geschichte der Menschheit, deren erste E pitel wir nur kennen, erst in viel späterer Zeit die kommenden E nerationen erheben kann.) Aber der Zusammenhang, in dem der kannte Gang der bisherigen Entwicklung des menschlichen Geschlec mit der wahrnehmbaren Bildung der Erdoberfläche steht, ist eine d denkenden Naturforscher allerdings nahe gelegte Aufgabe, und wen stens theilweise erkennbar.

Zuvörderst also in dieser Hinsicht die Charaktere der Form tion der Erdoberfläche, wie sie nach dem gegenwärtigen St der Erdkunde offen gelegt ist. Wenn wir auch nur oberflächlich e Gestaltung der Erde nach einem verjüngten Maßstabe betrachten; fällt folgendes in die Augen: daß überhaupt die hervorragenden E massen sich mehr in die nördliche Hemisphäre als die südliche zusamm drängen; daß sie nicht nur in Größe, sondern auch im Einzelnen v Zwischenmeeren durchzogen, und zum Theil getrennt, oder auch, (n Inseln,) wie abgesprengt sind; daß aber die zwei Hauptmassen, die alles übrige bezogen werden kann, deren oben bereits als e Ost- und Westfeste gedacht worden, sich wesentlich dadurch untersc den, daß bei der letztern Ein Haupthöhenzug als Weltrücken v waltend von Nordwesten nach Südosten streicht, an den vornehm östlich mehrere Seitenhaupthöhenzüge sich wie Rippen ansetzen, bei sterer aber, wenn wir zunächst darauf sehen, in welcher Richtu am längsten eine zusammenhängende Berghöhe, (also auch hier d Weltrücken,) verfolgt werden kann, so, daß sie nirgends durch s schendurchlaufende Gewässer unterbrochen werde, wie hier zwar a



Haupthöhenzug von Nordosten nach Südwesten, (der von jenem nur auf eine kurze Strecke vom Meer unterbrochene Fortsetzung verfolgen können, daß aber hier auch ein jenen durchkreuzender mächtiger Höhenzug von Nordwest nach Südost verfolgt werden, weswegen auch die Ostfeste eben so der Breite als der Länge sich bedeutend macht, statt daß in der Form der Westfeste der Höhenzug der prädominirende ist.

Wie wir aber zur besondern Betrachtung beider Erdfesten übergehen, müssen wir noch einer Uebereinstimmung gedenken, welche beide verbindet, und welche gewöhnlich übersehen wird, nämlich der Verbindung von Hauptländermassen durch Erdengen oder Isthmen. Die Erdenge von Panama den nördlichen und südlichen Theil der Ostfeste, (Nord- und Südamerika,) verbindet; eben so wird durch Suez, (die von Suez,) der als Asien unterschiedene nördliche Theil der Ostfeste, (von der Europa ein integrierender Theil ist,) von Asien, als dem mächtigsten südlichen Theil dieser Feste, geschieden. Es ist aber nicht die einzige Parallele. Wenn wir nämlich auf den Höhenzug der Landhöhe sehen, mit welcher Asien in die Halbinsel Malacca südlich ausläuft; so finden wir, daß die ihr zur Seite liegende Insel Sumatra sich mit Java und den kleinern Inseln bis über Timor hinaus in Einer Richtung fortsetzt, welche Thatsache andeutet, daß hier unter dem Meer noch ein Landrücken fortsetzt, wovon jene Inseln Berghöhen sind, und der dann, in der großen Landmasse Neuhollland sich von neuem verbreitend, über das Meer wieder erhebt. Wenn jener in den gedachten Inseln fortstreichende Landrücken nur etwas weniger vertiefte Stellen hätte, und also nicht so weit durchbrochen wäre, würde Neuhollland geographisch ein integrierender Theil Asiens seyn, und der dadurch gebildete Isthmus dem von Amerika völlig gleichen, da auch dieser so niedrige Stellen hat, daß er noch um wenig mehr gesenkt seyn dürfte, um vom Meere überfluthet zu werden, wo auch dann die Westfeste in zwei Hauptmassen zerfallen würde, überdies letzterer durchbrochener Isthmus der Ostfeste eben so eine Masse großer und kleiner Inseln, (Bor-neo, Celebes, die Molucken u. s. w.) zur rechten, oder auf der linken Seite hat, als der Erdenge von Panama ein bedeutender Archipelago (die Westindischen Inseln,) zu selbiger Seite liegt, endlich auch insularische Gesamtmassen für das Aequatorialleben so viel Geschichtliches und Merkwürdiges darbieten.

Demnach verdient auch Neuhollland mit den ihm zur Seite liegenden Inseln als ein Haupttheil der Ostfeste zugerechnet zu werden, da zumal der wirklichen, nicht bloß geographischen, sondern geologischen Verbindung Südasiens und dieser Insularlande die kurze Unterbrechung durch das Meer vielmehr förderlich als hinderlich ist, wie denn auch die Verbindung von Nord- und Südamerika in der That weit mehr durch Ueberfahrt über das Meer, als durch Landweg, über den Isthmus vermittelt wird.

A. Besondere Betrachtung der Form der Ostfeste.  
Die Ostfeste ist diejenige zusammenhängende Ländermasse, die bei uns nach v. Humboldt hat die Landenge von Panama bei Cubique kaum 100 Meilen Höhe.

weitem den größten Theil der aus dem Meer hervorragenden Erbofläche zusammenbefaßt; die Westfeste über  $2\frac{1}{2}$  Mal an Flächengehalt übertrifft, und sich nach allen Richtungen hinaus, wiewohl vielfach gestaltet, theils in großen zusammenhängenden Landstrecken, theils vom Meer durchschnitten, von einem gemeinschaftlichen Mittelpunkte aus, kaum mit einiger bemerkbaren Ueberlegenheit der einen und andern Richtung, verbreitet.

Sie befaßt, als die Hauptmasse, den unter dem Namen Asien bekannten Welttheil, dessen westlicher, am weitesten vorgestreckter und besonders durch seine Perklüstung, mittelst in seine Küsten eintretender Meeresbuchten, sich auszeichnender Theil als Europa unterschieden wird. Mit dieser Hauptmasse tritt südwestlich durch einen Isthmus, (bei Suez,) die als Afrika bekannte große Landstrecke, südöstlich aber durch einen ähnlichen, aber durchbrochenen, durch die Halbinsel Malacca und die Insel Sumatra, mit den in gleicher Längsrichtung liegenden Inseln, Neuholland in Verbindung, und es hat das Aussehen, als ob zwei Welttheile von derselben Hauptform wie die Westfeste, (Amerika,) mit ihren nördlichen Hauptmassen zusammengewachsen wären<sup>51</sup>.) Die sich durchkreuzenden Haupthöhenzüge dieser Gesamtmasse finden in einem Theile von Asien ihren Durchschnittpunct, der ziemlich die Mitte der gesammten Ländermasse einnimmt, sich überhaupt durch seine hohe Lage bemerklich macht und sich den natürlichen Standpunct anbietet, von dem aus die relative Lage der einzelnen Haupttheile der Ostfeste bestimmt werden kann. Es dieß das Gebirge Mustäg, eine Landhöhe, die nach neueren Untersuchungen jeder andern der Welt<sup>52</sup>, wegen ihrer Hervorrägnis, wenigstens unbestritten der Verbreitung nach, den Vorzug streitig macht, insbesondere der westliche nördlich aufsteigende Theil des Asiatischen Hochgebirges unter etwa  $90^\circ$  Länge und  $35^\circ$  nördlicher Breite, oberhalb der Quellen des Indus und des Ganges, der Tibet von Seikstaaten im nördlichen Hindostan, von Ostpersien und der goldenen Bucharei trennt, und weiter hinauf, als das Gebirge Imaus<sup>53</sup>, unter etwa  $45^\circ$  nördlicher Breite, sich in Seitengebirge verbreitet. Von hier aus hat man, um über die gegenseitige Lage der die Ostfeste constituirenden einzelnen Landstrecken sich von einem rein naturhistorischen Standpunct aus zu orientiren, zuvörderst vier sich entgegengesetzte Endpuncte dieser Gesamtmasse ins Auge zu fassen, nämlich: a) in Nordosten, (unter etwa  $208^\circ$  Länge und etwa  $40^\circ$  nördlicher Breite,) das Asiatische Ostcap, oder das Eschukotskenos; b) in Südwesten, (unter  $37\frac{1}{2}^\circ$  Länge und  $35^\circ$  südlicher Breite,) das Cap Agulhas, oder das Nadelvorgebirge, als südlichste Spitze Afrika's; c) in Nordwesten, (unter  $8\frac{1}{4}^\circ$  Länge und  $38\frac{3}{4}^\circ$  nördlicher Breite,) das Cap da Roca unweit der Mündung des Tajo, als die westlichste Spitze von Europa; d) in Südosten, (unter  $122^\circ$  Länge und  $1^\circ$  nördlicher Breite,) das Vor-

51) Diese Bildungsform hat besonders Steffens (a. a. O. S. 177) mit Schönn dargestellt. 52) Vgl. oben S. 631. 53) Unter welcher Benennung

Indessen manche Geographen, besonders ältere, den ganzen Gebirgszug beinahe überhaupt herrschen in der besondern Bezeichnung der Asiatischen Gebirge v. u. bestimmen. 54) Evident bilden die gedachten zwei Haupthöhenzüge mehr die Form eines elliptischen X, als ein Kreuz, also ein Ektasma.



Romania auf der Asiatischen Halbinsel Malacca, oder wenn man, (obiger Bemerkung,) die in gleicher Richtung mit dieser Insel fortgehenden Insularmassen mit zu Asien rechnet, (unter  $165^{\circ}$  Länge  $44^{\circ}$  südlicher Breite,) das Südcap von Van-Diemens Land, welches von Neuhoiland bloß durch die Bassesstraße geschieden ist. Es erfolgen wir von diesen Punkten aus die Höhenzüge nach den entgegengesetzten; so macht sich der erste Höhenzug von dem Ost- zum Südwestpunkte, als die Halbschied desjenigen Haupthöhenzugs bemerklich, der, da er mit der andern Halbschied der Haupthöhenzug der Westfeste ist, als ein natürlicher Weltrücken schon oben angedeutet wurde, und auf den wir späterhin zurückkommen werden. Der Haupthöhenzug beider Continente ist nämlich am Asiacap diesseit, und dem Prinz-Wales-Cap, als der nördlichen Spitze von Amerika jenseit der Straße Anian, bloß durch geringen Zwischenraum von zehn geogr. Meilen und auch wegen zwischeliegender Inseln in diesem nicht ganz unterbrochen; ohne diesen man von der südlichsten Spitze Amerika's bis zur südlichsten Spitze Asias auf steten Berghöhen gelangen können, und so alle Quellen und Flußgewässer beider Continente umgehen, in so fern diese den Continentalmassen, welche von diesem Höhenzug entfernt liegen, nicht ausfließend angehören, und dann dem Haupthöhenzug, im Ganzen begleitet, parallel streichen. Wir wollen diesen Höhenzug, als den einen Weltrücken, den ihn durchkreuzenden aber als den Seitenhöhenzug der Ostfeste bezeichnen.

Dieser so bestimmte östliche Weltrücken hebt also von dem Jakotskoinos in Asien unweit des nördlichen Polarcirkels an, geht in südwestlicher Richtung durch das Land der Tschuktschen, über das Kamnaja-, das Stannowoigebirge, das Berchojansk-, (Kammgebirge,) und das Nertschinskische Gebirge, (Apfelgebirge,) weg in das Hochgebirge, das im Norden der Mongolei von Osten nach Westen sich fortzieht, und von dem der Bogdo-Dola als Hauptstammfließen wird, von welchem dann der große und kleine Altai ausfließende Theile sind. Von hier gelangt dieser Zug zu dem südlich endenden Gebirge Mustag, von wo aus er dann, mit südwestlicher gehender Richtung, über die Hindugebirge, die Gebirge Ghaur in Persien, über das Gebirge Maneschi, über den Berg Bagrus nach Persien, nordwestwärts sich herumbiegend, oberhalb der großen Mündung Naubendan nach dem Gebirge Ervand hin seinen Fortgang nimmt, ferner zwischen dem Urmi- und dem Wansee, nach dem Gebirge Anat zu und in westlicher Richtung auf die große Armenische Bergkette, welche als Antitaurus am bekanntesten ist, schlägt sich, wo das Gebirge vom Gebirge Taurus ansläuft, in südöstlicher Richtung um, und läuft auf einem Theil dieses Gebirges in die große Syrische Kette aus, die sich als Hochland in südlicher Richtung, und sodann in die Wüste Djofar in südwestlicher Richtung nach der Erdengegend Suez, (von 14 Meilen Länge,) forterstreckt. Von hier, also in Asien, geht der Höhenzug längs der großen Strecke zwischen dem Mittelmeer und dem rothen Meer in südöstlicher Richtung auf dem Gebirgsrücken der Thebaischen, dann der Rubischen Wüste zur Seite, zieht sich weiter in Mittelasien in noch wenig bekannten Länderstrichen in süd-

westlicher Richtung nach dem großen Gebirge Lupata<sup>55</sup>, zwischen dem großen See Maravi und der Küste Zanguebar fort, macht nun eine westliche Biegung nach noch unbekannten Gegenden, und tritt endlich wieder südöstlich in den Nierveldsgebirgen, im Norden des Landes, als ein bekannter Gebirgsrücken hervor, von wo aus er zwischen kleinen Flüssen sich hindurchwindet, und sich so bis zu dem merkten Cap Agulhas, als der Südspitze von Afrika, verfolgt.

Der diesen durchschneidende Seitenhaupt Höhenzug der Delfeste beginnt also, (wenn wir allein ihn ins Auge fassen,) von dem Cap de Roca in Portugal, als dem westlichsten Endpunct von Europa, zieht sich in nordöstlicher Richtung, vielfach sich schlängelnd durch das Hochland von Portugal und Spanien hindurch, nach dem nordwestlichen Ende der Pyrenäen, welche in östlicher Richtung stehende Gebirgskette er verfolgt. Diese verläßt er auf dem Mont Loz und steigt auf den Sevennen nordwärts, macht durch einen Urdorogesen dann in östlicher Richtung den Uebergang auf das Pyrenäengebirge, läuft auf selbigem südlich herab, bis über dem Genfer See wo er in östlicher Richtung um selbigen herum den Lauf der Berge der Alpen, (dem westlichen der vier Hauptgebirgszüge der Alpen,) das Hochland von Europa, erreicht, auf selbigem östlich über Gemmi, die Jungfrau, Finsterarhorn, dann nordöstlich zum Grisei und hierauf nördlich sich wieder zurückschlagend bis zur Furka geht, hier sich südlich und dann nordöstlich zum St. Gotthard umbiegt, von da Anfangs auf der Höhe der Graubündner Alpen zum Adulaberg, östlich, dann nordöstlich zum Lukmanier Berg, hier nördlich sich abermals zurückschlagend bis an die Quelle des Hinterrheins, östlich nach dem Splügerberg, von da auf dem Septimer zum Julier- und Albulaberg, von da nordöstlich nach dem Scalet und Sefretaberg, von da nordwärts nach dem Arleberg und Hornvogelberg, fortgeht, von hier aber sich nordwestwärts über den Bodensee verflachend, dann westlich bis zum Schwarzwald gelangt, welcher Berghöhe er sich nördlich fortstreckt, von wo er aber in nordöstlicher Richtung, oberhalb der Donau, sich auf die rauhe Alpe zieht und von hier aus, sich wieder mehr in das Land verflachend, erst nach nordwärts, dann wieder südwärts biegend, immer aber nördlich fortstreichend, zuletzt in das Fichtelgebirge sich erhebt, und von dem vier Armen, in welche diese Gebirgshöhe verläuft, den südwestlich bildet. Von hier geht der allgemeine Höhenzug als Böhmerwald südöstlich, dann in dem Gebirge zwischen Mähren und Böhmen noch östlich, hierauf auf der Grenze von Mähren und Schlesien, auf einem Theile der Sudeten<sup>56</sup>, wieder südöstlich, worauf er in östlicher Richtung auf dem Carpathischen Gebirge fortstreicht, von demselben aber in nordöstlicher Richtung in einer großen Landebene zwischen den Quellen der Weichsel, des Dniesters, des Dniepers, des Niemen, der Dina, der Wolga das Alanische Gebirge, oder das Wolgonstieß erreicht, von wo er hinter der Dwina, und beim Ursprunge

55) Nach der Sprache der Eingebornen Welstrücken.

56) Unter Sudeten ist eigentlich alles Gebirge besetzt, welches Schlesien von der West- und Südseite Mähren von der Nordost- und Nordwestseite umgibt.



vor auf das Berchoturische Gebirge gelangt, auf welchem und  
 ltral, als der natürlichen nordöstlichen Grenze von Europa, er  
 eine südliche Richtung bekommt. Von hier nimmt er dann  
 östlicher Richtung durch die wüsten Steppen der Kirgisiskaisaken  
 -Fortgang, gelangt hier auf das Gebirge Imaus und den Mu-  
 wo er von seiner Vereinigung mit dem vorher beschriebenen Hö-  
 33 östlich wieder ab- und auf der großen Tibetanischen Berghöhe,  
 vom Mustag aus nach Osten zu fortstreicht, seinen Fortgang  
 tt, von dieser Bergkette aus aber sich in einem langen Zuge  
 wendet, und der östlichen Indischen Halbinsel zur Grundlage  
 Form dient, wo er das Birmanische Reich von Siam scheidet  
 in die Erdzunge Malacca und auf dieser endlich in das Vor-  
 ee Romania ausläuft, von wo aus aber auch noch ein zum Theil  
 die Meeresfläche gesenkter Höhenzug durch die Inseln Suma-  
 Java, Bali, Lombok, Combava, Sandelbosch, Timor u. s. w.,  
 nach Neuhoolland verfolgt werden kann, dessen eigner Höhen-  
 doch gänzlich unbekannt ist, südlich aber am Cap Wilson aus-  
 und hier, durch die Bassesstraße unterbrochen, durch kleine In-  
 mit Bar=Diemens Land, (als dem südlichsten aller wegen näher  
 dem östlichen Continent beizurechnender Insularlande,) in Ver-  
 ung tritt, und hier auf dem Südcap ganz in des Meeres Tiefe ab-

sch diesem allgemeinen Entwurf der Bildung des Skeletts der  
 otfeste wird man nun auch die allgemeinen Formationen der  
 iedenen Hauptländer derselben, die nach den gewöhnlichen geogra-  
 en Bestimmungen willkürlich verbunden und willkürlich von ein-  
 getrennt werden, ihrer Naturbeschaffenheit nach, und nach ei-  
 hierdurch selbst dargebotenen und für alle Zeiten sich gleichblei-  
 im Principe, in ein Phantasiebild auffassen können.

die Höhenzüge hier im Ganzen von Nordosten nach Südwe-  
 and von Nordwesten nach Südosten streichen; so würde, wenn  
 bewässer in ihrem Ablauf durchaus auch die Grenzen der Län-  
 assen am Meere erreichten, nur eine vierfache Hauptabbachung,  
 och eine nach Norden, eine nach Westen, eine nach Süden und eine  
 Osten, unterschieden werden. Bei der großen Fläche der mittlern  
 ermasse, der starken Verdunstung der Gewässer in diesen wärmern Re-  
 en, ingleichen bei der weiten Verbreitung von Horizontalflächen dieser  
 arden, gelangen aber von hieraus die abfließenden Gewässer gar nicht  
 um Meer. Es wird daher ein großer Länderstrich in dem mitt-  
 Asien unterschieden, welcher den besondern Charakter hat, daß  
 gar keinem Zusammenhange mit dem Meere durch Gewässerab-  
 steht. Nur erst von diesem großen Rassin oder Kessel aus, wel-  
 als mittleres Hochland der Ostseite bezeichnet werden  
 , kann nach den verschiedenen Weltgegenden eine vierfache Ab-  
 ung, nämlich eine nördliche, eine westliche, eine südliche und  
 östliche, unterschieden werden, die jede indessen einzeln in kleinern  
 auch größern, zum Theil sehr mächtigen Strecken Bergkessel in  
 faßt, die auf gleiche Art außer Gemeinschaft mit dem Meer  
 t sind.

a) Besondere Bildung des mittlern Hochlandes der Ostfeste.

Dieses Land befaßt die besonders von Westen nach Osten von etwa  $60^{\circ}$  bis  $140^{\circ}$  sich in die Länge ziehende Landvertiefung, welche westlich das das Schwarze und das Caspische Meer scheidende Gebirg Caucasus, südlich den Westpersischen Höhenzug vom Mustag aus und die vom südlichen Ende des Mustags östlich fortstreichende große Gebirgskette, östlich das jenseit der Wüste Cobi nördlich aufsteigend mächtige Seitengebirge, nördlich den Höhenzug, der von Nordosten aus zu dem Mustag geht, zur Begrenzung hat. Vom Mustag aus abwärts muß auch das Hochland, welches zum Uralischen Gebirge aufsteigt, so wie dieses selbst und das Hochland zwischen der Wolga und dem Don, das endlich in dem Caucasus anfließt, der natürlichen Lage wegen, noch mit zur nördlichen Grenze gerechnet werden, wovon ein großer Theil nach gewöhnlicher Eintheilung mit zu Europa gezogen wird.

Der Mustag theilt also diesen großen Landstrich von Norden nach Süden in zwei ungleiche Hälften, die jede wieder einen besondern Bergkessel bildet. Die östliche größere hat das Eigne, daß ihre Niederung größtentheils Sandwüste ist, in welcher jedoch auch einzelne Berge hervorragen, oder auch sich von dem Bergrande in das Land ziehen, von denen Flüsse als kleine Steppenflüsse herabströmen und versiegen, oder nur kleine Landseen bilden. Von jenen ist der Terken, oder Hierkanfluß, der größte, welcher sich in dem Caspischen Meer ergießt. Das Land selbst ist als die große Mongolei bekannt. Unter den mehrern ganz wüsten Gegenden derselben ist die Wüste Cobi an der östlichen Seite die größte. — Die westliche kleinere Hälfte ist mehrentheils abhängiges Land und hat den Abfluß der Gewässer meist in große Seen, von denen sich vornehmlich das Caspische Meer, (von 6000 Quadratmeilen Flächeninhalt, und von noch tieferer Lage, als das Weltmeer,) mit seinem Hauptstrom der Wolga, auszeichnet, dessen Stromgebiet sich hoch nach Norden bis zum  $60^{\circ}$  und auch noch weit westlich, (bis etwa zum  $50^{\circ}$ ), erstreckt. Außerdem nimmt es westlich den Kur, (Eyrus,) östlich den Ural auf. Ein zweiter Landsee dieses Reichs ist der Aral, südöstlich vom vorigen, (von 40 Quadratmeilen,) in welchen östlich der Syr (Tarartes,) und südöstlich der Dschiou, oder Amu Darja, (Drus,) sich ergießen.

b) Nördliche Abdachung der Ostfeste.

So wie der Mustag eine östliche und westliche Hälfte vom mittlern Hochland, oder Hoch-Asien abgrenzt; so ist die von dem Mustag nordöstlich fortlaufende Gebirgskette, oder der Ural, auch eine natürliche Scheide der gedachten Abdachung.

a) Westlicher Theil vom Ural aus. Er bildet die große, von etwa  $77^{\circ}$  bis  $208^{\circ}$  Länge und östlich und südlich von dem von Nordosten nach Südwesten streichenden Haupthöhenzug bis zum Mustag und dann westlich von dem Ural begrenzte Ländermasse, deren größerer Theil als Sibirien bekannt ist. Sein Rand, nach dem seine Gewässer sich absenken, bildet fast  $\frac{1}{4}$  des großen Bassins, in dem das als Eismeer unterschiedene mittelländische Meer befaßt wird. Von dem diesem Rande entgegengesetzten Höhenzuge gehen vor-



ähnlich vier Hauptseitengebirge und Höhenzüge nach demselben ab, für fünf Sibirische Hauptflüsse eben so viele Flußgebiete bilden: 1) für den Kowna, als den kleinsten und östlichsten; 2) die Tanagerka, (die zwischen sich und dem folgenden das nicht unbedeutende, doch nicht hoch hinauf laufende Gebiet der Tana hat); 3) die mächtige Lena, mit ihren Nebenflüssen Aldan, Wittim, zu sich am Ausflusse noch der Olenok gesellt; 4) den gleich mächtigen Jenisei, der, aus kleinern Flüssen zusammentretend, besonders durch die das überfließende Wasser des Baikalsees abführende Angara, (Obertunguska,) und die Untertunguska aufnimmt; 5) den nicht minder bedeutenden Ob, vom kleinen Ural, der durch den Arktischen Meerbusen geht, und weiter hinab sich mit dem nicht minder mächtigen Irtysh vereinigt, der wieder den Obel aufnimmt und beim Ausflusse den Obischen Meerbusen bildet. — Von diesen Höhenzügen geht besonders der zwischen der Lena und dem Jenisei auslaufende nördliche bis zum 78°, und bildet hier das noch nie überschiffte Vorgebirge Taimur.

Der Ural selbst aber zieht sich als Werjoturisches Gebirge bis zum 68° nördlicher Breite als Gebirgsrücken, dann als Landrücken rechts bis über den 72° zum Vorgebirge Taimal, mit der ihr liegenden Insel Bieloi, links zum Vorgebirge Storezevski fort, zwischen dem und der Insel Waigats die Meerenge gleichen Namens, rechts das Carische Meer und südlicher zwischen den auslaufenden Landhöhen vom Ural der Carische Meerbusen unterschieden wird. Von der Insel Waigats macht der Höhenzug unter dem Meere den Uebergang zu den zwei großen, unter dem Namen Novazembla, (Nowaja-Semlja,) begriffenen Inseln, (von 2255 Quadratmeilen,) die wohl an der Nordseite, aber nicht an der südlichen völlig bekannt sind, und deren äußerstes Vorgebirge, (Bongomga,) ebenfalls bis 78° nördlich reicht.

2) Westlicher Theil vom Ural aus. Er befaßt das ganze nördliche Europa nach dessen Naturabgrenzung, wornach auch nördlich und südlich mehrere zu Asien gerechnete Länder mit dazwischen fallen. Er reicht von dem westlichsten Vorgebirge Portugals bis zum Gebirge Ural, und hat den Höhenzug vom Cap de Roca bis zum Werjoturischen Gebirge hin als Europäischen Landrücken nachwärtig zu seiner Grenze. Die im allgemeinen auch nördliche Abdachung dieses Theils unterscheidet sich besonders aber von der des vorigen dadurch, daß sie sich bei weitem nicht so weit erstreckt, weswegen auch die Ströme und Flußgebiete von weit minderer Mächtigkeit sind, als die bisher gedachten, sodann aber auch, daß die Seitengebirgs- und Höhenzüge nicht nur sehr ungleich in ihrer Länge sind, sonderh auch zum Theil ihre Richtung verändern und hierdurch Abdachungen nach allen Weltgegenden zu erhalten. Von diesen Seitenhöhenzügen bemerken wir vorläufig, besonders um Merkzeichen zu den folgenden Abtheilungen zu erhalten, folgende drei: 1) den von der östlichen Europäischen Hochgegend, beim Ursprunge der Wolga, oder dem Wolchonski-Lies, (Wolchonskwald, Wolgahöhe,) nördlich bis über den Polarkreis aufsteigenden, und durch erst westliche, dann südliche Umkrümmung die Grundlage der großen Scandinavischen

Halbinsel bildenden Höhenzug; 2) die von einem Seitengebirgszug des Carpathischen Gebirges zwischen der Oder und der Elbe fortstreichende Landhöhe, welche in die Halbinsel Jütland ausläuft; 3) den von dem Juragebirge aus zwischen den Flüssen Maas und Marn zum Ardennenwald fortstreichenden, in das Cap Blancnez am Pas de Calais auslaufenden Höhenzug, welcher aber, durch letzteren nur in kurzer Strecke durchbrochen in den Großbritannienischen Inseln wieder mit mächtiger Verbreitung sich erhebt. — Hierdurch bilden sich nun die unter dem Nahmen Ostsee, (zwischen 1 und 2,) und Nordsee, (zwischen 2 und 3,) bekannten mittelländischen Meere im Norden von Europa.

aa) Flußgebiete zwischen dem Ural und der Ostsee mit Abenkung in das Eismeer: zwei kleinere 1) das der Pelsora und 2) das des Mezen; (die zwischen beiden streichende Berghöhe geht unter dem Meere zur Insel Canin, wo sie das Vorgebirge gleichen Namens, und seitwärts östlich den Ezeskajaer Meerbusen bildet;) 3) das ansehnlichere der Dwina, an deren Ausflusse ein tief eindringender Meeresbusen des Eismeres das weiße Meer bildet, in das sich 4) auch die Onega entleert.

bb) Flußgebiete der Landhöhe zwischen dem Eismeer und der Ostsee nach beiden Meeren zu, oder der Scandinavischen Halbinsel, (von dem Ausflusse der Onega in das weiße Meer, bis zum Ausflusse der Newa in den Finnischen Meerbusen.) Der gedächte, vom dem Wolchonski-Lies abgehende Seitenzug geht nordwärts zwischen dem Onegafluß und dem Onegassee fort, und erhält hier den Nahmen Manselkoe, (Landhöhe,) gibt westlich Seitengebirge ab, die sich zerästelnd und von den sich ausbreitenden Flußgewässern durchrissen und eingeschnitten, Finnland seine Hauptform geben, welches südwärts zwischen sich und Esthland nebst Ingermanland, für den Finnischen Meeresbusen, eine östliche Seitenausbeugung der Ostsee-Raum läßt; dann ein östliches Seitengebirge, das, südlich sich umschlagend, die Lappländische Halbinsel bildet, welche nordostwärts das weiße Meer begrenzt. Nun macht der Hauptzug, welcher fernehin als das Gebirge Kölen, (Kielgebirge,) den Ländern Norwegen und Schweden zur Naturscheide dient, erst eine Hauptkrümmung westwärts, von wo aus ein Arm zum Vorgebirge Nordkyn, (Nordhorn,) ausläuft, welches nächst dem benachbarten westlichen der Insel Magerö, über den 70° hinaus, die nördlichste Spitze von Europa bildet; dann eine südliche Krümmung, und erhält also hier, statt der vorherigen nördlichen und südlichen, eine westliche und östliche Abdachung.

Die westliche Abdachung nach dem Atlantischen Meere zu (welches nordwärts hier in das Eismeer übergeht, südwärts aber den Nahmen Nordsee erhält,) ist durch eine Menge, von den Kölen auslaufender Seitengebirge durchzogen, die unter dem Meere zum Theil wieder in einer Inselreihe hervorgehen, die vom Nordhorn aus, nach dem Polarkreis hin, dem Hauptgebirgszuge ziemlich parallel streicht, in sich als Westraalen und Laxöden am bemerklichsten macht und nebst mehreren Meeresbuchten und Einschnitten in das Land, (Fiorde, besonders den Meerbusen West-Fjorden bildet, der durch südlich



na Land näher rückende kleine Inseln hier als ein durchbrochenes Mittelmeer sich darstellt. Südlicher, (unter  $62^{\circ}$ ), wo das Rölgebirge als Syltöp seine mehresten Höhe erreicht, theilt es sich in einen westlichen Arm, die lange Fjäellen, welche in der Norwegischen Südspitze, dem Vorgebirge Lindensäs sich endigen, und in einen östlichen, Sevebirget, welcher in seinem fernern Zug dem östlichen Theil von Schweden eine westliche und östliche Abdachung giebt, bis zur südlichsten Küste der Provinz Schönen fortstreicht, nördlicher aber, bloß durch den Öresund durchbrochen, mit dem Höhenzug der Dänischen Insel Seeland sich in eine fortstreichende Verbindung setzt.

Die östliche Abdachung des Rölgebirges geht nach dem nördlichen Theil von der Ostsee sich hinaufziehenden Bothnischen Meerbusen, der südwärts durch einen vom Sevebirget östlich abgehenden Seitenhöhenzug, unter dem Meere fortlaufend, und über der Meeresfläche die Insel Åland mit denen ihr zur Seite liegenden kleineren Inseln bildet, theilweise verschlossen wird; unterhalb der Åland-Insel geht die östliche Abdachung in das Hauptbassin der Ostsee, für welches die Inseln Deland und Gothland, in Parallelrichtung mit dem Hauptgebirge Südschwedens fortstreichend; wieder eine Mittelscheide von Nordosten nach Südwesten machen.

Außer diesen beiden bildet die Scandinavische Halbinsel wegen Theilung des Rölgebirges in seine beiden Hauptarme eine südliche Abdachung, in den der Landspitze der Halbinsel Jütland durch gegenseitige Einbiegung entsprechenden Cöbanischen Meerbusen.

Bei dieser verhältnißmäßigen Ueberlegenheit des allgemeinen Höhenzuges über die Seitenhöhenzüge hat die Scandinavische Halbinsel wohl eine Menge kleinerer Flüsse, aber keinen Hauptstrom von einiger Mächtigkeit; dagegen zeichnen sich aber diese Flüsse durch eine Menge Seen aus und bei der Abflachung der Ufer durch Seitenausbreitungen und Moräste aus. Die erheblichsten Flüsse ergießen sich in die Ostsee, so die Kymene von Finnland in den Finnländischen Meerbusen, die Tornea von dem Rölgebirge in die nördliche Krümmung des Bothnischen Meerbusens, die Däwelfe südlich eben dahin strömend. Die bedeutendsten Seen sind der Wenersee, die durch die Däwelfe sich in das Cattegat ergießt, der Wettersee, durch den Motalstrom in die Ostsee ausfließend, der Mälarsee mit seinen vielen Inseln und seinem Ausfluß in die Ostsee, u. s. w.

cc) Flußgebiete vom Europäischen Landrücken zur Ostsee bilden folgende Ströme: 1) die Nawa, die unter dem Namen Loral im nördlichen Theil des Wolchonskiwaldes ihre Quelle hat; (so wie von demselben östlich die Wolga, südlich der Dnieper, westlich die Duna strömt,) durch den Ilmensee fließt als Wolchow durch den Ladogasee geht, und nun mit dem aus dem Ladogasee strömenden Swir; und dem Finnischen Woxa, unter obigem Namen in den Finnischen Meerbusen sich ergießt; 2) die

37) Dadurch, daß die in die Wolga fließende Tnerza durch einen Canal mit der zum Flußgebiet der Nawa gehörigen Zna verbunden ist, wird der Erdrücken von Europa östlich durch einen künstlichen Wasserdurchzug durchschnitten, wie dasselbe durch den Canal von Languedoc und den Rölsercanal in Spanien westlich geschieht.

Narowa, vor ihrem Eintritt in den Peipussee Welika, und aus diesem in den Finnischen Meerbusen, sich ergießend; 3) die Düna, die aus dem Wolchonskimalb östlich abfließt, und mit der Pernau nördlich über ihr, in den von der Ostsee aus, besonders durch die von der Landhöhe zwischen der Pernau und der Narowa aus sich erhebenden Inseln, Dago und Oesel sich bildenden Rigaischen Meerbusen fällt; 4) die Memel, (der Niemen,) welche in zwei Armen, (Ruß und Neue Gilga,) sich in das Curische Haf ergießt, welcher Meerbusen durch die als Curische Mehrung bekannte schmale Erdzunge von der Ostsee gesondert ist und durch den kleinen Canal Ties seinen Ausfluß hat; 5) der Pregel, der, besonders aus der Vereinigung der Inster und Angerap gebildet, nördlich ins frische Haff, einen dem Curischen Haff analog gebildeten Meerbusen der Ostsee, fällt, dessen vorliegende Erdzunge, die frische Mehrung, durch die Meerenge Gatt durchbrochen ist; 6) die von den Carpathen aus von einer viel weitem Landstrecke, als die Gebiete der genannten Flüsse betragen, die Gewässer Ostpreußens (besonders auch als zahlreiche Landseen, worunter der Szwedding, und Pohlens abführende Weichsel, mit den Hauptseitenströmen Pilica und Bug, welche mit ihrem östlichen Arm, als Rogat in das frische Haff, mit ihrem westlichen theils ebenfalls in das frische Haff, mit der Hauptmündung aber in einen Meerbusen der Ostsee fließt, dessen östlicher, durch eine vorspringende schmale Landzunge (Hela,) nördlich begrenzter Theil den Rahmen Puziger Wyn führt; 7) die Oder, die unweit der Weichsel vom Carpathischen Gebirge entspringt, nachdem sie die Neisse, die Ohlau, die Bartsch, besonders die durch die Nege<sup>68</sup> verstärkte Warthe aufgenommen hat, den Damschen See bildet, und mit einem breiten Ausflusse, das Papenwasser, sich in das Pommersche frische Haff mündet, welcher offene Landsee wieder östlich als großes, westlich als kleines Haff unterschieden wird, die Ufer und mehrere kleinere Flüsse aufnimmt, und durch drei Ausflüsse, (Ost und Westdivenow, Swine und Peene, mit Ausnahme des Flusses gleichen Namens,) in der Ostsee sich öffnet.

dd) Die Halbinsel Gütland mit ihren Flußgebieten. Dieser die Gewässer der Ost- und der Nordsee scheidende Landstrich ist selbst eine Fortsetzung des mächtigen Gebirgszugs, welcher von den Subeten aus nördlich als Riesengebirge, (mit der Schneekoppe, als dessen höchstem Gipfel,) bekannt ist; von hieraus streicht der Höhenzug über den Iserskamm, westwärts über das Böhmisches Mittelgebirge bis zum Erzgebirge hin, wo er sich als Winterberg erhebt, sodann nordostwärts zur Landkrone in der Lausitz, worauf er, von dem Lausitzer Gebirge aus sich verflachend, zwischen der Oder, der Spree und der Havel<sup>69</sup> in das niedrige, und vielfach durch austretende Flußgewässer zerrissene Mittelland der Uckermark, und nordwestwärts in das gleiche Mittelland von Mecklenburg

68) Durch den Bromberger Canal, welcher die Nege mit der Brahe verbindet, ist eine künstliche Wasserverbindung des Weichsel- und des Odergebiets bewirkt. 69) Auch dieser Höhenzug ist zwei Mal durch Kunstcanäle, (Friedrich-Wilhelms-Canal und Böhnow-Canal,) durchbrochen.



abläuft. Von hier geht ein Seitenzug nordwestlich in das Mittel-  
 land von Vorpommern über, von wo er, durch die Meerenge Gallen-  
 erbrochen, in der Insel Rügen nochmals über die Meeresfläche  
 erhebt, (welche südwärts den Rügischen Boden als Meerbusen  
 bildet,) und hier sich erst auf der von der Halbinsel Fasmund  
 abstreichenden Halbinsel Wittow in der Ostsee in die Tiefe zieht.  
 Der Hauptzug aber setzt sich, wiewohl hin und wieder auf dem an-  
 tischen, (worunter der Müritg- und Schweriner See,) so reichen  
 Mecklenburgischen Boden, wegen überfließender Gewässer der einzel-  
 nen Flußgebiete unterbrochen, wie auch über die mit der Elbe, wie  
 weit der in die Ostsee einmündende Trave in Verbindung stehende  
 Mecklenburg hinweg, nach der Segeberger Heide in Holstein fort.  
 Hier ist eigentlich schon der Fuß der Halbinsel Jütland, indem die  
 Holstein südlich begrenzende Elbe bei ihrer Breite hier fast wie eine  
 auftretende Meeresbucht zu betrachten ist. Der Haupthöhenzug geht  
 über die westlich ausfließende, aber durch einen Canal mit der Ostsee  
 in Verbindung stehende Eyder weg, ziemlich in der Mitte des  
 Landes, bis nach Nordjütland fort, wo er sich wegen des östlich  
 auftretenden, das Land höchst zerklüftenden Meerbusen Lymfiord,  
 zur westlichen Seeküste wendet und von hier aus bis zum Vorge-  
 birge Skagen nördlich streicht. Außer diesem Haupthöhenzug geht  
 über ein Seitenzug von der Segeberger Heide nordöstlich in einen  
 vorspringenden Landtheil über, welcher den von der Pommerschen,  
 Mecklenburgischen und Holsteinischen Küste gemeinschaftlich gebildeten  
 Meerbusen der Ostsee, in den sich die kleinern Flüsse dieses Strichs,  
 (als die Rucknitz, die Warnow, die Trave,) ergießen, von der  
 westlichen Seite schließt, durch den Femersund von der Insel Femern  
 getrennt ist, von der aus die Inseln Laland und Falster einen  
 Übergang zu der bedeutendern Insel Seeland bilden, die selbst  
 weder bloß durch den Dresund von der Schwedischen Provinz  
 Schonen getrennt ist. Von Laland aus geht zugleich ein Höhenzug  
 in nordwestlicher Richtung nach der Insel Langeland und Funen,  
 und von hier aus nach Jütland zurück.

Alle diese abgerissenen und vorspringenden Theile zerfallen wegen  
 ihrer Bildung auch nur in kleine, aber zahlreiche Flußgebiete, durch  
 welche die Küsten auch vielfach zerklüftet werden.

Wichtiger als diese sind jedoch die Meerengen, die durch die ge-  
 rathenen, ihnen zur Seite liegenden kleinern Inseln und das an-  
 grenzende feste Land gebildet werden. Das Vorgebirge Skagen  
 bildet eigentlich südlich die Begrenzung der Ost- und Nordsee, die im  
 dänischen Meerbusen zusammenfließen. Der durch die Küste von  
 Nordjütland und Südschweden verengte Theil der Nordsee vom Co-  
 mischen Meerbusen südlich ist als Cattegat bekannt. In so fern  
 aber Jütland, als der mittlern Nordeuropäischen Scheide, östlich  
 liegt, gehört er schon der Ostsee an, oder bildet doch als ein eige-  
 nes Meerbassin zu ihr den Uebergang. Die zur Ostsee eigentlich ge-  
 hörenden Gewässer werden aber insbesondere durch den im Süden  
 des Cattegats liegenden Archipelagus zu einem größtentheils geschloss-  
 nen Meere, und die Verbindung derselben mit dem großen Ocean  
 durch das Cattegat hindurch insbesondere durch drei Meerengen,

den Drefund zwischen Schweden und Seeland, das große Belt zwischen Seeland und Fünen und das kleine Belt zwischen Fünen und Jütland, vermittelt.

ee) Flußgebiete vom Europäischen Landrücken zur Nordsee bilden folgende Ströme: 1) die Elbe, deren Flußgebiet in ein oberes, mittleres und niederer unterschieden werden kann, wovon das obere in dem Gebirgskessel gebildet wird, der Böhmen zu einem abgeschlossenen Lande macht, wo der östlich auf dem Riesengebirge entspringende Hauptfluß von Süden her die Böhmisches Mulde, von Westen her aus dem östlichen Winkel des Fichtelgebirges die Eger aufnimmt, und durch die sogenannte Elbpforte, die der Bergzug vom Erzgebirge und vom Riesengebirge her öffnet, abfließt; das mittlere Gebiet aber südlich vom Erzgebirge (als dem nordwestlichen Gebirgszug des Fichtelgebirges,) westlich durch den von Fichtelberg aus mit dem Böhmer Wald in gleicher Richtung, als Thüringer Waldgebirge zum Harz, (und auf selbigem bis zum Brocken,) fortstreichenden Bergzug, östlich durch das niedrige Lausitzer Gebirge und den Landrücken zwischen der Spree und der Oder eingeschlossen wird, und die Elbe von der Elbpforte bis zum Einfluß der Saale befaßt, in welchem Strich die Elbe westlich nebst der Saale aus dem nördlichen Gebirgswinkel des Fichtelgebirges, mit der westlich in diese strömenden Ilm und Unstrut, die ihr parallel streichende weiße Elster, die östlich auch in die Saale fällt, und die Sächsisches Mulde, östlich aber die schwarze Elster aufnimmt, das untere Gebiet endlich in durchaus flachem Lande von dem Einfluß der Saale an gebildet wird<sup>70</sup>, wo sich als größere Flüsse noch östlich die durch die Spree verstärkte Havel mit der Elbe vereinigt, die durch die Stecknitz eine Wasserverbindung mit der Ostsee eingeht, sich selbst aber zwischen Holstein und Bremen mächtig verbreitend, nachdem sie noch die Oste aufgenommen, (wodurch zugleich eine Wasserverbindung mit der Weser unterhalten wird,) in zwei Hauptströmen, die Norder- und Süderelbe, sich ergießt. 2) Die Weser, deren Gebiet östlich von dem Elbgebiet durch das Harzgebirge, südlich und westlich von dem Rheingebiet durch das Seitengebirge, welches von dem Thüringer Wald zum Rhöngebirge, (dessen Gipfel der Kreuzberg,) geht, durch dieses, und den Höhenzug über den Vogelsberg und das Rothlagergebirge, von dem Emsgebiet durch das in das flache Land auslaufende Wesergebirge geschieden ist, die selbst aus dem Zusammentritt der Werra und Fulda entsteht, außerdem die durch die Oker und Leine zusammentretende Aller aufnimmt, durch die Wunne und Oste mit der Elbe eine Wasserverbindung hat, und mit einem sich verbreitenden Flußbeet nahe an der Elbe ihren Ausfluß bekommt. 3) Die Ems, die zwischen den Flußgebieten der Weser und des Rheins gleichsam eingeschoben, westlich vom Wesergebirge am Stapelager Berge entspringt, und in den als Dollart<sup>71</sup> bekannten Meer-

70) Die Niederungen des Landes von dem Anfang dieses Strichs an verstatteten die durch den Plauischen Canal zwischen der Elbe und der Havel auf einem kürzeren Wege und durch den Friedrich Wilhelms-Canal zwischen der Spree und der Oder bewirkte künstliche Wasserverbindung. 71) Er entstand im J. 1277 durch Einbruch der Nordsee in angebautes und bewohntes Land, wegen Zerreißung der aufgeführten Dämme.



den der Nordsee, sich ergießt, von wo aus sich, (wie auch in den Aus-  
 fluß der Weser und Elbe,) große Strecken von Sandhügeln, (hier  
 Dünen genannt,) vorlegen, zwischen denen die Hauptströmungen,  
 Ostereis und Westereis, (die Insel Borkum ein-  
 schließend,) hindurchziehen. 4) Das Flußgebiet des Rheins, als  
 das vorzüglichste dieser Abtheilung, zerfällt ebenfalls in ein oberes,  
 mittleres, und ein niedriges, und wird südöstlich, von dem Zuge  
 Europäischen Landrückens, von dem Uebertritt des Juragebirges  
 (die Alpenkette beim Ausflusse des Genfer Sees an, bis zu dem Fichtel-  
 gebirge, östlich von dem Seitenhöhenzug vom Fichtelgebirge bis an  
 die Quelle der Ems und das von hier aus fortstreichende flache Land,  
 östlich von dem Juragebirge und einem von den Vogesen westlich  
 bis zur Mosel und der Maas fortstreichenden Gebirgszuge, der  
 ebenfalls in das flache Land ausläuft, begrenzt. Das obere Rheinge-  
 biet befaßt alle nordwärts von der Landhöhe über dem Genfer See,  
 zwischen dem Juragebirge und den Berner Alpen, und von die-  
 sem über den St. Gotthard fortstreichenden Schweizer Al-  
 pen und dem oberhalb des Bodensees von diesem nach dem Schwarz-  
 wald hin auslaufenden Höhenzug südwärts zusammenfließenden Ge-  
 wässern. Der St. Gotthard, als die vornehmste Höhe dieser Reihe,  
 von dem westlich die Rhone und südlich der Tessin in der südlichen  
 Abdachung von Europa entströmt,) gibt nördlich die Reuß, welche  
 zu den übrigen Gewässern der nördlichen Schweiz späterhin ebenfalls  
 zum Rhein gelangt, östlich aber den Hinter- und Mittel-  
 rhein, mit welchem sich bald auch der Vorderrhein vereinigt,  
 welcher gemeinschaftliche Strom dann durch den Bodensee, (mit  
 seinen Anhängen: den Bodmer- und Zeller See der ansehnlichste  
 Europäische Landsee,) hindurchgeht, und in seinem westlichen Fort-  
 streichen, außer der Thur, vorzüglich die ihm an Größe nicht nach-  
 gebende Aar aufnimmt, welche nämlich alle übrigen Nord-  
/>
 schweizerischen Gewässer, besonders auch die Reuß und die Limmat  
 in sich aufnimmt, die an mehreren Orten in den tiefen Schweizer Thä-  
 lern Landseen bilden, worunter sich besonders der von der Reuß durch-  
 flossene Vierwaldstädter See, nächst dem der Zürcher See von  
 der Limmat und der Neuchâtel See; dessen Wasser mit dem  
 der Vierer See die Aar abführt, auszeichnen. Das mittlere Rheinge-  
 biet wird von da an unterschieden, wo der Rhein aus seinem west-  
 lichen Lauf sich nördlich umbiegt, wo die nordwestlich streichende Nahe  
 in die Gewässer des dem Rheine östlich zufließenden Neckars von  
 dem Gebiet der Donau, so wie die Berghähen des Odenwaldes das  
 Neckargebiet von dem des ebenfalls östlich dem Rheine zufließenden  
 Mainsondert, welcher letztere Fluß aus dem westlichen Winkel des Fichtel-  
 gebirges, (als des mittlern Hochgebirges Deutschlands, mit eben-  
 falls vierfacher Abdachung, nach dem Saalthal, dem Eger Thal, dem  
 Harzthal und dem Mainthal,) seinen Ursprung nimmt, und in sei-  
 nem schlängelförmigen Lauf nördlich von dem den Uebergang zum  
 Thüringer Waldgebirge machenden Frankenthal, dem Seitenzug von  
 dem nach dem Rhöngebirge hin, und dem von demselben absteigen-  
 den Spessart begrenzt ist. Oberhalb des Einfalles des Mains in  
 den Rhein kann noch von einer neuen Umkrümmung des Rheins

nach Osten und bald darauf wieder nach Norden, (von dem sogenannten Bingerloch an,) wo es das Ansehen hat, als ob der Rhein durch das von der westlichen Seite desselben zur östlichen, oder der Höhe fortstreichende Gebirge, den Hundsrück, sich mit Gewalt einen Durchgang gebahnt hätte, seine nördliche Hälfte des mitlern Flußgebietes von der südlichen unterschieden werden, von wo auch dem Rhein östlich die nordwärts durch den Westerwald, welcher vom Wesergebirge sich südwärts zieht, begrenzte Lahn, westlich aber vorzüglich die Mosel von den Vogesen, (einem von dem Turaergebirge aus nördlich sich verzweigenden Gebirge,) und östlich noch der Sieg, Ruhr und Lippe zuströmen. Das niedere Rheingebiet besteht fast alles platte Land, welches der Rhein von dem Einflusse der Lippe an durchläuft, indem er selbst sich in zwei Arme, einen südlichen, den Waal, die sich mit der Maas vereinigt, und einen nördlichen theilt. Indem letzterer wieder sich in zwei Arme verläuft, ergießt der meiste in gleicher Richtung fortlaufende, als Yssel sich in die Zuyder See, von welchem tief einschneidenden, durch gewaltsamen Einbruch der Nordsee entstandenen Meerbusen, das Hatlemer Meer, nur ein besonderer Einschnitt ist, und der selbst durch eine bis zum Ausflusse der Ems östlich sich fortziehende Inselkette, (deren erste, Texel, zwischen sich und dem festen Lande die Hauptverbindung mit der Nordsee vermittelt,) zu einem meist verschlossenen Mittelmeer wird, in dessen Ende, gegen den Ausfluß der Ems hin, auch noch die Lauwe durch den sich bildenden Meerbusen gleichen Namens ergießt. Der zweite Arm nimmt westlich, unter dem beibehaltenen Namen Rhein seinen Lauf, ergießt aber sich zum größten Theil als Lech in eine Ausströmung der Maas, worauf der Rest, nachdem er auch noch einen Theil seiner noch übrigen Wassermasse als Lech in den Zuyder See abgegeben hat, in den dem Meere vorliegenden Dünen versickeret.

5) Die Maas, ebenfalls von den Vogesen entspringend, durch die von der Marne, und nachdem sie den Ardennenwald durchbrochen, durch Hochland von der Schelde geschieden, nimmt die Sambre und Roer auf, und verbindet sich vor ihrer breiten Ausströmung, durch welche sie den vorliegenden Theil der Niederlande in eine Menge Inseln abscheidet, mit der Waal und dem Lech vom Rheine, zuletzt theilweise mit der Schelde. 6) Die Schelde hat nur ein kurzes, eben vom Martinsberge, nördlich vom Ardennenwalde anhebendes Flußgebiet, und ist das letzte der Hauptgewässer, die durch ihre Verästelung beim Ausflusse das von der Ems herab durch seine niedrige und nur durch Kunst gesicherte, als Niederlande bekannte Küstenland mannigfaltig durchschneidet, welches, ohne eigentliche Flußgebiete zu haben, von seinen Gewässern mehr oder minder eine netzförmige Verbindung erhält.

7) Die Großbritannischen Inseln mit ihren Flußgebieten.

Die Großbritannischen Inseln sind die Fortsetzung desjenigen Zusammenhangs, welcher nordwestlich von dem Turaergebirge sich zu den Vogesen, durch den Ardennenwald hindurch, zwischen den Flußgebieten der Maas und der Marne, nördlicher zwischen denen der Schelde und der Seine, und der zwischen beiden sich noch einfügenden Klein-



itenflüsse, streichend, endlich das Cap Blancnez erreicht, hier der Straße von Calais, (welche Meerenge die Nordsee durch Canal, eine Erweiterung jener Meerenge mit dem Atlantischen Meer, südlich in Verbindung setzt,) unter die Meeresfläche sich senkt, bei Süd-Foreland wieder sich erhebt. Von hier streicht der Seitenzug erst westwärts, dann nördlich, wo er sich mit einem mächtigen Seitengebirgszug, dem Cheviotsgebirge, der in der Mitte Landes England von Schottland scheidet, durchkreuzt, dann seine Richtung fort, bis er im nördlichsten Vorgebirge Schottlands Dungsby-Head wieder unter die Meeresfläche kommt, wo er sich in den Orkney-Inseln, dann in den Shetland-Inseln, in der Richtung der Inseln an den Norwegischen Küsten theilweise von neuem erhebt.

Durch diesen Zug bekommt Großbritannien eine östliche und eine westliche Abdachung. Die westliche Küste schließt nach Osten die Nordsee, der jedoch nordwärts eine freie Verbindung mit dem Atlantischen Meere bleibt, insbesondere auch um Dungsby-Head herum, durch die Pentlandstraße.

Durch die Ungleichmäßigkeit der Seitenhöhenzüge bekommt Großbritannien an beiden Küsten, besonders der westlichen, die eingeknickene Form, die dieses Land charakterisirt. Der vortretendste Theil der Westseite ist der südliche, der sich in die Gebirge von Cornwallis und das Vorgebirge gleichen Namens endigt, und östlich als Meerbusen den Canal von Bristol bildet; ein zweites Vorgebirge St. Davids auslaufend, hat den St. George's Canal als Eingang in die Irländische See, (die Gewässer zwischen Großbritannien und Irland,) zur Seite und schließt mit einem dritten Seitenzug die Cardigonbay in sich, von wo durch die nahe Insel Anglesea und die etwas fernere Man zugleich das Irländische Meer von Süden nach Norden theilweise durchschnitten wird. Der südlichste Seitenzug Schottlands nach Westen bringt Großbritannien mit Irland in die nächste Verbindung, von dem bei Mull of Galloway durch den das Irländische Meer nachwärts begrenzenden Nordcanal getrennt ist, welches Großbritannien analog gebildete Land auch meist eine östliche und westliche Abdachung hat, doch auch mit Canälen durchschnitten ist. — Die britische Westküste oberhalb des Nordcanals zeichnet sich durch tief eindringende Meeresbuchten und Inseln, (Hebridische Inseln,) deren äußerste Western in einer zusammenhängenden Kette von Gewässern zwischen den übrigen als Schottisches Meer westwärts einschließen, in deren Zug nördlicher die Faröer sich erheben. Die häufig durch Canäle verbundenen Flüsse beider Hauptlandmassen können ihres kurzen Laufs wegen nicht von großer Mächtigkeit werden. Unter ihnen verdient die in die Nordsee strömende Themse in Südengland, wo die meiste Masse sich sammendrängt, den Hauptrückblick.

gg) Flußgebiete vom Europäischen Landrücken zum Atlantischen Meere. Das Atlantische Meer begreift die ganze Ostseite westlich und der Westseite östlich befindliche Meeresküste, in so fern diese nicht, zwischen einzelnen Ländermassen ein-

dringend, hier andere Benennungen erhält. In ihm macht der als Pyrenäen bekannte Theil des Europäischen Höhenzugs, weil er die Pyrenäische Halbinsel, in Form eines Kopfs, mit scharfer Begrenzung von dem übrigen Europa scheidet, eine natürliche Abtheilung.

αα) Flußgebiete auf der östlichen Seite der Pyrenäen bilden hauptsächlich folgende Flüsse: 1) die Seine, von der Cotinor, einer aus den Sevennen sich ziehenden niedrigen Bergreihe, deren Nebenflüsse, östlich besonders die Aube, Marne, Oise, durch den gedachten, über den Ardennenwald gehenden Höhenzug geschieden sind, der jedoch noch Raum für ansehnliche Küstenflüsse, (worunter die Somme,) übrig läßt, welche mit der Seine selbst in den Canal fallen; 2) die Loire, in den Sevennen entspringend, von welcher durch einen mächtigen Seitenhöhenzug geschieden, der über den Wald von Orleans wegstreichend, in zwei Vorgebirge, das Cadela Hague östlich, und St. Mathian westlich, ausläuft, (die die Inseln Gernisey und Jersy in der Bucht zwischen sich biffassen,) wo besonders der nach letzterem hingehende Höhenzug die Landzunge Finisterre bildet, von dem aus die bisher in westlicher Richtung fortstreichende Französische Küste eine südliche annimmt und also eine Abdachung nach Westen bekommt; 3) die Garonne, welche von den Pyrenäen kommt, und zwischen diesem und dem von den Sevennen aufsteigenden und endlich in die Insel Noirmontie auslaufenden Gebirgszug, mit der Dordogne vereinigt, als Garonde ihren Ausfluß südlich von den Inseln Re und Oleron hat, hinter denen die Charente und andere Küstenflüsse ihre Mündungen haben.

ββ) Flußgebiete auf der westlichen Seite der Pyrenäen. Der Höhenzug der Pyrenäischen Halbinsel zu den Pyrenäen streicht an der Nordküste derselben so nahe hin und gibt in gleich Richtung einen derselben Küste so nahe bleibenden, als Asturische Gebirge in das Cap Finisterre in Spanien auslaufenden Seitenbergszug ab, daß nach dieser Nordküste zu, die mit der westlichen Französischen den Meerbusen von Biscaya bildet, bloß kleine Küstenflüsse abfließen. Die bedeutenden Flußgebiete dieser Abtheilung haben jenseit des Caps Finisterre westliche Abdachung, unter ihnen besonders der Minho und der Duero, beide von den Cantabrischen Bergen, wovon ein Seitenzug nördlich von Tajo sich in den Capo de Roca endigt.

c) Westliche Abdachung der Ostfeste. Der Gebirgshöhenzug, in Hinsicht dessen die Gesamtheit der folgenden Flußgebiete als eine westliche Abdachung betrachtet werden kann, geht von dem Caucasus und Antitaurus nördlich auf das Caucasische Gebirge zwischen dem Caspischen und Schwarzen Meere ab, und läuft zwischen der Wolga und dem Don bis zu dem Woldchonski-Lies hin auf, wo sie sich an den Europäischen Landrücken anfügt; südlich ab geht sie auf dem großen Höhenzug der Ostfeste über die Landenge von Suez bis zur Afrikanischen Landspitze fort. Die Landenge von Suez macht aber hier wieder eine natürliche Scheide.

α) Gebiete von Flüssen, welche sich in die auf der nördlichen Seite der Landenge von Suez befindlichen Gewässer



ießen. Der im Norden der gedachten Erdenge, von dem Atlanti-  
schen Meere aus, zwischen die beiden als Europa und als Afrika un-  
terschiedenen Ländermassen eingedrungene Meerestheil, Mittelländi-  
sches Meer in beschränkterem Sinne, ist eine der wichtigsten Bildun-  
gen der Erdoberfläche. Durch dasselbe bekommen die den bisher ge-  
zeigten entgegengesetzten Flußgebiete von Europa südliche, ein Theil  
Afrikanischen nördliche Abdachung.

aa) Flußgebiete vom Europäischen Landrücken mit  
nördlicher Abdachung.

aa) Noch außerhalb des Mittelländischen Meeres.  
Am dem nördlichen Ende der Pyrenäen geht ein Höhenzug herab,  
der nicht nur hinter den Quellen der genannten Flüsse der Pyre-  
näischen Halbinsel, sondern auch hinter denen der folgenden beiden  
nach herabsteigt, nahe an der südlichen Küste dieser Halbinsel  
zuerst westlich wendet, in das Cap del Carnero und die Punta  
Europa an der Straße von Gibraltar ausläuft, und über die-  
se nach Afrika überseht. Dieser Höhenzug bietet sich eigentlich, we-  
gen seiner Verbindung mit dem vom Berge Atlas in Afrika ihm ent-  
sprechenden, zu einem noch natürlicheren für das westliche Ende  
des Europäischen Landrückens dar, und wenn er in obiger Abtheilung  
nicht dazu benutzt wurde, geschah, dieß bloß, weil das Cap de Roca  
der westlichste Punct von Europa ist. Zwischen diesem und der Straße  
von Gibraltar befinden sich also noch einige Flußgebiete, die zwar  
nördliche Abdachung haben, aber nicht ihre Gewässer dem Mittelländi-  
schen Meere zusenden, also eigentlich noch mit dem zuletzt gedachten  
ein System gehören, nämlich außer mehreren kleinern: 1) das  
des Tago, welcher auf der westlichen Küste und von dem folgenden  
anders durch die im Cap St. Vincent aus-, durch die Sierra  
de Guadalupe hindurchlaufende Landhöhe getrennt; 2) das der  
Guadiana und 3) das des Guadalquivir, welche, durch die  
Sierra Morena geschieden, auf der südlichen Küste ausfließen;  
in der Nähe des letztern ist die Insel Leon mit der Bai von Cá-  
dis und der Bai de Puntales bemerkenswerth.

bb) Europäische Flußgebiete innerhalb des Mittelländi-  
schen Meeres. Das Mittelländische Meer, (von 40,000 Qua-  
dratmeilen,) steht einzig durch die Straße bei Gibraltar mit dem  
Atlantischen Meere, und namentlich dem Atlantischen Meere in Verbindung.  
Nur es sich in der Länge zwischen Europa und Afrika fortstreckt,  
wenn mehr durch vortretende Theile des erstern als des zweiten  
Theils die besondern Abtheilungen desselben gebildet. Unter die-  
sen vortretenden Theilen machen sich besonders merkwürdig: 1) die  
Halbinsel Italien, 2) die als Griechenland bekannte Halbinsel, beide  
in südlicher Richtung, 3) die als Halbinsel Asien, (Anadolu,) in  
nördlicher Richtung, (Anadolu,) in westlicher Richtung in das Mittelländi-  
sche Meer hervortretend. Hiernach können auch die hier gehörigen  
Flußgebiete folgende Zusammenstellung erhalten:

aaa) Flußgebiete von der Meerenge von Gibraltar  
zu Italien: 1) das des Tago auf der Südostküste der Py-  
renäen. physiol. Realw. II. B.

renaischen Halbinsel, der unter mehrern Küstenflüssen zwischen vorspringenden Vorgebirgen, worunter das Cap de Sata, das Cap de Palos, vorzüglich das Cap la Noa, von dem ein fortgehend Höhenzug in Ivica und Formentera, oder in die Pithyusischen Inseln, ingleichen in Majorca und Minorca, oder den Balearischen Inseln von neuem hervortritt, sich besonders bemerklich macht; 2) das bedeutende des Ebro, welcher aus dem Gebirge Santillana im Cantinabrischen Gebirge, längs des Laufs der Pyrenäen, und alle übrigen Flußgebiete der Pyrenaischen Halbinsel, die ihre Quellen nicht in den Pyrenäen selbst haben, östlich begrenzend, mit südlicher Richtung in die hienieden gedachten Inseln sich bildende Bucht sich ergießt; 3) das der Lobregat und mehrerer Küstenflüsse, die das Wasser von dem in dem Cap de Creus südlich auslaufenden Pyrenäen herabfließen, und das Flußgebiet des Ebro während ihres kurzen Laufes nicht erreichen; 4) das der Rhone, welche von der Furka westlich vom St. Gotthardsberg in der Schweiz entspringt, die Gewässer des Walliser Thals aufnimmt, den Genfer See durchströmt, die von den Savoyischen Alpen strömende Arve aufnimmt, nachdem sie das Grauberge durchbrochen, und die von den Vogesen kommende Saône und Urdeche aufgenommen hat, durch die nordwärts streichende Sevennen zu südlichem Lauf bestimmt, zwischen ihnen in den Cottischen Alpen durch die Isère und Durance von den Savoyischen Alpen u. s. w. verstärkt, in dem hier sich bildenden Meerbusen von Lyon in mehrern Armen ins Meer fällt.

bbb). Die Halbinsel Italien mit ihren Flußgebieten. Der als Italien sich auszeichnende Theil von Europa erhält seine Grundlage durch einen von den in den Europäischen Landrücken aufgenommenen und von diesem westlich seinen Höhepunkt, (wie das Wolchonskies östlich,) bildenden Alpen ausgehenden Seitenzug, indem er in der Reihe, die, vom Genfer See an, als Berner Alpen ausläuft, dann über die Furka oberhalb der Rhonemündung sich um die Quelle der Reuß im Urserner Thale südlich zieht, und darauf nach dem St. Gotthard hin sich wieder nördlich umschlägt, von dem hierdurch sich bildenden Winkel, südwärts der zuerst den Namen Penninische oder Savoyische Alpen führende Zug, südwestlich über den Col de Gris, den Simplon, den Mont Rosa, den Mont Cenis, den großen St. Bernhard fortgeht, bis hierher das Rhonegebiet, oder das Walliser Land südlich begrenzend, ferner die Grajische, (Griechische,) Alpen, über das Haupt der Alpen den Montblanc; über den kleinen Bernhard, den großen und kleinen Mont Cenis fortstreicht, nun als Cottische Alpen zu dem Berge Viso gelangt, ferner, als Meer-alpen, die herabherige hauptsächlich südliche Richtung in eine östliche verwandelt, sich fortsetzt, und nach Absendung mehrerer Seitenäste zur See, (welche den kleinen Küstenflüssen zur Abscheidung dienen, und in ihrem südlichsten Herabstreichen, von neuem über die Meeresfläche hervortretend die Hyerischen Inseln bilden,) endlich als Apenninen den eigentlichen Uebergang in die Italienische Halbinsel macht. Durch die nördliche Krümmung des Bergzuges in diesem Uebergang wird



des der Meerbusen von Genua gebildet. Die fernere Richtung der Apenninen ist eine südöstliche. Durch sie und die von ihnen ausgehenden Seitenzüge werden die natürlichen Abtheilungen nebst Flußgebieten von Italien bestimmt.

Alles nordöstlich über den Apenninen und dem in den Mont di Gioia östlich auslaufenden Seitenzug liegende Land, (Flußgebiet Po und der ihm parallel laufenden Küstenflüsse,) bildet Ober-Italien. Von hier aus streckt besonders die Italienische Halbinsel Mittel- und Unteritalien sich schräg von der schon vorliegenden Küste in die Länge aus.

Von den Seitenzügen der Apenninen geht besonders ein südwestlicher unterhalb des Meerbusens von Genua unter der Meeresfläche auf die kleine Insel Elba, und von dieser, durch die Insel Capraja, durch, auf die ansehnliche Insel Corsica im Capo Corso, von dieser aber auf die, wie jene, ihren Längenzug südlich machende, noch größere Insel Sardinien, (durch die Bocca di Bonifacio, unterbrochen,) über, wo sie im Capo-Tavolara, in der Richtung nach der Afrikanischen Insel Galita zu, in dem Afrikanischen Vorgebirge Capo Serra ausläuft.

Indem der südlichere Theil der Apenninen in Unteritalien sich theilt, verläuft westlich bis an das Vorgebirge Santa Maria di Leuca streicht, geht aber als Calabresische Apenninen seinen Fortgang nimmt, setzt sich zwischen jenem und dem Zuge der letztern zum Capo della Madonna der ansehnliche Meerbusen von Tarent. Die im Capo Spartivento auslaufenden Calabresischen Apenninen setzen einem östlichen Seitenzug über die Faro de Messina auf die dem Capo di Faro an sich wieder erhebende Insel Sicilien, auf welcher der Höhenzug theils und hauptsächlich westlich zum Capo Boco, (nach dem Capo Bon auf der Afrikanischen Küste,) theils von der Mitte aus südlich in das Capo Passaro ausläuft, so daß Sicilien eine dreifache Abdachung erhält. Der nördlichen breitem Küste streifen die Liparischen Inseln, (wahrscheinlich Afrikanischen Ursprungs,) zur Seite, wogegen die Aegatischen Inseln sich wie eine überstossene Ecke des Insellandes nach Westen zu darstellen. Dem südlichen Höhenzug von Sicilien entsprechen die unweit Capo Passaro sich erhebenden Inseln Gozzo, Comino und Malta. — Von dem Genuessischen Meerbusen und dem Capo Corso bis zu der Meerenge bei Messina wird ein ansehnlicher Theil des mittelländischen Meeres durch die Inseln Corsica und Sardinien, die Afrikanische Küste von Capo Serra bis zum Capo Bon, und die Nordküsten von Sicilien zu einem größern Theils verschlossenen, dem Toscanischen Meere.

Die Flußgebiete der Italienischen Halbinsel können so wenig als die der benachbarten Eilande bedeutenden Umfang haben. Die wichtigsten Flüsse derselben sind auf der Westseite: 1) die Arno, welche nebst mehreren Küstenflüssen in den nördlichen Theil des Toscanischen Meeres fällt; 2) die Tiber, welche südlicher von den Apenninen eben dahin abfließt; 3) der Volturno, welcher, kleiner als die vorigen, mit ihnen einen gleichen Lauf nehmend, seinen Ausfluß in den Golfo von Gaeta hat, der, durch eine Inselkette von

Palmeira bis Capri theilweise verschlossen, hierdurch zugleich mit dem südlichen Golf von Neapel in Verbindung steht, welchen letztern eine vortretende Landecke vom Golf von Salerno scheidet, in den, wie in den noch südlichen Golf von Policaastro, und den von St. Eufemie, so wie von der ganzen Küste, nur kleine Gewässer strömen. — Auf der Südseite ist der Golf von Squillace durch einen nördlich hervorspringenden breiten Landtheil den mehrere Vorgebirge auszeichnen, von dem Meerbusen von Tries geschieden. Auf der Ostseite macht sich der Golf von Manfredonia wegen Hervortretens des nördlich liegenden Monte Gorgano bemerklich. Die Küstenflüsse, die zwischen den aus einander getretenen Rücken der Apenninen südliche Abdachung haben, sind weder in diesem Südtheile, noch auf der Ostküste der Italienischen Halbinsel von Erheblichkeit.

ccc) Flußgebiete zwischen der Italienischen und der Griechischen Halbinsel. Der lange Meerestheil, der auf der Ostküste von Italien sich hinaufzieht, und ostwärts von der in die Griechische Halbinsel auslaufende Landstrecke begrenzt, zu Ende ab zwischen dem in das Vorgebirge Leuca auslaufenden westlichen Arm der Apenninen und dem Vorgebirge Linguetta als Endtheil der Aegercerannischen Gebirge auf der Küste Griechenlands, am meisten beengt ist, ist als Adriatisches Meer bekannt. In dieses ergießt 1) besonders von der Westseite her der Po in mehrern Armen seine Gewässer, der selbst vom Berge Viso auf der Westseite von Oberitalien entspringend, alle von der Süd- und Ostseite der von den Berner Alpen bis zu den Meereralpen fortstreichenden Alpenkette, von der Nordseite der Meereralpen und der Apenninen kommenden Flüsse, mit Ausnahme derer, die auf dem Fortzuge der Apenninen, wo diese mehr südlich streichend, östliche Abdachung bekommen, entspringen und vor ihrem Zusammentritt mit dem Hauptstrom des Thals, und in paralleler Richtung mit dem Po streichend, das Adriatische Meer selbst erreichen. Auch gehört ein Theil des östlichen Alpenzugs von St. Gotthardsberge an, welcher südlich das Rheingebiet begrenzt, die Graubündner Alpen bis zum Julier Berg und von da bis zu den Tyroler Alpen, auf der Nordseite mit zur Begrenzung des Pogegebietes. Die bedeutendsten Seitenflüsse des Po's sind der Tessin, vom St. Gotthardsberg, der den Lago maggiore durchfließt, und die Adde die durch den Comer See fließt, außerdem auch durch den Minicio die Gewässer des Gardasees aufnimmt. — Die übrigen Gewässer der Südseite des östlichen Alpenzugs führen dem Adriatischen Meere, 2) die Etsch, (Abige,) von den Tyroler Alpen mit dem Po am Ausfluß sich vereinigend, 3) die Brenta von einer noch südlichen Theil der Tyroler Alpen, 4) die Piave und 5) der Tagliamento von den Julischen Alpen zu. — Oberhalb des Poausflusses bildet das Adriatische Meer, durch eine Reihe niedrig Inseln verschlossen, den Meerbusen (Lagunen,) von Venedig<sup>72</sup> und jenseit des Ausflusses des Tagliamento neben den Lagunen von Marana, den Meerbusen von Triest, der insb

72) Gewöhnlicher führt auch das Adriatische Meer selbst den Namen Meerbusen von Venedig.



Meere von einem von den Julier Alpen südlich, als eine Halbinsel südwärts steigenden, als Istrien bekannten Höhenzug südlich ausläuft, von welcher Halbinsel an dann auf der Ostseite des Adriatischen Meeres, von dem Meerbusen von Triume an, eine mächtige Inselreihe, die Illyrischen Inseln, als durchbrochene oder überflossene Vorgebirge der kurz hinter ihnen hier streichenden Gebirgskette, also der Landküste parallel fortlaufen. Diese Küste hat um deswillen auch wenige und kurze Küstenströme, dagegen viele Buchten, worunter die Bucht von Cataro, womit jene Inselreihe ihr Ende hat. Südlich von dieser Bucht ergießt sich die Bozina, der Drino, (dieser in einen Meerbusen gleichen Namens,) in mehre Küstenflüssen.

§ 444 Die Griechische Halbinsel mit ihren Flußgebieten. Die Landhöhe, von welcher die Griechische Halbinsel ein ausstehender Theil ist, geht von dem Europäischen Landrücken auf dem Rücken der Alpen ab, wo vom St. Gotthardsberg aus die Graubündner, (Rhätischen,) Alpen bis an den Julier Berg streichen. Hier zieht sich der südöstliche Arm dieser Alpen um die Quelle des Innus herum, zu dem Wormser Loch, und erhält von hier den Namen Tyroler, (Morische,) Alpen, unter denen sich die Dröschspitze, der große Ferner, der Brenner auszeichnen; der Höhenzug geht südöstlich über den Romunda- und Kreuzberg bis zum Terglou, wo die Krainer, (Julier,) Alpen anheben; über den Birnbaumer Wald ziehen diese sich südlich bis zu den Albanischen Alpen herab, welche als Morlachengebirge an der Küste des Adriatischen Meeres in der Richtung der Illyrischen Inseln fortstreichen, (unterhalb welcher ein mächtiger Seitenbergzug, der Montenegro, bis ans Adriatische Meer fortstreicht,) dann aber über den kleinen Dribaberg eine östliche Richtung nehmen, und hierauf als Sardische Berge, (Hämus, Balkar,) fortstreichen, das, mit gleichmäßiger Richtung fortgehend, in die Spitze von Albanien im schwarzen Meere auslaufen. Wenn wir aber den Höhenzug verfolgen, der von diesen letztern südwärts ab das Gebiet des Flusses Mariza ostwärts begrenzt, über das Gebirge Tekiri geht und sich an der Westseite des Hellesponts endigt; so bekommen wir damit eine Begrenzung auf östlicher Seite, von welcher aus bis zum kleinen Dribaberg westlich und von hier aus durch den Höhenzug südlich über den großen Dribaberg, den Berg Argenteo bis zum Berg Tomeriz, (von wo westwärts zu die Acroceraunischen Gebirge mit dem Vorgebirge Linguetta dem Adriatischen Meere ostwärts zur Grenze dienen,) der Landtheil abgeklüffelt wird, der für die gegenwärtige Betrachtung als Griechische Halbinsel insbesondere ins Auge gefaßt ist.

In ihm unterscheidet sich wieder der westliche Theil durch seine östliche Richtung und westliche und östliche Abdachung, von dem in Albanien das von dem kleinen Dribaberg bis zu dem Berge Tomeriz liegenden Theile, (Macedonien und einen Theil von Romanien,) mit südlicher Abdachung. Jener östliche Theil bildet sich von da, wo der Höhenzug vom Berg Tomeriz westlich in die Acroceraunischen Gebirge, zugleich aber auch östlich in den La-

Berg, (Olympus,) ausläuft, durch einen fernern südlichen mittlern Höhenzug, der in gekrümmtem Lauf über die Berge Lukura, (Parnass,) Sagarra, (Helicon,) Elatias, (Cythereon,) bis zu dem Corinthischen, (Peloponnesischen,) Isthmus sich fortstreckt, wo er in der Halbinsel Morea, (Peloponnesus,) in dem Vorgebirge Matapan die südlichste Landspitze des Festlandes von Europa bildet, obgleich von dem östlicher liegenden Vorgebirge Malio, unter dem Meere weg, ein in der Inseln Cerigio, Cerigetto, vorzüglich aber Candia, (und hier über den Berg Ida,) in südöstlicher Richtung hervortretender Höhenzug noch südlicher sich hinabzieht, wo das Cap Matapan die südlichste Spitze von ganz Europa darstellt. Der westliche Theil zeichnet sich besonders durch seine parallel südlich laufenden Seitenhöhenzüge aus, unter denen der längste durch die Macedonische Halbinsel hindurch sich in den Vorgebirgen Pailluri, Drepano und Monte Santo, (Berg Athos,) endet.

Der zwischen der Ostküste des östlichen, der Südküste des westlichen Theils der Griechischen Insel, und der Ostküste von Anatolien besetzte Meerestheil wird als Aegeisches Meer, oder in Bezug auf die vielen Inseln, welche er in sich schließt, als Archipelagus unterschieden. Südwärts ist er von der Insel Candia mit der westlichen nach der Halbinsel Morea, östlich nach Natolien hinstreichenden Inselreihe, (worunter Carpantho, Rhodus,) größtentheils verschlossen, nordostwärts steht es durch die Meerenge von Gallipoli mit demjenigen östlichen Theil des großen Mittelländischen Meeres in Verbindung, von dem späterhin die Rede seyn wird.

Unter den der Griechischen Halbinsel nahe liegenden Inseln und den Meeressbussen derselben verdienen besonders folgende Bemerkung auf der Westseite des östlichen Theils derselben die Ionischen Inseln, (Corfu, Santa Maura, Cephalonien, Zante,) mit dem zwischen beiden letztern bis auf den Isthmus auf der Nordseite von Morea einschneidenden Meerbusen von Lepanto; auf Morea die Meerbusen von Arcadia, von Coron, von Maratoni, von Napoli, von Engia, mit den hier befindlichen Inseln Coluri, (Salamis,) und Engia, (Aegina;) auf der Ostseite des östlichen Theils die langgestreckte Insel Negropont, (Euboea,) ehemals Euböa,) durch die Meerenge Euripus, und die von ihr nördlich und südlich ausgehenden Meeressbussen von Talanta und von Negropont von dem festen Lande geschieden, in deren Höhenzüge zugleich die größern der südlichen, im Aegeischen Meere liegenden Inseln, (Cycladen,) Andros, Tine, (Tenos,) Mycene, Naxia, (Naxos,) Amargo, Stampalia, sich nach der Insel Rhodus und zugleich der Küste von Natolien wenden, indem die äußersten westlichen dieser Inseln, Zea, (Ceos,) Therminia, (Cythrus,) Serpho, (Seriphus,) Siphanto, (Siphnus,) Milo, (Melos,) Santorin, (Callista,) der Richtung des Seitenhöhenzugs vom Berge Elathias an, über den Berg Hymethus weg in das Vorgebirge Colonna zwischen dem Eugaischen und Negropontischen Meerbusen entsprechen. Nördlich von Negropont ist der Meerbusen von Salonichi auf der Westseite der Macedonischen Halbinsel durch eine Inselreihe, (Sciatho, Scopolo, Chila-



ma, Seraguin, Scaggero und südlicher Sciro,) ver-  
auf der Ostseite derselben liegt dem Meerbusen von Con-  
sta, (worin die Insel Thassus,) die Insel Stalimene nebst  
vorrern vor.

Die Flüsse dieses Theils haben sämmtlich nur historische Merkwür-  
keit; der einzige bedeutendere ist die vom Hämus südlich ins Aegei-  
sche Meer fallende Moriza, (Hebrus.)

Flußgebiete mit Abdachung in den als schwarzes  
Meer unterschiedenen östlichen Theil des Mittelländischen Meeres.  
Das schwarze Meer ist ein fast gänzlich eingeschlossenes  
Abdmeer, und bloß durch die flußartige Meerenge von Gal-  
coli, (den Hellespont,) mit dem Mittelländischen Meere, und  
zunächst mit dem Aegeischen Meere in Verbindung. Aber nicht  
hier, sondern auch noch etwas nordöstlicher, tritt ein Seiten-  
einzug vom Hämus herab, nicht weit davon das Kara Burnu,  
(schwarzes Vorgebirge,) bildend, mit dem entgegengesetzten Anatolien  
einer längern Strecke so nahe zusammen, daß auch hier eine strom-  
artige Meerenge, Meerenge von Constantinopel, (Thracischer  
Sporus,) entsteht. Diese und der Hellespont schließen also ein  
Abdmeer des schwarzen Meeres, das Meer Marmora, (worin  
die Insel Marmora die bedeutendste ist,) ein:

Außer mehreren Küstenflüssen wird das schwarze Meer besonders  
durch folgende zum Theil ansehnliche Flüsse gefüllt, und erhält da-  
durch auch in den gedachten Meerengen eine bemerkbare Strömung:  
die östlich strömende Donau, die vom Schwarzwald, (hier  
das Flußgebiet des Rheins zur Seite begrenzend,) entspringt, erst in  
einem mäßigen Stromgebiete, dann in einem so ansehnlichen, zwischen  
den Stromgebieten des Rheins, des Po's, der Küstenflüsse des Adria-  
tischen und Aegeischen Meeres auf der Südseite, und denen der Elbe,  
der Oder, der Weichsel und des Dniesters auf der Nordseite, meist  
in südöstlicher Richtung ihren Lauf nimmt, daß sie an Mächtig-  
keit und Umfang alle übrigen Flüsse des westlichen Europa bei weitem  
übertrifft, indem in ihrem Anfangs südöstlichen Lauf ihr süd-  
lich die Iller und der Lech, nördlich die Altmühl, die Naab und  
die Regen, südlich die Isar, dann der ihr hier an Größe nicht  
nachstehende Inn mit der Salza, ingleichen die Enz, nördlich die  
Saar, südlich die Maab, nördlich die Waag, in ihrer nun süd-  
lichen Richtung westlich die zwei ansehnlichen Flüsse die Drau mit  
dem Mur und die Sau, mit der Unna, der Bosna, der Dris-  
ava, ferner in südöstlicher Richtung nördlich die ansehnliche Theis  
mit dem Hernath, Körös, Marosch und Temesch, südlich  
die Morawa, in ihrer nun östlichen Richtung, nördlich der Alt und  
endlich noch in ihrem nordöstlichen Lauf nördlich der Sirith und  
der Ruth zufließen, worauf sie in mehreren Ausflüssen, nebst zahl-  
reichen ihr parallelen Küstenflüssen, südlich von der Spitze Eminah an  
und nördlich bis zum folgenden Flußgebiet, sich ergießt. Unter meh-  
reren Landseen, die zu ihrem Gebiet gehören, verdient der Neusied-  
ler See, und besonders der Plattensee, (in Ungarn,) Bemerkung.  
Der südöstlich strömende Dniester, von den Carpathen, dessen  
Flußgebiet, als ein zwischen dem vorigen und den folgenden einge-

schobenes, und nordwärts von dem Weichselgebiet begrenztes erscheint 3) Der südlich strömende Dnieper, (Borystheneß,) dessen Quelle in dem Wolchonskischen Walde nicht weit von der Wolgaquelle ist, dessen Gebiet dem der Donau nicht nachsteht, und von dem des Dniepers, der Weichsel, der Memel, der Duna, der Wolga und des Don's begrenzt wird, dessen bedeutendsten Nebenflüsse die Berëzyna und der Pripecz östlich, die Desna westlich, und der in seine Mündung in dem daselbst gebildeten Meerbusen erst ihm westlich zu strömende Bog sind. 4) Der südwestlich strömende Don, (Tanais) von nicht minder erheblichem, größtentheils von dem des Dnieper und der Wolga besetzten Stromgebiet, der in einer erst südöstlichen Strömung sich besonders durch den Choper und die Medwediga verstärkt, in seiner Umkrümmung von Südosten nach Südwesten bloß durch einen schmalen Landstrich von der Wolga geschieden ist, (auf dem sich die östliche natürliche Grenze von Europa herabzieht, wenn man das Wolgagebiet mit zu Asien ziehen will,) in seiner südwestlichen Richtung noch besonders den Donez aufnimmt, und bei seinem Ausflusse das Asowische, (Mäotische,) Meer bildet, welches westwärts besonders durch die durch einen schmalen Isthmus, (auf dessen westlicher Seite der Meerbusen von Negropoli,) mit dem festen Lande verbundene Halbinsel Taurien, (Krimm, Chersonesus,) in welche die Landeshöhe zwischen dem Dnieper und dem Don ausläuft, geschlossen wird, mehrere Küstenflüsse aufnimmt und bloß durch die Meerenge bei Caffa, (den Cimmerischen Bosporus,) mit dem schwarzen Meere verbunden ist. 5) Der westlich vom Elborus des Caucasischen Gebirges herabströmende Kuban, der theils ins Asowsche, theils unmittelbar ins schwarze Meer fällt; und in seinen Ausflüssen die Inseln Taman und Kopsis besetzt.

fff) Flußgebiete von Asatolien. Dieses Land ist, (als Klein Asien,) nach der gewöhnlichen Ansicht von Europa ausgeschlossen, dem es aber mit zufällt, wenn man den nördlich vom Ural zwischen dem Don und der Wolga zum Caucasus herablaufenden Höhenzug in seinem fernern Verlaufe bis zur Landenge Suez zur Abgrenzung nimmt. Es wird seiner Hauptform nach gebildet, indem die als Taurus (südlich,) und Antitaurus, (nördlich,) bekannten Hochgebirge in einem Seitenzug sich westlich vorstrecken. Es unterscheidet sich durch diese westliche Richtung wesentlich von den bisher gedachten vom Europäischen Landrücken nach dem Mittelländischen Meere sich ausstreckenden Ländermassen, (Italien und Griechenland,) deren Richtung eine südliche ist. Seine Flußgebiete sind um so kleiner, als in der Mitte des Landes theilweise Steppenflüsse und Landseen, (wor-

73) Hiernach bleibt das Wolgagebiet von Europa ausgeschlossen, das aber die Natur wegen der Versenkung der Scheidlinie so innig mit dem angrenzenden Gebiete verschmolzen hat, daß es gezwungen erscheint, hier die natürliche Grenze von Europa zu sehen. Angemessener wird daher, da es überhaupt keine völlig natürliche Abgrenzung von Europa und Asien nach einem einfachen Princip gibt, die Höhenzug des Caucasus im Süden des Flußgebietes des Kuban und des in das Caspische Meer fließenden Teret, sodann die nordwestliche Küste des Caspischen Meeres und jenseit des Einflusses der Wolga in dieses der in das Caspische Meer verlaufende Höhenzug des Uralgebirges, dieselbe des Uralsees, als natürliche Grenze von Europa betrachtet, wornach das Wolgagebiet, größer als eines der Europäischen Flüsse, diesem Welttheile noch zuzählt.



er der Tattasee,) sich bilden. Doch ist die nördliche Abdachung dem schwarzen Meere, (wohin die Flüsse Rissil = Trmak, (Rissil,) in den Meerbusen von Samsum und Sakati, (Samsus,) strömen,) bedeutender, als die der Süd- und Westseite, welcher letztern der Serabat, (Hermus,) und der Meinder, (Meinder,) sich ergießen. Besondere Bemerkung verdienen aber auf der Westküste die vom Gebirge Ida, (einem Seitenzug unterhalb der Meerenge von Gallipoli,) sich herabziehenden, und mit dem Archipelagus des Aegeischen Meeres sich vereinigenden Inseln Mytilene, (Mytilos,) Scio, (Chio,) Nicaria, (Icaria,) und Samos, (Samos,) (Eos,) Patino, (Patmos,) Rhodis, (Rhodus.) In den zahlreichen Landbuchten hinter dieser Inselreihe zeichnen sich die Meeressbusen von Smyrna, von Skalanova, von Tori, aus, so wie auf der Südseite von Natolien die Meerbusen von Satalia und Ajazzo, (Iffischer Meerbusen,) wo vom Taurus auslaufende Gebirge Almadagh, (Ammanus,) Halbinsel von Syrien abgrenzt, dessen Küste westliche Richtung hat. Ein Seitenzug des gedachten Höhenzugs kommt jenseit des Meerbusens in der ansehnlichen Insel Cypern wieder zum Vorschein.

ggg) Flußgebiete zwischen Natolien und der Landenge von Suez. Der in dem Höhenzug vom Gebirge Taurus nach der Landenge Suez besagte Libanon streicht so nahe an der ganzen Ostküste des südlichen Theils des Mitteländischen Meeres vorbei, daß nur ganz kleine Küstenflüsse dadurch sich bilden, worunter der Orontes, (Aasi,) bloß weil er meist der Küste parallel streicht, noch ausgezeichnet. Südlicher theilt sich der Libanon in zwei Theile, (Libanon und Antilibanon,) von wo aus sich das Land parallel mit der Küste, muldenartig bildet, in welchem Strich der Jordan mit dem See Genezareth in das todte Meer ausfließt, jenseit dessen das Hochland, die Wüste Syriens, sich erstreckt, welches in den Isthmus verläuft und auf diesem nach Afrika übergeht.

bb) Flußgebiete von Nordafrika nach dem Mitteländischen Meer hin. Der Haupthöhenzug von Afrika, von der Landenge von Suez an bis zum Vorgebirge der guten Hoffnung, erstreckt sich auf ein reichliches Drittheil seiner Länge in südwestlicher Richtung unweit der Meeresküste fort, ohne westlich einen Hauptseitenzug abzugeben. Erst in der Nähe des Aequators zieht sich das Hochland nicht nur südwestlich, sondern zugleich auch ein Seitenzug in einer verbreiteteren Strecke als irgend ein Seitenzug auf der ganzen Oberfläche, ohne Unterbrechung, (über 60 Längengrade,) westwärts aus, hier zwar auch große Gebirgsketten bildend, mehrentheils aber in weite Sandwüsten nach allen Richtungen auslaufend, die nur in einzelnen Gegenden, wo das Land Abdachung hat, vegetabilisches und animalisches Leben verstatten; die daher auch in größeren Strecken, irgendwo dem Menschen, zumal dem gegen den feindseligen Widerstand, den hier die Natur im Bunde mit den rohen Landesbewohnern der noch culturfähigen Gegenden leistet, immer noch nicht genug bewaffneten Europäischen Fremdling, unzugänglich sind. Mit

der Naturbeschaffenheit des innern Afrika's ist also auch der Seitenhöhenzug, östlich vom Lande Abdel an bis zum Grünen Vorgebirge als dem vorgerücktesten Punct der Westküste dieses Welttheils, bei weitem zum größten Theil unbekannt. Wir wissen zwar, daß er von den Sandsteppen des Landes Abdel aus nach den Mondbergen hin seine Richtung nimmt, nicht aber, ob er die ganze Länge des Gebirge Kong verfolgt, oder zwischen den Mondbergen und diesen nördlich streicht, und erst westlicher zu dem östlichen Theil dieses großen Gebirges sich wendet, und dann zwischen den Flüssen Senegal und Gambia ausläuft. Es kommt nämlich darauf an, ob der große Strom Niger, welcher in Mittelafrika von Westen nach Osten fließt, wirklich ein Steppenfluß ist, im Sande oder in einem See sich endigt, wie man bisher gewöhnlich annahm, oder ob er nicht einen südlichen Ausfluß hat, wofür wenigstens Gründe der Wahrscheinlichkeit aufgestellt werden können. Im letztern Fall zieht sich die Hauptseitenhöhe von den Mondgebirgen zwischen den Quellen des zum Nil fließenden weißen Stroms und des in den See Fittre, (welcher wahrscheinlich zu dem Stromgebiete des Nigers gehört,) fließenden Misselads nördlich herauf, wo alsdann noch im Süden der Lybischen Wüste und der Wüste Sahara ein Höhenzug nach Westen verfolgt werden kann, oder auch, da diese Wüsten Kesselland, und, wiewohl sparsam, mit Steppenflüssen durchzogen sind, noch weiter nördlich herauf bis zu den Gebirgen zwischen der Wüste Barca und der Lybischen Wüste, und von da im nördlichen Theil Afrika's westlich bis zu dem Ammer- und Lomatgebirge, und von da zum großen Atlasgebirge verfolgt werden kann, von dem sie dann südlich, in Westen der großen Wüste, bis zur Quelle des Senegal auf das Konggebirge übergeht.

Für die Abdachung Afrika's zum Mittelländischen Meere ist der zuletzt bemerkte Zug bis zum Gebirge Atlas festzuhalten, von welcher aus aber wieder ein Seitenzug als kleines Atlasgebirge sich nördlich zur Meerenge von Gibraltar zieht und in das Cap Spart und die Spitze bei Ceuta ausläuft, welche den oben gedachten der Europäischen Küste entsprechen, und hier den großen Kessel des Mittelländischen Meeres fast ganz schließen, dessen nördliche Grenze der Europäische Gebirgsrücken<sup>74</sup>, östlich der Caucasische Höhenzug und südlich der Afrikanische Höhenzug von der Landenge von Suva an bis zum Atlas ist.

Unter den zu diesem Mittelmeer Europa's und Afrika's von letzterem Welttheil aus sich ablenkenden Flußgebieten verdient nun das des Nils, als eines der größten und ansehnlichsten der Ostsees, vorzügliche Bemerkung. Seine südliche Grenze ist der gedachte Seitenzug von dem Lande Abdel an bis zum Mondgebirge. Seine Quellen sind in dem Hochgebirge Abyssiniens, welche selbst von jenem Höhenzug zu den Mondgebirgen hin umfaßt oder eingeschlossen werden, wo er den See Tzana oder Dembeasee durchströmt, sich abend dann, (als blauer Fluß,) um seine eigne Quellen südwestlich herumkrümmt, und hierauf erst nördlich seinen Lauf nimmt, auf dem

74) Vgl. die oben S. 730 befindliche Bemerkung über das westliche Ende des Europäischen Gebirgsrückens.



erbeten größern Hälfte in dem Gebirgsland Abyssinien er beson-  
 durch den weißen Strom, (Neger, Bahal el Abiad,) west-  
 und die Tacazze östlich bedeutende Verstärkung erhält, und da-  
 Mubien, (das bloß längs seines Laufs keine Wüste ist,) durch-  
 , worauf er nach mehrern Wassercfällen in durchbrochnen Ge-  
 das lange Thal Aegypten durchströmt, und hier sich, (im  
 ta, als dem dadurch umfaßten Lande,) in zwei Hauptarme  
 , die auch nur zwei natürliche Ausflüsse, (bei Damiat und  
 ichid,) haben. Außer dem weiter landwärts mit dem Nil in  
 bindung stehenden See Möris verdienen auch die durch die Aus-  
 mungen des Nils gebildeten Seen Mensaleh, Beulos, Bir-  
 Mariuth, Bemerfung.

Die übrigen westwärts vom Nilgebiete auf der als Barbarei be-  
 ten Nordküste Afrika's strömenden Flüsse, (worunter der Schel-  
 der Mulul,) sind von keiner Erheblichkeit, da auch nördlich  
 dem gedachten Seitenhöhenzug, welcher diese Lande von dem zusam-  
 hängenden wüsten Lande des Nordtheils von Afrika diesseit des  
 vers absondert, noch Steppenflüsse ihren Lauf haben. Wichtiger  
 die Buchten dieser Meeresküste, unter ihnen der, (flache,) Meer-  
 en der Araber am See Mariuth, die große Syrte oder  
 terra durch die vortretende Wüste Barka von der in den Meer-  
 der Araber auslaufenden Küste getrennt, der Meerbusen von  
 bbs mit der vorliegenden Insel Zerbi, von wo an die Küste  
 zum Cap Bon nördlich steigt, und etwas westlicher in dem Cap  
 errat, den nördlichsten Punct von Afrika bildet, von wo die Küste  
 nur mäßiger südlicher Senkung, durch mehrere kleinere Buchten  
 gebogen, (worunter die Bai von Algier,) westlich fort, und  
 gt wieder nördlich bis zur Spitze bei Ceuta ausläuft.

§§. Flußgebiete auf der West- und Südseite der Land-  
 e bei Suez und des von selbiger auslaufenden Höhenzugs. Wir ha-  
 bereits des großen Seitenhöhenzugs gedacht, welcher um das Gebiet  
 Nils herum Afrika in seiner größten Breite von Osten nach We-  
 durchschneidet, und über die Mondgebirge und die Gebirge Kong  
 dem Grünen Vorgebirge ausläuft. Die in der Nähe desselben liegen-  
 Capverdischen Inseln, in denen dieser Höhenzug aus dem  
 Meere wieder hervortritt, haben ihre Richtung nach den nördlich im  
 antischen Meere, in der Breite von Portugal, gelegenen Azori-  
 schen Inseln hin, welche wieder sowohl ostwärts nach den  
 britannischen Inseln hin, als westwärts nach der Nordameri-  
 schen Küste zu streichen scheinen, so wie das auf der Nordküste,  
 der Meerenge bei Gibraltar an streichende kleine Atlasgebirge  
 die über das große Atlasgebirge in die Westseite der Wüste Sahara,  
 dann auf dem schwarzen Gebirge in das Cap Bojador verlaufende  
 e der Halbkreis eines Zugs zu seyn scheint, die unter dem Meere  
 gehend in den Canarischen Inseln, der Insel Madeira  
 den benachbarten Eilanden wieder in das Cap Vincent zurückgeht  
 dadurch einen Theil des Atlantischen Meeres, als ein Vormeer  
 Mittelländischen Meeres, abscheidet.

Die Westküste von Afrika selbst aber nimmt von der Straße  
 Gibraltar an bis zum Cap Bojador eine südwestliche, von

da zum weißen Vorgebirge, (unter welcher die Bai und Insel Arguin,) eine etwas mehr südlich sich neigende, von da bis zum grünen Vorgebirge eine fast südliche, von da bis zum Cap Roxo eine südliche, von da bis zum Palmenvorgebirge eine südöstliche, von da zu dem Vorgebirge der drei Spitz und ferner bis zum Cap Formosa, wiewohl durch die Bucht von Banin eingebogen, eine östliche, von da zum Cap Lopez in einer Einbiegung, (die Bucht von Biafra,) eine südöstliche, von da zum Cap Negro eine meist südliche, und von da zum Vorgebirge der guten Hoffnung fortstreichend, eine nur wenig davon östlich gewendete Richtung. Der Theil des Meeres vom Palmenvorgebirge an bis zum Cap Lopez, in dem die Küste des Festlands sich zum größern Theil südlich, zum Theil aber auch westlich senkt, wird auch als der Meerbusen von Guinea bezeichnet. Er bildet, bis zum Cap Negro auslaufend, einen großen Halbkreis, dessen andere, in das Meer fallende Hälfte sich in den abgesondert liegenden Inseln St. Matthäus, St. Ascensin und St. Helena andeutet.

Die ganze, von diesem Küstenzug, dem oben gedachten Hauptseitzuge, dem Nilgebiete und dem von der Meerenge bei Suez zum Vorgebirge der guten Hoffnung herabstreichenden Haupthöhenzuge eingeschlossene große Ländermasse hat nur zum kleinern Theil eine wirklich fortgesetzte Abdachung nach Westen. Der größte Theil nämlich Wüste und von Steppenflüssen durchzogen, die meist in ungeordnetem Lauf, wenn sie nicht zur Regenzeit aufgeschwollen sind, nur auch dann wohl noch im Sande versiegen, oder in stehende Landseen zusammenfließen, unter denen sich besonders der See Maravi auszeichnet, oder auch in die bekannten Küstenflüsse nur einen geringen Theil ihres Wasservorraths abgeben. Die wirklich bekannten Afrikanischen Ströme der Westseite sind folgende: 1) der Senegal zwischen dem weißen und dem grünen Vorgebirge und 2) der Gambia zwischen diesem und dem Cap Roxo, beide vom Gebirge Kong und durch den von diesem aus zum grünen Vorgebirge fortstreichenden Haupthöhenzug getrennt; 3) der Rio grande, südlich vom Gebirge Kong entspringend und unterhalb des Caps Roxo sich ergießend, von dem aus die Bissagotischen Inseln südlich sich vorlegen; 4) der Benin und der Calabar, wovon ersterer in die Bucht von Benin, letzterer in die von Biafra, worin die Guineainseln, (Fernando del Po, Prinzeninsel, St. Thomas, Annabon,) mit einem Nebenarm aber auch auf der Küste zwischen jenem Arm und dem Benin in das Meer fällt, welche beide Ströme höchst wahrscheinlich Arme eines gemeinschaftlich großen Flusses sind, der südwestlich herabströmt, mit dem Niger in Verbindung steht, und also selbst als ein Ausfluß dieses angesehen werden kann; man weiß nämlich, daß der gewöhnlich für einen Steppenfluß geltende Niger in dem Gebirge Kong unweit des Senegal seinen Ursprung nimmt und weit in das mittlere Afrika hinein vor Westen nach Osten fließt; man kennt jetzt seinen Lauf in einer Strecke von 450 geographischen Meilen bis dahin, wo er, sich theilend, das als Waggara unterschiedene Land, welches er regelmäßiger



schwimmt, wie eine Insel umfließt; ein an dem östlichsten Wiedersammentritt dieser Arme sich bildender See, (bei Semegon = hat wahrscheinlich mit dem See Fittre, in den sich südlich Misselad, nördlich der Gazellenfluß ergießen, Verbindung, von einem zweiten See, (bei Kegebil,) im Zuge des südlichen Arms des Nigers, geht wahrscheinlich ein Ausfluß in südöstlicher Richtung, wodurch wohl besonders das Wasser des Nigers nach der Jahreszeit abgeführt werden mag, und woher dann der Benin und Malabar ihren, ohne diese Annahme räthselhaften Wasserreichtum erhalten <sup>74</sup>; 5) die Zaire, zwischen dem Cap Lopez und dem Cap Bo, deren Ursprung bis in den See Chilande verfolgt werden kann; 6) nach mehreren nördlichen Küstenflüssen auf der westlichen Seite des Kafferlandes der Dragefluß mit zwar bekanntem Ursprunge auf der Ostseite des Caplandes, aber noch unbekanntem Verlaufe; 7) südlicher von dem in das Cap anlaufenden Gebirge der Elephantenfluß.

4) Südliche Abdachung der Ostseite. Diese befaßt die Höhenzug südwärts liegende Ländermasse, welcher vom Vorgebirge der guten Hoffnung bis zur Südseite des Caspischen Meeres, und da aber bis zum Mustag verfolgt werden kann, und der dann wieder die große Mongolei theilweise südlich begrenzend, südwärts in die Halbinsel Malacca ausläuft, von da durch die Inseln Sumatra, Java u. s. w. auf Neuhoolland überseht, und dessen endliche Spur im Wan-Diemenslande verliert.

Der von diesem ganzen Zug befaßte ansehnliche Meerestheil, nach dem hin, also die von jenem in einem nach Norden gewölbten Bogen begrenzte Ländermasse seine Abdachung hat, wird als der Indische Ocean, (besonders jedoch in seinem nördlichen Theile,) unterschieden. Er erscheint als ein großer Meeressbusen, dessen Endpunkte die afrikanische Südspitze und das Ende von Wan-Diemensland und Neuhoolland bilden, der also von etwa  $37\frac{1}{2}^{\circ}$  bis  $163^{\circ}$  Länge und  $10^{\circ}$  und  $44^{\circ}$  südlicher Breite bis  $30^{\circ}$  nördlicher Breite sich erstreckt. Für diese Abtheilung bildet die Landenge Suez wieder eine natürliche Scheide, nämlich für den derselben westlich, und den derselben östlich liegenden Theil, wovon jener Afrika, dieser Asien zu-

gehört. Westtheil von Afrika mit seinen Flußgebieten. Der Höhenzug von der Landenge bei Suez erst, (bis zum Lande Socotra,) in südöstlicher, von da an aber in südwestlicher Richtung, immer aber nahe an der Meeresküste, herabstreicht; so bildet sich, wo die Richtung in die zweite übergeht, ein vorspringender Winkel, das Cap Guardafui, (die östlichste Spitze von Afrika,) mit der davor liegenden Insel Socotra. Von hier an nach der Landenge zu ist die Richtung der Küste nur auf kurzen Strecken eine nördliche. Wie weit aber die Küste von der Landenge von Suez herab südwestlich streicht, begrenzt sie südwestlich einen Meerestheil, der vom Indischen Ozean abgetrennt ist. Wahrscheinlich ist auf der westlichen Seite des Mondgebirges eben so eine natürliche afrikanische Landhöhe, wie der Mustag in Asien, von der aus Höhenzüge, eben so wie dort nach vier sich kreuzenden Richtungen auslaufen, nur daß hier die südwestliche mit der südöstlichen durch Umbiegung in dem Vorgebirge der guten Hoffnung sich vereinigt, wodurch Afrika seine trianguläre Form erhält.

Indischen Ocean aus sich lang und schmal, (zugleich aber auch meist flach,) zwischen Afrika und Asien nordwestlich hineinzieht. Man kennt diesen als das röthliche Meer, oder den Arabischen Meerbusen; die ihn mit dem Ocean in Verbindung bringende Meerenge aber unter dem Namen Bab el Mandeb, (Thranenpforte.) Dieses zwischen Inseln reichende rothe Meer hat nördlich zwei lang fortgehende Buchten, eine östliche kürzere, (Bahrel Akaba,) und eine westliche längere bis zur Landenge bei Suez hinaufreichende, (Bahrel Kōsum.) Zwischen beiden zieht sich von der Afrika und Asien verbindenden Landhöhe ein Bergzug herab, dessen Höhen seit der ältesten Zeit als die Berge Horeb und der Sinai bekannt sind.

Von den auf der vom Cap Guardafui aus südwestlich streichenden Afrikanischen Küste sich bildenden Vorgebirgen zeichnen sich das Cap Delgado und das Cap Corrientes aus. Der Landküste von dem zum andern parallel streicht die große Insel Madagascar, deren Höhenzug als ein Vorgebirge des großen Afrikanischen Gebirgsrückens erscheint, welches besonders zwischen dem See Maravi und der Mersebküste als das Gebirge Lupata sich auszeichnet. Der ziemlich breite Meerestheil zwischen dem Festlande von Afrika und Madagascar wird als Canal von Mozambique bezeichnet. — In der Richtung des Längenzugs von Madagascar erscheinen nördlicher die Inseln Amirantes nebst den Sechellesinseln; zwischen ihr und dem Festlande, nordwestwärts die Comoroinseln, so wie in der nördlich vom Cap Delgado sich bildenden Bucht, (Küste von Zanguebar,) die Inseln Moufra, Zanzibar, Pemba ostwärts von Madagascar aber vorzüglich die Mascarenischen Inseln, (Reunion und Île de France.)

Von den nur kurzen Küstenflüssen der Westküste von Afrika bedienen höchstens nur der Cuama oder Zambeze in den Canal von Mozambique einmündend, und südlicher der heilige Geistesfluß, mit der unterhalb des Vorgebirges Corrientes sich bildende Lagoabai, Bemerkung.

β) Südwestheil von Asien mit seinen Flußgebieten. Diese Hälfte ist zusammengesetzter als die vorige, und erfordert neue Abtheilungen. Diese bilden auf natürliche Weise zwei ansehnlich nordwärts aufsteigende Meeressbuchten des Indischen Oceans: die eine westlichere, erst als Arabisches Meer, dann aber mit mehr westwärts gewendeter Richtung, als Persischer Meerbusen ein mittelländisches Meer darstellend; die andere östlichere unter dem Namen Meerbusen von Bengalen bekannt. Hierdurch bilden sich drei Landtheile in Form von Halbinseln, mit zwei Mittellanden zwischen sich. Gene drei Halbinseln sind Arabien, die westliche Ostindische Halbinsel, (diesseit des Ganges,) und von der östlichen Ostindischen Halbinsel, (jenseit des Ganges,) der in die Halbinsel Malacca auslaufende Höhenzug mit den in der Richtung desselben fortlaufenden Insulaländern.

aa) Halbinsel Arabien mit ihren Flußgebieten. Sie wendet ihre nordwestliche Küste dem rothen Meere, (Arabischen Meerbusen,) ihre südöstliche dem Arabischen Meere, ihre nordöstliche dem Persischen Meerbusen zu. An jeder dieser Küsten zieht sich eine Berg-



(hin, die, wodurch das Mittelland als Landsteppe umfaßt wird, daher den Küstenflüssen dieses Landes nur etwa der Aftan, in den Persischen Meerbusen fallend, einen Lauf von der Mitte des Landes aus hat. — Der Persische Meerbusen, (Blaues Meer,) deckt sich nicht die ganze Nordostküste des Landes hinab, sondern setzt sich an dem vorspringenden Vorgebirge Mussendom, wo sich hier eine Meerenge, (Straße von Ormus,) bildet, oder aus das Arabische Meer noch sich als ein tiefer Meerbusen stellt, der erst bei dem Vorgebirge al Hat endigt, von wo aus die südöstliche Küste erst anhebt. Im Norden des Landes geht die Arabische Wüste in die Syrische über, und fügt sich dem Höhenzuge von Asien und Afrika an. Dadurch aber, daß es sowohl östlich an der Straße von Ormus sich dem südlichen Gebirgs- und Höhenzuge Persiens vom Caspischen Meere herab, bis nur auf eine kleine Unterbrechung nähert, als auch westlich an der Straße Bab Mandeb, hier über die Perim und Bruderinseln weg, in den zwischen dem Nil und dem rothen Meer fortlaufenden Haupthöhenzug sich einfügt, werden die südlichen Arabischen bedeutenden Gebirge in einen Hauptseitenzug aufgenommen, der das Hochland Persiens, vom Mustag aus, mit den Afrikanischen Gegenden oberhalb der Nilquellen auf einem kürzeren Wege in Verbindung setzt, als der gewöhnliche Haupthöhenzug über die Erdenge von Suez, und in Hinsicht dessen vorzüglich das rothe Meer sowohl, als der Persische Meerbusen als geschlossene mittelländische Meere erscheinen.

b) Flußgebiete des Asiatischen Mittellandes zwischen Arabischen und der westlichen Ostindischen Halbkugel. Sie haben nördlich in den Flußgebieten der zu dem Caspischen Meere und dem Uralsee fließenden Gewässer, einzelnen Steppengebieten und Seen in den Persischen Sandwüsten, (worunter der wichtigste mit dem Steppensee Zarch,) und dem Höhenzug des Mustags nach Osten ihre Begrenzung. Unter ihnen zeichnen sich folgende aus; 1) der Phrat, (Euphrat,) und 2) der Tigris, (Dulchar,) zwei mächtige Ströme, die von der nördlichsten Ausbiegung des Haupthöhenzugs von Westasien entspringen, ersterer nämlich von der Ostseite Kleinasienens, von dem Höhenzug des Gebirges Ararat, über die Vorgebirge Mingkol nach dem Antitaurus, worauf er das Gebirge Taurus östlich umfließt, dann von der Syrischen und besonders der Arabischen Wüste westlich begrenzt wird, und kurz vor seinem Ausflusse, (unter dem Namen Schat al Arab, Arabischer Fuß,) mit dem Tigris vereinigt wird, der nur wenig südlicher wie jener, unter dem Namen Wansee seinen Ursprung, und östlicher seinen Lauf nimmt, worin der vereinte Strom, nachdem noch der von Nordosten ihm zufließende Karun, (Gyndes,) sich ihm beigefügt hat, in mehreren Verbindungen sich in das nördliche Ende des Persischen Meerbusens ergießt; 3) der Indus, (Sind,) der von einer Menge kleiner Ströme, theils vom Mustag, wo der Hauptgebirgszug theils westlich über die Vorgebirge nach Persien, theils östlich von dem Caschemir begrenzt wird, (mit seiner eigentlichen Quelle aus dem Gebirge Windhyn,) also dem höchsten Lande Asiens seinen Lauf hat, östlich noch besonders durch den Schunab, (Gyndes)

pes,) und Setlege, (Hystasis,) verstärkt wird, westlich in seine Gebiete, von denen mehrerer Steppen- und Küstenflüsse geschieden ist, und als ein mächtiger Strom in einer Menge von Ausflüssen in das Arabische Meer ergießt.

cc) Die westliche Indische Halbinsel mit ihren Flußgebieten. Von dem großen südöstlichen Gebirgszuge von Muslag herab über den Himali, (dem Anfang des Imaus der Alten, dem Scheidegebirge Indiens und Scythlens,) läuft ein Setenhöhenzug schlängelnd nach Süden herab, den man nördlich Sewalik, südlich die Gatischen Gebirge nennt. Dieser bildet mit parallelen Seitenzügen, die Grundlage der westlichen Indischen Halbinsel, indem er mehr auf der Westseite, der Küste Malabar (Bergland,) herabstreicht, und also die Hauptabdachung nach der östlichen Seite, Küste Coromandel, (Hirseland,) gibt, zuletzt aber in dem Cap Comorin sich endet. Diesem östlich liegt die ansehnliche, (durch die Palbo-Straße geschiedene,) Insel Ceylon westlich aber und etwas nördlich, der als Lacedivische Inseln von diesen aber weit südwärts streichend, der große, auf 12,00 Inseln und Klippen geschätzte, als Maldivische Inseln bekannte Archipelagus, von dem aus sich ein noch unter der Meeresfläche fortstreichender Höhenzug durch einzelne hervortretende Inseln, in südwestlicher Richtung den von der Insel Madagascar ausgehenden entgegengehend, andeutet.

Die nicht unansehnlichen Flüsse dieser Halbinsel und des Hochlandes über demselben sind nördlich von den Flußgebieten des Indus und Ganges begrenzt. Außer zahlreichen kleinern Flüssen entströmen ihr: 1) in westlicher Abdachung der Paddar, im Meerbusen von Guzerat sich mit den Gewässern des Indus verbindend; 2) der Narbeda, in den Meerbusen von Cambaya mündend, welcher das Land Guzerat als eine Art von Halbinsel von voriger trennt; 3) — 5) in östlicher Abdachung der Tail, der Godaver und der Kistna.

dd) Flußgebiete des Asiatischen Mittellandes zwischen der westlichen Indischen Halbinsel und der Halbinsel Malacca. In dieser Unterscheidung ist der größere Theil der östlichen Indischen Halbinsel mit darunter begriffen, indem bloß der Höhenzug, der in die Insel Malacca ausläuft, östlich die Grenze bildet. Die Abdachung dieses Länderstrichs ist in den bereits bemerkten Meerbusen von Bengalen. Die Hauptströme in demselben sind der mächtige Ganges nebst seinem nicht minder ansehnlichen Gefährten Brumaputer, (Bruma's Sohn,) der bei seinem Ausflusse mit dem östlichen Hauptarm des Ganges zusammenfließt. Jener, (der Ganges,) hat seine Quelle nahe bei der des Indus, und erhält durch die Dschumna und Dewa bedeutende Verstärkung; nicht weit von seiner Quelle östlich entspringt aber auch der Brumaputer, bleibt jedoch in seinem, jenem meist parallelen südöstlichen Lauf durch ein Gebirge, welches Tibet südlich begrenzt, vom Ganges geschieden, welches er erst gegen das Ende seines Laufs, (als Schemlag Gebirge,) umfließt, und dann erst in südlicher Richtung gemeinschaftlich mit dem Ganges dem Bengalischen Meerbusen zufließt. — Westlich



Bruamputer ergießen sich die niedern Flüsse Urakan, Uva, von, Trawatti,) und Peju, (Nukion, Thaluau,) in einander östlicher südlicher Richtung, entsprechend den im allgemeinen hier einzigen Höhenzügen, jenseit deren westlich das Vorgebirge Negrais Theil des Bengalischen Meerbusens als den Birmanischen Meerbusen abscheldet, indem die Abdachung östlich von diesem Vorgebirge für den Ausfluß der genannten Flüsse eine südliche wird, nach der Mündung des Bruamputers an eine westliche Abdachung gehabt hatte.

Vom dem Vorgebirge Negrais an erstreckt sich ein Höhenzug unter dem Meere durch eine Inselreihe, (worunter die Inseln Groß- und Klein-Andaman und die Nicobarischen Inseln,) sich ansetzt, fort, der dann in Sumatra wieder sich hebt.

Die Halbinsel Malacca, nebst dem von ihr ausgehenden Höhenzuge der südlichen Insularlande. Die Halbinsel Malacca hebt von einem Bergrücken an, der den Fluß Perak zur Seite, (der selbst westlich von ihm entspringt, südlich vom Birmanischen Meerbusen seine Mündung hat, in der Nähe der Merguierarchipelagus unterschieden wird,) von der Halbinsel zwischen den Flüssen Peju und Menang als das Gebirge Malacca schmal sich herabzieht, und bis zur Wüste Cobi als Bergrücken verfolgt werden kann, auch schon früher als Hauptzug der Ostküste bemerkt worden ist. In der Hälfte ihres Verlaufs ist diese Höhe nichts als ein langer Gebirgsrücken, (Isthmus;) in der zweiten Hälfte aber bekommt sie einige, wiewohl sehr kleine, Nebenflüsse. Ihre Endigung ist das Vorgebirge Romania, (der südliche Punct des Festlandes von Asien.) Ihr zur Seite westlich liegt aber in gleicher Richtung die ansehnliche Insel Sumatra, durch die flache Malacca-Straße von ihr getrennt, welche hauptsächlich aber nach dem Cap Romania hin, und südwestlich von ihm an Inseln reich ist, so daß der Höhenzug unter der Meeresfläche von jener auf Sumatra vorzüglich von diesem Puncte aus verfolgt werden kann.

Es ist aber die Insel Sumatra die erste und längste der unter dem Namen Sundainseln bekannten Eilande, und setzt selbst sich in einen Insularhöhenzug vom Cap Negrais aus fort. Eine Reihe kleiner, ihr südwestlich liegender Inseln bilden einen Parallelzug mit ihr. Die sich von ihr in östlich gekrümmtem Zuge fortsetzen Sundainseln auf der Südseite bilden, wie früher erwähnt, einen durchbrochenen Isthmus. Zwischen Sumatra und der Insel Java bewirkt die Sunda-Straße eine Verbindung mit den Gewässern der andern, (nördöstlichen,) Seite dieser Inselreihe, oder dem Sunda-See; in dem fortgehenden Zuge dieser Inselreihe von der Insel Bali aus, (welche die Meerenge gleiches Namens von Java scheidet,) befindet sich die Insel Timor. Schon von hier aus setzt ein Höhenzug unter der Meeresfläche in Van-Diemenland, dem nördlichsten Punct von Neuhollland, nach Westen zu verfolgt werden, so wie auch von den noch weiter östlich in jener Reihe nach Ostindien streichenden Inseln Hoogland, Timorland u. s. w. wie von allen diesen Inseln nur die westliche oder süd-

liche Abdachung in gegenwärtige Abtheilung fällt, so gehört auch v. Neuholland, welches wegen seiner ansehnlichen, der von Europa fast gleichkommenden Größe, (etwa 161,000 Quadratmeilen,) Festland betrachtet wird, nur die westliche und südliche Abdachung hierher, welche durch das Vorgebirge Chatam südlich von dem wie die ganze Westküste, durch vorliegende kleine Inseln sich auszeichnende, Geographenbai getrennt werden, von dem aus, in Richtung westwärts nach der Südspitze von Afrika, ein in der Meridiane streichender Höhenzug sich durch einzelne zerstreute Inseln andeutet, unter denen, als der südlichste Punct auf der Ostseite, (unter  $50^{\circ}$  der Breite,) Kerguelensland ist. Ungeachtet dieß Land aber wegen der geringen Einschnitte seiner Küsten sehr ansehnliche Flußgebiete besitzen muß; so kennt man diese jedoch so wenig, überhaupt das Innere des Landes erforscht ist. Die Hauptabdachung scheint östlich zu seyn. Als Höhenzug gilt eine von Diemensland um die Flußgebiete der westlichen und östlichen Abdachung herumziehende, und im Cap Wilson oder der Südostspitze des Landes auslaufende ideelle Linie, wo dann die Raffles-Straße von Diemensland, welches früher für einen Theil von Neuholland selbst galt, davon, (eigentlich aber nur von den Fournauriseln, und diese wieder die Banksstraße von Van-Diemensland scheidet, auf dem das Südcap der letzte Punct in dem ganzen Höhenzuge ist.

e), Westliche Abdachung der Ostfeste. Der den darum befaßten Länderteilen landeinwärts zur Grenze dienende Höhenzug geht also von dem Südcap von Van-Diemensland bis auf die Halbinsel Malacca und von da bis zur Wüste Gobi zurück, welche südlich und östlich begrenzt, indem er auf dem die große Mongolei östwärts zu einem geschlossenen Lande machenden Bergzuge bis zu den Tianshangebirge nordwärts steigt, und dann den fernern Gebirgszug bis zur Straße Union verfolgt.

Mit dem Zuge der Landküste dieser Abtheilung wird der eine Theil des westlichen gebildet, dessen zweite Hälfte die Westküste der Ostfeste bis auf den südlich bleibenden offenen Raum darbietet, nach dem die große, nur verhältnißmäßig von wenigen Insularland durchbrochene, als stille See bekannte Abtheilung des Weltmeers fließt.

Die hierhergehörige Ländermasse kann auf folgende Art flüchtig unterschieden werden: die südlichen Insularlande, in so fern sie auf der Ostseite des Höhenzugs zufallen, und die östliche Abdachung haben. Lande des Festlandes von Südasiens, von Mittel- und von Nordasiens.

a) Südöstliche Insularlande der Ostfeste.

aa) Westliche Abdachung von Neuholland. In dieß bemerken wir, (da die übrige östliche und nördliche Abdachung, in dem vorher gedachten Inselhöhenzuge nichts Merkwürdiges darbietet) mehrere besonders unterschiedene Baien, als die Botany-, Banks- und Port-Jacksonsbai, (mit den Mündungen der Flüsse Hawkesbury, Georg- und Cookfluß,) die Dreieinigkeitsbai, in deren Nähe die Mündung des Flusses Endeavour, v.



ch auf der Nordküste des Landes den tief eingehenden Meer-  
 en von Carpentaria. Der diesem ostwärts liegende Land-  
 (Carpentaria,) reicht mit seiner Spitze, Cap Cornwall, noch  
 nördlich als Diemenland, und ist durch die Endeavours-  
 (neue Oststraße,) von der ansehnlichen Insel Neuguini-  
 geschieden; der geringe Raum zwischen beiden Ländern wird  
 zwischenliegende Inseln noch vermindert. — Da die kleinern  
 Inseln auch mit Neuguinea Höhenzüge unterhalten; so kann  
 ein fortgehender Höhenzug von jenen aus über Neuguinea nach  
 Holland verfolgt werden, der vielleicht in noch kleinern Strecken  
 unterbrochen ist, als der oben gedachte.

b) Eigentliche Insellande. Wenn Neuhoiland als ein  
 der Welttheil, aber in Verbindung mit den nahe gelegenen In-  
 als Polynesien unterschieden wird; so sind es besonders  
 Inseln, welche ost- und nordwärts von Neuhoiland liegen, die  
 dann dazu rechnet.

unter diesen sind die unter dem Nahmen Neuseeland bekannt-  
 durch die Cooksstraße, (Charlottenlund,) geschiedenen In-  
 die südlichsten, indem das Südcap derselben noch südlicher,  
 über den  $47^{\circ}$  südlicher Breite,) reicht, als Van-Diemensland.  
 ihnen aus, kann ein Höhenzug über Neucaledonien und  
 nordostwärts liegenden Neuhebriden, nebst den Charlotten-  
 Inseln; nach Neugeorgien, und von da nach Neuguinea unterschie-  
 werden, wodurch diese und die zunächst liegenden Inseln, be-  
 zugs auch die durch Dampiers Straße davon getrennte, als  
 britannien-bekannte Inselgruppe, (in welcher wieder Neu-  
 land durch den Georgs-Canal vom eigentlichen Neubritan-  
 und Neuhanover durch Byrons-Straße von diesem  
 hieden ist,) nebst den Admiraltätsinseln mit der Ostfeste  
 nähere Verbindung kommen.

Von Neuguinea geht eine sehr bestimmt sich unterscheidende In-  
 züge in der Richtung der Küste von Ostasien nördlich, bis zur  
 schatzkassischen Halbinsel hinauf. Was nun aber diesem Zuge öst-  
 aus der stillen See als Inselland hervortritt, steht zu sehr au-  
 Bezug mit dem Festlande, als daß es diesem noch nach einer  
 natürlichen Verbindung zugerechnet werden könnte. Es sind entwe-  
 einzelne Eilande, oder auch Gruppen mehrerer, unter denen auch  
 eine oder die andere sich vor den übrigen bemerklich macht, alle  
 von verhältnißmäßig nur geringem Umfange. So isolirt aber  
 ihre Lage im Ocean erscheint; so sind sie doch im Ganzen der  
 feste näher, als der Westfeste gestellt. Es gehören namentlich  
 in Nordosten von Neuseeland, und in Osten von den Neuhe-  
 den die als Freundschafts- und Schifferinseln bezeichnete  
 Gruppe, in Osten von diesen die Gesellschaftsinseln, (wor-  
 der Tahaiten,) die niedrigen Inseln, und nördlich von  
 die Marquesainseln und andere. Alle diese haben südlich  
 Aequator ihre Lage. In dem nördlichen Theile der stillen See  
 machen sich besonders die Sandwichsinseln, (worunter  
 die,) durch ihre isolirte Lage bemerklich, indem diese der West-  
 von Amerika eben so nahe liegen, als den nächsten Inselgrup-

pen, mit denen sie jedoch wenigstens durch einzelne Inseln, (Bilalobos, St. Pedro und Barbados,) durch die Mulgraveinseln, mit Neugeorgien, durch die Weihnachtsinseln und andere mit den freundschaftlichen Inseln in einiger Verbindung stehen. Die den Mulgraveinseln westwärts liegenden, Carolinischen Inseln, (neue Philippinen,) und Pelaw-Inseln, die nördlichen Marianen-, (Diebs-) Inseln und andere haben etwas mehrern Charakter eines ihnen zu Grunde liegenden Höhenzugs, wovon der erste dem von Neuguinea, letzterer dem der Philippinischen Inseln in etwas entspricht.

Bestimmter sind die Moluckischen Inseln zwischen Neuguinea und Celebes, (von denen wieder ein Seitenzug über die Sunda-Inseln Maghindano zu den Philippinen geht,) und die großen Sundainseln Celebes und Borneo in den Zug aufgenommen, von Borneo über die Insel Banca auf Sumatra, (von ihr durch die Straße Banca geschieden,) und auf die Halbinsel Malacca zurückgeht, und der südlich den Sundasee, nördlich den Celebessee bilden hilft, welche durch die Straße von Macassar verbunden sind.

β) Flußgebiete der östlichen Abdachung von Süd-Sien. Das große Kesselgebirge, welches den östlichen Theil des Mittellandes von Asien, oder die große Mongolei elliptisch einschließt, nimmt von da, wo der Höhenzug südlich in die Halbinsel Malacca ausläuft, statt der vorher östlichen, eine nordöstliche Richtung an, aus welcher es dann nördlich in den großen Höhenzug sich erhebt, welcher vom Asiatischen Ozean aus nach dem Altai hin seinen Fortgang nimmt. Mithin gibt auch die Ostseite dieses, das Asiathe Mittelland verschließenden Gebirgskessels eine sowohl süd- als nordostwärts sich weit erstreckende Abdachung her. Als Südasi mit östlicher Abdachung bleibt daher, außer der Ostseite der Halbinsel Malacca, nur ein verhältnißmäßig kleiner Landstrich übrig, welcher durch einige Höhenzüge gebildet wird, welche mit dem Haupthöhenzug zur Halbinsel parallel, von fast gleichen Punkten ausgehen auf der Ostseite südlich streichen. Von diesen zeichnen sich besonders zwei Gebirgsrücken aus, wovon der westliche das Flußgebiet des Menam, (Menam,) und den Meerbusen von Siam östlich begrenzt, in den jener Fluß sich südlich ergießt, der östliche aber, südlich als Gebirge von Cochinchina, das Gebiet des Cambodjaflusses, (Menamkom, Maikong,) südlich von den Ländern Tonkin und Cochinchina scheidet, von denen Küstenströme westlich in das Chinesische Meer, (vor ihnen die Felseninseln Paracels,) nördwärts aber in den von letztem gebildeten, besonders auch durch die Inseln Hainan geschlossenen Meerbusen von Cochinchina fallen, wohin auch der ansehnliche Strom Sengkel, (Tungtak,) sich ergießt.

Das Chinesische Meer wird zwischen dem Festlande nördlich und westlich, und durch die Sundainseln, besonders Sumatra und Borneo südlich, durch die von letzterer Insel sich nördlich fortziehenden Philippinen, (besonders Paragua und die ansehnliche Insel Luzon,) aber östlich größtentheils umschlossen. Die zahlreichen Ph



linien, (Manilische Inseln,) worunter die ansehnlichste nach Süd-Mindanao, (Maghindano,) ist, bilden mit den nahen Sundaeen und Molucken bis nach-Neuguinea hin eine eigne reiche Inselwelt, den Indischen Archipelagus.

a) Flußgebiete der östlichen Abdachung von Mitteln. Dieser den Seitenbergzügen nach sich fächerförmig ausbreitende große Landstrich befaßt den größten Theil des großen Chinesischen Reichs. Ziemlich in der Mitte seiner Küsten wird es durch eine weit südlich in das Meer streichende Halbinsel Corea in eine südliche und nördliche Hälfte getheilt.

aa) Flußgebiete auf der Südseite von Corea. In ihm ist das eigentliche China befaßt. Nebst zahlreichen Küstenflüssen verläuft jedoch der Si-Kiang im Süden des Landes, in den Meerbusen von Canton fallend, bedeutend ausgezeichnet, wird in einem convergen Halbkreis sich abdachende Land von folgenden wichtigen Strömen durchzogen, deren Seitenströme eine Menge Verbindungen des Landes verstaten: 1) dem Tontsekiang, (Großer, auch Blauer Fluß,) der, (als Petschu,) von den Grenzgebirgen von Tibet aus das ganze Land von Westen nach Osten durchströmt, und mit dem unter andern die großen Landseen, Tong-See und Pojiang in Verbindung stehen; 2) dem Hohangho, (Gelber Fluß,) der nordwärts von Tibet, aus der Choschotei, (neem mit der Wüste Cobi in Verbindung stehenden gebirgigen und steppenlande,) in der Nähe des blauen Sees, (Kok-nor,) seine Quelle hat, in seinem sehr gewundenen Lauf eine Menge größerer und kleinerer Flüsse aufnimmt, und sich in das Gelbe Meer ergießt, mit welchem Rahmen der zwischen der Küste von China und Halbinsel Corea tief eintretende Meerestheil bezeichnet wird, dessen nördliche Hälfte durch eine vortretende, in das Vorgebirge von Macartney auslaufende Landspitze als der Meerbusen Hoang-See, (Meerbusen von Pet-sche-li,) abgegrenzt wird. Der von dem Gelben Meer südlich sich herabziehende Meerestheil wird unter dem Rahmen Tong-See südlich von der Insel Formosa, (Taiwan,) mit welcher der Inselhöhenzug von den Philippinen nordwärts sich dem Festlande am meisten nähert, und nördlich das Chinesische Meer schließt, westlich von den in jenem Höhenzug fortsetzenden nordöstlich zu den Japanischen Inseln streichenden Lieu-Kieu-Inseln theilweise geschlossen.

bb) Flußgebiete auf der Nordseite von Corea. Diese Halbinsel hat drei Küsten in das Meer sich verlaufende Halbinsel hat von dem sie bildenden Mittelgebirge aus meist westliche Abdachung zum Gelben Meer, etwas südliche und nur wenige östliche Abdachung zum Japanischen Meer, welches sich dadurch bildet, daß von ihr aus der mächtigen Japanischen Inseln, (Kiusju, vornehmlich Kyphon und Chicha, mit mehreren kleinern, worunter Sikoff,) der Inselhöhenzug nordöstlich fortsetzen. Von ihnen, (Chicha,) aus geht ein nordwärts streichender Zug auf die große Insel Eschoka, (Szechalien,) über die Perousenstraße zurück, welche lang gezo-

75) worunter der Yun-Lean, Königl. Canal, von Canton bis Peking, vom 23° bis 40° nördlicher Breite reicht.

gene Insel mit dem Festlande durch die Tartarische Meerenge getrennt ist.

Dieser ganze Landstrich, (Tungusien,) hat fast nur ein einziges Flußgebiet, das des Amur, (Schwarze Fluß.) Er entspringt als Onon (weiter hinab Schitka,) an der südlichen Seite des in den südwestlich streichenden Haupthöhenzug aufgenommenen Nerischinskischen Gebirges und als Kerlon, (weiter hinab Argon,) von einer etwas südlichen Landhöhe und fällt, nach Aufnahme mehrerer nicht unansehnlichen Ströme, (Tschirkiri, Songari, Uxuri,) in den Ausgang der Tartarischen Meerenge in das Meer von Schotzk.

1) Flußgebiete der östlichen Abdachung von Nordasien. Wie die Halbinsel Corea die vorige mittlere Abtheilung Ostasiens in zwei Hälften theilt, so ist die nördliche durch die lange südwärts gestreckte Halbinsel Kamtschatka ebenfalls in einen nördlichen und südlichen Theil geschieden, indem von dem vom Asiatischen Ozean auslaufenden Haupthöhenzug aus, jenseit der Quellen des Anadyr ein südlicher Gebirgszug abgeht, der die Halbinsel Kamtschatka ihrer Hauptform nach bildet, und von dem Vorgebirge Lopatka aus, als der Spitze der Halbinsel, in dem Zuge der Kurilischen Inseln sich den Japanischen Inseln anfügt, und so bis zu den Sundainseln seinen Fortgang nimmt. Der südöstlich von dem Abgange der Halbinsel Kamtschatka befindliche Landtheil Asiens ist, da der besonders als Stanowoigebirge hier streichende Hauptgebirgszug nahe an der Küste das Flußgebiet der Kanyma östlich begrenzt, nur sehr gering, und hat also bloß kleine Küstenflüsse (wovon die Dschota,) die in das hier von Kamtschatka und den Kurilischen Inseln größtentheils eingeschlossene Meer von Schotzk (Pama, Tungusisches Meer,) fallen, worin der nördliche Theil als das Meer von Penzinsk unterschieden wird. Der nordöstliche Asiatische Landestheil, nebst der Insel Kamtschatka, bilden vielfache Baien, (wovon südlich die Awatschbai,) aber ebenfalls nur wenig erhebliche Flußgebiete, worunter auf Kamtschatka bloß das des Flusses Kamtschatka am Vorgebirge Kamtschatkoi mündend, Bemerkung verdient, von dem aus ein als Inseln sich andeutender Höhenzug unter der Meeresfläche beginnt, der östlich einem gleichen von der Westküste entgegenkommt, so daß eine Inselreihe, als Aleutische, und sodann als Fuchsinselfn bekannt, den nördlichsten Theil des großen Weltmeers südlich bogenartig einschließt, welcher als das Meer von Kamtschatka bezeichnet wird.

Von den nördlich von Kamtschatka in das Meer einströmenden Flüssen ist der Anadyr, in den Meerbusen gleichen Namens, zwischen den Vorgebirgen Thaddäus und Tschukotskoi mündend, allein bemerkenswerth. Von diesem an rücken die Ostküste der Ostküste nördlich von der St. Lorenzbai, und die Westküste der Westküste einander immer näher, (zwischen denen die Clerksinseln und andere schon Verbindung unterhalten,) bis beide in dem Ozean oder Tschukotskoinos diesseit, und dem Vorgebirge Prinz Wallis jenseit in der Distanz von 13 Seemeilen<sup>76</sup>, welche die Straße Anian, (Be-

<sup>76</sup>) deren 20 auf einen Grad gehen, von 209° 12' bis 209° 25' Länge und 65° 46' bis 66° 6' nördlicher Breite nach Cook's Messungen.



(Straße, Cooksstraße,) nimmt einander am nächsten gerückt sind, auch hier noch durch kleine Inseln, die über den ohnehin nie über Klaftern tiefen Meeresboden hervorragten, fortgesetzt.

III. Besondere Betrachtung der Form der Westfeste. Die Westfeste, deren Flächenbetrag auf noch nicht  $\frac{1}{2}$  von dem der Ostfeste angeschlagen werden kann, stellt nicht sowohl einen Gegenstand als eine Ergänzung derselben dar, indem sie ihrer ganzen Lage nach der Ostfeste zugewendet ist, oder indem die Richtung der Züge der Berg- und Landhöhen vorwaltend eine östliche, eben so wie die Ostseite der Ostfeste eine westliche ist. Es biegt sich also der nördliche Theil, (Nordamerika,) seiner Hauptrichtung nach südöstlich, der südliche Theil, (Südamerika,) mit dem beide große Länder durch den verbindenden Isthmus, nordöstlich. Hiervon macht jedoch der östlich auslaufende Theil von Südamerika eine Ausnahme, und nimmt dieser östlichen Richtung so wenig Theil, als auch die südwärts aus dem Festland von Asien liegenden Insularmassen, besonders Neuholland, dem südwestlichen Zuge der Ostküste von Asien folgen, ja selbst sich zurückweichen. Es ist daher das große Weltmeer zwischen der Ostküste der Ostfeste und der Westküste der Westfeste nach Süden zu sehr etwas verengt, obgleich der Raum von Van-Diemensland bis zu der Südspitze von Amerika immer noch der weiteste ist, den die Landtheile in ihrer größten Annäherung zwischen sich lassen <sup>77</sup>. Von den Seitenzügen des vom Prinz Wallis-Cap, (im  $66^{\circ} 6'$  nördlicher Breite,) bis zum Cap Froward, als der Südspitze des Festlandes Amerikas, (unter etwa  $54^{\circ}$  südlicher Breite,) auslaufenden Haupthöhenzuges können sich besonders zwei aus, welche zugleich die Hauptgestalt von Nord- und Südamerika ihrer ersten Grundlage nach bestimmen, nämlich ein nördlicher, der an dem Vorgebirge Charles an der Küste von Labrador ausläuft, auf die der Mündung des St. Lorenzoflusses vorliegende Insel Newfoundland übersetzt, und unter der Mündung der großen Sandbank von Newfoundland nach den Azoren Inseln fortstreicht, und durch diese sowohl, in die Vorgebirge von Portugal, (nördlicher auch nach den Großbritannienischen Inseln,) als auch durch die Canarischen Inseln nach dem Cap Bojador in Nordafrika zuläuft, und ein südlicher, der südlich vom Amazonas im Cap de St. Roque sich endigt, hier dem grünen Vorgebirge, als dem westlichsten Punkte von Afrika, am nächsten zugekehrt ist, und durch die Inseln des grünen Vorgebirges zu diesem den Übergang macht. Dieser letzte Zug begrenzt auf natürliche Weise das Atlantische Meer, (dessen Abgrenzung von dem Aethiopischen sonst auf künstliche Weise als durch den Aequator gebildet angegeben wird.) Hierdurch wird das Atlantische Meer zu einem kleinen Mittelmeere, da es von dieser Stelle aus an Breite wie das bedeutend zunimmt, nämlich zum großen Mittelmeer der Ostfeste <sup>77</sup>). Der Aequator geht von der Insel Sumatra an von  $120^{\circ}$ , als dem durchbrochenen Isthmus der Ostfeste, bis zu der Westküste von Südamerika nur wenige Breitengrade unter dem Isthmus der Westfeste auf dem  $297^{\circ}$ , also  $177^{\circ}$  im größten Kreise im großen Weltmeer fort, und auch hier bloß in der Nähe von Sumatra durch bedeutende Inseln, (Borneo und Celebes) Dagegen ist die Ostküste von Van-Diemensland unter etwa  $43^{\circ}$  südlicher Breite von der Westküste der Südspitze von Amerika unter etwa  $47^{\circ}$  Breite nur etwa 136 Längengrade.

und Westfeste, das dann wieder da, wo es zwischen sich nahe liegen den Grenzen zweier Ländermassen, von da an diesen wieder zur sondernden Scheidung dient, auch besondere mittelländische Meere, abt. bloß für einzelne Landtheile, abgibt. Von seiner nördlichsten B dem breitung, zwischen den einander sich nähernden Nordküsten beid Erdfesten, als Eismeer wird noch in der Folge besonders die Re ligat seyn.

Die natürliche Eintheilung der Westfeste wird durch den be Haupttheile verbindenden Isthmus bewirkt, welchem letztern auch östlich liegenden, in ihrer Hauptrichtung ihm parallel streichenden I feln beigezählt werden können.

a) Nordamerika mit seinen Flußgebieten. Da es vo Haupthöhenzug von dem Prinz Wallis-Cap an der Straße Anian nörd mehr auf der West- als der Ostseite zu dem Isthmus seinen Fortgang nimmt; so hat auch dieser Landtheil vornehmlich östliche Abt dachung. Indessen bietet seine Nordseite wie seine Westseite Gegen stände dar, welche einer besondern Aufmerksamkeit würdig sind.

α) Nördliche Abdachung von Nordamerika. Diese ganze nicht unahnsehnliche Länderstrich ist größtentheils noch fast ga unbekannt. Von dem wenigen, was wir von ihm wissen, heben wir hier folgendes aus. Von dem Prinz Wallis-Cap aus zieht sich die nordwestliche Küste dieses Landes nordostwärts bis zum  $70^{\circ} 29'$  nördlicher Breite, ( $220^{\circ}$  der Länge,) oder zum Eiscap, als dem bekanntesten nördlichsten Punkte von Amerika, von wo ihre Hauptrichtung e östliche ist. Diese setzt sie zwar bis zum etwa  $270^{\circ}$  der Länge fort, dann aber steigt sie bis über den  $320^{\circ}$  der Länge hinaus, nicht unter  $79^{\circ}$  Breite nördlich, und tritt unter dem  $10^{\circ}$  der Länge im 7 nördlicher Breite, als der Anfang der bekannten östlichen Küste v Grönland, (den sogar bis zum  $80^{\circ}$  nördlicher Breite reichenden a Spitzbergen bekannten Eilanden gegenüber,) hervor, von wo die Küste der Halbinsel Grönland erst südlich, dann südwestlich bis zum Vorgebirge Farewell streicht, nun auf der Westfeste wieder nordwärts bis dahin ihre Richtung nimmt, wo unter dem 7 nördlicher Breite das Nordamerikanische Festland durch eine weit we lich fortstreichende südliche Abdachung, hier in Verbindung mit der Westseite von Grönland die weite Baffinsbai, (deren nördlichster The unter dem  $79^{\circ}$  nördlicher Breite der Smiths Sund,) nord- und ostwärts schließt, die südlich ihren Ausgang in das Atlantische Me durch zwei die nur südlich bekannte Jamesinsel in sich schließende Straßen, Davisstraße östlich, und Baffins Meereng westlich hat, auf der südwestlichen Seite auch mit der südlich liegenden nicht minder ansehnlichen Hudsonsbai in Verbindung steht zu welcher vom Atlantischen Meere aus, zwischen hier noch nicht durchaus bekannten Inseln, die Cumberlandsstraße, die Fr bisheesstraße, besonders aber die Hudsonsstraße führen, deren hauptsächlich Buchten nordwärts Thomas Moe's Wel come mit der Repulsebai, und südwärts die Jamesbai unterschieden werden, und in welche mehrere Flüsse des nördlichsten Amerika's sich ergießen.

Unter dem Eismeer begreift man gewöhnlich nur denjenigen nörd



ern Theil des Atlantischen Meeres, der die Nordasiatischen nebst nördlichsten Europäischen und die Nordamerikanischen Küsten umfließt. Es reicht hiernach von der Straße Anian an, (durch die es mit dem großen Weltmeere in Verbindung steht,) westlich bis zu dem Cap in Norwegen und östlich bis zur Ostküste von Grönland. Der kürzeste Strich ist vom etwa  $280^{\circ}$  und dem  $10^{\circ}$  der Länge es unbekannt, wie viel Raum zwischen der Asiatischen und Amerikanischen Küste es ausfülle, ja selbst ob es den Pol in sich liege, oder ob nicht der über der Baffinsbai und über dem bekannten Lande liegende Landtheil von Nordamerika sich über ihn wegziehe.

Wellen wir aber die natürlichste Abscheidung dieses Meeres von dem Atlantischen, nämlich darnach, wo es zwischen den nächst gelegenen Küsten der Ost- und Westseite aus diesen, als das mittelländische Meer der Polarländer beider Festen hervortritt, zu seiner Begrenzung nehmen; so würde der Seitenhöhenzug dafür der geeignetste seyn, der von der Ostküste von Grönland unter der Meeresfläche, zu dem Nordcap der Insel Island, welche Insel sich vorzüglich durch nördliche Abdachung auszeichnet,) von da über die Färöer und Shetländischen Inseln in den westlichen Punct der Norwegischen Küste ausläuft. Die Baffins- und Hudsonsbai in Verbindung aber bilden für sich im Zusammenhange mit dem ein eignes Nordamerikanisches Mittelmeer, das dem zwischen Europa und Afrika an Flächengehalt wenig nachgibt, ja es auch übertrifft, wenn wir alle die zwischen dem Cap Farewell, als der Südküste von Grönland, und dem Cap Charles, in welchem westlichen Puncte Nordamerika's die Küste Labrador in nordwestlicher Richtung ausläuft, befindlichen Gewässer dazu rechnen.

Von den Flüssen dieser Abdachung sind die in das Eismeer sich ergießenden: 1) der Mackenziefluß, der den großen Clavensfluß durchströmt, dem der Clavensfluß das Wasser des Athabascas und anderer zuführt, dessen Flußgebiet sich überhaupt über den  $53^{\circ}$  nördlicher Breite verfolgen lassen dürfte, und 2) der minder mächtige Kupferminenfluß, der noch wenig bekannt ist. Die Hudsonsbai empfängt eine Menge Flüsse untergeordneten Rangs, die mit den zahlreichen Nordamerikanischen Seen, (vorunter der Winnepessee der ansehnlichste,) in Verbindung stehen.

3) Westliche Abdachung von Nordamerika. Westwärts am Mackenziefluß streift der Haupthöhenzug in einem Gebirge, das sich zum Theil zu bedeutenden Höhen erhebt, auch mehrere Reihen bildet, und in der Folge unter dem Namen Steinichtes, auch Grünes Gebirge, dann Anahual von Norden nach Süden streicht, der doch auch sich so weit ostwärts zieht, daß es zweien nicht unansehnlichen Flüssen, (der Columbia und dem Colorado,) ein größeres Flußgebiet läßt, als irgend ein Strom auf der langen westlichen Amerikanischen Küste ein solches hat. Vom Prinz Wallis-Cap an östlich geht die Küste zuerst in dem Nortonsund etwa östlich zurück; dann zieht sie sich bis zum Vorgebirge Neuenham meist östlich, wo sie dann mit der vorspringenden Halbinsel Alaska die ansehnliche Bristolbai bildet. Diese Halbinsel Alaska bildet die

Spitze des als Fuchsinselfn bekannten Inselhöhenzugs, (worunter *Don alasea* und andere,) der den Aleutischen Inseln von der Ostasiatischen Küste entgegenkommend, den Bogen der Inselreihe schließt, zwischen der und nördlich der Straße *Anian* sich die als Kamtschatkalische Meer bereits früher gedachte nördliche Abscheidung des Weltmeers bildet. Von hier aus nun zieht sich die Nordamerikanische Westküste in einer großen Meeresbucht östlich, und dann südöstlich bis zum Ausflusse der *Columbia* fort, welcher ganze Strich sich dadurch auszeichnet, daß eine Menge vorliegender Inseln und vorspringender Halbinseln Meerengen bilden, die den Schein aus dem Land hervorgehender großer Ströme haben. Unter diesen ist *Cook's Einfarth*, (nordwärts von der Insel *Kodjak*,) der *Prinz Williams-Sund*, die *Beringsbai*, der *Großsund*, der *Norfolksund*, der *Königin Charlotten-Sund*, der *Nootkasund*, und unter den vielen Inseln, der *König Georg's-III. Archipelagus*, der *Prinz Wallis-Archipelagus*, die *Charlotteninseln*, die *Duadra-* und *Vancouverinseln* und andere. Von dem Ausflusse der *Columbia* an wölbt sich die Küste wieder westwärts, wo das *Cap Mendorino* den vorspringendsten Punct bildet. Der unmittelbarer als *Menalbio* bezeichneten Küste streichende Bergeszug läuft dann in südöstlicher Richtung in die große Halbinsel *Californien* (deren südliches Vorgebirge das *Cap St. Lucas*,) aus, die den Meerbusen gleichen Namens, auch das *Purpurmeer*, zwischen sich und der ihr parallel streichenden Küste des Festlands hat, in dessen nördliches Ende sich der *Colorado*, (*de los Martyres*,) ergießt, der zugleich den von Osten her strömenden *Rio grande de los Apolos* aufnimmt, und dem ostwärts mehrere Küstenflüsse zufließen. Die Westküste des Festlandes unterhalb der Halbinsel *Californien* bildet zuerst eine durch das Vorgebirge *Corrientes* sich schließende Meeresbucht, und läuft dann südöstlich, von Küstenströmen durchzogen, bis zur Spitze *de los Angeles*, wo die *Bai Tecanteper* anhebt, von wo an bis zur *Campechebai* auf der Ostseite das erste Mal die Westküste auf ihrem Zug von Norden nach Süden sich bedeutend verschmälert, und von wo der die Nord- und Südhälfte verbindende *Isthmus*, (in weiterer Ausdehnung,) seinen Anfang nimmt.

2) Westliche Abdachung von Nordamerika. Sie ist die ansehnlichste, und befaßt den ganzen Strich von Nordamerika, der sich von dem Vorgebirge *Charles*, als der Südspitze der Ostküste von *Labrador*, (oder wenn man die durch die Straße *Belleisle* getrennte Insel *New-Foundland*, als in den Höhenzug derselben Küste gehörig betrachtet, von dem südlichen Vorgebirge *Naz* dieser Insel,) in südwestlicher Richtung bis zu der bereits gedachten *Campechebai* fortzieht. Durch einen Seitenhaupte Höhenzug von dem Landrücken der Westküste, der erst als *Canadisches Gebirge* sich östlich, sodann aber zwischen dem *Bären-* und *Rothensee*, (welcher ersterer in das Gebiet des *Mississippi*, letzterer in das Gebiet des *St. Lorenzstromes* gehört,) südlich auf das *Apalaische Gebirge* und von da auf die Halbinsel *Florida* übergeht, wird eine nordöstlich größere und eine südwestlich kleinere Hälfte unterschieden. Erstere



fast ganz von dem Gebiete des St. Lorenzstromes eingenommen, bloß ein Küstenstrich südöstlich von diesem Strome, der von Apalatischen, (blauen) und Alleghanischen Gebirge, nämlich bei der Mündung des St. Lorenzstromes in das Gebirge, Dame ausläuft, von dem bloß Küstenflüsse herabströmen, ausgeschlossen bleibt. Der St. Lorenzstrom nimmt seinen Ursprung aus den fünf großen Canadischen Seen, wovon der Obersee zugleich der größte, (1800 Quadratmeilen,) die Mitte der umliegenden Gegend zwischen dem Ursprunge des Mississippi und den in die Hudsonsbai sich entleerenden Seen und Flüssen sammelt, durch die Straße St. Maria in den Huronensee seine Verbindung hat, der mit dem südlicher liegenden Michigausee in Verbindung steht; aus jenem führt die Straße Detroit in den Erie-See und aus diesem der Niagara, (durch seinen großen Wasserfall bekannt,) in den Ontariosee, der den St. Lorenzstrom entleert, welcher durch den Utawafluß und andere verstärkt, mit einem breiten Ausflusse den Meerbusen St. Lorenz bildet, welcher die Magdaleneninseln in seiner Mitte, die großen Inseln Anticosti, St. John, Cap Breton aber zur Seite hat, und sowohl nach Norden von New-Foundland durch die Straße Belleisle, als nach Südöstlich zwischen New-Foundland und Cap Breton über Sandbänke weg, (dergleichen sich auch an der ganzen südöstlichen Küste des Festlandes zur Seite des St. Lorenzstromes finden,) durch zwischen der Insel Cap Breton und der als Neuschottland benannten Halbinsel, (jenseit welcher die Fundybai,) durch die Straße Fronsac mit dem Atlantischen Meere in Verbindung steht.

Der von dem Gebiete des St. Lorenzflusses südlich liegende Küstenstrich, als der bei weitem kleinere Theil der nordöstlichen Hälfte der Abkantung, ist indessen immer noch ansehnlich genug, um mehrere Strömen untergeordneten Ranges, die von dem von dem Hohen Lande der Halbinsel Florida aus bis zum Ausflusse des St. Lorenzstromes nordöstlich streichenden zusammenhängenden Gebirge in ziemlich gleicher Richtung zum Atlantischen Meere strömen. Dahin gehört: der St. Marysfluß, (unweit des von Florida strömenden St. Jamesflusses,) an dessen Ausflusse nördlich die Insel Cumberland; die Matahama, (St. Georgsfluß,) vor deren Ausflusse die in der von der Insel Cumberland heraufstreichenden Reihe der Inseln Simons; die Ogechee, mit der vorliegenden Sapahowinsel, die jenen Zug endet; die Savannah, in den Savannahsund ausfließend; die Santee, die Wadnee, die Satpoco und der Roanoke, den Pamlicoeseund und den Roanokesund vor ihren Mündungen bildend, welche in Verbindung mit einander noch mehrere Küstenflüsse aufnehmen; der breite St. Jamesfluß, (vorher Fluviana,) nebst dem York, wo gegenüber liegende in das Cap Charles anlaufende Erdzunge tief ins Land einschneidende Chesapeakebai begrenzt; der Rapahannock; der Potomack; die Susquehannah in die Chesapeakebai mündend; die Delaware, bei ihrem Ausflusse die Delawarebai bildend; der Hudsonfluß, von dessen Ausflusse in

der New-Yorksbai östlich die Insel Long-Island anhebt, und den Long-Islandfurd nördlich zur Seite hat, in welchen der Connecticut mündet, dem östlich jenseit der Insel Rhode-Island die Bristolbai, neben ihr nördlich von der in der Richtung von Long-Island streichenden Insel Northas, die Buzzardsbai und jenseit derselben um das Cap Codd herum die Bai von Boston unterschieden werden; der Sagadahok, der sich mit dem Kennebec vereinigt, wodurch die Merri-Mertingbai gebildet wird, der Penobscot mit der Penobscotbai bei seinem Ausflusse der Passamacadi mit der Passamacadibai; beim Ausgange der Fundybai.

Die durch die Halbinsel Florida und deren Höhenzug abgeschiedene kleinere Hälfte der östlichen Abdachung von Nordamerika hat ihre Abdachung in dem großen Mericanischen Meerbusen, der von Florida nordöstlich, dann vom Festland von Nordamerika nördlich und westlich, der südwestliche Theil aber, als Campechebai südlich und östlich von dem Isthmus begrenzt wird. Die Flüsse in diesem Meerbusen strömen also in allen Richtungen, unter ihnen sind jedoch die der südlichen und die der östlichen Abdachung die vornehmsten.

Südliche Abdachung hat insbesondere der zweite mächtige Nordamerikanische Strom, der Mississippi, dessen Quellen bis zum Waldesee, westwärts vom Obersee verfolgt werden können, und dessen Gebiet westlich noch nicht genug bekannt, besonders von hier aus durch den Missouri, östlich aber durch den Ohio, (der mit dem See Erie in Verbindung steht,) verstärkt wird. Unter den ihm parallel fließenden Küstenströmen zeichnet sich östlich die Apalachicola, die in die Bai Apalache fließt, und die Alebohoma aus, deren Ausfluß die Bai von Pensacola ist.

Westliche Abdachung haben außer mehreren kleinern Flüssen der St. Marco, (Colorado,) der die Bai St. Bernhard, (St. Louis,) bildet, der Northfluß, (Branosfluß,) und Rio de las Palmas.

b) Isthmus der Westfeste mit den ihm zur Seite liegenden Inseln. Der nach Süden spitzig auslaufende Theil von Nordamerika kann, wenn man den Isthmus der Westfeste als einen verbindenden Landtheil, nicht bloß als eine Grenze betrachtet, südlich weiter nicht ausgedehnt werden, als von wo das Land zwischen den beiden entgegengesetzten Meeren aufhört, sich allmählig zu verschmälern, und sich also an wieder etwas breiter werdendes Land anfügt. Dieß ist, wie bereits oben erinnert wurde, die Stelle zwischen der Bai Tecoahteper südlich, und der Campechebai nördlich. Von hier aus hat der Isthmus bis dahin, wo er, (als Erdenge von Panama,) am schmalsten sich zeigt, von da an aber in die nordwärts spitzig auslaufende Landhöhe von Südamerika sich anfügt, südwestlich nur geringe, nordöstlich aber doch theilweise einige Abdachung, doch nirgends so viel, daß bemerkenswerthe Flußgebiete entstehen könnten. Das auf der Südwestseite fortziehende Gebirge, (welches jedoch auch theilweise sich der Meeresfläche nähert,) ist der nordwestliche Theil der Cordilleras, des Hochgebirges der ganzen West-



te, die am mächtigsten aber erst in Südamerika sich erheben. Von diesem Gebirgszug gehen vornehmlich zwei Hauptseitenhöhenzüge ab, von der nördlichere weiteste der Halbinsel Yucatan zur Grundlage dient, die ostwärts die Campechebai begrenzt, und den Mexicanischen Meerbusen theilweise südlich schließt. Zwischen ihr und dem zweiten Hauptseitenhöhenzuge, der eine nördliche und eine östliche Abzweigung hat, (welche das Cap Gracias a Dios scheidet,) befindet sich die inselreiche Hondurassbai, durch welche der Isthmus ein zweites Mal tief eingeschnitten wird. Auf der östlichen Seite dieses Landtheils steht der große Landsee Nicaragua durch den Fluß mit Juan mit dem Ocean in Verbindung. Die südwestliche Seite zeichnet sich durch die Fonseca- oder Amapallabai, den Meerbusen von Papagoya und den von Salinas aus, die der inneren Cap Blanc auslaufende Seitenhöhenzug trennt. Von hier krümmt sich der Höhenzug des Isthmus S-förmig von Westen nach Osten; durch einen südlichen Seitenhöhenzug, (östlich von der Insel Coiba,) bildet sich der Meerbusen von Panama aus, wo der Isthmus die schmalste Stelle, (12 Meilen,) hat, und dem auf der andern Seite, aber östlicher schon, im Uebertritt des Isthmus in Südamerika, der Meerbusen Darien entspricht.

Die von dem Höhenzug der Halbinsel Florida aus parallel mit dem Isthmus, auf dessen östlicher Seite streichenden Insularlande sind im Allgemeinen als die Antillen, oder Westindischen Inseln bekannt, und entsprechen den jenseit der Halbinsel Malacca, und den Inseln Sumatra, Java u. s. w. liegenden Ostindischen Inseln. Die größere, durch die Meerenge von Florida, als dem östlichen Eingang in den Mexicanischen Meerbusen, von diesem Lande geschiedene, Cuba, setzt aber nicht mit dem Anfang ihres Haupthöhenzugs, (Cap St. Antonio,) in das Südende von Florida, (das die Bightmoudbai bildet,) ein, sondern beugt sich westlich nach dem Malacca-Cap von der vom Isthmus ausgehenden Halbinsel Yucatan. Hierdurch wird der südliche Eingang in den Mexicanischen Meerbusen gebildet, oder auch derselbe mit dem Caraischen Meere in Verbindung gesetzt, worunter man die von dem Festland von Amerika einerseits ganz, und durch den Zug der Antillen von Cuba hin bis nach Trinidad theilweise eingeschlossenen Gewässer befaßt. Die auf der Südseite, besonders zwischen dem Vorgebirge Corrientes und Cruz eingehöhlte Insel Cuba läßt daselbst zahlreiche Buchten, und gibt vielen kleinern Inseln, (Garten der Königin,) Raum. Von dem Cap Cruz aus deutet sich ein Höhenzug unter der Meeresfläche in den Caymans Inseln, Saintanilla, nach Guanajo und Nualan in der Hondurassbai hin an. Ein südlicher Höhenzug bildet die Insel Jamaica. Von ihr aus geht ein Seitenzug unter der Meeresfläche südlich nach den Inseln Ceranilla, St. Andres u. s. w. nach dem Isthmus. In dem Hauptstrich der Insel Cuba liegt die Insel Hayti, (Hispaniola, St. Domingo,) dem Range nach die zweite unter den Antillen, von Cuba durch die Windward-Passage geschieden; durch das Gebirge Motta, westlich auf der Südseite, tritt sie in den Höhenzug von Jamaica. Mehrere kleinere Inseln, (Portugas, Gonave, La

Bache, die Beaten-Inseln, Saona,) umgeben sie. Von ihr geht der Höhenzug auf Portorico über. Auf der nördlichen Seite dieses ganzen Buges der, (vier,) großen Antillen streichen, von der Ostseite von Florida ausgehend, (von dieser von dem Neuen Bahamacanal getrennt,) die Bahama-Inseln, (Lucayos-Inseln, (unter ihnen die Insel Guanahani, St. Salvador,) die große Bahama-Bank zwischen sich befassend, jenseit deren die alte Bahamastraße, eine der Nordküste von Cuba vorliegende Inselreihe, (Garten des Königs,) abscheidet. Dieser Inselzug tritt auf Portorico mit dem der großen Antillen zusammen, setzt sich aber von hier aus in südlicher Richtung als Caraische Inseln (Kleine Antillen,) fort. Ein Theil derselben wird wieder als Leeward-Inseln, (Inseln über dem Winde,) und Windward-Inseln, (Inseln unter dem Winde,) unterschieden. Vorzüglich gehören in diese Reihe die Virginischen Inseln, (worunter St. Thomas, St. Croix, St. Jean,) Anguilla, St. Martin, St. Barthelemy, St. Eustache, St. Christoph, Antigua, Monserrat, Guadalupe, Dominique, Barbados, St. Lucie, St. Vincent, Grenada, Tabago, Trinidad und Margarida, von wo sich noch ein Inselzug an der Nordküste von Südamerika über Tortuga, Salada, Orchilla, Buen Ayre, Curassao, Oraba bis zum Cap Falso von Südamerika zieht. Bismlich östlich von den Bahama-Inseln deutet sich ein Höhenzug unter der Meeresfläche, von der großen Bank von New-Foundland zu, ihnen herabstreichend, in den Bermudas-Inseln an, der auch wohl mit den Azorischen Inseln zusammenhängt.

c) Südamerika mit seinen Flußgebieten. Wenn man den Südtheil von Amerika an sich betrachtet, so ist die Uebereinstimmung seiner Bildung mit der von Afrika höchst auffallend. Es entspricht nicht nur seine Form, ihrem allgemeinen Umriß nach, selbst noch mehr wie die von Afrika, der eines Dreiecks, sondern es geht auch von dem Haupthöhenzuge von Norden nach Süden, der dort auf der Ostseite, hier aber auf der Westseite fortstreicht, ein mächtiger Seitenzug ab, der eben dem Lande in seinem nördlichen Theil eine ausgezeichnete Breite gibt, und wie dort in dem Grünen Vorgebirge als dem westlichsten Punkte, hier in dem Vorgebirge St. Roque, als dem östlichsten Punkte, von dem aus der Höhenzug in der Insel di Fernando nochmals über die Meeresfläche tritt, sich endigt, in welchen beiden Endigungen also, auch beide große Ländermassen einander am nächsten stehen, und die das davon nördlich besetzte Gewässer, das Atlantische Meer, zu einem Mittelmeer beider Erdfesten machen. Eben so hat auch Südamerika, noch schärfer als Nordamerika drei Abdachungen, deren jede ihre besondere Betrachtung verdient.

a) Nordöstliche Abdachung von Südamerika. Sie ist ungeachtet die Meeresküste bei weitem nicht die Ausdehnung hat, als die der beiden folgenden Abtheilungen, doch an Umfang die größte. Wenn man als nordwestliche Grenze von Südamerika die Linie betrachtet, die über das Gebirge, von dem als Meerbusen von St. Miguel bezeichneten östlichen Einschnitt des Meerbusens von Panama



nach dem Meerbusen von Darien gezogen werden kann; so  
 geht die Meeresküste sich erst in einer bis zum Vorgebirge de la  
 Gama und dem nahen Vorgebirge Falso, (jenseit dessen der als  
 Meerbusen erscheinende See Maracaybo seinen Ausfluß hat,)  
 in östlicher Richtung, den über die Halbinsel Paraguana  
 zur Spitze de Magillanes, der Insel de la Trinidad gegen-  
 über, östlich fort, und nimmt von hier an erst bedeutende nordöst-  
 liche Richtung. — Auf dieser Strecke ist bloß das Gebiet des Mag-  
 dalenenflusses, der in nördlicher Richtung dem noch diesseit der  
 See Maracaybo gelegenen Meerbusen von St. Martha zu-  
 fließt, von einiger Erheblichkeit. Auf der eigentlichen nordöstlichen  
 Küste, von der Spitze de Magillanes an bis zum Cap Roque, haben  
 wir: ansehnliche Dronoco- und der mächtige Amazonasfluß,  
 deren Gewässer beim Ausflusse sich mit dem ansehnlichen Tocan-  
 tinfluß vermischen, ihren Ausfluß, deren Gebiete den größten Theil  
 des Landes einnehmen. Da auch die Flußgebiete des Dronoco und  
 des Amazonasflusses durch die Natur, wie sonst nie die zweier gro-  
 ßen Ströme verbunden sind; so verdienen die Gebiete der gedachten  
 drei Ströme als ein gemeinschaftliches großes betrachtet zu werden.  
 Es wird dasselbe durch den schon oben berührten Hauptseitenhöhen-  
 zug begrenzt, der ungefähr in der Mitte des auf der Westküste von  
 Südamerika, von dem Isthmus aus, herabsteigenden Haupthöhen-  
 zugs, südlich vom Titicasee, östlich abgeht, dann, indem er das Ge-  
 biet des Rio Platá nördlich abgrenzt, als Chiquitosgebirge nord-  
 östlich auf-, und dann südwestlich wieder abwärts steigt, und zu-  
 letzt, nordwärts das Gebiet des Franziscusflusses abscheidend, in das  
 Cap St. Roque ausläuft, (wo es dann auch die Gebiete der dem  
 Tocantines östlich parallel laufenden kleinern Küstenflüsse, als des  
 Nearym, (dem die Insel Marahad, (St. Louis,) vorliegt,)  
 des Tapiçura, des Paranaiba, des Acuaru, des Gua-  
 rana mit befaßt.

Nördlicher, aber oberhalb der Quellen des Magdalenenflusses, zieht  
 ein anderer Seitengebirgszug von den Anden, als dem Hauptzug öst-  
 lich ab, der dann nordöstlich fortstreicht, aber von dem bereits als  
 mächtiger Strom gebildeten Dronoco durchbrochen wird, indem die-  
 ser in mehreren Wasserfällen über ihn wegstürzt. Dieser Dronoco  
 entspringt nämlich in dem jenseit jener Wasserfälle gelegenen Gua-  
 ranagebirge, dessen westlicher Theil Mai, (wo die Wasserfälle des  
 Dronoco bei Maipures,) der östliche aber Tamucaraque heißt.  
 Der Dronoco krümmt sich von der als sein Ursprung angesehenen  
 Quelle an, (eben so wie der Nil in seinem Ursprung,) schnecken-  
 förmig um sich selbst, in erst nördlicher, dann östlicher, südlicher,  
 westlicher und wieder nördlicher Richtung; (wo er dann jene Fälle,  
 von Maipures an,) macht. In diesem Lauf berührt er, indem er  
 südlich strömt, den nach neuern Karten ansehnlichen Parime-See,  
 oder durch den Parimefluß einen Ausfluß in den zum Gebiet des  
 Amazonasflusses gehörigen Negro hat,) dessen Daseyn, oder wenig-  
 stens dessen Bedeutenheit aber v. Humboldt in Zweifel zieht. In  
 seiner westlichen Strömung gibt er nach Süden einen Hauptarm ab,  
 der als Cassuari sich mit dem Negro verbindet, so daß also

nur westlich von diesem Communicationsfluß an die Flußgebiete des Dronoco- und des Amazonenflusses, und zwar durch einen von den Quellen des Magdalenenflusses an östlich streichenden Höhenzug getrennt sind. In seinem nun nördlichen Lauf nimmt er mehrere nicht unbedeutende Flüsse, von der Westseite her, (wohin man auch vorher seinen Ursprung versetzte,) als die Ymirrida, Guaviare, Meta, auf, jenseit deren der Höhenzug das Gebiet des Dronoco von dem des Magdalenenflusses abgrenzt; zuletzt hat der hier durch periodische Ueberschwemmungen, wie der Nil, sich bedeutend machende Dronoco östliche Richtung, und wird durch nördlich wie südlich ihn zuströmende Flüsse verstärkt, bis er endlich der Insel St. Trinida gegenüber, zwischen der Spitze de Megillones, (hier den Golf Triste bildend,) und dem Vorgebirge von Barima in zahlreichen Ausflüssen in das Atlantische Meer fällt. Zwischen den Ausflüssen des Dronoco und des Amazonenflusses bildet sich ein beider Flußgebiete trennendes Küstenland, (von dem Vorgebirge de Barima, bis zu dem der Insel Carpori zugehörigen Vorgebirge Carpori,) das außer dem nördlich einströmenden Essequibo, nur von kleinen Küstenflüssen, als dem Berbice, dem Sutinain, dem Cayennefluß, (wo die Insel Cayenne,) als Amerikanisches Niederland durchströmt wird. — Der Amazonenfluß, (Maranhon, hat das größte Flußgebiet von allen Strömen der Erde, (über 88,000 Quadratmeilen.) Seine Quelle wird gewöhnlich aus dem See von Laurirocha, an dem Fuße der Anden, unter etwa  $11^{\circ}$  südlicher Breite, abgeleitet, von wo aus er erst nördlich fließt; dann, nachdem er die Gewässer vom Chimborasso empfangen, (wohin auch sein Ursprung gesetzt wird,) in östlicher Richtung; in welcher er seinen Lauf nimmt außer zum Theil bedeutenden Strömen, südlich den Ucayale, nördlich den mächtigen Negro, südlich die gleich mächtige Madera, (beide vielleicht von der Größe der Donau und des Nils,) ferner südlich den Popayoso und Xingu aufnimmt. Bei seinem Ausflusse in das Atlantische Meer, (gerade unter dem Aequator,) bildet sich südlich die ansehnliche Insel Guanes, (nebst mehreren kleinern,) dadurch, daß der nördlich auch hier einströmende Tocantines mit dem westlichen Arm sich mit dem ausströmenden Amazonenfluß verbindet, mit dem östlichen aber eine eigne Ausströmung hat.

β) Südöstliche Abdachung von Südamerika. Diese lange Strecke, deren auslaufende Küste nur in geringem Abstand südlich, von da aber bis gegen das Ende, (Vorgebirge de las Virgines,) südwestlich streicht, befaßt nur ein einziges Flußgebiet von bedeutender Mächtigkeit, nämlich das des Platastroms. Da dieses ziemlich in der Mitte des ganzen Strichs liegt, so kann man die übrigen Flußgebiete, zusammen befaßt, als nördlich und als südlich vom Platastrom liegende betrachten. Unter jenen zeichnet sich noch das des Franziscusflusses aus. Von dem Ausflusse desselben an bis zur Allerheiligenbai, wo die Küste durchaus südwestliche, und von dieser bis zum Vorgebirge St. Tomé, wo sie meist südliche Richtung hat, ferner von diesem über den Meerbusen Rio Janeiro, bis zur Bai Sagafuy, wo sie die



richtige Richtung wieder annimmt, ferner von da bis zum Mörros St. Marta, wo sie wieder südlich, von da bis zu dem Ausflusse des mit dem Mirimsee zusammenhängenden Sees de los Patos, (Rio grande de St. Petro,) wo sie wieder südwestlich streicht, abfließen eine Menge aber nur kleine Flüsse der Küste, weil die einzigen Gewässer südlich alle der Platastrom, (La Plata, Silberfluß,) aufnimmt, der an Mächtigkeit nur dem Amazonenflusse nachgibt, von dem mittlern Gebirge, was südlich vom Amazonenflusse südlich streicht, seinen Ursprung nimmt, und in seinem südlichen Laufe, Anfangs als Paraguay,) mehrere bedeutende Ströme, worunter vornehmlich der große, ihm auf östlicher Seite zufließende Parana-Fluss, zuletzt aber, mit Aufgabe jener Benennung, auf der westlichen Seite den Uruguay aufnimmt. — Die südlich vom Plata-Fluss auf dem durch ferneres Zurückgehen der Küste nach Westen immer spärlicher werdenden Endtheil von Südamerika abfließenden Flüsse sind zwischen dem Vorgebirge de St. Antonio südlich, am Ausflusse des Platastroms bis zum Cap Blanco, südlich vom Meerbusen St. George, der Fureuquo, der Colorado und Rio Negro, von welchem südlich sich die Bai St. Josef bildet, weiter in dem langen Strich vom Cap Blanco bis zu dem Cap de las Virgines, in der nördlichen von diesem gebildete Bai, der Mallegos.

Von dem Cap de las Virgines geht die unter dem Namen Malaguanische Meerenge bekannte Straße an; durch sie wird ein kleinerer Theil der als Feuerland, (Terra del Fuego,) bekannten Inselmassen abgeschnitten. In der großen Insel dieses Namens, der südlich, auf der kleinen Insel l'Hermitte, das Cap Horn die Südspitze von Amerika bildet, sind die die Successbai zwischen sich liegenden Vorgebirge, St. Diego und de Bon Succès, die nördlichsten östlichen Punkte, bis zu welchen die Küste, von dem Vorgebirge de las Virgines an, wieder östlich streicht. Dieser Zug setzt sich dann über die Straße le Maires in das Staatenland fort. Nördlicher aber kommt ein etwas verbreiteter Höhenzug über die Meeresfläche in den zwei, durch den Falklands-Canal, (Malinlesund,) getrennten größern, nebst mehreren kleinern, Falklandsinseln, (Maluinische Inseln,) wieder zum Vorschein, von denen ein tieferer Zug in der ferner nach Osten liegenden Insel Neu-Georgien, (Südgeorgien,) mit der Coopersinsel, und dem von geringer Vegetation entblößten Sandwichlande, wo der südlichste bekannte Punkt der ganzen Erde, Südliches Tule, (unter 60° der Breite,) verfolgt werden kann, und von dem vielleicht ein tiefer Höhenzug zur Südspitze von Afrika, (in der Goughsinsel hervorstehend,) nordöstlich streicht.

2) Westliche Abdachung von Südamerika. Ungeachtet hier die Küste die längste von allen ist, zeichnet sich dieser Strich doch durch gänzlichen Mangel an Flußgebieten von auch nur einiger Erheblichkeit aus, indem die großen Anden, (Kupferberge,) oder Cordilleras, (Kettengebirge,) längs der ganzen Westküste von dem Isthmus aus südlich ablaufen. Ihre Richtung ist Anfangs, im Parallellauf mit der Küste, bis zum Vorgebirge Orientes, etwas südöstlich, dann

aber eine südwestliche, wo die Küste von der Bai Buenaventura bis zum Vorgebirge St. Lorenz gleichermaßen laufend hier wie in der südlicher hervortretenden Spitze de St. Helena und dem Cap Blanco, wodurch der weite Meerbusen von Guayaquil befaßt wird, den westlichsten Punct von Südamerika bildet. Parallel mit diesen streift die hohe Bergkette der Anden in ihren hervortretendsten Höhen, und zwar in zwei Kuppen, die eine, das Tha von Quito, (unter dem Aequator,) umgebend, besonders in folgenden Spitzen, Coto cache, Cayambe, Antisana, Cinchulagua, Cotopaxi mit dem Inkakopf, Iliassa, Corazon Pichincha sich erhebend, die zweite, (unter 1° südlicher,) wo der Chimborasso besondere Auszeichnung erhalten hat, in dessen Nähe der Carquirasso, der Tungarahua, der Kapak Arku, der Sangai sich befinden. Von diesen Endpunten geht ein tieferer Höhenzug, sich vom Festlande entfernend, westwärts in den Ocean die Galapagos, (Schildkröteneilande,) die Inseln Galega (unter dem Aequator,) von denen vielleicht ein tieferer Zug nordwestlich in den Inseln de Chipperton, Rocca, Partida, und Disgraciada, bis zu den fernen Sandwichinseln fortstreicht, oder auch über einzelne, ostwärts zerstreut liegende Inseln auf die Westküste von Nordamerika in der Gegend von Californien zurückgeht. Vom Cap Blanco an geht die Westküste von Südamerika, mit nur wenigen Unterbrechungen, südöstlich bis zur Bai von Arica. Hier schließt der Gebirgszug den großen Landsee Titica ein. Von hier geht der Bergzug mit der Küste parallel, fast gänzlich südwärts fort, außer der kleinen etwas fernen Insel de Juan Fernandez, und der benachbarten Insel Masatierra, fast ganz ohne Inseln, bis erst gegen den südlichen Verlauf einige größere Inseln, in der Richtung der benachbarten Küste fortstreichend, wie die Insel Chiloe, der Archipelagus de Chonos, die Insel de Tres Montes und über den Meerbusen von Pennas die Insel de la Campana, über den Meerbusen von Trinidad die Insel la Madre de Dios und Victoria, nahe am Vorgebirge Victoria sich bemerklich machen, zwischen dem und der Vorgebirge Pilares die lang sich schlängelnde Magellanische Meerenge ihren westlichen Ausgang hat, von wo an die westliche Küste des Feuerlandes, nachdem der Höhenzug des Festlandes in der Magellanischen Meerenge selbst sich in dem Vorgebirge Froward verlaufen hat, sich nach dem Cap Horn auf der zum Feuerlande gerechneten kleinen Insel Hermite südöstlich herumbiegt.

4) Wer aus der Betrachtung der unterschiedlichen Form der Erdoberfläche, in der verschiedenartigen Hervorragung eines Theils derselben über den mit Wasser bedeckten zweiten, allgemeine Resultate für Erkenntniß der Geseze der Entwicklung eines höhern Lebens, und namentlich des menschlichen, als der allerhöchsten Steigerung des Erdenlebens, für sich gewinnen will, der darf sich die Mühe nicht verdrießen lassen, mit Hülfe guter Karten und vorzüglich unter Benützung eines künstlichen Erdglobus, (mit gänzlicher Nichtbeachtung alles Willkürlichen und Conventiellen, welches in dem gewöhnlichen Unterricht in der Geographie zur Unterscheidung und Abgrenzung



Ländern und Landtheilen wenigstens eben so hoch gestellt wird, als aus der natürlichen Erdbildung hervorgehenden Abscheidungen,) einem in dieser Erdbildung sich zunächst bemerkbar machenden Standort aus, die relative Lage und Gestalt der übrigen Theile Schritt Schritt aufmerksam zu verfolgen, und so sich zuvörderst ein Bildhaft in das Gedächtniß einzuprägen, wie die Erdenform in vergrößertem Maßstabe sich darstellen würde, wenn die Menschen erst jetzt ihr Besiz nehmen sollten, und noch nicht auch ihre Wohnstätten und ihre Lager- und Grenzsteine, zur Andeutung des gegenseitig anerkannten oder auch bestrittenen Eigenthums eingezeichnet hätten. Das Studium der natürlichen Geographie ist erst in neuerer Zeit, nur durch Abstraction aus der politischen Geographie, wie sie gewöhnlich der zunächst gelegte Gegenstand des Jugendunterrichts jedes gebildeten Menschen ist, hervorgegangen, als daß man bisher daran gedacht hätte, das Studium der natürlichen Geographie der politischen zu Grunde zu legen, das freilich durch den noch so großen Mangel von Kenntnissen der innern Landesbeschaffenheit der mehrsten, besonders der entferntern Länder, durch den Abgang befriedigender Karten, in denen bloß auf die natürliche Beschaffenheit auch nur in soweit Rücksicht genommen war, als wir Kunde davon haben, und endlich durch die Unbestimmtheit der Bezeichnung einzelner Landtheile und Gewässer noch gar sehr erschwert ist <sup>78</sup>.

Einen solchen Leitfaden nun zu gewähren, nach dem man sich in geographischen Werken vergebens umsieht, ist der Zweck vorstehender Skizze, die ohnedieß wohl dem Vorwurf einer zu weiten Abschweifung in ein fremdes Gebiet bloß gestellt seyn würde, und als vielleicht erster Versuch in ihrer Art mancher Nachhülfe und Ausfüllung bedarf, indessen ihren Zweck, das Auge auf das in der allgemeinen Erdbildung fest zu halten, worauf es für die physiologische Betrachtung derselben doch zunächst ankommt, nicht verfehlen dürfte.

Wer nämlich durch aufmerksame und wiederholte Betrachtung der Erdoberfläche in ihrer unterschiedlichen Formation es über sich genommen hat, in dem Bilde, das eine in Kugelform projectirte Weltkarte dem Auge darbietet, nichts als den natürlichen Bezug, den jeder einzelne Theil auf die andern hat, die gegenseitige Stellung und Richtung der verschiedenen Landestheile, der von diesen abfließenden Flüsse der in ihre Einschnitte eindringenden Gewässer, dieß alles aber auch zugleich mit Berücksichtigung der unterschiedlichen, auch von der Natur gegebenen, wenn auch nach willkürlichen Abschnitten unterschiedenen Breitengrade zu beachten, dem werden folgende für naturphilosophische Würdigung des Menschen- und Völkerlebens wichtige Resultate nicht entgehen.

Erstens. Die Erdoberfläche stellt sich nicht sowohl als trocknes Land, im Gegensatz von Wasser, sondern als Erdoberfläche in Verbindung mit theils von ihr besaßten, theils von ihr umgebenen Gewässern dar. Es dürfte wohl zu wünschen seyn, daß unter den so unterschiedlichen Bezeichnungen von Gegenständen der natürlichen Geographie immer die älteste Benennung, die ihnen die frühesten Schriftsteller, oder auch die Landesbewohner zur Zeit der Entdeckung, oder die Entdecker selbst gaben, in wissenschaftlichen Werken andern vorgezogen werden möchte. In obiger Darstellung hat indessen hierauf nicht immer Rücksicht genommen werden können.

abströmenden, oder auch in sie als Meeresbuchten oder Mittelmeereintretenden Gewässern, und den ihr nahe liegenden, besonders auch in jenen Buchten und Mittelmeeren hervorragenden Inseln als ein großes zusammengedrücktes Ganzes dar. Es war es aber auch für die Entwicklung und das Bestehen von Pflanzen- und Thierleben überhaupt, für das menschliche Leben aber insbesondere erforderlich. (Vgl. Erdbewohner.)

Wenn also strömende Gewässer und Landseen, Meeresbuchten und das den Küsten nahe Meer den menschlichen Bedürfnissen gleich wichtige Befriedigung gewähren, als der Boden, auf dem der Mensch fußt und seine Wohnung aufschlägt, und dieser allein, selbst angefeuchtet und von Gewässern eingeweicht, sein Leben wenigstens auf die Dauer nicht unterhält, noch weniger die freie Entfaltung desselben gestattet; so muß derjenige Theil der Gewässer, der auf die bemerkte Weise mit dem Festlande in der nächsten Beziehung steht auch dem Wohnplatz der Menschen zugerechnet, oder als Träger und Grundbedingung des menschlichen Lebens betrachtet werden. Weit davon entfernt, daß also das Meer Inseln in der Nähe vom festen Lande von diesem, oder überhaupt sich nahes Land von einander scheiden sollte, dient es vielmehr zu dessen gegenseitiger Verbindung, da der Mensch schon auf den frühesten Stadien der Cultur durch die Schiffahrt die Vortheile schwimmender und fliegender Thiere, mit Leichtigkeit von einer Landküste zur andern zu gelangen noch mit dem vereint, seinen Erdboden, und was ihm dieser zu seiner Subsistenz darbietet, mit auf die Wasseroberfläche zu nehmen. So weit also ein Meer für den Fischfang oder sonstige Bedürfnisse des gewöhnlichen Lebens befahren werden kann, ohne daß die Küste auf dem Auge schwindet, ist auch der Mensch, wenn er dasselbe für sein Leben benützt, noch nicht außer Gemeinschaft mit dem festen Lande gesetzt. Die höhern Culturmittel haben aber dem Menschen allmählig den ganzen Ocean, wenn auch nicht ohne Gefahren, zum temporären Aufenthalt geöffnet. Hierdurch sind also auch die Naturgrenzen überschritten, innerhalb deren allein der rohe Mensch, so lang ihn die Noth nicht drängt, dem Meere sich ohne Scheu anvertraut. Durch die Vortheile der Seeschiffahrt cultivirter Nationen sind entfernte Welttheile wohl noch in nähere Berührung gekommen, als manche sich nahe liegende Länder, deren Küsten und Vorgebirge durch von einem zum andern Schiffenden nicht aus dem Gesicht verlieren. Das Meer bietet also jetzt für die von ihm befaßten Länder keine absolute, sondern nur eine relative, indessen immer noch wohl unterscheidbare Abgrenzung dar.

Zweitens. Der Gegensatz, den das Festland und das Meer mit einander bilden, besteht darin, daß das letztere, in so fern es nicht als Mittelmeer, oder als Meeresbucht, in vorspringende Landtheile, oder zwischen vorliegenden Inseln und Inselreihen und dem Festlande eintritt, das gesammte Festland in einer mehr oder minder zusammengedrückten Masse ringsherum umströmt, und aus seinen Tiefen nur sparsam einzelne Höhen hervortreten läßt, die als zerstreute Inseln theils nur beschränkt ein vegetabilisches und thierisches Leben gestatten, theils, wenn



zufällig und wohl nie ohne Ueberwindung vieler Schwierigkeiten Menschen, um sich daselbst anzusiedeln, in Besitz genommen, doch diese in einen isolirten Zustand versetzen, dem zu entgehen so viele Schwierigkeiten, als die erste Besignahme sich entgegenstellen.

Erst in dieser Hinsicht verdient also das Meer den Namen eines Weltmeeres. Hat man die Gestalt des Festlandes, als ein zusammengedrängtes Ganzes, gehörig ins Auge gefaßt; so wird auch die Abgrenzung des Weltmeeres von seinen einzelnen Buchten, (wenn sie auch nirgends streng, in der Distanz weniger Meilen gedacht werden kann,) doch sich von selbst ergeben. Man kann überhaupt den Grundsatz aufstellen: ein Meerestheil ist Meeresbucht, wenn die Landmasse selbst, zwischen denen das Meer eintritt, ihrem Umfange nach bedeutender, als dieser eindringende Meerestheil ist. Im entgegengesetzten Falle zieht sich nicht sowohl das Meer zwischen Landtheile, als diese vielmehr sich in das Meer mit vorgestreckten Enden verlaufen.

Wenn wir nun, um das Weltmeer als ein Ganzes in der Vorstellung zu fassen, zuvörderst darauf Rücksicht nehmen, in welcher Gegend es nach allen Richtungen von dem Festlande am entferntesten ist; so finden wir diese, (voransgesetzt, daß jenseit des südlichen Polarkreises, welchen muthige Seefahrer nur auf wenigen Punkten in kurzen Strecken überschritten haben, sich kein Südländ von erheblichkeit befindet, welches ohnedieß auch nur eine mit ewigem Eise bedeckte Strecke darbieten könnte,) in der Entfernung von etwa 60 Breitengraden vom Südpol, unter etwa  $85^{\circ}$  der Länge. Hier bis zur Südspitze von Amerika und zu den beiden Südspitzen von Neuholland, ingleichen zu der Südspitze von Afrika ungefähr gleicher Abstand. War aber die Südspitze von Afrika nur noch um einige Grade östlicher gelegen, so daß sie in dem Meridian des Südcaps von Madagascar, aber unter dem nämlichen Breitengrade, den wir hier unterscheiden, ansließe; so würden die drei Südspitzen der Weltfeste, nämlich die östliche von Neuholland, die Amerikanische und Afrikanische Südspitze in der Distanz eines gleichmäßigen Dreiecks von einander abstehen, dessen Mittelpunkt in etwa  $78^{\circ}$  südlicher Breite und  $90^{\circ}$  der Länge fiel. Indem nun in das zunächst um den Südpol herum, als Südmeer, am weitesten verbreitete Weltmeer die Gesammtheit der Landmasse bloß in den gedachten drei Spizen sich hinabzieht, bietet sie in den Zwischenräumen, welche dadurch entstehen, daß die Landmasse von jenen Spizen aus nördlichwärts zusammengedrängt wird, noch große Räume dar, welche von dem Weltmeere erfüllt werden und in denen erst es durch einzelne Buchten und Mittelmeere mit den Landmassen in eine nähere Verbindung tritt. Es sind also wie drei südliche Endspitzen des Festlandes, wovon eine auf die Westfeste, zwei aber, (wegen Durchkreuzung der Haupthöhenzüge,) auf die Ostfeste kommen, auch drei Räume von dem Festlande gelassen, welche das Weltmeer nordwärts erfüllt. Von diesen ist der zwischen der Ostseite von Asien und der Westseite von Amerika bei weitem der größte, wo das Weltmeer dann den Namen Stilles Meer bekommt, und

seine Grenzen nördlich in den Aleutischen- und Fuchsinseeln findet jenseit welcher Inselreihe die Gewässer des Eismeeeres durch die Straß Anian mit denen des Kamtschatkalischen Meeres und durch dieses mit dem stillen Meere selbst in Verbindung treten. Daß mehrere der gewöhnlich zu Polynesiern gerechneten Inselgruppen, als die Freundschafts- und Schifferinseln, die Gesellschaftinseln, die niedrigen Inseln, Markesainseln, besonders nördlicher die der Westfeste noch näher als der Ostfeste gestellten Sandwichinseln, nebst den Mulgravesinseln, den Carolinischen und Pelew-Inseln, den Marianen u. a. wegen zu großer Entfernung von der östlichen Küste der Ostfeste als in diesem Meere zerstreute Erdtheile und außer natürlichem Zusammenhang mit dem Festlande, in dem Sinne, wie die größern Inselularlande und die Inseln anderer Meere, betrachtet werden müssen (ungeachtet eine ganz genaue Abgrenzung immer etwas willkürliches bleibt,) ist bereits früher bemerkt worden. — Der zweite Raum wird östlich von der Westküste von Neuhoiland und dem durchbrochnen Isthmus, welcher Neuhoiland zu einem Südtheile von Asien macht, westlich aber von der östlichen Küste der zu Südafrika gehörigen großen Insel Madagascar, nebst den andern Afrikanischen Inseln auf der Ostseite dieses Welttheils begrenzt; es zieht sich nur wenig nordwärts über den Aequator heraus, wo es dann in das Indische Meer übergeht. Dieser Meeresstheil wird auch als *Südinndisches Meer* bezeichnet. — Der dritte Raum wird östlich von Südafrika, westlich von Südamerika begrenzt. Die bei Gelegenheit der Beschreibung beider Landtheile erwähnten zerstreuten Inseln, von nur geringem Umfange, sind wegen Entfernung derselben von den Küsten mehr diesem Meeresstheile zugehörig, als als Particellen jener Landmassen zu erachten. Es wird auch als das *Aethiopische*, (*Südatlantische*), Meer bezeichnet. Von dem eigentlichen Atlantischen Meere aber ist es am natürlichsten durch den Raum abgegrenzt, der den westlichsten Punct der Ostfeste, (das Afrikanische grüne Vorgebirge,) und den östlichsten Punct der Westfeste, (das Cap de St. Roque in Südamerika,) in schräger Richtung den Aequator durchschneidend, von einander sondert.

Drittens: Die Landmasse der Erdoberfläche mit ihren Mittelmeeren und Buchten findet sich bei weitem zum größten Theil in der nördlichen Erdhemisphäre; das Weltmeer, als deren Gegensatz, nimmt dagegen größtentheils die südliche Hemisphäre ein. Hierbei zeigt sich aber zugleich das besondere Verhältniß, daß großen Landmassen in den ihnen direct entgegengesetzten Erdgegenden, also unter den entgegengesetzten Meridianen und Breitengraden, große Meeresflächen, und diesen große Landmassen mit Mittelmeeren entgegenstehen. Der so ansehnliche, jenseit des Aequators liegende Theil von Südamerika würde, wenn er auf die entgegengesetzte Seite der Erdkugel versetzt werden sollte, auf der Westseite, so wie Südafrika jenseit des Aequators auf der Ostseite des stillen Meeres, Neuhoiland aber in den ihm entgegengesetzten Atlantischen Meere hinreichenden Platz finden, und es würde bloß in Inseln und hier und da in Landküsten eine Formveränderung daraus entstehen. Aber das stille Meer allein diesseit des Aequators würde



genug gewähren, um nebst Südamerika und Südafrika auch Neuholland zu befaßen. Der Raum also, den das Weltmeer in nördlichen Hemisphäre einnimmt, indem es sich auf der Ostseite Asien und der Westseite von Amerika über den Aequator heraufreckt, wird größtentheils durch den ausgeglichen, den die in die südliche Hemisphäre sich herabsenkenden Landtheile hier erfüllen. Noch zum Theil nehmen die abgesonderten Inselgruppen der südlichen Hemisphäre, in so fern sie Gewässer zwischen sich als Mittelmeer bezaubern, in Anspruch, so daß überhaupt der Raum, den das Weltmeer der Erde einnimmt, ohne in besondere Verbindung mit Ländtheilen zu treten, sich so ziemlich nur auf die Hälfte der ganzen Erdoberfläche beschränken dürfte, obgleich von der andern Hälfte, in so fern climatische Verhältnisse, wie in den nördlichen Polargegenden, dem organischen Leben feindlich sind, oder die Localität des nahe gelegenen festen Landes die freie Entwicklung desselben nicht verstatet, dasselbe eben so, (wenigstens direct,) verloren geht, als dieß in dem großen Theil der wirklichen Erdfeste, in Sandwüsten, Hochbergen, Sümpfen u. s. w. auch der Fall ist.

**Viertens.** Die Erdoberfläche, (Land und Meer in Verbindung,) ist nicht nur zufolge ihrer Umdrehung und der dadurch erhaltenen Doppelpole in zwei Hälften, als eine nördliche und südliche Hemisphäre, (jede einen Erdpol zur Mitte, den Aequator aber zum größten Theile hat,) geschieden, sondern die Erdfeste, oder das über das Meer sich erhebende feste Land, hat auch durch das Meer selbst eine natürliche Abscheidung ost- und westwärts erhalten. So bestimmt die Unterschiede der nördlichen und südlichen Breiten, mit den davon abhängigen climatischen Verhältnissen durch das erste Verhältniß gegeben sind; so fixirt ist auch das Verhältniß der Länge und mithin auch ein erster Meridian, auf den dann die übrigen bezogen werden. Bekanntlich wird die geographische Bestimmung eines ersten Meridians als eine willkürliche betrachtet <sup>79</sup>. Man wählte den durch die Insel Ferro gezogenen, weil man diese als die westlichste der Europäischen Inseln betrachtete, und fixirte ihn weiterhin dadurch, daß man ihm von dem genau gemessenen des Pariser Observatoriums einen Abstand von  $20^{\circ}$  westlich gab. Dieser Meridian streift zwar sehr nahe an dem westlichsten Punkte von Afrika, und also der Ostseite überhaupt herab, hat also in so fern, mit nur geringer Rectification, den Anschein eines natürlichen; aber er scheidet beide Erdfesten nicht, indem nordwärts die zur Westseite gehörige Insel Grönland über  $10^{\circ}$  östlich über ihn hinausreicht, der noch nördlicher unbekannte Theil von Amerika auch wohl noch bedeutender westwärts sich erstrecken könnte. Die Trennung der Ost- und Westseite in der Straße Anian aber ist erst eine Entdeckung der neuern Zeit, daher sie bei der in eine frühere Zeit fallenden Bestimmung der Längengrade nicht benutzt werden konnte. Indessen bietet sie sich dafür so ungezwungen dar, daß sie wenigstens für die Theorie der Erdoberfläche Beachtung verdient, wenn auch bei der so verbreiteten Annahme der Längenbestimmungen, nach jenem willkürlichen Principe, und den mit Reduction auf andere bekannte Maße verbundenen Weitläufig-

keiten und Schwierigkeiten die Benutzung derselben zu einem practischen Behuf sich schwerlich erwarten läßt.

Ein die Straße Anian durchschneidender Meridian ist nämlich der einzige, der von einem Pol zum andern ganz über das Meer wegstreicht, (etwa eine oder die andere Insel an der Grenze des Rantshatkalischen Meeres, oder eine vereinzelte Coralleninsel des stillen Meeres oder der Südsee und dann die noch ganz unbekannten Polarregionen ausgenommen, unter deren ewigen Eisdecken sich etwa auch noch eine oder die andere Erdspitze erheben könnte.) Fragt man aber, in welcher Stelle der Straße Anian, an der Ostküste Asiens in der Mitte der Meerenge, oder auf der Westküste von Amerika ein Meridian als ein naturgemäß erster zu ziehen sei; so scheint der vorherrschende Charakter der Amerikanischen Westküste, die dem Hauptzuge nach sich als Berghöhe zeigt, und steil ist, während die Ostasiatische Küste sich, wie ihre zahlreichen Ströme und vorliegenden Inseln beweisen, allmählig verslacht, dafür zu sprechen, daß das Prinz Wallis = Cap in Nordamerika, dieses aber, um einen festen Punkt zu erhalten, nicht an seinem Fuß, wo es das Meer bespült, sondern in seiner Höhe, die Bestimmung gebe, eben so wie auch in Flüssen nicht die Mitte, sondern die dem steilern Ufer gewöhnlich zugekehrte Tiefe, als die Stromlinie betrachtet wird. Dann aber würde dieser Meridian, (in so fern nicht die bisherigen Messungen der Länge des Prinz Wallis = Caps noch erheblichen Rectificationen unterworfen sind,) so ziemlich dem 210ten von der Insel Ferro an entsprechen.

Vergleichen wir nun mit diesem die sich darnach ergebenden Hauptmeridiane, nämlich den ihm entgegengesetzten und die östlich und westlich von beiden in gleichen Weiten, (in  $90^\circ$ .) abstehenden; so finden wir in allen diesen Charaktere, die sie vor andern auszeichnen, und unsere Aufmerksamkeit verdienen. — Der ihm entgegengesetzte mittlere, (der 30ste nach gewöhnlicher Rechnung,) ist nämlich der, der Europa, in so fern es durch die ihm eignen Mittelmeere in einem nähern Zusammenhange steht, ziemlich gleichmäßig in ein östliches und westliches theilt, indem er von der Westseite von Spitzbergen nördlich herab, in der Richtung des Norwegen und Schweden theilenden Rölgebirges, zwischen den die Ostsee zu einem geschlossenen Meere machenden Meerengen, mitten durch Deutschland, (über die Gegend von Rostock, Leipzig, Regensburg,) geht, über die Tyroler Alpen, auf der Westseite des Adriatischen Meeres, da, wo, (unter  $45^\circ$  nördlicher Breite,) der Po seinen Ausfluß hat, sich fortzieht, und dann, indem er über die Gegend von Rom sich fortsetzt, Italien durchschneidet, auf der Westseite von Sicilien und südlicher dann über Afrika wegstreicht, welches er in seinem nördlichen Theile, auch östlich und westlich in zwei ziemlich gleiche Hälften theilt, südlich aber, nachdem nahe unter dem Aequator die südwestliche Küste von Afrika sich über ihn zurückzieht, in dem vorspringenden Cap Negro begrenzt. — Die von beiden, (dem ersten und dem gedachten mittlern,) Meridianen gleichweit, und zwar auf dem Aequator und den Parallelkreisen desselben gemessen, um Ein Viertel des Erdkreises abstehenden Meridiane haben das Gemeinschaftliche, daß sie beide die Isthmen der Erdfesten, der westliche, (unter  $300^\circ$  Länge nach gewöhnlicher Rech=



nen) den wirklichen Isthmus von Amerika in der Gegend seines  
 fachen Ueberganges, der östliche, (unter  $120^{\circ}$  Länge nach gewöhn-  
 licher Rechnung,) den durchbrochenen Asiatischen Isthmus, oder die  
 Spitze von der Halbinsel Malacca und die Insel Sumatra, und  
 den Isthmus in der Gegend seines nördlichen Ueberganges durch-  
 schneiden; daß jener, indem er den Aequator durchschneidet, in dem  
 All Quito, nicht weit von den mächtigen Gebirgshöhen der Cordil-  
 leras, dem Chimborasso u. s. w. vorbeigeht, dieser aber ebenfalls in  
 der Gegend seines Durchschnitts mit dem Aequator, wie dort über  
 den vulcanischen Boden streicht, und den mächtigen Berg Ophyr zur Seite  
 hat. Ueberdies theilt der westliche Meridian die Westfeste eben so,  
 wie sie in einen nördlichen und südlichen Theil zerfällt, so auch west-  
 und östlich in zwei einander nicht sehr ungleiche Hälften, deren  
 erster der größte Theil von Nordamerika, deren letzterer aber der  
 größte Theil von Südamerika zufällt, welchem er zugleich in seinem  
 Verlauf in die Südspitze ziemlich nahe zur westlichen Begrenzung dient.  
 Der östliche Meridian dagegen ist besonders dadurch charakterisirt,  
 daß er in Nordasien ziemlich nahe da eintritt, wo das Land, und also  
 die ganze Westfeste, (in dem Vorgebirge Taimur,) dem Nordpol am  
 nächsten gerückt ist, von wo aus er Nord- und Mittelasien ebenfalls  
 in zwei ziemlich sich gleiche Hälften west- und ostwärts trennt.  
 Fünftens. Stellen wir einen Erdglobus so auf, daß  
 er auf dem angeedeuteten mittlern Meridian, ( $30^{\circ}$  der Länge,) an  
 gleich der  $45^{\circ}$  nördlicher Breite der höchste Punkt ist;  
 so finden wir in der hiernach zur Ansicht kommenden  
 Erdhemisphäre bei weitem am meisten von der zum  
 organischen Gesammtleben geeigneten Erdoberfläche  
 freient. Denn außer einem auf der Südwestseite zum Atlantischen  
 Meere, und einem zweiten auf der Südostseite zum Indischen Meere  
 erhebenden Theile des Weltmeeres, und der nördlich jenseit des  
 Aequators, unter dem entgegengesetzten Meridian noch sich heraufziehen-  
 den nördlichsten Einbiegung des stillen Meeres, ist dann die vorlie-  
 gende Erdhemisphäre nichts als festes Land mit Mittelmeeren und  
 Meeresbuchten. Kam es bloß darauf an, der Erdkugel so eine  
 Stellung zu geben, daß der möglichst größte Theil des wirklichen fe-  
 sten Landes über den Horizontalkreis sich erhob; so müßte unter  
 demselben Breitengrade die Kugel ostwärts noch um  $10 - 15^{\circ}$  ge-  
 dreht werden, wo alsdann nicht der Deutschland, sondern der Frank-  
 reich oder Großbritannien und Spanien in ihrer Mitte durchstreichende  
 Meridian der höchste werden würde. Hier hebt sich nämlich westlich  
 von der Westseite von Nord-, und besonders von Südamerika mehr  
 über die Horizontalsfläche, als östlich von den Insularländern der  
 Ostseite von Asien, und selbst der Küste dieses Welttheils sich darunter  
 hebt. Es haben aber die meist sterilen Landstriche des westlichen Ame-  
 ricas für das allgemeine organische Leben bei weitem die Bedeuten-  
 heit nicht, als die Inselgruppen und Küstenländer des östlichen Asiens,  
 und es verdient also in dieser Hinsicht der bemerkte Standpunct gar  
 wohl als Höhe der auf diese Weise unterscheidbaren Landhemi-  
 sphäre betrachtet, und diese darnach von der entgegengesetzten  
 Meerhemisphäre unterschieden zu werden.

Hierbei ist aber nicht aus den Augen zu verlieren, daß die Natur ob ihr gleich überall mathematisch bestimmbare Principien zu Grunde liegen, doch diese gewöhnlich nicht streng beobachtet, und in räumlichen Formen so wenig, als in Zeitabschnitten, ganz genau bestimmte Grenzen und Maße befolgt, sondern immer nur durch Ausgleichung von Differenzen dem allgemeinen Gesetze der Gleichmäßigkeit genügt. Es würde daher vergeblich seyn, auch nur einen auf den Raum von wenigen Meilen beschränkten Standort der Erdoberfläche ausfindig machen zu wollen, auf den allein man, als auf ein gemeinschaftliches Centrum, das übrige Leben auf der Erdoberfläche beziehen wollte<sup>80</sup>. Eben so wenig kennt die Natur eine strenge Scheidegrenze einer zwiefachen Erdhemisphäre, die nur der Mathematiker mit Schärfe abscheldet, und es kann für das allgemeine Zusammenleben ganz gleichgültig seyn, ob von einem genommenen Standpuncte aus sich ein oder der andere entfernte Erdtheil um einige Grade noch über die Horizontalsfläche erhebt oder unter sie senkt. Nur in großen Abständen treten auch hier erst die Differenzen merkbar hervor.

Was also von dem zuvörderst nur nach Messungen bestimmten Standort der Landhemisphäre gilt, gilt auch von einem großen Bezirk um ihn herum, innerhalb dessen die dort sich darbietenden Verhältnisse gar nicht, oder doch nur unbedeutend wechseln. Diese Verhältnisse sind aber theils climatische, oder der für das Pflanzen- und Thierleben so bedeutende Vortheil einer mittlern Temperatur, theils locale, wohin dann besonders der Abfluß eines Stroms und eine tiefe Meeresbucht zwischen sich vorstreckenden Küsten gehört. Da nun diese Vortheile den mehesten Ländern des mittlern Europa's zukommen; so sind auch diese in Gesamtheit, mehr oder minder, als ein Mittelland zu betrachten, gegen das die übrigen Ländermassen ungefähr ein und dasselbe Verhältniß haben.

Nehmen wir aber nun eine sonach bestimmte, vom  $30^\circ$  der Länge und  $45^\circ$  nördlicher Breite ausgehende mittlere Gegend der Landhemisphäre an; so kann, wenn man den durch den Meridian bestimmten Nord- und Südpunct zu Grunde legt, ein größter Halbkreis unterschieden werden, der jenen rechtwinklich durchschneidet, also als Ost- und Westgegend anhebt, aber der Natur der Kugelform nach südwärts herabsteigt, und in dem Ost- und Westpuncte des Aequators von jenem mittlern Meridian aus, sich unter den Horizontalkreis herabsenkt. Es sind aber diese Ost- und Westpuncte des Aequators dieselben, welche auch nach jener Bestimmung des mittlern Meridians der östliche und der westliche Meridian durchschneiden, nämlich in Osten der  $120^\circ$  des Aequators auf der Insel Sumatra etwas nordöstlich vom Berge Ophyr, und in Westen der Punct des Aequators unter  $300^\circ$  Länge, oder ungefähr das Thal von Quito, also in der Nähe der Erdgegenden, die man im allgemeinen auch als Ost- und Westindien bezeichnet. Zwischen den hiernach auf dem Horizontalkreis des Erdglobus sich ergebenden vier Puncten, (Nord-,

<sup>80</sup>) In diesem Sinne ist bei ältern Schriftstellern häufig von einem Nabel oder einem mittlern Puncte der bewohnbaren Welt die Rede, den die Griechen in Delphi, die Jüdischen Gelehrten und Kirchenväter in Jerusalem zu finden glaubten. Vgl. Cellarii notitia orbis antiqui, T. I. c. 4 de medio, s. umbilico terrae habitabilis.



„Süd- und Westpunct,) kann man eben so viele mitt-  
Puncte, als Nordost-, Südost-, Südwest- und Nord-  
punct, unterscheiden. Indem nun zwei sich rechtwinklich in  
einanderkreuzenden Höhenpunct der Landhemisphäre, schneidende Halbkreise  
dieser Puncten auslaufen, werden dadurch vier Segmente unterschie-  
den, welche von jenem Standpuncte aus als der Norden, der Osten,  
Süden, der Westen des Europäischen Mittellandes bezeichnet werden  
können. Haben wir nun hierbei mehr die natürlichen Landabtheilun-  
gen als streng mathematische Bestimmungen vor Augen; so würden  
die Hauptlandmassen in Bezug auf das Europäische Mittelland  
folgende Zusammenstellungen haben. Dem Norden würden zufallen:  
das von der Nord- und Ostsee bespülten Europäischen Küstenlande,  
etwas von ihnen aus nordwärts liegt, sodann auf der Ostseite  
nördlich von dem Carpathischen Gebirge, dem Höhenzug von da  
zum Wolchonski-Lies und zum Ural, westlich vom Ural und nördlich  
von dem nördlichen Gebirgszug der großen Mongolei, und dem Höhen-  
zug im Süden des Amurgebiets, ingleichen nördlich von der Halbinsel Co-  
rea bis zur Nordseite des Japanischen Meeres gelegene Landtheile;  
auf der Westseite aber, von der Halbinsel Californien an, alles was  
Nordamerika von dem Bergzug zwischen dem Colorado und dem  
Mississippi, hierauf von dem Gebiete des St. Lorenzflusses an, mit  
einschluß desselben, ferner was von Newfoundland an bis an die Süd-  
küste von Großbritannien nördlich liegt. — Dem Osten würden zu-  
fallen: der von dem Carpathischen Gebirge und dem Höhenzug nach  
dem Wolchonski-Lies nördlich begrenzte Theil von Europa, ganz  
bis an die Berghöhe vom Ural zu dem Musag und den die  
Mongolei nördlich begrenzenden Höhenzug, ferner bis an das Amur-  
gebiet und den nordwärts von der Halbinsel Corea in die Nordseite  
des Japanischen Meeres anlaufenden Höhenzug, südwärts aber bis  
zur Landenge bei Suez, mit Einschlus der jenseit des Aequators lie-  
genden Insularlande, Neuholland und die Inseln des stillen Mee-  
res. — Dem Süden würden zufallen: die südlichen von dem Mit-  
teländischen Meere bespülten Europäischen Küstenlande und Inseln,  
nördlich von dem Adriatischen Meere an, dann ganz Afrika mit den  
dort gehörigen Inseln. — Dem Westen endlich würde zufallen:  
die westliche Küste von Europa von der Meerenge bei Gibraltar an,  
bis Südamerika, die Westindischen Inseln, der Isthmus, und von  
Südamerika, was dem von der Halbinsel Californien bis zur Mün-  
dung des St. Lorenzflusses und nach Newfoundland streichenden Hö-  
henzug südlich liegt.

Sechstens. Indem wir besonders in das Auge fassen,  
welchen Formen die die Landhemisphäre constitui-  
renden Erdtheile das Mittelland von Europa umge-  
ben, finden wir durchaus die kesselförmige Form  
vorherrschend, aber nicht sowohl die sich gleichförmig abrundende,  
sondern, mit Vorherrschaft linearer Richtung, die elliptische, aber  
auch diese nicht in einfachen geregelten Krümmungen, sondern man-  
nigfaltig sich nach mehreren Seiten zu biegend und schlangenför-  
mig gezogen, dabei theils sich erweiternd, theils sich verengend, in  
vielfachen mannigfaltigsten Verschiedenheiten, so daß jedoch die Grundform

der Ellipse stets die herrschende bleibt. Diesen Typus einer verzogenen Ellipse, die dann auch wegen dieser Verzogenheit wieder aus mehreren Ellipsen zusammentretend betrachtet werden kann, wie ihn z. B. die Gestalt des Mittelländischen Meeres, so wie die jedes geschlossenen Sees, auch die Form eines jeden Flußgebiets, wenn deren Grenzen auf einer Karte angedeutet sind, mehr oder minder vor Augen stellt, sehen wir sich wiederholen, so oft wir in den uns nächsten Umgebungen die Formen der Thäler, in denen Flüsse ihren Lauf haben, so wie von Auen beachten, die eine bemerkliche Abdachung nach sich durchziehenden Bächen, ja auch nur Absenkungen in Niederungen und Gräben haben, durch die das Regen- und Schneewasser von ihnen abfließt. Wo eine solche Senkung in größern Strecken nicht Statt hat, wird der Boden, sich selbst überlassen, und nicht (wie beim Garten- und Ackerbau,) in besondere Pflege genommen, der Cultur unfähig, vertrocknet, und wird zur Sandwüste, oder verschlemmt und wird zum Sumpf, je nachdem Mangel oder Ueberfluß an Feuchtigkeit vorhanden ist, oder der Boden höhere oder tiefere Lage hat. Wer mit der Natur des ihn umgebenden Landes sich bekannt machen will, darf zuvörderst nicht übersehen, in welchem Bezug der Boden zu den nächst gelegenen Höhenzügen und Flußgebieten steht, in welcher Art er sich aushöhlt, und in den höhern Stellen und Rändern mit scharfer Begrenzung, oder auch unmerklich sich verflachende Ellipsen bildet, wie diese sich wenden, theilweise geöffnet oder geschlossen sind, in einander übergehen u. s. w.

Siebentens. Die vorherrschende elliptische Form in der Bildung der Landhemisphäre ist zuvörderst in den Hauptumrissen hervortretend, in denen die sämtlichen Erdmassen als Ein Ganzes sich darstellen. Wir haben unter der vorherigen Nummer die Höhenzüge in ihren Streichen der Länge nach dargestellt, aber auch nicht unberührt gelassen, daß die Seitenzüge, welche von jenen Hauptzügen abgehen, öfters eben so hervortretend sind, als jene selbst. Betrachten wir aber jetzt jene Höhenzüge mit den bedeutendsten Seitenzügen vor dem oben bezeichneten Standpunct, in der Mitte von Europa aus, so können wir zuvörderst ein Ringgebirge unterscheiden, welches sich, mit nur theilweiser Unterbrechung, durch eintretende Mittelmeer um jenen Punct herumzieht, und von dem aus, theils convergirend, wieder Gebirgs- und Landhöhen um engere, theilweis nicht minder unterbrochene, Kreise bilden zu helfen, nach innen, theils divergirend andere nach außen gehen, die am Rand der allgemeinen Landhemisphäre sich unter die Meeresfläche ziehen.

Dieses Ringgebirge ist besonders in dem langen Zuge am hervortretendsten, der von dem Prinz Wallis-Cap auf der Westseite von ganz Nordamerika an der Straße Anian beginnt, und mit bogenförmiger Einbiegung gegen die Mitte des ganzen Kreises in südöstliche Richtung über den Isthmus weg, auch auf der Westküste von Südamerika bis an die Bucht von Arica verläuft. Hier aber verläßt er den Haupthöhenzug und schlägt sich ferner einwärts um das große Flußgebiet des Amazonenflusses herum, geht bei dem Cap St. Ro-



unter die Meeresfläche, aus welcher es fortstreichend, (hier mit ersten und längsten Unterbrechung,) erst wieder in dem grünen Vorgebirge auf der Westküste von Afrika sich erhebt, von wo aus der Seitenhöhenzug durch das mittlere Afrika, wahrscheinlich nördlich vom Niger, bildet, und über den Quellen des Nils auf den Haupthöhenzug von Afrika auf der Ostseite gelangt. Hier findet sich eine nur kleine Unterbrechung, durch die Meerenge Babel ab Man. Von hier aus geht der Ringbergzug, nun in nordöstlicher Richtung, über die südlichen Gebirge Arabiens, und das dritte Mal, nur auf kurze Strecken, durch die Straße von Ormus unterbrochen, in die Gebirge des südlichen Persiens über, von wo er dann durch das Caspische Meer den Haupthöhenzug der Ostseite über den Kaukasus und die nördlichen Gebirge der Mongolei erreicht, von wo er, immer nördöstlich streichend, endlich in das Asiatische Ostsee auslaufend, das vierte Mal nur durch die Straße Anian unterbrochen, hier wieder den Anfangspunct dieses Zugs erreicht. Innerhalb dieses großen Bergtringes können also nun wieder kleinere, nur geringen Zwischenräumen unterbrochene, Umfassungen von Landmassen unterschieden werden, zu denen jene größeren Züge Seitenzüge werden, so der Höhenzug, der über den kleinen Flüssen der Nordafrikanischen Küste, und das Nilgebiet umfassend, zur Landenge von Sues zurückgeht, von da über den Caucasus zur Landhöhe zwischen der Wolga und dem Don nordwärts steigt, und auf den Europäischen Landrücken übergeht, auf welchem er westwärts wieder über die Meerenge von Gibraltar in jenen Zug überseht; oder auch der Zug, der nordwärts vom Europäischen Landrücken zu den Kältegebirgen steigt, auf diesen die Ostsee, und durch Uebertritt auf die nördlichen Inseln der Großbritannischen Inseln auch die Nordsee theilweise umfaßt, von wo er dann, als von der Meeresfläche aus, wieder nach dem Cap Finisterre in Spanien zurücktretend betrachtet werden kann. So lassen sich auch die Seitenzüge des Amerikanischen Weltlandes, die in Newfoundland und in das Cap de Roque auslaufen, mit den Seitenzügen der Westeuropäischen Küste und Afrikanischen Westseite, bis zum grünen Vorgebirge, als ein nur in weiten Strecken unterbrochener elliptischer Höhenzug betrachten.

**Achtens.** Die vier besondern Abtheilungen der Erdhemisphäre, welche, nach dem oben gedachten Standpunct, nach Norden, Osten, Süden und Westen unterschieden werden, haben jede ihre besondere Eigenheiten, die erhebliche Unterschiede begründen. Der Norden nämlich ist nur bis zu einer gewissen Grenze zugänglich, und ewiges Eis in den höhern Polgegenden, und die kurze Dauer der Jahreszeit, in der die nördlichen Gewässer, selbst unter den geringern Breitengraden, befahren werden können, heben so gut wie ganz die Vortheile auf, welche das Eismeer als ein Mittelmeer darbietet. Zu den über den Nordpol hinziehenden Landen, welche, wenn die Polgegenden zugänglich wären, auf dem nämlichen Wege in verhältnißmäßig kurzer Zeit erreicht werden könnten, ist nicht anders, als durch große Umwege über Ost- oder Westlande Uebertritt zu gewinnen. — Der Süden gewährt, wegen der großen Aus-

dehnung der Landstrecken und der verhältnißmäßig geringen Abdeckung der Mittelafrikanischen Lande, in den Aequatorialgegenden auch nur theilweise Zugänglichkeit, und ist jenseit der gemäßigten Zone, wegen überwiegender Hitze, eben so dem Leben feindlich, als der Norden es wegen Kälte ist. Jenseit der heißen Zone verstatte seine sich ausstreckenden Landtheile wieder Zugänglichkeit, und begünstigen organisches Leben; aber auch zu ihnen ist nur durch Umweg Zugang zu gewinnen. — Der Osten ist bei weitem der verbreitetste Landtheil, wo sich auch die Massen am dichtesten zusammendrängen und erstreckt sich in seinen Insularlanden weit in die entgegengesetzte Meerhemisphäre. — Der Westen dagegen unterscheidet sich durch die relativ weiteste Entfernung des größern Theils seiner Landmasse wegen eines hier eingedrungenen Mittelmeers von einer Mächtigkeit, der gleichen kein anderes, indem es bloß einzelne Landtheile einer Abtheilung sondert, irgendwo besitzt. Dagegen ist aber dieser Theil desto schärfer von der Meerhemisphäre abgeschnitten, und nur mit seiner Südennde in sie hinein ragend.

Neuntens. Alle bisher berührte Verhältnisse, die aus einfacher Contemplation der Erdoberfläche nach verjüngtem Maßstabe hervorgehen, führen zu der Wahrheit, welche also zugleich als Endresultat der vorigen angesehen werden kann: daß der Erdenformation, und namentlich der Abscheidung von fester Lande und Gewässern, und dem Zusammenseyn sowohl, als der Entgegenstellung beider, so zufällig unregellos dieß auch bei oberflächlicher Ansicht erscheint, ein Einheitsprincip, als Andeutung von Zweckmäßigkeit zu Grunde liege. Wenn wir uns aber in der ganzen Natur nach Gegenstände umsehen, worauf die Eigenheiten dieser Formation in Verbindung zusammen Bezug haben; so finden wir durchaus nichts als das Menschengeschlecht in seiner Gesamtheit, d. i. nicht allein die lebenden Generationen in ihren Lebensverhältnissen zu einander, sondern auch die vergangenen, gegenwärtigen, und noch zu erwartenden Geschlechter in ihrer successiven Entwicklung, so weit es vergönnt ist, diese beobachtend zu verfolgen. Die allgemeine Länder- und Völkerkunde, wie die Geschichte der Menschheit überhaupt, findet also allein in der Anerkennung obiger Resultate, so wie in deren fernern Verfolgung wozu so reicher Stoff dargeboten ist, eine naturphilosophische Begründung. Zugleich geht daraus hervor, wie beschränkt die Ansicht von der Natur des Menschen bleibt, wenn er für sich, unlosgerissen aus der großen Kette ins Auge gefaßt wird, die alle lebende Geschlechter des ganzen Erdkreises umschlingt, und diese wieder an die vergangenen und die künftigen Generationen anknüpft und so im Raum wie in der Zeit allumfassend sich darstellt.

Beziehen wir nämlich das, was wir von einzelnen Völkern und Nationen, ihren Verfassungen, Sitten und Gebräuchen wissen, so was die bisherige Geschichte uns über den Gang der Entwicklung des menschlichen Geschlechts in der mannigfaltigen Gestaltung des Menschen- und Völkerlebens gelehrt hat, auf obige Resultate der Erdenformation; so wird eine Menge von dem, was einzelne Natio-



und Völker charakterisirt, so wie der Gang der frühern und  
 ern Geschichte der Menschheit, so weit uns solche überliefert wor-  
 ist, größtentheils in denselben befriedigende Erklärung finden,  
 auch, (was gar nicht zu erwarten ist,) die Einsicht der Noth-  
 igkeit des uns historisch Gegebenen, nach seiner ganzen Ausdeh-  
 und Entwicklung, darans nicht hervorgeht, indem zur Gestal-  
 der Schicksale einzelner Völker ja noch eine Menge von Be-  
 mungen hinzutritt, die zum Theil selbst der Möglichkeit, davon  
 Licht zu erlangen, entzogen sind. Denn wär dieß nicht, so müß-  
 wir den Gang der Weltgeschichte mit derselben Präcision vorher-  
 können, wie der Astronom Phänomene am Sternenhimmel in  
 aus bestimmt, die nothwendige Folge seines; auf die Geseze der  
 regung der himmlischen Körper gegründeten Calculs sind. So  
 es aber moralische Wahrheiten gibt, die, ob sie sich gleich allem  
 entziehen, doch ewig sich gleich bleiben, weil sie in der Natur  
 menschlichen Geistes und Gemüths gegründet sind; so gibt es  
 gewisse historische Wahrheiten, die nicht bloß äußere Beglaubigung  
 verworflicher Zeugnisse, sondern innere Versicherung in der Natur  
 (Erdenlebens) haben, und daher auch mit unwesentlichen Verschie-  
 reiten, welche Raum und Zeit darbieten, sich immer gleichmäßig  
 erhalten,

In diesem Geiste hat man erst in neuerer Zeit angefangen, die Ge-  
 chichte zu bearbeiten, besonders seit Herder in seinem unsterblichen  
 ke zuerst die Geschichtsforschung an das anthropologisch-physiolo-  
 gie Sordium knüpfte. Die Aufgabe ist: das in der Geschichte zu-  
 g Erscheinende aus in sich begründeten Gesezen der Natur und  
 menschlichen Daseyns als nothwendig bedingt abzuleiten. In  
 weit die hierauf gerichteten Bemühungen bisher befriedigend ge-  
 ern sind und was sich ferner von denselben erwarten läßt, muß hier,  
 hohes Interesse auch dieser Stoff für die Naturkunde des Men-  
 na hat, unerörtert bleiben. Folgende wenige und zunächst sich  
 bietende Hauptsätze der Geschichte des Menschen- und des Völker-  
 ums, in denen besonders die früher aufgestellten Resultate ihre An-  
 dnung finden, mögen indessen zum Schluß gegenwärtigen Artikels noch  
 knüpfepuncte darbieten, um jene Untersuchungen weiter zu  
 folgen, und werden wenigstens darüber keinen Zweifel lassen, in  
 cher engen Verbindung die Geschichte und die Naturlehre des Men-  
 mit einander stehen.

Der Inbegriff dessen, was wir Weltgeschichte nennen, läßt uns  
 die frühern Schicksale bei weitem der mehrsten bekannten Völker  
 völliger Ungewißheit. Ueberhaupt kennen wir nur ein Bruch-  
 stück von dem, was auf einem nur sehr beschränkten Erdenraume  
 zutrug. Verfolgen wir aber diese geschichtlichen Fäden; so führen  
 uns alle, wir mögen von irgend einem gewählten Standort der  
 ausgehen, auf jenes Hochland Asiens zurück, in dem die Haupt-  
 höhenzüge, an welches alles übrige Hochland sich, wie an den  
 Stamm eines Gerippes anlegt, einander kreuzen. Unter den so vie-  
 Problemen, welche die Urgeschichte des Erdkörpers zu lösen dar-  
 et, (oder die eigentlich selbst nur die Grundlage der Zusammenstel-  
 ung von Möglichkeiten sind, der wir den Namen Urgeschichte ge-

ben,) gehört auch das des Ursprungs des gegenwärtig über den Erdbreis verbreiteten menschlichen Geschlechts. Wie kamen die ersten Menschenstämme und Völkerschaften in das Hochland Asiens? Verbreiteten sie sich einzig von hier aus in die andern Welttheile? Afrika hat sein Mondgebirge, sein Eupata, sein Gebirge Kong, Amerika seine Anden; beide Welttheile haben ihnen eigenthümliche Bewohner von bestimmten Charakteren; blieb vielleicht aus verbreiteten Ueberschwemmungen des niedrigeren Landes auf den Asiatischen Höhen ein Menschenstamm erhalten, warum nicht auch auf jenen Höhen, die theilweise sich gleich mächtig erheben? Wer könnte sich unterfangen hierüber abzusprechen, und die Möglichkeit zu läugnen! Indessen leitet uns der Faden der Geschichte doch einzig nur zu den Asiatischen Gebirgen hin; diese haben zugleich vor jenen das Auszeichnende der Ausdehnung in der Breite, und einer der Vegetation, wie des animalischen Leben höchst günstigen Lage, und die Ableitung aller Menschenrassen aus einem einzigen Menschenstamme hat wenigstens keine physiologischen Schwierigkeiten, da die Mächtigkeit der climatischen Einflüsse auf die Bildungskräfte der Natur so vielfach sich bekundet. Dazu kommt, daß, nach Pallas<sup>31</sup>, alle Thiere, die in den Nord- und Südländern zahm sind, (den Dromedar ausgenommen,) in dem gemäßigten Clima des mittlern Asiens sich finden; ferner, daß in den Gebirgsländern des mittlern Asiens nicht nur unsere Getreidearten wild wachsen, sondern auch die vorzüglichsten Früchte der Erde, der Weinstock und die Olive, Citronen, Feigen, alles Obst, Castanien, Nüsse u. s. w. von diesen Gegenden aus sich erst über den übrigen zu ihrer Cultur fähigen Erdbreis verbreitet haben. Daß aber die spätern, in der Weltgeschichte unterschiedenen Völker wirklich in ihren Stämmen von Mittelasien ausgingen, wissen wir bei sehr vielen aus geschichtlichen Documenten, bei den entfernteren, und wo der Faden der Geschichte nicht völlig ausreicht, wie bei den Negernationen des mittlern Afrika's, oder den alten Bewohnern Amerika's, folgern wir es daraus, daß wir von den Asiatischen Nationen zu diesen allmähliche Uebergänge finden, wie zu den Negern durch die Aegyptier, die Abyssinier u. s. w., zu den Amerikanern durch die Bewohner der Nordwestküste von Nordamerika u. s. w. Auch bleibt es höchst bemerkenswerth, daß nicht nur die ältesten cultivirten Sprachen Asiatische, sondern daß in Asien besonders lauter einsylbige Sprachen zu Hause sind, oder auch die Worte mehrerer Sylben doch immer auf wenige Wurzeln von nur wenigen Buchstaben zurückgebracht werden können, so auch daß die Alphabete aller Sprachen Asiatischen Ursprung haben. Daß ferner alle Erfindungen ohne die der Mensch immer dem Thiere nahe gestellt bleibt, besonders der Ackerbau, die Viehzucht, von Hochasien ausgingen, daß hier zuerst Wissenschaften und Künste gepflanzt wurden, daß alle Religionen, die sich nicht bloß auf nationalen Uberglauben beschränken, in Asien ihre Begründung erhielten, daß hier zuerst sich Staatsverfassungen vernunftmäßig ausbildeten, alles deutet darauf hin, daß Hochasien die Wiege des jetzigen menschlichen Geschlechts sei.

31) Bemerkungen über die Berge, in den Beiträgen zur physikal. Erdbeschreibung 3. B. S. 250, übersetzt.



darf aber hier nicht ein einzelnes beschränktes Gebirge ins Auge faßend, und überhaupt ein Gebirge nicht in seiner Höhe, sondern bloß in dem Abhänge und in den von ihm umschlossenen Thälern, in denen allein dem allgemeinen Leben förderlich ist, und dann jene Kette von Gebirgen, die sich, nach obiger Darstellung, um den Mustag, auf der Durchschnittpunct der beiden Haupthöhenzüge des Festlandes fällt, herum lagert, und das von diesen umschlossene Hochland, aus dem aus die großen Asiatischen Ströme nach allen Richtungen das tiefere Land sich herabsenken.

In dieser Gegend ist das Nomadenleben zu Hause. Die älteste und die neueste Geschichte kennt hier keine andern, als herumwandernde Völker, die in einfacher Lebensweise, und im Genusse der Vorzüge eines Berglandes in einem milden Clima, sich in ihren Generationen stark und kräftig erhielten, aber zugleich in der Ueberfülle der Bevölkerung, für welche der Boden nicht ausreichenden Unterhalt darbietet, zu unterschiedlichen Zeiten nach allen Richtungen hin strömten. Alle die weitverbreiteten Völkerschaften, die die ältere Geschichte, als Scythen, die neuere unter dem nicht minder schwanzigen Namen Tartaren aufstellt, kamen aus einer und derselben Gegend, und die Spur leitet, so weit sie sich geschichtlich verfolgen lassen, immer bis zu den das Gebirge Mustag umgebenden, und an den Füße desselben sich bildenden Steppen. Eben so bestimmt ist auch der Unterschied, den zu allen Zeiten die ost- und westwärts Mustag wohnenden Völkerschaften zeigten und noch zeigen, nicht bloß aber auch der der nördlich und südlich von da aus sich verzweigten Nomadenvölker, indem in weitem Abständen nach allen Richtungen hin die Charaktere der Nationen in den schärfsten Abgrenzungen getreten. Nach dieser rein geographischen Abscheidung haben sich die unterschiedlichen Hauptverschiedenheiten von Völkerschaften gebildet, die man als Menschenstämme, oder Menschentracen, (dieser Artikel,) unterscheidet, welche, jedoch, hier bloß in Hinsicht auf Ursprungs Gegenstand unserer Betrachtung sind.

Unvörderst tritt jener Unterschied der Caucasischen und Mongolischen Bildung schon in kurzen Abständen von dem Grenzgebieth des Asiatischen Mittellandes und zwar unter gleichen Breiten hervor. Die übrigen Hauptunterschiede der Malaischen und Ethiopischen, (Neger-) Bildung, so wie der Amerikanischen, (welche wahrscheinlich originär eine nördliche ist,) scheinen die Folgen climatischer Verhältnisse zu seyn.

Betrachten wir aber, wenn auch nur in ganz allgemeinen Umrissen, die verschiedenen Hauptvölker selbst, welche die Geschichte aufstellt, welche noch jetzt nationale Charaktere haben, nach der Lage der ihnen eingenommenen Erdgegenenden gegen das Asiatische Mittel-  
 13, so zeigen sich folgende merkwürdige Eigenheiten.

Im Osten von Mittelasien behaupten alle jene nur erst in neuer Zeit aus ihrer Dunkelheit getretenen nomadischen Völkerschaften, die in dem großen Bergkessel, dessen oben als der östlichen Hälfte im mittlern Hochlandes, der Ostseite gedacht wurde, heimisch, und denen die Mongolen, (im engeren Sinne des Wortes,) ein Haupt-

1) S. 710.

voll sind, die reinen Charaktere Mongolischer Bildung, (glattes Gesicht, kleine Augen, breite Nase, große Ohren, starkes Gelbbraune Farbe, dünner Bart u. s. w.)

Was der Mensch aber in dieser Erdgegend, unter Begünstigung des Bodens werden konnte, zeigen die Chinesen, die seit Jahrtausenden, auf derselben Staffel der Cultur, die fruchtbaren Flußgebiete der östlichen Abdachung Asiens von den Mongolischen Gebirgen, (von denen aus ihre Vorfahren längs der Ufer des Hoangho und Kiang sich herabzogen,) bewohnen, deren Reich bereits zu einer Zeit, als erst eine Europäische Völkergeschichte anhub, in sich ausgebildet und abgeschlossen war, und als ein alter Kiese unter den mannigfaltigen sich wandelnden übrigen, gegen ihn meist nur Zwergstaaten da ältern, der mittlern und neuern Zeit sich erhielt, auch in seine Innern nie anders, als durch Stämme gleicher Herkunft erschüttert wurde. Als veredelte Mongolen, nur in kleinerem Bezirk, erscheinen auch auf gleiche Weise die durch ihr Inselland begünstigten Japaner. Wenn wir aber der Ursache nachforschen, warum beide Nationen, bei allen Vortheilen ihrer Ausbildung, (die auch in ihnen je Selbstgenügsamkeit erzeugten, zufolge der sie andere Nationen eben so wenig aufsuchen, als sie ihnen überhaupt einen Werth zugestehen,) doch in allen ihren Einrichtungen, Künsten und Wissenschaften stehen geblieben, wo sie schon vor Jahrtausenden waren, so finden wir diese in der Lage dieser Staaten, besonders von China, (von der Japan doch nur ein sich anfügender Theil ist,) zwischen unfruchtbaren, die Bewohner reicher Erdgegenden wenig anlockenden Wüsten oder Steppenlanden und dem großen Weltmeere, an dessen Saum das Chinesische Reich, mit den vorliegenden Japanischen Inseln, hingestreckt ist, und in dessen Tiefe alle Ostasiatischen Bergzüge auslaufen, so daß höchstens nur ein Verkehr mit den nächsten Küstenlanden sie in eine natürliche Verbindung mit der übrigen Welt setzt, dessen sie aber selbst auch, bei dem innern Reichthum ihres Bodens, größtentheils entzathen können.

Im Süd ein von Mittelasien unterscheiden wir besonders drei Landstrecken, in deren Zug sich auch die Urbewohner Asiens verbreitet haben mögen: a) Auf der südöstlichen Landstrecke, jenseit des Gebiets des Ganges und Brumaputers, welch in die heiße Zone hineinreicht, aber sich (als hintere Indische Halbinsel) verschmälernd hinauszieht, haben früher Mongolische Völkerschaften den längs der Ufer des Arakan, des Ava, des Peja, des Siam, der Cambaiva, und den Küsten von Sunkin und Cochinchina wohnenden Hinterindischen Stämmen ihre Entstehung gegeben, die jetzt von der Chinesisch-Mongolischen den Uebergang zu Malaischer Bildung machen (welche durch schwarzbraune Farbe, großen Mund u. s. w. die Negerbildung nahe gestellt ist,) die besonders in den Malaien, ob den Eingebornen der Halbinsel Malacca hervortritt, und von da auf den Bewohnern aller östlichen und südlichen Eilande gemein ist, die ihrer Lage nach Asien zugehören, ja die in unverkennbaren Spuren an allen Insulanern der Südsee sich bemerkbar machen; die außerdem noch in Sprache, Sitten u. s. w. bis auf die Bewohner der entfernten Sandwichinseln, die gemeinschaftliche Abkunft



Asiatischen Völkerstämmen Malaischer Herkunft beurfunden. Die mittlere südliche Landstrecke Asiens, längs der mächtigen Indischen Ströme Ganges und Brumaputer jenseit, und des Indus jenseit der ebenfalls flussreichen und in die heiße Zone hinein, (nach indischen Indischen Mythe nach dem Zuge eines in das Welt- abgeschossenen Pfeils,) sich verschmälernden vordern Indischen Insel, bis zu dieser selbst, in der mehr als in irgend einer Welt- sich die Vortheile des Clima's und der Lage vereinen, um der alles zu entlocken, was sie an reichen Lebensgütern in ihrem Bos birgt, ist schon in der Urzeit der Geschichte von den Völkern Asiatischen Hochgebirges in Besitz genommen worden, die dießseit jenseit des Mustangs sich in sie herabzogen, und insbesondere als Indus, als der älteste und am schärfsten nationalen Charakter habende Volksstamm, in der Veredlung ihrer Form wie ihrer Sitten, aber auch in der Verweichlichung ihres Körpers, die Uebermacht der Einflüsse der Milde des Clima's dieses Landstrichs auch an sich zogen,<sup>23</sup> aber auch bei allen Vorzügen ihres Geistes, in einem abgeschlossenen Leben, obgleich von den Völkern anderer Erdge- zeitig gekannt und aufgesucht; sich Tausende lang selbst hielten, und zugleich die Vortheile der Verbindung mit benachbarten Völkern, welche ihnen der Indische Ocean durch seine Buchten dar- bot, sich selbst zum Nachtheile, Fremden überließen. c) Die süd- liche Landstrecke ist von größerem Umfange, als die gedachte, in sie außer dem südlich von den Hindugebirgen, und dem Hüg- elzug von da bis zur Wüste Randan gelegenen Theil von Persien, seine Abdachung in dem Persischen Meerbusen hat, und der Insel Arabien, nach Aegypten übertretend, ganz Afrika befaßt. So fern in den nördlichen Theilen dieses Strichs Caucasische Bildung vorherrscht, da besonders Völker der Westseite des Mustangs auch in dieser Richtung verbreitet haben mögen, wird von den- in der Folge noch besonders die Rede seyn. Hier geben wir nur der südlichen, und also Afrikanischen Landtheile, in der Aethiopische Bildung herrschend ist, und die nicht, wie jene Striche, so wie auch die Nordafrikanischen Länder, durch Mittel- mit benachbarten Ländern in besonderer Verbindung stehen. Die reichen Negernationen vom Gambia- und Senegalstrom an, Niger in Nigritien, in Guinea und im Innern von Südafrika nicht nur unter sich mancherlei Verschiedenheiten, sondern auch in den nördlichsten Gegenden von Afrika, als Nubier, Ägyptinier und als Mauren, Uebergänge zur Caucasischen Bil- dung, wie sie auch als Kaffern, Buschmanen und Hotten- toten in dem Südtheile von Afrika, jenseit der heißen Zone, eben in der Negerbildung zurückweichen. Dieß und daß auch die Haut-

Die Milde dieses Clima's erstreckt sich bis in die höchsten Gebirgsgegenden, von denen die Gewässer des Indus herabfließen, wo das Thal Kaschmir's, das Indische Paradies, geheißen, viellecht selbst der heiligen Sage eines Para- dieses, als des Wohnsitzes, des noch von Schuld unbesetzten ersten Menschen- paars zu Grunde liegt. Nach Wernier (Aug. Reisen, 2. Th. S. 216.) wer- den noch jetzt die Kaschmiren für die geistreichsten und klügsten Indier gehalten; sie sind zur Poesie, Wissenschaft und Künsten gleich geschickt, und zugleich die wohlgebildeten Menschen, so wie ihre Weiber Muster der Schönheit.

schwärze unter den Malaien, (besonders als Negrillo's auf den Sunda-Inseln,) in gleichen Breitengraden, unter denen die Afrikanische Negerbildung hervortritt, aber in so einer Entfernung, daß schwerlich ein unmittelbarer Uebergang dieser Nationen zu einander in früherer Zeit Statt gehabt haben dürfte, spricht dafür, daß die Farbe, wie die ganze Constitution der Neger, Erzeugniß climatischer Verhältnisse sei. Uebrigens sind alle Nationen dieses weiten Länderstrichs theils durch Wüsten im Innern des Landes, theils durch die Entfernung der südöstlichen und südwestlichen Küsten von Afrika v. Landtheilen, zu sehr außer Gemeinschaft mit der übrigen Welt gesetzt, als daß auch sie früher, als sie von nördlichen Nationen aufsucht worden sind, ein weitgeschichtliches Interesse hätten erhalten können.

Im Norden von Mittelasien finden wir, eben so wie im Südje nachdem die Landstriche östlicher oder westlicher nördlich sich erstrecken, die Mongolische oder Caucasische Bildung vorherrschend; so Mongolische, besonders bei den Tungenen, in ihrer Verbreitung auf dem großen Amurgebiete, nördlicher bei den Kamtschadalen und den mehreren Sibirischen Völkerschaften in dem weitläufigen Landstriche, den die von den Mongolischen Gebirgen zum Eismeere strömenden großen Flüsse durchziehen, die Caucasische Bildung aber bei den Tartarischen Stämmen, (in neuerer Zeit Slaven,) die die seit des Urals sich bis an das Eismeer verbreitet haben. In den unter den höhern Breitengraden sich immer mehr verengenden Polargegenden hemmte die Kälte, wie alles thierische und vegetabilische Leben überhaupt, so auch die freie Entwicklung derjenigen Völkstämme, die ursprünglich wohl nur in diese feindliche Zone hineingedrängt waren, und zum Theil erst durch Acclimatisirung hier heimisch wurden. Wir finden eine den Polarvölkern unter allen Breitengraden gemeinsame Organisation, welche durchaus den Charakter eines zurückgedrängten Lebenstriebes hat, wiewohl nicht ohne verhältnißmäßige Reaction, welche dem Körper besonders Dauerhaftigkeit und Stärke verleiht, um den feindlichen Einwirkungen des Climats nicht zu unterliegen. Diese Organisation der Bewohner der Polargegenden ist mit nur geringen Modificationen bei den Lappeen, Samojeden, Korjaken und Tschuktschen, den mannigfaltigen Nationen auf der Nordwestküste von Nordamerika, den Eskimau und Grönländern auf der Ostseite von Nordamerika dieselbe. Sie ziehen sich um das Eismeer, das aber nach Norden selbst eine unüberschreitbare Grenze bildet, so weit die Landküsten bewohnbar sind, in einem Kreis herum. Jenseit dieses ganz Polarkreises von Nordasien aus heben aber die bewohnbaren, sehr weit ausstreckenden Gebiete von Nordamerika an, zu denen also um das Eismeer herum, bei der nur kurzen Unterbrechung des Landzugs von der Ostseite zur Westseite, sowohl östlich in der Nähe der Straß von Anian, besonders in dem Zuge der Aleutischen und Fuchsinself, als auch, westlich von den Norwegischen Küsten aus, über Island nach Grönland, Zugang gegeben war. Bei der Entdeckung von Nordamerika fand man in den allmählig bekannt werdenden, und nicht nur im nördlichen Amerika, sondern selbst auch über die heiße Zone hi-



bis zur Südspitze von Amerika verbreiteten Nationen Charaktereinstimmender Bildung, (die um deswillen auch als die afrikanische bezeichnet wird, und sich besonders auch durch Kupferfarbe bemerklich macht, die in den südlichen Gegenden zuhause hat,) und wenn auch gleich unter ihnen, in den am vortheilhaftesten für höhere Cultur gelegenen Gegenden, zwei ziemlich gebildeten Stämmen, (in Mexico und Peru,) doch nirgends Spuren eines Hochalterthums<sup>84</sup>; daher der Ursprung aller ältern Amerikanischen Völkerschaften, von den Stämmen der freien Indianer in Nordamerika in der Gegend der Hudsonsbai an, bis zu den wieder den Western der nördlichen Polarländer ähnlichen Feuerländern jenseits der Südspitze des Festlandes von Amerika, von Hochasien aus, oder von übergehenden nördlichen Stämmen, (die dann jenseit der Gegenden durch climatische Einflüsse die ihnen eigene wiederkräftige Bildung erhielten,) im Zuge der großen Amerikanischen Kette und der Inselreihen zwischen Nord- und Südamerika, nicht unnatürlich erscheint. Für die Weltgeschichte konnten aber auch diese, ohnedieß in so weit aus einander gezogenen Landstrichen zerstreuten Völker, bei ihrer Entfernung von der Ostküste, überdiß bei wahrrscheinlich nur kurzen Zeit ihrer Ausbildung zu eignen Staaten vorher kein Interesse darbieten, bis sie selbst durch jene, als Entdeckung der neuen Welt bekannte, geschichtliche Catastrophe aus ihrer Isolation traten.

Wenn wir in dem ganzen bisher verfolgten Zuge von Völkerschaften, die theils erwiesen, theils höchst präsumtiv, von dem Asiatischen Mittelland ost-, süd- und nordwärts sich verbreiteten und ansetzten, nur eine Nebeneinanderstellung von Nationen erblicken, die jede in sich ein mehr oder minder abgeschlossenes Leben führen und kein, oder doch nur ein höchst geringes Interesse haben, einander Verbindungen einzugehen, deren frühere Geschichte uns weder gar nicht bekannt ist, oder sich doch durch kein Ereigniß hervorwärtig macht, welche eine Hauptumformung in der innern Entwicklung dieser Nationen herbeigeführt hätte; so ist von allem diesem (Gegentheil in dem noch übrigen Landstriche, welcher im Westlichen von Mittelasien seine Lage hat. Nur dieser Theil der Welt hat eine zusammenhängende Geschichte, die eine Verkettung von Begebenheiten in sich faßt, in welche nach und nach auch alle übrigen Nationen der Erde, nachdem die von Mittelasien aus westlich sich verbreitenden Nationen, zum Theil durch große Umwege, Zugang zu ihnen gesucht, und entweder gefunden, oder theilweise erlangt hatten, verflochten worden sind.

aus dem großen Gebirgskessel, in dessen Tiefe das Caspische Meer, mit dem großen Aralsee zusammengeschlossen ist, zwischen dem Muscovitisch und dem Caucasischen Gebirge, welches den Landrücken zwischen dem Caspischen und Schwarzen Meere bildet, westlich, von der fetten Weide gebenden Gebieten des Syrs und Oshion, des Kura, der nördlich von demselben vom Caucasus zu dem Caspischen Meere fließenden kleinern Flüsse, (Terck, Kuma u. s. w.) kamen

Dr. Bernartucci und von Humboldt zweifeln, daß Amerika seither als vor 1000 Jahren bevölkert gewesen sei.

alle jene Völkerstämme, welche in sich schon die Form edler kräftig Bildung, (der Caucasischen,) tragend, in den unterschiedlichen Perioden, welche die Geschichte unterscheidet, die großen Begebenheiten einleiteten, welche zunächst der Stoff der Weltgeschichte sind. Indien hat die älteste Geschichte; nur Sagen; von hier aus treten zunächst das benachbarte Persien, Arabien und Aegypten, unter sich durch Mittelmeere in nächster Berührung, aus ihrem Dunkel hervor. In den Trümmern von Persepolis in Westpersien, und von Theben in Oberägypten sind uns noch jetzt Denkmäler einer frühesten hohen Cultur jener Länder erhalten. Persien war vor allen durch die vielfachen Züge seiner Gebirge, durch die Menge seiner Stromgebiete, wovon nur wenige und kleine Abzweigungen in das Weltmeer haben, die mehrsten aber sich aus Steppenflüssen und größern und kleinern Landseen bilden, vorzüglich geeignet, ein Uebergangsland zu werden. Hier hat es auch ein Reich für sich, mit innerem Zusammenhange gebildet, wohl aber große Völkereinbrüche erfahren, und selbst bewirkt. Die alten Perser, (wovon die Gauren ein Ueberrest sind,) zeigten noch Uebergänge von Mongolischer Bildung; aber die nordwärts auf der Westseite des Muthags die Flußgebiete des Osihon einnehmenden Tartarischen Stämme, (Alsackier, Bucharen u. s. w.) tragen schon die Züge veredelter Caucasischer Bildung. Noch stärker tritt aber diese in den um das Caspische Meer herum, über den Caucasus selbst verbreiteten Stämmen hervor. Die Georgier, die Circassier zeichnen sich jetzt, wie immer die Bewohner dieser Landtheile, durch Schönheit und einen in jeder Art vollendeten Körperbau aus. — Noch weiter und dauernder, als die Perser, haben die Araber, von ihrer Halbinsel aus, wozu der Zugang von Persien so erleichtert war, hier in dem von der Natur ihnen gebotenen Nomadenleben, sich zu einer Höhe von intellectueller Cultur erheben, die nur unter diesem Clima und in dieser Landesform möglich war, auf die Schicksale der westlichen und nördlichen Nationen Einfluß gehabt. — Durch das Nilthal auf einen beschränktern Erdstrich angewiesen, bildeten sich ebenfalls die Aegyptier sehr zeitig, (wahrscheinlich durch frühere nach Abyssinien und Oberägypten) übergegangene Arabische Stämme,) zu einem Volke aus, das in der ältesten Geschichte, so lange es nicht in das allgemeine Völkerleben gezogen wurde, (dem es bei der Senkung des Landes in das Mittelländische Meer nicht entgehen konnte,) in einem ihm eignen grotesken Charakter erscheint. Auch von ihm sind früh rohe Künste und wissenschaftliche Kenntnisse ausgestossen.

Nirgends aber war im westlichen Hochasien eine Gegend, welche in größerer Strecke die Nomadischen Stämme an sich zu locken geeignet war, als der lange Zug der Ufer des Euphrats und Tigris in den Persischen Meerbusen hinab. Hier bildete sich daher auch die erste Monarchie der Weltgeschichte; hier zeigt uns die Geschichte die erste Werkstätte von Künsten und die ersten Schulen nützlicher Kenntnisse. Hier war viele Jahrhunderte lang der Wohnsitz der Babylonier und Assyrier. Doch konnten, da auch die Gebiete dieser Ströme noch so sehr außer Verbindung mit andern lagen, die von jenen Völkern gestifteten Reiche sich gegen die Einfälle nachdrängender Nomadenvölker



behaupten, und bildeten bloß Uebergänge zu höherer humanistischer Cultur.

Erst als die sich westlich wendenden Völker jenseit des Libanus und der Syrischen Küste das große Afrikanisch-Asiatische Europäische Mittelmeer erreicht hatten, gewann das Menschengeschlecht selbst einen Boden, in dem es zu höherer Cultur bleibende Grundlagen schlug, wodurch die Weltgeschichte von nun an eine centrale Entwicklung erhielt.

Die Phönicier zeigten zuerst, von welcher Wichtigkeit der Handels-gegenständlicher Verbindung der Nationen ist. Von der schmalen Küste Syriens aus, auf welche Phöniciern beschränkt war, besuchten sie alle Ufer des Mitteländischen Meeres, nebst seinen zahlreichen Inseln, und legten daselbst Colonien an. Vom Rothen Meere aus wurde Aethiopien und Westafrika von ihnen besucht, Afrika selbst höchst wahrscheinlich zu mehreren Malen umschifft; am Persischen Meerbusen wurde das zweite Tyrus von ihnen gegründet; alle Kenntnisse und Schätze aus dem Osten gelangten durch sie zu dem Norden und Westen. Jenseit der Säulen des Herkules, (Straße bei Gibraltar,) gelangten sie nordwärts zu den Britischen Inseln und den Preussischen Küsten, also zur Nord- und Ostsee, (den nördlichen Europäischen Mittelmeeren,) so wie südwärts bis zum Vorgebirge der drei Spizen auf der Küste von Guinea. Nördlicher an der Ostküste des Schwarzen Meeres wetteiferten die Colchier mit den Phöniciern. An den Ufern der Flüsse Danubius und Kur, wovon jener zu dem Schwarzen Meere, dieser zu dem Caspischen strömt, brachten sie durch den Handel die Scythianer und Griechischen Nationen mit einander in Verbindung. Die Carthaginienser, die berühmtesten aller Phöniciern Colonisten, übernahmen in späterer Zeit fort, was die Phönicier in früherer Zeit begonnen hatten. Aber wie jene durch die Griechen, die in den letzten Jahrhunderten zur höchsten Geistesblüthe emporgeriethen, Völkern von Asiens, der südöstlichen Küsten Europa's, und der zwischen beiden liegenden Eilande zusammentretend, sich endlich zur herrschenden Nation ihres Zeitalters aufschwangen, fanden diese ihren Untergang in der Uebermacht der Römer, welche von einem westlichen Punkte der Europäischen Südküste aus sich zu Gebieten aller Küstenlande des Mitteländischen Meeres und theilweise noch weit über dieselben hinaus erhoben. Von nun an gebot der Westen, von den Küsten des Mitteländischen Meeres aus, dem Osten, so lange als noch nicht die zunehmenden Völkerströmungen von daher, bei Ueberfüllung der ursprünglichen Wohnsitze des menschlichen Geschlechts, durch überwältigende physische Kraft alle Künste des raffinierten Krieges vereitelten, auch hier erst, unter Benützung höherer Culturmittel, sich auszuweiten. Die Hebel der Weltherrschaft waren auch schon zu jener Zeit die höhere intellectuelle Kraft, und die dadurch begründete Staatskunst, der durch Vervollkommen der Küstenschiffahrt erleichterte Austausch der Producte der verschiedenen Welttheile durch den Handel, und unter wachsendem Nationalreichtum die Bildung einer Kriegsmacht, die auch einen mächtigen Feind nicht zu scheuen brauchte. In ihnen gefellte sich in späterer Zeit noch die Religion, die aus der nationalen, der Träger, (deren Geschichte- und Religionsbücher zu

den frühesten Denkmälern der humanistischen Cultur in Westasien gehö-  
 ren,) von der vom Jordan durchströmten Landstrecke längs der Ostküste  
 des Mittelländischen Meeres ausgehend, als Christliche ihrem Geist und  
 ihrer Lehre nach alle Menschen in Glaube, Liebe und Hoffnung zu  
 einen strebt. Aber alle diese Vortheile mußten verloren gehen, als  
 in den Jahrhunderten der Völkerwanderung, wo gleichsam durch ein  
 neu-neuen Trieb auch neue Menschengeschlechter in den Stammingegenden  
 des mittlern Asiens hervorzugehen schienen, diese die vor ihnen bereit-  
 festten Fuß gefaßten Völker weiter drängten, und so besonders die an-  
 kenden abendländischen Gegenden überschwemmten. Während aber die  
 der Geschichte der ältern und mittlern Zeit, als Völker und Kan-  
 tabrer, Galen, (Celten,) Kymren, Germanen, vorzüglich auch  
 als Slaven unterschiedenen, in früherer Zeit eingewanderten Bewoh-  
 ner Nordeuropäischer und westasiatischer Landstriche, oder auch die neu  
 aus dem Osten zuströmenden Völker, Hunnen, Bulgaren,  
 Westgothen, Sueven, Alanen, Vandalen, Ostgothen,  
 Longobarden u. s. w., die alten Ordnungen in den zu höherer  
 Cultur gelangten Staaten zerstörten, wurden sie selbst geistig besiegt  
 und mitten unter dem immer neu entzündeten Streite bildete sich all-  
 mählig ein umfassendes Völkerleben, das unter unaufhör-  
 licher steter Anregung, besonders auch unter dem Jahrhunderte lang  
 fortgesetzten Kampfe des unter den Fahnen des Christenkreuzes ver-  
 einten Europa's, gegen das von Arabien ausgehende, mit theilweis  
 glänzenden Erfolgen begleitete Streben, die Weltherrschaft an der  
 als eine Aftergeburt aus dem Judenthum und dem Christenthum her-  
 vortretenden Islam zu knüpfen, bis in die neuesten Zeiten, imme-  
 neue Aeußenseiten zeigend, einem wogenden Meere gleich, fortbauerte  
 und dessen Charakter Erhaltung des Ganzen unter gegenseitiger Span-  
 nung und offenem oder heimlichem Krieg ist. Was die Araber, (Sa-  
 razenen,) nach ihnen die von der Westküste des Caspischen Mee-  
 res hervortretenden Türken von Ost- und Südeuropa und von  
 Nordafrika eroberten, mußten sie größtentheils zu behaupten und mit  
 ihren Asiatischen Besitzungen zu vereinen. Noch ist der große Krang  
 des Mittelländischen Meeres in seiner größern Hälfte süd- und ost-  
 wärts von Völkern orientalischer Herkunft eingenommen, die, die  
 Vortheile ihrer Wohnplätze vernachlässigend, sich in das Europäische  
 Völkerleben, wie es die nur hier erreichbare Staffel der Cultur er-  
 heischt, nicht fügen können, und sich entweder mit Aufgebung ihrer  
 mitgebrachten Nationalbeschränktheiten erst noch in der Folge selbst zu  
 höherer Cultur erheben, oder, was wahrscheinlicher ist, der Geistes-  
 übermacht der Europäischen Nationen endlich doch erliegen werden.  
 durch die wohl schon jetzt die Sicherung dieser Erdgegend gegen Rück-  
 fall in Barbarei entschieden ist.

Der durch die allmähliche Bevölkerung Europa's und die fort-  
 gehende Ausbildung der Europäischen Staaten entstandene  
 große Verein würde aber schon jetzt ein abgeschlossener seyn, wenn  
 er sich bloß auf die Küstenlande des Afrikanisch-Europäischen Mittel-  
 ländischen Meeres und der Nord- und Ostsee, als Nordeuropäischer  
 Mittelmeere, erstreckte, zu denen der so culturfähige, nur selten durch  
 hohe Gebirgszüge unterbrochene, und also auch die Bewohner entge-



erfetzter Flußgebiete zu Einer Nation verschmelzende Europäische Völker einen so vortheilhaften Uebergang bildet. Aber jene große Erde, wo, auch von Europäischen Küsten aus, die Schifffahrt, ehe man früher die Küsten nicht aus dem Gesichte zu verlieren gewohnt war, so vervollkommenet wurde, daß nun auch die weitesten Erdtheile Zugänglichkeit erhielten, und überhaupt über den ganzen Erdkreis, mit Ausnahme der Polar Gegenden, Brücken geschlagen waren, und nun Amerika, nachdem es nordwärts, und ohne daß geschichtliche Denkmäler darüber erhalten blieben, seine Bevölkerung erhalten hatte, als Westland, oder Westseite entdeckt, und von den Europäischen Nationen, deren Landküsten zur Seefahrt nach Westen sich öffneten, größtentheils in Besitz genommen, und durch Colonisten, später durch Ueberführung von Negern aus den Westafrikanischen Küsten, neu bevölkert wurde, jene Periode hebt ein zweites Buch der Weltgeschichte an. Bis auf noch nicht ein halbes Jahrhundert zurück zu gehn, dieser ganze Welttheil, so weit er in das Europäische Völkerleben gezogen werden konnte, nur Pertinenzstücke der Europäischen Staaten dar. Aber die Zeit ist allmählig gereift, wo die fremden Ansiedler, besonders durch Uebertragung Europäischer Cultur, Selbstständigkeit erlangt haben, die Vortheile ihrer Landereien für sich zu benutzen und theils der Abhängigkeit vom Europäischen Mutterlande bereits entledigt, in immer kräftiger werdender Volksherrschaft sich als eigne Nationen behaupten, theils im Kampf um die Unabhängigkeit begriffen sind. Im Besitze einer ansehnlichen Macht und bei den Hülfsmitteln, solche immer noch mehr zu erweitern, ist der Abstand ihrer Ostküste in dem großen Halbkreis, wenn diese sich der Ostseite zukehrt, keine Scheide, was er, wenn die Schifffahrt noch wie ehemals bloß Küstenfahrt war, ewig geblieben seyn würde. Diese ganze Innenseite von Amerika, in so fern sie mit Europäischer Cultur wetteifernd, an den großen Strebungen Theil nimmt, die das Europäische Völkerleben anregen, ist also schon als integrierender Theil eines großen Ganzen anzusehen, wovon die Europäischen Gesamtstaaten nur die eine Halbschale bilden, und die sich als solcher in späterer Zeit immer mehr und mehr betrachten.

In dieser Beziehung ist also insbesondere das Europäische Mittelmeer geographisch zugleich als Mitte des allgemeinen Staatsvereins Völker höherer Cultur zu erachten, nicht, daß es in einer Zeit von hier aus eine wirkliche Weltherrschaft, in dem Sinne, wie zur Zeit der höchsten Blüthe des Griechischen und Römischen Reichs, nur in noch erweiterten Kreisen ausgehen, sondern, in dem Sinne, als immer das gemeinsame Streben der Völker, die sich theils mit Uebermächtigkeit erheben, und die Vortheile der erweiterten und erleichterten Schifffahrt auch wohl zur Verbindung mit abgelegenen Ländern und Völkern benutzen, sich doch wohl immer in dem Centraltheil der bewohnbaren Erde wieder reflectiren, und so im Gleichgewicht setzen und erhalten dürfte. Die Hebel aber, die noch jetzt in dem allgemeinen Conflict der Völker, sich gegen einander in Vortheil zu setzen und zu behaupten, die Nationen aufzuregen und mit einander in Verbindung bringen und erhalten, wirken theils

still; nur in langen Zeiträumen bemerkbar, aber dauernd und sicher, theils offen gelegt, stürmisch mit Uebermacht, aber mit unverbürgtem Erfolge. Erstere sind besonders Religion und Wissenschaft; jene in dem immer allgemeiner werdenden Streben, mit Toleranz gegen abweichende Religionsansichten, den Geist, der, als nicht von außen gegeben, allen Religionen zu Grunde liegt, in der Christlichen Religion aber am lebendigsten sich bezeugt, immer mehr zu verbreiten; letztere zufolge des nothwendigen Fortschreitens der intellectuellen Cultur, wenn ihr einmal Bahn gebrochen ist. Getriebe der zweiten Art sind aber die vorzüglich im Völkerleben potenzierten menschlichen Leidenschaften, (ohne deren Einwirken die Geschichte einem ruhig strömenden Wasser gleichen würde, statt daß ihr Bild ein fast immer vom Sturm ausgehöhltes und nur in beschränkten Zeitperioden und Räumen einen glatten Wasserspiegel darbietendes Meer ist,) hier besonders in dem selbstsüchtigen Streben einzelner Nationen und ihrer Machthaber nach Reichthum durch den Welthandel, und nach Hoheit durch Benützung von überlegener Macht hervortretend. Aber die ewige Nemesis wacht, daß das ungehörliche Ueberschreiten der Naturgrenzen, die jedem Volke zu seinem Wohlbestehen und zur Sphäre seines vollen Kraftlebens angewiesen wurden, nicht nur seine Hemmungen findet, sondern durch aufgeregte Gegenwirkung zu seiner Zeit auch wieder abgebußt und zurückgedrängt werde, und so die alte Ordnung, welche die Grundfeste der Natur selbst ist, ihr ewiges Recht behauptend, immer wieder von neuem hervortrete.

Hierher gehörige Schriften.

(Mit Beschränkung auf diejenigen, die mehrere hieher gehörige Hauptgegenstände in Bezug auf einander verhandeln.)

Aristotelis de mundo l. graecæ c. duplici versione lat. priore L. Apuleji, altera Guil. Budaei e scholiis et cast. Bon. Vulcanii etc. Lugd. Bat. 1591, 8 (ed. in operibus).

Ricard Bunworth cosmographia physica, Lond. 1650, 8.

Thom. Burnet telluris theoria sacra, Lond. 1681, et 1689. 4. (aus dem lat. übers. mit Anmerk. v. J. Jan Zimmermann, Hamb. 1698, 4.)

J. Ray physico-theological discourses, Lond. 1692, 8. (1713, 1721, 8.)  
Joh. Wäst physico-theologische Betrachtung vom Anfange, Veränderung und Untergange der Welt, a. d. Engl. übers. Neue verbess. Aufl. Pelp. 1756, 8.)

Guil. Godofr. Leibnitz protogaea, (in Actis eruditorum anni 1693.)  
Ed. C. L. Scheid, Goett. 1749, 4.

Th. Robinson's Anatomy of the Earth, Lond. 1694, 4.

J. Woodward an essay towards a natural history of the Earth. Lond. 1695, 8. (1702, 1723, 1726, lat. ed. Scheuchzer Tigur. 1704, 1714, franz. à Paris 1735, 1753, 8.; deutsch. Erf. 1746, 8.)

Wilh. Whiston nova telluris theoria s. neue Betrachtung der Erde, nach ihrem Ursprung und Fortgang bis zur Hervorbringung aller Dinge u. s. w., aus dem Engl. übers. in R. Frankfurt. a. M. 1713, 4.

Joh. A. d. Rudin's diss. de tellure in genere, Gedani 1726, 4.

Car. Linnaei diss. de incrementis telluris habitabilis, Lugd. Bat. 1744, 8.

J. G. Krüger's Geschichte der Erde, in den allerältesten Zeiten, Halle 1746, 8.

Ant. Lazzari Monro's neue Untersuchung des Erdbodens, nach Ansehung der Spuren von Meeresthiere und Meerpflanzen, die auf Bergen und in trockner Erde gefunden werden, aus dem Ital. übers. in R. Pelp. 1751, 8.

Elie Bertrand memoire sur la structure intérieure de la terre, à Zurich 1782, (1760,) 8.

Joh. Lulff's Ansehung zur mathematischen und physikalischen Kenntniß der Erdkugel, aus dem Holländischen v. H. G. Kästner, Gott. u. Pelp. 1755, 4.

Rud. Fr. Raspe specimen historiae naturalis globi testaquei, praecipue



novis e mari natis insulis, et ex his exactius descriptis et observatis, ultimus confirmanda. Hookiana telluris hypothese de origine montium et corporum petrefactorum, c. f. Amat. et Lips. 1763, 8.

Joh. Eht. Silbereschlag's neue Theorie der Erde, oder ausführliche Unter-  
suchung der ursprünglichen Bildung der Erde nach dem Berichte der heil. Schrift  
den Grundsätzen der Naturlehre und Mathematik, Berlin 1764, 8. Joh. Eht.  
Silbereschlag's Geogenie, oder Erklärung der Mosaischen Erdschöpfung nach phy-  
sichen und mathematischen Gründen, 2 Bände, Berlin 1780, 5. Band vertheidigte  
Geogenie, Berlin 1783, m. R. gr. 4. Philos. physikal. Fragmente über die Geogenie,  
1801. u. Bresl. 1783, 4. Dessen felt. Vellage zur Geogenie, Göt. 1784, 4.

Joh. Aug. Unzer's physikalische Untersuchungen von der Structur der Erdoberfläche  
und den Ursachen der Erdbeben, Hamburg u. Lüneb. 1768, 8.

Bergmann's, Torb. und Fr. Mallet's Weltbeschreibung, aus dem Schwed.  
18. J. Röhl, Greifsw. 1769 — 1774, 8.

J. H. G. Jussel's Geschichte des Erddörpers, Berlin 1771, 8.  
Vermischte Beiträge zur physikalischen Erdbeschreibung, 6 Bände, Brandenb. und  
Magdeb. 1773 — 1787, 8.

Pet. Sim. Pallas observations sur la formation des montagnes et les chan-  
gements arrivés au globe, à Petersb. 1777, 4. (Par. 1779.) (Vet. Sin.  
Pallas Betrachtungen über die Beschaffenheit der Gebirge und die Veränderungen  
der Erdkugel, aus dem Franz. 1777, Alga 1779, 8.)

G. L. le Clerc Comte de Buffon les époques de la nature, Vol. II.  
Par. 1778, 1789, 8. (nouv. éd. 1790, 8. v. Buffon's Epochen der Natur,  
aus dem Franz. Petersb. 1781, 8. v. J. F. Hackmann, m. R. Petersb. 1781, 8.)

Jean André de Luc lettres physiques et morales sur les montagnes et  
l'histoire de la terre et de l'homme, Vol. 1—6, à la Haye 1778, 8. (J. A.  
Luc physisch. moralische Briefe über die Berge und die Geschichte der Erde und des  
Menschen, aus dem Franz. v. J. M. Marcard, 2 Bände, Leipz. 1778—1782, 8.)

J. G. Waller'si meditationes physico-chemicae de origine mundi, in pri-  
ncipis geocosmi, ejusdem metamorphosi, Ups. 1779, 8. (J. G. Waller's  
physisch-chemische Betrachtungen über den Ursprung der Welt, aus dem Lat. v. L. F.  
Keller, Erf. 1782, 8.)

W. S. v. Gleichen's, genannt Rügworm, von Entstehung, Bildung, Um-  
wandlung und Bestimmung des Erddörpers, Berlin 1782, 8.

Fr. Schömann's Beiträge zur Bestimmung des Alters unserer Erde und ihrer  
Bewohner, der Menschen, 2 Theile, Wien 1782, 1783, 8.

J. Neinh. Förster's Bemerkungen über Gegenstände der physischen Erdbe-  
schreibung, Naturgeschichte und stilklichen Philosophie, auf einer Reise um die Welt  
asiamelt, 1805, v. G. Förster, Berl. 1783, 8.

Jos. Brunner's Handbuch der Gebirgskunde für angehende Geognosten, m. R.,  
Hilp. 1783, 8.

Joh. Georg Herder's Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit,  
2 Theile, Alga und Leipz. 1784 — 1791, 4.

K. Haldinger's systematische Einteilung der Gebirgsarten, Petersb. 1784, 4.  
J. R. W. Wolf's drei Briefe über die Gebirgskunde, Helm. 1785, 8. (Zweite  
verbesserte Aufl. 1786, 8.)

Dessen practische Gebirgskunde m. R., Helm. 1791, (1797) 8.

Joh. Elert Wode's Anleitung zur allgemeinen Kenntniss der Erdkugel, Berlin  
1786, (verbess. und verm. 1803) 8.

J. Whitchurst an inquiry into the original state and formation of the  
earth, Lond. 1786, 4. (J. Whitchurst's Untersuchung über den ursprüngli-  
chen Zustand und die Bildung der Erde, a. d. Engl. mit Zus. u. R., Leipz. 1788, 8.

J. W. H. v. Trebra's Erfahrungen vom Innern der Gebirge m. R., Dessau u.  
Hilp. 1786, 8ol.

Eh. F. Kestler's von Sprengelsen Untersuchung über die Entstehung der  
Erden-Oberfläche unserer Erde, besonders der Gebirge, m. R., Leipz. 1787, 8.

Albr. Gottlob Werner's kurze Classification und Beschreibung der Gebirgsar-  
ten, Dresd. 1787, 4.

Dessen neue Theorie von der Entstehung der Gänge, Freib. 1791, 8.

- J. Mitterbacher's physikalische Erdbeschreibung, Wien 1790, 8.
- J. Cl. de la Méthrie's théorie de la terre, T. I et II, à Paris an 5, 8.
- (J. Cl. de la Méthrie's Theorie der Erde, aus dem Franz. mit einigen Anmerkungen von Ch. G. Eschenbach, nebst einem Anhange von J. Reinh. Forster, (diesen auch unter besonderm Titel, 2 Theile Leipzig 1797.)
- Jos. Weber über die Erde, das Wasser und die Atmosphäre, Landsh. 1796, 8. (in dessen Allgem. Naturwissenschaft gebrüg.)
- J. A. Minrod's Beiträge für die Bildungsgeschichte der Erdoberfläche, besonders für die Urbildung der Thäler und Berge, Jena 1800, 8.
- J. W. Otto's Versuch einer physikal. Erdbeschreibung, nach den neuesten Beobachtungen und Entdeckungen, 1. Th. Hydrographie, Berl. 1800, 8.
- J. E. Gabel's Abriss der natürlichen Erdkunde, insbesondere Gelfest, Nürnberg 1800, 8.
- Imm. Kant's physische Geographie, 4 Bände, Mainz 1801—1804, 8. (umgearb. Aufl. v. J. F. Wollmer, 1. B. 1807, 8. Aus dessen Handschrift herausgegeben v. Friedr. Theod. Rink, 2 Bände, Königsb. 1802, 8.)
- \* Helnr. Steffens's Beiträge zur neuern Naturgeschichte der Erde, 1. Th. Freib. 1802, 8.
- \* Ebendess. geognostisch-geologische Aufsätze, als Vorbereitung zu einer innern Naturgeschichte der Erde, Hamb. 1810, 8.
- K. E. Schumler's die Geognosie nach chemischen Grundsätzen dargestellt, Leipzig 1802, 8.
- \* Franz Ambros Rens's Lehrbuch der Geognosie, 2 Bände, (auch als 3. Band des Lehrbuchs der Mineralogie,) Leipzig 1805, 8.
- J. B. Lamarck's hydrogéologie, à Par. 1802. (J. B. Lamarck's Hydrogéologie, oder Untersuchung über den Einfluss des Wassers auf die Veränderung der Erdoberfläche, d. d. Franz. und mit Anmerk. v. Wrede, Berl. 1805.)
- J. Alb. H. Reimarus über die Bildung des Erdballs, und insbesondere über das Lehrgebäude des Pth. de Luc, Hamb. 1802, 8.
- J. D. Mayer's Lehrbuch über die physische Astronomie, Theorie der Erde und Meteorologie, Gött. 1805, 8.
- \* J. G. Ebel über den Bau der Erde in den Alpengebirgen, nebst Betrachtungen über den Bau der Erde überhaupt, 2 Bände, Zürich 1803, 8.
- Heurt. G. Oberlin's propositions géologiques, à Strasbourg 1806, 8.
- André's théorie de la surface actuelle la terre, ou recherches sur le tems et l'agent de l'arrangement actuel de la surface de la terre, à Par. 1806, 8.
- E. M. Meiners vom Leben der Erde, Tübing. 1807, 8.
- \* Aug. Zeuner's Gea, Versuch einer wissenschaftl. Erdbeschreibung, Berl. 1808. (Gda, zweite vollkommnere Aufl. 1811, 8.)
- \* W. v. Humboldt's Ansichten der Natur mit wissenschaftlichen Erläuterungen, Tübing. 1808, 2 B.
- Theod. Alex. v. Hagen's kosmologische Geschichte der Natur, insonderheit des Mineral- und Pflanzenreichs der Erde, Mannh. 1809, 8.
- L. E. Schreiber's Grundriß der Geognosie zum Gebrauch seiner Vorlesungen, nach dem neuesten Werner'schen System entworfen, Hildburgh. 1809, 8.
- Dessen Ideen über die Organisation und das eigenthümliche Leben des Erdkörpers, Wien 1810, 8.
- E. F. Lasche, das Wissenswürdigste aus der Gebirgskunde, Böhmb. 1811, Fol.
- K. Naumer's geognostische Fragmente, 2 Bände, Nürnberg 1811 u. 1812, 8.
- F. Reichert's Anleitung zur Geognosie, Wien 1812, 8.
- Georg Friedr. Parron's Grundriß der Physik der Erde und Geologie, Alga u. Pils 1815, 8.

Erdreisten, s. Dreistigkeit.

Erdrich, s. Klima.

*Erecti capilli*, struppiges Haar. S. unter Haupthaare.

*Erectio corporis*, s. Aufrichtung des Körpers. — *trunci*, s.

Erection des Rückgraths.

Erection<sup>1</sup>, (*Erectio*<sup>2</sup>.) Aufrichtung<sup>3</sup>, Aufrichten<sup>4</sup>,

1) Meckel's Deutsch. Arch. f. d. Physiol. 2. B. 1. H. S. 101. 2) Schurig spermatol. o. 3. S. 4. 3) 4) Haller's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v. Revesting 2. Th. S. 737. Note und S. 893.



steifwerdung <sup>5</sup>; Steifwerden <sup>6</sup>; Steifigkeit <sup>7</sup>, Anschwellung <sup>8</sup>; Anschwellen <sup>9</sup>; Turgescenz <sup>10</sup>; Erhebung <sup>11</sup>, Extensio <sup>12</sup>; Tensio <sup>13</sup>; Rigiditas <sup>14</sup> Turgescencia, Intumescentia, Inflatio <sup>15</sup>; Induratio <sup>16</sup>.) Alle feste Theile des lebenden Körpers bedürfen zu ihrer Function eines gewissen Grades von Straffheit der einzelnen Fibern, aus denen sie bestehen, die, in so fern sie flüssige Stoffe in sich in Höhlungen aufnehmen, mit der Menge Wasser und der dadurch bewirkten Erfüllung jener innern Räume in Verbindung steht. Ihr Gegensatz ist Schlaffheit, welche der Integrität jener Functionen Eintrag thut, oder auch durchaus hinderlich ist, in so fern jener Zustand bleibende und fortgehende Bedingniß der Gesundheit ist, wird er als Ton oder Lebens-turgor bezeichnet, in so fern er temporär ist, aber auf mehrere Theile, oder auch wohl über den ganzen Körper sich verbreitet, als Orgasmus. Vgl. diese Artikel. Auch von der Verheit, die Folge der Contraction eines Theils ist, ist hier nicht die Rede, (vgl. Contractilität und Irritabilität,) sondern bloß von demjenigen Zustand von Anspannung und relativer Härte, in welchen einzelne Organe, deren Function nur temporär ist, um zu derselben fähig zu werden, aus innerem Trieb und zwar mit Zunahme ihres Volumens nach allen Richtungen versetzt werden.

Es ist dieß insbesondere der Fall, bei dem männlichen Zeugungs-liebe; daß zur Ausübung der Geschlechtsfunction, ohne directe Bestimmung des Willensvermögens, wiewohl gewöhnlich nicht ohne psychische Einwirkung, jene bekannte Formveränderung erfährt, vermöge welcher es aus dem Zustande von Flaccidität, in welcher es, sich überläßt, bloß dem Gesetz der Schwere gehorcht, in den eines dem Druck und der Beugung mehr oder minder Widerstand leistenden Körpers übergeht, hier bis zur Horizontalfläche und noch darüber sich aufstreckt und zugleich der willkürlichen Muskelbewegung unterworfen wird. Das Wort Erection, (mit den übrigen Synonymen,) findet daher auch auf dieses Organ zunächst Anwendung; außerdem aber auch auf die ähnliche Formveränderung der Clitoris beim weiblichen Geschlecht während angeregter Geschlechtslust. Ihr analog ist die Aufschwellung der Brustwarzen beim Säugen, oder bei äußerem Reiz. Andere Aufschwellungen einzelner Theile durch besondere Reizung derselben und dadurch bewirkten Orgasmus, die wohl auch noch etwa hierher gezogen werden könnten, zeigen in der sinnlichen Wahrnehmung zu wenige Formveränderung um jenen Namen zu verdienen, obgleich solche, (wie z. E. die der innern weiblichen Geburts-theile bei der Conception,) vorausgesetzt werden können.

Es ist von jeher den Physiologen ein Problem gewesen, was es

- 6) Heuermann's Physiol. 4. Th. S. 134. 7) Haller's Grunds. u. f. w. a. u. D. S. 891. 8) Jadelot's v. b. Natur des ges. menschl. K. übers. v. Panzerbleter, S. 349. 9) Hildebrandt's Lehrb. d. Physiol. 8. Ausg. S. 705. 10) Rosse über das Anschwellen d. männl. Gliedes im gesunden Zustande, in seinen physiol. Untersuch. S. 17. 11) Sponitzer über die Turgescenz des männlichen Gliedes im Journal d. Erind. 10. St. S. 37. 12) Mayer's Besch. d. menschl. K. S. 15. D. S. 182. 13) — 14) Schnrig-spermatol. I. c. S. 5 et 10. 15) 16) Verheyen's c. h. anat., pag. 24.

sei, wodurch das männliche Zeugungsglied, wenn es in den Zustand von Erection gelangt, angespannt und aufgerichtet werde. Wir kennen wohl aus der Erfahrung die veranlassenden Ursachen. Wir wissen, daß nicht nur der Geschlechtstrieb sich in diesem Phänomene äußert, indem die dadurch bewirkte Formveränderung nothwendige Bedingung der Uebung der Geschlechtsfunction ist, (vergl. Begattung,) sondern daß auch andere äußere und innere Reize dieselbe Wirkung haben, die dann wenigstens indirect auf Erregung des Geschlechtstriebes hinwirken, gegenseitig, aber auch bei schon vorhandenen Bedingungen, welche das Geschlechtsleben anregen, als Anfüllung der Samenbläschen mit kräftiger Samenfeuchtigkeit, die Fahrt der vollkommnen Geschlechtsreise und Geschlechtsthätigkeit, Gegenwart oder lebhaftes Vorstellung eines geliebten Gegenstandes u. s. w., zum so leichter Erectionen zur Folge haben. Dahin gehören Frictionen, gelindes Drücken oder Erschütterungen des Zeugungsgliedes, besonders der Eichel, der Genuß kräftiger gelind gewürzhafter Speisen, (von denen mehrere, wie auch andere, besonders die Harnabsonderung vermehrende oder auch sollicitirende Stoffe, Canthariden, Maikäfer und andere, specifische Wirkung auf die Anregung des Geschlechtstriebes zeigen, und als Aphrodisica bekannt sind,) der Genuß von Weinen und geistigen Getränken überhaupt, Hautreize in der Nähe der Geschlechtstheile<sup>17</sup>, erhöhte Wärme, besonders durch Bettbedeckung, Anfüllung der Harnblase, und dadurch bewirkter Druck der Samenbläschen, beides besonders während des Schlafs, der selbst fördernd zu wirken scheint, Blähungen und eine Menge Reize, die als wirklich krankhafter Art hier unberührt gelassen werden. Aber alle diese sind nur entfernte Ursachen; der physiologische Vorgang kann nur aus der nähern Kenntniß des organischen Baues des Theils, der diese Formveränderung erfährt, klar werden.

Aus diesem geht aber zuvörderst die Wichtigkeit derjenigen Erklärungsarten hervor, die man in früherer Zeit für befriedigend hielt. Unter den mehrern Muskeln, die mit dem Zeugungsgliede in näherer Verbindung stehen, erhielt einer, der von dem aufsteigenden Aste des Sigstücks des Hüftknochens zu dem hintern Theile dieses Organs geht, den Namen eines Erhebers, oder Aufrechtemuskels desselben; (Erector penis,) weil man ihm die directe Wirkung der Erection beilegte; aber dieser Muskel bewegt den Theil offenbar nicht, wenn er bereits ausgespannt ist, wo dann dem Abwärtsinken desselben zugleich auch durch Muskelthätigkeit Widerstand geleistet wird<sup>18</sup>. Man glaubte, die Erklärung dieses Phänomens darin zu finden, daß dieser Muskel sowohl, als auch die tiefern in der Gegend des Perinaums,

17) Vgl. Meibomii de usu flagiorum in re med. et venerea, Lugd. B. 1743, 4. und mehrere über diesen, auch besonders seit Boussseau in seinen Selbstbekenntnissen ihn in pädagogischer Hinsicht berühret, der Aufmerksamkeit näher gelegten Gegenstand, in Schurig spermatoth. c. 15. §. 22. 18) „Per ridicula experimenta inuouit, non exigua pondera, et diu quidem, de pene suspensa circumferri posse.“ Halleri elem. physiol. T. VII. l. 27. s. 3. §. 11. Stannum, cantharum, mensuras cerevisiae quinque, (libr. X.) continentem iuuenis 22 annorum citra molestiam, nec sine intuentium stupore, et risu, ultra horae dimidium peni appendum circumtulit. Schenk exercit. p. 629 et Misc. nat. curios. Dec. 2. ann. 6. app. p. 12.



accelerirende Muskel des Harns, die Quermuskeln des Perinäums, Aftermuskeln, während sie sich zusammenzögen, die das Blut dem Zeugungsgliede zurückführenden Venen zusammendrücken, so daß dieses darn durch das in demselben angehäuften Blut aufwölbt. Allein einmal ist die Erection keine der Willkür direct unterworfenen Körperveränderung, sie erfolgt langsam und hört auch weder eben so allmählig auf; auch hat dasselbe Phänomen an anderen Theilen, wie im menschlichen Körper an den Brustwarzen, (bei Tieren unter andern an dem rothen Lappen am Halse der Truthühner,) Statt, wo gar keine Muskeln im Spiele sind; sodann aber können die zurückführenden Venen, ihrem Laufe nach, durch jene Muskeln entweder gar keinen Druck erfahren, oder dieser ist bei weitem unzureichend und viel zu partiell; auch ist die Concurrenz jener Muskeln in ihrer Zusammenziehung gar wohl sinnlich zu unterscheiden, es erhöht lediglich die bereits vorhandene Erection dem Grade nach, solange jene Zusammenziehung dauert, und dieß theils durch hinzukommende Spannung der Fibern, theils durch Pressen auf die zwischen contrahirten Fasern befindlichen Feuchtigkeiten, und namentlich das Blut. Also ist Muskelthätigkeit bei diesem Vorgang höchstens nur eine concurrirende, keinesweges aber primäre Ursache.

Die Bergliederung des Zeugungsgliedes aber belehrt uns, daß dasselbe wesentlich aus den im ihres eigenthümlichen Baues willen so genannten zwei fächerigen oder cavernösen Körpern besteht, wovon die Eichel nur ein, durch einen leichten Einschnitt sich bemerklich machender vorderer Theil ist, die nach unten die, ebenfalls mit ähnlichem fächerigen Gewebe umgebene Harnröhre zwischen sich haben. Wenn nach dem Tode in eine dieser kleinen Höhlungen, oder auch durch die Blutgefäße dieses Theils Luft eingeblasen, oder eine Flüssigkeit, oder Injectionsmasse eingespritzt wird; so werden die sämtlichen Höhlungen angefüllt<sup>19</sup>, und der ganze Theil gelangt dadurch in den Zustand einer künstlichen Erection. Es sind also die Blutgefäße des Zeugungsgliedes, und zwar sowohl die Arterien als die Venen, mit diesen Fächern in einer directen Verbindung, und es war ein sehr nahe liegender Gedanke, daß im Zustande der Erection jene Fächer mit Blut erfüllt würden, wodurch dann eine Anschwellung und Anspannung des ganzen Theils erfolgte. Schon Vesal<sup>20</sup> stellte die Ansicht auf, daß die cavernösen Körper bloß aus Gefäßnetzen beständen; seit seiner Zeit war die Meinung ziemlich allgemein, daß die Erection durch in diesen Höhlungen sich anhäufendes Blut, (oder auch nach hypothetischer Voraussetzung ein spirituelles Blut,) bewirkt werde. Doch wurde die frühere Vesalsche Annahme von den Anatomen der spätern Zeit, namentlich N. de Graaf, Nussch, Diverney, Boerhaave und besonders Haller<sup>21</sup>, in so fern aufgegeben, als man die in den cavernösen Körpern und Geweben befindlichen Zellen der Räume derselben Art wie die des Zellgewebes überhaupt erklärte, nur mit den Arterien und Venen des Theils in Verbindung stehend:

19) Die Zellen beider cavernösen Körper haben unter sich zwar Gemeinshaft, doch ist zwischen diesen und denen der Eichel und des cavernösen Gewebes der Harnröhre keine directe Verbindung, welche beide letztere aber wieder unter sich verbunden sind.

20) de h. c. fabr. l. 5. c. 14.

21) a. d. D. l. 27. s. 1.

Auch wurde es unter andern von Langguth<sup>22</sup> zweifelhaft gemacht, daß während der Erection sich Blut in diesen Theilen anhäuft, indem er in Versuchen an Thieren, denen er das zur Erection gebrachte Zeugungsglied schnell amputirt hatte, dasselbe keinesweges von ausgetretenem Blute erfüllt gefunden haben wollte, weshalb auch Sponhger<sup>23</sup> die unmittelbare Ursache der Erection bloß in einen Nervenreiz setzte, der die Erection, vermöge der eignen Construction und Organisation der derselbigen fähigen Theile bewirkt. Allein Roose<sup>24</sup> hat das Unrichtige der Versuche, welche dieser Annahme zum Grunde liegen, durch Gegenversuche dargethan, welche allerdings die Erfüllung der innern Räume des im Zustand der Erection befindlichen Zeugungsgliedes erweisen, und womit auch frühere und spätere Beobachtungen übereinstimmen.

Nach neuern anatomischen Untersuchungen der Zeugungsglieder von Thieren, die sich durch größern Bau der Körperteile auszeichnen, namentlich nach Cuvier's Zergliederung der Ruthe eines Elephanten und Tiedemann's Untersuchung der schwammigen Körper der Ruthe eines Pferdes<sup>25</sup>, scheint es nun aber keinem Zweifel ausgesetzt, daß die Höhlungen dieses Theils keine intermediären Bildungen zwischen den Arterien und Venen, sondern nur Erweiterungen der vielfach verschlungenen Gefäße, und insbesondere Venennehe, im gewöhnlichen Zustande aber zusammengefallen sind, und nur auf bestimmte Veranlassungen anschwellen und sich mit Blut füllen.

Dieses kann nun wohl eben so gut dadurch erfolgen, daß das Zufließen des arteriösen Bluts größer, als der Abfluß des venösen Bluts, als auch dadurch, daß der Zurückgang des Bluts durch die Venen unterbrochen ist, während die Arterien fortfahren, Blut zuzuführen. Außerdem aber, daß bei dieser Ansicht das Leben weniger ins Auge gefaßt ist, als bei physiologischen Vorgängen dieß doch zunächst erfordert wird, bleibt immer die Erörterung noch zurück, was den mehrern Zufluß des Bluts zunächst herbeiführt, oder den Rückfluß desselben zunächst hemmt. Wenn nun einmal die Nervenenthätigkeit bei diesem Vorgang als primäre Ursache nicht aus den Augen verloren werden darf, so ist es weit näher gestellt, dieser eine directe Einwirkung auf die feste Substanz, aus denen jene Höhlen oder Gefäß Erweiterungen gebildet sind, zuzugestehen. Es ist also die unmittelbare und directe Ursache dieses Phänomens der Erection ganz dieselbe, von welcher aller Lebenssturgor und jede Aeußerung des Orgasmus, oder temporär erhöhter Lebensthätigkeit in Körperteilen abhängt, eine Erweiterung und Ausdehnung der mit Nerven begabten Fibern unter Zuströmung assimilirter Stoffe, besonders des Bluts, wofür sodann mehr Räumigkeit sich darbietet, und wovon zu gleicher Zeit jene Räume ausgefüllt werden. Es ist also die Zuströmung der Feuchtigkeiten gleichzeitig mit jener Erweiterung, und der eine Theil des lebendigen Processes, also weder Ursache noch Wirkung der Erweiterung selbst. Wollen wir jene Aufrichtungsfähigkeit der vorher

22) In Schumann diss. de vi imaginationis in foetum, Virch. 1790. Vgl. Journal d. Erfind. u. s. w. 4. St. S. 122. 23) a. a. O. s. Note 10. 24) a. a. O. Note 9. Vgl. auch J. H. Thaut diss. de virgae virilis statu sano et veriboso, Virceb. 1808, 4. 25) S. Meckel's Deutsch. Archiv f. d. Physiol. 2. B. 1. S. S. 95.



theilweise collabirten Fibern mit einem eignen Wort, nach Vorgang neuerer französischen Physiologen<sup>26</sup>, etwa als *Erectilität* bezeichnen; so muß man dabei nicht übersehen, daß eigentlich keine andere Grundkraft, als die der Expansion überhaupt, oder der reine Gegensatz der Contractilität, ihr zu Grunde liege. Es äußert sich aber selbige in dem Phänomen der Erection vorwaltender, weil einerseits der organische Bau der zur Erection geeigneten Theile so ist, daß größere hohle Räume in andern Organen bei Aufhebung des Collapsus der sie einziehenden Wände sich bilden, andererseits aber besonders im Zeugungsgliede, (wie aber auch in der Clitoris und den Brustwarzen) die Arterien von einer vorwaltend ansehnlichen Menge von Nervenzweigen vom Cerebralsystem begleitet sind.

Es ist Forderung der Natur, daß für die Ausübung der Geschlechtserection die gesammte Lebensthätigkeit so auf den organischen Apparat der Erzeugung flectirt werde, daß sie, successiv sich steigend, zu einem Moment der Erzeugung selbst von hier aus central wirkt. Von jeder successiven Steigerung ist nun die Erection des Zeugungsgliedes das erste Moment. Indem die Cerebralthätigkeit sich auf den Gegenstand besonders richtet, der das individuelle Leben für das sich erhebende Geschlechtsleben in Anspruch nimmt, wird unter gemeinschaftlicher Thätigkeit der Cerebralnerven des Zeugungsgliedes und der letzten Endigungen der Arterien, welche, so wie jene im Gehirn, im Herzen ihr Centralorgan haben, ein höheres Leben in diesem erweckt; die Expansivität der Fibern bekommt, vermöge des natürlichen Strebens alles Lebens nach außen, ein relatives Ueberwicht. Indem Blut energischer in den Theil einströmt und sich vorwärts drängt, wird die natürliche Wärme und das Gemeingefühl in diesem Organe gesteigert, das in dem Maße rasch und kräftig aufsteigt, als die mehreren Momente, welche auf diese Wirkung Einfluß haben, dafür günstig sich vereinen. Hiermit beginnt schon das individuelle Leben, sich hier zu concentriren; die Erection hebt von den cavernösen Körpern, die den größern Theil der Substanz des Zeugungsgliedes bilden, an, die Aufschwellung der Eichel erfolgt später und in höherem Grade erst in Steigerung der Geschlechtslust unter wirkender Friction; zugleich theilt dieser Zustand erhöhter Lebenskraft und Fülle sich dem äußern Ueberzug der Harnröhre mit, dessen mehrere Gefäßerweiterungen mit der der Eichel in directer Verbindung stehen. Von hier aus setzt sich dieselbe, unter fortgehender Steigerung, zu dem hintern Theile der Harnröhre fort, wo dann, nachdem die Spannung diejenige Höhe erreicht hat, deren der Organismus nach seinen individuellen Verhältnissen fähig ist, das neue entzündete Leben, indem es für den Moment das aller übrigen Organe in seine Sphäre zieht, sich durch jene Pulse andeutet, in denen das künftige Geschlechtsleben seinen vollen Triumph über das abgeklaffene individuelle feiert. Indem aber die Natur dadurch auch die aufgeregten, und noch in der Systole und Diastole jener Pulse die Schärfe hervortretenden Gegensätze wieder ausgleicht, verliert sich die mit der ihnen vorhergegangenen Spannung auch der Lebenstrieb des Zeugungsorgans, der nur der Weckung von außen gewärtig war, um

26) Vgl. Dictionnaire méd. T. XIII. mot *Erectilité*.

Atmat. physiol. Realw. II. B.

thätig hervorzutreten; es kehrt der Zustand von Erschlaffung oder Collapsus der angespannten Theile zurück, die jetzt aber auf kürzere oder längere Zeit unfähig bleiben, jene Metamorphose von neuem einzugehen, auf so lange nämlich, als bis die sorgsame Natur für erneuerten Zufluß materieller Stoffe gesorgt hat, die den erloschenen Trieb erst in der Folgezeit von neuem anfachen.

Es ist offenbar, daß die Fähigkeit des männlichen Zeugungsorgans zur Erection demselben um der Erzeugung selbst willen, deren eine materielle Bedingung sie ist, verliehen sei. Finden wir aber solchen auf mannigfaltige andere Arten aufregbar, die sehr oft nicht unmittelbar mit dem Zeugungsact in Verbindung stehen, ja selbst bei der Erzeugung unfähigen Individuen, bei zarten Kindern, Castraten eintreten; so erhellt daraus bloß, in welchem weiten und eigentlich universellen Bezug die Erzeugungsfähigkeit des Mannes, in Zustand seiner vollen Reife, mit dem ganzen Leben stehe. Auch das zarteste Kind ist kein für das Geschlechtsleben indifferenter Mensch, sondern ein werdender Mann, so wie der Castrat ein gewesener, oder auch noch ein Bruchstück von einem Mann. In dem zarten Knabenalter, wo Erectionen, selbst von der Geburt an<sup>27</sup>, auf Veranlassung ganz geringer Reize, entstehen, können sie wohl zur allmählichen Entwicklung des Theils beitragen, dessen der erwachsene Mann so wesentlich bedarf, um seine volle Mannheit zu documentiren, in dem die vasculösen Räume, welche in der Erection mit Blut sich anfüllen, doch auch schon früher als das eigentliche Naturbedürfnis eintritt, sich im Verhältniß des übrigen Wachsthum des Körpers ausbilden müssen.

Bemerkungswerth ist auch, daß nicht allzu selten noch im Moment des Sterbens, wahrscheinlich zufolge der mehreren tumultuarischen Bewegungen im Körper, wodurch die natürliche Verbindung der Lebensthätigkeiten aufgehoben wird, Erectionen des Zeugungsorgans eintreten, die dann auch nach dem Tode, wegen in den Räumen stehend verbliebenen Bluts, fortbauern und in die allgemeine Erstarrung der Leichen mit übergehen. Man will besonders bemerkt haben, daß Erdrösselungen mit Erectionen verbunden seien. So will man auch dieß Phänomen, was bei in Schlachten gebliebenen Kriegerern nicht selten gefunden wird, als ein gewöhnliches auf Schlachtfeldern beobachtet haben, welches Völker des Orients mit Leichen füllten, und will die Veranlassung dazu in dem Gebrauch des Opiums zur Erweckung des Muthes finden<sup>28</sup>.

Die Unfähigkeit eines Mannes in den Jahren der Geschlechtsreife zur Erection kann im allgemeinen auch als Impotenz, und in so fern als krankhaft angesprochen werden. Indessen ist der Fall nicht ungewöhnlich, wo unter sonst vorhandenen Bedingungen der Zeugungsfähigkeit die auf das Zeugungsgeschäft gerichtete Willenthätigkeit die Erection des Zeugungsorgans nicht zur Begleitung hat, und also in einem übrigens gesunden Körper eine temporäre Impotenz eintritt. Man knüpfte in früherer Zeit an diese nicht so seltene Beobachtung

27) Ambrosius Stegmann führt unter andern in den Misc. nat. curios. Dec. 3. ann. 4. obs. 105 einen Fall an, wo ein Kind so geboren wurde.

28) Vgl. unter andern Garmanni de mirabil. mortuorum; l. 1. lit. 2. §. 9.



Idee einer Bezauberung, und als solche ist die Erscheinung von Zeiten der Rassenphilosophie her als Nestelknüpfen bezeichnet. Die Ursache derselben ist wohl immer eine psychische und sie ist das Resultat eines Conflicts leidenschaftlicher Gefühle, unter denen eines und das andere störend ist, und die Cerebralthätigkeit, der Richtung des Individuums entgegen, auf fremde Ideen, und also von Sphäre des Geschäftslebens ableitet, daher die Abhülfe auch gewöhnlich auf psychischem Wege zu erwarten ist <sup>29</sup>.

29) Vgl. hierüber den pliquanten Art. Aiguillette im Dict. méd. T. I. (5.)

**Erection des Rückgraths,** (*Erectio trunci* <sup>1</sup>.) Ausstreckung des Rückgraths <sup>2</sup>, diejenige willkürliche Bewegung, wodurch die Rückenwirbel mit ihren Spinalprocessen einander so genähert werden, daß der Körperstamm eine gerade Haltung bekommt, im Gegensatz der Flexion. S. Muskeln.

1) 2) Maner's Besch. d. menschl. K. 7. B. S. 114.

**Erector der Clitoris,** (*Erector clitoridis* <sup>1</sup>.) Aufstehter <sup>2</sup>, oder Aufrichtender Muskel <sup>3</sup>, oder Steifer <sup>4</sup> des Cliters, Aufhebemuskel der weiblichen Ruthe, (*Summator clitoridis* <sup>5</sup>, *Musculus clitoridis* <sup>6</sup>, s. *superior rotundus clitoridis* <sup>7</sup>, s. *ischio cavernosus clitoridis* <sup>8</sup>, s. *ischio clitorideus* <sup>9</sup>), der kleine, längliche Muskel des weiblichen Körpers, welcher, dem Erector des Penis am männlichen Körper analog, vom steigenden Ast des Schoosstücks des Hüftknochens auf- und etwas vorwärts gehend, am hintern Theile des cavernösen Körpers der Clitoris sich ansetzt, und, mit dem gegenseitigen zusammenwirkend, die Clitoris in etwas zu bewegen geeignet ist. S. unter Genitalien des weiblichen Geschlechts, Clitoris.

1) Cowper myotom. ref. c. 5. 2) Sömmerring's Musckell. S. 225. 3) Plentaud's Zergliederungsk. Uebers. Leipz. 1782, 2. B. S. 656. 4) nach Sömmerring (a. a. D.) 5) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 2355. 6) nach Galoppia (obs. anat. in Vesal. operib. T. II p. 794.) 7) nach Riolan (anthropogr. l. 5. c. 37.) 8) (ischio-caverneux) nach Winslow (expos. d'anat. T. III. tr. du bas-ventre et lat. vers. l. c. §. 635.) 9) (ischio-clitoridien) nach Dumas (système method. de nomenclat. des musc. p. 154.)

**Erector des Penis,** (*Erector penis* <sup>1</sup>.) Aufrichter <sup>2</sup>, Unterstüher <sup>3</sup>, oder Aufhebemuskel der Ruthe, Aufsteinsteifer <sup>4</sup>, Spanner des männlichen Gliedes <sup>5</sup>, (*Summator* <sup>6</sup>, s. *Director penis* <sup>7</sup>, *Musculus ischio-cavernosus* <sup>8</sup>, s. *libidinosus* <sup>9</sup>, s. *posterior penis* <sup>10</sup>, s. *collateralis penis* <sup>11</sup>, s. *penem erigens* <sup>12</sup>), der längliche kurze Muskel, welcher nach innen von der Tuberosität des Sitzstücks des Hüftknochens entspringt, schräg auf- und einwärtsgehend sich hinterwärts an seiner

1) Weil die Alten die Erection des Penis von der Muskelwirkung desselben ableiteten. Vgl. Oribasii collect. art. med. ed. Dundas, Lugd. B. 1735, p. 279. S. auch Riolani anthropogr. l. 5. c. 36. 2) Sömmerring's Musckell. S. 213. 3) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 2286. 4) nach Sömmerring (a. a. D.) 5) Brown's verteutschte Besch. d. Musc. v. Spener, Berl. 1704, S. 9. 6) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. 7) nach Riolan (a. a. D.) 8) (ischio-caverneux) nach Winslow (expos. d'anat. T. III. tr. du bas-ventre et vers. lat. l. c. §. 569.) 9) Schaarschmidt's anat. Tabell. Tab. 14. 10) nach Columbus (de re anat. l. 5. c. 24.) 11) 12) nach Spiegel (de hum. c. fabr. l. 4. c. 12.)

Seite an den cavernösen Körper des Penis ansetzt, und, mit dem gegenseitigen zusammenwirkend, das steif gewordene Glied in seiner Richtung erhält. S. unter Genitalien des männlichen Geschlecht, Penis.

**Ereiferung**, s. Zorn.

**Ereuxis**, **Erevmos**, **Eryge**, in Uebersetzung der gleichlautenden Griechischen Worte<sup>1</sup>, i. q. Ructus.

1) ερευξίς, ερευμός, ερυγι.

**Erepthos**, in Uebersetzung des gleichlautenden Griechischen Wortes<sup>1</sup>, s. Erröthen.

1) ερευθος, rubor, pudor.

**Erfassung**<sup>1</sup>, **Empirie**<sup>2</sup>, **Empirische Kenntniß**, (**Experientia**<sup>3</sup>, **Empiria**<sup>4</sup>, **Empeiria**<sup>5</sup>.) Erfahren und Erfahrung drücken im allgemeinen jedes Wahrnehmen durch den äußern und innern Sinn aus; in engerer und eigenthümlicher Bedeutung aber bezeichnen sie die Summe der, mit Reflexion durch das Wahrnehmungsvermögen, vermittelt des Sinnes gesammelten Erkenntnisse. Erfahrung in diesem Sinne entsteht also nicht durch bloßes Anschauen oder Wahrnehmen durch die Sinne, sondern es ist dazu eine Thätigkeit des Verstandes erforderlich, welcher das Beständige und Nothwendige in den verschiedenen einzelnen Wahrnehmungen erkennt, es zu einem Ganzen verknüpft, und dadurch zum Range von Erfahrungen erhebt; welchen nicht bloß subjective, sondern auch objective Gültigkeit zukommt. Wer z. B. einmal zufällig wahrnahm, daß durch Eintauchen eines verbrannten Fingers in kaltes Wasser der Schmerz gelindert wurde, hat deßhalb noch nicht die Erfahrung gemacht: daß kaltes Wasser ein probates Mittel gegen die Folgen von Verbrennungen sei. Dazu gehört mehr. Er hat es nur in einem Falle wahrgenommen, und dadurch eine subjective — für ihn selbst gültige — Uebersetzung erhalten. Um aber diese Wahrnehmung zur Erfahrung zu erheben, und ihr auch objective Gültigkeit — Glaubwürdigkeit beizubringen — zu verschaffen, ist es nöthig, daß er diese Wahrnehmung wiederholt, und in verschiedenen Verhältnissen mache, und dabei auf alle Umstände Rücksicht nehme, welche Täuschung verursachen könnten. Wenn er nun aus wiederholten Versuchen und Beobachtungen durch Vergleichung der Resultate erkannt hat, daß keine andere zufällige Ursache, sondern allein das kalte Wasser die beständige Ursache der Linderung des Schmerzes und Beseitigung der Folgen gewesen sei; so kann er dann mit Recht sagen: Er habe die Erfahrung gemacht u. s. w.

Eine auf diesem Wege erkannte Wahrheit heißt eine Erfahrung, und ein auf diese Art begründetes Urtheil ein Erfahrungsurtheil; eine Wissenschaft aber, welche auf Erfahrungsgrundsätzen und Erfahrungen beruht, eine Erfahrungswissenschaft, z. B. die Geschichte, die practische Heilkunde u. s. w.

Man unterscheidet an der Erfahrung den Stoff oder die Materie

1) Zimmermann von d. Erfahrung in der Urinell. 2. Theile, Zürich 1765, 1764, 8. 2) ebendaf. 2. Buch 3. Kap. 3) Celsi de med. 1. praef.

4) 5) Vgl. dieß Wort.



den Inhalt derselben, und die Form. In beider Hinsicht kann mannigfaltig seyn.

Man theilt sie auch in verschiedener Hinsicht ein, z. B. in die gemeine und gelehrte, oder wissenschaftliche Erfahrung. Jene ist der Inbegriff der Erfahrungskenntnisse, welche das gemeine, gewöhnliche menschliche Leben darbietet und entwickelt; diese ist die Summe der Erkenntnisse, welche aus absichtlich angestellten Beobachtungen und Versuchen abgezogen und gesammelt wird. (S. Beobachten; Versuche.) Wir unterscheiden auch eigene und fremde Erfahrung. Die letztere ist von weit größerem Umfange, die erste aber für den größten Theil der Menschen von größerem Genuß.

(Diondi.)

**Erfindsamkeit, Erfindungsgeist.** Erfinden heißt durch Thätigkeit der schaffenden Phantasie und des combinirenden Verstandes neue Zusammensetzungen in den Künsten und Wissenschaften herbeiführen. Es unterscheidet sich vom Entdecken erstlich dadurch, daß jenes schon vorhanden, bis jetzt aber unbekannte Dinge auffindet, dieses aber etwas ganz neues, noch nicht vorhandenes, schafft. Der Magnet wurde entdeckt; denn er war als solcher vorhanden, obgleich er zu seiner Entdeckung unbekannt. Die Magnetnadel aber wurde gefunden, denn sie war vorher nicht da. Ferner unterscheidet sich das Finden vom Entdecken auch dadurch, daß letzteres ganz neue, vor- noch gar nicht bekannte Dinge zur Kenntniß bringt, und daher die Sphäre unsers Wissens reell erweitert; jenes im Gegentheil, das Finden, schafft aus schon bekannten Dingen bloß neue Zusammenhängen, und erweitert die Sphäre unserer Kenntnisse bloß formell. Man da der menschliche Geist sich nichts vorstellen kann, wovon er nicht durch die Sinne die Theilvorstellungen irgend einmal erhalten hat; so leuchtet ein, daß jede Erfindung nur eine neue Zusammensetzung schon vorhandener Theile oder Gegenstände, eine neue Verbindung bekannter Dinge ist. Es kann daher nichts Neues entstehen werden, von welchem die Theile nicht schon vorhanden wären. Alle Erfindungen sind bloße neue Zusammensetzungen, mithin *in forma* neu, nicht *in materia*. Sobald also eine Erfindung gleich auch neue, noch nicht bekannte Gegenstände enthält, so ist zugleich eine Entdeckung.

Das Erfinden kann auf doppelte Art geschehen, entweder durch Zufall, oder durch Nachdenken. Schwarz erfand das Schießpulver durch Zufall.

Wenn das Erfinden durch Nachdenken geschieht; so erfordert es nicht allein ein Zusammenwirken mehrerer Geisteskräfte, als der Phantasie, des Verstandes, insonderheit des Combinationsvermögens und Sagacität, sondern es ist dazu auch ein großer Vorrath der mannigfaltigsten Kenntnisse, nicht selten eine Menge von Beobachtungen und Versuchen, und ein lange fortgesetztes Nachdenken nöthig. Der Moment der Erfindung ist zwar oft ein einziger, und erscheint wie Blitz, allein oft nur, wie dieser, aus einer Menge dunkler Ideen, welche wie Wolken die Phantasie umschweben. Wer z. B. die Kunst zu fliegen erfinden wollte, würde nicht allein eine vollkommene Kenntniß der mechanischen und physischen Gesetze des menschlichen Dr-

ganismus und der atmosphärischen Modificationen besitzen, sondern auch eine Menge Versuche anstellen, und durch fortgesetztes Nachdenken und Combiniren den glücklichen Moment des Erfindens vorbereiten und herbeiführen müssen.

Es ist hierzu außerdem eine glückliche Stimmung des Geistes nöthig, welche Erfindungsgeist oder Erfindsamkeit heißt, und in der günstigen Anlage des Geistes besteht, leicht auf neue Combinationen der menschlichen Kenntniß zu kommen. Der Erfindungsgeist ist eine Eigenschaft des Genies, (s. Genie,) und kann wie dieses universell, oder particulär seyn. Universeller Erfindungsgeist — eine seltene Erscheinung — ist bloß Eigenschaft eines Universalgenies, welches mit den vollkommensten, in harmonischem Einklang entwickelten Geistesgaben eine schöpferische Phantasie, und die vielseitigste Bildung verbindet. Particulärer Erfindungsgeist ist häufiger, und einseitigen, oder particulären Genien eigen, z. B. in der Malerei, Musik, Mechanik u. s. w. Ein solches Genie macht nur in einer Wissenschaft Erfindungen, und scheint für alle andere unempfänglich und todt zu seyn.

Eine Erfindung, als Object, ist eine durch originelle, erfolgreiche Thätigkeit des Geistes hervorgebrachte neue Zusammensetzung menschlicher Kenntnisse und ihrer Producte, oder kürzer: ein neues bis jetzt noch nicht vorhandenes Kunstproduct. Die Wissenschaft, welche die Regeln aufstellt, nach welchen Materialien zu wissenschaftlichen Zwecken erfunden werden sollen, heißt *Heuristik*. (Dzondi.)

**Ergebenheit, Hingebung.** Ergebenheit ist die Stimmung unserer Gesinnung, vermöge welcher wir dieselbe freiwillig nach dem Willen eines andern leiten und modificiren, ohne daß uns der fremde Wille ein Gebot wär; denn in diesem Falle würde es Gehorsam seyn, welcher sich dadurch von Ergebenheit unterscheidet. Wir geben uns freiwillig der Willkür und dem Interesse eines andern hin, ohne daß er befugt wär, es zu fordern. Ein hoher Grad dieser Ergebenheit heißt Hingebung, und ist diese Hingebung mit Hintansetzung unsers eignen Interesses verbunden, und selbst bereit, Nachtheil und Schaden sich gefallen zu lassen, so heißt sie Aufopferung. Ein niederer Grad der Ergebenheit heißt Anhänglichkeit. Ergebenheit kann mancherlei Quellen haben, als Dankbarkeit, Hochachtung, Liebe u. s. w. (Dzondi.)

**Ergießung oder Erguß des Samens,** s. Ejaculation des Samens.

**Ergözung,** s. Vergnügen.

**Ergon,** in Uebersetzung des ursprünglich Griechischen Wortes *ἔργον*. i. q. Opus. S. unter Actionen des lebenden Körpers. i. *ἔργον*. (Vgl. Poesii decon. Hipp. h. v.)

**Ergrimmung,** s. Zorn.

**Erhabenheit,** s. Eminenz, auch Tuberosität. — des großen multangulären Knochens des Carpus, s. Tuberkel des großen multangulären Knochens des Carpus. — des Kahnbeins, Tuberkel des scaphoideischen Knochens. — des mittlern Hirnlappens, s. unter Loben des großen Gehirns, mittlerer Lobus.



des Sitzstücks des Hüftknochens, s. Tuberosität des Sitzstücks  
Hüftknochens.

Erhabenheiten der Handwurzel, s. Eminenzen des Carpus.  
der Speiche, s. Eminenzen des Radius. — Des Hinter-  
kopfs, s. Decipitalprotuberanzen. — Des Schenkelknochens, s.  
Tuberositäten des Schenkelknochens.

Erhebender Augenmuskel, s. Aufschlagender Augenmuskel.

Erhebung, s. Eminenz, auch Exaltation, auch Erection, auch  
Tuberosität. — Des Körpers, s. Aufrichtung des Körpers.

Erweiterung, s. Heiterkeit.

Erholung, Erquickung, Labung, (Recreatio<sup>1</sup>, Analepsis<sup>2</sup>.)  
Erholung ist Herstellung verlornen oder gestörter Kräfte des Gei-  
stes oder Körpers durch Ruhe. Wir bedürfen der Erholung nicht  
allein nach Anstrengung der Kräfte durch Arbeiten, sondern auch nach  
andern Störungen; man erholt sich z. B. nach Krankheiten, nach  
Blutverlust, nach Hungerleiden, nach Schrecken u. s. w.

Erholen unterscheidet sich von Ausruhen theils dadurch, daß letz-  
teres bloß den Zustand nach vorhergegangener Arbeit ausdrückt, also  
von engerer Bedeutung ist, theils dadurch, daß es bloß das Aufhö-  
ren der Kraftanstrengung, nicht die allmähliche Wiederersekung der  
Kräfte bezeichnet.

Erquicken, (von quid, lebendig,) heißt das getrübt, herab-  
gesetzte oder gestörte Gefühl des freien unbehinderten Lebens durch  
etwas einen Genuß erhöhen. Dieß kann auf doppelte Weise gesche-  
hen, entweder negativ, durch Verminderung unangenehmer Gefühle,  
z. B. des Durstes, oder positiv, durch Gewährung angenehmer Ge-  
nüsse, z. B. durch Schlaf, Speise, Ruhe u. s. w.

Laben, (von Leben,) heißt das ungetrübt, das Leben  
durch neue Annehmlichkeiten erhöhen. Der Unterschied zwischen Er-  
quickem und Laben liegt in dem Zustande des Lebensgefühls; ein  
schon reges Gefühl des Lebens kann nicht erquickt und gelabt  
werden. Wir erquickten den hungrigen Armen mit Speise und Trank,  
und laben uns an dem Anblicke, wie gut er es sich schmecken  
läßt. (Diondi.)

1) Plinij hist. mundi, l. 22. c. 23. 2) entsprechend dem Griechischen  
Worte αναληψις, (Galen de macore, l. c. 9.)

Erigenus penem musculus, s. Erector des Penis.

Erinnerung, s. Gedächtniß.

Erkenntlichkeit, s. Dankbarkeit.

Erkenntniß, (Cognitio<sup>1</sup>, Cognoscentia<sup>2</sup>, Episteme<sup>3</sup>.) Eine  
Vorstellung, oder einen Begriff von einem Gegenstande haben, heißt  
ihn kennen; ihn erkennen aber heißt eine Vorstellung, oder  
einen Begriff von ihm erhalten, oder eine Vorstellung u. s. w. auf  
einen durch den Sinn erhaltenen Gegenstand beziehen.

Erkennen unterscheidet sich mithin von kennen, wie erhalten von  
haben, wie erwerben von besitzen; beides aber von Denken dadurch,  
daß dieses im allgemeinen Begriffe und Vorstellungen haben bezeich-

1) Ciceron. de offic. l. 1. c. 43. 2) Marini Victorini adv.  
Arian. l. 1, 3) Vgl. dieß Wort.

net, jene aber das Beziehen derselben auf wirkliche Gegenstände. Denken ist bloß subjectiv, Erkennen aber zugleich das Beziehen des Gedachten auf etwas Objectives. Wenn ich durch Beschreibungen eine Vorstellung vom gelben Fieber habe, so denke ich mir es; habe ich irgend einmal Gelegenheit, die wirklichen Zeichen desselben in der Erfahrung zu beobachten und sie mit meiner Vorstellung zu vergleichen, so erkenne ich es in diesem Momente, und wenn ich im Besitze dieser Erkenntniß bleibe, so kenne ich es für die Folgezeit.

Es können drei Arten des Erkennens unterschieden werden: 1) das Erkennen durch den Sinn, wahrnehmen, anschauen, d. h. mit Bewußtseyn Vorstellungen auf Gegenstände beziehen; 2) das Erkennen durch den Verstand, verstehen, d. h. durch Begriffe etwas erkennen; 3) Erkennen durch die Vernunft, begreifen, d. h. aus allgemeinen Denkgesetzen u. s. w. erkennen. Bei jedem Erkennen ist die Urtheilskraft thätig.

Die Erkenntniß — in subjectiver Bedeutung — ist die Beziehung einer Vorstellung auf einen bestimmten Gegenstand, wodurch er von allen andern unterschieden wird. Das Erkenntniß — in objectiver Bedeutung — ist ein Gegenstand, in wie fern er erkannt wird, und ein Theil unsers Wissens ist. Dem philosophischen Ausdruck, die Erkenntniß, entspricht im gemeinen Sprachgebrauche das Wort Kenntniß in der einfachen Zahl. In der vielfachen Zahl aber — Kenntnisse — entspricht es der Bedeutung des philosophischen Ausdrucks: das Erkenntniß; denn Kenntnisse sind Theile unsers Wissens, oder Gegenstände, in wie fern sie erkannt werden.

An jeder Erkenntniß unterscheidet man Materie und Form; jene, welche auch Stoff, Inhalt genannt wird, ist das Mannigfaltige, welches von den Gegenständen herrührt und in eine Erkenntniß zusammengefaßt ist; diese, die Form, ist die bestimmte Art und Weise wie das gegebene Mannigfaltige vom Erkenntnißvermögen zu einer Vorstellung verbunden wird; jenes ist das Objective, dieses das Subjective einer Erkenntniß.

Zur Construction einer Erkenntniß sind folgende Bedingungen erforderlich: 1) ein Gegenstand, welcher erkannt werden soll, sei es in oder außer dem erkennenden Subjecte; 2) der Sinn, durch welchen etwas erkannt wird, sei es ein äußerer, oder der innere; 3) Richtung des Wahrnehmungsvermögens, oder des Sinnes auf einen Gegenstand oder Aufmerksamkeit; 4) ein Zustand des ungetrübten Bewußtseyns des erkennenden Subjects, und endlich 5) eine Thätigkeit der Urtheilskraft, welche die Vorstellung als mit dem vorgestellten Gegenstande übereinstimmend anerkennt. Die Genesis, Entstehung oder das Werden einer Erkenntniß, setzt mithin ein Zusammenwirken mehrerer Geistessthätigkeiten voraus und kommt auf folgende Art zu Stande. Das, auf einen Gegenstand und mit Bewußtseyn und Aufmerksamkeit gerichtete Vorstellungsvermögen nimmt vermittlest des Sinnes ihn wahr, und der reflectirende Verstand urtheilt, daß er einer gewissen Vorstellung entspreche.

Wahrnehmung eines Gegenstandes ist daher wohl von der Erkenntniß desselben zu unterscheiden. Wenn wir eine Wahrnehmung, Anschauung, haben, so verknüpfen wir Merkmale zu einer Vorstel-



g, ohne zu urtheilen, ob diese Verknüpfung nothwendig sei, und in andern auch so gemacht werde; wenn wir aber eine Erkenntniß — Kenntniß — von einem Gegenstande haben, so urtheilen wir, daß die Verknüpfung der Merkmale desselben zu einer gewissen Vorstellung nothwendig sei, und von allen mit Verstand begabten Wesen auf dieselbe Art gemacht werden müsse. Wer irgend einmal eine Finsterniß sah, hat eine Wahrnehmung und Vorstellung von derselben, allein keine Erkenntniß; denn diese hat nur derjenige, welcher die Art und Weise kennt, auf welche sie entsteht, welcher d. h. die Vorstellung von ihr mit dem Bewußtseyn hat, daß jeder andere, welcher eine Erkenntniß von ihr hat, sie auf eben dieselbe Weise haben müsse.

Man kann mancherlei Arten der Erkenntniß unterscheiden, von welchen die vorzüglichsten folgende sind.

1) Empirische und rationelle. Jene, welche auch sinnliche Erfahrungserkenntniß — Erkenntniß a posteriori — heißt, ist jede Erkenntniß, welche durch das niedere Erkenntnißvermögen vermittelt ist: Sinne mittelbar oder unmittelbar aus der Erfahrung geschöpft wird, selbst auch dann, wenn sie durch eine Reihe von Schlüssen von einem Erfahrungsfaße abgeleitet worden ist. Die ganze Reihe der Schlüsse ist dann empirisch. Rationelle, reine, intellectuelle, — Erkenntniß a priori — ist jede Erkenntniß, welche, von aller Erfahrung und Sinnesindrücken unabhängig, durch das obere Erkenntnißvermögen bloß durch die Gesetze des Vorstellungsvermögens gebildet ist.

2) Mathematische oder philosophische Erkenntniß. Jene, welche auch die intuitive, anschauliche Erkenntniß heißt, entsteht aus Construction der Begriffe, z. B. der Begriff Triangel. Diese, auch discursive Erkenntniß genannt, entsteht durch Verstandesgesetze aus bloßen Begriffen, z. B. die Begriffe Ursache und Wirkung.

3) Negative und positive Erkenntniß. Jene bestimmt bloß, was ein Gegenstand nicht ist, diese, was er ist.

4) Speculative Erkenntniß, welche auf Dinge geht, die nicht Gegenstände der Erfahrung sind, z. B. Gott.

5) Transscendentale Erkenntniß, welche sich mit den Gesetzen unserer Erkenntniß a priori beschäftigt, z. B. daß Raum und Zeit Formen der Wahrnehmung oder Anschauung sind.

6) Analoge Erkenntniß ist die Erkenntniß des Verhältnisses einer an sich unbekannten Sache zu einer bekannten, oder die Erkenntniß eines unbekannten Gegenstandes nach der Ähnlichkeit mit einem bekannten. So haben wir z. B. von Gott nur eine analoge Erkenntniß, in wie fern wir von den Vollkommenheiten unseres Geistes auf die des höchsten Wesens schließen. (Diondi.)

**Erkenntnißvermögen.** Dieser Ausdruck bezeichnet nicht ein einzelnes Vermögen der Seele, sondern die Gesamtheit der verschiedenen und mannigfaltigen Vermögen und Organe des Menschen, durch welche das geistige Princip Vorstellungen und Begriffe erhält, und constituiert als Totalität mit dem Gefühls- und Begehrungsvermögen die Trias — Dreieinigkeit — der menschlichen Seele. Es ent-

faltet sich in zwei Hauptvermögen, den Sinn, oder die Sinnlichkeit, und den Geist, oder die Intelligenz; in jenem wurzelt das niedere, sinnliche, in diesem das höhere, verständige Erkenntnißvermögen. Vermittelst des niedern Erkenntnißvermögens erhalten wir einzelne Wahrnehmungen, Anschauungen und sinnliche Vorstellungen, z. B. dieses, oder jenes Thieres, Gewächses, welche sich immer nur auf einzelne Gegenstände, oder Individuen beziehen. Vermittelst des höhern Erkenntnißvermögens aber bilden wir verständige Vorstellungen, Begriffe, Urtheile, Ideen, welche sich immer auf das allgemeine, was mehreren gemein ist, beziehen, z. B. der Begriff Mensch, Thier, Gewächs. Zu jenem, dem niedern, gehören die Sinneswerkzeuge — der äußere und innere Sinn —, das Vorstellungs- — Wahrnehmungs- oder Perceptionsvermögen, das Gedächtniß- und Erinnerungsvermögen; zu diesem, dem höhern, gehören Verstand, Urtheilskraft und Vernunft. Phantasie, oder Einbildungskraft und Bewußtseyn gehören beiden an; denn ohne Bewußtseyn ist selbst keine vollkommene Sinneserkenntniß möglich, und Einbildungskraft ist bloß selbstthätiges Gedächtniß.

Obgleich nur in der Theorie das höhere Erkenntnißvermögen von dem niedern getrennt ist, und jedem gewisse Geistesvermögen zugetheilt werden; so findet doch diese Trennung keinesweges in der Natur selbst Statt, sondern die gesammten Geistesvermögen, welche bei dem Erkennen thätig sind, wirken stets harmonisch, und sind in ihrer Thätigkeit so innig mit einander verwebt, daß dieselben Vermögen, welche im höhern Erkenntnißvermögen wirken, auch im niedern thätig sind. Denn selbst bei der einfachsten Wahrnehmung muß der Verstand thätig seyn, und das Licht der Vernunft — das Bewußtseyn — leuchten; wenn sie zur Vorstellung werden soll; und auf der andern Seite können die abstractesten Begriffe und Ideen nicht anders als im Gedächtniß aufbewahrt, durch die Erinnerungskraft hervorgerufen, und durch die Phantasie dem Verstande vorgehalten werden.

Die Art und Weise, wie vermittelst des Erkenntnißvermögens Erkenntniß zu Stande kommt, ist im Artikel Erkenntniß angegeben worden. Hier ist nur so viel zu bemerken, daß, wenn wir vom Erkenntnißvermögen im allgemeinen sprechen, auch die bloßen Wahrnehmungen und sinnlichen Vorstellungen zu seinen Functionen gehören.

Dem Erkenntnißvermögen sind gewisse Formen oder Grundgesetze — nicht Grundsätze — eigen, nach welchen es die Gegenstände erkennen und Vorstellungen von ihnen bilden muß. Diese Formen und Denkgesetze sind das Wesen des Geistes und so wie das All der Dinge aus einem und demselben Urquell geflossen. Daher stimmt auch die Einrichtung der gesammten Natur mit unsern Denkgesetzen überein, und unser Erkenntnißvermögen, in Hinsicht auf seine Urformen, paßt genau den Gattungen und Arten des Erkennbaren an, so daß unsere Erkenntniß dadurch Gewißheit und Realität erhält, und nicht bloße Sinnestäuschung, Schein oder Erscheinung ist. Dadurch wird auch Erkenntniß der Natur a priori möglich, denn die Gesetze des Denkens sind der Natur der Dinge genau angepaßt, und selbst erst durch die Entwicklung und Ausbildung des menschlichen Geistes von der niedrigsten Stufe der kindischen Bewußtlosigkeit zur höhern, des ver-



stiftigen Nachdenkens zum Bewußtseyn gelangt und begründet worden. Indesß da jede Erkenntniß a priori nur eine individuelle ist, durch eine beschränkte Intelligenz bedingt ist; so muß sie unvollständig und selbst des Irrthums fähig seyn, sie bedarf daher einer ständigen Berichtigung durch genaue Vergleichung mit der Erfahrung, welche der Urquell aller unserer Erkenntnisse ist. Vgl. *Vorstellungsvermögen*, *Verstand* und andere verwandte Artikel. (*Diondi.*)

**Erkennung**, s. *Wahrnehmung*.

**Erkühnung**, s. *Kühnheit*.

**Erkünsteln**, vgl. *Kunst*.

**Erlernung**, s. *Gelehrsamkeit*.

**Ermannung**, s. *Muth*.

**Ermattung**, *Abmattung*, ist die natürliche Folge eines fortwährenden Kraftaufwandes, in dem Gefühl der Mattigkeit, (vgl. diesen Artikel,) und in der Verringerung der Energie der Kraftäußerung sich andeutend. Sie tritt vermöge des Naturgesetzes ein, daß jede Lebensfunction, die nicht anders als auf Kosten der übrigen, erst mit Abbruch der Energie geschehen kann, welche alle übrigen Functionen erheischen, nur temporär Statt haben darf, und durch längere oder kürzere Perioden relativer Ruhe unterbrochen seyn muß. Auch diejenigen Functionen, die, da wesentlich das organische Leben in ihnen besteht, immer einen Theil der allgemeinen Kräfte für sich in Anspruch nehmen, daher auch keine wirklichen Unterbrechungen stattfinden, wie z. E. der Herzschlag, das Athemholen, können meistens eine höhere Anregung auf die Dauer nicht ertragen, und auch ihnen tritt dann ein Zustand der Ermattung ein, der aber, weil das Leben hier in seinen Wurzeln selbst angegriffen ist, immer mit pathologischen Erscheinungen verbunden ist. Vorzüglich sind es aber die Thätigkeiten der willkürlichen Bewegung, der Geistesthätigkeit und der sinnlichen Wahrnehmung und die der reproductiven Sphäre des Lebens, welche ermatten, wenn sie ohne verhältnißmäßige Unterbrechung und mit Anstrengung, (s. dieß Wort,) in Thätigkeit versetzt werden. Derselbe Zustand ausgebildet, nur ohne Beachtung des ihn begleitenden Gefühls, wird als *Abspannung*, (vgl. dieß Wort,) bezeichnet, der dann in der Erschöpfung, wobei alle Kraftäußerung aufhört, seinen höchsten Grad erlangt. (H.)

**Ermüdung**, (*Fatigatio*<sup>1</sup>, *Defatigatio*<sup>2</sup>), der Uebergang aus dem Zustande von Kraftgefühl in den von Müdigkeit. Vgl. dieß Wort, auch *Ermattung*, auch *Abspannung*.

1) „Minus afficit sensus fatigatio, quam cogitatio.“ Curtii de reb. Alex. M. l. 7. c. 11. 2) „Senectutis defatigationem fugere debemus.“ Ciceron. de senect. extr.

**Ermuthigung**, s. *Muth*.

**Ernährende Arterien und Venen**, s. *Nutritionsarterien* und *Venen*.

**Ernährung**, *Nutrition*<sup>1</sup>, (*Nutritio*<sup>2</sup>, *Nutricatio*<sup>3</sup>, *Nutritus*<sup>4</sup>, *Alitura*<sup>5</sup>.) Der thierische Körper bedarf, wie der vegeta-

1) Lucd's Entwurf ein. Systems der med. Anthropol. 1. B. 2. Abschn. 3. Cap.

2) v. der Linden melet. med. Hipp. med. physiol. S. 105.

3) 4)

Varronis de re rust. l. 1. c. 44 et 47. 5) doch nur in activer Bedeutung. Gelli noct. Att. l. 12. c. 1.

bilische, zu seinem Bestehen stete Erneuerung der in dem Lebensproceß verloren gegangenen Stoffe. Dieser Wiederersatz des der äußern Natur Zurückgegebenen durch andere äußere Stoffe ist Ernährung im weitesten Sinne des Worts. In wie fern sie selbst ein Lebensproceß ist, oder durch eignes inneres Vermögen erfolgt, durch welches aus fremdartigen Stoffen ein eigenthümlicher, wie ihn die Natur eines jeden Organismus erheischt, gebildet wird, ist sie Reproduction; in wie fern die Umänderung des Stoffes selbst ins Auge gefaßt wird, Assimilation. (Vgl. beide Artikel.) Ernährung ist also an sich dasselbe, nur als einfacher Gegenstand der sinnlichen Wahrnehmung dargestellt, zufolge deren es unter die Kenntnisse des gemeinen Lebens gehört, daß alle Pflanzen- und Thierkörper nur durch und unter Zugang angemessener äußerer Stoffe und deren Umänderung in dem Innern des Organismus in angemessene Substanz ihr Bestehen haben.

Diese äußern Stoffe heißen dann, vorzüglich bei Thierkörpern, die solche erst in größern Massen in einen innern Raum, (Magen, Darmcanal,) aufnehmen, von wo aus sie, in flüssigen Zustand versetzt, (wenn sie solches nicht schon vor dem Genuß waren,) dann erst in die innere Körpersubstanz gelangen, Nahrung, oder Nahrungsmittel und sind, als solche, und in wie fern sie mehr oder weniger sich eignen, den Körper zu ernähren, oder assimilirt zu werden, Gegenstand der Diätetik. Die Verarbeitung dieser Nahrungsmittel zu wirklichem organischen Stoffe, oder die Verdauung, ist aber mehr eine der Ernährung selbst vorhergehende Function. (S. diesen Artikel.) Hiernach wird also jenes Wort in einer eigenthümlichen Bedeutung bloß auf den Wiederersatz des aus dem Körper Geschiedenen und Gewichenen durch bereits assimilirten Stoff beschränkt.

Hier ist denn der Stoff der Ernährung nicht mehr etwas Aeußeres, dem Organismus fremdartiges, sondern ein wirklich schon assimilirter, dem Organismus eigenthümlicher Stoff, und zwar bei den vollkommnern Thierclassen das Blut, (s. diesen Artikel,) und der Vorgang der: daß durch eigne Lebensthätigkeit, (Reproduktionsvermögen,) das dazu geeignete Material während der Circulation des Bluts durch die einzelnen Theile von dem Blute sich trennt, und in wirkliche thierische feste Substanz von der Beschaffenheit, wie dieß für jedes Organ insbesondere erforderlich ist, umgeändert wird. Es ist dieß also der letzte Act der Assimilation, und an sich weiter keiner Erklärung fähig, wie dieß unter dem Artikel Assimilation bemerkt worden ist, und unter dem Artikel Reproduction weiter zur Sprache kommen wird. (H.)

**Ernährungskraft**, (Vis, s. Virtus; s. Facultas nutritiva, s. nutritiva, s. nutritoria, s. alitrix, s. augmentativa, s. crescitiva,) eine Subtilität der Galenisten in weiterer Unterscheidung der anhaltenden Facultät. S. unter Facultäten.

1) Avicennae canon ex Gerardi Crem. versione a J. Coster, et J. P. Mongio annotationib. illustr. l. 1. fen. 1. doct. 6. c. 1.

**Ernährungsproceß**, s. Reproduktionsproceß. — **thätigkeit**, s. Reproduktionsvermögen.

**Erniedriger**, s. Deprimirende Muskeln.



**Ernst, Ernsthaftigkeit, Ernstlichkeit, (Severitas<sup>1</sup>.)** Ernst berechnet in der ursprünglichen Bedeutung die Stimmung des Menschen, in welcher er sich befindet; wenn er mit Gegenständen befaßt ist, die ihm nicht gleichgültig, die ihm wichtig sind. Da das Leben mit seinen Angelegenheiten eine ernste, d. h. wichtige Sache ist; so pflegt die gewöhnliche Stimmung des Menschen ernsthaft, zu seyn, und ist in dieser Hinsicht andern Zuständen und Stimmungen des Menschen, als z. B. der Gesundheit, der Ruhe, der Stille, der Gleichmüthigkeit verwandt. Ernst ist daher dem Manne, und dem verständigen Alter, welchem die Bedeutung des Lebens wichtiger ist, und überhaupt jedem einzelnen, welcher die Wichtigkeit des Lebens mehr empfindet, in einem höhern Grade eigen; weniger dem Kinde- und jugendlichen Alter, so wie überhaupt jenen, die das Leben mehr von seiner angenehmen als lästigen Seite betrachten. — Da die Ansicht, welche wir vom Leben haben, sehr subjectiv ist; und von der Stimmung unsers Innern, von dem Gefühl der Kraft und des Wohlfeyns des Geistes und Körpers, von dem Glauben an die Schicksale und von der Leichtigkeit, mit welcher wir Schwierigkeiten überwinden, abhängt; so ist eine Hauptquelle des Ernstes die ernsthafte Stimmung eines Menschen auch in seinem Innern, in seinen individuellen Geistes- und Körperanlagen und Bestimmungen zu suchen. Daher sind tausend Verhältnisse diesem innern Kern, welche jenen in die ernsthafteste Stimmung versetzen. Man kann an Ernst in wichtigen Angelegenheiten des Lebens, zeigt Flacht, Beschränktheit und Mangel an Charakter an, feierlicher Ernst nur in unwichtigen Kleinigkeiten ist Pedanterei.

Der Ernst kann verschiedene Grade haben, welche theils von der Wichtigkeit oder mindern Wichtigkeit des Gegenstandes, welcher ihn bezieht, theils von der individuellen Stimmung der Seele abhängt. Im Gegenstand sowohl, als die Stimmung, welche er hervorbrachte, wie die äußern Zeichen desselben, als Mienen, Geberden, Benehmen, bezeichnen wir mit dem Ausdruck ernsthaft; alles aber, was in dieser Stimmung thun, nennen wir ernstlich, wir glauben, wünschen, wollen, vermahnern, strafen u. s. w. ernstlich. Ernstlich unterscheidet sich mithin von ernsthaft, wie Wirkung von Ursache, und bezeichnet beides, denn man sagt: eine ernste Gesinnung, ernste Miene, ein ernster Verweis u. s. w.

Ernsthaftigkeit, das Hauptwort von ernsthaft, ist mit diesem gleichbedeutend.

Der Ernst drückt sich auch in den Mienen und Geberden deutlich aus, nicht durch Falten und Runzeln, (den Andeutungen der Düsternheit, Sorge, Verdruß,) sondern durch Ruhe und Stätigkeit der gesetzmäßigen von Freundlichkeit und Scherz entfernten Gesichtszüge eines Menschen. Ernst kann mit einem Grade von Heiterkeit verbunden seyn; aber Fröhlichkeit und Lustigkeit sich aussprechen, da weicht der Ernst. Aus dieser ursprünglichen Bedeutung des Wortes Ernst, in welcher es etwas Wichtiges bezeichnet, ist eine zweite, nicht weniger gewöhnliche abgeleitet worden. Da man nämlich in Angelegenheiten, welche uns wichtig sind, nicht scherzet, d. h. das Gegentheil von dem

<sup>1</sup>) Cicéron. de senect. c. 28. „severitatem in senectute probo.“

äußert, spricht, thut, was man für wahr hält, und was unsere Meinung und Ueberzeugung gemäß ist; so bezeichnen wir mit dem Ausdruck Ernst auch die Uebereinstimmung unserer Gesinnung und Ueberzeugung mit unsern Äußerungen, und setzen ihn in dieser Hinsicht dem Scherze entgegen. In dieser Bedeutung wird er von jeder Art der Äußerung unserer Ueberzeugungen, Gefühle, Meinungen, Wünsche, Begehrungen, ja selbst von der Wahrheit des Scherzes gebrandt, denn wir fragen z. B. ist's im Ernst nur dein Scherz? Wenn Ernst dort so viel als wichtig bedeutete, so bedeutet er hier so viel als wahr, und ist dem bloßen Schein entgegengesetzt. Man sagt: jetzt wird's Ernst! wenn etwas sich nun deutlich, als das auspricht, was es wirklich ist.

Ernst unterscheidet sich übrigens von wahr, wie Art von Gattung. Ernst bezeichnet nur eine Art von Wahrheit, nämlich die Uebereinstimmung unserer Gesinnung mit unsern Äußerungen, und zwar immer in Beziehung auf die mögliche Voraussetzung, als könne ein Scherz seyn; denn ohne diese Beziehung bezeichnet die Uebereinstimmung unserer Gesinnungen mit unsern Äußerungen der Ausdruck auf richtig. Vgl. Aufrichtigkeit. (Dzondl.)

*Eros*, in Uebertragung des ursprünglich Griechischen Wortes  $\epsilon\rho\varsigma$ , i. q. Amor. S. Liebe.

1)  $\epsilon\rho\omega\varsigma$ , nach der ältesten Mythe von Hestiodus und Orpheus das Prinzip aller Genuß, durch Lösung des uranfänglichen Erreits der Elemente; erst nach ihm entstanden die Götter des Olymps. Die Mythe des *Eros*, als Göttersohns von Ares und Aphrodite, ist spätern Ursprungs. Sein Gegensatz ist *Anteros*, nach der Mythe der jüngere Bruder des *Eros*, nach dessen Geburt dieser erst zu wachsen begann, zur Andeutung, daß erst Gegenliebe die Liebe kräftigt.

*Erotoleptos* und *Erotomanes* bezeichnen in Uebereinstimmung mit den gleichlautenden Griechischen Worten  $\epsilon\rho\tau\omicron\lambda\epsilon\pi\tau\omicron\varsigma$  und  $\epsilon\rho\tau\omicron\mu\alpha\nu\epsilon\varsigma$  beide einen Verliebten, doch mit dem Unterschied, daß der Gegenstand der Liebe des erstern ein edler ist, der letzte hingegen bloß einer leidenschaftlichen Begierde sich überläßt. Vgl. Liebe.

2)  $\epsilon\rho\omega\tau\omicron\lambda\eta\pi\tau\omicron\varsigma$ ,  $\epsilon\rho\omega\tau\omicron\mu\alpha\nu\epsilon\varsigma$ . S. v. der Linden sel. med. ex. 15. §. 46.

Erquickung, s. Erholung.

Erregbarkeit, Erregende Kräfte oder Potenzen, Erregung, s. Incitabilität, Incitirende Potenzen, Incitation.

Erregungstheorie <sup>1</sup> war eine Zeit lang in den neuern medizinischen Schulen ein Lieblingsausdruck zur Bezeichnung von medizinischen Systemen, denen die von Brown aufgestellten Lehrsätze der Erregung als Lebensprincip zur Grundlage dienen. In wie fern solche besonders zum Leitfaden einer rationellen Krankheitsheilung dienen sollte, würde ihrer hier nicht zu gedenken seyn. In wie fern aber auch für einfache Lebenserscheinungen im gesunden Zustande ein Erklärungsgrund in ihr gesucht wurde, war und ist sie noch jetzt auch dem Physiologen nahe gelegt.

Was aber Brown über die Gesetze des Lebens für Grundsätze aufstellte, ist unter dem Artikel Brownsches System der Physiologie zusammengestellt worden. Dasselbe ist nun also auch Erregungstheorie in consequenter Bezeichnung, so weit sie den Physiologen in-

1) Matthäi's Handbuch der Erregungstheorie, Berl. 1801, 8.



sirt. Aber man fand gar sehr bald, daß Brown's Lehre zur Erklärung der Gesetze des Lebens nicht ausreichte. Gleichwohl war durch den blendenden Schein von Realität, den das Brownsche System, bei seiner Einfachheit und seiner Consequenz hatte, zu sehr befangen, um es sogleich aufzugeben, wenn man sich auch das Unbefriedigende und Unzureichende desselben nicht abläugnen konnte. Man machte also eine Zeit lang Versuche, dem Brownschen System Bestimmungen beizufügen, welche die Lücken desselben ausfüllen, oder zu dienen sollten, um ihm Anwendbarkeit zu verleihen, welcher es seinem Princip nach widerstrebte. So bewies Jos. Frauk, einer der eifrigsten Verfechter der Brownschen Lehre in Deutschland, daß neben reizenden Potenzen auch noch andere Wirkungen der Reize, die bloße Reizung berücksichtigt werden müßten, daß die Erregbarkeit wirklich ersetzt werden können; so unterschied Rösch (mit Reil,) in der Erregbarkeit, Regbarkeit und Wirkungsmögen als zwei besondere Factore; überhaupt wurde von fast allen Theoretikern, die sich zu Brown's Fahne bekannten, mehr oder weniger Qualitatives als nothwendige Bedingung der Lebenserscheinungen eingeräumt. Je mehrere dergleichen Modificationen und Zusätze aber die Brownsche Lehre erhielt, und je mehr insbesondere dem fortgebildeten Brownianismus die qualitativen Bestimmungen des Lebens aus dem Hintergrunde wieder hervortraten, in welche sie Brown verwiesen hatte, der bloß die quantitativen Lebensverhältnisse als primäre beachtete; desto mehr verlor die Brownsche Lehre ihren Charakter als Erregungstheorie, bis sie endlich, nachdem bereits ihre Hauptstützen unter den Deutschen Schriftstellern, Marsch, Kilian u. m., zu der durch Schelling modernisirten Naturphilosophie übertraten, sich gegen die besonders seit dieser Zeit verbreiteten allgemeineren und erweiterten Ansichten des Naturlebens nicht weiter behaupten konnte, und als ein auf eignen Stützen ruhendes Lehrsystem in den medizinischen Schulen ganz unterging, obgleich einzelne Grundsätze derselben ihre auch schon vor Brown's Periode anerkannte Wahrheit ewig behaupten werden. (5.)

**Erröthen**, Rothwerden, (Erubescencia<sup>1</sup>, Rubor faciei, Erythros<sup>2</sup>.) Die Gesichtshaut des Menschen ist nicht nur von feiner Textur und mit reichlichen Blutgefäßen durchzogen, als verhältnißmäßig andere Hauttheile, sondern es verbreitet sich auch von den inneren Zweigen von Gehirnnerven, die zu den Gesichtsmuskeln gehen, und theils dem fünften Nervenpaare angehören, theils vom Facialisnerven oder dem sogenannten harten Nerven kommen, eine Menge dieses. Um deswillen ist auch der Lebenssturgor, der den Zustand betrübter Gesundheit begleitet, insbesondere durch Vollheit und Röthe des Gesichts, namentlich der Wangen, ausgedrückt, so wie die Erhöhung der Lebensthätigkeit durch Bewegung, Wärme, heisses Getränk, geistiges Getränk sich insbesondere auch durch Gesichtsröthe und Wangenröthe andeutet.

Eine eigne Erscheinung aber ist das vorübergehende Erröthen, als Ausdruck leidenschaftlicher Gefühle, besonders der freudigen Ueberraschung und des Lächelns, aber auch der Scham, der Verlegenheit

<sup>1</sup> Tertullian de poenit. c. 20 In der Bedeutung von Scham. <sup>2</sup> Vgl. dasselbe Wort.

und des Erschreckens, wenn nämlich letztere Gefühle nicht so weit gehen, daß sie den Geist niederschlagen, sondern wenn solche bloß einen Kampf anregen, der mit der Kraft nicht im Mißverhältniß ist. In jenem Fall ist nämlich das Gegentheil des Erröthens, das Erblaffen des Gesichts, die Folge. (Vgl. diesen Artikel.) Unter wogenden Gefühlen in jenem Kampfe, indem der Geist abwechselnd sich erimuthigt, abwechselnd aber auch sich gedrückt und gelähmt fühlt, wechseln auch wohl Erröthen und Erblaffen, und werden dadurch Verräther des innern Zustandes.

Man hat geglaubt, das Erröthen wie das Erblaffen entsände dadurch, daß die Blutgefäße des Gesichts durch Nervenschlingen verengt würden, und dadurch das Blut entweder in den Gefäßen des Gesichts zurückgehalten, oder zu ihnen zu gelangen verhindert würde<sup>3</sup>. In dieser Ansicht ist aber offenbar zu viel auf eine mechanische Einwirkung gerechnet, deren Daseyn nicht einmal erweislich ist. Wir können eigentlich nicht mehr als eine Erhöhung der Lebensthätigkeit des so reichlich mit Nerven versehenen Gefäßnetzes der Gesichtshaut als gleichzeitigen Vorgang mit der Erhöhung der geistigen Thätigkeit anerkennen, welchen die Natur auf gleiche Weise an jene Gemüthseraltation geknüpft hat, wie sie auf tausendfache andere Art das gemüthliche innere Leben sich auch durch äußere Bewegungen und überhaupt körperliche Andeutungen veroffenbaren läßt.

Bei fein fühlenden Frauenzimmern wird beim Erröthen des Gesichts, zumal bei der Schamröthe, auch wohl der Hals bis an den Busen geröthet. Dieß scheint auf der innigen Verflechtung der Nervenzweige von dem Facialnerven mit den Zweigen des besonders von dem dritten Cervicalnerven entspringenden flachen Halsnerven zu beruhen, welche letztere sich eben so in die Haut des Gesichts, als die des Halses verbreiten. (H.)

3) S. Schmörring's Hrn. und Nervenlehre, S. 241 u. 257.

**Errhomenos**, in Uebersetzung des rein Griechischen Worts<sup>1</sup>, f. **Gesund**.

1) *εργαζμενος*, valens, und von verschiedenen Körpertheilen und Lebensthätigkeiten vom Körper wie vom Geist gebräuchlich. Vgl. v. der Linden sel. med. ex. 13. S. 293 et 491.

**Erschaffung**, f. **Schöpfung**.

**Erscheinung**, (*Apparitio*, *Apparentia*<sup>1</sup>, *Epiphania*<sup>2</sup>.) das Daseyn für die sinnliche Wahrnehmung, welches also für den Verstand auch bloße Illusion seyn kann. Vgl. **Existenz**, ingl. **Illusion**.

1) Jul. Firmici astron. libr. 5. c. 8.

2) Vgl. dieß Wort.

**Erschlaffer des Paukenseils**, f. **Laxatoren des Tympanums**.

**Erschlaffung**, f. **Schlaffheit**. — **Des Herzens**, f. **Diastole**.

**Erschöpfung der Kräfte**, vergl. **Ermattung**.

**Erschrecken**, f. **Schreck**.

**Ersinnen**, **Aussinnen**, auf etwas mit Schwierigkeit verknüpfes mit Erfolg sinnen. S. **Sinnen**.

**Erstarrung**, f. **Coagulation**. — **Der Leichen**, f. **Todtenerstarrung**.

**Erstaunen**, f. **Verwunderung**.



**Erste Fingerglieder**, s. unter Phalangen der Finger. — **Ge-  
ste der Finger**, s. unter Fingergelenke. — — **Der Zehen**,  
unter Zehengelenke. — **Magen- und Darmhaut**, s. unter  
Ante. des Magens und der Gedärme, äußere Haut.

**Erste Reihe** <sup>1</sup> der Knochen des Carpus, **Oberste Reihe** <sup>2</sup>  
der Handwurzelknochen, (Ordo primus <sup>3</sup>; s. superior <sup>4</sup> os-  
sium carpi,) von den acht Knochen, welche gemeinschaftlich die  
Handwurzel bilden, der scaphoideische, der semilunäre und der trian-  
gläre, welche gemeinschaftlich die Articulationsfläche der Hand bil-  
den, und den lenticulären Knochen zur Seite beigefügt haben. S.  
Handknochen.

1) — 4) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 254.

**Erste Reihe** <sup>1</sup> der Knochen des Tarsus, **Hinterste Rei-  
he** <sup>2</sup> der Hinterfußknochen, (Ordo primus ossium tarsi <sup>3</sup>),  
von den sieben den Hinterfuß bildenden Knochen der Talus und der  
darunter gelegene Calcaneus. S. Fußknochen.

1) — 3) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 356.

**Erste Rippe** <sup>1</sup>, **Oberste Rippe** <sup>2</sup>, (Costa prima <sup>3</sup>, s. su-  
prema <sup>4</sup>, s. parva, Catacleis <sup>5</sup>, Subclavicula, Subclavium <sup>6</sup>),  
die oberste der zwölf Rippen auf jeder Seite der Brust, die sich durch  
ihre stärkere Krümmung, mehrere horizontale Lage, ihre Kürze und  
mehrere Eigenheiten des Baues, so wie auch mindere Beweglichkeit  
von den übrigen auszeichnet. S. Rippen.

1) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 157.

2) Hildebrandt's

Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 567.

3) 4) Verheyen c. h. anat.

tr. 5. c. 11.

5) 6) Vgl. das Wort catacleis. S. nach G. Hofmanni

comm. ad Galeni l. de usu part. n. 103.

**Erste Vorkammer des Herzens**, s. unter Arterien des Her-  
zens, erstes Atrium. — **Wege**, s. Darmcanal. — **Wurzeln  
des Intercostalnerven**, s. Cephalischer Theil des Intercostalner-  
ven. — **Zehenglieder**, s. unter Phalangen der Zehen.

**Erster Brustknoten**, s. unter Thoracische Ganglien. — —  
**Erster Wirbel**, s. Erster Thoraxwirbel. — **Gehirnnerv**, s. Olfactori-  
scher Nerv. — **Falsnerv**, s. unter Cervicalnerven, erstes Paar.  
— — **wirbel**, s. Atlas. — **hinterer, äußerer und unterer  
Hautnerv des Unterschenkels**, s. unter Cutannerven des Unter-  
schenkels. — **Lenden-nerv**, s. unter Lumbalnerven.

**Erster Lendenwirbel**, **Hüftwirbelbein** <sup>1</sup>, **Nierenwir-  
belbein** <sup>2</sup>, (Vertebra nephritis <sup>3</sup>, s. asphaltites <sup>4</sup>), besondere  
Heraushebung des ersten Lendenwirbels, der zu denen des Rückens  
den Uebergang macht. S. Lendenwirbel.

1) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 157.

2) 3) Kulmus anat.

Tabell. Tab. 5. Note p.

4) Linden med. physiol. 1. 2. c. 14. S. 17.

**Erster Mittelhandknochen**, **Mittelhandknochen des Daumens**,  
s. unter Metacarpus. — — **füßknochen**, **Mittelfußknochen  
der großen Zehe**, s. unter Metatarsus. — **Nackenwirbel**, s.  
Atlas. — **Nerv des siebenten Paares**, s. Facialnerv.

**Erster Rückenwirbel**, oder **Erster Brust- oder Thorax-  
wirbel**, **Erstes Brust- oder Rückenwirbelbein** <sup>1</sup>, (Verte-  
bra)

1) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 135.

bra dorsi, s. thoracica prima<sup>2</sup>, Vertebra gutturalis<sup>3</sup>, Lophadia<sup>4</sup>, Lophia<sup>5</sup>, Liphia<sup>6</sup>, Asphalia<sup>7</sup>.) der oberste der zwölf Thorarwirbel, der besonders in seiner Bildung das eigene hat, daß die Gelenkflächen für die erste Rippe von ihm allein auf jeder Seite gebildet werden. S. Thorarwirbel.

2) Riolani comm. de ossib. c. 15.

3) Monro's Knochenl. übers. v.

Krause, S. 283. Note.

4) — 6) S. Lophia.

7) nach dem Griechischen

Worte ασφαλεια, Sicherheit.

**Erster Rückennerv**, s. unter Dorsalnerven, der obere. — **Thorarwirbel**, s. Erster Rückenwirbel. — **Wirbel**, s. Atlas.

**Erstes Brustwirbelbein**, s. Erster Rückenwirbel. — **oder oberstes Halswirbelbein**, s. Atlas. — **Rückenwirbelbein**, s. Erster Rückenwirbel.

**Erstgebärende**, (Primipara<sup>1</sup>.) Vgl. Gebälerin.

1) von Menschen und Thieren gebräuchlich Plinii hist. mundi l. 8. c. 40.

**Erstgeborne**, **Erstgeburt**, (Primogenitus<sup>1</sup>, Primigenius<sup>2</sup>, Primigenus<sup>3</sup>.) Vgl. Geburt.

1) Plinii hist. mundi l. 11. c. 40.

2) Varron, de re rust. l. 2. c. 2.

3) Lucretii de nat. rer. l. 2. v. 1105.

**Eructatio**, i. q. Ructus.

**Eruptio dentium**, s. Zahnen.

**Erwachen**, **Aufwachen**, (Evigilatio<sup>1</sup>.) der natürliche Uebergang aus dem Schlaf in den wachenden Zustand, und eben so dem den Tag vermittelnden Aufgang der Sonne, oder dem Morgen gleichgestellt, als sein Gegensatz, das Einschlafen solches dem Niedergang der Sonne, oder dem Abend ist. Vgl. Schlaf.

1) Augustini soliloqu. l. 1. c. 1.

**Erwachsener Körper**, s. Körperreise.

**Erweiterer der Kehle**, s. Dilatoren der Glottis.

**Erweiterung**, s. Dilatation. — **des Herzens und der Arterien**, s. Diastole.

**Erwerbsucht**, s. Habsucht.

**Eryge**, s. Ereuxis.

**Erythroides tunica**, nach dem Griechischen Worte<sup>1</sup> gebildet, s. vaginalhäute des Hoden und des Samenstranges, ingl. Dartos. Vgl. auch Umbilicalbläschen.

1) erythrosides, von röthlicher Farbe.

**Erzeugniß**, s. Product.

**Erzeugung**<sup>1</sup>, **Zeugung**<sup>2</sup>, **Generation**<sup>3</sup>, (Generatio<sup>4</sup>, Procreatio<sup>5</sup>, Genesis<sup>6</sup>.) ist der Act, wodurch die allgemein verbreiteten, oder die im Geschlechtsunterschied individuell hervortretenden Kräfte der Natur zusammenwirken, damit ein neues individuelles Leben in Thätigkeit sich äußere, und in der ihm eigenthümlichen Masse räumlich dargestellt erscheine.

Vielfach sind die Wege, auf welchen man zur Ergründung des Geheimnißvollen bei diesem Vorgang zu gelangen suchte; zahlreich sind die Theorien, (Drelineourt zählte im Jahre 1682 schon 262,) welche man bei diesen Versuchen aufgefunden hat, bald einander ganz entgegengesetzt, bald nur in einzelnen Momenten wenig modificirt,

1) — 3) S. die Literatur zu Ende des Artkels.

4) Plinii hist. mundi,

l. 9. c. 50.

5) Ciceron, Tusc. qu. l. 1. c. 14.

6) Vgl. dieß Wort.



se genügend. Haben uns gleich wiederholte Untersuchungen über  
 reres der Wahrheit wahrscheinlich sich nähernde Aufschlüsse gege-  
 , haben uns gleich umfassendere Ansichten der ganzen Natur zur  
 tlichern Erkenntniß des individuellen Lebens hingeführt, und wird  
 so auch manches recht lichtvoll in diesem dunkeln Wirken der  
 fte; so kommen wir doch immer, wollen wir uns nicht selbst  
 schen, an eine Grenze, über die hinaus unsere Schlüsse eben so  
 nig reichen, als unser Blick, wo wir zwar das Walten der Thä-  
 reiten in ihren Producten erkennen, sie selbst aber zu ergründen  
 nt vermögen.

So vielfach verschieden auch die Theorien der Zeugung sind, so  
 ern sie sich doch alle, näher oder entfernter, auf zwei Hauptan-  
 zen zurückführen.

II) Das neue Individuum geht aus schon in ver-  
 iedener Art präformirter organischer Materie her-

III) Innere Kräfte bewirken aus der ungeformten  
 atterie die Entwicklung des neuen Individuums.

I. Zu jener ersten Ansicht gehören nach meiner Meinung fol-  
 gende Hypothesen:

A. Ansaß organisch gebildeter Theile von außen. (Die Theo-  
 ri von Buffon, le Camus und Regius. — Eine Art von  
 iogenese.)

B. Entwicklung präformirter Keime. (Evolutionstheo-  
 ri.)

Nach dem Ort, wo sich diese Keime bilden, gehören vier Unter-  
 theilungen hierher.

1) Die organischen Keime sind allgemein verbreitet. (Pan-  
 permie, nach Heraclit, Bonnet, Sulzer, Muschenbroek.)

2) Die Keime liegen im männlichen Samen als Samenz-  
 erchen, (die Theorie der Animalculisten, oder von den Sa-  
 anthierchen, nach de Hamen, Leeuwenhoek, Ledermüller,  
 autier d'Agoty;) als organische Filamente, (nach Darwin.)

3) Die Keime finden sich in den Eierstöcken der Mutter, und  
 ar:

a) vollkommen gebildet in Einer Mutter für alle folgende  
 n ihr abstammende Individuen (Einschachtelungstheorie,  
 ch Jos. du Rometariis, Schammerdam, Haller;)

b) sie werden in einer jeden Mutter neu gebildet, (nach  
 p alanzani und andern neuern Physiologen.)

4) Die Keime liegen im männlichen Samen und in den  
 iern der Eierstöcke, und beide vereint bilden das neue Geschöpf.  
 (Die Theorie der Animalculo-Ovisten.) Oken's Theorie ge-  
 ert wohl hierher, sie ist aber verbunden mit einigen Ansichten, die  
 r Lehre der Panspermie führen.

Für eine jede von diesen Ansichten will ich die Darstellung an-  
 ehren, in welcher die Idee am deutlichsten ausgedrückt ist, oder die  
 es meiste Eigenthümliche hat.

A. Ansaß organisch gebildeter Theile von außen.

Nach le Camus<sup>7</sup> pflanzen sich die Thiere und Vegetabilien durch Samenkörner fort. Der Same der Thiere enthält diese Samenkörner, welche als kleine Gehirne in dem Gehirn ausgeschieden werden, und durch die Nerven in die Hoden wandern. Bei der Zeugung gelangt der Same in die Gebärmutter, bildet daselbst ein kleines Gehirn, dann einen Kopf, aus welchem heraus alles übrige hervorgeht. — Theorien, die so wie diese ihre Wichtigkeit deutlich aussprechen, und nie viel Beifall gefunden haben, werde ich, ohne Zeit und Raum mit Widerlegungen zu verderben, nur anführen, nicht bestreiten.

Auch die Theorie von den beiden Principien gehört gewissermaßen hierher. Sie stammt aus der Linnesehen Schule, und Regius hat sie am ausführlichsten dargestellt. — Der organische Körper besteht aus zwei Principien: dem Markprincipium, (Principium medullare,) und Rindenprincipium, (Principium corticale;) jenes kommt von der Mutter, dieses von dem Vater. Jenes ist wesentlicher Grundstoff des Gehirns und der Nerven, dieses des Fleisches, Blutes, der Haut u. s. w.

Durch die Vereinigung dieser beiden Principien wird das neue Geschöpf gebildet. — Man sucht diese Hypothese durch folgende Gründe zu beweisen: bei den Gewächsen entstehen die männlichen Geschlechtstheile immer aus dem Holze, die weiblichen aus dem Marke; der männliche Same werde bloß aus dem Blute abgesondert, die Nerven sollen sich ganz nackt in dem Eierstocke endigen, bei dem männlichen Geschlechte sollen sie nur zur Aufrichtung und Anspannung der Geschlechtstheile dienen; die geschlechtslose Fortpflanzung in dem Gewächreiche und in dem Thierreiche lasse sich am besten aus dieser Theorie erklären. — Sollten solche Gründe eine Widerlegung nöthig haben?

Viele Aufmerksamkeit erregte die Theorie des berühmten Naturforschers Buffon<sup>8</sup>. Nach seiner Meinung ist in der Natur eine unzähligen kleinen Kugeln bestehende, immer thätige Materie (Materia productrix,) verbreitet, durch die sich Pflanzen und Thiere erzeugen und erhalten; ein jeder Theil des Körpers hat seine eigene Form, in welche er diese Materie aufnimmt und ihr seine Gestalt einprägt; was nicht zur Ernährung der Theile gebraucht wird, geht geformt nach den einzelnen Theilen des Körpers, als verschieden gebildete Moleküles, in den Hoden oder in die Eierstöcke, wo es als Samensflüssigkeit erscheint; nach und nach kommen daher in jenen Organen Abdrücke von allen Theilen des Körpers zusammen. Bei der Begattung werden jene Moleküles der Samensflüssigkeit des Mannes und des Weibes in die Gebärmutter ergossen, die kleinen, nach den einzelnen Theilen geformten Körper legen sich an einander, und so bildet sich der Embryo.

Schon Daller und Bonnet haben das Irrige dieser Theorie mit sehr triftigen Gründen bewiesen. Es existiren weder in dem Samen die nach Buffon's Meinung gebildeten Kugeln oder Moleküles, noch mischt sich die Flüssigkeit, welche die Eier der Eierstöcke enthalten, mit dem männlichen Samen in der Gebärmutter so zusammen, wie es nach jener Theorie angenommen wird. Auch ist der

7) Mém. sur divers sujets de méd. à Par. 1760.

8) hist. nat. T. IV. ch. 10



Embryo der Aelteren nicht allein beim Beginnen seiner Bildung, sondern auch überhaupt das Kind sehr oft den Aelteren gar nicht ähnlich, doch durchaus jedes Mal Statt finden müßte, wenn nach den Eilen der Aelteren geformte Kugeln das Kind bildeten. Wie können von Aelteren, die ganz normal gebildete Theile besitzen, Kinder vorgehen, bei denen manche Organe mißgebildet sind? Müßten die Mißbildungen der Aelteren nicht jedes Mal auch auf die Kinder fortpflanzen? Und überhaupt ein Einwurf, der sowohl gegen diese, mehrere der folgenden Zeugungstheorien gerichtet ist, welche das Geschäft der Zeugung der Materie übertragen: überall in der Natur finden wir die Thätigkeit der Kräfte, das Leben selbst erscheint als ein Ausdruck derselben, und so wie die individuelle Kraftsterkung erlischt, so wird auch die Materie etwas ganz anders als Pflanze oder Thier. Nicht die Materie ist also das Bildende, Bezeugende, und gewiß eben so wenig das Zeugende, sondern die mit ihr in ihr waltende Kraft.

#### B. Entwicklung präformirter Keime.

1) Panspermie. Nach dieser Theorie sind die bei der ersten Schöpfung schon gebildeten Eier und Samen der Thiere überall in der Natur verbreitet, und in dem einzelnen Individuum eingeschlossen. Sobald sich die zu ihrer Entwicklung nöthigen Bedingungen vereinigen, so werden sie ausgebildet. — Nur oberflächliche Beachtung des Zeugungsgeschäftes würde diese Meinung für wahrscheinlich halten können; sie läßt eben so wenig eine vernünftige Erklärung zu, wie eine allgemein verbreitete Samen in die einzelnen Geschöpfe gelangen, als wie durch die Begattung verschiedener Geschöpfe Bastarde erzeugt werden, worin die Aehnlichkeit der Kinder mit den Aelteren gegründet ist.

2) Theorie der Animalculisten. Nachdem Hartsöcker zuerst, nach ihm Ludwig de Ham, Leeuwenhoek, v. Gleichen, Ledermüller und viele andere die Infusorien, Cercarien, in dem männlichen Samen aufgefunden hatten, fand die Ansicht vielen Beifall, daß der Embryo aus den Samenthierchen des männlichen Samens allein erzeugt werde, und daß diese Thierchen von dem Vater auf alle von ihm stammende Generationen übergehen. Die Samenthierchen gelangen bei der Begattung in die Gebärmutter, eines derselben hängt sich mit kleinen Fasern, die in der Folge den Mutterkuchen bilden, an die innere Wand der Gebärmutter an, und wird hier allmählig entwickelt. — Allein wie werden diese Samenthierchen erzeugt? Von dem Vater auf den Sohn können sie nicht übergehen, da sich in diesem selbst das Zeugungsvermögen nur nach und nach entwickelt. Es mußte Zeugung Statt finden, wenn nur dem Manne die Kraft dazu nicht fehlt; allein geschieht die Begattung mit einer Frau über 50 Jahren, so erfolgt keine Schwängerung, wenn gleich derselbe Mann mit einer jüngern Frau noch Kinder zeugen kann. Dieses und vieles andere spricht offenbar dafür, daß nur durch das Zusammenwirken beider Geschlechter eine neue Bildung hervorgerufen werden könne. Hierzu kommen denn noch manche andere Einwürfe: die Aehnlichkeit der Cercarien des männlichen Samens, bei ganz unähnlichen Geschöpfen, z. B. dem Menschen und dem Esel; der Man-

gel dieser Thierchen bei manchen fruchtbaren Thieren und bei den Pflanzen; das Mißverhältniß der Zahl derselben und ihrer Größe zur Zahl und Größe der jungen Thiere, die Entstehung der Bastarde läßt sich aus diesen Ansichten nur schwer, oder gar nicht erklären.

3) Die Keime finden sich in den Eichen der Eierstöcke der Mutter entweder vollkommen gebildet in einer Mutter eingeschlossen, für die folgenden von ihr abstammenden Geschlechter, die Einschachtelungstheorie, (die Theorie der Infinitovisten,) oder sie werden in einer jeden Mutter neu gebildet, (die Theorie der Ubovisten.)

Schon bei den älteren Naturforschern, als Orpheus, Empedokles, Anaximander, Epicur, findet man Andeutungen, die auf freilich nur sehr dunkle Begriffe über die Erzeugung der Geschöpfe aus Eiern schließen lassen. Als Regner de Graaf, oder Steno die Eierstöcke zuerst aufgefunden hatten, fing man an, diesen Organen gleiche Bestimmung wie bei den eierlegenden Thieren zuzusprechen; die Auffindung des Fallopius der nach ihm genannten Canäle ließ keinen Zweifel übrig, daß die Eier der Eierstöcke es wären, in welchen der Keim des Embryo liege, und durch Haller's Beobachtungen über das befruchtete Ei, durch Spallanzani's und anderer microscopischen Untersuchungen der Froscheier, die im unbefruchteten Zustande, eben so wie in dem befruchteten, einen schwarzen Punct, als die erste Spur des Embryo, zeigen, wurde jene Ansicht bestätigt, und durch Haller's treffliche Darstellung gegeben sehr wahrscheinlich gemacht.

Alein dieser große Physiolog hat doch übersehen, daß manche Gründe, die er als Beweise für seine Hypothese anführt, gar nicht für dieselbe sprechen. Er beruft sich vorzüglich auf die Bildung des Embryos eierlegender Thiere. Hier ist es aber gerade, wo wir am deutlichsten sehen, daß der Embryo nicht präformirt ist; denn auch im befruchteten Ei sehen wir noch keinen Embryo, alle seine Theile werden erst nach und nach gebildet. Auch die Geschlechtstheile entstehen erst allmählig; es kann daher ein Uebergang der Eier, die schon bei der Mutter vorhanden sind, in die Eierstöcke des Embryo, eine Einschachtelung, nicht angenommen werden, und die gefäßreiche Haut, welche im befruchteten Ei mit den Häuten des Embryo zusammenhängt, ist nicht dieselbe, welche das Ei in dem Eierstocke umgeben hat. — Die Beweise, welche von der Verwandlung der Insecten aus Raupen in Puppen, aus diesen zu Schmetterlingen und Käfern hergenommen sind, passen gar nicht. Die Entstehung der Bastarde, der Mulatten, der Blendlinge, die Aehnlichkeit der Kinder mit den Aeltern, die Wiedererzeugung größerer Theile des Körpers, wie wir sie bei manchen Thieren vorzüglich beobachten, kann man nach dieser Theorie gar nicht erklären, und das letztere spricht offenbar gegen dieselbe. Wäre sie gegründet, so würden die Gebrechen, oder Eigenheiten des Vaters auf die Kinder übergehen können, und wie oft ist dieses nicht der Fall; man würde die Thierarten nicht durch männliches Vieh veredeln können, wofür doch die Erfahrungen allgemein sprechen. Der Grund endlich, den man für die Evolu-



stheorie daraus hat ableiten wollen, daß man in dem Unterleibe geborner Mädchen schon die Rudimente eines Embryo gefunden ist auch eine ganz unsichere Stütze. Theils kann man Fälle da- an anführen, die zeigen, daß auch in neugeborenen Kindern männ- lichen Geschlechts Rudimente von Embryonen gefunden worden sind; als spricht diese Erscheinung mehr für die Annahme einer bilden- Kraft.

Sich sage nichts über die unendliche Kleinheit, welche die Keime seyn müßten, wenn man die Theorie Haller's von der Einschach- lung der Keime und ihrer Existenz in einem weiblichen Geschöpf für von ihr abstammenden annehmen wollte.

4) Die Keime liegen in dem männlichen Samen und in den Eiern der Eierstöcke, beide vereint bilden das neue Geschöpf. — Dieses ist die Theorie der Animalculo = Vivisten. Einige an ihnen glauben, die Samenthierchen drängen durch die Muttertrompeten zu dem Eierstocke, und eines oder mehrere kröchen in das Eichen, um es zu befruchten, worauf dieses erst in die Gebärmutter gelange. Andere nehmen an, es werde bei der Begattung schon ein Eichen in die Gebärmutter gebracht, und in dieser dränge Samenthierchen von dem zugleich ergossenen männlichen Samen ab. Dasselbe. — Dieser Theorie steht alles das entgegen, was schon oben an ist. Wo soll die materielle Vermischung der Samensflüssigkeiten sich gehen, da noch keine Untersuchung den Uebergang des Sa- mens bis zu den Eierstöcken genügend dargethan hat, und doch erst mehrere Tage nach der Befruchtung das Eichen in die Gebärmutter gelangt, wie Cruikshank's und andere Untersuchungen beweisen; die Schwangerschaft in den Eierstöcken und in den Muttertrompe- ten, und andere Gründe beweisen, daß die Befruchtung in dem Eier- stocke geschehe?

Ich will hier noch das Wesentliche aus Oken's Zeugungstheorie<sup>10</sup> hinzufügen, welche, wie mir scheint, der Lehre von der Panspermie und der Animalculo = Vivisten in gewisser Rücksicht anzuhören scheint, jedoch nach den neuern Ansichten in der Naturforschung eigenthümlich modifizirt.

Die lebendige Kraft des Erdkörpers äußert sich in Hervorbringung einer unendlichen Menge selbstständiger lebendiger Körper, die, durch Vergrößerungsgläser betrachtet, als Infusionsthierchen erscheinen. Alle organische Körper bestehen aus unzähligen Thierchen dieser Art; diese Urthiere, Urstoffe des organischen Reiches, liegen aber nicht neben einander, sondern sie durchdringen einander, wie Wasserstoff und Sauerstoff im Wasser, Schwefel und Quecksilber im Zinnober, so daß sie kein eignes Leben führen. Die Infusorien entstehen, indem sie frei werden aus den Fesseln des größern Thieres; sie werden nicht erst erzeugt, sie sind schon vorhanden. Dieses Lostrennen oder Freiwerden der Infusorien erscheint als Gährung; diese ist ein organi- scher, kein chemischer Proceß, eine wahre Entwicklung, Entzeugung, (Catagenesis.) Bei der Begattung bringt ein Infusionsthierchen,

<sup>10</sup> S. dessen Schrift, (wie in mehreren ähnlichen Fällen,) unter der dem Artikel zu Ende beigefügten Literatur.

eine Cercarie des männlichen Samens in ein Eichen des Eierstocks, und so ist die Gestalt des Thieres gesetzt durch die Gestalt des Samenthieres im weiblichen Bläschen. Man muß sich aber das weibliche Eichen nicht denken als da liegend, gleich einem hohlen Modell, in welches die Samenthierchen gegossen würden; nein, das Formen der Natur ist kein Bossiren, sie durchdringt lebendig das Innerste der Atome der Materie, und schichtet diese in ihre Winkel und Ringe von Innen heraus, wie der magnetische Strom dem Eisenstaub die regelmäßige Richtung gibt, oder die Chemie das flüssige Salz zum Crystall macht. — Ich muß aufrichtig bekennen, daß mir in dieser scharfsinnigen Theorie manches dunkel geblieben ist. Ich kann mir nicht denken, wie wirklich materielle, schon geformte Infusionsthierchen, von homogener Art, wie man sie doch in einer Samenmasse annehmen muß, in einander verschmelzen sollen, wie Schwefel und Quecksilber zu Zinnober. Es ist mir dunkel, warum man sich das weibliche Eibläschen, was doch wirklich vorhanden ist, als nicht da liegend denken soll, und thue ich auch dieses, so weiß ich nicht, wo und wie das Samenthierchen dasselbe durchdringen kann. Es bleibt nach dieser Theorie doch wohl unerklärt, oder ist schwer zu erklären, wie die Eier bei eierlegenden Thieren durch eine Begattung bis zu dem 20sten Tag der Legzeit befruchtet werden können. Bei den Fischen, Kröschen, Salamandern und ähnlichen Thieren ist noch schwerer einzusehen, wie die Cercarien der männlichen Samenfeuchtigkeit in die Eier gelangen können, da diese auf die gallertartige Masse ergossen wird, welche die Eier umgibt.

II. Wir kommen nun zu den Ansichten, nach welchen innere Kräfte aus ungeformter Masse die Entwicklung des neuen Individuums bewirken. Alle kommen darin mit einander überein, daß nach ihnen eine unbekannte, nicht weiter zu ergründende Kraft es ist, die in der rohen Materie die Bildung bedingt; nur in der Benennung dieser Kraft, in den Vermuthungen über ihr Wesen und die Art ihrer Wirkung, der Bestimmung, ob der männliche Samen allein, (nach Aristoteles, Empedokles, Seno,) oder eine Vermischung der männlichen und weiblichen Zeugungssäfte, oder doch eine Einwirkung des ersten auf die letztern, (nach den meisten Physiologen,) den Embryo bilde, weichen sie von einander ab. — Im allgemeinen kann man nach der Art, wie die unbekannte Kraft die Bildung vollbringt, die mannigfachen Ansichten in zwei Hauptclassen theilen.

A. Der Ansatz der Masse geschieht von außen, nach Art einer Crystallisation. (Epigenesis per appositionem, *Vis plastica* der Alten,) nach Hippokrates, Descartes, Procope Couteau, Große, Mayer.

B. Die Bildung geschieht von innen heraus. (Epigenesis per vegetationem,) nach Stahl, Wolf, Sacombe, Blumenbach, Prochaska, Hildebrandt, Dömling, Döllinger, Walthier, Liedemann, Jörg, und die meisten neuern Physiologen.

A. Zur ersten Classe gehören vorzüglich folgende Theorien:

1) Die *Vis plastica* der alten griechischen und römischen Na-



Forſcher. Die meiſten glaubten, der männliche und weibliche Same werde in die Gebärmutter ergoſſen, vermenge ſich, und durch dieſer Materie zukommende *Vis plastica* ſetze ſich dieſelbe zur Bildung eines Embryo ſo an einander, wie man es bei dem Anſchließen der Crystalle ſehe.

1) Bonamico<sup>11</sup> gibt über die *Vis plastica* der Alten folgende Erklärung: der männliche Same enthält einen flüchtigen Geiſt, der von der Gottheit aus ſich in ihn ſenkt, und durch die Kraft des männlichen Geſchöpfes unter göttlicher Einwirkung in die Gebärmutter geſchickt wird. Hier kocht er die von den mütterlichen Zeugungstheilen beſetzte Materie, und bringt durch verſchiedene Behandlung derſelben Werkzeuge hervor. So lange er dieſe bereitet, heißt er ausübende Kraft; wenn ſie ſo weit vollendet ſind, daß er ſich ihrer bedienen kann, ſo wird er zur Seele.

2) Descartes<sup>12</sup> hat dieſe alte Hypotheſe wieder hervorgeholt, und ihr durch Gründe, die mit ſeiner Philoſophie in Verbindung ſtanden, aufs neue mehr Eingang zu verſchaffen geſucht.

3) Und noch ſpäter hat Procope Conteau dieſe Meinung vertheidigt, nur mit dem Unterſchied, daß nach ihm der männliche Same in den Eierſtöcken ſich mit der Flüſſigkeit vermiſcht, welche dieſen enthalten; dieſe Miſchung fängt ſchon hier an anzukochen, und in der Gebärmutter wird nun die weitere Ausbildung des Embryo bewirkt.

4) Auch Groſſe's Theorie<sup>13</sup> gehört hierher, der die Zeugung aus dem allgemeinen Naturgeſetz der Aggregation, d. h. der Anziehungskraft ähnlicher Theile an einander, erklären will. Eine mit leeren Declamationen vorgetragene, aber nicht durch treffende und wichtige Gründe geſtüzte Hypotheſe.

5) Nach Mayer<sup>14</sup> kommt der männliche Same und die Flüſſigkeit, welche das Eiſen des Eierſtocks enthält, in der Gebärmutter oder Trompete zuſammen, damit ſich aus ihnen der Embryo cryſtalliſire.

Aus der einfachen wirkenden Kraft der Natur, von welcher die Crystallization abhängt, läßt ſich aber gewiß die Bildung der höhern organischen Geſchöpfe nicht erklären; auch zeigt uns die Unterſuchung des vorbereiteten Eies ſehr deutlich die Bildung von innen nach außen.

B. Man bemerkte auch bald, daß man mit dieſer Annahme nicht ausreiche, und daher die zahlreichen Anhänger der zweiten Hauptclafſe dieſer Anſichten mit ihren vielfachen Modificationen.

1) In den ältern Werken finden wir dieſe Anſicht durch die Annahme einer *Generatio aequivoca* oder *spontanea* angeſetzt. So erklärt ſchon Ariſtoteles die Entſtehung der Dinge. Eine der Natur allgemein verbreitete Kraft vereinigt die Grundſtoffe zu einfachen Pflanzen und Thieren, ohne daß Geſchöpfe ihres Gleichen zur Erzeugung mitwirken, nur Fäulniß ſei das Mittel zur Begünstigung dieſer Zeugung. Es wurde dieſe Hypotheſe von Helian, Avicenna, Albertus Magnus weiter bearbeitet, und nicht als

11) de alimento, (Florent. 1605, 4.) 1. 4.  
in deſſen phyſikaliſchen Schriften, Nr. 2.

12) de formato fetu.

13)

14) Beſchr. d. menſchl. K. 5.

lein auf die unvollkommnern Pflanzen und Thiere, sondern selbst auf die vollkommnern ausgedehnt. Ohne Samen oder Eier sollten aus faulem Fleische Maden, Schlangen aus Weiberharen, Frösche aus Schlamm sich erzeugen. Die Beobachtungen lehren zu deutlich, daß diese Naturforscher die *Generatio aequivoca* oder die Wirkung der *Vis genetrix naturae* zu weit ausdehnen. Sie ist es aber doch, auf die wir auch jetzt noch zurückkommen müssen, wenn wir uns die Entstehung der einfachern Organismen erklären wollen, und auch bei der Zeugung vollkommener Geschöpfe, die durch Begattung bewirkt wird, scheint sie mit einzugreifen.

2) Stahl und seine Schüler glaubten, die Seele bringe den Körper hervor, indem nach ihren Ansichten das denkende Wesen sich auch durch die Thätigkeit äußert, welche gemeinlich Lebenskraft genannt wird. Nach einigen wird bei der Zeugung die Seele des Embryo's ins Daseyn gerufen, und diese bildet nun in der rohen Materie den Körper. Nach andern ist es der geistige Theil des männlichen Samens, welcher in der weiblichen Samensflüssigkeit das neue Geschöpf bildet.

Es fehlt aber überhaupt der Beweis der Identität der Seele mit den Kräften, die in der Materie thätig sind, und so lange dieser nicht geführt ist, kann man auch die Bildung eines neuen Individuums der Wirkung der Seele auf keine Weise zuschreiben. Es müßte eine unbegreifliche Umänderung in dem Zusammenhange der Seele mit dem Körper, und der Einwirkung jener auf diesen vorgehen, wenn sie in dem Embryo die Theile selbst bilden sollte, auf welche sie in der Folge nicht einmal mehr Einfluß hat.

3) Needham nennt die Kraft, welche das Geschöpf bildet, vegetirende Kraft; durch sie wird der Embryo, indem er von innen herauswächst und immer neuen Ansat von Materie erhält, aus einem sehr einfachen Keim erzeugt.

4) Wolf nimmt eine wesentliche Kraft an, über welche er sich auf folgende Weise erklärt. Sie ist diejenige Kraft, durch welche in den vegetabilischen Körpern alles dasjenige bewirkt wird, wesswegen wir sie belebt nennen; ich habe sie deswegen die wesentliche Kraft dieser Körper genannt, weil eine Pflanze aufhören würde, eine Pflanze zu seyn, wenn ihr diese Kraft genommen würde. In den Thieren findet sie eben so wohl Statt, als in den Pflanzen, und alles dasjenige, was die Thiere mit den Pflanzen gemein haben, hängt lediglich von dieser Kraft ab; die ersten Theile des künftigen Thieres sind Anfangs alle flüssig und unorganisch, werden aber nachher durch diese wesentliche Kraft zu einem neuen Geschöpf vereinigt; sie ist diejenige Kraft, welche den Nahrungstoff sammelt, durch die organischen Körper treibt, und an die verschiedenen Glieder absetzt.

Man sieht wohl leicht, daß Needham und Wolf dasjenige schon dunkel geahndet haben, was im Ganzen auch jetzt noch das Unbekannte ist, worauf uns unsere Forschungen über das Zeugungsgeschäft führen. Allein so unbestimmt und dunkel, wie sich beide über diese unerforschbare Kraft äußern, kann auch die Ansicht über das Unerklärbare nicht genügen. Needham nimmt noch daneben einfache Keime an; Wolf stellt sie ganz gleich mit der vegetirenden Kraft der Pflan-



und so verirren sich beide von dem Wege, der sie zu einer weniger verworrenen Darstellung der Aeußerung jener bildenden Kraft führen können.

55) Glücklicher war der berühmte Naturforscher Blumenbach, begünstet durch seinen eignen scharfen Blick, durch sein sinniges Auffassen der Naturerscheinungen, und durch die Fortschritte der Naturkunde; der Philosophirens über die Natur im Ganzen. — Bildungstrieb, (*vis formativus*), heißt nach ihm die unerforschliche Kraft, welche allem Organischen unaufhörlich thätig ist, erhält und schafft. Es giebt keine präformirten Keime, sondern in dem vorher rohen unentwickelten Zeugungsstoff der organischen Körper wird, nachdem er seiner Reife und an den Ort seiner Bestimmung gelangt ist, ein anderer, dann lebenslang thätiger Trieb-kege, ihre bestimmte Gestalt Anfangs anzunehmen, dann lebenslang zu erhalten, und wenn sie etwas verstümmelt worden, wo möglich wieder herzustellen. Ein Trieb, der folglich zu den Lebenskräften gehört, der aber eben deutlich von den übrigen Arten der Lebenskraft der organisirten Körper, (der Contractilität, Irritabilität, Sensibilität u. s. w.) als von den allgemeinen physischen Kräften der Körper überhaupt, verschieden ist; der die erste wichtige Kraft zu aller Zeugung, Ernährung und Reproduction zu seyn scheint, und den man, um ihn von andern Lebenskräften zu unterscheiden, mit dem Namen des Bildungstriebes bezeichnen kann. — Wohl zu beherzigen ist aber, was Blumenbach dieser Erklärung, was er unter Bildungstrieb versteht, hinzufügt. Hoffentlich ist für die meisten Leser die Erinnerung zu überflüssig, daß das Wort Bildungstrieb, so gut wie das Wort attraction, Schwere u. s. w. zu nichts mehr und nichts weniger dienen soll, als eine Kraft zu bezeichnen, deren constante Wirkung aus Erfahrung anerkannt worden, deren Ursache aber, so gut wie die Ursache der genannten, noch so allgemein anerkannten Naturkräfte, uns *Qualitas occulta* ist.

Vorurtheilsfreie Beobachtung der Natur überhaupt, als der Bildung des Embryo bei eierlegenden Thieren sowohl, als bei den Säugthieren insbesondere, so weit wir dieselbe nur verfolgen können, und die Richtung, welche unsere Kenntnisse von dem Wesen der Naturerscheinungen genommen haben, leiten uns nothwendig hin zu der Annahme einer eigenthümlichen Bildungsthätigkeit; die wichtigsten Gründe sprechen für sie. Die Einwürfe, welche man gegen Blumenbachs Lehre gemacht hat, beziehen sich vorzüglich auf den Mangel, welchen selbst zugestehet, es ist der Bildungstrieb eine verborgene Kraft. Allein wollen wir uns nicht selbst täuschen, so hat jeder Versuch, den man bis jetzt gemacht hat, tiefer in das Geheimnißvolle des Zeugens und des Lebens einzudringen, dem wesentlich nach auch nicht weiter geführt, als zu einer ähnlichen Annahme, nur auf andere Weise gestaltet, anders benennt. — Andere allerdings gegründete Einwürfe betreffen die der Natur nicht gemäße Darstellung jener Thätigkeit, als einer besondern Kraft, da sie nur eine eigene Richtung der Lebensäußerung überhaupt ist, ihre Trennung von den allgemeinen Kräften der Natur, da sie nur als eine besondere Darstellung der allgemeinen Bildungsthätigkeit erscheint, das Mangelhafte bei der Aufstellung ih-

rer Geseze. So finden wir den in Wahrheit auch in den neuesten physiologischen Werken unter der Benennung Reproductionskraft, Productionskraft, productive Function, Bildungs-, Zeugungsthätigkeit, Bildungsenergie, bildende Kräfte der Natur, des individuellen Organismus, organische Kraft, vegetatives Leben, Vegetationskraft, nur die nach den Fortschritten der Naturforschung und dem Geiste der Zeit geformte und dargestellte Annahme eines Bildungstriebes wieder. Groß sind aber die Verdienste neuerer Physiologen rücksichtlich der nähern Bestimmung der Beziehungen und der Geseze dieser Thätigkeit eines Dömling, Oken, Waltherr, Treviranus, Bartels, Dethoff, Luca und Anderer. (Vgl. auch den Artikel Bildungstrieb.)

Weniger Beifall hat Blumenbach's weitere Erklärung des Zeugungsgeschäftes gefunden. Er nimmt an, der männliche Same und die in dem Eichen enthaltene Flüssigkeit ergieße sich zugleich in die Gebärmutter, und hier werde dann aus beiden der Embryo durch den rege gewordenen Bildungstrieb gebildet. — Allein gegen eine solche gleichzeitige Ergießung in die Höhle der Gebärmutter sprechen die Beobachtungen an Thieren, nach welchen erst mehrere Tage nach der Befruchtung das Eichen aus den Eierstöcken in diese Höhle geführt wird, und die Schwangerschaften außerhalb der Gebärmutter.

6) Auch einzelne, in der Natur allgemein verbreitete Kraftäußerungen benutzte man, um das, was da bildet, näher zu bestimmen.

Henke glaubt, daß eine sehr concentrirte, besonders qualificirte Feuermaterie durch den männlichen Samen zu den Eiern der Eierstöcke gelange, und hier ungefähr das verrichte, was ein Ferment bei der Gährung bewirkt. Es setzt die Masse der Eier in schnelle Bewegung, und macht sie dadurch fähig zu einer schnellen Entwicklung.

Gerdesen glaubt, die Zeugung durch die Kräfte der Electricität am besten erklären zu können. Durch das wechselseitige in einander Wirken der positiven und der negativen Electricität wird die Frucht gebildet und ins Leben gerufen.

Wem entgeht aber, daß diese einzelnen Aeußerungen der Kräfte der Natur nicht hinreichen können, um ein Ganzes zu bilden, wenn es gleich höchst wahrscheinlich ist, daß sie vereint mit andern ähnlichen allgemein verbreiteten Kraftäußerungen bei der Bildung neuer Geschöpfe mit eingreifen.

Endlich kommen wir zu einigen Theorien der Zeugung, in welchen man mehrere Ansichten der schon betrachteten Hypothesen mit einander zu vereinigen gesucht hat.

1) Grasmeyer nimmt an, daß die flüchtigsten, feinsten Theile des männlichen Samens von den Saugadern der Scheide aufgenommen werden. Die aufgesaugten Stoffe werden der ganzen Blutmasse beigemischt, und erregen eine mehr oder minder starke Reizung, einen fieberartigen Zustand. Aus dem Blute nehmen die Säfte der Eierstöcke, den Gesezen der Affinität gemäß, einen Theil des männlichen Samens in sich auf; er gelangt so in das zu befruchtende



Bläschen des Eierstockes, die beiden Säfte mischen sich, und so entstehen die ersten Rudimente des Embryo's.

Die Reizung dieser Theile pflanzt sich auf die Gebärmutter fort; es wird in dieser und den Trompeten viel Schleim abgesondert. Die Gebärmutter schwillt an, der Raum in den Fallopischen Röhren und in dem Uterus wird erweitert, und in der Höhle dieses erzeugen sich Klößen. Durch die Störung in dem Blutgefäßsystem, welche dadurch herbeigeführt wird, wird der monatliche Blutabgang unterdrückt, und es zeigen sich mehrere krankhafte Zufälle. Das Ei im Eierstocke fängt an zu wachsen; es wird in ihm eine neue zarte Haut gebildet, welche die feinen Theile des Embryo's umgibt. Es plagt die äußere Haut des Bläschens, die von Blut strogenden Fallopischen Röhren richten ihre Franzen auf, umfassen den Eierstock, nehmen das Ei in sich auf, und leiten dasselbe zu der Gebärmutter. In den Eierstöcken bleibt eine Grube mit röthlich gelben Flecken, der gelbe Körper, zurück. In der Gebärmutter wird dann das Ei und der Embryo weiter entwickelt. — Würde aber nicht der Same bei dem Umweg, welchen er, dieser Theorie zufolge, machen muß, so verändert werden, daß er gar nicht mehr dieselbe Mischung hat; und wozu ist überhaupt dieser Umweg nöthig, da nähere Wege vorhanden sind, wenn ja materielle Theile des Samens in die Eierstöcke gelangen sollen? Auch dienen sehr leichte Gründe dieser Theorie zur Stütze, die sich größtentheils nur darum drehen, es sei nicht möglich, daß der Same durch die Gebärmutter und Fallopischen Röhren zu den Eierstöcken gelangen könne. Uebrigens ist Grassmeyer nicht der erste, welcher diese Ansichten aufgestellt hat; schon in den Schriften von Casp. Bartholin, Schellhammer, Schurig und einigen andern finden sie sich.

2) Hösch's Zeugungstheorie ist aus den Buffonschen, Hallerschen, Grassmeyerschen und Blumenbach'schen zusammengesetzt. Der männliche Same besteht aus zwei Hauptbestandtheilen: aus Keimen aller im Körper vorhandenen Theile, die eine, durch die ganz eigne Form und Mischung specifisch modificirte Anziehungskraft besitzen, und aus dem männlichen Samenduft. Dieser Duft reizt in der Mutterscheide die Saugadern und die absondernden Gefäße, diese verdünnen durch die Feuchtigkeit, welche sie ausscheiden, den Samen, machen ihn zur Einsaugung geschickt, jene nehmen den feinen geistigen Theil in sich auf, er gelangt zur Blutmasse, und durch diese zu den Eierstöcken. Während dieses geschieht, dringen die gröbern Theile des männlichen Samens, die Keime durch die Gebärmutter und Fallopischen Röhren zu den Eierstöcken. Die Eier derselben enthalten eine dem männlichen Samen analoge Flüssigkeit, Keime aller Theile des Körpers und Samenduft. — Durch die Vermittlung des männlichen und weiblichen Samenduftes setzen die gleichartigen Keime des männlichen und weiblichen Samens, und zwar nur die von einerlei Theilen, die in ihnen gebunden liegende, und jedem Keime ganz eigene bildende Kraft in Thätigkeit, vermöge welcher der zuströmenden Lympe die gehörige Bildung gegeben wird. Die belebten gleichartigen männlichen und weiblichen Keime bringen keine zwei Producte hervor, sondern wirken vereint zu einem Zweck.

Je nachdem die Keime des Mannes oder Weibes mehr oder weniger, oder gleiche bildende Kraft haben, gleicht das Product bald mehr dem Vater, bald mehr der Mutter, bald keinem von beiden, sondern es entsteht ein Geschöpf, welches beiden in etwas ähnlich ist.

Die ungleichartigen Keime werden ausschließlich entweder vom männlichen oder vom weiblichen Samenduft belebt. Wenn also der männliche Samenduft mehr belebend ist, so belebt er ausschließlich die männlichen zu einem Körper erforderlichen ungleichartigen Keime, und ertheilt auch durch seine Einwirkung auf die gleichartigen Keime, die sich, durch die Aneignung des männlichen und weiblichen Samenduftes einander selbst belebt haben, dem ganzen Körper den unverkennbaren männlichen Charakter, und das Product ist ganz männlichen Geschlechts. Umgekehrt gilt dieses auch für die Bildung eines weiblichen Geschöpfes.

Im weiblichen Ei sind nur so viele Keime enthalten, als zur Bildung eines Menschen nöthig sind. Aber mehr männliche Keime, als zur Bildung von vier Menschen nöthig sind, gelangen in die Mutterseide.

Das Eichen bekommt im Eierstocke schon die Häute, welche man in der Folge in dem Ei in der Gebärmutter findet; der Embryo bildet sich in ihm und es wird daher besonders auch durch die Menge der Feuchtigkeiten so sehr ausgedehnt, daß es platzt. Durch diese Vorgänge wird auch die Gebärmutter gereizt, sie geräth in einen entzündlichen Zustand, gerinnbare Lymphe schwimmt auf ihrer innern Oberfläche aus; es bildet sich die Huntersche Haut. Durch dieselbe consensuelle Reizung wird die Fallopische Röhre auf der Seite, auf welcher das befruchtete Ei liegt, steif, legt sich an den Eierstock, und leitet das Ei in die Gebärmutter, welches beim Menschen in der dritten Woche geschieht. In der Gebärmutter wird nun die Ausbildung des Eies und der Frucht fortgesetzt.

3) Willot's Zeugungstheorie. Die Grundstoffe des künftigen Geschöpfes befinden sich in flüssiger Form in dem Eichen der Eierstöcke, und zwar in dem rechten Eierstocke die zur Bildung der Knaben, im linken die zur Bildung der Mädchen erforderlichen. In dem Samen beider Geschlechter sind flüchtige Theile enthalten, die sich mit einander mischen. Der männliche Same besteht auch aus zwei verschiedenen Stoffen, einem lymphartigen, welcher der der Blutgefäße, und einem geistigen, flüchtigen, der ein Theil des Nervenfluidums ist. Die schleimige Flüssigkeit der Prostata ist das Vehikel für beide. Der erste und letzte enthalten viele organische Theile, der geistige ist sehr flüchtig, und befruchtet, selbst wider Willen des Mannes, das Weib, und ohne daß der Same selbst in den Uterus gelangt. Es ist dieser flüchtige Stoff entweder einerlei mit dem Stoffe, welchen man unter verschiedenen Nahmen als Grundprincip oder Element des Universums angesehen hat, dem Phlogiston, Elementarfeuer, caustischem Fluidum, electrischem Stoff, Lebensluft u. s. w., oder doch das Vehikel desselben. — Dieser Samenduft dringt durch die Fallopischen Röhren in ein Eichen, welches am meisten ausgebildet ist, verbindet sich mit den daselbst vorhandenen Atomen, belebt und vereinigt sie; die beiden andern Stoffe des männlichen Samens bleiben in der



Gebärmutter, um das Ei daselbst fest zu halten. Die Atome des Samenduftes bewirken eine Anschwellung des Eies; es zerreißt die Haut, welche dasselbe an das Ovarium befestigt, und die Fallopiischen Röhren führen dasselbe in die Gebärmutter, wo es durch die kleimigen Theile des Samens befestigt, und theils durch die Wärme, theils durch die Nahrungsstoffe, welche dasselbe in der Gebärmutter erhält, ausgebildet wird.

4) Mit dieser Theorie hat die von Schneegaß vorgetragene sehr viel Aehnlichkeit. Das erste, was zur Zeugung nothwendig ist, ist die Erregung des Orgasmus veneris, wodurch der Geschlechtstheil einen Augenblick allein thätig bleibt, und in einem ungewöhnlichen, über die Maßen vermehrten Leben sich befindet, wodurch Theile in Thätigkeit gesetzt werden, die außerdem auf immer ruhen. Darauf erfolgt beim Manne die Ergießung des Samens, nicht bloß des Duftes, sondern auch des dickern Theils in die Gebärmutter selbst, und soll Zeugung erfolgen, die gleichzeitige Ergießung einer Feuchtigkeits, die man weibliche Samenfeuchtigkeit genannt hat. So wie sich diese beiden Flüssigkeiten ergossen haben, so wird entweder aus dem männlichen Samen allein, oder aus beiden zugleich, der eigentliche feine Zeugungsstoff, (Aura seminalis,) frei, steigt dann durch die Trompeten zu den Eierstöcken, und belebt dadurch, daß er dieselben übergeht, und sich mit ihnen verbindet, ein oder mehrere Eichen, die sich während, und durch den Orgasmus veneris von dem Eierstocke so weit losreißen und trennen, daß sie nur noch durch einige Gefäße ernährt werden. Durch den Orgasmus veneris war eben, da diese erste partielle Trennung dieses Eichens von der Wand des Ovariums erfolgte, die Ireritabilität in ihm, so wie im ganzen weiblichen Körper, auf dem zur Befruchtung nöthigen Grad erhöht, und nun wirkt die Aura seminalis, als das erste und feinste äußere Moment auf dasselbe, verbindet sich mit der Ireritabilität, und bewirkt Erregung, deren Product Leben ist. (!?)

Das befruchtete Eichen bekommt seine erste Nahrung in dem Eierstocke. Indem es wächst, dehnt es den Eierstock aus, wirkt consensuell auf die Gebärmutter und die Trompeten, die sich zu der Zeit, wenn sich die Decken des Eies nicht weiter ausdehnen lassen, sondern klappen, aufrichten, und das Ei in die Gebärmutter führen. Von den gröbern Stoffen der männlichen und weiblichen Samenfeuchtigkeit, denen die Aura seminalis entflohen ist, bleibt ein Theil in der Gebärmutter zurück. Er verhindert, nebst dem schon wieder geschlossenen Muttermund, den weitem Durchgang des Eichens, und dient zum Bindungsmittel zwischen diesem und der Gebärmutter, d. h. er wird zur Membrana caduca Hunteri, und in der Folge zum Mutterkuchen. Die weitere Ausbildung des neuen Geschöpfes geschieht nun durch sein eigenes Leben, daß man in dieser Hinsicht Lebenskraft, Bildungstrieb nennt.

Eigentlich gelangt nur der Samenduft zu den Eierstöcken, doch kann auch etwas von der gröbern Masse dahin gelangen. Dieses ist besonders nöthig bei der Schwangerschaft in den Fallopiischen Röhren.

5) Heinlein's Zeugungstheorie stellt die Erzeugung als eine förmliche Absonderung dar. Jedes Graafische Bläschen ist von der

eintretenden Pubertät an ein anfangendes Absonderungsorgan; es sondert eine eiweißähnliche Feuchtigkeit ab, die aufgesogen und immer wieder abgesondert wird. Zu einer bestimmten Zeit gelangt ein Bläschen nach dem andern zur Reife. Die Reife eines Eies besteht aber in der Entwicklung, vermöge welcher es zu einem drüsenartigen Körper wird, und seine Structur deutlicher mit der eines Absonderungsorgans übereinkommt. Die nun abgesonderte Feuchtigkeit unterscheidet sich von der, welche ehemals in den Bläschen enthalten war dadurch, daß Samenthierchen, oder eigentlich organische Keime, (*Moleculae organicae*.) darin sind, die sie zu einem wahren *Liquor prolificus* machen. Dieses reife Ei ist nun der entstehende gelbe Körper, (*Corpus luteum*.) Der männliche Same gelangt durch die Gebärmutter und die Trompeten zu den Eierstöcken; wo er das befruchtete Eichen ganz umfließt, und dasselbe in einen wahren gelben Körper, in ein wahres, mit einem Ausführungsgange versehenes Absonderungsorgan verwandelt. Dieser als Drüse angesehene gelbe Körper hat bei der Zeugung eine dreifache Function: 1) es verwandelt die ehemalige eiweißähnliche Flüssigkeit des Graafischen Bläschens in einen wahren *Liquor prolificus*, in welchem sich organische Keime befinden, und fährt fort, diese zu bereiten; 2) es mischt, nachdem die Befruchtung vorausgegangen, den Samen beider Geschlechter innigst unter einander, indem die in einem gereizten Zustand befindlichen Gefäße jener Drüse den Samen begierig einsaugen; 3) es bringt den *Liquor prolificus* zur vollkommenen Reife. Die organischen Theilchen, (*Moleculae organicae*.) werden nach einander reif und frei, wodurch sie das Vermögen erhalten, die Rudimente des menschlichen Körpers zu bilden. Wenn nun mehrere *Moleculae organicae* zusammenkommen, so conspirirt die kleinere Bildungskraft der einzelnen zur größern der ganzen Summe, deren Resultat endlich die Ausbildung des Fötus selbst ist. Nachdem dieses geschehen ist, geht das Ei, welches den Fötus schon enthält, in die Gebärmutter, wo der Embryo seine Reife erlangt.

Es ist wohl nicht nöthig, Gründe gegen diese Zeugungstheorien anzuführen, die auf so vielen, ganz willkürlich angenommenen und unerwiesenen, vielleicht auch unerweislichen Sätzen beruhen.

6) Die neueste Zeugungstheorie hat uns Döllinger geliefert<sup>15</sup>. Im wesentlichen beruht sie auch auf der Lehre von der bei dem Zeugungsact hervortretenden bildenden Kraft zur Entwicklung eines neuen Geschöpfes. Eigenthümlich ist aber die aus der neuern naturphilosophischen Schule hervorgegangene Darstellung und die Bestimmung des Antheils, welchen die männliche Samenfeuchtigkeit und das weibliche Bläschen, (*Ovulum Graafianum*.) an der Bildung des Embryo's hat.

Der männliche Zeugungsstoff kommt beim fruchtbaren Beischlaf in die Gebärmutter, und macht auf diese einen eigenthümlichen Eindruck, welcher das Mittel zwischen Reizung und Ansteckung hält, und an der Natur beider participirt. Theils durch die Geschlechtslust, theils und bestimmter durch die eingedrungenen Zeugungsstoffe wird zunächst die der Gebärmutter eigenthümliche Secretion hervorgerufen,



Gebärmuttersame, und dieser ist Blut. Dieses mischt sich mit männlichen Samen, und wirkt als Vermittelndes bei der Befruchtung. Dabei wird das weibliche Blut bestimmt, in ein eigenes, der Gebärmutter verschiedenes Gebilde überzugehen.

Die Eierstöcke nehmen an dem Zeugungsgeschäft einen bestimmten Theil; doch ist es nicht wahrscheinlich, daß der männliche Zeugungsstoff unmittelbar, und in Substanz zu denselben gelange. Die Eierstöcke können zu dem Zeugungsgeschäft mit beigezogen werden, entweder durch den Zeugungstrieb und die Zeugungswollust, oder durch den sensuellen Antheil, welchen die Eierstöcke an dem Wirken der Gebärmutter nehmen. Durch diesen Antheil, welchen die Eierstöcke an dem Zeugungsgeschäft nehmen, trennt sich von ihnen ein Graafisches Bläschen, welches durch die Fallopischen Röhren in die Gebärmutter geführt wird. Dieses wirkt auf den männlichen Samen ein und zwingt ihn, den Befehlen der Weiblichkeit zu folgen; der Same bildet sich zu einem neuen Bläschen. Zwischen beiden Bläschen ist ein lebendiger Gefäßsaft, welchen das polypöse Gebilde des Gebärmutterblutes ausgleicht. Auf der Oberfläche des weiblichen Bläschens entstehen feine Gefäßreize, auf der des männlichen Bläschens ein Rückenmark. Vom Mutter hat das Kind die Nerven, von der Mutter die Gefäße, von beiden das Daseyn. Indem sich Nerv und Gefäße wechselseitig bezaubern, und sie der dem Ei inwohnende Bildungstrieb zur Vereinerung bringt, entsteht der bewegliche Punct, das Herz. Der gezeugte Embryo zeugt nun selbst Theile zu seinem Wachsthum, und mit dem Selbstständigwerden des Embryo's stirbt das weibliche Bläschen allmählig ab. — Man wird das Scharfsinnige in dieser Theorie leicht erkennen, und als Versuch zu weiterer Prüfung hingegeben, wozu der Verfasser diese Darstellung, der Ueberschrift zufolge, selbst beizutragen hat, ist sie ein schätzbarer Beitrag zu den Versuchen, den Vorgang des Zeugungsgeschäfts zu ergründen. Raisonnement allein kann zur Prüfung nicht fruchten. Möge sich daher dem Naturforscher bald günstige Gelegenheit darbieten, das durch Beobachtungen zu bestätigen, oder zu verwerfen, was bei dieser Theorie als Thatsache vorgelegt werden muß!

Die Physiologen waren aber damit nicht zufrieden, Hypothesen über das Zeugungsgeschäft selbst aufgestellt zu haben; sie wollten auch wissen, wie man nach Gefallen Knaben oder Mädchen zeugen könne. Hierher gehören die Vorschläge von Morasch, Millet und Henke. Erstere nehmen an, in dem rechten Eierstocke befänden sich die Eier zur Zeugung der Knaben, in dem linken zur Zeugung der Mädchen, die Frau habe sich daher gegen das Ende der Begattung nur gegen die rechte Seite hin zu neigen, damit der Same in dem rechten Eierstock dringen könne, wenn ein Knabe, und gegen die linke, wenn ein Mädchen gezeugt werden soll.

Henke hingegen nimmt an, in dem rechten Hoden werde der Same abgesondert, der Knaben, in dem linken der, welcher Mädchen zeugt. Der Hode, welcher bei der Begattung am nächsten am Bauchring liege, ergieße seinen Samen. Soll ein Knabe gezeugt werden, so muß der Mann mit dem rechten Knie zuerst überschreiten, und die ganze Lage so nehmen, daß die rechte Seite mehr gespannt

ist als die linke, er muß den obern Theil des Leibes mehr gegen die linke Seite hinrecken; sollte der linke Hode dennoch gegen den Bauchring hinaufgezogen worden seyn, so darf man ihn nur während der Begattung herunterziehen, und den rechten hinaufschieben. Auf die entgegengekehrte Art verfährt man, wenn ein Mädchen gezeugt werden soll.

Blicken wir nun zurück auf diese vielfachen Versuche, das Zeugungsgeschäft zu erklären; so scheint kaum ein Hauptweg übrig zu seyn, auf dem man tiefer eindringen kann in das Innere jenes Actes. Wir sind hingeführt zu der Annahme einer bildenden Thätigkeit eines Ausdrucks des allwaltenden, und im Individuum sich darstellenden Lebens, und nur die Beobachtung, wie jene Thätigkeit sich äußert, wie sie die Materien, die wir erkennen, benützt, um ein neues Geschöpf zu entwickeln, kann wohl, nach unsern gegenwärtigen Ansichten der Dinge, ein Gegenstand unserer Forschungen seyn.

Bleiben wir nun nicht allein bei den vollkommnern Organismen stehen, sondern suchen überhaupt zu erforschen, wie jene Thätigkeit wirke; so offenbaren sich uns zwei Hauptäußerungen:

1) Allgemeine Kräfte der Natur wirken zusammen, (*Vis generatrix naturae*), und bilden Flüssigkeiten von verschiedenem Gehalt, verschiedenen Eigenschaften, Erdarten, Steine, Crystalle, aber auch einfachere Organismen der Pflanzen und Thiere, die entweder nach ihrer Bildung fähig sind, durch Verbindung der Geschlechtsverschiedenheit sich selbst als selbstständige Individuen fortzupflanzen, oder die wieder untergehen in der allgemeinen Masse der Materie, ohne daß wir eine solche Fortpflanzung wahrnehmen. Man nennt diese Äußerung der bildenden Thätigkeit *Generatio aequivoca*, besser *Generatio univoca*, oder *Generatio univoca heteroryma*. Zeugung von Organismen durch die Kräfte der Natur, ohne Einwirkung von Geschöpfen ihrer Art.

2) Die bildende Thätigkeit bewirkt durch Organismen, und in ihnen die Bildung neuer Geschöpfe ihrer Art, indem die *Duplicatio* der Geschlechter in ihrer Vereinigung organisirend wird, ein neues gleichartiges Wesen aus sich selbst produciren kann.

Es ist uns zwar nicht genau bekannt, wie weit die Wirkung der Urzeugung, (*Vis generatrix naturae*), gehe, mit Wahrscheinlichkeit verfolgen wir sie aber auf den untersten Stufen der Organisation. Im Pflanzenreiche werden durch sie hervorgebracht der Schimmel (*Mucor*, *Mucedo*), viele Schwämme, Tremellen, Conserven, Bryozoen- und Fucusarten, mehrere Flechten; im Thierreiche die Infusions-thierchen, die Eingeweidewürmer, mehrere Zoophiten und Polypen, so daß wir in dem Schimmel den Urfang des Pflanzenreichs, in den Infusorien die Urfänge des Thierreichs erkennen.

So weit wir diese Zeugung verfolgen können, so scheint es, daß die niedern Pflanzenorganisationen vorzüglich aus Stoffen der Atmosphäre und des Wassers, die niedern Thierorganisationen aus Pflanzen- und Thierstoffen, welche durch die Einwirkung des Wassers der Luft und der Wärme, bis zu einem gewissen Grad aufgelöst sind, erzeugt werden.

Mehrere dieser niedern Organismen erheben sich bald zur Selbstständigkeit und zur Zeugung aus eignen Kräften; nicht mit Gewiß-



läßt sich aber bestimmen, wo diese zweite Art der Aeußerung der lebenden Thätigkeit beginnt. Nach unsern gegenwärtigen Kenntnissen wissen wir nur, daß die Eingeweidewürmer, die Endobranchen, die Asminthen und wahrscheinlich auch die Polypen sich selbst fortpflanzen können, und so bilden denn diese Thiere den Uebergang zu den Geschöpfen, die jetzt nur allein durch Vereinigung der Geschlechtsdrüsen fortpgepflanzt werden. Allein über die Fortpflanzungsart vieler Thiere sind wir noch ganz im Dunkeln, es gehören dahin die Corallenthier, die Tubiporen, Madreporen, Milleporen, Celleporen, Siphonien, Gorgonien, Alcyonien, Spongien, Tubularien, Sertularien, Hydularien u. s. w. Auch von vielen Würmern wissen wir in dieser Hinsicht wenig, von den Medusen oder Quallen, den Seeanemonen, den Branchiodalen, den Nereiden, Aphroditen, Steinbohrern, Sandwürmern, Terebellan, Amphitritten, Seepinseln, Meeresschnecken und mehreren andern.

Verfolgen wir die Zeugung der Thiere durch Vereinigung der Geschlechter weiter; so finden wir, daß Aufregung des Geschlechtstriebes, bei den Thieren Brunst genannt, Begattung und Befruchtung dazu erforderlich ist. Die Begattung und Befruchtung geschieht aber entweder dadurch, daß die Geschlechtstheile sich so mit einander vereinigen, daß der männliche Same in die weiblichen Geschlechtstheile ergossen werden kann, oder dadurch, daß ohne wechselseitige Berührung der Geschlechtstheile der männliche Same auf die aus den weiblichen Geschlechtstheilen ausgeschiedenen und mit einer gallertartigen Masse überzogenen Eier ausgegossen wird. — Die weitere Ausbildung des Embryos durch die Zeugung in seinen Rudimenten hervorgegangenen Geschöpfes geschieht entweder in der Gebärmutter des mütterlichen Thieres in fortwährender Vereinigung mit diesem, (*Animalia vivipara*), oder ohne unmittelbaren Zusammenhang, selbst ganz getrennt von dem Körper des mütterlichen Thieres in Eiern durch den Einfluß der Wärme und andere günstige Verhältnisse, durch Ausbrütung, (*Animalia ovipara*).

So weit liegt das Zeugungsgeschäft deutlich vor uns; forschen wir tiefer, so kommen wir auf Punkte, über welche sich die Beobachtungen widersprechen, auf andere, wo uns Beobachtungen ganz verlassen.

Schon die erste nun folgende Frage kann nicht, ohne daß Widersprüche Statt finden, beantwortet werden: wohin gelangt der männliche Same bei den Geschöpfen, bei welchen er in die weiblichen Geschlechtstheile ergossen wird?

Einige Physiologen glauben, er gelange nur in die Scheide, andere in die Gebärmutter, und noch andere lassen ihn bis zu den Eierstöcken dringen, wie aus den oben aufgestellten Zeugungstheorien erhellt. Harvey, de Graaf und Haller haben zwar niemals Samen in der Gebärmutter gefunden; dagegen haben aber Morgagni und Ruysch nicht allein in der Gebärmutter Samen gesehen, sondern auch in den Trompeten, und behaupten daher, daß derselbe bis zu den Eierstöcken gelange; hingegen hat Hinghton durch neuere Versuche an Kaninchen bewiesen, daß Befruchtung erfolgen könne, ohne daß ein Tropfen Same die Eierstöcke berühre. — Beachten wir

nun diese Erfahrungen und den Bau der weiblichen Geschlechtstheile; so ist es sehr wahrscheinlich, daß der materielle Theil des Samens in die Gebärmutter, aber nicht bis zu den Eierstöcken gelange.

Die Beantwortung dieser Frage bestimmt schon zum Theil die einer andern: wie wirkt der männliche Same? Höchst wahrscheinlich nur durch die inponderabeln Bestandtheile, welche er enthält, (was schon mehrere Physiologen behauptet haben, neuerlich aber durch Luca. und Jörg besonders gut dargestellt worden ist;) es scheint nicht allein das eben Angeführte dafür zu sprechen, sondern auch die Analogie, (bei den Fischen, Fröschen, Salamandern u. s. w. wird der männliche Same nur auf die gelatinöse Masse ergossen, welche die Eier umgibt, der Samenstaub der Pflanzen kann nicht bis in den Fruchtknoten gelangen,) und wie schon bemerkt der Bau der Theile. Besonders bei den Vögeln ist der Oviduct sehr gekrümmt, die innere Fläche zottig mit einem chylusartigen Schleim angefüllt, die männlichen Geschlechtstheile sind so klein, daß ein tiefes Eindringen nicht möglich wird; es läßt sich daher nicht wohl erklären, wie bei diesen Geschöpfen der gröbere materielle Theil des Samens zu den Eierstöcken gelangen kann.

Was von den verschiedenen Ansichten über die Bestimmung des Eizens in den Eierstöcken und über die Form, in welcher die zur Bildung des Embryo's bestimmten Materien in die Gebärmutter gelangen, zu halten sei, ergibt sich aus dem Obigen; auch das, was man hierüber sagen kann, ist durch Thatsachen nicht hinlänglich bewiesen und nur vermuthen können wir, daß der Hergang bei der Zeugung folgender seyn möge.

Durch den stärker aufgeregten und zur Begattung antreibenden Geschlechtstrieb wird die Thätigkeit des Gefäß- und Nervensystems im allgemeinen, die der Geschlechtstheile aber vorzugsweise sehr erhöht; noch mehr geschieht dieses während der Begattung selbst, und entsteht Befruchtung, so trifft der höchste Grad der Reizung, und die mit dieser verbundene Ergießung der Samenfeuchtigkeiten, (ich will hier den Nahmen Samenfeuchtigkeit auch für die Flüssigkeit beibehalten, welche in den weiblichen Geschlechtstheilen sich ergießt,) zusammen. Der männliche Same, mit den feinsten und edelsten inponderabeln Stoffen des Organismus begabt, bringt durch Theile und in Theile, in denen das Leben in einem hohen Grade gesteigert ist; er bringt bis in die Gebärmutter und trägt zu ihr selbst, als Leiter, einen Antheil der bildenden Kraft des Mannes. Das Bläschen des Eies enthält den bildbaren Stoff zu dem hin, von der Gebärmutter aus, die durch den männlichen Samen gegebene bildende Thätigkeit und von dem erhöhten Leben der Eierstöcke selbst aus, die des weiblichen Organismus sich verbreitet. So tritt in diesem Moment einer neuen Schöpfung die bildende Thätigkeit heraus aus dem eigenen Organismus der Zeugenden, und bindet sich an den Stoff, den das weibliche Geschöpf hergibt. Von diesem Augenblick an ist aber auch die bildende Kraft zu dem Ei übertragen worden; gleichzeitig fangen neue Bildungen im Innern der Gebärmutter an, durch die aufgeregte bildende Thätigkeit, vielleicht materiell vermittelt durch einen Theil des männlichen Samens und der vom Weibe ergossenen Flüssigkeit. Ein Theil des



ulichen Samens wird aber sehr wahrscheinlich von den Saugadern der Scheide und der Gebärmutter aufgenommen, so wie dieses bei der Begattung, auch der nicht fruchtbaren, geschieht. Ein beträchtlicher Theil fließt aber auch aus der Scheide bald nach der Begattung wieder heraus. Das Eichen kommt, aus Häuten und Flüssigkeiten bestehend, durch die Fallopiischen Röhren in die Gebärmutter. Auf seiner Oberfläche bilden sich Gefäße, (*Figura venosa*,) die nach innen sich senken und das erste Rudiment des Gefäßsystems darstellen, die nach außen sich verbreiten, und an das in der äußern Fläche der Gebärmutter vorhandene Gebilde sich anlegen. Ein Theil der Flüssigkeiten des Eichens wird zur Bildung jener Gebilde und des in ihnen enthaltenen Bluts verbraucht; einen andern Theil sehen wir in einem eignen Häutchen eingeschlossen, als Nabelbläschen; es bilden sich nun so zuerst die Organe des Eies und von diesem aus der Embryo. Wie nun von diesem Moment an der Embryo wahrscheinlich weiter gebildet wird, habe ich unter den Artikeln von Embryo aus einander zu setzen gesucht. — Indem ich annehme, daß nicht das ganze mütterliche Ei, sondern nur ein Theil desselben zu dem Nabelbläschen gebildet werde, habe ich allerdings auch einen Versuch aufgestellt, wie wir uns die erste Bildung des Embryo's der Säugthiere erklären können; indessen würde diese Erklärung der Rudimente des Embryo's aus der Analogie etwas für sich haben; das Ei, welches aus den Eierstöcken in die Gebärmutter gelangt worden ist, würde dann gleich seyn einem Ei der eierlegenden Thiere ohne Schale, in der Gebärmutter findet dasselbe seine äußere Hülle schon vorgebildet, und die Mittel zum Ersatz für den Mangel der atmosphärischen Luft, der hinreichenden Menge von nährender Flüssigkeit, in der ersten Zeit der Bildung.

(Seiler.)

#### Hierher gehörige Schriften.

- Hippocratis de genitura l. gr. lat. c. libro de nat. pueri c. notis J. B. Oracii, Par. 1545, 8. (1564, 4. 1622, fol. interpr. J. Willichio c. ej. serv. in Lactantii Firmiani libr. de opificio Dei, Argentor. 1542, 8.; Francof. ad Viadr. 1542, 8.; c. Polybi nomine vert. Albano Torino, 1548, 1544, 4.; c. comm. J. Sylvii Paris. 1561, 8.; Gall. aut. Gu. Chredeen, Paris. 1556, 8. 1559, 8.; Ital. c. tit. Polybi, vert. P. Cauro, Rom. 1545, 4. et in operibus.)
- Ant. Maria Venusti Discorso generale intorno alla generazione, al nutrimento degli homini, Venet. 1562, 8.
- Joh. Jessenii a Jessen de generationis et vitae hominis periodis, tractatus II. Viteb. 1602, 4. (Oppenh. 1610, 8.)
- Mundini Mundini, de genitura pro Galenicis, Venet. 1622, 4. et de disputationem de genitura additamentum apoglogeticum, Venet. 1626, 4.
- Vict. Cardeliani de origine foetus libr. II, Vinc. 1628, 4.
- (Casp. Hofmanni de generatione hominis libri IV, contra Mund. mundinum, Francof. ad M. 1629, fol.)
- Joh. Bened. Sinibaldi Geneanthropeiae, s. de hominis generatione Deutenchon, Rom. 1642, fol. (Francof. 1669, 4.)
- Maur. Hofmanni de generatione et usu partium eidem interuentium 1650, 4.
- Gu. Harvey exercitationes de generatione animalium, quibus accedunt praedam de partu, de membranis ac humoribus, de conceptione etc., Lond. 1651, 4. (Amst. 1651, 12. 1662, 12. Patav. 1666, 12. Hag. 1630, 12. Angl. Lond. 1653, 8.)
- Ant. Everardi novus et genuinus hominis brutique exortus, Mediol. 1661, 12.

Ant. Deusing *Genesis microcosmi, s. de generatione foetus in utero*, diss., Amst. 1665, 12.

Jan. Orchami *de generatione animalium conjectura*, Colon. 1667, 12.

Georg. Frid. Rallii *de generatione animalium disquisitio med. physica*, Stett. 1669, 12.

Mar. Malpighi *de formatione pulli in ovo dissertatio epist. et appendix de ovo incubato*, Lond. 1673, 4. (Lond. 1686, fol. et in operib.)

Just. Schraderi *observationes et historiae ex Guil. Harvey libello de generatione animalium excerptae et in accur. ordinem redactae etc.*, Amst. 1674, 12.

Car. Drelincourt *de conceptione adversaria*, Lugd. B. 1682, 12.

Cosmopolitae *historia naturalis comprehendens novam et genuinam animalium generationem*, Lugd. B. 1686, 12.

Joh. Chr. Sturm resp. Guil. Bachmann, *diss. de plantarum animaliumque generatione*, Altd. 1687, 4. (rec. in Halleri coll. T. V. p. 61.)

Nic. Venette *la génération de l'homme, ou Tableau de l'Amour conjugal*, Amst. 1688, 12. (Parm. 1689, 12. Ed. 7. Col. 1696, 12. 1712, 12. Par. 1732, 2 Vol. Hamb. 1751, 12. Lyon 1768, 12. Deutsch, Leipz. 1698, 8. Röthgeb. 1738, 12. Englisch, Lond. 1703, 1712, 8. Holländisch, Amst. 1695, 8. Hag. 1737, 4.)

Chr. Frid. Garmanni *homo ex ovo, s. de ovo humano dissertatio*, Chemn. 1672, 4. Ejusd. *oologia curiosa, ortum corporum naturalium ex ovo demonstrans*, Cygn. 1691, 4.

Joh. Val. Scheid *paradoxorum anatomicorum circa hominis generationem specimen*, Arg. 1694, 4.

Dan. Taubvry *traité de la génération et de la nourriture du foetus*, à Par. 1700, 4.

Rud. Jac. Camerarii *specimen experimentorum circa generationem hominis et animalium*, Tubing. 1715, 4.

Gu. Manguest *de la Mothe dissertation sur la génération etc.*, à Par. 1718, 8.

J. Hyacinthi Vogli *de anthropogonia dissertatio anat. physiol. P. I et II*, Bonon. 1718, 4.

Sim. Pauli Hilscheri *observationes et meditationes circa opus generationis in foeminis*, Jenae 1719, 4.

Ant. Vallisneri *Istoria della generazione dell' uomo, e degli animali, se sia da vermicelli spermatici, o dalle uova*, Venezia 1721, 4. (Übers. v. Berger, Pengo 1739, 8.)

J. Bapt. Paitioni *della generazione dell' uomo discorsi academici I—IV*, Venez. 1722—1726, 4.

J. Christoph. Lischwitz *diss. de ortu et propagatione hominum*, c. f. Lips. 1723, 4.

Ch. Denis Delaunay *nouveau système sur la génération de l'homme et celle de l'oiseau*, à Par. 1726, 12.

Fabr. Joh. Ferri *curiosa quaesita de generatione viventium in triplici statu, univoco, analogico, et aequivoco, resoluta ad mentem Hippocratis*, Ferrar. 1728, 8.

Herm. Fr. Teichmeyer *diss. de generatione*, Jenae 1736, 4.

Car. Joh. Aug. Otto *exercitatio physiol. anat. de generatione*, Jenae 1736, 4.

Joh. Elmi *vermehrter und erläuteter Dionis, oder Anmerkungen über dessen Tractat von Erzeugung und Geburt des Menschen*, Brem. 1745, 8.

Franç. Imbert *generationis historia*, Monsp. 1745, 8.

Venus physique, cont. une dissertation sur l'origine des hommes et des animaux etc., 1746, 12. (6. édit. 1751, 12.)

E. M. Nicolai *von der Erzeugung des Kindes im Mutterleibe*, Halle 1746, 8.

T. Needham *mikroskopical discoveries etc.*, Lond. 1745, 8. (Nouvelles découvertes faites avec le microscope trad. de l'anglais, Leyde 1747, 12. et Nouvelles observations microscopiques, trad. par M. L. A. Lavirotte, à Par. 1750, 12.)



- Offrai de la Mettrie réflexions philosophiques sur l'origine des  
 eux, à Londres 1750, 4.
- mi. Eloy Gautier d'Agoty zoogénésie, ou génération de l'homme  
 animaux, à Par. 1750, 12.
- ob. de Haller réflexions sur le système de la génération, de M. de  
 fcon, à Genève 1751, 12. (Pateinisch, in operib. minor. T. III.)
- mon. Parson philosophical observations on the analogy between the pro-  
 of animals and that of vegetables, Lond. 1752, 8.
- util. Mallinkrodt diss. exh. veterum et recentiorum opiniones et pla-  
 de miro artificio naturae in opere generationis, Giess. 1758, 4.
- asp. Fridr. Wolf theoria generationis, Hal. 1759, 4. (ed. aucta  
 8.; Casp. Fr. Wolf Theorie von der Generation, Berl. 1764, 8.)
- ar. Linné, resp. Chr. Lud. Råmstrøm generatio ambigena, Ups.  
 4. (in Linné amoen. acad. Vol. VI. n. 101)
- ar. Bonnet considération sur les corps organisés, ou l'on traite de leur  
 de, de leur développement, de leur reproduction, Vol. I et II, Amst.  
 8. (E. Bonnet's Betrachtungen über die organisierten Körper, aus dem  
 übersetzt und mit Zus. herausgegeben v. J. A. E. Göße, 2 Theile, Lemgo  
 8)
- iz. Spallanzani saggio d'osservazioni microscopiche, concernenti il  
 della generazione di Sign. Needham e Buffon, Modena 1765, 4.
- iff. in Spallanzani's phys. und math. Abh. Nr. 3.)
- sselden. Experiences pour servir à l'histoire de la génération des animaux  
 ces plantes avec une ébauche de l'histoire des êtres organisés avant leur  
 undation par J. Senebier, à Genève 1785, (à Paris 1786, übersetzt v.  
 Schell's Leipz. 1786, 8)
- och. Christoph Denke völlig entdecktes Geheimniß der Natur, sowohl in der  
 gung des Menschen, als auch in der willkürlichen Wahl des Geschlechts der Kin-  
 Braunschweig 1786, 8.
- Mayer diss. de iis, quae generationem animalis vel plantae concernunt,  
 1775, 4. (in Diss. Prag. Vol. II. Nr. 9.)
- Blumenbach über den Bildungstrieb und das Zeugungsgeschäft, Göt. 1787,  
 verbeß. Aufl. 1789, 8)
- Wewels gegen die Entwicklungstheorie. Ein Brief an Hrn. Senebier von C. F.  
 dem Franz. übers. v. G. Forster, Göt. 1788, 8.
- cos a. Mohrenheim nova conceptionis atque generationis theoria, Re-  
 am. 1789, 4.
- Paul Fr. Herm. Grasmeyer de conceptione et foecundatione humana.  
 setting. 1789, 8. (in Schlegel syll. oper. ad art. obstetr. Vol. I. Nr. 9.)
- speculations on the mode and appearances of impragnation in the human  
 male, with an examination of the present theories of generation, Edinb.  
 1799, 8. (Betrachtungen über die Schwängerung u. s. w. übersetzt von C. F. M.  
 Schell's, Altona und Leipz. 1789, 8.)
- Fontana lettera ad un amico sopra et sistema degli suiluppi, Fi-  
 nze 1792, 8. (übers. in Reil's Archiv f. die Physiol. 2. B. 8. H. Nr. 6.)
- Den die Zeugung, Hamb. 1805, 8.
- Trastour expositions et résumation de tous les systèmes sur la géné-  
 ration, à Par. 1804, 4.
- Hoh. Wolfg. Heinlein diss. de foecundatione et conceptione, Erl.  
 1803, 8.
- Pulley an essay on the proximate cause of animal impregnation,  
 Lond. 1801, 8.
- Hösch's Versuch einer neuen Zeugungstheorie, Lemgo 1801, 8.
- Die wunderbare Werkstätte der Natur, in Beispielen von der Fortpflanzungsweise  
 der Thiere und Pflanzen dargest., Berl. 1801, 2. (auch unter dem Titel: Friedr.  
 Schell. Jung Aphrodite, Erhaltung der lebenden Geschlechter auf Erden, 2. Aufl.  
 Berl. 1816, 8.)
- \*Christoph Pol. Schneegaß über die Erzeugung, oder Aufzählung und Beur-  
 theilung aller bisherigen Zeugungstheorien, nebst einer neuen und vollständigen Er-  
 klärung dieses bewundernswürdigen Geschäftes der Natur, Jena 1802, 8.

Joh. Christ. Bauer examen criticum variarum opinionum de procreatione hominis, Erl. 1805, 8.

\* Sam. Christian Luch's physiologisch-medizinische Untersuchungen über einige Gegenstände der Lehre vom Zeugungsgeschäfte, insbesondere des Mannes, Frankf. a. M. 1813, 8.

† G. J. v. Döbenitz's Belehrungen über das Geheimniß der Zeugung der Menschen, Berl. 1817, 8.

**Erzeugungskraft, Erzeugungsvermögen, f. Zeugungskraft.**

**Erzittern, f. Zittern.**

**Erzürnen, f. Zorn.**

**Eselstemperament, f. Böotisches Temperament.**

**Esflust, f. unter Hunger.**

**Essen, Speisen, (Assumptio ciborum, Cibatio \*).** Die unaufhörliche Verzehrung fester Stoffe des lebenden thierischen Körpers erheischt deren periodischen Wiederersatz. Dieß Bedürfniß wird in der Periode des Wachsthums ein noch erhöhteres.

Dieser Stoff wird von allen Thieren als ein roher, jedoch nicht ohne Auswahl, durch den Mund, jenen allgemeinen charakteristischen Theil der Thierwelt, aufgenommen, um innerhalb des Körpers in einem eignen organischen Apparat dafür, (Magen und Darmcanal,) diejenigen Veränderungen zu erfahren, wodurch er zur Ernährung geeignet wird, welcher physiologische Vorgang als Verdauung bekannt ist. (Vgl. diese Artikel.) Tene Ausnahme äußerer, zur Ernährung geeigneter Stoffe, (Nahrungsmittel,) erfolgt instinetartig, nie aber, ohne daß das Thier durch das ihm fühlbare Nahrungsbedürfniß zu Muskelthätigkeit angeregt wird, die insbesondere darauf abzielt. Jedes Thier sucht also seine Nahrung, nicht selten unter Kampf mit äußern Hindernissen, unter Furcht und Verlangen auf, und eignet sich die Nahrungsstoffe, deren es habhaft werden kann, bis zur Sättigung dadurch zu, daß es solche in seine Mundhöhle aufnimmt, und nach längerem oder kürzerem Verweilen in dieser, mit oder ohne Vorbereitung derselben, niederschluckt.

Diese zur eigenen Erhaltung der Thiere nothwendige Lebensfunction des Fressens wird in der Deutschen Sprache in dem menschlichen Leben mit dem edlern Ausdruck des Essens bezeichnet. Sie verdient diese besondere Bezeichnung, indem sie bei dem Menschen rein eine Handlung der Willkür und unter Gesetze der Vernunft gestellt ist. Auch die Organisation des menschlichen Gesichts deutet darauf hin, daß der Ersatz der verlorenen Körperstoffe durch neue Nahrungsmittel höhern Zwecken des menschlichen Daseyns untergeordnet sei. Alle Thiere, nur mit wenigen Ausnahmen, (wie der Elephant,) fassen die Nahrungsstoffe unmittelbar mit dem Munde auf, der um dieses Zwecks willen auch der am weitesten vorgerückte Theil des Kopfs ist. Der Mensch aber, sobald er seine Hände gebrauchen gelernt hat, bedient sich derselben dazu, um die Nahrungsmittel in den Mund zu bringen. Hierin steht ihm nur der Affe, als das einzige Thier, dem die Natur Hände verlieh, zur Seite. Andere Thiere bedienen sich ihrer Vorderfüße bloß um ihre Nahrungsmittel fest zu halten, und sie bequemer benagen zu können.

\*) eigentlich nur in activer Bedeutung, wie Cibatus, (Coelii Aurel. tard. pass. l. 4. c. 4.)



Das Essen selbst, als physiologischer Vorgang, beginnt mit dem Abbringen der Nahrungsmittel, (Speisen,) in den Mund zum Zweck der Ernährung; ein zweiter Act desselben ist bei Menschen und auch mit Zähnen versehenen Thieren das Zerkauen der Speisen, insofern sie dessen bedürftig sind; der dritte und letzte ist das Niederschlucken. Von beiden letztern wird unter eignen Artikeln die Rede sein. S. Kauen und Schlucken.

Der Reiz zum Essen hat der Mensch mit allen Thieren gemein. Dieser Reiz, in der Perception, Appetit, wird gesteigert zum Hunger, und erheischt dann unbedingt Befriedigung. Vgl. auch diese Art.

Die mehrsten Thiere, sich selbst überlassen, fressen, so oft sie etwas bekommen können; bis zur Sättigung. Die vielseitige Bestimmung des Menschen bringt sie schon auf den niedern Stufen der Cultur dahin, gewisse Tageszeiten zum Essen festzusetzen und überhaupt an eine periodisch wiederkehrende Ordnung im Essen zu gewöhnen; deren genauer Befolgung sie sich gewöhnlich am besten befinden. In wie fern gewisse Grundsätze in der Auswahl, in der Zeit, in der Menge von Nahrungsmitteln auf den Gesundheits- und Krankheitszustand des Menschen den nächsten Bezug haben, ist ein wichtiger Gegenstand der Diätetik, und muß hier unerörtert bleiben. Nur die allgemeine Bestimmung eines thierischen und insbesondere menschlichen Nahrungsmittels ist gegenwärtigem Artikel zunächst gelegt, indem nicht das Aufnehmen eines äußern Stoffs in die Mundhöhle, das Zerkauen und Niederschlucken allein, sondern alles dieß nur dann Essen ist, wenn es zum Behuf der Ernährung oder wenigstens zur Stillung des Hungers geschieht.

Das Wort Nahrungsmittel deutet schon selbst an, daß nur dasjenige als ein solches zu betrachten ist, was zur Ernährung dient; es belehrt uns also zunächst die Erfahrung darüber, welche unter den mannigfaltigen äußern Stoffen, durch den Mund in den Körper gebracht, diesen Zweck, oder in wie fern sie solchen erfüllen. Als Nahrungsmittel, womit der Mensch also nicht nur seinen Hunger stillt, sondern wodurch auch sein Körper sich in dem Zustande von Fülle erhält, der der Gesundheit charakterisirt und dem Menschen zugleich die nöthigen Körperkräfte verleiht, ist Nahrungsmittel. Die Natur aber hat zugleich dafür gesorgt, daß die Aufnahme eines solchen äußern Stoffes mit einem Gefühl von Wohlbehagen verbunden ist, so daß derselbe zugleich Genußmittel wird. Das Thier wird einzig durch die mit dem Genuß verbundene sinnliche Anregung zur Auswahl der Nahrungsmittel bestimmt, und zwar so, daß es unter mehreren, was ihm zur Nahrung dient, das, was dazu am tauglichsten ist, auch zunächst, das minder Taugliche aber nur in Ermangelung eines bessern Stoffes genießt. Bei dem Menschen, (und selbst auch den vorerwähnten Hausthieren, die, wie in mehreren, auch hier ihm in seinen Lebensverhältnissen näher gestellt sind,) ist der sinnliche Reiz, der zunächst von dem Geschmacksorgan aufgefaßt wird, gar leicht mit dem Verdauungsvermögen in Mißverhältniß gestellt, und es tritt daher nicht selten der Fall ein, daß mit Wohlgeschmack, zumal in Uebermaß genossene Stoffe nicht assimilirt werden, also relativ keine Nahrungs-

mittel sind. Doch kann im allgemeinen wohl, der Grundsatz aufgestellt werden, daß, was das Geschmacksorgan angenehm reizt, d. i. wohlschmeckend ist, an sich und abgesehen von etwa beigemischten Stoffen, und in einer, den Verdauungskräften angemessenen Menge, auch der Ernährung förderlich ist.

Da aber das Verdauungsgeschäft ein complicirtes ist, und nicht bloß in der Annahme von äußern assimilirbaren Stoffen besteht; so ist der Verdauung nicht bloß das wirklich dem Körper Homogene, also zur Assimilation Geeignete, sondern auch das, was bei jenem Proceß anregend einwirkt, förderlich. Es wird daher manches von genossenen äußern Stoffen, was direct kein Nahrungsmittel, (an sich nicht assimilirbar,) ist, indirect zu einem solchen.

Auch hier hat uns zunächst die Erfahrung gelehrt, was für Stoffe dieß zunächst bewirken, so wie auch die Uebereinstimmung, in der die sinnlichen Gefühle beim Genuß, (der Wohlgeschmack und der Appetit nach dergleichen Stoffen, wenn der Mensch schon früher damit bekannt wurde,) mit der spätern Wirkung derselben in den Verdauungsorganen stehen. Für die Wissenschaft, aber ist es Aufgabe, die besondern Eigenheiten hervorzuheben, welche Nahrungsmittel an sich, (sowohl indirecte als directe,) haben müssen, um ihren Zwecken zu entsprechen. Hierzu würde die Chemie uns nähere Bestimmungen geben, wenn sie uns überhaupt in der Abscheidung einzelner Körpertheile von andern immer befriedigende Aufschlüsse darüber ertheilte, was diese in Verbindung zusammen leisten. Nun kennen wir wohl nach chemischen Untersuchungen gewisse Extractivstoffe von übereinstimmenden Eigenschaften, und die sich immer in den Stoffen, die als directe Nahrungsmittel benutzt werden, wiederfinden, so das Sagmehl, (Amylum,) den Gummi, (Pflanzenschleim,) die Colla, den Pflanzeneiweißstoff, die Pflanzenöhle, den Zucker in vegetabilischen Stoffen; den Faserstoff, den Eiweißstoff, die thierische Gallerte, die thierischen Öhle, den Milchezucker in thierischen Stoffen; aber alles dieses nur als nächste Bestandtheile. Ueber die Mischungsverhältnisse, nach denen sie in diesem oder jenem Nahrungsmittel insbesondere sich als tauglich zeigen, läßt uns die Chemie meist ohne befriedigende Belehrung. Kam es bloß darauf an; daß obiger Stoffe in dem Verhältniß, als sie als thierische Stoffe dem belebten Körper auch zu seinem Bestehen nöthig sind, und während des Lebensprocesses aus ihm gelangen, auch an andern Pflanzen- oder Thierkörpern ihm zum Ersatz wieder zugehen; so müßte eine Menge Pflanzen- und Thierkörper, (ja eigentlich wohl alle, nur von heterogenen Stoffen getrennt,) zur Nahrung auf gleiche Weise taugen. Die Erfahrung aber lehrt, daß, so raffiniert auch die Kunst der Menschen ist, Nahrungsmitteln eine solche Vorbereitung zu geben, daß nicht nur die Verdauung derselben erleichtert, sondern daß auch der Geschmacksinn zugleich angenehm aufgeregt wird, doch eigentlich nur eine verhältnißmäßig sehr geringe Zahl von Pflanzen- und Thierkörpern dazu benutzt wird, und daß die übrigen höchstens nur als Surrogate dienen, um in Ermangelung andrer, (nicht ohne Beeinträchtigung des Wohlbefindens,) den Hunger zu stillen. Welche aber gute Nahrungsmittel abgeben, hat durchaus erst durch Versuche ausgemittelt



ren müssen, und die Chemie an sich leitet uns ohne solche Ver-  
 hier eben so unsicher, als sie allein auch über die Wirksamkeit  
 Angemessenheit eines Heilmittels in Krankheiten durchaus zu  
 sichern Leitung dient. Nachdem jene Versuche aber schon  
 ist angestellt sind, und durch sie bereits, was angemessenes Nah-  
 rsmittel sei, ausgemittelt worden ist, haben nun freilich auch  
 wissenschaftlichen Principien die einzelnen dazu dienenden  
 Stoffe, mit Berücksichtigung ihrer nächsten Bestandtheile; und in  
 fern sie den Körper direct nähren, oder, indem sie, (wie  
 Salze, Gewürze, spirituöse Mittel u. s. w.) den Geschmack erhö-  
 , zugleich die Verdauung unterstützen, zusammengestellt werden  
 können, wie dieß in wissenschaftlichen Bearbeitungen der Diätetik an  
 ihrem Ort ist, hier aber übergangen werden muß.

Im allgemeinen aber muß die Physiologie den Grundsatz anerken-  
 : daß, so wie schon die Neigung den Menschen, der eine Aus-  
 wahl in seinen Nahrungsmitteln treffen kann, zu einer gemischten  
 Nahrung hinleitet, auch eine solche dem Körper für das Assimila-  
 tionsgeschäft die angemessenste ist, da der thierische Stoff des leben-  
 digen Körpers selbst kein einfacher, sondern ein höchst gemischter ist.

Man hat die Frage aufgeworfen, ob der Mensch sich von Pflan-  
 zen oder von Thieren am besten nähre. Von den Thieren sind einer  
 großen Menge einzig Pflanzen, andern einzig andere Thiere zu ih-  
 rem Unterhalt von der Natur angewiesen. Wenn man von dem  
 Grundsatz ausgeht, bei welcher Nahrung der Mensch am wenigsten  
 Störungen seiner Gesundheit ausgesetzt ist, bei welcher Geist und  
 Körper sich am gleichmäßigsten erhalten; so muß man der Pflanzen-  
 Nahrung den Vorzug geben. Gegenseitig ist Thiernahrung schon an  
 sich eine dem menschlichen Körper homogenere, die zugleich ein kräf-  
 tiges Leben aurgt, und dessen bemerkbare nachtheilige Einwirkungen  
 sich zunächst nur dem Uebermaß des Genusses beizumessen sind, zu  
 dem freilich in ihnen sehr nahe liegende Veranlassungen gegeben sind.

Vergleicht man aber den Bau der bei der Ausnahme der Nahrungs-  
 mittel und der Verdauung derselben zunächst thätigen Organe, ins-  
 besondere der Kauorgane und des Darmcanals, mit den gleichen Or-  
 ganen derjenigen Thiere, die entweder bloß von Vegetabilien, oder  
 bloß von Thieren, oder auch von gemischter Nahrung leben; so fin-  
 den wir, daß der Bau des menschlichen Körpers in Hinsicht auf seine  
 Ernährung so ziemlich zwischen dem der pflanzenfressenden und dem  
 der fleischfressenden Thiere in der Mitte stehe, und mit dem derer,  
 die gemischte Nahrung zu sich nehmen, am meisten übereinstimme.

Die menschlichen Zähne entsprechen in ihrer Stumpfsheit und der  
 Fläche ihrer Kronen den Zähnen der pflanzenfressenden Thiere;  
 bloß die Spitzzähne haben einige Andeutung von Zähnen, wie sie sich  
 bei fleischfressenden Thieren finden. Am meisten kommen die mensch-  
 lichen Zähne mit denen der ungeschwänzten Affen überein, die bloß  
 von Vegetabilien leben. — Auch das Kiefergelenk am menschlichen  
 Kopf ist, wie bei pflanzenfressenden Thieren, einer Bewegung zur  
 Seite, um die Speisen zermalmen zu können, fähig. Im ganzen  
 stehen aber pflanzenfressende Thiere den Unterkiefer nicht weit abwärts,  
 sondern mehr seitwärts und zugleich hinterwärts und vorwärts, statt

daß fleischfressende Thiere die Kieferhöhle weit öffnen, aber auch nur auf diese Art der Bewegung beschränkt sind. — Der Magen des Menschen ist einfach, häutig, nur wenig muskulös und wenig drüsig, entspricht daher der Bildung des Magens fleischfressender Thiere; doch findet man dieselbe Structur auch in pflanzenfressenden Thieren; am meisten gleicht der menschliche Magen dem des Pferdes und des Schweines, besonders auch dem von von Pflanzen lebenden Affen. Der Dünndarm hält das Mittel zwischen dem von Pflanzen und dem von Fleisch sich nährenden Thieren, indem er bei jenen lang und enge, bei diesen kurz und weit ist; eben so auch der Dickdarm, der bei fleischfressenden Thieren kurz, einfach, und nur weniger dicker als der Dünndarm, bei pflanzenfressenden Thieren aber lang, mit vielen klappenartigen Einziehungen versehen und bedeutend dicker als der Dünndarm ist. Indem auch hier der Bau des menschlichen Dickdarms zwischen beiden innen steht, nähert er sich aber doch etwas mehr dem Bau des Dickdarms der pflanzenfressenden Thiere. Dagegen stimmt aber die Bildung des Blinddarms wieder mehr mit der des Blinddarms fleischfressender Thiere überein, indem er, wie bei diesen, kurz und eng ist; da hingegen dieser Theil bei pflanzenfressenden Thieren sich durch Länge, Größe und Weite auszeichnet.

Alle eigentliche Nahrungsmittel liefert bloß das Pflanzen- und das Thierreich, weil erst durch den Lebensproceß in diesem der Nahrungsstoff ein so gemischter wird, wie es zur Assimilation der höhern Organismen erforderlich ist. Man hat indessen auch dem einfachen Wasser Nahrungsfähigkeit beigelegt. Daß Pflanzen während des Wachstums ihre festen materiellen Stoffe unter Vermittelung des Lichts und der Atmosphäre zunächst aus dem Wasser ziehen, ist keinem Zweifel unterworfen. Wenn aber nicht nur Fische, sondern auch andere Thiere, ja selbst Menschen eine Zeit lang mit bloßem Wasser haben genährt werden können<sup>2</sup>; so beweist dieß doch nur, was die Natur, unter Umständen, ohne zu erliegen, verträgt, obgleich wohl nicht zu läugnen ist, daß bei der Ernährung auch Wasserzerseßungen im thierischen Körper vorgehen mögen. Wie wenig aber diese unter gewöhnlichen Lebensverhältnissen, wo die Consumtion der Körperteile eine nicht unerhebliche ist, zum Wiederersatz ausreichen, bedarf keiner Auseinandersetzung, indem dem Wasser, wie in den sogenannten Numfordschen Suppen nothwendig eine verhältnismäßige Menge thierischer und vegetabilischer Stoffe beigemischt seyn muß, wenn dem Zweck der Ernährung Genüge geleistet werden soll<sup>3</sup>.

Unter wilden Völkern ist es nicht ungewöhnlich, daß sie zur Stillung ihres Hungers Erdarten genießen, deren wesentlicher Bestand-

- 2) Jordonce hat Versuche bekannt gemacht, nach denen es ihm gelang, Goldfische über 6 Monate in bloßem destillirten Wasser zu ernähren. (S. dessen neue Unterf. des Verdauungsgeschäftes der Nahrungsmittel, übers. v. M. Schaeffer, Leipzig. 1793, S. 53) In der von Pouteau angewandten Wassercur. genossen die Kranken mehrere Wochen hindurch nichts als kaltes Wasser, ohne dabel abzumagen. (S. Pouteau oeuvres posthumes, à Paris 1783, T. II, und Richter's chir. Bibl. 7. B. S. 295. 3) Doch ist dieser Velsatz zum reellen Bedürfnis bei weitem in so großer Menge nicht erforderlich, als man dieß gewöhnlich wähnt. Nach Numford vermag eine Quantität von 9½ Loth fester Nahrungsmittel in einer Masse von 40 Loth Wasser eine erwachsene Person zu sättigen. (S. dessen Abh. über Spelße in seinen kleinen Schriften, 1. B. S. 247.)



Thon ist. Das dringende Bedürfnis, in Ermangelung wirklicher Ernährungsmittel, mag diese Menschen zuerst dahin gebracht haben, das Ethl des Hungers durch Anfüllung des Magens abzustumpfen. (Gewohnheit bei geringer Sensibilität und robuster Körperconstitution mag sie dahin gebracht haben, daß sie diesen Genüssen in der That sogar Geschmack abgewannen<sup>4</sup>. Schwerlich aber möchte auf deren Theil, den dergleichen mineralische Stoffe an der wirklichen Nahrung nehmen, etwas bedeutendes zu rechnen seyn.  
Vgl. v. Humboldt's Nachrichten von den Erde fressenden Otomaken. (Nachrichten der Natur, 1. B. S. 142.) (H.)

Essentia. s. Wesen. — quinta, s. Quintessenz.

Essentialia consecutiva, constitutiva, s. unter Eigenschaft.

Essigschälchen, unschickliche wörtliche Uebersetzung von Acetabulum.

Esuries, Esurigo, Esurio, Esuritio, Esuritor, s. Hunger und Hungernder.

Estesticulatio, s. Castration.

Ethisma, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wortes, s. Gewohnheit.

Εθισμα, consuetudo.

Ethismus, vgl. Ethos.

Ethmoidalarterien, (Ethmoidales, s. Ethmoideae<sup>1</sup> arteriae,) Kiechbeinarterien<sup>2</sup>, Siebbeinarterien<sup>3</sup>, Schlagadern des Siebbeins<sup>4</sup>. Deren werden zwei unterschieden: a) eine vordere<sup>5</sup>, (anterior<sup>6</sup>), und b) eine hintere<sup>7</sup>, (posterior<sup>8</sup>), die vordere ein beständiger, letztere ein unbeständiger Zweig der ophthalmischen Arterie, die beide zum Ethmoidalknochen und benachbarten Theilen gehen. S. Augenarterien.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2475. 2) Edm. merriug's Gefäß. S. 118. 3) Pöder's anat. Tafeln, Taf. 96. F. 6. Nr. 34 u. 35. 4) — 8) Eleutaud's Vergleichen. Uebers. Leipz. 1782, 2. B. S. 69.

Ethmoidaldeckel, (Ethmoidalia opercula<sup>1</sup>), die auf manchen Ethmoidalzellen zuweilen vorkommenden eignen Knochenplättchen, welche dieselben decken. S. Ethmoidalknochen.

1) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 183.

Ethmoidale foramen anterius, medium, posterius, s. Ethmoidallöcher. — os, s. Ethmoidalknochen.

Ethmoidales arteriae, s. Ethmoidalarterien. — cavernulae, cellulae, s. Ethmoidalzellen. — processus conchae inferioris et ossis frontis, s. Ethmoidalprocesse des muschelförmigen Knochens und des Stirnknochens. — sinus, s. Ethmoidalzellen. — venae, s. Ethmoidalvenen.

Ethmoidalfläche des Orbitalprocesses des Gaumenknochens, (Ethmoidalis superficies processus orbitalis ossis palatini<sup>1</sup>), Siebfläche<sup>2</sup>, oder Innere vordere Fläche<sup>3</sup> des Orbitalprocesses des Gaumenknochens, (Superficies processus orbitalis ossis palatini anterior<sup>4</sup>), die an dem Orbitalprocess des Gaumenknochens nach innen und vorn befindliche, zuweilen

1) 2) Pöder's anat. Handb. 1. B. S. 118. 3) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 324. 4) Pöder's anat. Handb. a. a. O.

stark ausgehöhlte Fläche, welche gegen die hintern Zellen des Ethmoidalknochens gerichtet ist, und diese im letztern Falle nicht nur verschließt, sondern auch vergrößert. S. Gaumenknochen.

*Ethmoidalia foramina*, s. Ethmoidallöcher. — *opercula*, s. Ethmoidaldeckel.

*Ethmoidalincisur des Stirnknochens*, (*Ethmoidalis incisura*<sup>1</sup>, *Ethmoidea incisura*<sup>2</sup>,) Siebbeinsauschnitt<sup>3</sup>, Siebbeinnasenauschnitt, Lücke für das Siebchen des Riechbeins<sup>4</sup>, Einschnitt am Siebbein<sup>5</sup>, Riechbeinauschnitt<sup>6</sup>, der längliche, rauhe Auschnitt in dem Nasenproceß des Stirnknochens, welcher die Siebplatte des Ethmoidalknochens aufnimmt und sich mit den Seitentheilen dieses Knochens verbindet. S. Stirnknochen.

1) Pöder's anat. Handb. 1. B. S. 34. 2) Sommering's Knochenl. S. 95. 3) Meier's Besch. d. menschl. K. 1. B. S. 350. 4) Sommering's Knochenl. a. a. O. 5) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1753, 1. B. S. 67. 6) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 566.

*Ethmoidalis nervus*, s. Ethmoidalnerv. — *processus ossis sphenoidaei*, s. Eribröse Spina des Sphenoidalknochens. — *sulcus ossis sphenoidaei*, s. Eribröse Incisur des Sphenoidalknochens. — *superficies processus orbitalis ossis palatini*, s. Ethmoidalfläche des Orbitalprocesses des Gaumenknochens.

*Ethmoidalknochen*, (*Ethmoidale*<sup>1</sup>, s. *Ethmoideum*<sup>2</sup>, s. *Ethmoides*<sup>3</sup> os,) Riechbein<sup>4</sup>, Siebbein<sup>5</sup>, Siebknochen, (*Os cribrosum*<sup>6</sup>, s. *cribriforme*<sup>7</sup>, s. *spongoides*<sup>8</sup>, s. *spongiosum*<sup>9</sup>, s. *spongiforme*<sup>10</sup>, s. *foraminulentum*, *Colum*, *Os colatorii*, *Cribrum*, *Colatorium*<sup>11</sup>, *Os isthmoides*<sup>12</sup>, s. *cavernosum*<sup>13</sup>, s. *cristatum*, *Ethmos*<sup>14</sup>,) wird, ob er gleich nur den kleinsten Theil vom Grunde der Schädelhöhle bildet, zu den Knochen der Hirnschale gerechnet. Am meisten trägt er zur Bildung der Nasenhöhle, und etwas zur Bildung der Augenhöhle bei.

Man unterscheidet an dem Knochen die Siebplatte, die perpendiculäre Platte und die Seitentheile oder Labyrinth.

1) Die Siebplatte, (*Lamina cribrosa*,) ist das in der Schädelhöhle befindliche Stück des Knochens, und macht die Scheidewand zwischen der Schädelhöhle und Nasenhöhle aus. Bei dem Menschen liegt sie horizontal, bei den meisten Thieren vertical oder perpendicular. Sie hat die Form eines länglichen Vierecks; der hintere Rand grenzt an den Körper des Keilbeins, und die übrigen Ränder sind in

- 1) nach der Analogie wie sphenoidale os gebildet, (the ethmoidal bone der Engl. Wörter,) sonst weniger gebräuchlich als das folgende Wort. 2) 3) nach dem Griechischen Worte *ἠθμοειδές*, siebdrmtg, gebildet. (Galenus de usu part. 1. 9. c. 3.) 4) S. Riolani anthropogr. Par. 1626, p. 712 et 791. 5) nach Sommering (Knochenl. S. 154). 6) Walter's Abh. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 111. 7) C. Bauhini theatr. an. 1. 1. c. 7. 8) entsprechend dem Griechischen Worte *σπγγωειδές* nach Hippokrates, vgl. Galenus de usu part. 1. 8. c. 7. 9) 10) Bauhini theatr. anat. 1. c. 11) Vgl. dieß Wort. Blumenbach's Gesch. u. Besch. d. Knoch. S. 67. 12) Vgl. dieß Wort. S. Veslingii synt. anat. c. comm. Blasii c. 15. mot. ad os ethm. 13) in Uebersetzung des Wortes *σπγγωειδές* nach Galen a. a. O. 14) in wörtlicher Uebersetzung des Wortes *ἠθμος*, Sieb, wovon der Knochen seine Bezeichnung erhalten hat.



Am Ethmoidalauschnitt des Stirnknochens eingefügt, so daß jeder Seitenrand an den Orbitaltheil des Stirnknochens seiner Seite grenzt. Oben und vorn erhebt sich aus der Siebplatte der Hahnenkamm, (Crista galli,) ein zur Anlage des Siebelfortsatzes der harten Hirnhaut bestimmter, hohler rundlicher Fortsatz mit einem ziemlich scharfen, nach hinten verstreichenden Rand, der sich vorwärts in zwei kleine Seitenfortsätze, die Flügelfortsätze, (Processus alares,) spaltet, die zur Anfügung an den Nasenfortsatz des Stirnknochens bestimmt sind. Zwischen beiden Flügelfortsätzen ist eine senkrechte Furche sichtbar, welche einer ähnlichen am Stirnknochen entspricht und das sogenannte blinde Loch, (Foramen coecum,) bilden hilft, das eigentlich ein trichterförmiger, zur Aufnahme einer Vene bestimmter Canal ist. An jeder Seite befinden sich neben dem Hahnenkamm zwei Reihen von Löchern. Diese Sieblöcher, (Foramina cribrosa,) sind eigentlich auch kurze trichterförmige Canälchen; die inneren, - weitem, leiten Zweige des Geruchsnerven zur Schleimhaut an der Scheidewand der Nase; die äußeren, engern, führen Zweige des Geruchsnerven zu den Nasenmuscheln hin; die vordern und mittleren dieser Canälchen sind oft drei bis vier Linien lang. Außer diesen in Reihen gestellten Canälchen sind noch unregelmäßige Löcher zum Durchgang von Gefäßen vorhanden, und an jeder Seite sieht man ein längeres, schief von vorn nach hinten und außen, gegen die Papierplatte herablaufendes Canälchen, in welchem der Ethmoidalzweig vom ersten Ast des fünften Nervenpaares liegt, der dann durch ein eigenes Loch der Siebplatte sich in die Nase herabsenkt.

2) Die Perpendicularplatte, senkrechte Platte, (Lamina perpendicularis,) senkt sich in der Mitte, von der untern Wand der Siebplatte, in derselben Richtung abwärts, in welcher sich an der obern Wand der Hahnenkamm erhebt. Sie ist oben und hinten am dünnsten, vorwärts aber dicker, und hier senkt sie sich auch weiter herab als hinten; sie macht den obersten Theil der Nasenscheidewand aus, und hat einen kurzen und dicken, schief nach vorn herablaufenden obern Rand, auf welchem die Nasenknochen ruhen, einen vordern schief nach hinten herablaufenden Rand zur Anfügung des knorpeligen Theils der Nasenscheidewand, und einen untern scharfen zur Verbindung mit dem Vflugschar, (Vomer,) bestimmten Rand. Oben und hinten, wo die senkrechte Platte am dünnsten ist, spaltet sie sich in zwei dünne Knochenfortsätze, die Keilbeinhörner, Zuten, (Cornua sphenoidalia, Ossicula Bertini.) Jedes dieser Knochenplättchen bildet ein sphärisches Dreieck, dessen scharfe Spitze nach hinten frei hervorsticht, die hintere Wand ist ausgehöhlt, die vordere gewölbt und in der Mitte jedes Keilbeinhorns befindet sich ein kreisrundes Loch, als der Ausgang der Keilbeinhöhle, (Sinus sphenoidalis.) Denn es machen diese Fortsätze der Perpendicularplatte, welche Bertin für abgesonderte Knochen hielt, die vordern Wände der Keilbeinhöhle aus, indem sie sich mit ihren Rändern dicht an den Körper des Keilbeins, und oben an die Nasenplatte des Siebbeins anlegen, ja oft so genau mit dem Keilbein verschmelzen, daß sie ohne Verletzung nicht getrennt werden können.

3) Die Seitentheile, Labyrinth, gehen zu beiden Sei-

ten, neben der senkrechten Platte von der Siebplatte herab und sind aus der Papier- oder Augenhöhlenplatte, aus der Nasenplatte und aus den, zwischen beiden befindlichen Siebbeinzellen zusammengesetzt. Die Augenhöhlenplatte, (*Lamina papyracea*,) macht den äußern Umfang des ganzen Knochens, und den größten Theil der innern Wand der Augenhöhle aus; sie ist der Nasenplatte und senkrechten Platte parallel und vierseitig, so daß sie von vier Rändern umschrieben wird. Der obere Rand ist mit dem Orbitaltheil des Stirnknochens verbunden, und hat einen oder zwei, bisweilen auch mehrere Einschnitte, welche ähnlichen des Stirnknochens entsprechen und mit ihnen verbunden, die Ethmoidallöcher, (*Foramina ethmoidalia*,) bilden. Zuweilen sind diese Löcher ausschließlich von dem Ethmoidalknochen, oder von dem Stirnknochen gebildet; genau genommen sind sie aber kurze Canälchen, von denen das vordere längere, schief zur Schädelhöhle aufsteigt, um den Ethmoidalnerven vom ersten Ast des fünften Nervenpaares dahin zu leiten, welcher von einem Zweig der Augenarterie begleitet ist. Das hintere Canälchen ist aber kürzer und führt Arterien und Venen von der Augenhöhle in die Nasenhöhle über. Der untere Rand fügt sich an den Orbitalfortsatz des Oberkiefers, der vordere Rand an das Thränenbein und der hintere Rand an das Gaumenbein und Keilbein. Die äußere, in der Augenhöhle befindliche Fläche der Papierplatte ist glatt und eben, die innere Fläche aber an die Scheidewände der Siebbeinzellen befestigt und daher uneben. — Die Nasenplatte senkt sich vorn zwischen der Papierplatte und der senkrechten Platte, mit beiden parallel laufend, von der Siebplatte herab; von hinten an bis zu dem vordern Drittheil ist sie aber durch einen horizontalen Einschnitt getrennt und also in ein oberes und unteres Stück geschieden. Das obere Stück rollt sich nach außen um und wird zur obern Nasenmuschel; das untere Stück bildet auf ähnliche Weise die mittlere Nasenmuschel. In seltneren Fällen gehen auch wohl zwei parallele Einschnitte durch die Nasenplatte und dann sind also auch drei Nasenmuscheln an dem Siebbein vorhanden, von denen die obere sehr klein ist und mit dem Rahmen Santorinische Muschel, (*Concha Santoriniana*,) belegt wird. Jede Nasenmuschel hat eine innere gewölbte, und eine äußere ausgehöhlte Fläche, einen stumpfen Rand und ein nach hinten hervorstehendes Ende. Die ganze Nasenplatte und vorzüglich die Theile derselben, welche die Nasenmuscheln ausmachen, sind sehr porös, zeigen flache Vertiefungen, Furchen und Löcher von verschiedener Weite zur Aufnahme der Schleimdrüsen, Gefäße und Nerven der Riechhaut. Den Raum, unterhalb jeder Nasenmuschel nennt man Nasengang, (*Meatus narium*,) In der Gegend, wo der untere Rand der mittlern Nasenmuschel vorn aufhört, verlängert sich die Nasenplatte noch in das, schief nach hinten sich herabsenkende Hakenplättchen, (*Processus uncinatus*,) welches sehr dünn und zerbrechlich ist, einen Theil der innern Wand der Kieferhöhle, (*Sinus maxillaris*,) ausmacht, vorn an das Thränenbein, und unten an die untere Nasenmuschel grenzt.

Die Siebbeinzellen, (*Cellulae ethmoidales*,) werden durch



mehrere meist senkrechte unregelmäßige Blättchen hervorgebracht, durch welche der Raum zwischen der Nasenplatte und der Papierplatte in vier Theile getheilt wird, von denen meistens eins mit dem andern Gemeinschaft hat. Man theilt die sämtlichen Zellen in vordere, mittlere und hintere. Die letztern, welche auch Gaumenbeinzellen, (Cellulae palatinae,) genannt werden, haben mit dem obern Nasengange Gemeinschaft, die mittlern, oder Stirnbeinzellen, (Cellulae frontales,) haben mit den vordern, oder Augenhöhsenzellen, (Cellulae orbitariae, s. lacrymales,) ihren Ausgang zum mittlern Nasengang. Oben werden die Siebbeinzellen durch die Orbitalplatten des Stirnknochens, unten durch die Orbitalwand des Oberkiefers, vorn durch den Thränenknochen, hinten durch den Orbitalfortsatz des Gaumenknochens und die Keilbeinhörner verschlossen.

(Erst im fünften Monat beginnt die Bildung des Ethmoidalknochens mit dem Seitentheilen, zwischen deren Platten noch keine Siebbeinzellen vorhanden sind. Der mittlere Theil verknöchert erst nach der Geburt und verhältnißmäßig breiter als beim Erwachsenen. (Rosenmüller.)

**Ethmoidallöcher**, (Ethmoidalia<sup>1</sup>, s. Ethmoidea<sup>2</sup> foramina,) Siebbeinlöcher<sup>3</sup>, Innere Augenhöhlenlöcher<sup>4</sup>, (Foramina orbitalia interiora<sup>5</sup>, s. orbitaria<sup>6</sup>, s. orbitaria interna<sup>7</sup>, nasi<sup>8</sup>), die an der innern oder Nasenwand der Augenhöhle befindlichen, bald von dem Stirnknochen allein, bald von dem Ethmoidalknochen mit, oder auch allein gebildeten größern oder kleinern zwei bis fünf Löcher, durch welche Gefäße und Nerven in die Nase bringen, deren dann wieder ein vorderes<sup>9</sup>, auch inneres oder vorderes Augenbraunloch<sup>10</sup>, und hinteres<sup>11</sup>, auch wohl ein mittleres<sup>12</sup>, (For. anterius<sup>13</sup>, s. orbitale internum, anterius<sup>14</sup>, For. posterius<sup>15</sup> medium<sup>16</sup>), unterschieden werden. S. Stirnknochen, auch Ethmoidalknochen.

- 1) Pöder's anat. Handb. 1. B. S. 32. 2) Schmerring's Knochenl. S. 95. 3) Mayer's Besch. d. menschl. K. 1. B. S. 347. 4) 5) Schmerring's Knochenl. a. a. D. 6) 7) Walter's Abh. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 117 u. 130. 8) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. 9) Walter's Abh. u. f. w. a. a. D. 10) Meunier's Zergliederungskf. Uebers. Leipz. 1782, 1. B. S. 49. 11) — 13) Walter's Abh. u. f. w. a. a. D. S. 117. 14) Meunier's Zergliederungskf. u. f. w. a. a. D. 15) 16) Walter's Abh. u. f. w. a. a. D.

**Ethmoidalnerv**, (Ethmoidalis nervus<sup>1</sup>), Riechbein- oder Siebbeinnerv<sup>2</sup>, der eine der beiden Äste, in welche sich der erste Hauptast des fünften Gehirnnerven kommende Nasalnerv theilt, der durch das vordere Ethmoidalloch in die Nasenhöhle tritt, im Fall aber, daß auch ein hinteres, oder nebst diesem auch noch ein mittleres Ethmoidalloch da ist, auch einen hintern oder auch mittlern Ast abgibt, welche durch diese Oeffnungen gleichfalls zur Nase gelangen, wo dann dieser Nerv auch zum Unterschied den Namen vorderer oder größerer Siebbeinnerv<sup>3</sup>, (Nervus ethmoidalis anterior, s. major,) bekommt. S. unter Gehirnnerven, fünfter Nerv.

- 1) — 3) Mayer's Besch. d. menschl. K. 7. B. S. 113 u. 114.

**Ethmoidalprocesse des muschelförmigen Knochens**, (Ethmoidalprocessus d. muschelf. Knoch.) Anat. physiol. Realw. II. B.

moidales processus conchae inferioris<sup>1)</sup>, Siebbeinsfortsätze<sup>2)</sup>, Riechbeinsfortsätze<sup>3)</sup>, die an dem obern Rande jedes muschelförmigen Knochens zwischen dem Nasal- und Maxillarproceß desselben, auch wohl nur über dem letztern hervorragenden, dünnen, an Zahl und Gestalt unbestimmten Knochenspitzen, welche sich nach oben mit dem Ethmoidalknochen, gewöhnlich mit dem Hamulus des Labyrinths, verbinden. S. Muschelförmige Knochen.

- 1) 2) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 36. 3) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 607.

**Ethmoidalprocesse des Stirnknochens**, (Ethmoidales processus<sup>1)</sup>, Siebbeinsfortsätze<sup>2)</sup>, zwei schmale Knochenblättchen am innern Rande des Orbitalstücks des Stirnknochens, deren innere Ränder in Verbindung mit den Seitentheilen des Ethmoidalknochens stehen und die Siebplatte desselben einschließen, auch dessen Zellen der Seitentheile vergrößern helfen. S. Stirnknochen.

- 1) 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. 1. B. S. 172.

**Ethmoidalvenen**, (Ethmoidales<sup>1)</sup>, s. Ethmoideae<sup>2)</sup> venae<sup>3)</sup>, Nasenhöhlvenen<sup>4)</sup>, Riechbein- oder Siebbeinsvenen<sup>5)</sup>, oder Blutadern, Venen, welche Blut von der Schleimhaut der Nase durch die Ethmoidallöcher zur ophthalmischen Vene führen, von denen man ebenfalls, wie bei den Ethmoidalarterien, eine vordere<sup>6)</sup> und hintere<sup>7)</sup>, (anterior<sup>7)</sup> et posterior<sup>8)</sup>, unterscheidet. S. Augenvenen.

- 1) 2) Schimmering's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2660. 2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 4. B. S. 2660. 3) Schimmering's

Gefäßl. S. 245. 4) — 6) Loder's anat. Tafeln, Taf. 122. Fig. 2. Nr. 24 u. Fig. 1. Nr. 39. 7) 8) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D.

**Ethmoidalzellen**, (Ethmoidales<sup>1)</sup>, s. Ethmoideae cellulae<sup>2)</sup>, Riechbeinzellen<sup>3)</sup>, Zellen<sup>4)</sup>, oder Höhlen<sup>5)</sup>, oder Fächer<sup>6)</sup> des Siebbeins, (Cellulae<sup>7)</sup>, s. Cavitates<sup>8)</sup>, s. Sinuli<sup>9)</sup> ossis ethmoidei, Cavernulae, s. Sinus<sup>10)</sup> ethmoidales,) die in den Seitentheilen des Ethmoidalknochens befindlichen, durch feine Knochenplättchen gebildeten, an Zahl und Gestalt unbeständigen Zellen, die den größten Theil des Labyrinths ausmachen, und vor welchen sich a) die vordern<sup>11)</sup>, (anteriores<sup>12)</sup>, Trichterförmige Zellen<sup>13)</sup>, (Cellulae infundibuliformes<sup>14)</sup>,) untere Augenhöhlen<sup>15)</sup> und Stirnfächer<sup>16)</sup>, Augenhöhlen<sup>17)</sup> und Stirnbeinzellen<sup>18)</sup>, (Cellulae orbitariae<sup>19)</sup>, s. lacrymales<sup>20)</sup> et frontales<sup>21)</sup>, Cellulae frontales<sup>22)</sup> et orbitariae<sup>23)</sup>,) letztere auch als mittlere<sup>24)</sup> unterschieden, zum Theil mit den Höhlen des Stirnknochens in Verbindung stehend, in den mittlern Nasengang öffnen, nach außen vor dem Nasalproceß des Oberkiefers und dem Thränenknochen, nach oben aber durch den innern Rand des Orbitalprocesses des Stirnknochens bedeckt werden; dagegen sich b) die hintern<sup>25)</sup>, (posteriores<sup>26)</sup>,)

- 1) Loder's anat. Handb. 1. B. S. 82. 2) Blumenbach's Gesch. u. Besch. d. Knoch. S. 75. 3) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 572. 4) Walter's Abh. v. trock. Knoch. 2. Aufl. S. 116. 5) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 188. 6) Mayer's Besch. d. menschl. K. 1. B. S. 322. 7) 8) Verheyen c. h. anat. 11. S. c. 5. 9) Heisteri comp. an. ed. 2. S. 72. 10) Blumenbach's Gesch. u. f. w. a. a. D. 11) 12) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. S. 324. 13) 14) Loder's anat. Handb. a. a. D. 15) 16) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. 17) — 26) Meckel's Handb. u. f. w. a. a. D.



um beinzellen<sup>27</sup>, (Cellulae palatinae<sup>29</sup>), abgesondert von je-  
n., in den obern Nasengang öffnen, nach oben von dem Orbital-  
proceß des Stirnknochens, nach unten aber vom Orbitalproceß des  
Maxillarknochens oder vom Körper des Sphenoidalknochens verschlos-  
sen werden. S. Ethmoidalknochen.

27) 28) S. Note 17.

*Ethmoidea arteria anterior et posterior*, s. Ethmoidalarterie.  
— *foramina*, s. Ethmoidallöcher. — *incisura*, s. Ethmoidalincisur des Stirnknochens.  
— *vena anterior et posterior*, s. Ethmoidalvenen.

*Ethmoideae arteriae*, s. Ethmoidalarterien. — *cellulae*, s.  
Ethmoidalzellen. — *venae*, s. Ethmoidalvenen.

*Ethmoideum foramen anterius medium, posterius*, s. Eth-  
moidallöcher. — *os*, s. Ethmoidalknochen. — *septum*, s. Perpen-  
dicularplatte des Ethmoidalknochens.

*Ethmos*, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wort-  
es<sup>1</sup>, s. Ethmoidalknochen.

1) *ἔθμος*, ein Stieb.

*Ethos*, beßgl.<sup>1</sup>, s. Gewohnheit, auch Sitte.

1) *ἔθος*, (*ἔθισμος*), consuetudo; *ἦθος*, mos.

*Etron*, beßgl.<sup>1</sup>, s. Hypogastrium.

1) *ἔτρον*.

*Euboastrychos*, beßgl.<sup>1</sup>, s. Lockenkopf.

1) *εὐβοαστρυχος*, cincinnatus.

*Eucheria*, beßgl.<sup>1</sup>, s. Geschicklichkeit.

1) *εὐχερεία*, *εὐχειρία*. *Εὐχεΐρ*, *εὐχεΐς*, geschickt.

*Euchroea*, beßgl.<sup>1</sup>, gute Haut- und Gesichtsfarbe, als ein Zei-  
chen des Wohlfeyns. S. Röthe der Haut.

1) *εὐχροία*; *Εὐχροος*. (Hipp. aph. l. 5. aph. 42,) ein Mensch von guter Ge-  
sichtsfarbe, dessen Gegensatz: *δυσχροος*.

*Euchylia*, *Euchymia*, beßgl.<sup>1</sup>, Güte der Säfte im Körper.  
Bgl. Gesundheit.

1) *εὐχυλία*, *εὐχυμία*, (Galen de simpl. fac. l. 2. c. 13,) auch *Εὐχυ-  
λος*, *Εὐχυμος*, mit guten Säften versehen.

*Eucnemios*, beßgl.<sup>1</sup>, ein Mensch, mit guten schönen Waden. S.  
Waden.

1) *εὐκνήμιος*, *εὐκνήμις*.

*Eucolia*, beßgl.<sup>1</sup>, s. Humanität.

1) *ευκολία*, eigentlich der Charakter des Weisen nach der Lehre der Stoiker. *Ευ-  
κολος*, ein zustehender, umgünstlicher Mensch.

*Eucosmia*, beßgl.<sup>1</sup>, s. Sittsamkeit.

1) *ευκοσμία*.

*Eucrasia*, beßgl.<sup>1</sup>, ein gutes Temperament. S. Tempera-  
ment.

1) *ευκρασία*, (Galen de san. tuend. l. 1. c. 5.) *Ευκρατος*, mit einem  
solchen Temperament versehen; dessen Gegensatz: *δυσκρατος*, (Galen de  
temper. l. 2. c. 1.)

*Eudactylos*, beßgl.<sup>1</sup>, eine Person mit schönen Fingern.

1) *ευδακτυλος*.

*Eudiapneustos*, beßgl.<sup>1</sup>, ein Mensch, dessen Transpiration wohl  
im Statten geht. Bgl. Transpiration.

1) *ευδιαπνευστος*, leicht verdampfbar. Bgl. Gorraei def. med. h. v.

*Eudysopetos*, beßgl. <sup>1</sup>, leicht zum Erröthen und in Verlegenheit zu bringen. Vgl. Schamhaft.

<sup>1</sup>) εὐδυσωπητος.

*Eugeos*, *Eugion*, *Engium*, beßgl. <sup>1</sup>, f. Uterus, ingl. Hy-men.

<sup>1</sup>) ευγειος, eigentlich fruchtbar.

*Euglenos*, beßgl. <sup>1</sup>, mit guten, schönen Pupillen, und überhaupt Augen versehen. Vgl. Augen.

<sup>1</sup>) ευγληνος.

*Englossia*, beßgl. <sup>1</sup>, Vermögen, gut zu sprechen, auch Beredsamkeit. Vgl. Sprache.

<sup>1</sup>) ευγλωσσία, ευγλωττία. Ευγλωστος, ευγλωττος, mit einer guten Zunge versehen, redselig.

*Eugonia*, beßgl. <sup>1</sup>, f. Fruchtbarkeit.

<sup>1</sup>) ευγονία. Ευγονος, fruchtbar.

*Eune*, beßgl. <sup>1</sup>, eigentlich das Kuhelager, uneigentlich auch i. q. Coitus. Vgl. Begattung.

<sup>1</sup>) ευνη. Hippocr. de morb. mat. 1. 2. c. 61.

*Eunuch*, (*Eunuchus*,) beßgl. <sup>1</sup>, ein durch Entmannung seiner wesentlichen Zeugungstheile entrathender, in allgemeinerem Sinne aber überhaupt wegen angeborenen Mangels, oder zufällig durch Unglücksfall, oder gestilltlich, insbesondere um der Eifersucht keinen Verdacht zurückzulassen erlittenen Verlust der Hoden, oder auch des Zeugungsgliedes, zur Zeugung unfähiger Mann. S. Castrat, auch Impotenz. Vgl. auch Spado.

<sup>1</sup>) ευνουχος, nach der gewöhnlichen Herleitung von ευνη, cubile, und εχω, custodio, wegen der gewöhnlichen Bestimmung der Eunuchen im Oriente; nach Scaliger's (exerc. 277. s. 3.) Erklärung aber von ευ νουν εχην, indem die Ausübung dessen, wozu die Eunuchen unvermögend sind, von den Allen häufig als amentia, (ανωια,) bezeichnet wird. In diesem Sinne sagt auch Clemens Alexandr. (paedagog. 1. 3. c. 4.) „Eunuchus verus est, non qui non potest, sed qui non vult dare voluptati operam.“

*Eunuchismus*, beßgl. <sup>1</sup>, i. q. Castratio.

<sup>1</sup>) ευνουχισμος.

*Eunuchus*, f. Eunuch.

*Eupathia*, beßgl. <sup>1</sup>, eine Körperconstitution, die leicht Affectionen unterworfen ist, aber auch eine solche, die leicht Leiden erträgt. Vgl. Affection.

<sup>1</sup>) ευπαθεια, ευπαθια, auch Wohlleben; der Gegensatz: dyspathia. Ευπαθης, ein verletzbarer, empfänglicher Mensch.

*Eupepsia*, beßgl. <sup>1</sup>, gute Verdauung. S. Verdauung.

<sup>1</sup>) ευπεψια.

*Euphonia*, (*Euphonia*,) beßgl. <sup>1</sup>, eine gute und liebliche Stimme, überhaupt auch Wohlklang. Vgl. Stimme.

<sup>1</sup>) ευφωνία. Ευφωνος, wohlklingend.

*Euphoria*, beßgl. <sup>1</sup>, das Wohlbefinden. Vgl. Gesundheit.

<sup>1</sup>) ευφορία, eigentlich leichtglüht, etwas zu tragen oder zu ertragen, und in so fern übereinstimmend mit ευπαθια.

*Euphrasia*, *Euphrosine*, beßgl. <sup>1</sup>, f. Frohsinn.

<sup>1</sup>) ευφρασία, ευφροσύνη. Ευφρων, ein verständlicher, heiterer Mensch.

*Euphyia*, beßgl. <sup>1</sup>, überhaupt eine gute Natur und glückliche Anlage. Vgl. Gesundheit.

<sup>1</sup>) ευφύια. (Galen de usu part. 1. 1. c. 9.) Ευφυης, von guter Anlage und Art.



**Eupleuros**, beßgl. <sup>1</sup>, ein Mensch mit starken Seiten oder Rippen. S. Stämmig.

1) ευπλευρος.

**Euplocamis**, beßgl. <sup>1</sup>, f. Lockenkopf.

1) ευπλοκαμης.

**Eupnoestia**, **Eupnoea**, beßgl. <sup>1</sup>, ein leichtes freies Athemholen. Respiration.

1) ευπνεστια, ευπνοια. Der Gegensatz: δυσπνοια. Ευπνευστος, ευπνοος, leicht athmend.

**Eupodia**, beßgl. <sup>1</sup>, f. Leichtfüßigkeit.

1) ευποδια, Güte der Füße überhaupt. Ευπους, gut von Füßen.

**Eupogon**, beßgl. <sup>1</sup>, ein Mensch mit einem starken schönen Bart. Vgl. Bart.

1) ευπωγων.

**Euprosopia**, beßgl. <sup>1</sup>, schöne Gesichtsbildung. Vgl. Gesicht.

1) ευπροσωπια.

**Euprosopos**, beßgl. <sup>1</sup>, ein Mensch von schöner Gesichtsbildung. Vgl. Gesicht.

1) ευπροσωπος.

**Eupsychia**, beßgl. <sup>1</sup>, guter froher Muth. Vgl. Muth, auch hochsinn.

1) ευψυχια. Ευψυχος, hochgesinnt.

**Eupygos**, beßgl. <sup>1</sup>, mit guten oder schönen Hinterbacken versehen. Vgl. Hinterbacken.

1) ευπυγος.

**Eurostia**, beßgl. <sup>1</sup>, Stärke des Körpers. Vgl. Gesundheit.

1) ευρωστια.

**Eurostos**, beßgl. <sup>1</sup>, f. Gesund.

1) ευρωστος.

**Eurycarenos**, beßgl. <sup>1</sup>, ein Mensch mit breitem Kopf. Vgl. Kopf.

1) ευρυκαρηνος.

**Eurychoria**, beßgl. <sup>1</sup>, f. Capacität.

1) ευρυχωρια, eigentlich ein breiter weiter Plog. (C. Hofmanni comm. ad Galeni de usu part. l. n. 1167)

**Eurygenios**, beßgl. <sup>1</sup>, ein Mensch mit breitem Kinn und starkem Bart. Vgl. Bart.

1) ευρυγενιος.

**Eurymetopos**, beßgl. <sup>1</sup>, ein Mensch mit einer breiten Stirn. Vgl. Stirn.

1) ευρυμετωπος.

**Eurynotos**, beßgl. <sup>1</sup>, ein Mensch mit einem breiten Rücken. Vgl. Rücken.

1) ευρυνωτος.

**Euryphonia**, beßgl. <sup>1</sup>, die laute, deutliche Aussprache. Vgl. Sprache.

1) ευρυφωνια. Ευρυφωνος, ein Mensch mit einer starken deutlichen Stimme.

**Eurysternos**, **Euristethes**, beßgl. <sup>1</sup>, ein Mensch mit einer breiten Brust. S. Stämmig.

1) ευρυστερνος, ευρυστηθης.

**Eurystomia**, beßgl. <sup>1</sup>, weite Mundöffnung, vorzüglich beim deutlichen Sprechen. Vgl. Mund.

1) ευρυστομια. Ευρυστομος, ein Mensch mit weitem Munde.

**Eurythmie**, (*Eurythmia*,) beßgl.<sup>1</sup>, Gleichmäßigkeit des Zeitmaßes, überhaupt Uebereinstimmung. Vgl. Harmonie, auch Symmetrie.

<sup>1</sup>) *εὐρυθμία*.

*Eurythmus pulsus*, s. Rhythmus des Pulschlags.

**Eusarcos**, *Eusarcosis*, beßgl.<sup>1</sup>, s. Wohlbeleibt, Wohlbeleibtheit.

<sup>1</sup>) *εὐσαρκος*. (Hipp. aph. I. 4. aph. 7.) *εὐσαρκωσις*, auch *εὐσαρκία*.

*Eusceles*, beßgl.<sup>1</sup>, s. Leichtfüßig.

<sup>1</sup>) *εὐσκελής*.

*Euschemosyne*, beßgl.<sup>1</sup>, i. q. Décor. Vgl. Anständigkeit.

<sup>1</sup>) *εὐσχήμεσυνη*. *Εὐσχημος*, *εὐσχημῶν*, ein Mensch, der Anstand beobachtet.

*Eusebia*, beßgl.<sup>1</sup>, s. Religion.

<sup>1</sup>) *εὐσεβεία*.

*Eusitia*, beßgl.<sup>1</sup>, guter Appetit. Vgl. Hunger.

<sup>1</sup>) *εὐσιτία*.

**Eusitos**, beßgl.<sup>1</sup>, mit guter Verdauungskraft versehen. Vgl. Verdauung.

<sup>1</sup>) *εὐσιτος*. (Foesii oec. Hipp. h. v.)

**Eusomatia**, beßgl.<sup>1</sup>, gute Körperconstitution. Vgl. Gesundheit.

<sup>1</sup>) *εὐσωματία*.

**Eusomatos**, beßgl.<sup>1</sup>, ein Mensch von guter kräftiger Körperconstitution. Vgl. Gesund.

<sup>1</sup>) *εὐσωματος*.

**Eusphyctos**, beßgl.<sup>1</sup>, eine Person mit schönen Knöcheln, oder überhaupt Füßen. Vgl. Füße.

<sup>1</sup>) *εὐσφυκτος*.

**Eusplanchnia**, beßgl.<sup>1</sup>, s. Muth.

<sup>1</sup>) *εὐσπλαγχνία*.

**Eusplanchnios**, beßgl.<sup>1</sup>, mit guten Eingeweiden versehen, auch muthig. S. Gesund.

<sup>1</sup>) *εὐσπλαγχνος*. (Hippocr. prorrh. I. 2. c. 11.)

**Eustachiana tuba**, s. Eustachische Röhre. — *valvula*, s. Eustachische Klappe.

**Eustachianus musculus**, s. Tensor des Tympanums.

**Eustachische Klappe**<sup>1</sup>, (*Eustachiana*<sup>2</sup>, s. *Eustachii*<sup>3</sup> *valvula*,) Klappe des Eustachs<sup>4</sup>, oder der untern Hohlvene<sup>5</sup>, (*Valvula falcata*, s. *semilunaris*<sup>6</sup>, s. *nobilis*<sup>7</sup> *cordis*, *Valvula magna auriculæ anterioris*<sup>8</sup> *cordis*, *Valvula peculiaris venae cavæ inferioris*<sup>9</sup>, *Membrana reticularis in au-*

<sup>1</sup>) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1860. <sup>2</sup>) J. F. Crell

diss. de valvula venae cavæ Eustachiana, Viteb. 1774, 4. <sup>3</sup>) nach

Eustach, (vgl. Realwörterb. I. B. S. 200.) so benennt, der ihrer (libell.

de vena pari Antig. 11. in opusc. p. 289, vgl. auch dessen Tab. anat. 8.

f. 6 u. T. 16. f. 3.) zuerst gedenkt. J. G. Brendel de valvula Eu-

stachii diss. Goett. 1738, (rec. in opusc. I. p. 71 und in Halleri

coll. II. p. 171.) <sup>4</sup>) Haller's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v. Le-

elling, I. Th. S. 172. <sup>5</sup>) Gommerring's Gefäßl. S. 15. <sup>6</sup>)

L'ancisi's de motu cord. etc. Rom. 1728, p. 119. <sup>7</sup>) nach Guiffart

(lettre touchant la connoissance du chyle etc. ensemble la découverte de

la noble valvule etc. Rouen 1656, 4.) S. Th. Bartholini spicil.

II. de vas. lymph. c. 8. <sup>8</sup>) J. F. Lobstein (et J. M. Diebold)

diss. de valvula Eustachii, Argent. 1771, 4. p. 2. <sup>9</sup>) Halleri

de valvula Eustachii diss. Goett. 1734, 4, rec. in operib. min. T. I.

p. 25.



palae orificio apposita <sup>10</sup>), eine durch Duplicatur der innern Haut der untern Hohlader in ihrem Eintritt in das rechte Herzatrium bildende Falte, deren unterer gebogener Rand nach der Hohlader, obere hohle Rand aber nach der Höhle des Herzens zu gekehrt ist, die vorzüglich ausgebildet sich im Embryo zeigt, wo sie die Verbindung zu haben scheint, das Blut aus der untern Hohlader zum rechten Loch zu leiten, indem sie, einem Damm gleich, es von dem rechten Ostium des vordern Herzatriums abhält. S. Herz.

<sup>10</sup>) Vgl. G. Bauhini theatr. an. l. 2. c. 22. S. auch Halleri el. physiol. T. I. l. 4. s. 2. §. 15.

**Eustachische Röhre** <sup>1</sup> oder Trompete <sup>2</sup>, oder Tuba, (Eustachiana Tuba <sup>3</sup>, s. Eustachii Canalis <sup>4</sup>, s. Ductus <sup>5</sup>, s. Tympanica <sup>6</sup>), Trompete des Eustachius <sup>7</sup>, Gaumengang <sup>8</sup>, oder Nasengang <sup>9</sup> des Ohrs, Trompete <sup>10</sup>, Ohrtrompete <sup>11</sup>, Tuba <sup>12</sup>, Tuba acustica <sup>13</sup>, Aquaeductus Fallopii <sup>14</sup>, s. Eustachii <sup>15</sup>, Ductus palatinus auris <sup>16</sup>), der vorwärts und rückwärts aus dem Tympanum abgehende, theils knöcherne, theils knorpliche und häutige Canal, so weit er knöchern ist, seine Lage an der äußern Seite des carotischen Canals des Schläfenochns hat, etwas über der Hälfte der Pyramide dieses Knochns knöchern zu seyn aufhört, und von da an als eine knorpliche Verlängerung seinen Fortgang nimmt, zuletzt aber mit einer weiten Mündung oder einem Wulst <sup>17</sup>, Musculus tubae <sup>18</sup>, Annulus membranaceus <sup>19</sup>), auf jeder Seite an der hintern Nasenöffnung sich endigt, und hauptsächlich dazu zu dienen scheint, daß durch ihn so viel Luft in das Tympanum gelangt, als zum Gegendruck gegen diejenige Luft erfordert wird, welche durch den äußern Gehörgang auf das Trommelfell drückt. S. Ohr.

<sup>1</sup>) Blumenbach's Gesch. u. Besch. d. Knochn. §. 47. <sup>2</sup>) Maner's Besch. d. menschl. N. 3. B. S. 427. <sup>3</sup>) nach Eustach so benannt, der diesen Theil zwar nicht entdeckt hat, indem schon Alcmæon eine Kenntniß desselben hatte, auch Aristoteles (hist. an. l. 1. c. 11.) desselben gedenkt, doch zuerst ihn mit anatomischer Genauigkeit, (audit. org. exam. p. 162) beschrieb. S. Halleri el. physiol. T. V. l. 15. s. 1. §. 24. <sup>4</sup>) Cassebohm tr. de aure hum. §. 87. <sup>5</sup>) <sup>6</sup>) Heisteri comp. an. ed 2 p. 16. <sup>7</sup>) — <sup>8</sup>) Winslow's anat. Abh. Uebers. Berl. 1753, 1. B. S. 91. <sup>9</sup>) Hal: ler's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v. Leveiling, 1. Th. §. 528. <sup>10</sup>) Sommering's Knochnl. S. 135. <sup>11</sup>) Halleri el. physiol. l. c. §. 25. <sup>12</sup>) Leberi prael. anat. ed. nov. 10. Vind. 1778, p. 27. <sup>13</sup>) fälschlich von Duverney (tr. de org. auditus, übers. v. Mischel, Berlin S. 12) und andern so benannt. (Vgl. Halleri elem. physiol. l. c.) <sup>14</sup>) Schaaersmidt's splanchnol. Tabell. Tab. 21. <sup>15</sup>) Winslow exp. anat. lat. vers. T. I. tr. de oss. sicca. §. 261. <sup>16</sup>) Winslow's anat. Abh. u. f. w. 4. B. S. 396. <sup>17</sup>) Winslow exp. an. u. f. w. T. IV. tr. de cap. §. 501. <sup>18</sup>) Halleri el. ph. etc. l. c.

**Eustathes**, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wortes <sup>1</sup>, s. Gesund.

<sup>1</sup>) *ευσταθης*, eigentlich fest, beständig.

**Eustathia**, beßgl. <sup>1</sup>, s. Gesundheit.

<sup>1</sup>) *ευσταθια*, *ευσταθεια*, Festigkeit, Beständigkeit, von *Επιστη* insbesondere zur Andeutung der guten Constitution des Körpers gebraucht.

**Eusternos**, beßgl. <sup>1</sup>, ein Mensch, dessen Brust vorzüglich gut geordnet ist. Vgl. Thorax.

<sup>1</sup>) *ευστερνος*.

*Eusthenia*, beßgl. <sup>1</sup>, gute Körperkraft. Vgl. Gesundheit.

<sup>1</sup>) ευσθενεια.

*Eusthenos*, beßgl. <sup>1</sup>, bei guten Kräften. S. Gesund,

<sup>1</sup>) ευσθενος, ευσθενης.

*Eustomachia*, beßgl. <sup>1</sup>, eine gute Beschaffenheit des Magens, insbesondere der Verdauung.

<sup>1</sup>) ευστομαχια.

*Eustomachos*, beßgl. <sup>1</sup>, ein Mensch von guter Verdauung.

<sup>1</sup>) ευστομαχος, auch dem Magen zuträglich.

*Eustomia*, beßgl. <sup>1</sup>, wörtlich gutes Mundwerk, vorzüglich gute leichte Aussprache. Vgl. Sprache, auch Geschwätzigkeit.

<sup>1</sup>) ευστομια.

*Eustomos*, beßgl. <sup>1</sup>, ein Mensch mit einem schönen Munde, oder auch i. q. Euprosopos. Vgl. Mund, auch Schwächer.

<sup>1</sup>) ευστομος.

*Eusynesia*, beßgl. <sup>1</sup>, s. Scharfsinn.

<sup>1</sup>) ευσυνεσια.

*Eutaxia* <sup>1</sup>, beßgl. <sup>1</sup>, gehörige Beschaffenheit des Körpers. Vgl. Gesundheit.

<sup>1</sup>) ευταξια, eigentlich gute Ordnung überhaupt. (Thomson ac. magn. lat. redd. p. G. Heniken c. 10.)

*Euthanasie* <sup>1</sup>, (*Euthanasia*,) beßgl. <sup>2</sup>, leichter, schmerzloser Tod. Vgl. Tod.

<sup>1</sup>) Kell's Entw. e. allg. Therapie, 15. Cap. <sup>2</sup>) ευθανασια, ευθανατος, ein in seinem Will und überhaupt auf eine leichte Art und ehrenvoll Sterbender. Suetonii vit. Octav. c. 99.

*Eutharsia*, beßgl. <sup>1</sup>, s. Muth.

<sup>1</sup>) ευθαρσεια. Ευθαρσης, fähig.

*Euthenia*, *Euthesia*, beßgl. <sup>1</sup>, Wohlfeyn, gute Körperbeschaffenheit. S. Gesundheit.

<sup>1</sup>) ευθηνα, ευθηνα, ευθεια. (Galenii exeg. voc. Hipp.)

*Euthymia*, beßgl. <sup>1</sup>, guter Muth. S. Frohsinn.

<sup>1</sup>) ευθυμια. (Hippocr. epid. l. 5. c. 31.) Dessen Gegensatz: αθυμια. Ευθυμος, wohlgemuth.

*Euthyoneiria*, beßgl. <sup>1</sup>, das Schauen der Zukunft im Traum. Vgl. Traum.

<sup>1</sup>) ευθυονειρια. Ευθυονειριος, ein Mensch, der auf diese Art träumt.

*Euthypnus*, beßgl. <sup>1</sup>, ein mit Leichtigkeit Athmender. Vgl. Respiration.

<sup>1</sup>) ευθυπνους. (Hippocr. aph. l. 6. aph. 28.)

*Euthyporia*, beßgl. <sup>1</sup>, das Gehen in gerader Richtung. Vgl. Gehen.

<sup>1</sup>) ευθυπορια. Ευθυπορος, ein Mensch, der einen geraden Gang hat.

*Euthyrris*, beßgl. <sup>1</sup>, ein Mensch mit einer geraden, wohlgebildeten Nase. Vgl. Nase.

<sup>1</sup>) ευθυρρις, auch ευθυρριν.

*Euthythrinx*, beßgl. <sup>1</sup>, ein Mensch mit schlichtem Haarwuchs. Vgl. Haupthaare.

<sup>1</sup>) ευθυθριξ.

*Eutocya*, beßgl. <sup>1</sup>, s. Fruchtbarkeit.

<sup>1</sup>) ευτοκια, auch leichtes Gebären. Ευτοκος, fruchtbar, leicht gebärend.

*Eutolmia*, beßgl. <sup>1</sup>, s. Muth.

<sup>1</sup>) ευτολμια. Ευτολμος, muthig.



**Eutonia**, beßgl. <sup>1</sup>, i. q. **Energia**. S. **Kraft**.

1) εὐτονία. Eutonos, kräftig.

**Eutrapelia**, beßgl. <sup>1</sup>, f. **Freundlichkeit**.

1) εὐτραπέλια (Hippocr. de dec. orn. c. 3.)

**Eutrophia**, beßgl. <sup>1</sup>, gute reichliche Nahrung des Körpers. S. **wohlbeleibtheit**.

1) εὐτροφία. (Galenii de san. tuend. l. 3. c. 8.) Gegensth: ολιγοτροφία. εὐτροφος, εὐτραφής, εὐτραφήςτος, gut genährt.

**Euzoodynamia**, ein neu nach dem Griechischen gebildetes Wort <sup>1</sup>, Zustand guter Lebenskraft. S. **Gesundheit**.

1) von Gilbert (euzoodynamie,) aus εὐ, wohl, ζῆν, leben, δύναμις, Kraft. S. Dict. méd. Vol. XIII. p. 470.

**Evacuatio**, f. **Excretion**.

**Evaemia**, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wortes <sup>1</sup>, gute Beschaffenheit des Bluts. Vgl. **Blut**.

1) ευαιμία. Vgl. Fernelii pathol. l. 2. c. 14.

**Evanatrophos**, beßgl. <sup>1</sup>, wohl genährt. Vgl. **Gesund**.

1) εὐανατροφος.

**Evanthes**, beßgl. <sup>1</sup>, blühend von Aussehen. Vgl. **Gesund**.

1) ευανθης.

**Evaporation**, (*Evaporatio* <sup>1</sup>.) Verdampfung, Verdunstung, Dunstbildung. Sie geht allezeit vor sich, sobald ein vorher dichter Körper in den Zustand der dunstförmigen elastischen Flüssigkeit übergeht. Der sichtbare Erfolg ist die Abnahme von dem, indem der daraus gebildete Dunst unsichtbar, wie die Atmosphäre selbst, sich mit dieser vereinigt und es so lange bleibt, bis Kälte oder Druck ihn wieder in seiner frühern Gestalt abscheidet. Das Wasser kann als Beispiel dienen. Durch angebrachte Wärme dasselbe leicht in Dunst zu verwandeln. Es bilden sich am Boden des mit Wasser gefüllten, dem Feuer genäherten Gefäßes also bald Wasserdunstblasen, die von da aufsteigen und sich der Atmosphäre beimischen. Dasselbe geschieht auf der Oberfläche, (und also unmerklich,) eines jeden mit der Atmosphäre in Berührung stehenden Wassers, auch fast zu allen Zeiten, je nachdem die Capacität der Atmosphäre, diesen Dunst aufzunehmen, stark oder schwach ist. Leslie's Versuchen nach <sup>2</sup> wächst dieses ihr Sättigungsvermögen mit der Ausdehnung, oder was dieser unter gewissen Umständen gleich ist, mit dem Wärmegrade; es nimmt dagegen ab durch Erkältung, Zusammenrückung oder andere Verdichtung. Daraus folgt, daß der Sättigungsgrad bei jeder Temperatur ein anderer seyn müsse, so wie man wieder aus der Menge des in der Atmosphäre noch Verdampfenden auf die schon darin befindliche Menge Dunst mit Genauigkeit schließen kann <sup>3</sup>.

Während jeder Verdunstung erkaltet sich der zurückbleibende Theil, weil der verdunstende Theil, um sich zu Dunst verwandeln zu können, Wärme bindet, welche der zurückbleibende hergeben muß. Von allen hieher gehörigen merkwürdigen und oft sehr auffallenden Erscheinungen berühre ich nur die darauf gegründete physiologische Erscheinung

1) Senecae nat. quaest. l. 6. c. 13.

2) Thort account of experiments and instruments depending of the relations of air to heat and moisture, by John Leslie, Edinburgh 1813, 8.

3) Leslie's Besch. eines Hygrometers u. s. w. in Nicholson's Journal, 3. B. S. 461.

am organischen Körper, daß jeder die ihm eigenthümliche Temperatur mittelst der Verdunstung seines Schweißes oder anderer liquiden Ausdünstungen behauptet, es sei die der ihn umgebenden Atmosphäre auch noch so hoch. Wladen, Fordyce, Berger haben an sich solche Versuche angestellt<sup>4</sup>, letzterer konnte sieben Minuten lang eine Hitze von 228,8 Fahrenheit'schen Graden ertragen. Vgl. Dampf.

4) Biblioth. britannique 1807, 8.

(Ficinus.)

*Evasthesia*, in Uebersetzung des gleichlautenden Griechischen Wortes<sup>1</sup>, gute Beschaffenheit der Sinnesthätigkeit. Vgl. Sinne.

1) ευασθησια. Ευασθητος, mit guten Sinnen begabt.

*Evectoia*, beßgl.<sup>1</sup>, leichtes Gehör. S. Gehör.

1) ευηκοια, auch Gehorsam.

*Evectoos*, beßgl.<sup>1</sup>, leicht hörend. Vgl. Gehör.

1) ευηκοος. (Hipp. aph. l. 5. aph. 17.)

*Evetes*, *Eveticos*, beßgl.<sup>1</sup>, von guter Körperbeschaffenheit. Vgl. Gesund.

1) ευετης, ευετικος.

*Evcpaesthetos*, beßgl.<sup>1</sup>, s. Scharffführend.

1) ευεπαισθητος. (Hipp. de morb. mul. l. 7. c. 65.)

*Evepia*, beßgl.<sup>1</sup>, i. q. Facundia. S. Beredsamkeit.

1) ευεπια. (Hipp. de dec. orn. l. c. 2.)

*Evester*, (*Evestrum*,) ein Paracelsisches Fignient, ein inneres Princip, „das jedem Dinge wie der Schatten dem Körper anhängt, mit der ersten Gebärung eines jeglichen Dinges seinen Anfang nimmt, das Ewige erkennt, Prophezeiung gibt, der Ewigkeit des Firmaments in vier Welten gleich ist“ u. s. w. Hiernach unterscheidet Paracelsus *evestrum cometarum*, *impressionum*, *miraculorum*, *evestrum propheticum et umbratum*<sup>1</sup>. S. unter Theosophische Systeme der Natur, Paracelsisches System.

1) Vgl. Theophr. Paracelsi philos. ad Athen. 19. Tert.

*Evethia*, in Uebersetzung des gleichlautenden Griechischen Wortes<sup>1</sup>, s. Gutherzigkeit.

1) ευηθια, ευηθεια, in guter und schlimmer Bedeutung. Ευηθην, gutherzig, aber auch einfältig.

*Evexia*, beßgl.<sup>1</sup>, s. Gesundheit.

1) ευεξια, körperliches und geistiges Wohlfeyn. (Galen de san. tuend. l. 1. c. 8.) Dessen Gegensatz: καχεξια.

*Evigilatio*, s. Erwachen.

*Eviratio*, s. Castration.

*Eviratus*, s. Castrat.

*Evolution*<sup>1</sup>, (*Evolutio*<sup>2</sup>,) Entwicklung<sup>3</sup>, setzt den Zustand einer frühern, wenigstens der Anlage nach, vollendeten Bildung voraus, für deren freies Hervortreten bloß die sie zurückhaltenden Hindernisse und Hemmungen aus dem Wege geräumt werden. Der Ausdruck ist von dem mechanischen Verfahren hergenommen, nach dem zusammengewickelte Fäden, oder zusammengewickelte und zusammengefaltete Stoffe ihrer Länge und Breite nach ausgezogen und aus einander gelegt werden.

1) Ein Brief über das System der Evolution, v. F. Fontana, in Reil's Arch. für die Physiol. 2. B. 3. P. S. 474.

2) Halleri el. physiol. T. VIII. l. 29. s. 2. §. 27.

3) P. F. Hopfengrerner's Bemerkungen über die menschl. Entwicklungen u. s. w. Stuttg. 1792, 3.



Wenn dieses Wort zur Erklärung von Vorgängen im Leben an-  
 wendet wird, so ist diese dann immer nur eine bildliche, und fin-  
 auch in dem Sinne derer, die es brauchen, nur theilweise An-  
 bildung. Man hat nämlich die Entstehung neuer Individuen aus  
 den vorhandenen dadurch erklären wollen, daß das ganze in die Er-  
 zeugung tretende Individuum bereits in einem von denen, die ihm  
 die Entstehung gaben, ausgebildet vorhanden sei, und also einzig  
 die Entwicklung aus ihm hervorgehe, so daß also bei der Erzeu-  
 gung, eines der beiden Geschlechter nur die Bedingung der Entwick-  
 lung, das andere aber den derselben zu seiner Erscheinung bloß be-  
 nötigten Stoff hergebe. Hier ist indessen nur von den den kleinsten  
 Moleculen eigenthümlichen Formen die Rede; denn der Ansatz von  
 der Materie, die dem werdenden Organismus von außen her zugeht,  
 welche den materiellen Stoff beim Wachsthum hergibt, ist wohl  
 kein Gegenstand der Controvers gewesen. Die Würdigung dieses  
 Evolutionssystems ist unter dem Artikel Erzeugung zu su-  
 chen.

Aber auch während des fortgehenden Lebens treten Phänomene ein,  
 als Entwicklungen eines schon vorhandenen Zustandes, (nicht  
 etwas neu Hinzugekommenes,) angesprochen werden. Jener frü-  
 here Zustand ist dann Anlage, oder die innere Bedingung, die in  
 der Entwicklung auf den entstandenen, unter äußern Veranlassungen, die in ge-  
 wöhnlichen Lebensverhältnissen nicht außen bleiben, einen neuen Zu-  
 stand zur nothwendigen Folge haben.

So entwickelt sich die Pubertät aus der Organisation des kindli-  
 chen Körpers, der von der ersten Entstehung an dazu die Anlage  
 hatte. Die Beachtung von dergleichen Entwicklungen im Leben  
 ist besonders in pathologischen Zuständen wichtig; doch darf man  
 nicht übersehen, daß der Vorgang immer ein Product des eigenthüm-  
 lichen Bildungsvermögens der Natur ist, die ihr angefangenes Werk,  
 die Vorwärtsbildung oder Rückbildung, oder auch der sich ablenken-  
 den Bildung,) nur fortsetzt und der frühere Zustand in dem Begriff  
 der Entwicklung nur als Primäres ins Auge gefaßt ist, wobei je-  
 doch das Hinzukommende als Secundäres nie übersehen werden darf.  
 (vgl. Bildungstrieb.) — Auch im geistigen Leben finden auf gleiche  
 Weise und in gleichem Sinne wie im körperlichen Evolutionen vorhan-  
 dener Anlagen Statt. (h.)

Evolutionssystem<sup>1</sup>, Eierevolutionssystem<sup>2</sup>, Einscha-  
 lungssystem<sup>3</sup> oder Entwicklungslehre<sup>4</sup>, (Systema, s. Theo-  
 evolutionis<sup>5</sup>, s. involutionis<sup>6</sup>, s. syngenesios<sup>7</sup>.) die zu-  
 sammenhängende Lehre der Erzeugung neuer organischen Wesen aus  
 formirten Keimen durch bloße Evolution. S. Erzeugung.

Haller's Grunr. d. Physiol. umgearb. von v. Reveling, 2. Th. Note 627.  
 2) Maner's Beschr. d. menschl. R. s. B. S. 255. 6) — 7) Schnee:  
 1804 über die Erzeugung, S. 43.

Evoneiros, in Uebersetzung des gleichlautenden Griechischen  
 Wortes<sup>1</sup>, einer, der gute Träume hat. S. Traum.

Evoveipos, auch in der Bedeutung von etwas, das gute Träume macht.

Evophrys, beßgl.<sup>1</sup>, ein Mensch mit schönen Augenbraunen.  
 u. Augenbraunen.

1) evophrys.

*Evophthalmos*, *Evopis*, *Evopos*, beßgl.<sup>1</sup>, ein Mensch mit schönen Augen. Vgl. Auge.

1) *ευοφθαλμος*, *ευωπης*, *ευωπος*, auch was schön in die Augen fällt.

*Evorgisia*, beßgl.<sup>1</sup>, s. Jähzorn, auch Sanftmuth.

2) *ευοργησια*. *Evorgisios*, *ευοργος*, der sich leicht erlirnt, aber auch der, der seine Leidenschaft, besonders den Zorn, bescämpt.

*Evosphranticos*, *Evosphritos*, beßgl.<sup>1</sup>, ein Mensch von vorzüglich gutem Geruch. S. Geruch.

1) *ευοσφραντικος*, *ευοσφρητος*.

*Exaemos*, beßgl.<sup>1</sup>, i. q. *Exsanguis*. S. Blutlos.

2) *εξαemos*.

**Exaltation**, (*Exaltatio*<sup>1</sup>). Aufschwung<sup>2</sup>, ist der Zustand erhöhter Lebentbätigkeit; ein Zustand, welcher dem Ansachen der Flamme, dem Brennen und Athmen in Lebensluft, (Sauerstoffgas,) analog ist. Diese Stimmung eines erhöhten Lebens, und kräftigerer Aeußerungen desselben wird durch irgend einen innern oder äußern Reiz hervorgebracht, und kann entweder die Gesamtheit des Menschen, Seele und Körper, umfassen, oder bloß eine Hälfte desselben, und in dieser bloß ein oder mehrere Vermögen oder Organe. Im ersten Falle ist unser ganzes Ich exaltirt, im andern direct zwar nur die eine Hälfte; allein immer wird indirect zugleich die andere zum Theil ergriffen werden, und zwar mehr noch, wenn das geistige Princip ursprünglich exaltirt war.

In diesem Zustande gehen alle Verrichtungen des Körpers und insbesondere des Geistes weit lebhafter, rascher, leichter und kräftiger von Statten; die Geistesvermögen wirken harmonischer; ihre Kraftäußerungen sind vielseitiger und origineller; sie übertreffen sich selbst, und bringen Producte und Handlungen hervor, über welche der Urheber selbst, auf den gewöhnlichen Zustand zurückgekommen, in Verwunderung und Staunen geräth. Der Körper selbst vermag in diesem Zustande eine so außerordentliche Muskelkraft zu entwickeln, Lasten fortzutragen, und eine Ausdauer zu zeigen, welche seine gewöhnlichen Kräfte um das Drei- und Vierfache übersteigt.

Es können aber auch einzelne Vermögen der Seele exaltirt werden, z. B. der Verstand, die Phantasie, das Geföhlsvermögen, das Begehrungsvermögen, oder selbst einzelne Geföhle und Begierden, als Muth, Haß, Liebe, Ruhmsucht, Habsucht u. s. w. Am leichtesten wird die Phantasie, am schwersten die Vernunft exaltirt.

Die Exaltation eines jeden Geistesvermögens zeigt sich auf eine eigene Weise: die des Verstandes durch größern Scharfsinn und Sagacität, durch schnelles, treffendes Urtheil; die der Phantasie durch reichlichen Zufluß lebendiger, treffender Bilder, witzige Einfälle und Welterungen, durch Erfindung neuer Zusammenstellungen; die des Geföhlsvmögens durch innigere, lebhaftere, heftigere Geföhle; die des Begehrungsvermögens durch schnelleres, kräftigeres und ausdauerndes Wollen; die der Vernunft durch tiefsinnige Schlüsse, tiefeindringende Blicke in das Innere der Geheimnisse der Natur und der Seele

u. s. w.

Das Entstehen der Exaltation ist entweder allmählig oder plötzlich,

1) *Terrulliani de cultu foemin. c. 3.* „*Exaltatio non congruit professoribus humilitatis.*“

2) Vgl. dieß Wort.



ihre Dauer gewöhnlich mit dem Grade ihrer Höhe in umgekehrten Verhältnissen. Die höchste Exaltation ist von der kürzesten Dauer. Beweis hiervon ist die Exaltation des Gefühls bei der Begattung.

Die Exaltation kann doppelter Art seyn, die natürliche, innere, künstliche, erkünstelte, äußere. Jene ist die Steigerung und Erhebung der Geistesthätigkeiten durch psychische Mittel, durch Vorstellungen, und sie kann theils objectiven, theils subjectiven Ursprungs seyn. Exaltation, welche durch Vorstellungen von Gegenständen außer uns und das Interesse, welches sie uns einflößen, herbeigeführt wird, z. B. Worte, Töne, Gemälde; Anschauungen, Gesellschaft, Naturschönheiten u. s. w., ist objectiven Ursprungs; Exaltation im Gegentheil, welche durch Vorstellungen von uns selbst oder unserem Innern durch Nachdenken, Phantasie, Ueberzeugung, Hoffnung, Wollen, durch Ideen u. s. w. hervorgebracht wird, ist subjectiven Ursprungs. Von dieser gilt das Pectus est quod facit virtutem. Uebrigens wird durch Exaltation des einen geistigen Vermögens oft ein verwandtes secundär und consensuell exaltirt. Freude, Enthusiasmus, Liebe, Muth sind insonderheit leicht der Exaltation fähig und wiederum geschickt zu exaltiren.

Die künstliche Exaltation, oder die äußere, wird durch äußere Mittel hervorgebracht, welche auf den Körper, namentlich das Nervensystem, wirken, und mittelbar auf die geistigen Vermögen. Dieß geschieht insonderheit durch geistige, flüchtig erregende Mittel, Wein, Rauschgeist, Opium und dergleichen, welche besonders das Blut nach oben ins Gehirn treiben und dadurch lebhaftere Thätigkeit desselben herbeiführen. Sehr mäßig angewendet, sind sie weniger nachtheilig, in größeren Gaben aber desto mehr, da die Menge nach und nach immer erhöht werden muß, und die auf die Exaltation folgende Abkühlung immer bedeutender wird, so daß endlich eine, durch nichts zu hebende Erschlaffung und Erschöpfung eintritt, wie z. B. bei den Rauschweintrinkern und Opiumessern der Türken.

Die natürliche, innere geistige Exaltation ist ein in manchen Verhältnissen des Lebens zu empfehlender Kunstgriff, um etwas Ausgezeichnetes zu leisten. So erwärmt sich der Redner durch die Wahrheit und Wichtigkeit seiner Sache, der Dichter durch Vorhaltung der interessantesten Phantasiegemälde, der Künstler durch Anschauung der Meisterwerke und Studium ihrer Vollkommenheiten; so exaltirt der Feldherr sein Heer durch das Feuer seiner Rede u. s. w.

Noch darf die Exaltation die Gefühle nie in so einem Grade reizen, daß sie in den zweiten Grad des Affectes übergehen und das Licht des Verstandes verdunkeln. Diese innere Exaltation, wenn sie ihren Schranken bleibt, hat eher günstige als ungünstige Einflüsse auf den Körper; im höhern Grade erschöpft sie auch Geist und Körper.

Die Exaltation spricht sich auch im Außern durch Mienen und Gebärden, Worte, Ton, Stimme und Bewegung aus, und jede Art hat ihre Charaktere.

(Dzondi.)

*Exanguis*, i. q. *Exsanguis*.

*Exanimatio*, s. *Tod*.

*Exanimatum corpus*, f. Cadaver.

*Excandescencia*, f. Sähzorn.

*Excantatoria magia*, f. Incantation.

*Excastratio*, f. Castration.

*Excastratus*, ungewöhnlich und nur von Thieren gebraucht, i. q. Castratus. Vgl. Castrat.

*Excavatio*, f. Cavität.

*Excavationes veli palatini*, f. Seitenligamente des Velums des Gaumenvorhanges.

*Excavatum capitulum radii*, f. Condylus des Radius.

*Excerneuda*, f. Excremente.

*Excernicula*, f. Excretionsgebilde.

**Excernirende Secretionen.** So benennt Lucca<sup>1</sup> diejenigen Secretionen, deren Product ein Excretionsstoff ist. S. Secretion.

1) etrige Sätze aus der physiol. Lehre von den secretirten Säften, S. 43.

*Excessus*, i. q. Apophysis.

*Excisio*, f. Incisur.

*Excisura*, f. Incisur. — *semilunaris maxillae inferioris*, f. Sigmoidische Incisur des Unterkiefers.

**Excitabilität**, (*Excitabilitas*,) f. Incitabilität.

**Excitation**, (*Excitatio*,) f. Incitation.

*Exclamatio*, f. Geschrei.

**Exclusion des Fötus**, (*Exclusio foetus*,) f. Geburt.

*Excorticalis tunica scroti*, f. Dartos.

**Excremente**<sup>1</sup>, (*Excrementa*<sup>2</sup>,) Ausgeleerte, oder Ausgesonderte Stoffe, Ausleerungsstoffe<sup>3</sup>, Ausleerungen, Abgänge, Excretionsstoffe<sup>4</sup> oder producte<sup>5</sup>, Auswurfstoffe<sup>6</sup>, (*Excernenda*, *Excretiones*, *Excrementitia*<sup>7</sup>, *Colliquamenta*, *Recrementa*<sup>8</sup>, *Retrementa*<sup>9</sup>, *Egesta*, *Ecreta*, *Apionta*<sup>10</sup>, *Apochoreon*<sup>11</sup>, *Apocrisis*<sup>12</sup>, *Diachorema*<sup>13</sup>, *Perittoma*<sup>14</sup>,) alle, mittelst Excretion irgend einer Art aus dem Körper geschiedene, und von ihm zum Zweck seiner eignen Erhaltung ausgeworfene Stoffe, insbesondere aber der Darmkoth. Vgl. Excretion, ingl. Darmkoth.

1) Haller's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v. Leveking, 2. B. S. 665.

2) im allgemeinen, das Abzusondernde, so die Spreu, („*excrementa tritici*,“ *Columnella de re rust.* l. 5. c. 3.) *Excrementa corporis*, *Plinii hist.* *jaundi* l. 11. c. 26.)

3) Schallgruber's Entw. einer Physiol. d. M. S. 163.

4) — 6) Lucca's Entw. einer mediz. Anthropol. 1. B. S. 482,

483, 493. 7) v. der Linden melet. med. Hipp. med. physiol. §. 111.

8) Wedellii physiol. med. ed. 2. p. 245. 9) *Macrobiani* sat. 7. c. 15.

10) — 14) S. diese Worte.

**Excrementa alvina**, f. Darmkoth.

**Excrementielle Partikeln**<sup>1</sup> oder Säfte, (*Excrementitii humores*,) der im Blute und überhaupt in den zur Ernährung dienenden thierischen Säften unterschiedene, dafür nicht geeignete, und daher in voraus zur Excretion bestimmte Antheil. Vgl. Excretion.

1) Lucca's Entw. e. mediz. Anthropol. 1. B. S. 475.

**Excrementitia**, f. Excremente.

**Excrementitii humores**, f. Excrementielle Partikeln.

**Excrementum**, jedes Ausgesonderte, S. Excremente. Vgl. aber auch, Protuberanz.



*Excrementum alvinum*, s. Darmkoth.

*Excrescentia cerebelli*, s. Intermediärer Lobus des Cerebellums.

*Excrescentiae<sup>1</sup> carnea*, s. *ramosae*, s. Epitloische Anhänge.

*Excrescentia*, Excrescenzen. plur. was über etwas hervorgewachsen ist, gewöhnlich aber nur von pathologischen Gebilden üblich.

*Excreta*, i. q. Excrementa.

*Excretion<sup>1</sup>*, (*Excretio<sup>2</sup>*.) Aussonderung<sup>3</sup>, Aus-  
führung, Ausföhrung<sup>4</sup>, Ausstoßung<sup>5</sup>, Ausscheidung<sup>6</sup>,  
Ejection, Excretionsverrichtung<sup>7</sup>, Excretionsproceß<sup>8</sup>,  
Excretionsthätigkeit<sup>9</sup>, (*Ejectio<sup>10</sup>*, *Expulsio<sup>11</sup>*, *Evacua-*  
*tio<sup>12</sup>*, *Eccrisis<sup>13</sup>*, *Abductio excrementorum<sup>14</sup>*.)  
des individuellen Leben, (der Thiere wie der Pflanzen,) besteht; und  
stellt sich körperlich in und unter Aufnahme äußerer Stoffe in die  
eigene Substanz, und in und unter Zurückgabe des Untauglichen oder  
Erhaltung untauglich Gewordenen an die Außenwelt. Durch die  
Assimilation vorhergehenden und sie bedingenden Lebensprocesse,  
nämlich die Resorption, gelangt das dem lebenden individuellen  
Körper vorher Fremdartige zu ihm und constituirte dann eine Zeit  
lang seine eigene Substanz; von dieser sondern sich aber gleichzeitig  
Theile und zwar zunächst in flüssiger Form, als relativ zur körper-  
lichen Substanz nicht mehr gehörige ab, und werden dadurch beson-  
dere Gegenstände sinnlicher Wahrnehmung. In so fern diese Stoffe  
entweder um noch besondern Zwecken in dem organischen Kör-  
per selbst zu dienen, oder auch damit der Körper sich ihrer entledige,  
oder der allgemeinen Säftemasse, dem Blute, geschieden werden,  
nennen sie den Namen abge sonderte, secernirte Stoffe, und  
nach den einzelnen Functionen, wodurch dieß geschieht, oder die Vorgänge  
heißen, den Namen Absonderungen, Secretionen. (Vgl.  
das obige Wort.) Gelangen erstere aber dabei aus dem Körper und wer-  
den absolut dem Körper etwas fremdartiges; so werden sie mit scharfer  
Bezeichnung, als ausgesonderte, excernirte Stoffe, so wie die  
Functionen und Vorgänge, in denen dieß erfolgt, als Aussonde-  
rungen, Excretionen unterschieden.

Es ist nicht gerade zu nöthig, daß solche Excretionsstoffe dem Le-  
ben selbst nicht weiter dienen. Der Speichel z. B., nachdem er vor-  
her in den Speicheldrüsen secernirt worden war, und während des  
Kauens durch die Speichelgänge excernirt wird, wird mit dem Biss-  
trocken in den Magen aufgenommen und ist nun noch der Verdauung  
fähig; der männliche Same, vorher in den Hoden secernirt und  
in den Samenbläschen abgesetzt, wird in der Begattung excernirt und  
begegnet in dem weiblichen Körper ein neues Leben. Darin kom-  
men aber alle Excretionen mit einander überein, daß der excernirte  
Stoff nicht mehr dem Körper angehört und aus seinen Räumen ent-

1) Lucd's Entw. eines Syst. d. med. Anthropol. 1. B. S. 472. 2) v. der Linden melet. med. Hipp. med. physiol. §. 114. 3) Jadelot's

Lehre v. d. Nat. d. gesund. menschl. K. übers. v. Penzlerbleter, S. 133.

4) Heuermann's Physiol. 1. B. S. 567. 5) — 6) Lucd's Entw. u.

7) s. w. a. a. D. S. 474 u. 531. 8) v. der Linden melet. etc. I. c.

9) Spachii diss. de expulsionem et retentionem excrementorum, Ar-

gent. 1597, 4. 10) J. M. Savonarola diss. de egestionibus.

11) S. dieß Wort. 12) C. Hofmanni apol. pro Galeno, P. 1. §. 335.

weicht, oder von ihm ausgestoßen wird, da insbesondere die Darmstoffe, so lange sie nicht resorbirt sind, ebenfalls äußern Stoffen gleich geachtet werden müssen.

Mit den Excretionen werden theils solche Stoffe ausgeworfen, die aus rein assimilirter Substanz wieder abgeschieden worden sind, nach dem Gesetze, daß das Leben nur unter unaufhörlichem Stoffwechsel bestehen kann, (so ist z. E. in dem Samen ein rein thierischer Stoff aus dem Blute abgesondert,) theils aber werden durch dieselben wieder Stoffe aus dem Körper gebracht, die ihm auch hier durchaus fremdartig blieben, und durch den Körper gleichsam nur hindurchgehen.

Zu letztern gehört nun insbesondere die Darmercretion, (von der ein eigener Artikel handelt,) die sich besonders dadurch unterscheidet, daß der größere Theil der hier ausgeleerten Stoffe gar nicht resorbirt wurde, und also auch dem Raume nach dem Organismus fremdartig blieb, für welchen die innere Haut des Darmcanals, von welcher die Darmstoffe während der Verdauung zunächst befaßt sind, (als Gegensatz der Hautdecken als äußerer Oberfläche,) bloß eine Umhüllung bildet.

Alle übrigen Excretionen sind solche, durch welche Stoffe aus dem Körper gelangen; die vorher, durch Resorption in die Blutmasse aufgenommen, hier entweder ganz oder theilweise assimilirt wurden, und nun in dem Verhältnisse, als dieß geschah, durch einen eignen organischen Proceß ihre qualitative Beschaffenheit erhielten. Im ganz gesunden Zustande gehen keine äußern Stoffe ohne völlige Assimilation durch die Blutmasse hindurch, und gelangen so zu den Excretionsorganen; die sie der Außenwelt zurückliefern; doch ist der gesunde Körper fähig, ihm heterogene Stoffe, die in sein Inneres gelangen, auf diesem Wege wieder auszustößen, wie wir dieß vom Quecksilber, vom Schwefel und andern Mitteln, die als Arzneien, Gifte oder sonst zufällig in den Körper gelangten, besonders in Krankheitsfällen wahrnehmen.

Wie es zugehe, daß zu jedem Excretionsorgane nur diejenigen Stoffe gelangen, deren Ausführung aus dem Körper durch ein eigenes Organ für das Wohlfeyn des Organismus nothwendige Bedingung ist, ist eine eben so eitle Frage, als wie es geschieht, daß irgend ein secernirendes Organ nur eine bestimmte und keine andere Feuchtigkeit absondert. Wir müssen uns hier bloß mit der Beobachtung genügen, die, während wir aus ihr eine Gleichförmigkeit des Verfahrens der Natur bis zu einer gewissen Grenze erkennen, uns zugleich den Reichthum derselben in qualitativer Beschaffenheit ihrer Producte kennen leut.

Mit der Darmercretion ist zugleich die Gallenercretion verbunden, die eigentlich eben so wie die Excretion des pancreatischen Saftes und des Darmschleims, schon Statt hat, indem die gedachten Stoffe in den Darmcanal gelangen.

Unter den Excretionen nimmt die des Harns oder die Nierenexcretion die zweite Stelle ein, durch die vorzüglich das Blut von ihm untauglichen und überflüssigen wässerigen Stoffen gereinigt wird. Von ihr unterscheidet sich die Hautexcretion, außer nicht uner-



schon qualitativen Verschiedenheiten, insbesondere dadurch, daß auf einer weit größern Fläche, aber auf jedem Punct nur in geringen Quantität, wässerige Feuchtigkeiten ausgeleert werden, die hier nicht, ehe sie ganz aus dem Körper gelangen, wie dort, in einem eignen Höhlen, (die Harnblase,) zusammenfließen, und auf einmal in einer Strömung ergossen werden, sondern vielmehr bei ihrer Excretion meist verdunsten. Mit der Hautexcretion die Lungenexcretion unter dem Respirationproceß beim Ausathmen die nächste Analogie. — Andere Excretionen, wie die der Augenfeuchtigkeit, der Thränen, des Speichels, des Ohrschleims, des Ohrschmalzes, dienen nicht, wie die ersten, allgemeinen, sondern besondern Zwecken des Lebens. Von diesen aber, wie von diesen, wird näher unter besondern Artikeln die Rede seyn. (H.)

*Excretio alvi*, s. *alvina*, s. Darmausleerung, — *cerumini*, s. unter Ohrschmalz. — *saecum alvinarum*, s. Darmleerung. — *lotii*, s. Harnausleerung. — *muci narium*, s. Schleimen der Nase. — *salivae*, s. Speichelausführung. — *seminis*, s. Ejaculation des Samens. — *urinae*, s. Harnausleerung. *Excretiones*, s. Excremente. — *per alvum*, s. Darmkoth. *Excretionsapparat*, s. unter Excretionsgebilde.

*Excretionsgänge des Ovariums*, (*Excretorii ductus ovarii*, *Vasa semen deferentia*, s. *ejaculatoria*, s. *Ductus ejaculatorii ovarii*,) nach der Annahme älterer Anatomen kleine Gänge, welche einen unmittelbaren Uebergang des weiblichen Saamens aus den Ovarien in die Höhle des Uterus, oder auch in den Vaginalkanal vermitteln sollten, und deren Lauf verschiedentlich beschrieben wird. S. unter Genitalien des weiblichen Geschlechts, Ovarien.

2) Laurentii hist. an. l. 7. c. 9. 3) Halleri Elem. physiol. med. VIII. l. 28. c. 2. §. 35, wo überhaupt die verschiedenen Angaben dieses vermittelnden Theils aus den ältern anatomischen Schriften zusammengestellt sind.

*Excretionsgebilde*, *Excretionsorgane*, (*Excretoria organa*), *Excretionswege*, *Ausscheidungsorgane*, *Ausscheidungsorgane*, *Ausleerungsorgane*, oder *wege*, *Eggregationsorgane*, *Colatorien*, (*Viae excretionis*, *Excernicula*, *ejaculatoria*, *Emunctoria*,) die zur Ausscheidung der zur Excretion bestimmten Stoffe aus dem Blutssysteme bestimmten Organe; auch in Bezug auf die Blutmasse selbst, aus der ihr heterogene Stoffe dadurch entfernt werden, als *Reinigende Organe*, (*Organa depuratoria*, *expurgatoria*,) überhaupt auch als *Excretionsapparat* bezeichnet. S. *Excretion*.

— 6) Lucä's Entw. einer mediz. Anthropol. 1. B. S. 487, 475, 496, 519, 534. 7) Wedellii physiol. med. ed. 2 p. 145. 8) Paracelsi paramir. tr. c. 9. 9) Lucä's Entw. u. f. w. a. a. D. S. 487. 10) v. der Linden meletem. med. Hipp. physiol. §. 9. 11) Lucä's Entw. u. f. w. a. a. D. S. 550.

*Excretionsproceß*, s. *Excretion*. — *producte*, oder *Stoffe*, *Excremente*. — *Thätigkeit* oder *verrichtung*, s. *Excretion*. — *Apparat*, s. *Excretionsgebilde*.

*Excretoria vascula testis*, f. Graafische Samenröhrchen. —  
*organa*, f. Excretionsorgane.

*Excretorii canales*, s. *ductus*, f. Ausführende Gänge. —  
*ductus glandulae lacrymalis*, f. unter Thränendrüse. —  
*ovarum*, f. Excretionsgänge des Ovariums.

*Excretorius ductus seminis*, s. *spermatis*, f. Ausführungsgänge des Samens. — — *salivialis*, f. Stenonischer Gang. —  
*musculus vesicae*, f. unter Harnblasenhäute.

*Excretus*, erwachsen, f. unter Körperreife.

*Exercitata anatomia*, f. Anatomische Technik.

*Execheglutos*, in Uebertragung des gleichlautenden Griechischen Wortes<sup>1</sup>, Cluneminulus<sup>2</sup>, ein Mensch mit hervorstehenden Hinterbacken. Vgl. Hinterbacken.

1) εἰσεχέγλυτος. (Hipp. de articul. l. wo jedoch bloß von dem Fall, daß durch Verrenkung dieser Zustand entstanden sei, die Rede ist.) Vgl. auch Foesii oecon. Hipp. l. v. 2) Nach Foesius Uebersetzung (a. a. D.)

*Exhalantes pori cutis*, f. unter Poren der Haut.

*Exhalantia vasa*, s. *vascula*, f. Exhalirende Gefäße.

*Exhalation*<sup>1</sup>, (*Exhalatio*<sup>2</sup>) Ausdampfung<sup>3</sup>, Ausdünstung<sup>4</sup>, (*Exspiratio*<sup>5</sup> *Anathymiasis*<sup>6</sup>), im allgemeinen der Abgang, den ein tropfbar flüssiger, oder ein theilweise aus tropfbar flüssigen Theilen bestehender Körper, durch Umänderung dieser in Dampfform und Uebergang dieses Dampfs in die Atmosphäre, oder die umgrenzenden Räume erleidet, in Bezug auf den lebenden thierischen oder überhaupt organischen Körper aber, Excretion flüssiger Stoffe in Dampfform. S. Dampf und Excretion, vgl. auch Emanation.

1) Hall's Arch. für Physiol. 5. B. 2. St. S. 256. 2) Ciceron. Tuscul. quaest. l. 1. c. 19 „propter exhalationes terrae.“ 3) Neuermann's Physiol. 2. B. 22. Cap. 4) Ciceron. de nat. Deor. l. 2. c. 33 „terrae exspirationibus aer alitur.“ 5) Vgl. dies Wort. S. auch Galeni de caus. morb. l. c. 3.

*Exhalatio cutanea*, f. Hautexhalation.

*Exhalationsproceß*<sup>1</sup>, (*Processus exhalationis*), der thierische Vorgang, wodurch mittelst der Exhalation Stoffe aus dem Körper entfernt werden. Vgl. Exhalation.

1) Eucd's Entw. d. mediz. Anthropol. 1. B. S. 412.

*Exhalirende Gefäße*, (*Exhalantia vasa*, s. *vascula*<sup>1</sup>) Ausdünstungs- oder Ausdünstende<sup>2</sup> Gefäße, die nach außen gerichteten Endigungen der Capillargefäße, die auch eben so nur als Poren angesehen werden können, und durch welche die zur Exhalation geeigneten Stoffe aus dem Körper, und insbesondere aus dem Blutgefäßsystem gelangen. Vgl. Exhalation, auch Capillargefäße.

1) Halleri elem. physiol. T. I. l. 2. s. 1. §. 24. 2) Haller's Grundr. d. Physiol. übr. von v. Levetting, 1. Th. S. 52.

*Exigua lingua*, i. q. Epiglottis.

*Existenz*, (*Existentia*<sup>1</sup>), Seyn, Daseyn. In physiologischer Betrachtung genügt es, das Seyn der Dinge, als absolut notwendig für die Naturvorgänge zu postuliren. Die Metaphysiker haben lange genug ihren Scharfsinn erschöpft, um besondere Bestim-

1) erst in den neuern philosophischen Schulen geübtes Wort. (Winkler inst. philos. univ. P. I. s. 1. c. 3.)



ingen des Seyns, (gleichsam ein Seyn außer dem Seyn,) zu finden. In dem bekannten Cartesianischen Satz: *Cogito, ergo sum*, wenigstens in Einem Falle, in dem des eignen Seyns, die Wahrnehmung und die Existenz als absolute Einheit keinem Widerspruch ausgesetzt, daher auch der Egoist, der das Daseyn aller Dinge außer dem eignen als problematisch aufstellt, allein nicht aus dem Satz zu heben ist, während Idealisten und Materialisten, Monisten, Dualisten der ältern metaphysischen Schulen sich vergebens bemühen, in etwas außerhalb ihres eignen Bewußtseyns eine absolute Grundlage der Naturlehre aufzustellen.

Die Beengtheit der Vorstellung des alleinigen Seyns des Ichs, dem dann das Nicht-Ich bloß Prädicament seyn würde, und das Widerstreben des Geistes gegen eine solche Ansicht des Einzigseyns in der obden Welt führt aber nothwendig zur entgegengesetzten eines Seyns und eines Allseyns, welches in unendlichen Eigenwesen, in dem es sich entfaltet, eben so unendliche Centralpuncte faßt, von denen es sich wieder strahlend nach außen reflectirt. Als Unendliches dem endlichen Bewußtseyn unerfaßlich erheischt es jedoch Anerkennung, weil jede gezogene Grenze dem forschenden Blick doch noch Etwas hinter derselben entrißt, und so ist es das alte *παινον εν*, All und das Eine in unauflöslicher Verbindung, worauf wir in der Naturforschung als absolut Erstes und Letztes zurückkommen.

Hiermit ist aber zugleich die Nothwendigkeit der Synthesis des Seyns, oder die Nothwendigkeit, das Seyn an sich nur als ein ethisches anzuerkennen, ausgesprochen. Alle Versuche, ein vereintes Seyn, oder ein Seyn einzelner Wesen außer seinem Zusammenhang darzuthun, ist ein eitles Beginnen, daher die Hohlheit der metaphysischen Lehrsätze, obgleich die Natur unsers Denkvermögens es erheischt, für die innere Welt unsers Geistes Einzelheiten aus dem Allseyn als Vorstellungen auszuheben, und sie nach Freiheit zu Elementen einer neuen Welterschöpfung, welche jeder denkende Geist sich producirt, zu benutzen. Daher die Nichtexistenz aller abstracten Begriffe, ohne welche gleichwohl keine Einheit des Bewußtseyns möglich ist.

Das Criterium des Seyns für das Vorstellungsvermögen, nicht bloß die sinnliche Wahrnehmung, die die Außenwelt als Erscheinung auffaßt, sondern auch für den reflectirenden Verstand, ist allein die Uebereinstimmung, das Sich-gleich-bleiben unter wechselnden Erkenntnissen, und das Zusammenpassen mit andern erkannten Realitäten.

Der absolute Gegensatz des Seyns ist das Nichts, und zwar das absolute Nichts, indem das relative nur ein unbeachtungsbedürftiges, oder unbeachtbares Etwas ist. Ein solches absolutes Nichts selbst nicht mit einer Vorstellung in Verbindung; denn, wenn wir auch das Nichts, oder überhaupt das Negative abstract denken, nehmen wir es bloß als den Gegensatz des Etwas in unsere Vorstellung auf, und dann wird es eben als Gegensatz zu Etwas, so die Vorstellung der Unendlichkeit, als Gegensatz der Endlichkeit, zu einem Endlichen, oder wie dem Mathematiker negative Größen in Gegensatz von positiven selbst Größen, also ebenfalls ein Etwas sind. Der relative Gegensatz des Seyns aber ist der Schein,

oder die Illusion. Aus der Verwechslung beider entspringen alle Irrthümer der Wissenschaften und alle Täuschungen des Lebens. Schein beruht auf Unkunde oder Verkennung des wahren und nächsten Zusammenhanges der Dinge, und einer durch die Geistesethätigkeit selbst nach den Gesetzen des Vorstellungsvermögens für subjective Zwecke des Seyns bewirkten Ergänzung jener Lücken. Durch unaufhörliche Irrung im Leben bezeugen wir die Freiheit unsers Geistes. Was in der Natur bloß mechanischen Impulsen gehorcht, irrt nie; Irrthum ist bloß das Resultat des Conflicts der innern Welt jedes denkenden und empfindenden Wesens mit der äußern, den allein die Wahrheit, die Darlegung des natürlichen Zusammenhanges und zwar immer zum Triumph der Außenwelt über die innere, wiewohl häufig mit der Zertrümmerung dieser selbst, beilegt. Daher die hohe Würde und die Ueberlegenheit der Wahrheit, (von der Ordnung, Recht, Harmonie in dem Allleben nur eigne Seiten ihrer Offenbarung sind,) über alle Truggestalten des Lebens, die selbst, indem sie ihnen die Maske abnimmt, zu Gegenständen der Erkenntniß werden; daher auch kein Heil im Leben in etwas anderem als in der Wahrheit, und keine Beeinträchtigung desselben, außer in dem Wahn und der Täuschung. (H.)

*Existimatio*, f. Urtheil, vgl. auch Ehre.

*Existimativa virtus*, f. Urtheilskraft.

*Exitus pelvis*, f. unter Aperturen des Beckens, die untere.

*Exoneirogmos*, *Exoneirosis*, in Uebersetzung der gleichlautenden Griechischen Worte<sup>1</sup>, i. q. Pollutio.

<sup>1</sup>) ἐξονειρωγμος, ἐξονειρωσις. Vgl. van der Linden sel. med. exeg. 15. S. 36 — 38.

*Exordium unguum*, f. Lunula der Nägel.

*Exorsus*, *Exortus*, f. Ursprung.

*Exortus anteriorum ventriculorum cerebri*, f. Olfactorischer Nerv. — *intestinorum*, i. q. Duodenum.

*Exos*, *Exossis*, e, *Exossus*, a, um, ein Thier oder Theil ohne Knochen. S. Knochenlos.

*Exosculatio*, f. Küssen.

*Exossis*, *Exossus*, f. Exos.

*Expansibilität*, (*Expansibilitas*,) Ausdehnbarkeit, Fähigkeit zur Expansion. S. Expansive Kraft.

*Expansion*<sup>1</sup>, (*Expansio*<sup>2</sup>,) Ausdehnung<sup>3</sup>, gründet sich auf die Ausdehnbarkeit, Expansibilität, der Materie. Der Atomist erklärt sie aus der Porosität derselben; der Dynamiker sieht sie als Aeußerung einer der beiden bewegenden Grundkräfte, der Repulsivkraft, an. Wie dem auch sei, die sinnlichen Merkmale der ausgedehnten Materie bestehen hauptsächlich darin, daß sie einen größern Raum, als vorher einnimmt, und in demselben Verhältniß an ihrer specifischen Schwere abnimmt; außerdem erhalten die luftförmigen mit steigender Ausdehnung auch größere Capacität für die Wärme.

<sup>1</sup>) Döllinger's Grundr. d. Naturl. d. menschl. Organism. S. 54. <sup>2</sup>) in der Bedeutung von Ausbreitung, oder Ausdehnung des Körpers, Coelii Aureliani tard. pass. 1. S. 6. 2. <sup>3</sup>) Kant's metaph. Anfangsgr. d. Naturwiss. S. 58.



Diese Wärme ist aber bei weiten am häufigsten diejenige in die Sinnen fallende Ursache, welche Ausdehnung hervorbringt. So nimmt Luft, wenn sie vom Eispunkte bis zum Siedepunkte erhitzt wird, einen 3375 Mal größern Raum ein; Wasser vergrößert seinen Umfang unter denselben Bedingungen um 1,045, Eisen aber nur um 1,001. Lavoisier hat das merkwürdige Gesetz aufgestellt, daß alle luftförmigen Körper, Dämpfe sowohl als Gase, durch Wärme in gleichem Grade und bei jeder fortgesetzten Erhitzung, durch dieselbe neu zuge-setzte Menge Wärme, auch gleichförmig ausgedehnt werden, während dieses nicht auf tropfbare und starre Körper paßt. Denn diese weichen in der Gleichartigkeit ihrer Ausdehnung durch gleiche Wärmemengen gar sehr von einander ab. Blausäure, Schwefelsäure, Aether dehnen sich stärker aus als Weingeist, diesen stehen wieder nach Salpetersäure, Wasser, endlich Quecksilber. Dieses dehnt sich unter allen Metallen am stärksten aus, ihm folgen nächst Platin, dann Eisen, Kupfer, Zink, Spießganz, Wismuth, Blei, Zinn, Stahl, Messing. Glas dehnt sich ungemein wenig aus. (Sicinus.)

*Expansio aponeurotica*, i. q. Aponeurosis. — — *diaphragmatis*, s. Aponeurotische Expansion des Diaphragma's. — *cordis et arteriarum*, s. Diastole. — *tendinea*, i. q. Aponeurosis. — — *diaphragmatis*, s. Aponeurotische Expansion des Diaphragma's.

*Expansionskraft*, *Expansionsvermögen*, s. Expansive Kraft. *Expansiva electricitas*, s. Positive Electricität. — *vis*, s. expansive Kraft.

*Expansive Electricität*, s. Positive Electricität.

*Expansive Kraft*<sup>1</sup>, *Expansionskraft*, *Expansionsvermögen*<sup>2</sup>, *Ausdehnungskraft*<sup>3</sup>; (*Vis expansiva*), das in Gegensatz der contractiven Kraft, (*Attraktionskraft*), als Naturthätigkeit, oder potentiell, unterschiedene Princip aller Raumerfüllung, als Eigenschaft der Körper, auch als Expansibilität bezeichnet. S. Expansion.

1) Kant's metaph. Anfangsgr. d. Naturwiss. S. 37. 2) Burdach's Diätetik, 1. Th. S. 15. 3) Kant's metaph. Anf. u. s. w. S. 36.

*Experientia*, s. Erfahrung.

*Experimentalis anatomia*, s. Anatomische Technik.

*Experimentum Mariotti*, s. Mariottischer Versuch.

*Expiratio*, i. q. Exspiratio.

*Explantatio*, i. q. Apophysis.

*Expositio naturae dynamiæ*, s. Dynamische Naturerklärung.

— — *mechanica*, s. Mechanische Naturerklärung.

*Expulsio*, s. Excretion. — *faecum*, s. Darmausleerung. —

*coetus*, s. Geburt. — *seminis*, s. Ejaculation des Samens.

*Expultrix facultas*, s. Austreibende Facultät.

*Expurgatoria organa*, s. unter Excretionsgebilde.

*Exsanguis*, e, s. Blutlos.

*Exscretio*, s. Räuspern, ingl. Husten.

*Exsectio virilium*, s. Castration.

*Exsectus*, i. q. Castratus. S. Castrat.

*Exsecutiva facultas*, f. Vollziehende Facultät.

*Exsecutoria organa*, f. Vollziehende Organe.

*Expiration*, (*Exspiratio*<sup>2</sup>), Ausathmen<sup>3</sup>, Ausathmung<sup>4</sup>, Aushauchen, (*Expiratio*<sup>5</sup>, *Ecpnoe*<sup>6</sup>, *Ecpnysis*<sup>7</sup>, *Efflatio*<sup>8</sup>, *Exsufflatio*<sup>9</sup>), derjenige Theil der Function des Athmens, wo die in die Lungen gezogene Luft theils durch Nachlaß der Thätigkeit der Muskeln, welche das Einathmen bewirkten, theils durch die Thätigkeit der Muskeln, welche von jenen Antagonisten abgeben; wie besonders beim angestregten und anhaltenden Ausathmen; wieder ausgestoßen wird. S. *Respiration*.

1) Denon's Physiol. 1. B. S. 306. 2) eigentlich Ausdünstung, vgl.

*Exhalatio*. S. Haller's elem. physiol. T. III. l. 8. s. 4. c. 1. 3)

Haller's Grundr. d. Physiol. umgearb. von v. Lebeling, 1. Th. 4. Abschn.

4) Heuermann's Physiol. a. a. D. 5) Vesalii de h. c. fabr. l. 2.

c. 35. 6) Val. d. d. W. 7) Heftiges Ausathmen, vgl. d. d. W. 8)

9) gleichbedeutend mit *Ecpnysis*. Vgl. Foessii oec. Hipp. v. ex-

*Exspulio*<sup>1</sup>, f. Ausspucken.

1) W. d. d. l. physiol. med. s. 3. c. 23.

*Exsuctio*, f. Saugen.

*Exsultatio*, f. Springen.

*Exsurrectio*, f. Aufstehen.

*Extā*, f. Eingeweide.

*Extalis*, f. Mastdarm.

*Extendirende Muskeln*, (*Extendentes musculi*<sup>1</sup>),

Ausstreckende Muskeln<sup>2</sup>, Ausstreckemuskeln<sup>3</sup>, Ausstre-

cker<sup>4</sup>, Streckmuskeln<sup>5</sup>, Strecker<sup>6</sup>, (*Extensores*<sup>7</sup>), Mus-

keln, deren Hauptwirkung darin besteht, daß Glieder, welche einer

Biegung gegen einander fähig sind, in gerader oder gestreckter Rich-

tung erhalten werden. S. *Muskeln*.

1) Spigelii de h. c. fabr. l. 4. c. 4. 2) Mayer's Besch. d. menschl.

S. 5. B. S. 107. 3) Cuvier's Zergliederungsk. Uebers. Leipz. 1782,

1. B. S. 385. 4) Winslow's anat. Abb. Uebers. Weid. 1753, 2. B.

S. 17. 5) Valsyn's chir. Anat. Uebers. v. Duth, 1. B. S. 244.

6) Commerring's Muscell. S. 44. 7) Th. Bartholini anat.

l. 4. c. 9 u. a. a. D.

*Extensio*, f. Ausdehnung, auch *Extension*, auch *Erection*. — *cor-*

*dis et arteriarum*, f. Diastole.

*Extension*, (*Extensio*<sup>1</sup>), Ausstreckung, Ausstrecken<sup>2</sup>,

Streckung<sup>3</sup>, wird insbesondere, im Gegensatz der *Flexion*, diejenige

Muskelwirkung genannt, welche ein bewegliches Glied des Körpers

das einer Biegung gegen das andere fähig ist, gegen dasselbe in eine

gerade oder gestreckte Richtung bringt und erhält. S. *Muskeln*.

1) Riolani anthropogr. l. 5. c. 75. 2) Cuvier's Zergliederungsk.

Uebers. Leipz. 1782, 1. B. S. 409. 3) Commerring's Muscell. S. 41.

*Extensor carpi radialis, brevis et longus*, f. Radialexten-

soren. — *ulnaris*, f. Ulnarextensor. — *cubiti brevis, longus,*

*magnus*, f. unter Anconäen.

*Extensor der Finger*, (*Extensor digitorum communis*<sup>1</sup>, s.

*digitorum manus communis*<sup>2</sup>, s. *quatuor digitorum*<sup>3</sup>, s. qua-

1) nach Comper (myotom. ref. c. 23.) 2) nach Albin (hist. musc. hom.

4. ed. p. 393) 3) Winslow expos. anat. lat. vers. T. II. tr. de

musc. S. 326.



Extensor digitorum communis <sup>4</sup>, s. digitorum magnus <sup>5</sup>,) Gemeinschaftlicher Fingerstrecker <sup>6</sup>, Ausstrecker der Finger <sup>7</sup>, Gemeinschaftlicher Ausstreckemuskel <sup>8</sup>, oder Gemeiner Streckemuskel <sup>9</sup> der Finger, Gemeinschaftlicher Ausstrecker der vier Finger <sup>10</sup>, Gemeiner Spanner des vierten und dritten Gelenks der Finger <sup>11</sup>, (Tensor digitorum <sup>12</sup>, s. communis digitorum secundi et tertii interphalangei <sup>13</sup>, Musculus condylo-dorso-phalangeus <sup>14</sup>, s. epi-condylo-supra-phalangeus communis <sup>15</sup>,) der längliche, an der äußeren Fläche des Unterarms liegende, zur Ausstreckung der Finger bestimmte Muskel, welcher vom äußern Condylus des Oberarmknochens, in Verbindung mit dem kurzen Radialextensor und dem Interosseus der Hand entspringt, abwärts steigend sich in vier, unter dem Dorsalligament des Carpus weglaufende, runde Sehnen theilt, von denen zu jedem Finger eine geht und sich, indem solche sich am nächsten Gliede in drei Schenkel theilt, so ansetzt, daß der mittlere jeder Sehne an das obere Ende der zweiten Phalanx geht, die beiden Seitenschänkel aber zusammen an die dritte Phalanx sich befestigen. S. Handmuskeln.

1) Hempel's Anfangsgr. d. Anat. 2. Aufl. §. 101.      5) nach Meckel (anthropogr. 1. 5. c. 29.)      6) nach Sommering (Muskel. §. 232.)  
7) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 2. B. §. 1204.      8) Fleury's Zergliederungskf. Uebers. Leipz. 1782, 1. B. S. 410.      9) Palfyn's chr. Anat. übers. v. Huth, 1. Th. S. 289.      10) Schaarschmidt's mñol. Tabell. Tab. 17.      11) Browne's verteutschte Besch. d. Musc. v. Spener, Berl. 1704, S. 63.      12) nach Laurentius (hist. anat. 1. 5. c. 28.)      13) Browne's verteutschte Besch. n. f. w. a. a. D.      14) nach Schreger (Nomenclat. d. Musc. S. 19.)      15) (Epi-condylo-supra-phalangeus communis) nach Chaussier (expos. sommaire des musc. p. 16.)

Extensor des Fußes, (Extensor tarsi magnus <sup>1</sup>, s. sura-  
lex <sup>2</sup>,) Großer Ausstreckemuskel des Fußes <sup>3</sup>, Ausstrecker des Wadenmuskels der Fußwurzel <sup>4</sup>. Unter diesen Bezeichnungen werden der Gastrocnemius und Soleus als ein einziger Muskel gefaßt. S. Fußmuskeln.

1) 2) nach Douglas (myogr. compar. c. 42.)      3) 4) Fleutaud's Zergliederungskf. Uebers. Leipz. 1782, 1. B. S. 470 in der Anmerkung.

Extensor des kleinen Fingers, (Extensor digiti minimi <sup>1</sup>, digiti minimi manus <sup>2</sup>, s. proprius <sup>3</sup>, s. digiti auricularis proprius <sup>4</sup>,) Strecker <sup>5</sup>, oder Eigener Strecker des kleinen Fingers <sup>6</sup>, Ausstrecker <sup>7</sup>, oder Streckemuskel <sup>8</sup>, oder eigenthümlicher ausstreckender Muskel <sup>9</sup>, oder Eigener Ausstreckemuskel <sup>10</sup> des kleinen Fingers, Streckemuskel des Ohrlingers <sup>11</sup>, Spanner des kleinen Fingers <sup>12</sup>, Tensor digiti minimi <sup>13</sup>, M. condylo-phalangeus auricula-

1) Douglas, descr. comp. musc. c. 36.      2) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 2. B. §. 1205.      3) Sommering's Muskel. §. 234.  
4) Albini hist. musc. 4. ed. p. 397.      5) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. §. 1132.      6) Sommering's Muskel. a. a. D.      7) Hildebrandt's Lehrb. n. f. w. a. a. D.      8) Palfyn's chr. Anat. übers. v. Huth, 1. B. S. 294.      9) Mayer's Besch. d. menschl. K. 3. B. S. 418.      10) Fleutaud's Zergliederungskf. 1. Th. Uebers. Leipz. 1782, S. 412.      11) Foder's anat. Tafeln, Taf. 30. Nr. 78.      12) 13) Browne's verteutschte Besch. d. Musc. v. Spener, Berl. 1704, S. 71.

# 856 Extensor d. Zeigefingers Extensor internodii sec. etc.

ris <sup>14</sup>, s. epicondylo-supra-phalangeticus digiti minimi <sup>15</sup>, der längliche kleine Muskel, welcher am äußern Condylus des Oberarmknochens entspringt, oberwärts mit dem Extensor der Finger und dem Ulnarextensor der Hand, zwischen denen er liegt, in Verbindung steht, sich, oberwärts gehend, mit der zum kleinen Finger gehenden Sehne des erstern ebenfalls zu demselben begibt, diesen ausstreckt und ihm eine freiere Bewegung verstatet. S. Handmuskeln.

14) nach Schreger (Nomenclat. d. Musc. S. 20.) 15) (Epicondylo-sus-phalangeticus du petit doigt) nach Chaussier (expos. sommaire des musc. p. 16.)

**Extensor des Zeigefingers**, (Extensor indicis <sup>1</sup>, s. indicis proprius <sup>2</sup>,) Zeigefingerstrecker, Eigenthümlicher ausstreckender Muskel <sup>3</sup>, oder Ausstrecker <sup>4</sup>, oder Eigner Ausstrecker <sup>5</sup>, oder Ausstreckemuskel <sup>6</sup>, oder Streckemuskel <sup>7</sup>, oder Strecker <sup>8</sup> des Zeigefingers, Zeigefingermuskel, Zeigendes Mäuslein <sup>9</sup>, (Extensor secundi internodii indicis proprius <sup>10</sup>, Indicator <sup>11</sup>, Musc. indicatorius <sup>12</sup>, s. ulno-phalangaeus index <sup>13</sup>, s. cubito-supra-phalangeticus, s. phalangeticus indicis <sup>14</sup>, Abductor indicis <sup>15</sup>,) der dünne, längliche Muskel, welcher in der Mitte der äußern Fläche der Ulna entspringt, sich unter dem Extensor der Finger und unter der Sehne, welche von diesem zum Zeigefinger geht, ebenfalls zu diesem begibt, dieselbe Anlage hat, den Zeigefinger ausstreckt und ihm eine freiere Beweglichkeit gestattet. Auch findet sich wohl ein Seltner kurzer Strecker des Zeige- oder Mittelfingers <sup>16</sup>, (Extensor digiti indicis vel medii brevis <sup>17</sup>,) auf dem Rücken der Hand, der von der Rinne für die Sehne des gemeinschaftlichen Extensors der Finger in der untern Extremität des Radius aus sich zur Seite jener Sehne an das erste Glied des Zeigefingers, oder auch mittlern Fingers, als Mittelfingerstrecker <sup>18</sup> anlegt. S. Handmuskeln.

- 1) nach Cowper (myotom. ref. c. 28.)
- 2) Winslow exp. anat. lat. vers. T. II. tr. de musc. §. 331.
- 3) Wäner's Besch. d. menschl. A. 3. B. S. 417.
- 4) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 2. B. §. 1207.
- 5) Schearfsmidt's myel. Tabell. Tab. 17.
- 6) Plencaud's Vergleich. Uebers. Selpz. 1782, 1. B. S. 413.
- 7) Palsyn's Hlr. Anat. übers. v. Huth, 1. B. S. 295.
- 8) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. §. 1145.
- 9) nach Alimus (anat. Tabell. Tab. 28.)
- 10) nach Douglas (myogr. compar. c. 35.)
- 11) nach Risolan (anthropogr. 1. S. c. 29.)
- 12) nach Arantius (obs. anat. c. 42.)
- 13) nach Schreger (Nomenclat. d. Musc. S. 20.)
- 14) (Cubito-sus-phalangeticus de l'index) nach Chaussier (expos. sommaire des musc. etc. p. 19.)
- 15) nach Westling (syntagm. anat. c. 18.)
- 16) 17) Sommering's Musckell. §. 258.
- 18) Meckel's Handb. u. f. w. a. a. D. §. 1146.

**Extensor digiti auricularis**, s. Extensor des kleinen Fingers. — — **indicis vel medii brevis**, s. unter Extensor des Zeigefingers. — — **minimi proprius**, s. Extensor des kleinen Fingers. — **digitorum communis**, s. **digitorum magnus**, s. **manus**, s. Extensor der Finger. — — **pedis brevis**, s. unter Extensoren der Behen, den kurzen Extensor. — — — **communis**, s. **longus**, s. unter Extensoren der Behen, den langen Extensor. — **indicis**, s. **indicis proprius**, s. Extensor des Zeigefingers. — **internodii secundi et tertii digitorum pedis**, s. Extensoren der Behen.



— — — — *pollicis*, s. Extensoren des Daumens. — — —  
*allicis proprius*, i. q. E. indicis. — — *tertiij minimi digi-*  
 f. Abductor des kleinen Fingers. — *pollicis brevis, longus,*  
*minor*, s. Extensoren des Daumens. — — *internodii*  
*mini*, s. *primus*, s. unter Abductoren des Daumens, den langen  
 Abductor. — — *pedis brevis et longus*, s. *proprius*, s. Ex-  
 tensoren der großen Zehe. — *tarsi magnus*, s. *suralis*, s. Exten-  
 sor des Fußes. — — *minor*, i. q. Plantaris.

Extensoren, s. Extendirende Muskeln.

Extensoren der großen Zehe, (*Extensores pollicis pedis* <sup>1</sup>, s. *pollicis* <sup>2</sup>.) Ausstrecker <sup>3</sup>, oder Streckmuskeln <sup>4</sup> der großen Zehe, die beiden der großen Zehe eigenen, und zum Ausstrecken desselben bestimmten Muskeln, und zwar a) ein langer, (*Extensor longus* <sup>5</sup>, s. *proprius* <sup>6</sup>.) Streckter der großen Zehe <sup>7</sup>, eigener Streckter <sup>8</sup>, oder Ausstrecker der großen Zehe <sup>9</sup>, Ausstrecker des großen Zehes <sup>10</sup>, Ausstreckemuskel der großen Zehe <sup>11</sup>, (*Tensor pollicis pedis* <sup>12</sup>, *Musculus peroneo-supra-phalangeus pollicis* <sup>13</sup>, s. *peroneo-supra-phalangeus pollicis* <sup>14</sup>, s. *peroneo-dorso-phalangeus* <sup>15</sup>, s. *peroneo-supra-unguicularis* <sup>16</sup>.) welcher als ein gefiederter Muskel zwischen dem vordern Tibialis und dem langen Extensor der Zehen liegt, vorwärts von der innern Fläche der Fibula und dem Zwischenknochenligament des Unterschenkels entspringt, abwärts und mit seiner Sehne unter dem Kreuz- und Querligament des Fußes hinweg geht, und sich, verbunden mit der Sehne des folgenden Muskels, an der Oberfläche des zweiten Gliedes ansetzt, und b) ein kürzer, (*Extensor brevis* <sup>17</sup>, s. *brevis Cowperi* <sup>18</sup>.) welcher auf der Dorsalfläche des Fußes am Calcaneus entspringt, sich am ersten Gliede der großen Zehe befestigt, und als der innere Theil des kurzen Extensors der Zehen betrachtet werden kann, auch von den meisten Anatomicern als solcher, und nicht als eigener Muskel beschrieben wird. S. Ausstrecker.

- 22) nach Cowper (myotom. ref. c. 55.) 2) 3) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 2. B. S. 1296 u. 1298. 4) Valign's chl. Anat. überf. v. Huth, 1. B. S. 315. 5) nach Cowper (a. a. O.) 6) nach Albin. (hist. musc. hom. 4. ed. p. 320.) 7) nach Sommering (Muskell. S. 317.) 8) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 593. 9) Schaarschmidt's myol. Tabell. Tab. 4. 10) Brown's verteilte Besch. d. Musc. v. Spener, Berl. 1704, S. 95. 11) Meckel's Vergleichungsk. überf. Leipzig. 1782, 1. B. S. 481. 12) nach Spiegel (de hum. c. fabr. l. 4. c. 27.) 13) (Peroneo-sus-phalangeus du pouce) nach Chaussier (expos. sommaire des musc. etc. p. 33.) 14) (Péronéo-sus-phalangien du pouce) nach Dumas (système method. de nomenclat. des musc. p. 186.) 15) nach Schreger (Nomencl. d. Musc. S. 23.) 16) (Péronéi-sus-onguen) nach Dumeril (Euvier's Vert. les. über vergl. Anat. S. 470.) 17) nach Cowper (a. a. O.) 18) nach Duglase (myogr. compr. c. 44.)

Extensoren der Zehen, (*Extensores digitorum pedis* <sup>1</sup>, *digitorum pedis communes* <sup>2</sup>.) Zehenstrecker <sup>3</sup>, Ausstre-  
 1) nach Cowper (myot. ref. c. 36.) 2) Winslow exp. anat. lat. vers. T. II. tr. de musc. S. 518 u. 522. 3) nach Sommering (Muskell. S. 315 u. 318.)

der <sup>4</sup>, oder Streckmuskeln <sup>5</sup>, oder Ausstreckmuskeln <sup>6</sup> der Zehen, Gemeinschaftliche Ausstreckmuskeln der Zehen <sup>7</sup>, (Tensores digitorum pedis <sup>8</sup>), die beiden, zum Ausstrecken der Zehen dienenden Muskeln, von welchen a) der lange <sup>9</sup>, (Extensor longus <sup>10</sup>), Ausspanner des dritten Zwischengelenks der Zehe <sup>11</sup>, Gemeinschaftlicher Zehenstrecke <sup>12</sup>, oder Ausstreckemuskel <sup>13</sup> der Zehen, (Extensor tertii internodii digitorum pedis <sup>14</sup>, s. communis digitorum pedis <sup>15</sup>, Musculus cnemo-dactyleus <sup>16</sup>, s. tibiaeo-dorso-phalangaeus <sup>17</sup>, s. peroneo-supra-phalangeticus communis <sup>18</sup>, s. peroneo-tibia-supra-phalangeticus communis <sup>19</sup>), neben dem vordern Tibialis und dem langen Extensor des Daumens liegend, an der äußern Fläche der Tibia, dem Kopfe der Fibula, und von dem Zwischenknochenligament des Unterschenkels entspringt, abwärts und unter dem Querligament und Kreuzligament des Fußes weggehend, sich in vier Sehnen theilt, deren je eine zum ersten Gliede einer der vier letzten Zehen geht, hier mit den Sehnen des folgenden Muskels, des Lumbricalis und Zwischenknochenmuskels jeder Zehe in Verbindung steht, sich aber nun wieder in drei Schenkel spaltet, von denen der mittlere an das zweite, die beiden Seitenschlenkel aber zum dritten Gliede der Zehen gehen, b) der kurze <sup>20</sup>, (Extensor brevis <sup>21</sup>), Ausspanner des zweiten Zwischengelenks der Zehe <sup>22</sup>, Fußmuskel <sup>23</sup>, (Extensor secundi internodii digitorum pedis <sup>24</sup>, Musculus pedieus <sup>25</sup>, s. calcaneo-dorso-phalangaeus <sup>26</sup>, s. calcaneo-supra-phalangeticus, s. phalangeticus communis <sup>27</sup>, s. calcaneo-supra-unguicularis <sup>28</sup>), seine Lage auf dem Rücken des Fußes hat, vom Calcaneus kommt, sich, vorwärts gehend, in drei Sehnen spaltet, die sich an das erste Glied der zweiten, dritten und vierten Zehe ansetzen. Sein mehr nach innen liegender Theil kommt auch unter dem Nahmen des kurzen Extensors der großen Zehe vor.

G. Fußmuskeln.

- 4) nach Schöar Schmidt (muscl. Tab. II. Tab. 21.) 5) Palfyn's Chr. Anat. Übers. v. Huth, 1. B. S. 313. 6) 7) Meutaud's Zergliederungskf. Übers. Leipz. 1782, 1. B. S. 479 u. 480 in den Anmerkungen. 8) nach Kriolan (anthropogr. 1. 5. c. 44.) 9) 10) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 3. B. S. 1294. 11) Browne's verteutschte Besch. d. Musc. v. Spener, Berl. 1704, S. 94. 12) Meckel's Handb. d. menschl. Anat. 2. B. S. 591 u. 596. 13) Meutaud's Zergliederungskf. u. f. w. a. a. D. 14) Browne's verteutschte Besch. u. f. w. a. a. D. 15) Meutaud's Zergliederungskf. u. f. w. a. a. D. 16) Blasii med. univ. p. 111, 219. 17) nach Schreger (Nomenclat. d. Musc. S. 22.) 18) (Peroneo-sus-phalangeticus commun.) nach Chaussier (expos. sommaire des musc. etc. p. 33.) 19) (Peroneo-tibi-sus-phalangeticus commun.) nach Dumas (système method. de nomenclat. des musc. p. 138.) 20) 21) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. S. 1298. 22) Browne's verteutschte Besch. u. f. w. a. a. D. 23) Meutaud's Zergl. u. f. w. a. a. D. S. 486. 24) Browne's verteutschte Besch. u. f. w. a. a. D. 25) nach Kriolan (1. c.) 26) nach Schreger (a. a. D. S. 23.) 27) (Calcaneo-sus-phalangeticus commun.) nach Chaussier (a. a. D. S. 41.) 28) (Calcaneo-sus-unguicus) nach Dumeril (Cuvier's Vorl. über vergl. Anatom. S. 476.)

Extensoren des Daumens, (Extensores pollicis <sup>1</sup>, Exten-

1) nach Albin (hist. musc. hom. 4. ed. p. 403 u. 407.)



pollicis secundus <sup>2</sup>), Streck<sup>3</sup>, oder Streckmuskeln <sup>4</sup> Daumens, Ausstreck<sup>5</sup>, oder Ausstreckende Mus-  
<sup>6</sup>, oder Zweiter Ausstreckemuskel <sup>7</sup> des Daumens,  
 Innenstreck<sup>8</sup>, Spanner des andern und dritten  
 Gelenkheins des Daumens <sup>9</sup>, (Tensor secundi et tertii in-  
 ternodii pollicis <sup>10</sup>, Musculi ulno-dorso-phalangei pollicis <sup>11</sup>),  
 beiden zum Ausstrecken des Daumens bestimmten Muskeln, von  
 a) der größere oder längere <sup>12</sup>, oder große <sup>13</sup>, (Ex-  
 tensor major <sup>14</sup>, s. longus <sup>15</sup>, s. proprius longus <sup>16</sup>, Exten-  
 tertii internodii ossis pollicis <sup>17</sup>, Musculus cubito-supra-  
 phalangeus. s. phalangettieus <sup>18</sup>), an der äußern Fläche der  
 ulna, über deren Mitte, und von der Zwischenknochenmembran des  
 Vorderarms entspringt, sich über das untere Ende des Radius hinweg-  
 setzt, unter dem Dorsalligament des Carpus und über den Sehnen  
 Radialextensoren der Hand zum Metacarpus des Daumens geht,  
 der mit dem folgenden Muskel in Verbindung tritt, und sich an  
 erste Phalanx des Daumens ansetzt, b) der kleinere, oder  
 kürzere <sup>19</sup>, (Extensor minor <sup>20</sup>, s. brevis <sup>21</sup>, s. proprius  
 brevis <sup>22</sup>, Extensor secundi internodii ossis pollicis <sup>23</sup>, Mus-  
 culus cubito-supra-phalangeus pollicis <sup>24</sup>), aber von der Spina  
 der Zwischenknochenmembran des Vorderarms kommt, sich auf  
 dieselbe Weise zum Daumen begibt und sich an das obere Ende des  
 ersten Gliedes desselben befestigt. Einige ältere Anatomen betrachteten  
 die Muskeln als einen einzigen. S. Handmuskeln.

1) Kleutaud's Zeralederungst. Uebers. Leipz. 1782, 1. B. S. 415. 3) nach  
 Schömmerring (Muskell. S. 255.) 4) Valsby's chir. Anat. Uebers. v.  
 Duth, 1. B. S. 293. 5) nach Schaarschmidt (myol. Tabell. Tab. 17.)  
 6) Mayer's Besch. d. menschl. K. 7. B. S. 420. 7) Kleutaud's  
 Zeralederungst u. f. w. a. a. D. 8) Meckel's Handb. d. menschl. Anat.  
 2. B. S. 517 u. 518. 9) 10) Browne's verteilte Besch. d. Musc.  
 v. Spener, Berl. 1704, S. 70. 11) nach Schreger (Nomenclat. d.  
 Musc. S. 20.) 12) Hildebrandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 2. B. S. 1208.  
 13) Mayer's Besch. u. f. w. a. a. D. 14) nach Albin (l. c. p. 407.)  
 15) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. 16) Schaarschmidt's  
 myol. Tab. a. a. D. 17) nach Cowper (myot. ref. c. 29.) 18) (Cu-  
 bito-sus-phalangettien du ponce) nach Chaussier (expos. sommaire  
 des musc. p. 18.) 19) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. S. 1209.  
 20) nach Albin (l. c. p. 405.) 21) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w.  
 a. a. D. 22) Schaarschmidt's myol. Tabell. a. a. D. 23) nach  
 Cowper (l. c.) 24) (Cubito-sus-phalangien du ponce) nach Chauf-  
 sier (a. a. D.)

**Extensores**, s. Extendirende Muskeln. — *carpi radialis*, s.  
 Radialextensoren der Hand. — *digitorum pedis*, s. Extensoren  
 Zehen. — *hallucis*, s. Extensoren der großen Zehe. — *ma-*  
*is*, s. Radialextensoren und Ulnarextensor der Hand. — *pol-*  
*is*, s. Extensoren des Daumens. — — *pedis*, i. q. E. hal-  
 lucis.

**Extensoria bursa mucosa digiti minimi**, s. unter Fingere-  
 extensoren Schleimsäcke.

**Extensorius condylus ossis humeri**, s. unter Condylen des  
 Oberarmknochens.

**Exterior, Exterius**, u. f. w., s. Äußerer, Äußere, Äuße-  
 3. u. f. w.

360 Exterior cort. tunic. vag. Extremitäten d. Kn. d. Metat.

*Exterior cortex tunicae vaginalis*, s. Vaginalhäute des Testikels.  
*Exstesticulatus*, i. q. Exsectus.

*Extima cuticula*, s. *cutis*, i. q. Epidermis.

*Extra-pelvio-trochantericus musculus*, s. unter Obturatoren, äußerer Obturator.

*Extrema*, s. Extremitäten. — *cuticula*, s. *cutis*, i. q. Epidermis. — *palpebrarum*, s. Ränder der Augenlider.

**Extremitäten** (*Extremitates*<sup>2</sup>.) Enden, Endtheile, (*Extrema*, s. *Extremae partes*<sup>3</sup> corporis, *Acroteria*<sup>4</sup>.) im umfassenden Sinn alle äußersten, und am entferntesten liegenden Körpertheile in relativer Beziehung auf das Ganze, insbesondere aber am menschlichen Körper Arme und Füße. Vgl. auch Glieder.

1) Loder's anat. Handb. 1. B. S. 22. 2) Plinii hist. mundi 1. 28. c. 6. 3) Spigellii de h. c. fabr. 1. i. c. 1. 4) Vgl. dieß Wort.

**Extremitäten an Knochen**, (*Extremitates ossis*<sup>1</sup>.) Endtheile<sup>2</sup>, oder Enden<sup>3</sup> eines Knochens, werden besonders die Endstücken eines langen Knochens in Bezug auf den mittlern Theil, als den Körper derselben, benannt. S. Knochen.

1) Walter's Abb. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 27. 2) Palfyn's chr. Anat. übers. v. Puth, 1. Th. S. 34. 3) Walter's Abb. u. f. w. a. a. D.

**Extremitäten an Muskeln**, (*Extremitates musculorum*<sup>1</sup>.) die beiden Enden eines Muskels in Bezug auf dessen mittlern Theil, oder sogenannten Bauch, und dann gewöhnlich als Kopf und Schwanz unterschieden. S. Muskeln.

1) Douglas myogr. compar. in introductione.

**Extremitäten der Fibula**<sup>1</sup>, (*Extremitates fibulae*<sup>2</sup>.) Endtheile<sup>3</sup>, oder Enden<sup>4</sup> des Wadenbeins: a) die obere<sup>5</sup>, (*E. superior*<sup>6</sup>.) s. Kopf der Fibula, b) die untere<sup>7</sup>, (*E. inferior*<sup>8</sup>.) s. unter Knöcheln, äußerer Knöchel. S. auch Fibula.

1) Walter's Abb. v. trock. Knoch. S. 266. 2) Schaarschmidt's osteol. Tabell. Tab. 22. Nr. 4. 3) Palfyn's chr. Anat. übers. v. Puth, 1. B. S. 199. 4) Loder's anat. Handb. 1. B. S. 200. 5) — 8)

Walter's Abb. u. f. w. und Schaarschmidt's osteol. Tab. a. a. D.

**Extremitäten der Hand**<sup>1</sup>, (*Extremitates manus*;) dergleichen werden a) eine obere<sup>2</sup>, (*Extremitas superior*, s. *brachialis*<sup>3</sup>.) (vgl. Brachialfläche der Knochen des Carpus,) und b) eine untere<sup>4</sup>, (*Extremitas inferior*, s. *digitalis*<sup>5</sup>.) unterschieden, (vgl. Spitzen der Finger.) S. Hand.

1) — 5) Walter's Abb. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 312.

**Extremitäten der Knochen des Metacarpus**<sup>1</sup>, (*Extremitates ossium metacarpi*<sup>2</sup>.) Endtheile, oder Enden<sup>3</sup> des Mittelhandknochens: a) die obere<sup>4</sup>, (*E. superior*;) s. Basis der Knochen des Metacarpus, b) die untere<sup>5</sup>, (*E. inferior*;) s. Köpfehen der Knochen des Metacarpus. S. auch unter Handknochen.

1) Walter's Abb. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 332. 2) Schaarschmidt's osteol. Tabell. Tab. 21. Nr. 2 u. 3. 3) — 5) Loder's anat. Handb. 1. B. S. 265.

**Extremitäten der Knochen des Metatarsus**<sup>1</sup>, (*Extremitates ossium metatarsi*;) Endtheile, oder Enden<sup>2</sup> des Mittelfußknochens: a) die obere<sup>3</sup>, (*E. superior*;) s. Basis der Knochen des Metatarsus, b) die untere<sup>4</sup>, (*E. inferior*;) s. Köpfehen der Knochen des Metatarsus. S. auch unter Fußknochen.

1) Walter's Abb. v. trockn. Knoch. S. 391.



**Extremitäten d. Phal. d. Finger** - **Extremit. d. Ulna** 361  
 ss ossium metatarsi,) Endtheile<sup>2</sup>, oder Enden<sup>3</sup> der Mitt-  
 fußknochen: a) die hintere<sup>4</sup>, (E. posterior<sup>5</sup>.) f. Basis  
 Knochen des Metatarsus, b) die vordere<sup>6</sup>, (E. an-  
 ter<sup>7</sup>.) f. Köpfschen der Knochen des Metatarsus. S.  
 Fußknochen.

Schaarschmidt's osteol. Tabell. Tab. 23. Nr. 2. 3) Pöder's anat.  
 Handb. 1. B. 823. 4) — 7) Walter's Abh. u. f. w. und Schaars-  
 Schmidt's osteol. Tab. a. a. D.

**Extremitäten der Phalangen der Finger<sup>1</sup> und Zehen<sup>2</sup>,**  
 extremitates phalangum digitorum<sup>3</sup>.) Endtheile<sup>4</sup>, oder  
 Enden<sup>5</sup> der Finger- und Zehenglieder: a) eine obere<sup>6</sup>,  
 superior<sup>7</sup>.) an jedem Gliede, f. Basis der Phalangen  
 Finger und Zehen, b) eine untere<sup>8</sup>, (E. inferior<sup>9</sup>.) f.  
 Köpfschen der Phalangen der Finger und Zehen, vgl.  
 Fingern der Finger und Zehen. S. auch Handknochen.

2) Walter's Abh. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 324 u. 399. 3) Schaars-  
 Schmidt's osteol. Tabell. Tab. 21. Nr. 3. 4) Pöder's anat. Handb.  
 1. B. 184 u. 207. 5) — 9) Pöder's anat. Handb.  
 1. B. 274 u. 330.

**Extremitäten der Rippen<sup>1</sup>,** (Extremitates costarum<sup>2</sup>.)  
 Endtheile<sup>3</sup>, oder Enden der Rippen<sup>4</sup>, die an den Körpern  
 Rippen befindlichen beiden Endtheile, von denen a) die vor-  
 dere<sup>5</sup>, untere<sup>6</sup> als Brustbeinende, (E. anterior<sup>7</sup>, s. su-  
 prior, Palmula<sup>8</sup>.) welche den vordern dickern Theil des Körpers  
 der Rippe ausmacht und vorwärts mit dem Rippenknorpel in Ver-  
 bindung steht, b) die hintere<sup>9</sup>, als Wirbelende, (E. poste-  
 rior<sup>10</sup>, Remulus<sup>11</sup>.) welche von dem Körper der Rippe nach hin-  
 in das Köpfschen derselben ausläuft, und so mit den Körpern der  
 Rückenwirbel in Verbindung tritt, unterschieden wird. Auf gleiche  
 Weise wird auch an den Rippenknorpeln ein vorderes<sup>12</sup> und  
 hinteres<sup>13</sup> Ende, (E. sternalis<sup>14</sup> et costalis<sup>15</sup>.) unterschieden.  
 Rippen.

1) Böhmer's Anweis. zum Unterr. in d. Knochenl. S. 460. 2) Hilde-  
 brandt's Lehrb. d. Anat. d. M. 1. B. S. 555 u. 559. 3) Pöder's  
 anat. Handb. 1. B. 166. 4) — 6) Mayer's Besch. d. menschl. K. 2. B. S. 153 u. 154. 7) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. S. 559. 8) Monro's Knochenl. übers. v. Krause, S. 535, Note. S. auch dieß Wort. 9) 10) Hildebrandt's Lehrb. u. f. w. a. a. D. S. 555. 11) Monro's Knochenl. u. f. w. S. 332, Note. S. auch dieß Wort. 12) — 15) Pöder's anat. Handb. 1. B. S. 212.

**Extremitäten der Tibia<sup>1</sup>,** (Extremitates tibiae<sup>2</sup>.) End-  
 theile<sup>3</sup>, oder Enden<sup>4</sup> des Schienbeins: a) die obere<sup>5</sup>,  
 superior<sup>6</sup>.) auch als Kopf mit den zwei Condylen der Ti-  
 bia, b) die untere<sup>7</sup>, (E. inferior<sup>8</sup>.) als Basis der Tibia  
 unterschieden. S. die gedachten Artikel, auch Tibia.

1) Walter's Abh. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 359. 2) Schaarschmidt's  
 osteol. Tabell. Tab. 22. Nr. 2 u. 3. 3) Pöder's anat. Handb. 1. B. S. 192. 4) Pöder's anat. Handb. 1. B. S. 293. 5) — 8)  
 Walter's Abh. u. f. w. und Schaarschmidt's osteol. Tab. a. a. D.

**Extremitäten der Ulna<sup>1</sup>,** (Extremitates ulnae<sup>2</sup>.) End-  
 theile<sup>3</sup>, oder Enden<sup>4</sup> der Elbogendröhre: a) die obere<sup>5</sup>,  
 superior<sup>6</sup>.) auch als Kopf mit den zwei Condylen der Ulna,  
 b) die untere<sup>7</sup>, (E. inferior<sup>8</sup>.) als Basis der Ulna  
 unterschieden. S. die gedachten Artikel, auch Ulna.  
 1) Walter's Abh. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 299. 2) Schaarschmidt's  
 osteol. Tabell. Tab. 20. Nr. 4. 3) Pöder's anat. Handb. 1. B. S. 174. 4) Pöder's anat. Handb. 1. B. S. 244. 5) — 8)  
 Walter's Abh. u. f. w. und Schaarschmidt's osteol. Tab. a. a. D.

## 362 Extremitäten d. Coccyxknochens Extremit. d. Schlüsselb.

(E. superior<sup>6</sup>), auch als Kopf, nach hinten mit dem Mecra non, nach vorn mit dem coronoideischen Proceß unterschieden, b) die untere<sup>7</sup>, (E. inferior<sup>8</sup>), oder Condylus der Ulna. S. die gedachten Artikel, auch Ulna.

6) — 8) S. Note 5.

**Extremitäten des Coccyxknochens**, f. Basis und Spitze der Coccyxknochen.

**Extremitäten des Fußes**<sup>1</sup>, (Extremitates pedis,) dergleichen werden eine hintere<sup>2</sup>, (E. posterior,) als Ferse, und eine vordere<sup>3</sup>, (E. anterior,) oder die Spitze des Fußes unterschieden. S. Digital- und Tarsische Extremität des Fußes.

1) — 3) Walter's Abh. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 572.

**Extremitäten des Oberarmknochens**<sup>1</sup>, (Extremitates ossis brachii<sup>2</sup>), Endtheile<sup>3</sup>, oder Enden<sup>4</sup> des Oberarms, werden a) als eine obere<sup>5</sup>, (E. superior<sup>6</sup>), nach dem Schulterblatt zu gerichtete, an der der Kopf nebst dem Hals und zwei Tuberkeln bemerkenswürdig sind, und b) eine untere<sup>7</sup>, (E. inferior<sup>8</sup>), mit dem Vorderarm sich verbindende, mit den beiden Condylen und Articulationsgruben unterschieden. S. Oberarmknochen.

1) Walter's Abh. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 290. 2) Schaareschmidt's osteol. Tabell. Tab. 20. Nr. 3. 3) Palfyn's chir. Anat. übers. v. Huth, 1. B. S. 170. 4) Pöder's anat. Handb. 1. B. S. 229. 5) — 8)

Walter's Abh. u. f. w. und Schaareschmidt's osteol. Tab. a. a. D.

**Extremitäten des Radius**<sup>1</sup>, (Extremitates radii<sup>2</sup>), Endtheile<sup>3</sup>, oder Enden<sup>4</sup> der Speiche: a) die obere<sup>5</sup> schmale; (E. superior<sup>6</sup>), die sich besonders durch den Condylus, oder Kopf, und den Hals merklich macht, b) die untere<sup>7</sup>, (E. inferior<sup>8</sup>), auch als Basis betrachtet. Vgl. die genannten Theile. S. Ulna.

1) Walter's Abh. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 506. 2) Schaareschmidt's osteol. Tabell. Tab. 20. Nr. 5. 3) Palfyn's chir. Anat. übers. v. Huth, 1. B. S. 174. 4) Pöder's anat. Handb. 1. B. S. 237. 5) — 8)

Walter's Abh. u. f. w. und Schaareschmidt's osteol. Tab. a. a. D.

**Extremitäten des Schenkelknochens**<sup>1</sup>, (Extremitates ossis femoris<sup>2</sup>), Endtheile<sup>3</sup>, oder Enden<sup>4</sup> des Schenkelbeins, werden als eine obere<sup>5</sup>, (E. superior<sup>6</sup>), wovon sich besonders der Kopf, der Hals und die beiden Trochanteren auszeichnen, und als eine untere<sup>7</sup>, (E. inferior<sup>8</sup>), mit den beiden Condylen des Schenkelknochens unterschieden. S. Schenkelknochen.

1) Walter's Abh. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 349. 2) Schaareschmidt's osteol. Tabell. Tab. 22. Nr. 1. 3) Palfyn's chir. Anat. übers. v. Huth, 1. B. S. 187. 4) Pöder's anat. Handb. 1. B. S. 285. 5) — 8)

Walter's Abh. u. f. w. und Schaareschmidt's osteol. Tab. a. a. D.

**Extremitäten des Schlüsselbeins**<sup>1</sup>, (Extremitates clavulae,) Endtheile<sup>2</sup>, oder Enden des Schlüsselbeins, dergleichen werden eine vordere, (E. anterior,) am Sternum, und eine hintere, (E. posterior,) am Schulterblatt unterschieden. S. Sternal- und Scapularextremität des Schlüsselknochens.

1) Walter's Abh. v. trockn. Knoch. 2. Aufl. S. 272. 2) Palfyn's chir. Anat. übers. v. Huth, 1. B. S. 160.



*Extremitas brachii inferior, superior*, s. Extremitäten des Oberarmknochens. — *cartilaginum costarum costalis, et ster-*  
*corum*, s. unter Extremitäten der Rippen. — *claviculae anterior*,  
 E. claviculae sternalis. — — *acromialis*, s. humera-  
 i. q. E. claviculae scapularis. — — *inferior*, s. pecto-  
 ris, i. q. E. claviculae sternalis. — — *posterior*, s. sca-  
 puris, s. Scapularextremität des Schlüsselknochens. — — *ster-*  
*corum*, s. *superior*, s. Sternalextremität des Schlüsselknochens.  
*corum ossis hyoidei majorum inferior*, s. unter Wurzel  
 Hörner des Zungenknochens. — *costarum anterior, inferior*,  
*anterior, superior*, s. Extremitäten der Rippen. — *fibulae*  
*anterior, superior*, s. Extremitäten der Fibula. — *manus bra-*  
*chialis, digitalis, inferior, superior*, s. Extremitäten der  
 Hand. — *nasi*, s. *nasi inferior*, s. Spitze der Nase. — —  
*anterior*, s. Wurzel der Nase. — *nervi olfactorii vaccinis pa-*  
*pillis similis*, s. Bulbus des olfactorischen Nerven. — *ossis bra-*  
*chii et femoris, inferior, superior*, s. Extremitäten des Ober-  
 arm- und Schenkelknochens. — — *brachii scapularis*, s. Kopf  
 Oberarmknochens. — *ossium coccygis inferior*, s. Spitze der  
 Coccyxknochen. — — — *superior*, s. Basis der Coccyxknochen.  
 — *metacarpi inferior, superior*, s. Extremitäten der Kno-  
 chen des Metacarpus. — — *metatarsi anterior, posterior*,  
 Extremitäten der Knochen des Metatarsus. — *pancreatis acuta,*  
*acuspudata*, s. Spitze des Pancreas. — — *dextra*, s. duodena-  
 lis, s. *lata*, s. Kopf des Pancreas. — — *lienalis*, s. Spitze des  
 Pancreas. — — *obtusa*, s. Kopf des Pancreas. — — *sinistra*, s.  
 Spitze des Pancreas. — *pedis anterior, s. digitalis*, s. Digi-  
 talextremität des Fußes. — — *posterior, s. tarsea*, s. Tarsei-  
 Extremität des Fußes. — *phalangum digitorum inferior*,  
*anterior*, s. Extremitäten der Phalangen der Finger und Zehen.  
*radii inferior, superior*, s. Extremitäten des Radius. —  
*tibiae et ulnae inferior, superior*, s. Extremitäten der Tibia  
 und Ulna.

*Extremitates*, s. Extremitäten. — *cartilaginum costarum*,  
 unter Extremitäten der Rippen. — *claviculae*, s. Extremitäten  
 Schlüsselknochens. — *costarum*, s. Extremitäten der Rippen.  
*fibulae*, s. Extremitäten der Fibula. — *glandularum acumi-*  
*natae*, s. Papillen der Nieren. — *inferiores*, s. Füße. — *ma-*  
*nus*, s. Extremitäten der Hand. — *musculorum*, s. Extremitäten  
 Muskeln. — *ossis brachii*, s. Extremitäten des Oberarmkno-  
 chens. — — *femoris*, s. Extremitäten des Schenkelknochens. —  
*capitulum*, s. Extremitäten an Knochen. — — *coccygis*, s. Basis  
 Spitze der Coccyxknochen. — — *metacarpi*, s. Extremitäten  
 Knochen des Metacarpus. — — *metatarsi*, s. Extremitäten  
 Knochen des Metatarsus. — *pedis*, s. Extremitäten des Fußes.  
*phalangum digitorum*, s. Extremitäten der Phalangen der Fin-  
 ger und Zehen. — *radii*, s. Extremitäten des Radius. — — *supe-*  
*iores*, s. Arme. — *tibiae*, s. Extremitäten der Tibia. — *ul-*  
*nae*, s. Extremitäten der Ulna.

*Extremum cordis*, f. Spitze des Herzens.

*Extuberantia*, *Extuberatio*, f. Protuberanz.

*Excuberes*, Kinder, die nicht mehr an der Mutterbrust sind, in Gegensatz von *Sabuberes*: S. Säugling.

*Exuvium*, i. q. *Corium*.

- 1) Gebrauchlicher *exuviae*, in dem Sinne von abgezogener Thierhaut, sonst auch Kleidung, wörtlich das Ausgezogene, von dem obsoleten Abjectivum *exuvius*, a, um, in obigem Sinne nach Keuchen in ed. Sereni Sammonici *corn. de med. p. 314*.

*Ey u. f. w.*, f. Ei u. f. w.

*Eyleiter*, f. Faloppische Röhre.













